




# إدوار غَالِب المَوْسُوعَة

٢٤٢٠ صفحة • ٣١٤٦٤ مائة


٦٩٦٢ رسمًا • ٢٤ لوحة ملونة

# في عُلُومِ الطَّبِيعَة

تبحثُ في الزَّرَاعَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَ وَالْجَيُولُوجِيَا



دارالمشرق بيروت



الموسوعة في علوم الطبيعة



مَشْهُورَانَتْ ،  
دَارُ الْمَشْهُورَاتِ ش.م.م  
ص.ب. ٩٤٦ - بَيْرُوت ، لُبْنَان



الْمَشْهُورَاتُ ،  
الْمَكْتَبَةُ الشَّرْقِيَّةُ - سَاعَةُ الْجَمْعَةِ  
ص.ب. ١٩٨٦ - بَيْرُوت ، لُبْنَان





الرسوم :

جورج ديب

جورج غنتوس

جان فرطاري

جهاد جبر

سليم غصن

المجموعة : ISBN 2-7214-2148-4

المجلد الثالث : ISBN 2-7214-2151-4

يحتوي هذا المجلد من

الموسم الثاني من الموسوعة

١٠١٠٤ مادة

٢٠٧٧ رسماً

٨ لوحات ملونة

الأوزان غالباً

مهندس زكاري


# الموسوعة في علوم الطبيعة

تبحث في الزراعة والنبات والحيوان والطير والسمك والحشرات والفطور  
والجراثيم والأرض الحيوانية والنباتية والمصطلحات العلمية على اختلافها  
أخصها الفيزياء والكيمياء والرياضة والجغولوجية والطبيعة والجغوف  
وتألف من أربعة مجلدات يحتوي آخرها على مسارد للمصطلحات باللغات :  
الألمانية ، الإنكليزية ، الإيطالية ، الفرنسية ، اللاتينية ، اليونانية

طبعة ثانية محدّدة

المجلد الثالث

من القاف إلى الياء



ق

٢١٣٧٠ - قابِل الإِنْفِلَاق Fissible, Fissile (F).  
Fissile (E).

نعت تعريفي يطلق عل ما كان يحمل في تكوينه ميزة الانفلاق .

٢١٣٧١ - قابِل الانِهضَام Digestible (F).  
ما كان حفسه هيباً كاملاً .

٢١٣٧٢ - قابِل التَمَثُّل Assimilable (F).  
هو السائغ من الغذاء .

٢١٣٧٣ - قابِل القِسْمَة Divisible (F).  
هو ما كان مقدور القسمة .

٢١٣٧٤ - قابِلِيَّة ، اسْتِعْدَاد Aptitude (F).  
Taste (E). ميل طبيعي أو آفتابي نحو شيء معين .

٢١٣٧٥ - قابِلِيَّة الإِنْفِطَال ، بَطْطَان Annulabilité, Nullité (F). Nullity (E).  
هو انتقاص عقد بسبب فقدان أحد الشروط الجوهرية أو الشكلية اللازمة لصحته .

٢١٣٧٦ - قابِلِيَّة الاغْتِذَاك Faculté nutritive (F).  
Nutritive faculty (E). هي المقدور الغذائي .

٢١٣٧٧ - قابِلِيَّة الإِنْتِاش ، خاصِيَّة الإِنْتِاش Faculté germinative (F). Germinal faculty (E).  
هي المقدار النسبي ال ما ينتش من عدد بزور معين . فإذا

نتش سبعون برة من أصل مائة برة يقال أن قابلية الانتاش في تلك البزور هي سبعون من المئة .

٢١٣٦١ - قَاب ، قَيْب Rayon (F). Radius (E).  
نصف قطر الدائرة .

٢١٣٦٢ - قَابَ Troisième année (F).  
القاب اسم السنة الثالثة بعد الحاضرة . يقال أنك لا تستغل أرضك لا العام ولا القابل ولا القاب .

٢١٣٦٣ - قَابَة Couvi (F).  
القابة والقائية : بيضة الطير المحفوظة .

٢١٣٦٤ - قَابِس Récepteur (F). Receiving (E).  
كل جهاز قابل أو آخذ كما في التلغراف والتلفون .

٢١٣٦٥ - قَابِض ، عَقِص Astringent  
القابض من العلوم ما ينقبض اللسان منه . والقابض من الادوية ما يحبس الفضلات المنفعة من المعدة .

٢١٣٦٦ - قَابِض ، مُقَلِّص Contractif (F).  
Contractive (E). ما يجمع أجزاء العضو ويكنفه .

٢١٣٦٧ - قَابِض ، مُنْسَلِم Accipiens (F).  
هو من يقبض المفقود عليه أو الملكية .

٢١٣٦٨ - قَابِعَات الأَسْكَان Pleurodonte (F).  
Pleurodotes (E). نعت تعريفي توصف به العظام من ذوات الاسنان القابعية المرتزة في الحالة الداخلية من الفك . ويقالها شارقات الاسنان .

٢١٣٦٩ - قَابِل An prochain (F). Next year (E).  
اسم لعام المقبل بعد العام الحاضر .

Rémige primaire, Flèche (F). ٢١٣٩٢ - قادمة  
Wing primary (E).  
ريشة من أرياش مقدم الجناح. ج. قوام. والأشعار  
والمواشير في القوام.

Trémie (F), Hopper (E). ٢١٣٩٣ - قاذوس  
هو عين الطاحون. ثقب أو فرجة أو شق يلقى الحب  
الذي يمر به شيئاً فثباتاً.

Albatros ٢١٣٩٤ - قاذوس  
طائر بحري كبير القند مشهور باسم قطرس، أطلبه.

Asphalte (F), Asphalt (E). ٢١٣٩٥ - قار  
هو الزفت أو الإسفلت، نوع من الحجر المنسج الاسود  
الناع. يستعمل في ترقيت الطرقات.

Carya (S), Caryer (F), Hickory (E). ٢١٣٩٦ - قار  
جنس أشجار حرجية وزراعية من فصيلة الجوزيات.  
أنواعه عديدة أصلاً البلاد الحارة. جميعها كبيرة القند،  
دائمة. أوراقها مركبة، عابلة. أزهارها الذكورية أبوية  
الارتكاز، سنبلية التجميع، دقيقة متدلية. أزهارها  
الانثوية طرفية الارتكاز، ثلاثية التجميع. ثمارها جزوية،  
جامدة الغلاف، رباعية الفلق || أحرف أنوعه  
وأشهرها ما يتبع.

Carya aquatica (S). ٢١٣٩٧ - قارة المتابع \*  
Caryer des marais (F), Swamp hickory (E), Sum-  
phickorybaum (D), Caria palustre (I).  
نوع من القار يجثوه كبيرة القند فارة تملو من ٢٥ إلى  
٣٠ م. وريقاتها كبيرة القند وريّة التجميع براوح  
عددها بين ٩ و ١٣. نصلها أحليسي الشكل ذاتي الزمام  
الاخبر وهو بارز العروق سنن الحافة || ثمارها بيضية  
مقطونة عادمة الجناح.

٢١٣٩٨ - قارة بيضاء، قارة بيضيّة  
Carya alba, C. ovata (S), Caryer blanc (F), White  
hickory (E).  
نوع من القار يجثوه سبروتية تملو من ١٥ إلى ٢٠ م.  
براعمها متراكبة الحراشف الجذوية اللون. أوراقها كبيرة  
القند. وريقاتها سنانية النصل تطول نحو ٢٠ سم. وتعرض  
نحو ٨ سم. || ثمارها بيضية، لوزها صغير القند،  
مستحب الطعم.

٢١٣٩٩ - قارة زيتونية \*  
Carya pscan, C. olivaeformis (S), Caryer pscanier,  
Noyer pscan (F), Pecan-nut tree (E), Pekanbaum (D),  
Caria (I).  
نوع من القار يجثوه كبيرة القند فارة تملو من ٢٥ إلى  
٥٠ م. براعمها حادة الحراشف. أوراقها كبيرة القند.  
وريقاتها وريّة التجميع براوح عددها بين ١١ و ١٧  
وهي أحليسية الشكل متفحة، نصلها يطول من ٨ إلى  
١٥ سم. ويعرض من ٣ إلى ٦ سم. وهو سنن الحافة  
مزهبر العروق. ثمارها بيضية الشكل مقطوعة القلق  
تطول من ٣ إلى ٤ سم. قشرة الثمرة تنفلق عند الإدراك  
عن ٤ لوزات زيتونية الشكل لهاها أبيض اللون مستحب  
الطعم والنكهة.

٢١٣٩٨ - قابلية التصرف، قابلية التملك  
Aliénabilité (F), Alienability (E).  
صفة قانونية عاقلة بمال يمكن نقل ملكيته بموض أو بلا  
عوض.

٢١٣٩٩ - قابلية التسل، قابلية العزل  
Amovibilité (F), Removability (E).  
تقال عن موظف يجوز نقله أو استبدال وظيفته أو عزله  
بقرار.

٢١٣٩٠ - قابلية الانهضام  
Digestibilité (F).  
مقدور الشيء حل الانهضام. وهو ما يجب فوارق  
الانهضام في الأغذية.

٢١٣٩١ - قابليق  
Kapoquier (F).  
هو الكايك، أطلبه.

٢١٣٩٢ - قات \*، شاي العرب، حراكية مأكولة  
Catha edulis, Celastus edulis (S), Célastré com-  
estible, Cathé comestible, Gaz (F), Catha, Khât, Kât,  
Arabian tea plant (E), Kaspianzoo (D), Catha (I).  
نوع من الحراكية وهي جنبة برية وزراعية من فصيلة  
القاتيات. ساقها فراء تملو نحو ٣ أمتار. أوراقها متفحة،  
متقابلة، أحليسية النصل، يقال أنها طيبة. أزهارها  
صفوية، طرفية الارتكاز، غصراء اللون، صفراء الملوام،  
خاسية الفصل والبتلات والاسدية. ثمارها دقيقة مستديرة  
سائرة الطعم مأكولة || تزروع في اليمن وأحبشة حيث  
يمضقون أوراقها المنبة المنهضة ويستخرجون من تقطير  
ثمارها مشروب كحولي شديد الوقع على الأعصاب.

٢١٣٩٣ - قاتل أبيض  
Arbousier (F).  
هو الشغلب، أطلبه.

٢١٣٩٤ - قاتل أخضر  
Orchis (F).  
هو السحلب، أطلبه.

٢١٣٩٥ - قاتل البق  
Cimicaire (F).  
هو الأبق المنقودية، أطلبه.

٢١٣٩٦ - قاتل البقر  
Cigu des marais (F).  
هو الشوكران الدم، أطلبه.

٢١٣٩٧ - قاتل الحشرات، حاشوشه  
Insecticide  
كل مادة تصلح لقتل الحشرات.

٢١٣٩٨ - قاتل الكتك  
Colchique d'automne (F).  
هو سورجان الخريف، أطلبه.

٢١٣٩٩ - قاتل التيسر  
Aconit napal (F).  
هو الاكونيت أرمي، أطلبه.

٢١٣٩٠ - قاتليات  
Celastraceae (S).  
Célastracées (F), Celastraceae (E).  
هي الحرايات فصيلة نباتية من ذوات الفلقين. أشهر  
اجناسها الحراية وبها القات.

٢١٣٩١ - قاحل  
Asperme (F), Aspermeus (E).  
الفاصل من النبات العادم البذور.



قات



.....



قارة زيتونية (البار)

أصنافها منظر آفاق البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الهندي. تتميز من امكان سطح الينابيع والشلالات بمياهها الباردة وجميها وهي الشلال في غيلول من ٩٠ الى ١٠٠ م. ويزن من ٤ الى ١٢ كيلو. ثوبها الى الصلبة القطنية يسر عنه الظهور ويملو قبعين مستديرين اسود في الظهور والجلالين. وأنها متدلة الجرم، شريطي الخط، رصبة الانفراج. لها مثال الانفراج. استنساخ صفة، صيها كيرتان، جاسطان. زفافها الظهيرة الى الحرة، الصديرة صفراء اللون والحويصة كذلك. زعفرانها الشرجية حراء. اما الفالية صفراء وعلاية التتمير. لحما فاغر الصف، مرغوب،

٢١٤١ - قَارُون - Acore (F).  
نبات جلدسوري عطر يقال له عود ألوج . اطلبه .

۲۱۴۱۱ - قاري، كودني Continental  
هو مايت الى قارة. كقولك مناخ قاري او كودني.

٢١٤١٢ - قوارية  
 Rollier (F). قال فيها الجاحظ والكسائي : طائر الخضر  
 الظهور ، أسود المنقار الطويل ، قصير الرجلين ، أخضر من  
 الخلفات . ج قواري .

Graine de tamarin (F).      قاريط - ٢١٤١٣  
سحب التمر الهندى .

Amphibie (F). **قَازِب ، بَرَمَائِي**  
 Amphibious, Amphibian (E).  
 كل حيوان مسكنه الماء لكنه يستطيع الخروج منه بعض الوقت كالقملقة وفرس البحر والتمساح الخ.

٢١٤١٥ - قَاسَ ، قَدَّرَ ، مَتَرَ ، ذَرَعَ ، مَسَحَ ،  
صَاعَ ، كَالَ

اعمل قياس مختلف وجوه الشيء لمعرفة مقداره . كقياس الطول والعرض لمعرفة المساحة وقياس الطول والعرض والارتفاع لمعرفة الحجم .

Exertile - قاسح  
نعت تعريفي يوصف به العضو القابل للانتشار ان في الحيوان او في النبات .

Diviseur (F). ٢١٤١٧ - قاسم ، مقسوم عليه  
 Divisor (E).

Diviseur commun (F). قاسم مشترك - ٢١٤١٨  
Common divisor (E).

٢١٤١٩ - قَاسِيَاتُ الْجُلُودِ Sclérodermes (F).  
مرتبة من الاسماك  
الملحومات الفكوك.

Oculée (F). قَاشِرَة - ٢١٤٢٠  
نعت تمرين، توصف به اللطخة الشبيهة بالعين.

٢١٤٢١ - قاصير Mineur (F), Minor (E). هو الذي لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره فهو عديم اهلية الاداء الا في حالات عنها القانون .

Siève (F). Hamper (E). قاصوصة - ٢١٤٢٢  
حوتة من القصب أو القصب .

Carya tomentosa (S). قارة قطيية  
Caryer cotonneux (F).

نوع من القار شجرته تملو من ٢٠ الى ٢٥ م. راعها  
مراكبة الحراشف الجبوية اللون. اوراقها متوسطة الكبر.  
ورديقتها سبعية او تساعية التركيب، جميعها لائفة،  
متصلها خلي الصفحة السفلى. ثمارها صغيرة القد، لوزها  
سكري الطعم المستحب.

٢١٠١ - قارورة حرة ، قارورة قلبية  
*Carya cordiformis*, *C. amara* (S). *Caryer amer* (F).  
 نوع من القار حرة سبروتية تعلق من ٢٠ إلى ٣٠ م.  
 أوراقها حادة اطرافها مسننة صفراء اللون. أوراقها تعلق من  
 ٣٠ إلى ٤٠ سم. وريقاتها بترية التجميع ، حدها رايح  
 يونية ٧ و تصلها بطول نحو ١٦ سم. ويرى ٣ سم.  
 البنية إلى الخضراء الزاهي ، حجارة منشاري التفرع.  
 ثمارها مكورة ، جامدة الغلاف ، مجنسة القنب. لوزها  
 قلبي الشكل مر الطعم ، قلوي المادة .

٢١٤٠٢ - قَارَح  
Coin (F). Corner tooth (E).  
سنّ قاطعة ثلي الرباعية. وهما عند الخيل قارحان في كل  
فك. || ترتيب اسنان الخيل يبتدئ بالكنايا ثلثها الرباعيات  
ثم القوارح.

٢١٤٠٣ - قنارح  
هو البندق الهندي ، اطلبه .  
Cniquier (F).

٢١٤٠٤ - قارص  
هو المرم نبات طبي من الدفليات ، اطلبه .

٢١٤٥ - قَارِضٌ، قَاصِمٌ. Rongeur (F). Rodent (E).  
نعت تمير، يطلق على كل حيوان يتم إلى رتبة القوارض.

٢١٤٠٦ - قارۇد ۵، قارۇد ۵

أكاراتوكسيك، أكاريسيدي (F). أكاريسيدي (E).  
نُعت تعريفِي يطلق على كل مادة تستعمل للقضاء على  
القراد والحلم.

٢١٤٠٧ - قَارُورَة  
Ballon en verre (F).  
Glass receiver (E).  
آنية زجاجية لانتياية الحميم والسعة تستعمل في المختبرات .

Morone labrax (S). قاروس\* ، قروس ٢١٤٠٨  
Bar, Loup, Loubine (F). Sea bass (E).

جنس اسماء بحرية من فصيلة الغريئات. ازواجه المرقية ٧ اصنافها مياه للتوسط والاطلسي. جميعها كبيرة القند طولها يراوح بين ٣٥ و ١٠٠ سم. فيبلغ وزنها اذ ذاك نحو ١٠ كيلو. انثواها اذ الصبغة القندية ابيض يميلوا الى بعض الانواع بتيجع اسمر صدره في تلك المناطق السطحي السحرية. قوتها الاسماك الصغيرة والقشريات. تقطع خور الابرهر وتوسط صعدا في طلب المسرا وقد يكن ذلك في الشتاء تستمر اوتعود الى البحر في الربيع في من الاسماك المأكولة لحمها لذيق اللحم مرغوب فيه.

٢١١٠٩ - قَارُوس مَبْدُول \* ، قَرُوس مَبْدُول ،  
 بَرَآك مَبْدُول  
 Labrax lupus (S).  
 Bar commun, Loup de la Méditerranée, Loubine  
 vulgaire (F). Common sea bass (E).

نوع من القاروس . سمكة بحرية بيوض من فصيلة القرشيات .



قاروس



قاروس مبدول

يُعرض من ٣ الى ٥ سم. نصلها جاهد الصفحة ، بحري  
الون ثنائي القصبة الصلبة النازعة ، ازهارها خافتة الون.  
ثمارة قرمزية || يستخرج من ثمارها عصارة صمغية حارة  
الون شائعة الاستعمال .

٢١٤٣١ - قاطير عطر Dracona fragrans (S).  
Dragonier balsamique, D. odorant (F).  
شجرة زيتية تفلو من ٣ الى ٦ امتار. اوراقها سنائية  
الشكل تفلو نحو ١٠٠ سم. نصلها اسحب الصفعة ، فسقي  
الحصار اللامع . ازهارها نواحة العرف العلوي . ثمارة  
كرزية ارجوانية الون || تروخ في المراكب والمصارى  
ترغب في الارربة الدبابية .



قاط امود

٢١٤٣٢ - قاطع Interruptif (F). Interruptive (E).  
عمل قانوني يقطع مفعول عمل آخر .

٢١٤٣٣ - قاطع Interrupteur (F).  
اداة يقطع بها التيار الكهربائي . Switch, Cut-out (E).

٢١٤٣٤ - قاطع Sécante (F). Secant (E).  
خط مستقيم يقطع الدائرة .

٢١٤٣٥ - قاطع ، حاكم Péroptre (F).  
نمت الحكم التيسل الذي لا يقبل الجدل . Peremptory (E).

٢١٤٣٦ - قاطع التمام Cosécante (F).  
Cosecant (E).

٢١٤٣٧ - قاطع التروخ ، حاكس الدم Hémostatique (F).  
Hæmostatic (E).  
كل دواء يقطع النزف او السيلان .

٢١٤٣٨ - قاطعة Incisive (F). Incisor (E).  
هي اسنن الاسنان الاسمية في كل من الفكين . وللتوابع  
عد التحليل ثلاث اسنان : ثنيان وروبيعان وقارحان .

٢١٤٣٩ - قاطوب موشع Anthribus nebulosis (S).  
Anthrbe nébuleux (F). Anthribus nebulosus (E).

حشرة وائمة قانصة وأحبة من فصيلة القاطوبيات وربة  
مفصلات الاجنحة . موطنها بعض اقاليم حوض البحر  
الايض المتوسط . تألف اجراج الصنوبر . خنافسها  
واشمة تعيش على اذعار الثباتات البرية تقضم البلات  
والكؤوس والمابر . يرقاتها قانصة تعيش على ما تقترنه  
من البرقات الخاشية التي تغطي الصنوبر والشربين ||  
جسمها صغير القند يطول من ٢ الى ٤ سم. ثوبها الى  
الوراء الفضي يملو خل اشهب ينعكس عليه النور  
فيبدو كأنه موشع - رأسها معتدل الجرم ، قصير الخيط .  
عينها كبيرتان . زيانها خيطيان . فكاهها ذريبان .  
غدها شديدا الصلبة ، شبيهاة بالثعيزير . ارسافها  
ثلاثية المقل || الانثى اكبر قدماً من الذكر وابنت ثوباً  
منه واقصر ذرباناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر  
الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اوائل الصيف ||  
تروح في النهار وتبيت في الليل تحت قشور الصنوبر ||  
الطور البرقي يستمر نحو ٣٦ اسبوعاً . والبرقة عند ادراكها  
الكامل الجسوري تفلو نحو ٦ م. جسمها رمشي الشكل ،  
مستطيل القدم ، مستقيم الخصر . ثوبها الى الخفي  
الاصفر المواج . رأسها وروبياعها وشرجها الى  
السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع

٢١٤٣٣ - قاضي Rongeur (F).  
هو القارض ، آكله . Gnawing, Biting (E).

٢١٤٣٤ - قاضي ، حاصم Ester en Justice, Agir en Justice  
التسبا الى القضاء

٢١٤٣٥ - قاضي الجبل Agame (F).  
هو الحرزون ، آكله ومنه الازرق والاخضر .

٢١٤٣٦ - قاط Elacates (S).  
Elacate (F). Elacate (E).

الاسم العلمي والفرنسي والانكليزي من العربي القاط .  
جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسمريات شالكاك  
الزغائن ، انواعه المعروفة قليلة العدد . اسطائها بحار  
البلاد الحارة || اجسامها مستطيلة وشية الشكل . رؤوسها  
اسفلية ذلقة . اشداها كبيرة . هيون صغيرة ، مامحة  
زعانها الظهيرة تمتد من اواسط الظهر الى مؤخره تتقدمها  
بعض المناخر الحادة . زعانها الذيلية مقعرة || لحومها  
متوسطة الصنت ، مأكولة .

٢١٤٣٧ - قاط أسود \* Elacates nigricans (S).  
Elacate noir (F). Black elacate (E).

نوع من القاط . سمكة بحرية بيوض . اسطائها البحر  
الاجمر والمحيط الهندي || جسمها وشي الشكل يطول من  
٨٠ الى ١٠٠ سم. ثوبها الى السرة السوداء يملوها خطوط  
فضية ، قاطية ، مستعرضة || رأسها معتدل الجرم ، ذلق  
الخيط . فكها الاسفل يتقدم الاعل بعض الشيء . شفتها  
رصب الانفراج . عينها مستديرتان صغيرتان ، مامحتان .  
زعنفها الظهيرة مستطيلة تتقدمها ثمانية مناسر حادة .  
زعنفها الشرجية تقابل الظهيرة . وتمثلها شكلاً . زعنفتها  
الذيلية مقعرة العرف || لحمها متوسط الصنت ، مأكول .

٢١٤٣٨ - قاطير \* ، دم الثنين ، دم الثعبان Dracona (S).  
Dragonier (F). Dragon tree (E).

جنس اشجار ونبات برية وزيتية من سبط المليونيات  
وفصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ اسطائها البلاد  
الاستوائية جميعها بطيئة النمو مديدة العمر . بعضها يشبه  
النخل . اوراقها طرية الارتكاز يكثر فيها الشكل السني .  
ازهارها عشكوية التجميع ، تاجية الارتكاز ، يضاء الون .  
ثمارة كرزية القند والشكل ، ورتقالية الون او حمراء .  
من خصائصها انها لا تزهر قبل بلوغ ٢٥ سنة من العمر .  
يستخرج من سوق بعض انواعها عصارة صمغية حارة  
تتحول بعد تجفيفها وتحرقها الى دقيق احمر الون كبير  
الاستعمال الصنائي || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢١٤٣٩ - قاطير أرجواني Dracona terminalis (S).  
Dragonier pourpre (F).

جنية زرقية صغيرة القند ، مثبوتة ، بطيئة النمو ، ليفة  
المخار . اوراقها سيفية الشكل مستطيلة . نصلها اسحب  
الصفعة ارجوانية الون || منبها الصين . تروخ في المراكب  
ترغب في الارربة الدبابية .

٢١٤٣٠ - قاطير حنبار ، دم الاخوين Dracona draco, Pleomele draco (S).  
Dragonier sang-draco, D. gigantesque, Sang-draco (F).

جنية زرقية صغيرة القند ، مثبوتة ، بطيئة النمو ، ليفة  
المخار . اوراقها سيفية الشكل مستطيلة . نصلها اسحب  
الصفعة ارجوانية الون || منبها الصين . تروخ في المراكب  
ترغب في الارربة الدبابية .



قاطر

اي يوم من القمر يقابل ٢٥ حزيران سنة ١٩٦٦ . اتبع الطريقة التالية : القاعدة ٨ اخف البها علامة شهر حزيران اي ٤ ثم اخف ٢٥ اي ايام الشهر الشمسي فيصح المبحر ٣٧ ، اسقط ٣٠ يبقى ٧ هو المطلوب .

٢١٤٤٩ - قاعدة المثلث (F).  
Base of a triangle (E).

السطح الذي يرتكز عليه الخط العمودي .

٢١٤٥٠ - قاعدة المنشور (F).  
Base of a prism (E).

السطح الذي يرتكز عليه الخط العمودي .

٢١٤٥١ - قاعدتي ، أساسي (F).  
Basilaire, Basique (F). Basilar, Basic (E).

صفة الجسم الذي يحوي خاصة القاعدة . ونعت ترميني يطلق على كل ملح سوي سطحاً من القاعدة .

٢١٤٥٢ - قاعدته (F).  
Basicité (F). Basicity (E).

صفة الاجسام التي تمثل دور القاعدة في التراكيب الكيميائية .

٢١٤٥٣ - قافزات الذئب (F).  
Collemboles (F).

هي الكهديات . اطلبها .

٢١٤٥٤ - قافزة القطن (S).  
Lepidocyrtinus incertus (S).

هي كهدل القطن ، اطلبه .

٢١٤٥٥ - قافزة الموز (F).  
Drépanure du bananier (F).

هي كهدل الموز ، اطلبه .

٢١٤٥٦ - قاقور ، قاقور (F).  
Spatha (F).

هو الكانكور ، وعاء ملغ السفل .

٢١٤٥٧ - قاق (F).  
Corneille cendrée (F).

هو الفراق الابقع . يعتبر من الطيور المؤذية .

٢١٤٥٨ - قاق البحر (F).  
Corbeu de mer (F).

سمكة بحرية تدعى قرية سوداء ، اطلبها .

٢١٤٥٩ - قاق الماء (F).  
Cormoran (F).

هو القاق ، اطلبه .

٢١٤٦٠ - قاقلي ، قاقلي (S).  
Cacalia (S). Cacalie (F). Cacalia (E). Kakalie (D). Cacalia, Cacano (I).

جنس نباتات عشبية معمرة ، برية وزراعية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة بعضها طبي وزرني . اوراقه متناوبة ، لاقطاسية الشكل . ازهاره حذقية التجميع ، بيضاء اللون . يزهر مهدبة ، اهدابها وحيدة الصف . اشهر انواعه ما يلي .

٢١٤٦١ - قاقل سرمكي الورق (F).  
Cacalia atriplicifolia (S). Cacalia à feuilles d'arroche (F).

نوع من القاقل وهو جنبة معمرة تعمل من ٩٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها مفصصة ، حادة التنتين . نصلها اخضر الصفحة العليا ، بحري السفل . اهدابها مستعرضة ، لاقطاسية التركيب . ازهارها بيض || ازهارها يستمر من آب تشرين الاول .

٢١٤٦٢ - قاقل طبي ، قاقلي بوصبرية الورق (F).  
Cacalia verbascifolia (S). Cacalie sacrée (F).

نوع من القاقل وهو جنبة طيبة صغيرة معمرة تعمل من ٦٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها بيضبة الشكل ذلقة ، نصلها يطل

ينفضي في آخر سرداب دخلته البرقة ضمن غشاء رقيق هزيل .

٢١٤٤٠ - قاطوبيات (S).  
Anchribidae (S). Anthribidae (F). Anthribidae (E).

فصيلة حشرات واسعة دائمة قاطنة وانجبة من رتبة عثديات الاجنحة || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المستقلة الحرارة . تألف الاجراج وتميش على المواد النباتية المنسقة وعلى ما تقتصره من يرقاات الحشرات الخاشية || اجسامها متباينة الاحجام بين الصغيرة والوسلى ، اشكالها قريبة الشبه بالسوسيات . رؤوسها صغيرة . اخطاها مستعرضة وقصيرة . زباناها غطية نحيلة وقد تنتهي بفصل صقبة متطاوله . كواسلها لاقطاسية الشكل . اعمادها لاحقة . جرابها نسيطة . ارساها ثلاثية العقول || اشهر اجناسها القاطوب والطعانة .

٢١٤٤١ - قاطوع العنب (F).  
Tordeuse de la grappe (F).

حشرة مؤذية تدمر عناقيد العنب تدعى ادويس اطلبها .

٢١٤٤٢ - قاع (F).  
Tordeuse de la grappe (F).

القاع : ارض سهلة مطبنة قد انفرجت عنها الجبال والاكمام .

٢١٤٤٣ - قاعدة (F).  
Base (F).

هي الاساس . اطلبه .

٢١٤٤٤ - قاعدة (F).  
Règle (F). Rule (E).

الخط الواجب اتباعه للوصول الى الهدف .

٢١٤٤٥ - قاعدة ، نظرية (F).  
Théorie (F). Theory (E).

٢١٤٤٦ - قاعدة السنوات السابقة (F).  
Règle de la pénultième année (F).

قاعدة السنوات السابقة (F).  
Règle de la pénultième année (F).

٢١٤٤٧ - قاعدة السنوات المسيحية والمجرية (F).  
Règle de la pénultième année (F).

هي القاعدة التفرعية المتبعة لفترة السنة الهجرية اعتباراً من السنة المسيحية او السنة المسيحية اعتباراً من الهجرية .

١) السنة الهجرية =  $X + \frac{X}{33}$

٢) السنة المسيحية = السنة الهجرية - ٣٢ + ٦٢٢

٣) السنة الهجرية = السنة المسيحية - ٦٢٢ + ٣٢

٤) السنة المسيحية = السنة الهجرية - ٦٢٢ + ٣٢

٥) السنة الهجرية = السنة المسيحية - ٦٢٢ + ٣٢

٦) السنة المسيحية = السنة الهجرية - ٦٢٢ + ٣٢

٧) السنة الهجرية = السنة المسيحية - ٦٢٢ + ٣٢

٨) السنة المسيحية = السنة الهجرية - ٦٢٢ + ٣٢

٩) السنة الهجرية = السنة المسيحية - ٦٢٢ + ٣٢

١٠) السنة المسيحية = السنة الهجرية - ٦٢٢ + ٣٢

١١) السنة الهجرية = السنة المسيحية - ٦٢٢ + ٣٢

١٢) السنة المسيحية = السنة الهجرية - ٦٢٢ + ٣٢



قَاتُل

Moule (F), Mould (E).

٢١١٧٤ - قَالِب

الجهاز الخاص بالبلك .

Fibrophaë (F).

٢١١٧٥ - قَالِف

Fibrophagous (E).

القائف من الحيوان والحشرات ، الذي يقضي كل قشور النبات واليائها .

Maclura (S).

٢١١٧٦ - قَانَة ، مَكْلُورَة

Maclura, Maclure (F), Osage tree (E).

جنس اشجار وعشيرات معمرة فراء من فصيلة التوتيات . انواعها قليلة منها البرية والزرعية . فروعها شائكة ، اوراقها

معنقة متعاقبة . نصلها يبيض الصفحة الكاملة او ثلاثي التعميص . ازهارها ثنائية المسكن ، الذكورية منها عشودية النجيب اما الانثوية طفيفة . احشائها قوية ، لينة ، لونها الالفار الحلي ، تستعمل في صناعة القسي || اشهر انواعها القانة البرتقالية .



قائم ، هرمن

٢١١٧٧ - قَانَة بَرْتَقَالِيَّة ، مَكْلُورَة بَرْتَقَالِيَّة

Maclura aurantiaca, Toxicylon pomiferum (S). Maclura oranger, Oranger des Osages, Bois d'Arc (F). Bow-wood tree, Osage orange (E). Osagedorn, Osagenapfel (D). Maclura aurantiaca (I).

نوع من القانة وهي شجرة سبروتية فراء داخلة تملو من ١٥ الى ٢٠ م . اوراقها تفول من ٧ الى ١٦ سم . وتعرض من ٣ الى ١٠ سم . نصلها اخضر الصفحة للامعة البشرة ، يارز الفروق الباعثة اللون . ازهارها يستمر من سز ران الى تموز . ثمارها مأكولة وهي برتقالية الشكل والحجم واللون .

Géster (F), Gizzard (E).

٢١١٧٨ - قَانَصَة

ثالث جيب في جهاز هضم الطير . وهي حنة دون القبة تعرف باللاطفة والجربنة والحوصل والحوصلة والفرقة والقنصة والمخفلة ...

Canon

٢١١٧٩ - قَانُون

مجموعة شرائع كنسية متباينة المصادر بعضها يركز على التامم السأورية وبعضها يجاري الحقوق الطبيعية والعرف والتقاليد والقانون المدني .



قانة برتقالية

Loi (F), Law (E).

٢١١٨٠ - قَانُون ، شَرِيعَة

القانون او الشريعة معناه مجموعة القواعد القانونية التي سبها المشرع || والقانون بمعناه الضيق مجموعة القواعد الانجائية الثابتة التي تسبها السلطة العامة وتكمل الفقرة تنبيلها .

٢١١٨١ - قَانُون ، مَجْمُوعَة الْقَوَائِن

اسم شامل يطلق على مختلف فروع علم القانون وتصممه التشريعية المنسقة والمجموعة في ابواب ودوا .

٢١١٨٢ - قَانُون الْاِحْوَال الْشَخْصِيَّة

Code du statut personnel (F).

هو القانون الذي ينظم حالة المرء الشخصية من الولادة الى الوفاة وذلك من حيث الارتباط الاجتماعي والاعلى والخصائص .

٢١١٨٣ - قَانُون التَّجَارَة

Code de commerce (F).

هو القانون الذي ينظم المعاملات التجارية .

من ١٠ الى ٢٠ سم . وهو جامد الصفحة ، يارز الفروق المتوازية . اعناقها صغيرة القند خالية التركيب || ازهارها يستمر طوال شهر سز ران .

٢١١٦٣ - قَائِل عُطْرِي

Cacalia suaveolens, Synosus suaveolens (S). Cacalia odoriférante (F).

نوع من القائل وهو جنبة صغيرة القند معمرة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها السفل حراية الشكل مجنمة المالحق ، اوراقها العليا مثلثة الزوايا . اعناقها كبيرة القند ، لاقياسية التركيب تقسم من ٢٥ الى ٣٠ زهرة عرفها عطر فواح . ازهارها يستمر من آب الى تشرين الاول .

٢١١٦٤ - قَائِل كَلْبِي الْوَرِّي

Cacalia reniformis (S). Cacalia réniforme (F).

نوع من القائل وهو جنبة معمرة تملو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها السفل كلوية الشكل ، كبيرة القند تعرض نحو ٦٠ سم . اوراقها العليا اهلبيجية مستطيلة . نصلها خضر الصفائح المسننة الحار . اعناقها صغيرة القند ، خاسية الازهار البيض || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

Amome (F).

٢١١٦٥ - قَائِلَة ، بَانَلِي

في الحال ، اطبله .

٢١١٦٦ - قَائِلَة تَيْش الْفِيل

في الحال الجوزي ، اطبله .

٢١١٦٧ - قَائِلَة حَبَشِيَّة

Amome de Madagascar

في الحال الجبشي ، اطبله .

Mélégueffe (F).

٢١١٦٨ - قَائِلَة ذَكْرِيَّة

في الحال الذكر ، اطبله .

Cardamome petit (F).

٢١١٦٩ - قَائِلَة صَغِيرَة

في الحال الصغير ، اطبله .

٢١١٧٠ - قَائِلَة عَشُودِيَّة

Amome cardamome (F).

في حال حاما ، اطبله .

٢١١٧١ - قَائِلَة مُجْتَمَعَة

Cardamome silé de Java (F).

في حال جاوا ، اطبله .

Amomaceae (S).

٢١١٧٢ - قَائِلِيَّات

Amomacées (F), Amomaceae (E).

في الحالات سبط من فصيلة الزنجبليات . نباتاتها جذمورية ، عشوية ، معمرة . بعضها طيب وبعضها عطري وزراعي ودرربي .

٢١١٧٣ - قَائِم \* ، قَائِم ، هَرْمِين

Ictis erminea, Putorius erminea (S). Hermine, Belette hermine (F). Ermine, Stoat (E). Hermelin (D).

حيوان من السراييب اطائه البلاد الجبلية العالية . ثوبه العسبي الى الازرق المابقة . اما الشتوي فايض اسفر او ابيض يبق الا طرف ذنبه الذي يبقى على لونه الجوزي يطوه ملج اسود . جسمه ابيض القند ، قصير الجرامز ، طوله يراوح بين ٢٤ و ٢٧ سم . وذنبه من ١٠ الى ١١ سم . وهو من الحيوانات الشجاعة الشرسة . يسرح في الليل ، يندر على الاراض وتسلق الانجار . قوته القراع والارتب والطير والرحاقت على اختلافها من الافاعي الى العظاء . انثاه تقسم مرة في الحزن من جروين الى ثمانية . فروه جيدة الصنف نجبة القندر .



القذ؛ قشوره مستلبة، غذوية، بارزة الصلوع، لونها الى الصفرة || يرغب في التربة المروية الخفيفة الغنية بالناصر العضوية .

٢١٤٩٨ - قانون المير هو القبطان الأحمر، اطله .

٢١٤٩٩ - قانون هندي \*

Cucumis anguria (S). Angurie, Anguria, Concombre des Antilles, C. marron (F). Beer-gherkin, West Indian gherkin (E). Birgurke, Anguriengurke (D). Anguria, Cocomero anguria (I).

نوع من القرعيات الحولية، ضروبه عديدة منها البرية والزراعية، اصنافها البلاد الحارة. جميعها عديدة ومتسلقة. اوراقها كلية ثلاثية التخصيص، حية النصل حل صفحتيه. ثمارها بقلية مأكولة وهي مستطيلة المالحق، زينة الشكل والجميع، مفصلة القشور الثلثية الشاذية. الوانها تختلف باختلاف الضروب منها الاخضر والاصفر والمخمد والموشم والاخضر.

Coccomyces ٢١٥٠٠ - قاوية

جنس فطور مجهرية من الرينات وفصيلة المشاريات. يتميز بصدائه المائرة في ريشته الرسية. بونه خيطي او مخروطي الشكل مستقيم الانتصاب او اسجين، إثنائه كيدي وكثائه صلبة الشكل. بوفياته كيفية لتجميع شفاقة خيطية مستقيمة او منمنقة || انواعه قليلة منها واحد مؤد يفسى قاوية الكرز.

٢١٥٠١ - قاوية الكرز \*

Coccomyces hiemalis, Cylindrosporium hiemalis (S). فطر مجهرى يركب اناث الكرز وأوراقه وأمن ثماره. مظهره الخارجى حل الاوراق وقشوة كيفية، لونها الى البهرة تركب صفحة النصل العليا وتجنبب الضلع والوروق. قطر البقعة منها يراوح بين ١ و ٢ م. وهي شبه مستديرة او مقرنة الزوايا || يسبب جفاف النصل والأحيال الباكر بعد ان يوقف التبادل النسفي قبل زمن الركون الطيعي، وهو على الامن يقع صغيرة مبيضة لونها الى الحمرة تسبب جفاف النسج الواصلة وتعمل نقل النسج الى اثار فتجهم وتسقط || اما حل الفروع والافناد فهو يقع قرصية وسادية الشكل متوسطة الكثافة مبيضة بدون انتظام تركب البشرة وتضرب اللحاء فتدخل الاوربية وتمطعها وتمتصها عن القيام بوظيفتها || يكافح باستعمال احد الوسائل السطوكسية التجارية بعد تخفيفها ٥٠ ٪ وتريديها نحو ٠,٦ ٪ من سلفات الحديد. تنضج الانجبار حل مرتين او ثلاث مرات. الاول حل اثر القذ والثانية بعد الاول بأسبوعين والثالثة بعد الثانية بثلاثة اسابيع .

Alkalid (F). Alkalid (E). ٢١٥٠٢ - قالد

القالد آخر نجم من كوكبة بنات لنش الصغرى .

Morphologie interne (F). ٢١٥٠٣ - قالفية

Internal morphology (E). هي درس تركيب الاجسام وعضيتها الداخلية في الحيوان والنبات .

Membre (F). Membre (E). ٢١٥٠٤ - قامة

Troquer (F). To truck (E). ٢١٥٠٥ - قابض

استانصا سلمة سلمة .

٢١٤٩٤ - قانون الحراج ، قانون الاحراج

Code forestier (F). Forest rule (E).

هو القانون الذي ينظم ملكية الاحراج وصيانتها واستغلالها الى آخره .

Droit industriel (F). ٢١٤٩٥ - قانون الصناعة

Industrial law (E).

هو القانون الذي ينظم الشؤون الصناعية ويحميها .

Droit fiscal (F). ٢١٤٩٦ - قانون الضرائب

Fiscal law (E).

هو القانون الذي ينظم الضرائب على الاعيان الثابتة والمنقولة فيقدرها ويفرضها ويمن طرق جبايتها .

Code de la route (F). ٢١٤٩٧ - قانون الطرق

Rule of the road (E).

هو القانون الذي ينظم السير على الطرق .

٢١٤٩٨ - قانون العرف والعادات

Droit coutumier (F). Unwritten law sanctioned by usage (E).

مجموعة العرف القانوني التي قررها العرف .

Code pénal (F). ٢١٤٩٩ - قانون العقوبات

Penal law (E).

هو القانون الذي يبين الجرائم وعقوباتها والاشخاص الذين نصح معاقبتهم .

Lex fori ٢١٤٩٠ - قانون المحكمة

صفة لاتينية تستعمل في القانون الدولي الخاص للدلالة على نصوص القانون الذي تأخذ به المحكمة المطروح عليها النزاع .

Droit rural (F). ٢١٤٩١ - قانون زراعي

Rural law (E).

هو الذي ينظم الملكية الزراعية ويحمي الزراعة .

٢١٤٩٢ - قانون مكان التعاقد

Lex loci contractus

صفة لاتينية تستعمل في القانون الدولي الخاص للدلالة على قانون البلد الذي انعقد فيه العقد .

Lex rei sitae ٢١٤٩٣ - قانون موقع المال

صفة لاتينية تستعمل في القانون الدولي الخاص للدلالة على قانون البلد الذي يقع فيه المال . وهو يجري حل الاموال الخاصة بهما .

Légal (F). Legal, Lawful (E). ٢١٤٩٤ - قانوني

نعت يستعمل للدلالة على مطابقة القانون او حل صدور النصوص به عن القانون .

Martin-pêcheur (F). ٢١٤٩٥ - قاروند

هو القزل ، اطله .

Martin-pêcheur vulgaire ٢١٤٩٦ - قاروند شائع

هو القزل الشائع ، اطله .

٢١٤٩٧ - قانون \* قانون سقياوي

Cucumis angulatus (S). Melon santavi (F). Santavi melon (E). Santavische melonen (D). Melone santavi d'Elgitco (I).

نوع من الثمار الزراعي للمأكول ، وهو من نبات البلاد الحارة تكثر زراعته في مصر . ثماره زينة الشكل، كبيرة



قارون



قارون هندي



قاوية الكرز

٢١٥٠٦ - قَبْ

آخر حلقة من بطن القشريات .

٢١٥٠٧ - قَبْ

قب النبات ؛ يمس .

٢١٥٠٨ - قَبْ

كل طرف من طرفي فلك المحور الأكبر في الكواكب الخس أي السيارة .

٢١٥٠٩ - قَبْ

Pleurotomaria (F). Pleurotomaria (E).

جنس حلوانات بحرية من الرخويات مهديات الأرجل وفصيلة القبايات . أنواعه المعروفة كثيرة العدد ، منها نحو ٥٠٠ من متحجرات الاحقاب الاول ، واربعة أنواع معاصرة منتشرة في مجار البلاد الحارة || اصنافها كبيرة ، عتية ، رقيقة ، سباعية الدورة الحلزونية التي تضيق مع الاقتراب من القب .

٢١٥١٠ - قَبْ ، قَبْ

Polyprion (S). Cernier (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الصرايات شاكيات الزمانف . انواعه عديدة معظمها من اسماك البحر المتوسط . جميعها كبيرة القد ، طول اجسامها يراوح من ٧٠ الى ٢٠٠ سم . فلونها مستدرة ، نهامة ، متراكبة . زناظفها شاككة . يستطيل اوتارها الى السرة البنية يعلوها تقيج ابيض . وهي من الاسماك المأكولة المستحبة للعم .

٢١٥١١ - قَبْ أَسْمَر \* ، كَعْبِد ، دَبِج

Polyprion cernium (S). Cernier brun (F). Brown Stone-bass (E).

نوع من القبا . سمكة بحرية بيوض من فصيلة الصرايات . كانت ، في التصنيف السابق ، تتبع فصيلة الفرغيات . اعطائها مظهر اقارب البحر الابيض المتوسط . جسمها اطيحي الشكل ، كبير القد ، ي طول من ٧٠ الى ١٠٠ سم . حراشفها صغيرة ، معدية ، مسنة الحواشي . لوها الى السرة البنية يعلوها تقيج ابيض || رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخيط . شذفها واسع الانفتاح . فكها الاسفل يتقدم الاعل . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، تافزتان || زانفها متباينة الاشكال والاحجام ومنها المنخسية الشاككة وسبها المفصلة السرحة || عليها جيد الصنف ، مرغوب فيه الا في زمن مرض المرجان الذي يمتد من شباط الى نيسان ومن ايلول الى تشرين الثاني .

٢١٥١٢ - قَبْ

Pleurotomaridae (S). Pleurotomaridae (E).

فصيلة حلوانات بحرية من الرخويات مهديات الأرجل اميات انياشم . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد معظمها من متحجرات الاحقاب الاول وبعضها معاصر || اصنافها متغايرة الاحجام والاشكال معظمها مستطيل الحلزونية التي تبدو كأنها قب متراكبة || اعرف اجناسها واشهرها القبا والشرمة .

٢١٥١٣ - قَبْ ، قَبْ

عنية تنبت في الفلظ ولا تنبت في الجبل ترتفع عن الارض قيس الامسح او اقل ارتفاعا المائي (١ م) . ج قبا .

٢١٥١٤ - قَبْ

Tetraophsis (S). Tétraphase (F). Tetraophsis (E).

جنس طير من فصيلة الترجيات . نوعا المعروفان يمشان في جبال التبت . شكله قريب الشبه بالفرس . جسمه متوسط القد . ثوبه الى السرة المنمرة بالافير . زوره اسود مطوق بالابيض . ذنبه متوسط الطول ، مستدير الطرف . منقاده ورجلاه الى الجوزة السوداء .

٢١٥١٥ - قَبْ

القبا طير عظم المقد عما يلي المرقن .

٢١٥١٦ - قَبْ

Ours (vieux) (F). Bear (old) (E). القبا : الدب الحرم .

٢١٥١٧ - قَبْ

Claprier commun (F). هو الكبر الشاك ، اطله .

٢١٥١٨ - قَبْ

Monogénie (F). Monogeny (E).

القبا مشتع تناسل قوامه ان الاجسام المغطاة تنتج اجساما تنفصل عنها وتستقل بذاتها .

٢١٥١٩ - قَبْ \* ، قَبْ ، قَبْ

Aulacodus (S). Aulacode (F). Cane rat (E).

جنس حيوانات كبيرة قاضية ، من فصيلة الدغايات . انواعه عديدة قريية . الشبه من الجردان . اجسامها ربة قوية تقطن من ٥٠ الى ٦٠ سم . وذانها من ١٤ الى ٢٢ سم . روارها صغيرة . مقاشمها قصيرة وعريضة . اذنانها نصت مستدرة . جرانها قصيرة خامة الاصابع . اطرافها منخجية الشكل ، اذنانها حلوية الشعر شاككة || اوتارها الى الصهبة السوداء تقبع مع اقترابها من الظهر وتبيض عند البطن . صوفها غثن للممس قبل الكفافة || موطنها بعض الاصقاع الافريقية تكثر في المناطق الجنوبية والوسطى . تأثت مختلف الاقاليم الزراعية . اجبرتها افاحيص تضعضها في الادغال والمقاصب وبين الصغور القريبة من الحقول المزروعة . قوتها الفتق وسائر النباتات المسقرلة وقصب السكر والخيزران .

٢١٥٢٠ - قَبْ

صوت الخنزير .

٢١٥٢١ - قَبْ

Bascule (F). See-saw (E).

جهاز توزن به الاشياء .

٢١٥٢٢ - قَبْ

Cordylina (F).

جنس نباتات برية وريزية من فصيلة الزنبقيات ، انواعه عديدة مهداة البلاد الحارة . اروبيا ضخمة ، جذوعها منتخبة ، اوراقها عصفية للشكل مستطيلة . ازهارها حامية الارتكاز ، عتقة التجميع ، صغيرة القد يكثر فيها الابيض والبيكلي || اشهر انواعه ما يلي .

٢١٥٢٣ - قَبْ أَحْمَر

Cordylina rubra (S). Cordylina rouge (F).

نوع من القبا وهو شجيرة ريزية سرولية ، تطلع من ٣٠٠ الى ٤٥٠ سم . اوراقها عصفية الشكل متعفة . نصلاها بطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . وهو جامد الصلابة المائلة ، شديد الخضار . عتقا صغير القد ، اطل الشراخ . ازهارها الى الحمرة يعلوها موج بنفسجي .



قبا



قبا



قبا



قبا



قبا

مقاره الى السمرة الزيتونية || موطنه حضاب وسهل الشرق الاسطر واروية . يكثر في العراق || انشاء تبنيص من ١٢ الى ١٨ يصفه تحضبا وسدحا ثلاثة اسابيع .

### ٢١٥٣٠ - قُبَّة ، قُبَّة ، قُبَّة ، قُبَّة

*Alauda (S). Alouette (F). Lark (E).*  
ج . قبر وقنابر . جنس طير من فصيلة القبرات ، انوامه عديدة ، اصغاتها فسيحة الاربعاء تشمل معظم البلاد الحارة والمعتدلة . جميعها ناعمة . اجسامها صغيرة اللد تملو من ١٤ الى ٢٥ سم . منقارها مخروطية قصيرة . اجنحتها مستطيلة . اذناها فارقة . اثنائها موثقة مرفوعة || قوتها الحشرات واليدور البرية . اشهر انوامها مايلي .

### ٢١٥٣١ - قُبَّة الحَقُول \* ، قُبَّة مَعْرُوفَة

*Alauda arvensis (S). Alouette des champs, A. commune (F). Skylark (E).*  
نوع من القبرة وهو طائر صغير اللد ، طوله نحو ١٨ سم . ثوبه متناخل الالوان ، رأسه وظواهره الى الكهبة الموثقة بالاسود والاصهب والافبر . بطنه وضواؤه الى اليباض الاغبر تملو رقة سمره . حنار عينه ابيض مستطيل الشكل اشقر اللون . عيناه جوزيتان . مقاره الى السمرة . يئن في التربة بين الزروع وفي المراعي والشتاق . انشاء تبنيص من مرتين الى ثلاث مرات في السنة . حفضتها تشمل اربع بيضات او خمس ، اما الحفن لينوم ١٤ يوما تقوم به الاثنى بمناوبة الذكر .

### ٢١٥٣٢ - قُبَّة الغِيَاض \*

*Alauda arborea, Lullula arborea (S). Alouette lulus, A. des bois (F). Wood lark (E).*  
نوع من القبرة ، وهو طائر صغير اللد نحو ١٥ سم . ثوبه ثوب قبرة الحقل ، لكنه اصنع يبيضا واشقر صهبة . بألف اليرز والحساب والنباض والبشرة الاشجار ، رغب في مراعات الخلع والصمر . انشاء تبنيص ثلاث مرات في السنة والحفن يكون بمناوبة الذكر .

### ٢١٥٣٣ - قُبَّة سَمَرَاء \* ، قُبَّة ، عَلْبَعَة

*Alauda brachydactyla (S). Alouette calandrelia (F).*  
نوع من القبرة ، صغيرة اللد تملو نحو ١٤ سم . ثوبها ثوب قبرة الحقل الا انه اشد سمره . وهي اهلون جنسا من قبرة النياض واكثر رسا منها || تألف الاراضي الكلسية والربلية . انشاء تبنيص ثلاث مرات في السنة . يبيضها اصهب اللون تملو رقة حنطية .

### ٢١٥٣٤ - قُبَّة مَنُوحَة \*

*Alauda cristata, Galerida cristata (S). Alouette cochavis, Cochevis huppé (F). Tufted lark (E).*  
نوع من القبرة ، ومنهم من جعلها جنسا مستقلا . جسمها يطول نحو ١٨ سم . رأسها مستطيل القنزعة . ظهرها اسمر اللون ، وبداي المولج ، حنار ريش رأسها وظهروها وجنابها الى الصهبة الخفيفة . صدرها وبطنها وضواؤها الى اليباض الاصهب تملو رقة مستطيلة سوداء اللون . اصغاتها البلاد الحارة والمعتدلة . تألف المناطق البويرة والمراعي والحقول المزروعة بجوانب الطرقات . قوتها الحشرات والمواوم واليزور والحيوب || تدن عشها في التربة بين الاشاب او تحت التلع . وهي لا تبنيص اكثر من مرتين في الحول . حفضتها تتألف من ٥ او ٦ بيضات تقوم بها الاثنى بمناوبة الذكر .

### ٢١٥٣٤ - قُبَّ الجَنُوب (S). Cordylone australis (S). Cordylone australe (F).

نوع من القتب وهو شجرة سرورية برية وتربيتية تملو من ١٠ الى ١٢ سم . ساقها فراء . اوراقها تشبه اوراق البوكا . نصلها يطول من ٨٥ الى ١٢٠ سم . وهو مائل البشرة جيل الخضر الزاهي يملو ثوب اخضر او احمر . انمارها الى اليباض الاغبر . اصغاتها كبيرة اللد متوسطة الكثافة . ازهارها يستمر من اذار الى نيسان .

### ٢١٥٣٥ - قُبَّ كَثِيف الزَّهر

*Cordylone dense (S). Cordylone dense (F).*  
نوع من القتب وهو شجرة تربيتية تملو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها نحلة فراء . اوراقها تملو من ٣٠ الى ٧٥ سم . نصلها جامد الصلصة مسن الحافة احسن الزام الاخير ، لونه الى الخضر العميق || شراغها الزهري قرمزي اللون ، عذها كثيف التجميع ، ازهارها ليلية .

### ٢١٥٣٦ - قُبَّة Azha

القبة بعض نجوم كوكبية الاكليل الجنوبي . يسمي قبة لاستارها . بين العرب من يسميها ادعى النعام لانها على جنوب النعامين .

### ٢١٥٣٧ - قُبَّة ، قُبَّة ، حَفْت Foullet (F). Third stomach of ruminants (E).

هي من كلف واشغالها هنة ذات الحلق متصلة بالكروش وهي الزواء الذي يتنأى اليه الفرت .

### ٢١٥٣٨ - قُبَّوَر \* ، جَمَل مُكَرَّم

*Ateuchus laticollis (S). Scarabée à large dôme (F). Ateuchus laticollis (E).*

حشرة نائلة من فصيلة الجمليات ورتبة حديدات الاجنحة . يألف المزارع والبراري يعيش على الاثني والروث واليرز موار . يدعى كبرتل يتألف من نفق او نفقين وسجيرة فسيحة لسكرانه لا يذو له القممولة التي يعيش عليها || جسمه متوسط اللد يطول من ١٦ الى ٢٢ سم . ثوبه الى السواد اللامع . رأسه صغير الجرم . قصير الخط . زبانه صغيران دقيقان . عيناه صغيرتان ماصحتان . ظهرانه محدد الشكل ، بالغ التصديق البهدي ، مطووم المؤخر ، لا يلفظ كابل اللدن || الاثنى اصغر قدأ من الذكر واجبت ثوبا منه واكثر سمره || له جبل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجسلانة في ايار وتعيش حتى ايلول . تسرح في النهار . تساد في حزيران . تنجح مكنة واسعة في القممولة || البرقة عند بلوغها الادراك اتام تطول نحو ٢٢ سم . جسمها غليظ البين والطرف ، مقوس الشكل ، قصير الراجب ، تصلب التآخير ثوبا الى القبرة السمره . رأسها اسود اللون ، احمر الجفج . تميش في اول عهدها على المواد الصلبة الموجودة في القممولة ثم على الزبل حتى زين الاكمال .

### ٢١٥٣٩ - قُبَّج \* ، قُبَّج ، حَجَل أَرْبَدَة ، حَجَل عِرَاقِي

*Sterna (S). Sterne, Perdrix grise (F). Sand partridge, Bonham's (E).*  
طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة الجمليات وفصيلة الطيوريات . واحده قبيجة لذكور والاثنى . وهي طائر ربع الجفج . متوسط اللد ، طوله نحو ٢٨ سم . ثوبه الى الريدة الرصاصية الغصية المواج يملوها بجميع وثوب وتبنيص .



قُبَّوَر



قُبَّج



قُبَّة الحَقُول



قُبَّة النِيَاض



قُبَّة سَمَرَاء



قُبَّة مَنُوحَة

الحافة . شراخها الأزهي يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم .  
أزهارها ال الصفار المابق يعلو توشم سننلي يستقر عند  
الختار || أزهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢١٥٤٣ - قيسيس ٥  
Type  
هو النموذج المثال الذي يجمع الملامح الشكلية الرئيسية  
المائدة الى الضرب او العائلة او العرق .

٢١٥٤٤ - قيسيس ٥ \* بوليمونيم  
Polemonium (S). Polémoine (F).  
جنس نباتات برية وزراعية ترينيه من فصيلة القيسيات  
انواعها عديدة جميعها عشبية معمرة ، اوراتها متعاقبة ،  
مركية ، مستطيلة . أزهارها عقودي او عكرولي التجميع .  
اشهر انواعها الزراعية للترينيه ما يتبع .

٢١٥٤٥ - قيسيس الأزرق  
Polémoine bleue (F).  
هو عشبية المقرب ، اطليا .

٢١٥٤٦ - قيسيس يهي  
Polemonium pulcherrimum (S). Polémoine  
superbe (F).  
عشبة معمرة صغيرة القند زياه . تملو نحو ٢٥ سم . سوتها  
برمام منتصبه قليلة الورق . وريقاتها وريية التجميع  
عندها يروحون بين ١٧ و ٢٧ عناقيدها الأزهرية متوسعة  
الكثافة . أزهارها ثنائية اللون منها الازرق والاصفر ومنها  
الازرق والايض ومنها الازرق والايض للموشم بالاحمر .  
أزهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢١٥٤٧ - قيسيس صوفي  
Polemonium lanatum (S). Polémoine laineuse (F).  
عشبة معمرة صغيرة القند . مهدها البلاد الباردة . تملو من  
١٠ الى ٢٥ سم . سوتها واوراتها وأزهارها زغبية البشرة .  
سوتها نجيلية . اوراتها قليلة العدد . وريقاتها وريية التجميع  
تألفت من ١٧ الى ١٩ او ٢١ وريقة . أزهارها لبدة  
زرقاء اللون || أزهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢١٥٤٨ - قيسيس قليل الزهر  
Polemonium pauciflorum (S). Polémoine pau-  
ciflore (F).  
عشبة معمرة زياه الفروع تملو من ٢٥ الى ٣٥ سم . ساتها  
متصبه . اوراتها نظامية . وريقاتها ٢٧ عقودها  
الأزهرية قليل الازهار . أزهارها صفراء اللون مستطيلة الشكل .  
أزهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢١٥٤٩ - قيسيس مسطح  
Polemonium reptans (S). Polémoine couchée (F).  
عشبة معمرة صغيرة القند . تملو من ١٥ الى ٢٥ سم . سوتها  
منبطحة . اوراتها مرطاه المتصل ، صغيرة الحجم . وريقاتها  
وريية ، خالصة او سباعية او تساعية العدد . عناقيدها  
الأزهرية رطلة التجميع ، أزهارها الى الزرة اليلكية || أزهارها  
يستمر من حزيران الى تموز .

٢١٥٥٠ - قيسيس  
Endémique (F). Endemic (E).  
نمت تعريف يطلق على النباتات والامراض التي تعيش  
وتتكاثر في محيط سناخي معين محصور .

٢١٥٥١ - قيسيس ٥  
Monogénique (F).  
Monogenic, Monogenetic (E).  
نمت تعريف يطلق على كل ما هو عائد الى القيسية .

٢١٥٣٥ - قيسيات  
Alaudidae (S).  
Alaudidés (E). Alaudidae (E).

فصيلة القير ، من الطوائف الغرويات الخائفة . اجنساها  
عديدة منها القبرة والملل والمكاه والرحدل والرحدن والقوقس .  
معظمها من القواطع وبعضها ابله . جميعها تألف الخفيس  
اكثر من الاجواء والاشجار . اجناسها ربة . ورونها  
كبيرة ، متعاقبة لا قياسية . اجنحتها مستطيلة ، اذناها  
قصيرة || قوتها الحشرات والبرور البرية .

٢١٥٣٦ - قيسية \* قيسر  
Corydalis (S). Corydalle (F). Corydalis (E). Klet-  
terder (D). Coridallide (I).

جنس نباتات برية وترينيه من فصيلة الخشخاشيات  
انواعها عديدة معظمها جندورية وبعضها دوقسي . اوراتها  
جلدية الازنكار او قرصية ، نصلها كثير التفريش  
والتشريح . أزهارها عقودية التجميع ترتكز حل شراخ  
يقوم مقام الساق || اشهر انواعها ما يتبع .

٢١٥٣٧ - قيسية جوفاء  
Corydalis cava (S).  
Corydalle creuse (F).

عشبة جندورية معمرة . جلورها دوقسية جوفاء . ساتها  
شراخ يعلو من ٢٠ الى ٣٥ سم . ينجلي بالمقود الأزهرية .  
أزهارها حر او يفيش || أزهارها يستمر من آذار  
الى ايار .

٢١٥٣٨ - قيسية سد ابيية الورق  
Corydalis rutacfolia (S). Corydalle à feuilles  
de rue (F).

عشبة جندورية معمرة . جلورها دوقسية مقلطحة جامدة  
اللباب . اوراتها ساذبية الشكل . أزهارها وريية كبيرة  
القند . شراخها يعلو نحو ١٥ سم . || أزهارها يستمر  
من نيسان الى ايار .

٢١٥٣٩ - قيسية صفراء  
Corydalis lutea (S).  
Corydalle jaune (F).

عشبة جندورية معمرة . اوراتها متوسعة التفريش  
والتشريح ، مالة البشرة . شراخها الأزهرية يعلو من ٢٥  
الى ٣٥ سم . أزهارها ذبعية اللون ، بزوها فسمية لامة .  
أزهارها يستمر من ايار الى ايلول .

٢١٥٤٠ - قيسية ليعونية الورق  
Corydalis cheilantifolia (S). Corydalle à feuilles de  
cheilanthe (F).

عشبة جندورية معمرة . اوراتها قبيعية الشكل ، مالة  
البشرة تملو نحو ٢٥ سم . شراخها الأزهرية يعلو نحو  
٢٥ سم . أزهارها كثيرة العدد ، جيلة الصفار القاتم .  
أزهارها يستمر طواق فصل الربيع .

٢١٥٤١ - قيسية مزعجيرة  
Corydalis tomentosa (S). Corydalle tomentueuse (F).  
عشبة نجيلية نجيلية . اوراتها قرصية الانتشاب ، نصلها  
يعلو من ١٥ الى ١٨ سم . وهو متباطء التفريش ، كثير  
التشريح ، مزهر الصنفه . أزهارها الى الصفار الكبيرتي .  
شراخها يعلو نحو ٢٠ سم || أزهارها يستمر طواق  
فصل الربيع .

٢١٥٤٢ - قيسية نيبيلة  
Corydalis nobilis (S).  
Corydalle noble (F).  
عشبة جندورية معمرة . اوراتها متباطدة التشريح ، سمنة



قبرية



قيس

**٢١٥٦٠ - قُبَيَّات** (S). Dermochelidae (F). Dermochelidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية بيوضة من رتبة السلاحف. النوع المعاصر الوحيد من هذه الفصيلة هو المحتبس || يتنفس القنيس بفقاره وضلوعه الطويلة غير المحتبس بالذبل. وبذيله المركب من فصليات متتالية تنتم في السن. ويخلو من السهت القرني المادة الذي يتكون ذبال سائر السلاحف || الاثنى وحدها تأتي الى البر من مرتين الى ثلاث مرات في الحول وذلك في زين الاشلاق حيث تقص في كل مرة من ١٠٠ الى ١٥٠ شلقة تنف بعد وضعها بنحو ثمة اسابيع. والقنيس فور لفته يتوجه تراً نحو البحر.

**٢١٥٦١ - قَبَط** (F). Málanger (F).

To mix, To mingle (E). قبط الشيء: خلطه جيداً. يقال قبط الاسمدة الكبارية.

**٢١٥٦٢ - قَبِيع** (F). Aulacode (F).

هو القباغ حيوان لبون قاضم، اطلبه.

**٢١٥٦٣ - قَبِيعَة** (F). Alouette calandrelle (F).

هي القبرة السراء. صفور ابقع ارض تكثر اقامته قرب اجساد الجردان فاذا فرغ اتبع فيها.

**٢١٥٦٤ - قَبِيعَة** (S). Pétasites (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات. انواعه عديدة منها البرية والطيبة والتريزية. اوراقها جلدية معتقة متراكبة فائضة التصل المستدير أو القلبي الشكل. ازهارها سبيل التجميع رأسي الاوتكال قاعدته شخاخ غليظ متصطب تكسو الحراشيف. ازهارها متعددة الاولان. اشهر انواعه ما يتبع.

**٢١٥٦٥ - قَبِيعَة بَهْشَاء** (S). Pétasite albus (S).

**٢١٥٦٥ - قَبِيعَة بَهْشَاء** (F). Pétasite blanc (F). عشبة جبلية معمرة تملو نحو ٨٠ سم. اوراقها كبيرة فارشة طولها نحو ٧٠ سم. وعرضا ٥٠ سم. نصلها ازغب البشرة اطحل اللون اخضر العروق السفلى. شمرانها الزهري. يملو نحو ٨٠ سم. حراشيفه خضر. ازهاره صفر.

**٢١٥٦٦ - قَبِيعَة لَبْجِيَّة** (S). Pétasite niveus (S).

**٢١٥٦٦ - قَبِيعَة لَبْجِيَّة** (F). Pétasite neigeux (F). عشبة جبلية معمرة تملو نحو ٦٠ سم. اوراقها كبيرة، مثلبة الزوايا، نصلها عشن الصفحة العليا البحرية اللون ازغب الصفحة السفلى الطحال. اللون. شمرانها يملو نحو ٦٠ سم. ازهارها الى البياض الثلجي.

**٢١٥٦٧ - قَبِيعَة عَطْرَة** (S). Pétasite fragrans, Nardosmia fragrans (S).

**٢١٥٦٧ - قَبِيعَة عَطْرَة** (F). Pétasite odoriférant, Héliotrope d'hiver (F). عشبة معمرة تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها صفيرة، كلوية الشكل، غضراء التصل عل صفحتها، مسنة الحافة. ازهارها بنفسجية اللون عطرة. حرفها يشبه الونيل. تزده قترين. ازهارها شوي.

**٢١٥٦٨ - قَبِيعَة مَحْرَنْجِيَّة** (F). Pétasite officinal (F).

هي حشيشة القرماز، اطلها.

**٢١٥٥٢ - قَبَيَّات** (S). Polemoniaceae (F). Polemoniacées (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها واتواعها المعروفة عديدة معظمها بري وبعضها زراعي تزييني.

**٢١٥٥٣ - قَبِيَّة** (F). Monogénisme (F).

**٢١٥٥٣ - قَبِيَّة** (E). Monogenism (E). وحدة الاصل والذرية. نظرية علمية، وركزتها التسلسل اللطقي، وتوضح ان الاجناس البشرية تنفرع من قبس اصلي واحد.

**٢١٥٥٤ - قَبْشَرَة** (F). Gonomoarrhénie (F).

تصاب فرلي تكون اناث انثاء عاقرة أما ذكوره فنائرة.

**٢١٥٥٥ - قَبْشَ، قَبْشَ** (F). Fourmillière (F).

**٢١٥٥٥ - قَبْشَ، قَبْشَ** (E). Ant-hill, Ant's nest (E). مجتمع النمل الكبير الكثير. وهو ما يدعى قرية ومنملة.

**٢١٥٥٦ - قَبْشَة** (S). Truxalus (S).

**٢١٥٥٦ - قَبْشَة** (E). Truxale, Truxalis, Tryxalis (F). Truxalus (E). حشرة قاضية نشاطا من فصيلة الجراريديات. اطلها جميع الاصقاع الحارة والمعتلة الحارة من العالم القديم || جسمها كبير القد يطلو من ٣٥ الى ٤٠ سم. عند الذكر ويطلو من ٥٥ الى ٦٠ سم. عند الاثنى. ثوبها الى الكعبة الغراء يملوها سواج اعضر ويخضع اسمر. زباناها قلابا الشكل، مستطبا اطح. اجنتها شفافة ملونة حراء القناعة، وريدة الشماخ، متطبة الحاشية || تجوب المراعي والمواقع الرطبة من حزيزان الى آب || اضروها زعيدة لانها قليلة العدد.

**٢١٥٥٧ - قَبْشَ** (F). هو الاخذ، اطله.

**٢١٥٥٨ - قَبْشَ** (S). Dermatochelys coriacea, Dermatochelys coriacea (S).

**٢١٥٥٨ - قَبْشَ** (F). Dermatochelys coriacea (F). Dermatochelys coriacea (F). Tortue-luth, Tortue-cuir géante, Sphargis (F). Leather turtle (E). سلطفاء بحرية مبيضة الجنبس والترع من فصيلة القَبْشِيَّات. كانت في التصنيف السابق تتبع فصيلة البشيات || اطلها معظم مجار العالم. قوتها الاسماك والرخويات والنباتات البحرية والمرجان. لاتقرب من الشطوط الا في زين الاشلاق. محاضنها المشهورة شواطئ الهند والخليج والبرازيل || جسمها كبير القد، يطلو من ١٨٠ الى ٢٥٠ سم. وزنها يراوح من ٥٥٠ الى ٩٠٠ كيلو. ذبلها سفى المادة والتركيب، سباعي الاكطار القاطية المسترسعة عند قواعدها، الضيقة والقصية التجميع عند اطرافها. زعفها منبسط الصفحة. رأسها معتدل الجرم، شبه افعى. عتقا غليظ، معتدل الطول. قوائمها مبطلة، زعفية الشكل، عادمة المقانب. قاتمها الاماميتان كبيرتان، شليمتان، ومحورنا الى ملتصقتين لا يقل طولها عن ٣٠٠ سم. ولا يتجاوز ٣٦٠ سم. || عويلها عند اقتناصها زعاق صاحب شديد الوقع || لحمها مأكول.

**٢١٥٥٩ - قَبْشَان** (S). Strombus lambis (S).

**٢١٥٥٩ - قَبْشَان** (F). نوع من الدلاع وهو من الحلازين الكبيرة يجفف فيكون منه اطفار الطيب.



قَبْشَ



قَبْشَ



قَبْشَان



قَبْشَ



## ٢١٥٨٩ - قَيْب

Foin (F). Hay (E).  
هو القنق ، ما ليس من الخشيش وجع وأخترن كملف .

## ٢١٥٩٠ - قَيْبِي

Jusant (F). Ebb (E).  
القَيْبِي حركه المياحه عند ابتداء الجزر وسرعه تقلصه وايابه .

## ٢١٥٩١ - قَيْبِي

Polyplectron (S).  
Eperonnier (F). Asistic pea-cock (E).

جنس طير من فصيلة الطيريات انواعه المعروفة ١٥ جميعها من طيور الزايج ولغند الصينية. تألت المناطق الحرجية الجبلية . ايسانها قرية الشيه من التلوج ، اذبالها مستطيلة منقشة كاذبال الطلوس . تتميز بصيص ايسانها التي يراوح مدها بين ٢ و ٦ ، قنارها تاجية منقصة . اثلها عديده الالوان يكثر فيها الاخضر الاسفع والاريد الخشنى الالوسى البقيج والتزييم || انماها قنق من ١٢ الى ١٦ يمشه تحضبا رسدها في اناسيص رسمها بالفس والورق اليابس بين الادغال الكثيفة .

## ٢١٥٩٢ - قَيْبِي

Mimeux (F). Mirmous (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل نبات تنقيش اوراقه من القس .

## ٢١٥٩٣ - قَيْبِي ، قَيْبِي ، قَيْبِي

Narine du porc (F). Nostril of the pig (E).  
هي نخره قنطية الخنزير .

## ٢١٥٩٤ - قَيْبِي

Calypse Helene (S).  
Calypse Hélène (F).  
طائر من فصيلة القريسيات . اعطاه بعض مناطق أمريكا الجنوبية . يعتبر اصغر عصفور في العالم || جسمه يطول نحو ٥ سم . ثوبه متداخل الالوان الزاهية ، فيه الرمادي والاحمر والاصفر والاخضر . منقاره رقيق مستطيل || قوته للذباب والحوام وريقق الازمار . يدن عشه في الادغال . انما تحضن من مرة الى مرتين في الحبل . حضنتها من ٣ الى ٤ بيضات ترخها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوما .

## ٢١٥٩٥ - قَيْبِي

Luzerne Sauvage (F).  
هي القصة البرية ، اعطاه .

## ٢١٥٩٦ - قَيْبِي

Cavolinia (S).  
Cavolinia, Hysle (F). Cavolinia (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات بمنجات الارجل وفصيلة القناتيات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ منها ٢٠ منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ، وعشرة انواع من متحجرات الاراضي الميسانية والبليسانية || اجسامها صغيرة لينة ، مكررة الصفة البنية ، ثلاثية الانسان او الحما ، كبيرة الزناذف الفعية القليلة التضيي ، لونها الى الصفرة يملوها مراح يختلف مع الانواع يكثر فيه الازرق والبنيصفي || اشهر انواعها قنابة البحر الاخر الثلاثية الانياب الحادة .

## ٢١٥٩٧ - قَيْبِي

Cavolinilidae (E).  
Cavolinilidae (F). Cavolinilidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات بمنجات الارجل .



قَيْبِي



قَيْبِي



قَيْبِي



قنق الإجماس

اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاقناب النابرة . جميع انواعها المعاصرة يمية قل ما تقترن من الشطوط . اسراها وافر العدد . زعانفها رقيقة شفافة متفارة الانفلاق حادة التضييخ الشثالي . اصداها كلسية المادة رقيقة الصبغات || اعرف اجناسها واشهرها اقنابة والقصيلة والقوام .

Acacia du Sénégal (F). قنق - قنق  
هو سنط السنغال ، اعطاه .

Astragale gommifère (F). قنق - قنق  
هو الاسرافالوس البق ، اعطاه .

Neocosmospora (S). قنق  
جنس تطور بحرية من السناحيات وفصيلة المشويات اصانها سطحية الارتكاز حر الشاء ، تكاها غروية الشكل تحضن بوقا مستدرا اسر اللين || انواعه عديدة جميعها حيودة كانوا يتقنون انها مفرة ويعطون لها بعض امراض القطن والبقيج والنخيل .

Orque (F). قنق  
هو الاركة ، اعطاه .

Bât (F). قنق  
هو الاكاف او الرسل .

Intestin, Boyau (F). قنق  
Bowel, Gut (E).  
هو المعى . وقال ابو هيبه : « القنق ما تحو من البطن اي ما استدار منه وهي الحوايا واما الامعاء فهي الاقصاب » . ج . قنق .

Affût (F). قنق - قنق  
Stand for wait (E).  
ناموس الصالة الذي يشبه ليستر فيه عند السيد .

Calurus resplendens (S). قنق - قنق  
Quetzal, Calure resplendissant (F). Quetzal (E).  
طائر من فصيلة الطيريات . موطنه بعض مناطق المكسيك وامريكا الوسطى . يألث الاحراج الجبلية التي يراوح ارتفاعها بين ١٥٠٠ و ٢٥٠٠ متر عن سطح البحر || طوله نحو ١٠٠ سم . منها ٨٠ سم . لذنب و٢٠ للجم . ثوبه متداخل الالوان الساطعة . رذاؤه وصدره الى الخضرة الذهبية المراح . بطنه الى الحمرة القريزية القائمة . عين كستنية اللون . حواجيه سود . منقاده وساقه الى الصفار الاسمر . عزالان ذنب محجنا الاطراف || قوته للار البرية والجزور والحشرات والدنويات الصغيرة || يدن عشه في صلدوح الاججار الحمرة . الاثني تبين من ٤ الى ٥ بيضات تحضها بمناوبة الذكر نحو ثلاثة اسابيع .

## ٢١٥٩٦ - قنق الإجماس ، حمار ساق الشفاح

Zeuzera pyrina, Z. aesculi (S). Zeuzera, Z. du poirier, Z. de l'olivier, Z. du marronnier, Coquette (F). Wood leopard, Leopard moth, Wood leopard moth (E). Kastanienbohner, Blausie, Roskastanienbohner, Apfelbohner (D).

حشرة من فصيلة القناتيات حيفاها القد طولا نحو ٣ سم . ثوبها الى البياض الغابر . رواشها غبار اللون تعلوها رقة خنطية سوداء المراح . رقتها تطول نحو ٥ سم . ثوبها اغبر .



قَتَع البَصَل

اللون تشوبه حرة ارجوانية ورشة سوداء . رأسها ودقاتها الصدرية والدرجبة كستنية اللون . وهي تعيش من ٢٤ الى ٣٠ شهراً تركب سوق الاجاص والتفاح والفرجل والزيتون والورداء ... فتتغذى وتضعها || تظهر الفراشة من حزيران الى تموز . الذكر منها اصفر قداماً من الانثى . زمن كونه يدوم نحو الشهر ينتهي بفتح المكان على البوق ثم ينقث لكن بعد ذلك ببضعة ايام من رقات دقيقة يتأخر عليها التخريبي فور افساخها الالاء .

٢١٦١٢ - قَتَقُون \* *Chetodon saxatilis* (F).

هو يحمل الصفور ، اطلبه .

٢١٦١٣ - قَتَم \* الزاحمة قَتَم . راجع ميرمين .

٢١٦١٤ - قَتَمَة

القَتَمَة نبات كزبرة الرائحة . (محيط المحيط) .



قَتَع الجَفَنَة

٢١٦١٥ - قَتَمِيَّات \* هي الميرسيات ، اطلبها .

٢١٦١٦ - قَتَن \* *Xerophila* (F). *Xerophilous* (E). نعت تعريفي يطلق على النباتات التي ترغب في المناخات الجافة .

٢١٦١٧ - قَتَن \* *Gerris* (S). *Gerre* (F). *Gerris* (E). جنس اسماء بحرية من فصيلة القنات . انزاعه المعروفة نحو ٢٠ اقطانها بجار البلاد الحارة اغصنها البسر الاحمر وشواطيء الهند وسرنديب . اجسامها مبطلة ، عريضة ، قدور راحة الكف . زعانفها بارزة اغصنها الظهيرة الشائعة المقدم والثرجية الفارقة .



قَتَع السَّاق

٢١٦١٨ - قَتَنِيَّات \* *Gerridae* (S).

*Gerridae* (E). فصيلة اسماء مبطلة من شائكات الزمانيات اجنتها وانواعها عديدة اقطانها بجار البلاد الحارة . اعرف اجناسها واشهرها القتن .



قَتَع الصَّفَصاف

٢١٦١٩ - قَتَرَكِيَّة \* ، قَتَامَة \* *Anemopaegma miranda*, *Catuaba* (S). *Catuaba* (F).

*Folhas catuaba* (E). *Katuaba* (D). جنبة يرة طيبة معمرة من فصيلة البقوليات . مهدها بنس اصقاع البرازيل اساقها تملر نحو ٣ امتار . فروصها مستغلطة فناء . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، معقفة ، ستانية التصل الجلمد المالح الخشاش . انزاعها عقودي التجميع ، طري الا ارتكار . انزاعها جريسية الشكل ، وردية اذن ، مرطقة بالايض والاصفر . ثمارها كالبسر شكله وقد لا تكمل لا تؤكل || اشهرت بانها اقوى منط نباتي وصفادة للفسلس .


٢١٦٢٠ - قَتُون \* *Pteropterus* (S). *Ptéropte* (F). جنس قراد من فصيلة النمشيات . انزاعه قليلة جميعها عمياء صغيرة القبة يضيبة الشكل مبطلة نحو لمبستر واحد . انزاعها الى الصفرة الخنطية يملعوا بعض الزراكش الجفوية . يركبها الطير والمغافيش .



قَتَن

٢١٦٢١ - قَتُون \* *Glyphiphagus* (S).

*Glyphiphage* (F). *Glyphiphagus* (E). جنس حشرات مجهرية من فصيلة السكيات . انزاعه المعروفة ثمانية . اجسامها مبطلة تطول من ٤ الى ٥ امتار الملبستر . اعطالها ثمانية ماصة . ظهورها منشفة هلب دقيق مستطيل . قوائمها اربعة أزواج . انزاعها تراوح من النيرة السمراء الى السمرة الخنطية الملوحة || تركب جمع المارد النضوية والمغافيش والبيبع عنه نحه وبهد نحه والنظور الجافة . وقد تصيب الانسان في يده وجناحه تسبب له



قَتُون

اللون تشوبه حرة ارجوانية ورشة سوداء . رأسها ودقاتها الصدرية والدرجبة كستنية اللون . وهي تعيش من ٢٤ الى ٣٠ شهراً تركب سوق الاجاص والتفاح والفرجل والزيتون والورداء ... فتتغذى وتضعها || تظهر الفراشة من حزيران الى تموز . الذكر منها اصفر قداماً من الانثى . زمن كونه يدوم نحو الشهر ينتهي بفتح المكان على البوق ثم ينقث لكن بعد ذلك ببضعة ايام من رقات دقيقة يتأخر عليها التخريبي فور افساخها الالاء .

٢١٦٠٧ - قَتَع البَصَل \* ، دَسْبُوسَة البَصَل

*Dyspessa ulula*, *Endagria ulula* (S). *Dyspessa des oleons* (F).

حشرة من القناتيات صغيرة القبة طرفها نحو ١٠ م . وبسطها ٢ م . ثوبها ابيض اللون حطلي المراج . ورشاتها الاماميان الى الياض الاطحل يملعوا يتبع حطلي واصفر . ورشاتها الخلفيان نحو العروق بيض الاهداب || تظهر الفراشة من نيسان الى ايار ومن تموز الى آب . لها جيلان في الحول . ربتها صغيرة القبة سمراء اللون تركب مختلف انواع بصل الزنبقيات . يكثر وجودها على البصل في حزيران وفي ايلول .

٢١٦٠٨ - قَتَع الجَفَنَة \* *Paropeta paradoxa* (S).

*Paropeta paradoxal* (F). حشرة من القناتيات . فراشها متوسطة القبة سمراء اللون مبقعة الرواشن المهدية . ربتها صغيرة ، غليظة ، حنطية اللون جفوية المراج تركب الجفنة قنطريها تحت القشور .

٢١٦٠٩ - قَتَع السَّاق \* ، حَفَّار السَّاق

*Costus cossus*, *C. ligniperda*, *Trypanus cossus* (S). *Costus gâte-bois*, *Gâte-bois* (F). *Gout-moth* (E). *Weidenbohrrer* (D).

حشرة من القناتيات ، فراشها خضمة غليظة سمراء اللون . ورشاتها حنطية يملعوا يتبع رودي ، وتوتيه ، وتجنيس امير . ربتها تعيش من سنتين الى ثلاث سنوات وهي جفوية الثوب ، سمراء الظهر ، حنطية اللب . تركب سوق وانصاع واناد بعض الاجناس المتشعبة والخارجية فتخترها وتطليها ، منها الاجناس والكرز والكرز والخروج والمشش والقرز والاكينديا والريان والزيتون والسنديان والحود والصفصاف .

٢١٦١٠ - قَتَع الصَّفَصاف \*

*Cossus hontleyi* (S). *Cossus du saule* (F).

حشرة من القناتيات . فراشها صغيرة القبة نحو ٢٥ م . اما بطنها فتراوح بين ٤٢ و ٥٥ م . ثوبها الى الربة العلواء ورشاتها الاماميان الى الكلبة الخنطية المراج تتخللها حروك سمير . ورشاتها الخلفيان اتبع لوناً من جسمها || ربتها مستطيلة الشكل ، تلبه ، عنه كالك دورتها الحياتية || نحو ٦ م . ثوبها في اول عهدا يدي رودي اللون ثم ينصرف تدريجياً نحو الجفوة ثوبها صفرة شاملة ويقيم سيد رديانية تملر جميع صفقات الجسم ما عدا الحلقة الصدرية الاول || وهي تركب الصفصاف والبسط والائل والحود . تخفر السوق في شكلها تحت الغلف فتزنها اشد الانى .

٢١٦١١ - قَتَعِيَّات \* *Cossidae*, *Zeuzeridae* (S).

*Cossidae*, *Zeuzeridae* (F). *Cossidae*, *Zeuzeridae*, *Carpenter moths* (E). *Holzbohrrer* (D).

فصيلة حشرات من رتبة سرشقيات الاجنحة . اجناسها وانواعها زهاء ٦٥٠ معظمها جفوي السرح . اجناسها لا قياسية القبة . ورشاتها كبيرة . الوانها عديدة يملع فيها



٢١٦٢٧ - **قنبلة لعنانية\*** ، **زهره شعريه**  
*Thrichosanthes angula* (S). *Thrichosanthes serpent*,  
*Patola*, *Serpent végétal* (F). *Snake gourd*, *Serpent*  
*gourd*, *Viper gourd* (E). *Haarbümel*, *Sinesischer*  
*kürbis* (D). *Serpentone*, *Zuccetta cinese* (I).

نوع من قرق الحش ونبات القزبات وهو نبات عشبي  
 حولي حاشي ساقه تطلع نحو ٨ أمتار. أوراقه ثلاثية أو  
 خماسية التفتيس، أزهاره جميلة الشكل مهدبة البتلات  
 البيضاء، ثماره اسطوانية مستطيلة ملتصقة ملتصقة طولاً  
 بأوراق بين ٧٠ و ١٠٠ سم. وقطرها من ٤ إلى ٥ سم.  
 لوفاً في أول عهدا إلى الخضار البحري يعلوه تسليج  
 أبيض، ثم يتغير تدريجاً إلى أن يستقر عند النضج  
 على الأصفر البرتقالي || ثماره مأكولة وتطبخ كقاريا  
 وفيها من البقول.

٢١٦٢٨ - **قنبليات البحر**  
*Holothurides*  
 رتبة حيوانات بحرية من شعبة الشوكيات.

٢١٦٢٩ - **قنبد**  
*Concombres* (F).  
 هو الخيار وأحدثه قنبد.

٢١٦٣٠ - **قنبد**  
*Moignon sec* (F). *Dry stump* (E).  
 الفناء اليابس في أصل الشجرة والكزرة.

٢١٦٣١ - **قنبد\*** ، **قنبدان\***  
*Lixus* (S).  
*Lixe* (F).

جنس حشرات قارضة ناعرة من فصيلة السوسيات. أنواعه  
 نحو ٣٥٠ جميعها مستطيلة الشكل مقلعة، طولاً بأوراق  
 بين ٨ و ٢٢ سم. ألوانها عديدة يكثر فيها الأسود والأصفر  
 والخضري يعلوها طيل أصفر أو أسف. رقبتها دقيقة  
 ضيقة، ألوان مستحبة تظهر تميش داخل الراديب التي  
 تحفرها في سوق النباتات البقلية والصناعية والمروحية التي  
 تركبها أغصان الشوادر والمفوف والتيج والبرسيم والنفل  
 الخ.

٢١٦٣٢ - **قنبد مستطيل**  
*Lixe elongé* (F).  
 حشرة تدعى لكوس مستطيل، أطولها.

٢١٦٣٣ - **قنبث** ، **قنبث**  
*Pousse (jeune)* (F).  
*Shoot (young)* (E).  
 القنبلة الفتية جاز اقتلاها من أروبيتها.

٢١٦٣٤ - **قنبلة البوط\***  
*Phragmatiphila typhae*, *Nonagra typhae* (S).  
*Phragmatiphile des massettes* (F). *Phragmatiphila*  
*typhae* (E).

حشرة من النسيقات حشرقيات الاجنحة. موطنها يمتد  
 من الشرق الأقصى إلى أروبة والريفية التالية. القزاة  
 جارية قوتها رحيق الاثمار. السرفة خاضلة كثيفة تميش  
 في أول عهدا على أوراق النباتات الخشبية ثم على البوط  
 والقصب فتتبع صلاياها وتميش في داخلها حتى نهاية  
 طور الاكمال || جسمها مستطيل الجرم يعلو نحو  
 ٢٢ سم. سطحها نحو ٢٦ سم. رأسها حنطي اللون يعلو  
 منخس قرني المادة. عيناها كبيرتان. زباناها خيطان  
 جوشها الصافي الحنطي الصافي المواجه || رواشها  
 صغيرة الحجم. الأزواج الامامي، عند التفتيش، إلى  
 الحنطي الصافي المواجه يعلو تميش وتفتيش وتفتيش  
 رواشها الخلفاني إلى الحنطي الانثى المواجه يسر بعض

حكاكا مزيماً يمتد بشرة الجله. يقضى على الحكاك  
 باستعمال الكحول عيار ٧٥°.

٢١٦٣٥ - **قنبث** ، **قنبث** ، **قنبث** ، **قنبث**  
*Cucumis sativus flexuosus* (S). *Concombre serpent*,  
*C. flexuosus*, *Melon serpent* (F). *Snake cucumber*,  
*Curving cucumber* (E). *Schlaugengurke* (D). *Cocomero*  
*serpente*, *C. di turchia* (I).

نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة القرعيات اصغاره  
 اربعة او خمسة متره. أوراقها طويلة الزناد مقصصة.  
 ثمارها اسطوانية، مستطيلة، خلية البشرة في أول عهدا.  
 طولاً بأوراق بين ٣٠ و ١٠٠ سم. وقطرها من ٣ إلى ٨  
 سم. لوفاً إلى الخضار المالح ومنها البحري والآخر الاصفر.  
 طعمها بين الحار والكروي || تكثر زراعتها في البلاد  
 الحارة. تربى في الارربة المتوسطة الانساج والرطوبة.

٢١٦٣٦ - **قنبث البحر\*** ، **خيار البحر\*** ، **قنبث**  
**البحر**  
*Holothuria* (S).

*Holothuria*, *Biche de mer* (F). *Holothurian*, *Sea-*  
*Slug*, *Sea-cucumber* (E).

جنس حيوانات بحرية من قنليات البحر. أنواعه عديدة  
 جميعها اسطوانية عذبة الجسم المستطيل، مدنية الطرف،  
 غنية اللحم، فائقة الحساس القنبية التي يراوح عدها بين  
 ١٦ و ٢٠ || اعرف أنواعها وأشهرها. الثلاثة التالية:

*Holothuria tubulosa* (S). **قنبث البحر الأنبوبي**  
 يكثر وجوده في المتوسط يعيش بين صخور الشاطئ.

*Holothuria edulis* (S). **قنبث البحر المأكول**  
 يكثر في بحار الصين وإسبانيا والخليج الفارسي والبحر  
 الأحمر.

*Holothuria intestinalis* (S). **قنبث البحر المعصاني**  
 موطنه بحار الشام وهو مستطيل الجسم النثيق.

٢١٦٣٧ - **قنبث الخيار**  
*Ecbale* (F).  
 هو القنبث البري نبات يحمل ثمرًا كالثقل من الطعم  
 كزبه الرائحة يسطح بمصارته ليرقان الأصفر فيقتل  
 من الالتهاب مادة صفراء يزيل اليرقان باستعمالها (أ. م.).

٢١٦٣٨ - **قنبث الحنث**  
*Bel indien* (F).  
 هو الاكل أو البيل، أطولها.

٢١٦٣٩ - **قنبث برّي\*** ، **قنبث الحمار\*** ، **قنبث**  
**القمير** ، **عزوز\*** ، **أطريون**  
*Ecballium elaterium*, *Momordica elaterium*, *Elaterium*  
*officinale*, *E. agreste* (S). *Ecbale*, *Cornichon*  
*d'âne*, *Concombre sauvage*, *Gicet* (F). *Squirting*  
*cucumber* (E). *Echte Springsgurke* (D). *Cocomero*  
*asinino*, *Eelaterio*, *Ponocidi salvatici* (I).

نبات عشبي بري من فصيلة القرعيات. يعيش في المواقف  
 الرطبة. أوراقه تشبه أوراق القنبث والآخر تملأها وتأكليا.  
 ثماره زرقية، مستطيلة، حجمها حجم بيض الوز، تنفصل  
 عن الساق عند نضجها وتقتل بوزومها بيضاء عند الضغط  
 عليها وهي سامة يستخرج من صلبها مادة قاتلة تدعى  
 إلاتريوم تعتبر من المسهلات المنيفة وما استعمالها الطبي  
 المعروف.



قنبث البحر



قنبث بري



قنبث ثمانية



قنبث



قنبلة البوط



فُحَّاج

Houppier (F). ٢١٦٤٥ - قَحْمَة ، فَحَّاج

Crown (E).  
الشجرة اقتطعت أغصانها حتى السنة . ج ققام ويوق .

Maroute (F). ٢١٦٤٦ - فُحْرَان  
هو الاقوامان الخشن ، املبه .

Décrapitide (F). ٢١٦٤٧ - قُحْمُوقَة  
Decrepitide (E).  
القشوة . حالة الهرم وما ينتج عنها من وهن .

Cranis (S). ٢١٦٤٨ - قُحْمُوقَة \*  
Cranie (F). Cranie (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل  
وفصيلة القحفيقيات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد  
بعضها من صلب البحر الابيض المتوسط والبعض الآخر  
يوجد الى المحيط الهندي || أمدها الى امتدادية المصارع ،  
شبه مستديرة الشوزن ، مسطحة الصفحات السبل الثلاثة  
التقريب ، محبة الصفحات العليا المجهزة من الداخل بكتابين  
ناشرين || تعيش لاصقة بالصخور المنحدرة القليلة المنور.

Cranidae (S). ٢١٦٤٩ - قُحْمُوقَات \*  
Cranidés (F). Cranidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل .  
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة متطعمها من متحجرات  
الطبقة الارضية الاول وبعضها يعود الى الطبقة الطباشيرية .  
اما الانواع المعاصرة قليلة وتعيش في بحار البلاد الحارة  
والمعتدلة الحارة . جميعها ملتحمة باصدانها ، عادة  
والسويات الطينية || اعرف اجناسها واشهرها القحفية  
والقشوة .

Cottus (S). Cotte (F). Bull-head (E). ٢١٦٥٠ - قُدَّ \*  
جنس اسماك صغيرة القند مسجحة الشكل من فصيلة  
الطريخيات الشائكات الزعانف || انواعه عديدة منها  
البحرية والبرية جميعها تعيش في السق . كونهما دون المادي.

Chabot (F). ٢١٦٥١ - قُدَّ بَحْرِي \*  
Short-spined (E).  
نوع من القند موطنه البحار يعيش قرب الشواطئ المصرية  
المسقة النور . جسمه املطيبي الشكل مستطيل الزعانف  
الشائكة . رأسه كبير القند طوله يمازي الزام الاول من  
الجسم . قويه متراكب الانوار في الابيض والاسمر والجزوي  
والاشقر || اشواك زعانفه حادة مؤذية شغها المصيدون .

Cottus gobic (S). ٢١٦٥٢ - قُدَّ تَهْرِي \*  
Chabot (F). Father-lasher (E).  
نوع من القند يعيش في المياه العذبة . وهو سمكة صغيرة  
القند ، كبيرة الرأس والزعانف الحادة الشائكة . ثوبه  
متداخل الانوار المراكية . لحمه كرهه الطعم لا يؤكل .

Arôme (F). Aroma (E). ٢١٦٥٣ - قُدَّا \*  
الرائحة الطيبة . يقال فاح قداه .

Fleurs de bigaradier (F). ٢١٦٥٤ - قُدَّاح \*  
Flowers of a Seville-orange tree (E).  
القداح هو زهر التارنج او القناش . وبهم من قال نور  
النبات قبل ان يتفتح . اطراف الثبت الغض .

التي عند اقترابه من الحمار الخاربي || لها جيل واحد  
في الحمل . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى اواخر  
ايلول . تسمرح في الليل . تماطل بعد ظهورها بنحو ستة  
اسباع وتمتد المكن لطفاً على الصفحات السبل من نصال  
الاوراق || السرة تقول نحو ٣٤ سم . جسمها شبه اسطواني  
الشكل ، حاجي اللون ، تني الموج يملوه بغض الحلب  
القصور الاغبر . رأسها اسود منها ورواجها الى السرة ||  
طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع يتقضي  
داخل سلامة البرود او القصب .

Pagrus (S). ٢١٦٣٥ - فُجَّاج \*  
Pagre (F). Braize, Porgy (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات الشائكات  
الزعانف . انواعه نحو ١٥ اصنافها بحار البلاد الحارة .  
اجسامها بيضوية الشكل مسطحة طولها يراوح بين ٢٥  
و ٧٥ سم . زعانفها كبيرة ، الشرجية منها غارقة . فلورها  
ريقة مسنة . انوارها متداخلة الانوار ، ظهورها ودية  
او مرجانية ، بطونها فضية . طولها قليلة الطعم مرغوب  
فيها || اشهر انواعه :

Pagrus vulgaris (S). الفجج المبدول  
Pagre commun (F).

سمكة شبيه بالمرجان . شائعة في المتوسط .  
الفجج الارقي . Pagre orphe (F). Pagrus orphus (S).  
سمكة متوسطة القند مستطيلة الخنم تكثر في شمالي المتوسط  
وعلى شواطئ الاطلسي .

٢١٦٣٦ - فُجَّاج \*  
سمال الخيل .

٢١٦٣٧ - فُجَّاج \*  
سمال الابل .

٢١٦٣٨ - فُجَّاج \*  
هو السيل الجارف .

٢١٦٣٩ - قُحَّاقَة \*  
Benne préneuse (F).  
Grab-bucket (E).  
جهاز آلي يستعمل لرفع التراب والحجارة ونقلها من مكان  
الى مكان .

٢١٦٤٠ - قُحَّاق \*  
داه يصيب القم تجفف جلودها .

٢١٦٤١ - قُحَّاقَة \*  
Catabolisme (F).  
Catabolism (E).  
علم يبحث في دور انحطاط الكائنات الحية .

٢١٦٤٢ - قُحَّاق \*  
Orontium (S).

Oronce (F). Floating arum (E).  
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة القلقاسيات .  
انواعه قليلة اصنافها منافع وضفاف بحيرات البلاد الحارة  
اغصانها صفات القاصي . اولانها قرصية الانتساب  
منقطة املطجية ، نصليها بطول ١٢ الى ٣٠ سم .  
ويربض من ٥ الى ١٢ شمراخها الزعري يملو نحو ٥٠ سم .

٢١٦٤٣ - قُحَّاق \*  
Crâne (F).  
القحف هو الجمجمة او عظماها .

٢١٦٤٤ - قُحَّاق \*  
Aspermie (F).  
Aspermatism, Aspermia (E).

النمل اندام الحيوانات النورية في المذي وانعدام البرود  
في ثمار النبات .



قَحْمَة



قُدَّ



قُدَّ بَحْرِي



قُدَّ تَهْرِي

Altise du tabac (F). ٢١٦٦٥ - قَدَادُ التَّبَاقِ

راجع التيز التبغ .

Altise des céréales (F). ٢١٦٦٦ - قَدَادُ الزَّرْعِ

راجع التيز الزروع .

Altise de la vigne (F). ٢١٦٦٧ - قَدَادُ الْكَرْمَةِ

راجع التيز الكرمة .

Chaton (F). Setting of a gem (E). ٢١٦٦٨ - قَدِيدَةٌ

هي الحُريرة ، نظام هجرة يرتكز على سبله مركبة من ازهار  
وحيدة الشق .

Gobelet, Vase (F). ٢١٦٦٩ - قَدَحٌ \*

شكل من اشكال التقليم في الانجار . (E). Gobelet, Vase

٢١٦٧٠ - قَدَرٌ

القدر دائرة نجوم من كوكبة قيفاوس .

Puissance (F). Power (E). ٢١٦٧١ - قُدْرَةٌ

هي القوة على الشيء ، والتمكن منه .

Interligne (F). ٢١٦٧٢ - قُدْرَةٌ

Interlining, Space-line (E).  
هي الفراغ أي المسافة بين الرزق والرزق في الفرس  
المنسق .

Kadsura (S). ٢١٦٧٣ - قَدَصُورَةٌ

Kadsura, Kadsoura (F).

جنس جنبات برية وريشية من فصيلة المنكليات . أنواعه  
عديدة منها الشرق الاقصى . سوطها فراء تملو من ١٠٠  
الى ٣٠٠ سم . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، متعقبة . ازهارها  
فردية التجميع ، ابطية الارتكاز . ثمارها انورية ثلثولية  
القشور || أشهر أنواعه وأهمها زراعة القدصوره اليابانية .

٢١٦٧٤ - قَدَصُورَةٌ يَابَانِيَّةٌ \*

Kadsura japonica (S). Kadsoura du Japon (F).

نوع من القدصوره الزراعية والريشية وهي جنبة جاحدة  
تلمو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها اعليجية ذرية ،  
تصلها جامد المنقطة مالمس البشرية . ازهارها الى البياض  
الاخضر يملو موج اصفر . ثمارها الى الحمرة القرمزية .  
افتادها واوراقها تستعمل في صناعة الورق . تنبع افئافها  
واوراقها يستعمل في تنظيف الشعر من مواده الدهنية .

Anthèse (F). ٢١٦٧٥ - قَدَفٌ \*

نمن فخر الزهرة أي زمن انفتاح فجرة الطلع .

Caranx trachurus (S). ٢١٦٧٦ - قَدَقْدُ

نوع من السمك وهو سمكة بحرية مستطيلة الشكل طولها نحو  
٥٠ سم . مرتها المياه الاقليمية ، توجد في المتوسط . لحمه  
مستحب الطعم مأكول .

Lignée (F). Issue, Progeny (E). ٢١٦٧٧ - قَدِيرٌ

السلالة المنتجة من صرم معرف الصفات التوريثية .

Phophila (S). Phophile (F). ٢١٦٧٨ - قَدُوحٌ \*

جنس شجرات صغيرة القد ثنائية الجناح من فصيلة  
القنوجيات . أنواعه عديدة ألوانها الى البصرة الالامة ،

Astragale (F). ٢١٦٥٥ - قَدَادٌ

هو الاسطراغالوس . اطلبه .

Cricetus (S). Cricet (F). ٢١٦٥٦ - قَدَادٌ \*

Cricetus (E).

جنس حيوانات كبيرة قاضية من القاريات . انواعه عديدة  
موطنها العالم ، منها ١٣ منهاها العالم القديم . اجسامها رمية .  
رواسها غبروية . قاضها مقطوعة . آذانها متوسطة القد .  
جرانها واذانها قصيرة . ألوانها مختلفة الالوان . ديبها ناعم  
قصير ، صوفها جامد مستطيل || اعرف أنواعه وأشهرها :

Cricetus nigricans (S). ٢١٦٥٧ - قَدَادٌ أَسْمَرٌ

Cricet noirâtre (F).

نوع من القداد موطنه شرقي البحر المتوسط . يوجد في  
جبال لبنان من علو ١٢٠٠ الى ١٨٠٠ م . طوله نحو ٣٠  
سم . وذنبه ٣ سم . ثوبه الى الربة السراء يملو موج اسود ،  
ظهوره اصعب من بطنه || يألف الاسراج والادغال قوته  
المواد النباتية والمضوية .

Cricetus arenarius (S). ٢١٦٥٨ - قَدَادُ الرِمَالِ

Cricet des sables (F).

نوع من القداد موطنه الشرق الاوسط والقفاس واورية .  
ثوبه الى الربة السطحة . طوله الكامل نحو ٢٧ سم . يألف  
الناطق الرملية والجرف الغلظة العذبة .

٢١٦٥٩ - قَدَادٌ هَمْسْتَرٌ ، قَدَادٌ أَلْهَانِي

Cricetus frumentarius (S). Cricet Hamster, Hamster (F). Hamster (D).

نوع من القداد طوله ٣٠ سم . وذنبه ٣ سم . ثوبه الى الصفار  
الخطي يملو موج اخضر . قمضه ابيض . جبهة موشية  
خط اسود . خذاه الى الصفرة . عنقه الى الصبغة الصنائية .  
بطه الى البصرة الباقية || موطنه بعض الناطق الاوربية  
اغصها الماتية والدانوك || جمره رطب الارباء يقيمه في  
الهوم حل عنق يراوح بين المتر والمترين . وهو مؤلف  
من حجرة وسطى فسيحة ونفق مستطيل تمرضه من اليمين  
والثلاث عدة دهاليز مستطيلة يحزن فيها ما تبه من سطة  
ولغيرها من الحبوب || انتاه تضع من ٤ الى ٨ ادفاس  
ترضعها ثلاثة اسابيع .

Cricetines (F). ٢١٦٦٠ - قَدَادِيَّاتٌ

عزرة حيوانات كبيرة قاضية من فصيلة القاريات اجناسها  
وانواعها كثيرة موطنها العالم . أنواعها الامريكية فقط تمه  
٨٢ جميعها رمية الجسم قصيرة الجرامز والذنب . قوتها  
الحبوب وثمار المواد النباتية .

Vanne (F). Water-gate (E). ٢١٦٦١ - قُدَاسٌ

القداس حاجز ينصب على مصب الماء لتقنين كمية انسيابه .

Altise (F). ٢١٦٦٢ - قَدَادَانٌ

هي الاليز جنس حشرات من الضاريات .

Altise bleue (F). ٢١٦٦٣ - قَدَادَانُ الزَّرْقِ

راجع التيز زرقاء .

Altise potagère (F). ٢١٦٦٤ - قَدَادَانُ الْبُقُولِ

راجع التيز البقول .



قَدَادٌ



قَدَحٌ



قدصوره يابانية

Occiput - قَدَاكِي ، قَدَسِي  
نمت تمريني يطلق على كل ما هو خاص بالذئبال .

#### ٢١٦٩١ - قَدَايَات

Aphanipèrès, Siphonaptères (F). Aphaniptera, Siphonaptera (E).

رَبَّة حشرات صغيرة القند من طبقة حديدات الجناح . فصائلها خمس أما أجناسها وأنواعها فمئو ٥٠٠ || أجسامها خافتة الجوانب المصغرة ، حليّة الزنب المنحى الى الوراء . رؤوسها صغيرة القند ، حرياتها بسيطة . قرونها الاستشعارية تحملة مركبة من ثلاث فواصل . مثاك اغطائها ثالثة ماصة . أرجلها قوية مدة قفزز || وتتميز أفراد بعض فصائلها بصف أو صفين من الانسان تعرف بالمشط وهذا المشط قد يكون حدي أو سدري الارنكساز . ذكروها احمر من أنثاها تحمل هذه الكوم في قصبتها المتعقبة نحو البلاد || أشهر فصائلها البرغوثيات .



قُدُوح الجبن

Vexille (F). Vexillum (E). ٢١٦٩٢ - قَدَق

القَدَق فصل الرِيْفَة . وهما قَدَقان ، القَدَق الوحشية اي الخارجية والقَدَق الانسية اي الداخلية .

Ejaculation ٢١٦٩٣ - قَدَق

راجع انقذاق .

Balistique (F). Ballistic (E). ٢١٦٩٤ - قَدَقِيَّة

القَدَقِيَّة علم يبحث في رمي القذائف أي في ضبط حساب مدى الحرس وتسديده .

٢١٦٩٥ - قَدَرٌ هو حبل القتر .

Froid (F). Cold (E). ٢١٦٩٦ - قَرَر

هو البرد الشديد .

Poussin (F). Chick (E). ٢١٦٩٧ - قَرَر

صغير الدجاج . هو الصوص والكتكوت .

٢١٦٩٨ - قَرَر ، وَدَقِي

Chaleurs, Durée du rut (F). Heats, Duration of the rut (E).

مدة استمرام انثى الحيوان أو زمن ودقها وقد يدوم عادة نحو ٤٨ ساعة وهو يعاود كما يلي :

بعد الوضع

— بستة ايام عنه الفرس

— بعشرين يوماً عنه البقرة

— باربعين يوماً عنه الخنزيرة

— باربعة أو ستة أشهر عنه الشاة

عنه الاثني عشر الحامل

كل ٢٥ يوماً عنه الفرس

كل ٢٠ يوماً عنه البقرة

كل ٢٠ يوماً عنه الخنزيرة

من ١٥ الى ٢١ يوماً عنه الشاة

٢١٦٩٩ - قُرَاب

Caranx Korab (F).

سمكة بحرية تدعى شم قراب ، اخطبا .

٢١٧٠٠ - قُرَاب بَيْضِي

Galne ovarique (F).

Ovaric sheath (E).

حضر من شرار اناث الطير والخرشتر وهو وعاء جراي

الشكل يتكون فيه البيض

جميعها هوائية نائلة تركب مختلف المواد العضوية اخصها الجبن والدهن || أشهر انواعه قُدُوح الجبن .

٢١٦٩٩ - قُدُوح الجبن

Plophile casei (S).

Plophile du fromage, Mouche du fromage (F).

نوع من القُدُوح وهو ذبابة صغيرة القند طولها نحو ٣ مم . توجهها الى البصرة السوداء ، مقدمها وارجلها الى الصلبة ، حرياتها حر . تحض كبحا في الجبن فينفث عن رقات دقيقة تحملة تيش على الجبن فتختره وتطعمه .

٢١٦٨٠ - قَدُوسِيَّات

Phyllidae (S).

Phyllidae (F). Phyllidae (E).

فصيلة حشرات من ربة ذوات الجناحين ، أجناسها وأنواعها قليلة ، جميعها من الذباب المولك النائل الصغير القند المستطيل الاريل || رقاتها تعيش على المواد العضوية المتفطرة وصل اللعوم المتعددة والجبن والسمك ...

٢١٦٨١ - قَدِيَّات

Cottidae (S).

Cottidae (F). Cottidae (E).

فصيلة سمك من شائكات الزعانف . أجناسها وأنواعها قليلة العدد تقسم الى قسمين قسم الاسماك البحرية التي تقضي حياتها في البحار وقسم الاسماك البرية التي تعيش في المياه العذبة . جميعها من الاسماك المسنجة الشكل ، كبيرة الرؤوس ، صغيرة الاجسام المستدقة ، مستطيلة الزعانف الحادة الشائكة لحومها دنيئة الصف .

٢١٦٨٢ - قَدِيَّات

فصيلة نباتية تعرف بالمرديات ، اخطبا .

٢١٦٨٣ - قَدِيد

Vlande desséchée (F).

Dried meat (E).

لحم مقد .

٢١٦٨٤ - قَدِيَّسيَّات

هي القَدِيَّسيَّات ، فصيلة نباتية ، اخطبا .

٢١٦٨٥ - قَدُوسِيَّات ، لَامَرْسِيَّة

Lamarkia (S).

Lamarkia, Codion, Elaeodendron (F).

جنس نباتات عشبية برية من التبجيليات المكروشيات .

انواعها المعروفة عديدة منها يراري حوض البحر الابيض

المتوسط || اورثاتها عصفية النصال المسطحة ، ازهارها

سلبيل التجميع ، سبيلاتها صغيرة .

٢١٦٨٦ - قَدَاة

Branchipus (S).

Branchipe (F). Branchipus (E).

دورية من القشريات الدنيا عصفريات الاطراف . تعيش

في المياه العذبة . جسمها حاد الحافات ، مستطيل الشكل ،

يطول نحو ١ مم . عينها مزنةتان . زباناها مستطيلان

عند الذكر . قوائمها الصدرية صفيحية الشكل . تموم

على ظهورها .

٢١٦٨٧ - قَدَاة

Brachyne (F).

هي الرنات ، اخطبا .

٢١٦٨٨ - قَدَاة أَحْمَرُ الرَّأْس

Brachyne crépant . اخطبا .

هو الرنات الحمراء الرأس ، اخطبا .

٢١٦٨٩ - قَدَاة ، قَدَاة

Nuque (F). Nape (E).

جامع مؤخر الرأس ويقل ما بين قفزة القفا الى الاذن .

والقذال من الفرس مدقة المذار خلف الناحية . ج قذ

وأفظة .



قَدَاة



معظم أنواعها عصارة حليابية حراء اللون سرية الجفاف تستعمل استعمال الكينو والكاشو .

Cornouiller (F).

٢١٧٣٢ - قُرَالِيَا

هي القُرُنْس ، أطلبه .

Cornacées (F).

٢١٧٣٣ - قُرَانِيَّات

هي القُرُنْسِيَّات ، أطلبها .

٢١٧٣٤ - قُرِيَا . هي الزَّق ، أطلبه .

Corvina (S).

٢١٧٣٥ - قُرِيَا

Corb (F). Corvina (E).

جنس أسماك بحرية بوضحة من شائكات الزعانف وفضيلة الجباريات || أنواعها المروفة نحو ٢٥ منها من أسماك المحيط الهادي والهندي والمحيط الآخر ، وبعضها يعيش في البحر الأبيض المتوسط || أجسامها متفارقة القد ، أطوالها تراوح من ١٢ إلى ٣٥ سم . أطرافها متباعدة الألوان يكثُر فيها الرصاصي والاسمر القاتم || لحمها جيدة الصنف مأكولة || أعرف أنواعها وأشهرها القرية السوداء .

٢١٧٣٦ - قُرِيَا سَوْدَاه \* ، قَلَقُ الْبَحْرِ

Corvina nigra (S).

Corb noir, Corbeau de mer (F). Crow fish (E).

نوع من القرية . سمكة بحرية يعيش . أطلبها البحر الأبيض المتوسط || جسمها أعليجي الشكل يطولها من ١٨ إلى ٣٥ سم . ثوبها إلى السرة السوداء المواج . ظهرها اسود . بطنها فضي . زعانفها إلى السواد الآزرق المواج يطولو تنطيق ذهبي . رأسها مخروطي الشكل ، قصير الخط . فكها متعادلان . شفتها مثل الانفراج . عيناها كبيرتان ناشزتان . زعانفها متباعدة الاشكال . الظهرية الأولى محززة . الظهرية الثانية مستطيلة . الصدوية مجذافية . الخوضية تديية . الشرجية مستطيلة . الذيلية بموجة الطرف || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢١٧٣٧ - قُرَّتُ الْجِلْد . Kératose (F). Karatosis (E).

علة في الجلد تنشط الطليقة القرية تشقق وتتصلب .

٢١٧٣٨ - قُرَّة \* ، قُرَّةُ الْعَيْنِ

Nasturtium officinale (S). Cresson de fontaine, Santé du corps (F). Water cress, Water grass (E). Brunnenkresse, Brunnenwasserresse (D). Crescione di fonte, Nasturcio, N. acquatico, Sisembrio acquatico (I).

بقلة مسمرة من فصيلة الصليبيات تعيش على سطح الماء . سوتها عشية . أوراقها متفكة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات . ازهارها متفردية التجميع ، يفضا اللون ، فروصها وأوراقها وازهارها مأكولة ، نافمة (راجع جذائر الفيتاين).

٢١٧٣٩ - قُرُنْج

Cyclostrema (S).

Cyclostreme (F). Cyclostrema (E).

جنس حيوانات بحرية من القُرُونْجِيَّات مملوكة الارجل وفضيلة القُرُونْجِيَّات . انواعها المعاصرة المروفة مدينة منتشرة في جميع بحار العالم || أصدانها صغيرة القد قمرية ، حلزونة ، متدلة الانفتاح ، جانبية الفوعة المستديرة كالبيو . لوها إلى البيضاء الاغبر تملو زخرفة جووية متناسقة تمتد من الفوعة والقاعدة إلى القمة .

٢١٧٣٢ - قُرَامِيَّاتُ الْبَحْرِ Acalaphes (F).

رئة من الحشرات تنتمي إلى صف الحياترات الموسية . فصائلها وأجناسها عديدة تتميز بشكلها القمي التركيب تملو اعداب شائكة اذا لامست الجلد أليتها كما يفعل القراص . اصطناعا جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة تعيش على الصنوبر .

٢١٧٣٣ - قُرَامَا \* Karatas (S).

Karata, Karatas, Caratas, Ananas à feuilles longues (F). Curra-cowplant (E). Karatas Ananas (D). Karatas (I).

جنس نباتات مسرة برية وزراعية تربيتية من فصيلة الانثاسيات . أوراقها لحمية ليفية مستطيلة طحلاء اللون شائكة الاطراف والمقصية . ازهارها جميلة الشكل والالوان ، سفلية التجميع || أنواعها قليلة الشهرة ما يتبع .

٢١٧٣٤ - قُرَامَا سَانْ دُومِيْنِك

Karata de St. Domingue

نوع من القُرَامَا أوراقها صناعية لسيجية وقد تستعمل مع الجذور بعد سحقها في تدويج السلك لصيده .

٢١٧٣٥ - قُرَامَا غُوِيَّان ، شَجَرَةُ الْفَتَالِ

Karata de la Guyane, Bois de mêche

نوع من القُرَامَا لها كالصناعات يستعمل استعمال الفتال . ثمارها صغيرة القد رئية الشكل تملو ليمون الأرض لها حازرة العلم وتنضج في الرئة .

٢١٧٣٦ - قُرَام \* قَنَار ، قَانُوكَا

Picus (S). Pic (F). Woodpecker (E).

طائر جسم الدورار يتناسق جلوع الانجار وينقرها لاستخراج الحود من شقوقها . راجع قنار .

٢١٧٣٧ - قُرَام Dermatomyccosis (S).

Dermatomyccose (F).

مرض جلدي سببه القراد .

٢١٧٣٨ - قُرَامَا Ecorce (F). Bark (E).

هي اللحم بوجه عام وفي التخصص طلاء سوق النباتات الحولية والخولة .

٢١٧٣٩ - قُرَام Phalaris noueux (F).

هو البشعة المعقدة نبات عشبي علني من التيجليات .

٢١٧٤٠ - قُرَام \*

Rhizophora (S).

Rhizophora, Manglier (F). Mangrove tree (E). Gemeiner Wurzelbaum, Mangelbaum (D). Rizofora (I).

جنس اشجار متفكة من فصيلة القُرَامِيَّات . انواعه • اشجارها كبيرة القد . أوراقها متفكة ، متقابلة ، جلدية اتصل الاوع . ازهارها محورية الاوتكار ، نورية التجميع ، مستطيلة الزناد . ثمارها حلزونية الشكل ، مأكولة اللب . يخرج من عصارة ثمارها بعد تحضيرها مشروب غري لا بأس به .

٢١٧٤١ - قُرَامِيَّات Rhizophoraceae (S).

Rhizophoracées (F). Rhizophoracées (E).

فصيلة نباتية من ذوات الملتين مستقلة الفعالات . اجناسها • وانواعها • • أطلبها المناطق الاستوائية . جميعها اشجار وجنبات . أوراقها متفكة ، متقابلة ، بسيطة ، كاملة . ازهارها نورية التجميع ، اعطية الارتكار أو ناجية . ثمار بعض اجناسها مأكولة ويستخرج من سوق



قُرَامَا



قُرَام



قُرَا سَوْدَاه



قُرَّة

انزهاره عشوية التجميع ، كبيرة القد ، تبدو يبيضاء اللون ثم تتحرف شيئاً فشيئاً الى الاحمر || انزهاره يستمر من تموز الى ايلول .

### ٢١٧٥٢ - قُرْدَبُ السَّاقِ

Renouée à feuilles de patience (F).  
يمر بالدثار ، اطلبه .

### ٢١٧٥٣ - قُرْدَبُ شَرْقِي

Polygonum orientale (S). Renouée d'Orient, Bâton de St Jean, Cordon de cardinal, Monte au ciel (F).  
نوع من القردوب الزرني ساقه عديمة سوقه سرحة قليلة الفروع تنمو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقه كبيرة القد ، تسلسها يبيغي الشكل ، ذات الزوايا الاخير . انزهاره سفلية التجميع ، طرفية الارتكاز وعشوية ، مستطيلة الزنناد متدلية ، لونها يختلف باختلاف الضرب منها الابيض والوردي والاحمر والموشج || انزهارها يستمر من آب الى ايلول .

### ٢١٧٥٤ - قُرْدَبُ صَوِّي

Polygonum lanigerum (S). Renouée laineuse (F).  
نوع من القردوب الزرني ساقه زياء اللحاء ، طلاء اللون . ستانية ، تسلسها خلي الصفحة الفضية الموج . انزهارها سفلية التجميع ، متبادعة ، متبادعة ، يبيضاء اللون او وردية . انزهارها يستمر طوال شهر ايلول .

Polygonum chinense (S). قُرْدَبُ صِيْنِي  
Renouée de Chine (F).

نوع من القردوب الزرني ساقه فراء تملو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقه اهليلجية مستطيلة ، تسلسها قصير المتق ، سنن الحافة ، اخضر البشرة او احمر . انزهاره عشوية التجميع ، تاجية الارتكاز ، قمرزية اللون . انزهاره يستمر طوال الصيف .

Guenon (F). She-monkey (E). قُرْدَبَة  
انثى القرد .

Papion (F). قُرْدُجُ  
هو القردوح ، اطلبه .

Philopterus (S). قُرْدُجُ ، تَمَّ  
Philoptère (F). Philoptère (E).  
جنس حشرات جلدية صغيرة من فصيلة النمنمات . انواعه عديدة جميعها مفلطحة الجسم . مستطيلة الرأس ، طولها يراوح بين ١ و ٤ مم. ألوانها الى الخشن يستر او يفسر مع الانواع . وهي من الحشرات المؤذية ، تركب البعير فتفسده بانصاصها الدم .

### ٢١٧٥٩ - قُرْدُجُ اسْمَر

Philopterus atratus (S). Philoptère noir (F).  
نوع من القردج طوله نحو ٢ سم. جسمه يبيغي الشكل ، كثيف الهلب المستطيل . ثوبه الى السرة يطولها تبعج مثلث الزوايا سفلي اللون || يركب للربان انحصا البداف .

### ٢١٧٦٠ - قُرْدُجُ البَطِّ \* ، تَمَّ البَطِّ

Anaticola anseris (S). Anaticole des anserides (F).  
نوع من القردج طوله يراوح بين ٢ و ٣ مم. جسمه شبيه الشكل . ثوبه الى الصغار الخشن . هلب صغير القد ، كثيف التجميع || يركب البط ويؤذي .

### ٢١٧٤٠ - قُرْدُيَات \*

Cyclostrematidae (S). Cyclostrematidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل حشيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم انحصا بحار البلاد الحارة والمتلة الحارة || امداها منشفة او شفافة ، عديمة المادة الكولوية ، متبادعة الاجسام ، يكثر لها الصفر ، جميعها قمرزية مجازة ، قليلة الارتفاع ، مستديرة الفتحة الانائية الارتكاز القرنية المادة || اشهر اجناسها القردج .

### ٢١٧٤١ - قُرْدَحَانَة

غرب من الكساء . ج. قردحان . والقردحان يبيض صفار ذوات رؤوس كروية الفطر .

### ٢١٧٤٢ - قُرْدَحَة ، قُرْدَحَة

Ulcer (F). Ulcer (E).  
تريده نسيجي لاتيني الشكل والثان يميل في الاجسام الجراحية والتبائية فيعطها .

### ٢١٧٤٣ - قُرْدَحَة الغتس ، قُرْدَحَة الحراشيف

Becqueriau du mouton, Chancres des lèvres (F).  
مرض ضئيل يصيب الثمن . مظهره الخارجي يشو ببع مقروحة تملو مراشفت الحيوان المصاب .

### ٢١٧٤٤ - قُرْدَحَة القفا

Mal de nuque (F).  
عارض يصيب الخيل .

### ٢١٧٤٥ - قُرْد ، سَحْدَان

Singe (F). Ape (E).  
اسم شامل يطلق على كل حيوان لبون من القرديات . كنيته ابو خاله وابو حبيب وابو خلف وابو ربة وابو قشة . جمه قرد وقردة . والاثنى قردة جمها قرد . وتسمى لقا ودحية .

### ٢١٧٤٦ - قُرْدُ المغرب

Magot (F).  
هو الشعيم ، اطلبه .

### ٢١٧٤٧ - قُرْدُ الهند المقدس

Singe saint des hindous (F).  
هو حبار التليس . اطلبه .

### ٢١٧٤٨ - قُرْدُ امريكي

Saki (F).  
هو الساي ، قرد كث الذنب واللعية .

### ٢١٧٤٩ - قُرْدُ مقدس

Semnopithecus (F).  
هو الحبار ، اطلبه .

### ٢١٧٥٠ - قُرْدَب ، عصا الراعي

Polygonum (S). Persicaria, Renouée (F). Persicaria (E). Knöterich (D). Persicaria (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة البطاطيات . انواعه عديدة منها البرية والزرينية والشبية والجنية والعارشة . سوقها عقدية ، اوراتها لازياية الشكل ، انزهارها عشوية التجميع او سفلية ، اشهر انواعه ما يلي .

### ٢١٧٥١ - قُرْدَبُ التُرْكَمَن

Polygonum badschuanicum (S). Renouée du Turkestan, R. du Badschouan (F).

نوع من القردوب الزرني . ساقه عارشة طولها من ٥ الى ٨ امتار ، فروصها رطلة ، اوراتها اهليلجية الشكل ، ثوبها القاعد ، تسلسها مائل البشرة ، سنن الحافة .



قرد التركستان



قردب شرقي



قردب صوري



قردع اسمر




قردع البط

## ٢١٧٦٩ - فَرْدُوحُ شَحَوْت ، رَبَاحُ أَبُو الْهَوَل ، وَهَاب

Papio sphinx (S).  
Papion sphinx, Papion grand (F). Cynocephalus mormon (E).

نوع من القراديج كبير الجثة انفس الزنقوم . موطنه عند من النيل الى النيجر والكنغو . ثوبه الى الجؤرة الياضه يمين مع اقترابه من شج الظهر ونقرة الرأس . صاحب اولف الشعر الابيض . اذنه متوسطه القله مرداه . صوته يشبه قباغ الخنزير || جماعته متوسطه البدن .




فردع الحام

فردع الحوام

## ٢١٧٧٠ - فَرْدُوحُ عَشْرِيَّيْ \* ، شَحْمَكَة

Papio porcarius (S). Papion chacma (F). Chacma (E).

اكبر القراديج جثة واعظا زلقيا وهو عادم الشفرة صغير الكتاب . ثوبه الى الكهبة السراء يطرها موج اخضر . حمار كلب ابيض اللون وشعر صاحب كته || يالفت الحصاب والجبال والمناقع . يعيش جماعات كبيرة تمتد بعض الفترات .



فردع النسور

فردع الزنج

## ٢١٧٧١ - فَرْدُوحُ مَزْوَاج ، مَيْمُون

Mormon malmom (S). Papion mandrill (F). Papio malmom, Mandrill (E).

نوع من الفرداديج وبرايع الفرد وادها وادها واسلمها وانسحقا واشربها خلقا واشدعا يأسا . موطنه البلاد الافريقية يكثر في الفايون والكنغو || جسمه مصموري يطول نحو ١٠٠ سم . ويطول ١٠٠ سم . ذنبه ١٠٠ سم . قوائمه شديدة النشط . رأسه متوسط الحجم . زلقوه مستطيل مقطوم . عيناه غائرتان . انفه احمر اللون . كئابه غمدة ، بارزة ، زرقاء اللون || ثوبه الى السرة الزرقية الخفيفة المزاج ، يمين هت الظهر والرأس || يعيش جماعات كبيرة تمتد بعض الفترات .



فردوح الحيشة

## ٢١٧٧٢ - فَرْدُوحُ يَمْتِي \* ، رَبَاح

Papio hamadryas (S). Papion hamadryas, Hamadryas Tartarin (F). Hamadryas (E).

اعرف وشهر انواع القراديج . موطن الحيشة والسودان والجزيرة . قدمه قد الكلب الكبير اللطيف . ثوبه الى الكهبة الغضبية . وجهه صفلي اللون . كتابه زائجة احمره . قوائمه غليظة وقوية ، ذنبه بالغ الطول جثلي الطرف || الذكر منه يتحمل بفترة كثيفة تستطيلة الشعر تحمق الرأس والمتن والصدر ونصف الظهر .



فردوح بيزان



فردوح خنزيري

## ٢١٧٧٣ - فَرْدُوحُ \* ، لِيْپُورُ

Lipeurus (S). Lipeure (F).  
جنس شفرات جلدية صغيرة من فصيلة الشنانيات انواعها عديدة جميعها دقيقة . طول اجسامها يراوح بين ١ و ٢ سم . ورونها مستطيلة ، عليها خيل وكثيف . اولها الى البعرة الطعلاء . تركب الشجاييات على اختلاف انواعها فتزينا لانها تحمص اللحم .



فردوح ببي

## ٢١٧٧٤ - فَرْدُون

Chardon (F).

هو الحرفش . اطله .

## ٢١٧٧٥ - فَرْدِي

Simien (F). Simian (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما يتفق بالفرد .

## ٢١٧٧٦ - فَرْدِيَّات

Simians (F). Simians (E).  
مرقة الفرد وهي حيوانات لبيته من الرئيسات . فصائلها وانجاسها وانواعها كثيرة العدد تقسم الى مجموعتين :

## ٢١٧٦١ - فَرْدُوحُ الْجَوَانِمِ \* ، تَمَّ الْجَوَانِمِ

Philopierus subflavescens (S). Philopière des passeriaux (F).

نوع من الفردع طولهُ يراوح بين ١ و ٢ م . ثوبه الى الصفار الخنط . جسمه كثيف الحلب الدقيق || يركب الجوام اعصها الشرويات .

## ٢١٧٦٢ - فَرْدُوحُ احْتِمَامِ \* ، تَمَّ احْتِمَامِ

Columbicola columbae (S). Colombicola (F).

نوع من الفردع طولُ ذكوره نحو ٢ م . واثانه ٣ م . جسمه ورأسه وزيناه وعليه الى الاستطالة . ثوبه صفلي اللون ، اصفر المزاج || يركب الحام على اختلاف انواعه .

## ٢١٧٦٣ - فَرْدُوحُ الزُّوجِ \* ، تَمَّ الزُّوجِ

Dégeerella ornata (S). Dégéerle ornée (F).

نوع من الفردع طولهُ نحو ٢ م . رأسه غمري الشكل . جسمه يبيضي منقطع . عليه دقيق مستطيل . ثوبه الى الصفرة يملوه توشيح سترش اسمر || يركب الزوج رنح الماء .

## ٢١٧٦٤ - فَرْدُوحُ النُّسُورِ \* ، تَمَّ النُّسُورِ

Ethiopterum monile (S). Ethioptérme (F).

نوع من الفردع يطول نحو ٤ م . ثوبه الى الحنط الاسمر . زياناه خادشة الاطراف ، عليه صغير القند ، متوسط الكثافة || يركب النسور على اختلاف اجسامها وانواعها .

## ٢١٧٦٥ - فَرْدَمَاتَا

Cardamine amère (F).

هي الحشارة . اطها .

## ٢١٧٦٦ - فَرْدُوحُ ، فَرْدُوحُ

Papio (S). Papion, Cynocéphale (F). Baboon, Cynocephalus (E).

جنس فرد من فصيلة الببرويات . انواعه ٩ تتميز ببقايا منظرا وسفالة اخلاقتها ودمارتها وقدراتها واحتياجا . اجسامها مصمورة ، عضلاتها قوية ، ورونها ضخمة ، اغظامها زلقوية الشكل مقطوعة . اذنانها صغيرة . قوائمه قصيرة وقوية تمكها من العدو السريع وتعمل دون خفة التسلق . اذنانها لاقياصة الشكل واللعل || موطنها قصح الاربا . يعم نصف القارة الافريقية وكال الجزيرة العربية . تألف المناطق الوعرة تتجنب الاحراج والغابات . تعيش جماعات كبيرة العدد قوتها ما استطاعت اليه سبيلا من الحبوب والفاار والجذور والشرات والمظا وبيض الطير || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

## ٢١٧٦٧ - فَرْدُوحُ احْمَشِيَّة \* ، فَرْدُوحُ دُجِيْرِيَّة

رَبَاحُ دُجِيْرِي

Papio doguera (S).  
Papion doguera (F). Doguera baboon (E).

نوع من الفرداديج موطنه عند من الجفة الى الكنگو ثوبه الى الصفار الزيتوني ، قوائمه سيد . مفر ذكوره عاتقة اللون يطرها موج اسمر || يالفت المناطق الجبلية البعيدة عن كل حرا . جماعته متوسطه البدن .

## ٢١٧٦٨ - فَرْدُوحُ بَبُونِ \* ، بَبُونِ ، رُبَح

Papio babulin (S). Papion babouin, Babouin (F). Baboon (E).

نوع من الفرداديج العادم المفر والكنائب . موطن الحيشة وجوارها . ثوبه الى الصفار الخنط يمين هت الظهر ويمنر هت الرأس والليل || يالفت الاماكن القريبة من الحقل الزدرة اعصها صفول القند والبشن || يعيش جماعات تعد بعض الفشرات .



من ٤٦ إلى ٤٨ م. رأسها حطلي اللون. عيناها كيريات. زياتها عيطيان. جوشها وعيطها إلى الحطلي الاسمر المواج || روشنها الامانيان إلى الحطلي الجوزي المواج تملو مجبوعات من الزراكش والثراريق الجوزية. روشنها الخلفيان إلى الحطلي الاسمر المواج. اذهابها إلى الحطلي الاسمر || لها جبل واحد في الحقل. تسهر القراشة في اوائل تموز وتبقى حتى اواخر ايلول. تسهر في الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع ويمتنع الممكن لتعاطي على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرعة تقول نحو ٤٠ م. جسمها شبه اسطواني الشكل يعلو في السكة المباشرة نحو هربي. ثوبها إلى الخضار الاصفر تملو جده قاطبة سواد يتخللها تنقيط ابيض ويحدها من الجانبين خط اصفر. رأسها اسود يعلو تمشيع اصفر. مدنها ورواجبها إلى الخضار المايق || طور الاكمال الذي يشتر نحو ١٥ يوما يتقضي في التربة حيث تندمن السرعة ملتصقة بجلباب من الطين.

٢١٧٨٥ - قُرْدِس ، نَجْرَس ، قُرْدِس  
Simulium (S). Simule (F). Simulium (E).  
جنس حشرات صغيرة القند من فصيلة القرسيات تملو الذباب. انواعها عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم. تألف الاساكن الرملية. ذكورها تعيش على الانزعاج. اناتها لاسمة تمتص الدم.

٢١٧٨٦ - قُرْدِس اَحْمَر الرُّس  
Simulium erythrocephalum (S).  
Simule à tête rouge (F).  
حشرة مؤذية من فصيلة القرسيات. جسمها مستطيل صغير يطول نحو ٤ م. رأسها كبير. عيناها متقاربان. زياتها اسطواني، قصيران. روشنها كيريات شفافان. رأسها احمر. صدرها إلى السرة البنية. يعلها اصفر الزام الاول والاخير، بني الزام الثاني والثالث. قوائمها بيضاء. تظهر الحشرة الجبلانة من ايار إلى تموز. الذكر يعيش على رصيق الازهار. الانثى لاسمة، ماصة، تهاج كير حيون ولا تمف من الانسان. تقتسم بنوع خاص الأنف والعين والاذن والرجل.

٢١٧٨٧ - قُرْدِس الخَيْل  
Simulium equinum (S). Simule du cheval (F).  
نوع من القرس طوله يراوح بين ٢ و ٤ سم. اناته تلصع الدواب اغصها الخيل وقد لا تمف من الانسان ثربصه وتقله || يكافح باستماله ا ل د د د ت. وانشالها من الادوية التي لا تؤذي الانسان والحيوان.

٢١٧٨٨ - قُرْدِسَة  
Crassatella (S).  
Crassatella (F). Crassatella (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم وفصيلة القرسليات. انواعها المعروفة تناهز المئة، اكثرها من متحجرات الاباج الثاني. انواعها الماصرة وقدرها نحو ٣٠ تعيش في بحار البلاد الحارة || اصداها متوسطة الحجم، مخرجة الشكل، ثنائية المصارع المتساوية. مزخرفة السطح الخارجية المائلة.

٢١٧٨٩ - قُرْدِسِيَّات  
Crassatellidae (S).  
Crassatellidae (F). Crassatellidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد

مجسومة قرد العالم القديم المعروفة بسفليات المنخرين. ومجسومة قرد العالم الجديد المعروفة بالهتارات او الفتاسيات ٢١٧٧٧ - قُرْدِيَّة  
خط شج الطهر .

٢١٧٧٨ - قُرْدِيْس \*  
Cardina (S).  
Cardine (F). Cardine (E).  
جنس دويبات مائية من القشريات ، عشاريات الارجل ، طول الذيل ، وفصيلة القريدسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، بعضها هربي يعيش في المياه العذبة وبعضها بحري || اجسامها متوسطة القند . صدرها مستطيل الشكل . مؤخرها معتدل الخانة والتعطيط . تصير عمتاشها المغائية الاطراف || اشهر انواعها واكبرها قدأ القرديس الهندي (C. fossarum) الذي يكثر ويوجد في نهر جنجنس .

٢١٧٧٩ - قُرْدِيَّة  
Ochradenus (S). Ochradène (F).  
جنس نباتات برية بجملة مصرية من فصيلة الخريزانيات . انواعها المعروفة قليلة مهددا بعض مناطق حوض البحر المتوسط . سورها مشتبكة الفروع مستشيكها . اوراقها خريزة النصل او خطية ، قليلة العدد ، متباعدة الاوتكار . ازهارها حادة القعالات . خاسية او مفلسية الفصل ، لا نفاذية الاسبدة التي يراوح عددها بين ١٠ و ١٥ .

٢١٧٨٠ - قُرْدُوح \*  
Atraphaxis (S). Atraphace (F).  
الواحدة قرقسة . جنس نباتات حنينة مصرية صغيرة القند من فصيلة الباطليات . انواعها قليلة . اوراقها بيضية ، كاملة ، صغيرة ، جلدية النصل . فصل ازهارها الداخلية تقول وتتلون بعد التورير || اعرف انواعها ما يلي .

٢١٧٨١ - قُرْدُوح سنائي  
Atraphaxis frutescens (S). Atraphace lancéolé (F).  
نوع من القردوح وهو حنينة سريرية تسرة تملو من ١٠ سم الى ١٥٠ سم . اوراقها سنائية الشكل ، صغيرة القند ، بحرية اللون . ازهارها إلى البيضاء الناصع || ازهاره يستمر من تموز إلى ايلول .

٢١٧٨٢ - قُرْدُوح شاكك  
Atraphaxis spinosa (S).  
Atraphace épineux (F).  
نوع من القردوح وهو بجملة سريرية شاككة تملو نحو ٥٠ سم. ساقها رطوية غير القواء . اوراقها صغيرة القند ، صميكة النصل ، بحرية اللون ، ازهارها وريدية || ازهاره يستمر من ايار إلى آب .

٢١٧٨٣ - قُرْدُوح شَمْشَادِي  
Atraphaxis buxifolia (S). Atraphace à feuilles de buis (F).  
نوع من القردوح وهو بجملة صغيرة سريرة تملو من ١٠ الى ١٠ سم. اوراقها بيضية شمشادية الشكل والتسج . ازهاره يستمر من ايار إلى حزيران .

٢١٧٨٤ - قُرْدُوبَة هَرْمِيَّة \*  
Amphipyra pyramides (S). Amphipyre pyramidal (F). Amphipyra pyramides (E).  
حشرة من فصيلة السقيات حشرليات الاجنحة . موطنها يشل معظم اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والناطق الداخلية المناخنة . قراشها واشعة قوتها رصيق الازهار . سرتها خاضعة تميش على اوراق الاشجار الوريفة || جسمها متوسط القند يطول نحو ٢٥ م. يسلها قراوح



قردوح



قرديس



قردوح



قردوبة هرمية



قردس الخيل

مسكها مدون القشار ، جيد الصنف ، شائع الاستعمال .  
لحمها متوسط الصنف مأكول . ويستخرج من كبدها  
زيت مرغوب فيه .



قُرَشِ أَسَهَتْ

٢١٧٩٤ - قُرْشُ شَالِك \* ، كَلْبُ بَعْرُ شَالِك  
*Squalus acanthias* (S). *Aiguillat* (F).  
*Picked dog-fish*, *Hound-fish*, *Spiny dog-fish* (E).

سمكة بحرية ولدت مفترسة من فصيلة القرشيات . اعطائها  
البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الأطلسي ||  
تعتبر من الاسماك البنية . مسرعا الاغواط والثقات ||  
جسمها وشي الشكل يطول نحو ١٢٠ سم . رأسها مخروطي  
الشذن ، معتدل التبطيط ، ذلق الخط المستدير الطرف .  
انسانها ثلاثية الصفوف ، متباينة الاشكال بين الفكين  
تكثر فيها الاطراف المشارية الحادة || ثوبها الى الطحلة  
السمراد يملوها موانع ازرق يبق عند الظهر . جانبها الى  
الطحلة الموحدة بالازرق تنبر مع الاقتراب من البطن  
الابيض || تتميز بانعدام الزعنفة الشرجية وبالمتمنص  
الصلب القرني الحادة الذي يستيق الزعنفة الظهرية الاولى  
والثانية || الاثني مثانة تقع في فصل الصيف نحو ٧٠  
جيرا || لحمها قاس ، كثير الالياف ، كامن الصنف .  
مسكها مغروب فيه ويستخرج من كبدها زيت جيد  
شائع الاستعمال .



قُرَشِ خَيْرِي



قُرَشِ شَالِك

٢١٧٩٥ - قُرْشَامُ \*  
*Hoplocampa* (S).  
*Hoplocampe* (F).

جنس حشرات صغيرة الغد من فصيلة المشاريات . انواعه  
المعروفة ١٦ جميعها وسيدة الجبل الحولي اثوابها ملونة  
تكثر فيها السرة . ورأسها شفاقة . رقاتها جلدية تركب  
الآثار وتطلى || أشهر انواعه وأضرعا قرشامة التفاح  
والاجاص والمخوخ .



قُرْشَامَةُ الْاجَاصِ

٢١٧٩٦ - قُرْشَامَةُ الْإِجَاصِ \*

*Hoplocampa brevis* (S). *Hoplocampe des polres* (F).  
*Pear sawfly* (E). *Birnensägegwespe* (D).

حشرة من القرشام طولا يراوح بين ٤ و ٥ سم . ثوبها  
حنطي اللون تملوه بقع سمر . ارجلها الى الصفار المايق  
اناثها تمتع المكن على زهر الاجاص فينتفخ من رقات  
دقيقة نحيلة تنخر الفرة عنه بدء تكوينها فتقرض البيض  
وتسبب الانعاص .



قُرْشَامَةُ التَّفَاحِ

٢١٧٩٧ - قُرْشَامَةُ التَّفَاحِ \*

*Hoplocampa testudina* (S). *Hoplocampe des pommes* (F). *Apple sawfly* (E). *Apfelsägegwespe* (D).

حشرة من القرشام . طولا يراوح بين ٦ و ٧ سم . رأسها  
ورزبانها وجوشها الى الصفرة تملوها رقة سوداء . بطها  
اسود اللون مطروق الى الاصفر || رقاتها حنطية شبراء الموانع ،  
كروية الرائحة تركب ثمار التفاح تقتردها سطحيا تحت  
القشور ثم تنقبها باتجاه الحزور .



قُرْشَامَةُ الْخَوْخ

٢١٧٩٨ - قُرْشَامَةُ الْخَوْخ \*

*Hoplocampa minuta* (S). *Hoplocampe des prunes* (F).  
*Plum sawfly* (E). *Schwarze Pflaumensägegwespe* (D).

حشرة من القرشام طولا يراوح بين ٤ و ٥ سم . ثوبها الى  
السرة السوداء . اناثها تمتع المكن داخل قشور الثمار  
فينتفخ من رقات دقيقة تنابع الثقب والنخر حتى يبلوغ  
العجبات .

الحارة || اصداؤها متشابهة ، مألوفة ، مزعجة ، شبه  
عمرسة الشكل ، ثنائية المصارع ، حادة المادة اللؤلؤية ||  
اعرف اجناسها واشهرها القرشة .

٢١٧٩٠ - قُرْشِيَّات  
*Simulilidae* (S). *Simulilids* (F). *Simulilidae*, *Sand flies*, *Buffalo gnats* (E).

فصيلة حشرات من ذرات الجناحين . اجناسها وانواعها  
كثيرة العدد عينة الاشارة . جميعها صغيرة الغد طولا  
يراوح بين ٢ و ٦ مم . اجناسها غليظة الشكل . خلية  
المرحاض المستعدة ، رؤوسها وجوشها كبيرة . قرونها  
الاستشارية قصيرة . ارجلها قوية ، ورأسها شفاقة  
كبيرة || ذكورها تميش حل رقيق الانوار . اناثها  
لاصمة بمنص الدم ، لديها مؤلم يلذي ، لهايا يبيع البشرة  
وقد يسبب حدة امراض ومجات تغلفها الحشرات من الاجسام  
المريضة الى السلية .

٢١٧٩١ - قُرْشُ ، كَوْسَجُ ، لَحْمُ ، بَيْسِكُ ،  
كَلْبُ الْبَحْرِ

*Squales* (S).  
*Requin* (F). *Shark* (E).  
جنس اسماك بحرية من فصيلة القرشيات . انواعه المعروفة  
٣٥ جميعها كبيرة الغد مستطيلة الشكل ، مفترسة لا تمر  
بشيء . الاصنعة باستانها الى شطرين .

٢١٧٩٢ - قُرْشُ أَسَهَتْ \*

*Centrophorus squamosus* (S). *Centrophore squameux*, *Requin chagrin* (F). *Porpoise* (E).

سمكة بحرية ولدت مفترسة من فصيلة القرشيات . اعطائها  
البحر الأبيض المتوسط . تعتبر من الاسماك البنية .  
مسرعا الاغواط والبجاج ولا تقترب من الجاهج الا نادرا  
جدا || جسمها وشي الشكل يطول نحو ١٥٠ سم . رأسها  
معتدل الجرم ، مستطيل الخطم الذلق . فها سفلي الزنكاز ،  
صغير الغد ، معتدل الشلق ، متباينة الانسان بين الفكين  
الموي والسفلي . ثوبها الى الطحلة السبورية الموانع يسمر  
ويبقى عند الظهر وينبر ويبيض عند البطن || تتميز  
بمسكها البعثر السهف الاثنياسي الحجم والترتيب وبانعدام  
الزعنفة الشرجية وبالمتمنص الصلب الصلب الذي يتقدم  
كل من الزنفتين الظهرين || الاثني مثانة تقع في فصل  
الصيف نحو ٧٠ جيرا || مسكها شائع الاستعمال . لحمها  
كامن الصنف قل من يربف فيه . ويستخرج من كبدها  
كية من الزيت الجيد .

٢١٧٩٣ - قُرْشُ خَيْرِي \*

*Oxynotus centrina* (S). *Centrâna*, *Humantin*,  
*Cochon de mer* (F). *Seahog* (E).

سمكة بحرية ولدت مفترسة من فصيلة القرشيات . اعطائها  
البحر الأبيض المتوسط || تعتبر من الاسماك البنية .  
مسرعا الاغواط واحالي الجاهج ولا تشاهد قرب الجاهج  
الا نادرا || جسمها شبه وشي الشكل ، مستمنص الخوض ،  
يطول نحو ١٢٠ سم . رأسها معتدل الجرم ، مبسط المقدم  
والخطم القصير . فها سفلي الزنكاز ، قصير الشذن  
العريض ، متباينة الانسان بين الفكين الموي والسفلي .  
اعكاسها الخيشوية خامية الفلوج الضيقة . ثوبها الى  
الحمرة القرميية تبق عند الظهر وتنبير عند البطن .  
زنفتها الظهرين شراطينا الشكل ، كبيرة الغد ||  
الاثني مثانة تقع في فصل الصيف نحو ٥٠ جيرا ||

للتوصلة الارتفاع . ساقه ليفية دقيقة فراء حادة الاوراق  
تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقه جلدية الالتصاق متراكبة ،  
نصلها شمع الصفحة الجامدة المقرضة الشائكة الاسنان.  
انزاعها عطرية التجميع ، تاجية ، زرقاء اللون || اوراقه  
ماكولة وقد تحلل .

#### ٢١٨٠٨ - قُرْصُكَة \* Cyclostoma (S).

Cyclostoma (F). Cyclostoma (E).  
جنس حيوانات برية من الرخويات مديات الارجل وفصيلة  
القرصيات . انواعها المرفوعة قليلة العدد منتشرة في  
معظم اقطار العالم || اشهر انواعها القرصقة المحددة  
(C. sulcatum) التي يكثر وجودها في معظم مناطق حوض  
البحر الابيض المتوسط . صدفها صغيرة ، بطينة ، حلزونية ،  
قصيرة العقب ، برتقالية اللون .

#### ٢١٨٠٩ - قُرْصُكِيَّات Cyclostomidae (S).

Cyclostomidae (F). Cyclostomidae (E).  
فصيلة حيوانات برية من الرخويات مديات الارجل  
امانيات الخياشيم وحيدات الاجزاء . اجناسها وانواعها  
للممارسة المرفوعة عديدة . جميعها برية تعيش على الارض  
في المواقع الرطبة || اصداؤها شبه خنزورية الشكل ،  
متبينة الحلزونية ، صغرة الاعقاب ، اسطوانية القواعد ،  
كلية الاسقاط || اعرف اجناسها واشهرها القرصقة .

#### ٢١٨١٠ - قُرْصُوع Cerianthus (S).

Cérianthe (F). Cerianthus (E).  
جنس حيوانات دنيا من المزهاريات وفصيلة القرصويات .  
انواعها المرفوعة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة  
والمعتدلة الحارة || مداخنها لحمية تنشب في رمال القاع  
حوالفها مستطيلة ، عصفية الشكل كاوراق التنبليات ||  
اشهر انواعها قرصوع المتوسط (Cérianthe de la Méditerranée).

#### ٢١٨١١ - قُرْصُوعِيَّات Ceriantidae (S).

Cérianthidés (F). Ceriantidae (E).  
فصيلة حيوانات دنيا من المزهاريات . اجناسها وانواعها  
عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || مداخنها اسطوانية ،  
مستطيلة ، هريالة او مغلقة ، تنتهي بحواف متعاقبة  
القراس || اعرف اجناسها واشهرها القرصوع .

#### ٢١٨١٢ - قُرْصِيّ Discoïde (F). Discoid (E).

نعت ترمي توصف به الاجسام القرصية الشكل كالثار  
وبغيرها .

#### ٢١٨١٣ - قُرْصِيَّات Discomycètes (F).

فصيلة الفطور القرصية تترف بالفشاريات ، اطلبها .

#### ٢١٨١٤ - قُرْصُ وَتَحَات Erosion

اغحات وجرف جزء من شي . سببه العوامل القارضة كالثاء  
التي تقرض التربة وتجرفها .

#### ٢١٨١٥ - قُرْصُ ، إِعَارَكَة ، عَارِيَة Prêt (F).

Lending (E).  
عقد يدفع به المرء الى غيره متقراض او عيأ او شيئاً معيناً  
ليستصله زمناً محدداً ثم يرده . ذائع القرض قارض او  
مير وآخذ مستقرض او مستعير .

#### ٢١٧٩٩ - قُرْشُوم Paederia (S). Pédérie (F).

جنس جنات عارضة ملتفة حمرة من فصيلة الميريات انواعه  
قليلة اصحابها البلاد الحارة . سورها تطول من ٤ الى ٦ امتار.  
اوراقها عابطة معقنة متعاقبة . نصلها بيضي الشكل ، ذات  
الزام الاخير وهو خلي الصلصة السفل ، كره الرائحة  
عند البس . انزاعها عطرية التجميع ، حلبي البشرة ،  
كرمية الرائحة ، انابيها وردية اللون ، ابواقها الى البياض  
الاخضر المراح .

#### ٢١٨٠٠ - قُرْشِيَّات Squalidae (S).

Squalidés (F). Squalidae (E).  
فصيلة اسماك مفترسة من رتبة الاشلاخ . اجناسها وانواعها  
عديدة . اجسامها مستطيلة وشبه الشكل . اصحابها ذلقة ،  
شابة . اسنانها حادة منشارية تقطع كل شي . زعانفها  
كبيرة . اصحابها بحار البلاد الحارة وقد تجوب اعوار الانهر  
العميقة النور .

#### ٢١٨٠١ - قُرْصُ Gaura, Rayon (F).

Honeycomb (E).  
عمدة غرايوس السطح الواحد في خلية النحل .

#### ٢١٨٠٢ - قُرْصُ Placemnt (F). Nipping (E).

هو القرمز اي قطع رؤوس الانضغان او الانثان القوية .

#### ٢١٨٠٣ - قُرْصَاق Renard corsac (F).

هو الثعلب القشري ، اطلبه .

#### ٢١٨٠٤ - قُرْصَانَة Myletes (S). Mylète (F).

جنس اسماك ثورية من مفتوحات اللسان وفصيلة القرصانيات  
انواعها المرفوعة خمسة منها نومان بيشان في انهر الهند  
وسيام وبنغال وثلثة انواع تعيش في انهر امريكا  
الاستوائية || اجسامها متوسطة القد ، بيضية اللون ،  
مسطحة ، تطول من ١٨ الى ٢٤ سم. رؤوسها صغيرة .  
زعانفها الظهرية كبيرة وريمية يتبعها زعنفتان شحمية  
صغيرة . زعانفها الشرجية مستطيلة مقعرة . زعانفها الذيلية  
منفرجة القوس ، قريبة الشبه بالحلل . اثوابها الى الخصار  
الاطحل المتفاوت المابجات || لحومها ماكولة ، متوسطة  
الصنف .

#### ٢١٨٠٥ - قُرْصَانِيَّات Characidae (S).

Characidae, Characinidae (F). Characidae (E).  
فصيلة اسماك ثورية من مفتوحات اللسان . اجناسها وانواعها  
المرفوعة عديدة اصحابها انهر وبحيرات المناطق الاستوائية  
الاسيوية والافريقية والامريكية || اجسامها لاقياسية  
الشكل والقد . حراشفها صغيرة متراكبة . رؤوسها هريالة  
فكرها مرصوفة الاسنان الصغيرة الحادة . زعانفها الظهرية  
والذيلية لانفاضة || اعرف اجناسها واشهرها القرصانة  
والمرقود والمسين والبشوش والوقوف .

#### ٢١٨٠٦ - قُرْصَة Scrofolaire du désert (F).

هي خنازيرة الصحراء ، اطلبها .

#### ٢١٨٠٧ - قُرْصَنَة \* ، قُرْصَعَتِي ، شُوك Eryngium creticum (S).

Eryngium creticum (S). Eryngie, Panicaud de Crète (F). Field eryngo (E). Feldmannstren (D). Eringio (I).  
نوع من الشنداب وهو نبات حشيشي بري يكثر في الجبال



قرصنة



قرصة



قرصع



قرط



قرط مور



قرطب الاربع



قرطب البطة



قرطب الدجاج

٢١٨٢٦ - قَرَطُ ، قَرَصُ ، جَتَمَ Pincement (F).  
Nipping (E).

تقطع رؤوس الاغصان او الانداد أو الانثان .

٢١٨٢٧ - قَرَطُ مَوْزُ \* ، طَرَحَ مَوْزُ Régime de bananes (F). Bunch of bananas, Cluster of bananas (E).

هو السنبلة الثمرية المشطية المتتابعة المتدلية التي يتألف منها حل الموزة .

Melampyrum (S).

Melampyre (F).

جنس نباتات برية حشوية حولية من فصيلة الحمازريات. أنواعه ٦ جميعها اشباب متصبية غدا . اوراقها سنانية او خطية النصل . ازهارها صفراء اللون او بنفسجية . اشهرها واضرها قُرْبُ الزرع .

٢١٨٢٩ - قَرَطُ الزَّرْعُ \* Melampyrum arvense (S). Melampyre des champs, Blé-de-vache, Cornette, Queue de loup, Queue de renard, Rougeole (F). Purple cow-wheat (E). Roter Wachtelweizen (D). Melampiro, Grano di vacca, Coda di volpe (I).

نوع من القُرْبِ يعتبر من النباتات الضارة لانه يكثر في زروع الحنطة فينبش جنوده في جنودها ويقضمها الغذاء . يزوره الى السرة ، دقيقها احمر اللون سر الطعم .

٢١٨٣٠ - قَرَطِيعَ Ménopon (F). Menopon (E).

جنس حشرات جلدية من فصيلة القرطيات . انواعه نحو ٦٠ جميعها مؤذية تركيب اللابير قضيهه || امرف انواعه واضرها الثلاثة التالية .

٢١٨٣١ - قَرَطِيعَ الْاَوَّزِ Ménopon pectinatum (S). Ménopon des oies (F).

نوع و القرط وهو حشرة صغيرة القد طويلا يراوح بين ١ الى ٢ سم . رأسها مستعرض الشكل ، مقعر الفخف . ثوبها الى الربعة يملحها قوسم اشقر . تركيب الاوز وتؤذيه .

٢١٨٣٢ - قَرَطِيعَ الْبِطَةِ Trinoton anserinum (S). Trinoton des canards (F).

نوع من القرط يركب البط فيؤذيه . جسمه الى الربعة السمره بطول من ٤ الى ٥ سم . رأسه مثلي الزوايا المستديرة . جوشه وبطه متساويان في الطول والشكل ، ترجاب بطه بجلدة بالحنطي .

٢١٨٣٣ - قَرَطِيعَ الدَّجَاجِ Ménopon gallinae (S). Ménopon des poules (F).

نوع من القرط وهو حشرة صغيرة القد طويلا نحو ٢ سم . جسمها اهلبيجي الشكل ، كثيف الحب البقيق . رأسها محدد العمود ، مقعر الفخف ، دبابي الحب المستطيل . ثوبها الى الربعة الصفراء المواج || تركيب جميع الطيور الدابجة اغصها الدجاج .

٢١٨٣٤ - قَرَطِيعِيَّاتَ Ménoponidae (F). Ménoponidés (E).

فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلديات . اجناسها وازناسها عديدة جميعها صغيرة القد اجسامها مفلطحة ، بيضية الشكل او اهلبيجية . طويلا يراوح بين ١ و ٦ سم . رؤوسها مستديرة او مثثة الزوايا . ارساغها مستطيلة خادشة .

Emprunt (F).

Borrowing (E).

عقد تبرم به صفقة قانونية يدفع بمقتضاها عادة مبلغ من المال او اي شيء آخر الى أحد طرفيه الذي يصبح مدينا به بشرط يتفق عليها . والقرض اشكال منها :

Emprunt forcé (F).

Forced borrowing (E).

Emprunt à long terme (F).

Long-dated borrowing (E).

Emprunt à court terme (F).

Short-dated borrowing (E).

Emprunt consolidé (F).

Funded borrowing (E).

Emprunt amortissable (F).

Redeemable borrowing (E).

٢١٨١٦ - قَرِضٌ ، صِلْفَةٌ

عقد تبرم به صفقة قانونية يدفع بمقتضاها عادة مبلغ من المال او اي شيء آخر الى أحد طرفيه الذي يصبح مدينا به بشرط يتفق عليها . والقرض اشكال منها :

قرض جبري أو إلزامي

قرض طويل الأجل

قرض قصير الأجل

قرض مضمون

قرض مقدور الاستهلاك

قرض قابل مالهك منها .

٢١٨١٧ - قَرِضُ الْمُخَامَرَةِ Prêt à la grosse aventure (F). Bottomry lending (E).

قرض يسري حل اشياء معرضة لاختطاف البحر . شرطه انه اذا هلكت هذه الاشياء كلياً او جزئياً كان المقرض في حل من رد مقابل ما هلك منها .

Prêt à intérêt (F).

Lending in interest (E).

نوع من انواع الاعارة الا انه يعاقب اي ان المستير يدفع للامير فائدة قدرها ما جرى عليه الاتفاق .

Crédit agricole (F).

٢١٨١٩ - قَرِضُ زَرْاعِيّ هو التسليل الزراعي .

٢١٨٢٠ - قَرِصَابُ Xérophage (F).

Xerophagous (E).

نعت تعريفي يطلق على الحيوانات والحشرات التي تعيش على المواد الجافة .

٢١٨٢١ - قَرِصَبُ

ما يبقى في الغريال رمى به مع الرذالة .

٢١٨٢٢ - قَرِصِيمُ قشر الريان يستعمل في الدباغة .

٢١٨٢٣ - قَرِصِيَّةُ

القرصنة ج . قرصه . من غريب شجر البر شكك ولوناً زهره اشد صفرة من الورس . قال ابو حنيفة : « القرصي » شلق بالشجر وينبت في اصل السرة والقرط وزهره اشد صفرة من الورس وورقه لطاف رقاق .

٢١٨٢٤ - قَرِصُ \* ، ثَوْمُ مُعَصَّر Allium schaeenoprasum (S). Ciboulette, Cive (F).

نبات دوفسي معمر من فصيلة الزنبقيات . فصوصه خلبية اشكل غليظة . اوراقه قرصية الانتساب . دقيقة ، ضيقة ، جواء النصل ، متصبية ، تعلو نحو ٢٠ سم . شماريح ازهرية تعلو نحو ٣٠ سم . ازهارها حمراء اللون ، هامية الانكسار ، صويالية التجميع .

٢١٨٢٥ - ثُرُوبُ

Mélioit à petites fleurs (F).

هو الحنطاري الصغير الزهر . نبات مرجوي تتخلفه الدواب بشوة .

Panellus (S).

٢١٨٤٢ - قَرْطُوب

Panellie (F). Panellus (E).

جنس فطور من فصيلة السيات. أنواعه المعروفة قليلة العدد أصلها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة. جميعها تتركب جلود الأجبار وأغصانها دون أن تؤذيها. تتميز بسموها القصيرة وبثقلها الفارسة، المكثفة الاطراف، الدبقة أو الحليمة السطح || أعرف أنواعه وأشهرها القربوب الحلو والقربوب المشخار.

٢١٨٤٣ - قَرْطُوب حَلْو \*  
Panellus melleus (S).  
Panelle douce (F).

نوع من القربوب. يعيش على جلود الصنوبر دون أن يؤذيها. مجموعته لا تقتل من ثلاث وحدات ولا تتجاوز السبع. ساقه شديدة القصر. نكتته غائرة لزجة دايدة مكثفة الاطراف، طحلا الذي كالساق، قطرها يراوح من ١ إلى ٢ سم. أطراسه دقيقة، حلالية المادة || حيث كانت الصنف غير مرغوب فيها.

٢١٨٤٤ - قَرْطُوب مِشْخَار \*

Panellus serotinus (S). Panelle tardive (F).

نوع من القربوب. يعيش على جلود وأغصان الأشجار المرونة إخصها السنديان. مجموعته تتألف من ثلاث إلى خمس وحدات. ساقه شديدة القصر. نكتته غائرة، مكثفة الاطراف، حلالية السطح في أول عهدها ثم لزجة. قطرها نحو ٢ سم. لونها إلى الطحلة الصفراء الخضراء المواج || لحية كانت الصنف غير مرغوب فيها.

٢١٨٤٥ - قَرْطُوبَزَة \*  
Cortusa (S).

Cortuse (F). Cortusa (E).

نبات عشبي معمر من فصيلة الربيديات. معقود التعريف على اسم العلامة «قربوزي»، منبها بعض جبال الشرق الأدنى وأروبة. أرواقها جذرية الانشطار، معنقة، كبيرة القد، مفصصة وسننة الخمار. أزهارها شبه صيواني التجميع، يتركز على سراج يرتفع من ١٥ إلى ٢٥ سم. أزهارها صغيرة القد، وردية اللون، صغيرة المحاليل || تنويرها يستمر من حزيران إلى تموز.

٢١٨٤٦ - قَرْطُوط \*  
Euchoreutes (S).

Euchoreute (F).

حيوان لين قاضم وحيد الجنس والنوع من فصيلة البيربويات موطنه يمتد من إيران إلى تركستان || جسمه صغير القد يتميز باستطالة أذنيه وأصابعه الخلفيتين. أما ذنبه فيبلغ للذكر. قويه إلى الشهية يعلوها مواج اشعث يسير في الرأس والظهر ويشقر في الصدر والبطن، ذنبه أسود الزام الأخير الذي ينتهي بالابيض.

٢١٨٤٧ - قَرْط \*  
Acacia sbrakeue (F).

هو السط العربي الواحدة قرطة.

٢١٨٤٨ - قَرْع \*  
Teigne (F). Tinea (E).

حليل جلدية مختلفة تصيب الحيوانات والطيور الداجنة فتقتفي على أصوافها ووبرها وريشها. أسبابها فطور مجهرية تتركب الجلد وبصل الشعر والريش.

٢١٨٤٩ - قَرْع البَقَر \*  
Teigne des bovins (F).

Cattle tinea (E).

نوع من القرع يركب وروش البقر وأغصانها.

أنواعها تختلف باختلاف الاجناس والانواع يكثر فيها الرمادي الاسفر المواج.

٢١٨٣٥ - قَرْطُف بقلة وقيل ثمرة الرث.

٢١٨٣٦ - قَرْطُف، قَرْطُف، إِحْرِيش، بَهْرَم، بَهْرَمَان، مَرْيَق

Carchamus (S).

Carchame, Cartame (F).

جنس نباتات عشبية وجنية، برية وزراعية، طبية وصيافية من سبط الميثرات وفصيلة المركبات. أنواعه عديدة منها الحولية والحرية والمصرة. سوقها منتصبة. أرواقها متعاقبة مستطيلة لا تخلو من الحنف. أزهارها نارية اللون، سرشفية التركيب. بزورها مضطمة بيضاء اللون طيبة يستخرج منها مادة زيتية تستعمل لعلاج داء المفاصل. أعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع.

٢١٨٣٧ - قَرْطُف الصَّبَاغِين \*، تَرْيَاف، عَصْفُور  
Carchamus tinctorius (S). Carchame officinal, C. des teinturiers, Safran bâtard, S. d'Allemagne (F).  
Safflower, Bastard saffron, Falsa saffron (E). Färb-safflor, Bastardsafran (D). Cartamo officinale, Croco bastardo, Zafferano falso (I).

نوع من القرم الحولي أو الحول يزوع للترسين أو لاستخراج القرمطين، مادته الفعالة الصيافية الصفراء اللون. ساقه منتصبة مرسة تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. أرواقه يفيضة الشكل مستطيلة الزام الأخير. نصلها بارز المرق، سن الحافة، قصير الحنف. أزهاره برتقالية اللون ذهبية المواج || أزهاره يستمر من تموز إلى أيلول.

٢١٨٣٨ - قَرْطُف بَرِّي \*، قَرْطُف صَوْبِي، شَوَكْرِب عَشْتَر

Carchamus lanatus, Kentrophylum lanatus (S). Carchame laineux, Chardon jaune, Kentrophylle (F). Woolly safflower, Distaff thistle (E). Wolliges Spornblatt (D). Cartamo lanoso, Ceeceprete, Scardicione salvatico (I).

نوع من القرم الحولي البري الطيب. ساقه منتصبة زياء تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. عصارها حراء اللون، كرسية الرائحة، حيلة الخضاب الزاهي. أرواقه مفترقة، نصلها غدي الصفعة، لرج البثرة. أزهاره إلى الصفار البرتقالي. أزهاره يستمر من تموز إلى آب.

٢١٨٣٩ - قَرْطُف جَنْسِي \*

Carchamus arborescens (S). Carchame arborescent (F).

نوع من القرم البروتي المعمر. جنينه تملو نحو ٢٠٠ سم. ساقها مخشوشة. أرواقها سنانية مستعرضة الفاعلة. نصلها جبل الخضاب الزاهي، سن الحافة الشاذكة. أزهارها إلى الصفرة الوردية المواج || أزهاره يستمر طوال شهر آب.

٢١٨٤٠ - قَرْطُومَان \*  
Avoine cultivée (F).

هو الحنظل الزراعي، اطله.

٢١٨٤١ - قَرْطُوب \*

Orang-utan malle (F).

He orang-utan (E).

ذكر السامي ارتفاعه واقفاً على رجليه يراوح بين ١١٨ و ١٢٢ سم.



قَرْطُف الصَّبَاغِين



قَرْطُف بَرِّي



قَرْطُوب حَلْو



قَرْطُوب مِشْخَار



قَرْطُوب

## ٢١٨٥٧ - قرع طويل \* ، ذبء ، كرتيب ، صرغ

Lagenaria vulgaris (S). Calebasse, Gourde, Bouteille, Courge d'ornement (F). Bottle-gourd, Calabash cucumber (E). Echter Flaschenkürbis (D). Zucca lunga, Z. bottiglia, Z. fiasco (I).

نوع من القرع الحولي ، ضروب عديدة منها البرية والزراعية المأكلة والتزيينية . سيقه مدادة حارسة . أوراقه كبيرة اللد لاقياسة التفصيص والتفريش . ثماره مخنقة الاشكال والأحجام منها الايطالية والمغلطة والبرمية والقارورية والمردنية ، الخ .



قرع اسود البزور

## ٢١٨٥٨ - قرع كبير \* ، يقطين مصنع

Cucurbita maxima (S). Potiron, Clerouille, Grosse courge (F). Large gourd, Spanish gourd, Winter squash (E). Speisekürbis (D). Popone, Cetrinollo, Zucca potirona (I).

ويدعى قرع حلو وقرع مالح . نوع من القرع الزراعي المشهور . ضروبه عديدة أوزنها قدر واشكال ثمارها الصخنة المستديرة المغلطة التي يراعى قطرها بين ٢٥ و ١٠٠ سم . وزنها من ٤ الى ٦٠ كيلو . لبها جامد المكسر حادم الالياف يحوي نحو :

- ٩٥,٦٠ ٪ من الماء
- ١٧,٠ ٪ من المواد الاثرية
- ١٢,٠ ٪ من المواد الدهنية
- ٢,٦٧ ٪ من المواد الاستخلاصية



قرع دوبي

## ٢١٨٥٩ - قرع مسكي \* ،

Cucurbita moschata (S). Courge musquée, Carabacette (F). Musky gourd (E). Moschuskürbis, Bismuskürbis (D). Cetriolo muschiato (I).

نوع من القرع الزراعي الشائع الاستعمال . ضروبه عديدة . سيقه مدادة طويلة . أوراقه مستديرة ، خلية النصل ، لاقياسة التفريش . ثماره مستديرة مخنقة الوسط يبلغ طولها في بعض الضروب نحو ١٠٠ سم . وزنها ٢٥ كيلو . لبها اصفر اللون ، قابل الالياف ، مسكي الرائحة .



قرع طويل

## ٢١٨٦٠ - قرعاه

Céraste (F).

هي الحادية من اعشب الحيات .



قرع كبير

## ٢١٨٦١ - قرع عليل

« دوبة عريضة محيطية الظهر والبطن (السان) .

## ٢١٨٦٢ - قرع ، يقطين

Citrouille, Courge (F). Pumpkin, Gourd (E).

هي ثمرة القرع أو اليقطين اشكالها واحجامها متباينة تختلف باختلاف النوع .

## ٢١٨٦٣ - قرع عوس ، قرع عوس ، قرع عوس

هو الفالغ جل ذو ستدين .

## ٢١٨٦٤ - قرع

Pépoulière (F). Pepo (E).

نمت وصفي يدل على ما شكله شكل القرع المستدير .



قرع مسكي

## ٢١٨٦٥ - قرعيات ، يقطينيات

Cucurbitaceae (S). Cucurbitacées (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القنات : اجناسها وانواعها كثيرة العدد . سيقها مدادة او حارسة . أوراقها متعاقبة ، سواقتها متشعبة . ازهارها وبرتة المسكن ، خالصة الاكام . ثمارها لبانية مخنقة الاشكال والاحجام . اشهر انواعها القرع والبطيخ والتام والخيتر والقشاة والحظيل ، الخ .

## ٢١٨٥٠ - قرع الخيل

Teigne du cheval (F). Horse tinea (F).

نوع من القرع يركب صهوة الفرس وسقته وكفله .

## ٢١٨٥١ - قرع الغنم

Teigne du mouton (F). Sheep tinea (E).

نوع من القرع يركب انسان والماعز فيسبب احمالها اسوانها وقد يمتدحك غالباً في امتثالها .

## ٢١٨٥٢ - قرع شهدي

Telgne faveuse (F). Tinea fava (E).

نوع من القرع يركب الطير والارانب والسنابر والكلاب .

## ٢١٨٥٣ - قرع ، يقطين

Cucurbita (S). Courge (F). Gourd (E).

جنس نباتات حولية او معمرة من فصيلة القرعيات . انواعه عديدة . سيقها مستديرة مدادة او حارسة . أوراقها مخنقة كبيرة اللد متشعبة الزناد الاجوف . نصلها قلبي القاعدة لاقياس التفصيص . سواقتها متشعبة . ازهارها وحيدة المسكن ، كبيرة اللد ، صفراء اللون . ثمارها مخنقة الاشكال والاحجام || اشهر انواعها الزراعية ، للمأكلة الباز ، ما يتبع .

## ٢١٨٥٤ - قرع اسود البزور \*

Cucurbita ficifolia (S). Courge à graines noires (F).

نوع من القرع الزراعي المعمر . ساقه لينة ، دقيقة ، مستديرة ، حارسة ، فراء . أوراقه خالصة التفصيص ، نصلها عايق الخصار يولد تمشج وتشيخ اصفر . ثماره بيضية الشكل كابطيخ خشوها صلبة خضراء اللون تملوها رقة بيضاء . لبها ابيض اللون كثير الالياف متوسط تركيبه يشمل :

- ٩٥,٦٠ ٪ من الماء
- ٢٢,٢ ٪ من المواد الدهنية
- ١٤,٣ ٪ من المواد الاثرية
- ١٠,٦ ٪ من السليولوز
- ٩,٣٤ ٪ من الرماد
- ٥,٩٥ ٪ من المواد الاستخلاصية

زوده سوية اللون الاسود لبها يحوي ما قدره

- ٢٣,٨٠ ٪ من المواد الدهنية
- ١٨,٩٥ ٪ من المواد الاثرية

## ٢١٨٥٥ - قرع الحشيش

Trichosanthe (F).

جنس نباتات مدادة حارسة من فصيلة القرعيات . انواعه نحو ٣٠ معظمها حولي وبعضها معمر . اعطائها البلاد الاسيوية الحارة ويصنف مناطق استراليا . سيقها عشية او لينة مستديرة . أوراقها كبيرة متشعبة . ازهارها عديدة البتلات . ثمارها وزورها لاقياسة الشكل والحجم . اشهر انواعها القشاة النباتية ، اطباها .

## ٢١٨٥٦ - قرع رومي \* ، قرع مغربي ، عمامة

Cucurbita pepo (S). Courge pépon, Giraumon, Courgeron (F). Pumpkin, Gourd (E). Schmuckkürbis (D). Giraumonte. Zucca Indiana (I).

نوع من القرع الزراعي ضروبه عديدة منها المكور والمستدير والمسطيل والتمشي والصنبر والكبير والمالسي والفصل وأخند || لباب ثماره جيد الصنف عمام الالياف .

المواج . ازهارها حليق التجميع . محوري وطرفي الازتكاز . ثمارها عنبية ، لاصقة التخت واللحم ، لذينة الطعم ، قطرها نحو ١٠ م . || قرفها سمراء اللون . غبراء المواج ، جيدة الصنف . يستخرج منها ومن الاوراق والازهار وآثار طيوب وادهان فاعرة .

٢١٨٧٤ - قَرْفَة كَذَابَة (F). *Fausse cannelle*.  
هي دريس بجلاف ، اطليه .

٢١٨٧٥ - قَرْفَة مَلَبَار \* ، سَادَج (F). *Cinnamomum citrodorum* (S). *Cannelier de Malabar* (F). *Malabar cinnamon* (E). *Malabarscher Zimmetbaum* (D). *Cannella di Malabar* (I).

شجرة زراعية من الافاوية . مهدا بلاد ملبار وقد انتشرت زراعتها في جزر الزانج وغيرها من جزر المحيط الهادي . ثمرتها صغيرة اللد ، فراء . يستخرج منها اجود الطيوب والادهان . اما قرفها فنادية .

٢١٨٧٦ - قَرْفَينِيَّة (F). *Caryophyllia* (S).  
هي الغلوبس الفلسطيني ، اطليه .

٢١٨٧٧ - قَرْفُول \* (F). *Caryophyllie* (F).  
جنس حويئات بحرية من الرجان عنية المدافع ، مستطيرة الثريجات المفردة || اشهر انواعه القرفول الجامي (C. cyanthus) الذي يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط .

٢١٨٧٨ - قَرْفِيَّات (F). *Cannellaceae* (S). *Cannellacées* (F).  
فئة من فصيلة الناريات تشمل القرفة والبيلون وغيرها .

٢١٨٧٩ - قَرْفِيَّات (F). *Manidae* (S). *Manidés* (F).  
فصيلة حيوانات من الدرد اجناسها وانواعها عديدة اعرفها ام قرفة .

٢١٨٨٠ - قَرْقُ (F). *Gloussement* (F). *Clucking* (E).  
صوت للدجاجة عندما تدعو فراخها .

٢١٨٨١ - قَرْقُ (F). *Liège* (F).  
هو القلين ، اطليه .

٢١٨٨٢ - قَرْبُ (F). *Mésange* (F).  
هو القرقفت جنس طير من الجروام .

٢١٨٨٣ - قَرْقَد (F). *Apocyn* (F).  
هو القروش ، اطليه .

٢١٨٨٤ - قَرْقَدَان (F). *Guimauve jaune* (F).  
هو الابوتيلان الاسرح ، اطليه .

٢١٨٨٥ - قَرْقَدَن ، قَرْقَدُون ، قَرْقَضُون ،

جَرْدَة سِنْجَالِي (F). *Myoxos* (S). *Loir* (F). *Dormouse* (E). *Siebenschläfer*, *Bilch* (D).  
جنس حيوانات قانسة من فصيلة القرقديات ، افروشا قليلة . اجسامها صغيرة اللد مسطيلة . اذناها سوية اللون . اذنانها جيلات الصفوف . رؤوسها اسطوانية للشكل . سالها طويلة قاسية . عيونها كبيرة . اذناها مستدرة رصية . تسرح في الليل . تتسلق الاشجار . قوتها النار والبالوط

٢١٨٦٦ - قَرْف (F). *Ecimage* (F).  
هو الصنف ، اطليه .

٢١٨٦٧ - قَرْف (F). *Ecorce* (F). *Bark* (E).  
لحاء الشجر ، وكل قشر قرف منه قرف الرمان .

٢١٨٦٨ - قَرْف الزَوَائِد ، تَقْرِيف (F). *Epamprage* (F). *Lopping off*, *Pruning* (E).  
تقليم الفصينات او السروع الزائدة في الكرومة .

٢١٨٦٩ - قَرْفَة (F). *Brou* (F). *Husk*, *Peel* (E).  
هي غلاف صمغ الشرة قبل جفافه او عند انفصاله بعد تمام الجفاف .

٢١٨٧٠ - قَرْفَة (F). *Cannella*, *Cannelier* (F). *Cinnamon-tree* (E).  
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من القرفيات وفصيلة القناريات . انواعه عديدة منها بلاد الاسيرية . سوقها منتصبه فراء . اوراقها ابيدة متقة . ازهارها صغيرة اللد لاقياسية التجميع والازتكاز || جميعها من الافاوية

ازهارها وثمارها واوراقها ولحاء سوقها وفروعها وجنودها عطرية للمادة ، لذنة الطعم . يستخرج منها طيوب وادهان طيارة شائلة الاستعمال الطبي . وهي تقيده الملحة والكبد ، تلبه الاصاب وتقشها وتنهش بها . وين منافها انها مضافة للتشع . اشهر انواعها ما يلي .

٢١٨٧١ - قَرْفَة بَيْضَاء (F). *Cannelle blanche* (F). *Canella* (E).  
هي البيلون ، اطليه .

٢١٨٧٢ - قَرْفَة مَرْتَدِب \* ، قَرْفَة سِيلَان ، دَارَصِينِي (F). *Cinnamomum Zeylanicum* (S). *Cannelier de Ceylan*, *Cinnamome* (F). *Common cinnamon tree*, *Cinnamon* (E). *Zimmetbaum*, *Zimmet*, *Zimmetrinde*, *Kaneel* (D). *Cannella*, *C. del Ceylan*, *Cinnamo* (I).

شجرة زراعية من الافاوية مهدا سريندي (سيلان) ساقها منتصبه فراء تملو نحو ١٠ اطار . فروعها متعاقبة الانتشاب ، مستقيمة الزوايا ، اوراقها متقة ، متعاقبة ، بيضية الشكل ، ابيدة ، تلتصها جامد النسيج ، مالمش البشرة . اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى ، ثلاثي المروق الرئيسية || ازهارها صغيرة اللد ، غبراء اللون ، عديدة الالامدية ، سداسية البلات . ازهارها عقودية التجميع ، تاجي الازتكاز . ثمارها عنبية لاصقة التخت واللحم . جمع اصفاء الشجرة عطرية تستخرج منها الطيوب والادهان اما لحاء السوق والفروع فتصبر من الافاوية الفاعرة الصنف .

٢١٨٧٣ - قَرْفَة صِينِيَّة \* ، دَارَصُون ، سَكِيحَة تَجَب (F). *Cinnamomum obtusifolium*, *C. cassia* (S). *Cannelier casse*, *C. de Chine*, *C. d'Annam*, *C. du Tonkin*, *Laurier casse* (F). *Chinese cinnamon tree*, *Cassia tree* (E). *Kassien Zimmetbaum* (D). *Cinnamo cassia*, *Lauro cassia*, *Cassia lignea* (I).

شجرة زراعية من الافاوية . اصلها فسيحة الارتداء تمتد من الالام الى الصين ويتنحى حتى ارتفاع ٢٠٠٠ م . من سطح البحر || ساقها منتصبه تملو من ١٣ الى ١٧ م . اوراقها ابيدة اهليجية متعاقبة متقة . تلتصها جامد الصفحة ، ثلاثي المروق الرئيسية . لونه الى الاخضر البعري || ازهارها صغيرة اللد لونها الى البياض الاخضر



قرفة سرنديب



قرفة صينية



قرفة ملبار



قرفول



قِرْقَدُنُ الْبَلُوط



قِرْقَدُنُ شَائِع



قِرْقُدُنُ



قِرْقُدَةُ اَبْرَةِ الشَّكْلِ



قِرْقُدَةُ الْمُنْتَطَب



قِرْقُدُ اَزْرَق

شديد الصغر و متكاثف الحلب و يطول من ٢ الى ٣ م. ثوبها الى الكسله. زباناها مطوكان بالاسود والابيض. روثناها كبير القند و متكاثف الخمل || ظهور الحشرة الجلجلة لا ينقطع طراول السه و هي مبالوة في كل مكان من القبايات الى المساكن المألولة || الاثني اكبر قنداً من الذكر. تمنع مكنتها في كل مكان مظلم رطب. ينقث المكان يد منه ياسيسون و يقرات مستطيلة و سطلة المقدم والمؤخر و سطلة الاذن و حلبة الجسد والرأس والنشرج || تعيش على المواد النباتية المتحللة حتى الاكادام.

### ٢١٨٩٥ - قِرْقُدَةُ الْمُنْتَطَب

*Phlebotomus papatasi* (S).  
*Phlebotomus papatasi* (F).

حشرة من ذوات الجناحين وفضيلة القرقصات. جسمها صغير الحجم و يطول من ٢ الى ٣ م. ثوبها الى الصفار الباهت و غلي القشاد. رأسها مخروطي الشكل و خطها معتدل القند. صدرها بيضي القالب. بطنها اسطواني. زباناها كثيفا الحلب النقي. صنها صغيرتان. روثناها كبيران و مهيان || تظهر الحشرة الجلجلة من نيسان الى تشرين الثاني. تألف جميع المواقع الرطبة والمسطحة الرملية. تسرح في الليل وتختفي في النهار وراء كل شيء لانها تخشى وقع النور || تمنع الاثني مكنتها في كل مكان مظلم رطب وتحت الانقاض والحجارة. ينقث المكان يد منه بمدة اربعون من لسبونين الى ثلاثة || البقرة مستطيلة و شبه اسطوانية الشكل و حلبة الحيد. فبراه القرن و صمراه الرأس و يطوها في مخزوها زوج من الحلب الجلجلة المستطيل. تعيش على المواد النباتية المتحللة حتى الاكادام.

### ٢١٨٩٦ - قِرْقُدَاتُ سَكَبَاتِ

*Psychodidae* (S). *Psychodidae* (F). *Psychodidae* (E). فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القند زباد الجسم والرواشن والقرون الاستشعادية || اشهر اجناسها القرقس.

*Loir* (F).

### ٢١٨٩٧ - قِرْقَدُنُ

هو القرقدن و الحلبه.

### ٢١٨٩٨ - قِرْقُدُ ، قِرْقُدُ ، قِرْقُدُ

*Parus* (S).

*Mésange* (F). *Tite* (E).

جنس طير من فصيلة القرقنيات انواعه كثيرة العدد اعطاهها العالم. اجناسها صغيرة القند. متناظرة ظاهريا غريبة الشكل و جالسة و قصيرة و قوية. اجنسها متوسطة القند. اذانها مقطوعة او فارقة. ارساغها صغيرة حسنة الجلد || تألف القبايات والحالات. قوتها الحشرات وكميات وبقاياها والبروز البرية والنار || اناثها تخضع مرتين في العام، الاولى في نيسان والثانية في تموز. عدد بيض الحفنة اراوح بين ٦ و ١٦ اما الترسيم فيستمر من ١٤ الى ١٥ يوما. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

*Parus corulaceus* (S).

*Mésange bleue*, *M. azuree* (F). *Blue titmouse* (E).

نوع من القرقن، طوله اراوح بين ١١ و ١٢ سم. ثوبه جميل الالوان. قة رأسه وجناحاه وذنبه الى الزرقة السنجونية يطوها في الجناحين يتجيج ابيض. ظهوره زيتوني و بطنه اصفر و صمراه الى البياض الناصع. طوقه صفه اسود اللون ازرق الخواج || وهو طائر ابد يالفت الاسراج والحالات والجنان.

والجزر والبنلق والكسنة وبيوض المصالب... || اجناسها اركان تربتها بين شقوق الصخور او في صدور الاشجار. اناثها تضع من ١ الى ٦ ادراس تبصر وتكتسي بعد اسبوع وترضع نحو الشهر || اعرف انواعها ما يلي.

### ٢١٨٩٩ - قِرْقَدُنُ الْبَلُوط

*Myoxus nitedula* (S). *Loir dryade* (F).

نوع من القرقدن طوله نحو ١٥ سم. وذنبه ٨. ظهوره اولد اصفر. بطنه ابيض افسر || موطنه يمتد من الصبح الى اربعة. يالفت اسراج السديان لان ركيزة قوته البلوط.

### ٢١٨٩٧ - قِرْقَدُنُ اَبْيَق

*Myoxus elegans* (S).

*Loir elegant* (F).

نوع من القرقدن، موطنه اليابان، طوله نحو ١٥ سم. وذنبه ٤. ثوبه الى الصبغة السناوية يميل مع اقترابه من تيج النهار. رأسه جزوي المواج، بطنه وسوئي جراسه الى الصفرة || قوته النار على احتلاها.

### ٢١٨٩٨ - قِرْقَدُنُ شَائِع

*Myoxus glis* (S). *Loir commun* (F).

نوع من القرقدن. طوله نحو ١٦ سم. وذنبه ١٤. يظهر الى الصبغة الزبداء يطوها مواج اسود. بطنه وسوئي جراسه الى البياض القضي. خداه وصفه واسفل ذنبه بيض. موطنه صبح الارياض يمتد من الشرق الى اطراف اربعة. يوجد في لبنان وسورية.

### ٢١٨٩٩ - قِرْقَدَاتُ ، قِرْقَدُونَاتُ

*Myoxidae* (S). *Myoxidae* (F). *Myoxidae* (E).

فصيلة حيوانات لبونة قافسة من مرتبة قرقنيات الشوزب ورتبة القواضم. اجناسها ثلاثة القرقدن والزغبة والقرقب. موطنها العالم القديم || اجناسها صغيرة القند مستطيلة الشكل والذنب. براسها العليا مطوقة و جراسها قصيرة. جميعها شاجرة تسرح في الليل. قوتها النار والحشرات، يالها الشوي يدم نحو ستة اشهر.

### ٢١٨٩٠ - قِرْقَدَاتُ الشَّوْزَب

مرتبة حيوانات لبونة من رتبة القواضم تشمل خسي فصائل القرقنيات والافاريات والمخلديات والجوميسيات والبريوصيات

### ٢١٨٩١ - قِرْقَدُنُ قَدُو

هو ابن حرس متن و الحلبه.

### ٢١٨٩٢ - قِرْقُدُنُ

هو الدند البري و الحلبه.

### ٢١٨٩٣ - قِرْقُدُ ، سَكَبَاتُ

*Phlebotomus* (S).

جنس حشرات من فصيلة القرقنيات. انواعه عديدة جميعها صغيرة القند، طولا اراوح بين ٢ و ٥ سم. اجناسها ورواشن وقوتها الاستشعادية حلبة الشفاء و صفراء اللون و حلبة المواج. اعطاها البلاد الحارة. ذكروها تعيش على رسيق الاذعار والافرازات السكرية النباتية. اناثها تمتص الدم حيثما تستطيع. لسنتها مزينة بقال اناث تنقل الحصى الباردة و صبة حلب.

### ٢١٨٩٤ - قِرْقُدَةُ اَزْبَةِ الشَّكْلِ

*Psychode phalaenoides* (S).

*Psychode phalaenoide* (F).

حشرة من ذوات الجناحين وفضيلة القرقصات. جسمها



## Alcedinidae (S).

## ٢١٩٠٨ - قُرُنَاتِيَّات

Alcedinidae (F). Alcedinidae (E).

فصيلة طير من الجوائم المتصقات الأصابع تتميز بصغر جرمها وسرعة حركتها، احتفاظها، رؤوسها خضراء، اجسامها ريمية مكشحة. مناقيرها قوية مستطيلة ذلقة، اجنحتها متوسطة القد، اذناها واربعها قصيرة، ألوانها قزمية الألوان الزاهية || اجناسها وانواعها عديدة تتجمع الى عازتين القرليات والمزوريات.

## Alcedo (S).

## ٢١٩٠٩ - قُرُنَاتِيَّ، قَاوَنَد

Martin-pêcheur (F). Plad kingfisher, Ceryle rudis (E).

جنس طير من القرليات. أنواعه ٣٠ موطنها العالم. ذكره في المناطق الحارة والمعتدلة. تتميز باستطالة مناقيرها السود، اثنائها قزمية الألوان الزاهية الجميلة || وقد قيل فيه : طائر حزموم يهوى بأحدى عياله الى قعر الماء طمعا || هو ما يصيده ويرفع الأخرى حذرا بما يصيبه منه المثل || هو اعزوم او احلر من قري ان رأى خيرا ندى وان رأى شرا توله || وذلك لانه اذا أبصر في الماء ما يستل يحمله انفض عليه كالهمر المرسل فاحسبه من قمر الماء وإذا أبصر في الجو كاسر كادخل البر هربا بسرعة البتلة. احرف انواعه واشهرها ما يتبع .

## Alcedo cyanotis (S).

## ٢١٩١٠ - قُرُنَاتِيَّ أَرْزَق \*

Martin-pêcheur bleuâtre (F).

طائر من القري. ثوبه الى الزرقاء الجميلة الخضراء الملاج. متقارب أسود. رجلاه الى الجفوة. موطنه افريقية الغربية. اخلاقه اخلاق القري الشائع .

## Alcedo bengalensis (S).

## ٢١٩١١ - قُرُنَاتِيَّ بَنْغَالِي

Martin-pêcheur bengalais (F).

طائر من القري. ثوبه قزحي الألوان المألوفة الجمال. موطنه يمتد من الهند الى أقصى الشرق. ارباشه مزرقة، ثمينة، مرغوب فيها || اخلاقه اخلاق القري الشائع .

## ٢١٩١٢ - قُرُنَاتِيَّ شَالِي \* ، قَاوَنَد شَالِي \* ، أَبِي الرَّقْص ، مَلْعَاب طِيلَه

Alcedo ispida (S). Martin-pêcheur vulgaire (F).

Common kingfisher (E).

طائر من القري. متقارب اسمر. رأسه مرطف. ذروه وأعلى عنقه الى البياض الماجي. حمراره الى الصبغة الغامقة. ظهوره لآزوردي. قنقه وجناحاه الى الزرقاء الخضراء الملاج. صدره وبطنه الى الشبه السفعا. ذنبه الى الزرقاء المختلفة الملاج. رجلاه الى الجفوة || موطنه يمتد من الهند الى بلاد فارس والشرق الاوسط واروبة وافريقية الشمالية. يألف جرف مجاري الماء وصفات الصفاف. قوته الاسماك والقفرجات والحشرات || أثناء تبيض من ٦ الى ٨ بيضات تحضنها وسدحا من ١٩ الى ٢١ يوما .

## ٢١٩١٣ - قُرُنَاتِيَّ قُتْبُرَانِي \* ، Alcedo cristata (S).

Martin-pêcheur huppé (F).

طائر من القري. ثوبه قزحي الألوان الجميلة. رأسه قزحي الريش. موطنه افريقية الشرقية والشمالية || اخلاقه اخلاق القري الشائع .

## Alcedinini (F).

## ٢١٩١٤ - قُرُنَاتِيَّات

عمارة طير من القرليات تشبه القري والزرافات وخطب الماء. جميعها صغيرة الجرم، زاهية الألوان المتراكبة.

## ٢١٩٠٠ - قُرُنْتُ الْمَقَاصِبِ

Mésange des roseaux (F).

طائر من القرقيات يدهى سبال، اطلبه .

## ٢١٩٠١ - قُرُنْتُ قُتْبُرَانِي \*

Parus cristatus (S).

Mésange huppée (F).

نوع من القرقف، طولها يراوح بين ١٠ و ١٢ سم. رأسه قزحي الريش الاسود المنقح بالاكعب. ظهوره الى الصبغة الرمادية. بطنه الى الصبغة النبراه الصفراء الملاج. ذروه اسود، عنقه مطوق بالاسود والابيض. حمراره الى البياض الاخير تملوه رقشة مراء || يألف احراج الصنوبر .

## ٢١٩٠٢ - قُرُنْتُ كَبِير \*

Parus major (S).

Mésange charbonnière, Mésangère (F). Great titmouse, Ox-eye (E).

نوع من القرقف، طولها يراوح بين ١٢ و ١٥ سم. ثوبه متراكب الألوان. ظهوره الى الخضار الزرقى يملوه مواج اصفر. بطنه الى الصفرة الباهتة يملوه خط قاطب اسود يمتد من طوق العنق الى اوسط البطن. رأسه وعنقه الى السود اللامع، حمراره وقنقه بيض، وجناحاه وذنبه الى الزرقاء الرمادية. قوامه يفيض الحار || يألف الحدائق والجنائن والنباتات والاغصان .

## ٢١٩٠٣ - قُرُنْتُة

Fauvette orphée (F).

طائر من اللعالي. اطلب دخله غريبة .

## ٢١٩٠٤ - قُرُنَاتِيَّات

Paridae (S).

Paridae (F). Paridae (E).

فصيلة طير من الجوائم الخروطيات المناقير، اجناسها وانواعها كثيرة العدد. اصطناعها العالم. معظمها غريد ذكورها واناثها متشابهة. تعيش على الاشجار. قوتها الحشرات وحبها وبقاها والثمار والحبوب || تدن في تجاريف الاشجار وارقاب الصخور والابنية للمهجرة. اركنها كروية الشكل تحبها بمهارة وتفرشها بالوبر والصوف .

## ٢١٩٠٥ - قُرُنَهَان

Calendula officinale (F).

هو الاذرين المغزني، اطلبه .

## ٢١٩٠٦ - قُرُنُور \*

Pristipoma stridens (S).

Pristipome strident (F).

سمكة من الشجرم تنتمي الى فصيلة القرشيات، طولها نحو ٥٠ سم. ثوبها الى الكهبة الخضراء الملاج. حراشها مهدبة. زانفتها كبيرة، الظهرية مستطيلة شاذكة والشرجية فارقة. يكتر وجوده في المتوسط والبحر الاحمر .

## ٢١٩٠٧ - قُرُنُوس \*

Coriscus rostratus (S).

Sublet groin, Sublet, Sublaire (F).

Coriscus rostratus (E).

سمكة بحرية يبرض من فصيلة الكيكيدات. اصطناعها البحر الابيض المتوسط. مسرحتها حشاش المهاد والاعواط || جسمها احليلجي اللون يطلو من ١٠ الى ١٥ سم. ثوبها الى الخضار الخجلي الملاج يملوه شمشع وردي واصفر. راسها مخروطي، ذلق القلم المنقح. زعنفتها الظهرية مستطيلة تنتهي بمستوى الشرجية. زعنفتها الشبيهة شبه مطعونة || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .



قُرُنْتُ قُتْبُرَانِي



قُرُنْتُ كَبِير



قُرُنُور



قُرُنُوس



قُرُنَاتِيَّ أَرْزَق



قُرُنَاتِيَّ شَالِي



قُرُنَاتِيَّ قُتْبُرَانِي



قُرْمَاة البرازيل



قُرْمِيَّة اسْتِرَالِيَّة



قُرْمِيَّة البرتقال البيضاء



قُرْمِيَّة البرتقال السوداء



قُرْمِيَّة التفاح



قُرْمِيَّة الثَّوْت

المواج . مكانها غُند الصفة ابيض اللون يحوي من ٦٠٠ الى ٨٠٠ مكنة قُرْمِيَّة اللون مُرَامَة السفت . لها جيلان في الحول، الاول يستمر من آذار الى تموز والثاني من آب الى شباط || تركيب الحفصيات والورد والسبط والدار والورباء والبطاطا || تكافح عند تقف مكن الجليل الاول وذلك في خلال شهر نيسان .

### ٢١٩٢١ - قُرْمِيَّة البُرْتَقَالِ البَيْضَاء \* مَغْفِرِيَّة الحَفْصِيَّات الدَّقِيقِيَّة ، كُوشِيْلِي البُرْتَقَالِ الْاَيْضِ

*Pseudococcus citri*, *Dactylopius citri* (S). *Cochenille blanche de l'oranger*, *C. farineuse de l'oranger* (F). حشرة من القرمزيات . انتاها سمراء اللون ، حراء المواج ، بيضيه للشكل ، منشارية الخار ، تظول من ٦ الى ١٠ م . جسمها منثني بمادة دقيقة بيضاء . مكانها يحوي من ٤٠٠ الى ٥٠٠ مكنة صفراء اللون || ايجالها الحولية ٢ راجع بين ٤ و ٥ تركيب الحفصيات والكرية والتين والغروبون والصبار ... وهي شديدة الاذى تقضي على الاوراق والابرار والثمار || مكافحتها صعبة تستلزم عناية خاصة قوامها التطهير بالانزيمات السامة . وقد تم الاذابة الحشرات المضادة التي تقضي عليها اغصانها الكريبتولوسوس (*Cryptoloeus*) .

### ٢١٩٢٢ - قُرْمِيَّة البُرْتَقَالِ السَّوَدَاء \* ، قُلْمَلَة البُرْتَقَالِ السَّوَدَاء ، حَشَرَة قُرْمِيَّة سَّوَدَاء ، كُوشِيْلِي البُرْتَقَالِ السَّوَدَاء

*Aspidiotus azonidum*, *Parlatoria ziziphi* (S). *Cochenille noire de l'oranger*, *Aspidiot de l'oranger* (F). حشرة من القرمزيات . دوقها مستطيلة الشكل قائمة الزوايا . تظول نحو ١ م . رسته خطوط وتعرض نحو ٦ خطوط . ثوبها الى السواد اللامع . مكانها تحوطي الشكل ينجح الخار الابيض يحوي نحو ٣٠ مكنة رافية الشكل ، بنفسجية اللون || ايجالها الحولية من ٢ الى ٣ تركيب الحفصيات دون غيرها وهي لا تقرب الثواب ابدأ في حين ان تسميتها العلمية تشير اليه || تكافح باستعمال مزيج من الزيوت النباتية والبيضاء .

### ٢١٩٢٣ - قُرْمِيَّة التَّفَاح \* ، عَفَن حَكَارِي ، مَغْفِرِيَّة التَّفَاحِ المَدَكَّة ، كُوشِيْلِي التَّفَاح ، كُرْمِس التَّفَاح ، دُوسْبُوس التَّفَاح

*Lepidosaphes ulmi*, *L. ceratoniae*, *Mytilaspis flava*, *M. pomorum*, *Diaspis pomorum* (S). *Cochenille du pommier*, *C. virgule du pommier*, *Kermès virgule*, *Diaspine du pommier* (F). *Mussal scale* (E). حشرة من القرمزيات فاصلية الشكل ، دقيقة . طرطا من ٣ الى ٤ م . ثوبها الى الخشنى قشعة مادة شمعية بيضاء . مكانها يحوي من ٤٠٠ الى ٦٠٠ مكنة حنطية اللون || يجلبها الحول واحد يحيى تركيب التفاح والاباص والحوخ والمشمش والجوز والرزون والاذرعت والحود والصفصاف ... تكافح كل اثر تقف الممكن وقد يكون ذلك في حزيران .

### ٢١٩٢٤ - قُرْمِيَّة الثَّوْت \* ، قُلْمَلَة الثَّوْت ، دُوسْبُوس الثَّوْت

*Diaspis pentagona*, *Pseudaulacaspis pentagona* (S). *Cochenille du mûrier*, *Diaspine du mûrier* (F). حشرة من القرمزيات . دوقها صابية قشرها رزاح من

روسيا خفيفة . متناوبة سادة مستطيلة . اوساغها قصيرة . تائف شطوط الجمار وجرث الانهار وضفاف البحيرات . قوتها الاسماك والتفشيات واخفشات || تكثُر في افانحيس تحضرها في الاماكن الرطبة المشرقة على مجاري الماء .

### ٢١٩١٥ - قُرْم \* ثَوْت كَالْدَب غُلْفًا وَيَاغَا يَنْبِت في جَوْف البحر \* (اللسان) .

### ٢١٩١٦ - قُرْم \* الفحل الكرم من الابل الذي ترك للفضة لم يسه حبل ولم يحمل عليه || وقيل السيد الظلم على التشبيه بالفحل . قال المتنبي ؛ ولكننا نذهب سنسلك قُرْمًا تراجمت القروم له سقانا

### ٢١٩١٧ - قُرْمَاط \* *Curimatus* (S). *Curimate* (F). *Curimatus* (E).

جنس اسماك نهريه من متفرحات الحفافة ونصيلة السلمونيات . انواعها المعروفة لا تتجاوز النشرة . اصلاها المياه المذبة الايركية انحصار امريكة الجنوبية || اجسامها اهلالية الشكل ، متوسطة القد . تتميز باعطائها الحادة الاطراف الدرة للقائمة ويفكرها الخالية من الاسنان || اشهر انوعها قُرْمَاطَة البرازيل .

### ٢١٩١٨ - قُرْمَاطَة البرَازِيل \* *Curimatus laticeps* (S). *Curimate à large tête*, *C. du Brésil* (F). *Curimatus laticeps* (E).

نوع من القرمات . مهدا نهر البرازيل وبحيرة وقد شاعت قريبها في اكثر مسامك العالم لانها سرورية ، قليلة التسلطيات ، جيدة اللحم || جسمها اهلالي الشرن يطول نحو ٣ م . راسها غدوني الشكل ، مستعرض القاعدة . ثوبها الى الخضار القضي يبق مع اقترابه من ثوب الطير ويؤخذ عند البطن . زعنفتها الظهرية واحدة شبه شراعية الشكل يقيمها في مؤخر الظهر جعدة فضوفية . زعنفتها الشريفة تقابل الجعدة . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .

### ٢١٩١٩ - قُرْمِيَّة ، مَغْفِرِيَّة ، حَشَرَة قُرْمِيَّة ، قُلْمَلَة الثَّوْت ، كُرْمِس ، كُوشِيْل ، مَغْفِرِيْن

*Cochenille*, *Kermès*, *Céroplaste* (F). *Cochineal*, *Kermès* (E). اسم شائل يطلق على مختلف انواع القرمز والمغفر وي حشرات صغيرة القد تنتمي الى فصيلة المغفريات . تركيب الابرار المشرقة وفقرها من النباتات الزراعية والحرجية فتؤذيها وتوقع بها الاضرار || اعرف انواعها المؤذية ما يلي .

### ٢١٩٢٠ - قُرْمِيَّة اسْتِرَالِيَّة \* ، كُوشِيْل اسْتِرَالِي ، اِيْشْكَار

*Icerya purchasi*, *Pericarya purchasi* (S). *Cochenille australienne*, *Icerya* (F). حشرة من القرمزيات طول الذكر فيها رزاح بين ١ و ٢ م . ثوبه الى الحمرة ، جناحاه الى البياض الشفاف . الاذن تظول من ٤ الى ٥ م . ومكانها يطول من ٣ الى ٤ م . جسمها وردي اللون تغشاها خيوط زغبية شمعية فضية

٢ م. وخطون إلى ٢ م. واربعة خطوط. ثوبها إلى البياض الاخير. الذكر يطول نحو ١ م. وخسة خطوط وهو يرتقالي اللون، شغلات الجناح، سريع الحركة. الانثى مستعرضة الشكل، صفراء اللون، اجسامها الحولية ثلاثة، مكها اصفر اللون تنمحه حل السوق والاضغان والافنان ابتداء من اواخر نيسان فينتفج ابتداء من اواخر ايار || تركيب التوت والدراق والشمش والافوز والكشمش والياعين والصفصاف || تكاتف باستعمال الحشرات المضادة او بعض الحواشير الفعالة اغصها الملوكن الشوية كالزيتوت النباتية المركزة بمعدل ٢ %.

٢١٩٢٩ - قرمزية الصبار، كوشنيل الصبار  
Diaspis echinocacti (S). Cochenille des cactées (F).  
حشرة من القرمزيات، درتها صابية الشكل قطرها نحو ٢ م. اناتها مستعرضة، مبطلة، ثوبها إلى الخضرة المراء. اجسامها الحولية ثلاثة. تركيب ثباتات الصبار على اختلاف اجناسها وانواعها || تكاتف باستعمال احد الحواشير الفعالة حل حدة دفتات متتالية فترتها تراوح من ١٥ الى ١٢ يوما.

٢١٩٣٠ - قرمزية القرنوس  
Eulecanium corni (S). Lecanium du cornouiller, Cochenille du cornouiller (F).  
حشرة صغيرة من القرمزيات، اناتها بيضية الشكل مبطلة، تطول نحو ٦ م. وتعرض ٤ م. ثوبها إلى الجوزة اللامعة. زيانها سياحية الفواصل. مكها نحو ١٥٠٠ م. الى ٣٠٠٠ م. مكته تنقف بعد متعها باسبوعين اذا كان ذلك في حزيران او في تموز || وهي من الحشرات البهية المؤذية. تركيب القرنوس والكريمة والخوخ والدراق والجوز والبنطق والورد والسفديان والكميلة. تصطب الانثاء وتبيض الثار وتجب الثمان || تكاتف في الشتاء باستعمال سائل الكريونيل المركز من ٤ الى ٥ % وتكاتف في الصيف من تموز الى آب باستعمال مركبات الباريون او احد الحواشير الفعالة او الزيتوت البيضاء المركزة من ١ الى ٢ % حل ان يتجه النضج من اسفل الى اهل ليم جميع صفحات الاوراق السفلى.

٢١٩٣١ - قرمزية الكرمة العنبراء، كوشنيل الكرمة العنبراء  
Helioecoccus hysrix, Phenacoccus hysrix (S). Cochenille farineuse de la vigne (F).  
حشرة من القرمزيات. طرطا نحو ٤ م. لونها وردي، زفها الشمعي يلحف الطير دون سواء. مكها وشي محوي من ٤٥ الى ٦٥ م. مكته ريفية الشكل حمراء اللون. اجسامها الحولية ثلاثة. تركيب الكرمة والعنب.

٢١٩٣٢ - قرمزية الكرمة البتفهام، دمة  
Dactylopius vitis (S).  
Cochenille blanche de la vigne (F).  
حشرة من القرمزيات، جسمها بيضي مفلطح. ذكرها يمتج يطول نحو ١ م. لونه إلى الصفرة. اناتها عديدة الجناح وتطول نحو ٤ م. لونها إلى الجوزة الصفراء، تفرز مادة شمعية بياض اللون تنشها بكاملها. تمتج مكها على صفحة النصل السفلي في خلال حزيران فينتفج من رقات همة تحصر عصارة الاوراق ولا تمف من العنب. ثم تقضي حياتها الشتوي في شقوق غلاف الجذوع وعند انتقاص الجذوع في التربة || تكاتف بكشط الحاء القديمة اليابسة وبطرش الجذوع بماء الكلس او بسائل سلفات الحديد المثلل ١٠ %.

٢١٩٣٣ - قرمزية الكرمة الحمراء، كوشنيل طوطي  
Pulvinaria vitis (S). Cochenille floconneuse de la vigne, C. rouge de la vigne (F). Grape scale (S). Wollige Rebschildlaus (D).  
حشرة من القرمزيات، درتها بيضية الشكل تطول من ٤ الى

٢ م. وخطون إلى ٢ م. واربعة خطوط. ثوبها إلى البياض الاخير. الذكر يطول نحو ١ م. وخسة خطوط وهو يرتقالي اللون، شغلات الجناح، سريع الحركة. الانثى مستعرضة الشكل، صفراء اللون، اجسامها الحولية ثلاثة، مكها اصفر اللون تنمحه حل السوق والاضغان والافنان ابتداء من اواخر نيسان فينتفج ابتداء من اواخر ايار || تركيب التوت والدراق والشمش والافوز والكشمش والياعين والصفصاف || تكاتف باستعمال الحشرات المضادة او بعض الحواشير الفعالة اغصها الملوكن الشوية كالزيتوت النباتية المركزة بمعدل ٢ %.

٢١٩٢٥ - قرمزية الحمضيات، وعف  
انقمضيات، وعف أزجواني

Lepidosaphes citricola, L. pinnaeformis (S). Cochenille virgule des oranges (F).  
حشرة من القرمزيات. درتها مبيدة الشكل ثوبها إلى السرة. حمارها اخضر، خلاها شمعي للمادة خلي التركيب. طرطا يراوح من ٢ م. وخسة خطوط إلى ٤ م. وخسة خطوط. عرضها نحو ٢ م. مكها مستطيل الحجاب محوي من ٣٠٠ الى ٤٠٠ م. مكته وشية الشكل حطية اللون. اجسامها الحولية تراوح من ثلاثة إلى اربعة. تركيب لوزان وفنان وشمار الحمضيات اغصها البرتقال واليضي وليسون الجنة || تكاتف باستعمال الغازات السامة لان الحواشير والزيتوت البيضاء لا تقضي عليها تماما فطرًا لكثرة وجودها على صفحات الاوراق العليا.

٢١٩٢٦ - قرمزية الخرنوب، كوشنيل الخرنوب  
Chionaspis ceratoniae (S).  
Cochenille du caroubier (F).

حشرة من القرمزيات، اجاصية الشكل مفلطحة. الذكر حاجي اللون طوله نحو ١ م. الانثى يرتقالي اللون تطول نحو ٣ م. || يقال ان جبلها الحولي واحد، تركيب اوراق الخرنوب والدقل والزيتون || تكاتف باستعمال الزيتوت النباتية والبيضاء.

٢١٩٢٧ - قرمزية الزيتون السوداء، قنبودة الزيتون المسطحة، كرميس الزيتون  
Saissetia oleae, Lecanium oleae (S). Cochenille noire de l'olivier, Lécane de l'olivier, Kermès de l'olivier (F).

حشرة من القرمزيات. درتها بيضية الشكل تطول من ٢ الى ٤ م. وتعرض من ٢ الى ٣ م. ثوبها إلى السرة الفسحة. مكها مكور الشكل محوي من ١٥٠٠ الى ١٦٠٠ م. مكته ريفية، حطية اللون || جبلها الحولي واحد. تمتج مكها ابتداء من ايار ويسمر من اواخر تموز. اما لتقف فيتدو بعد المتج يتنحو ثلاثة اسابيع || تركيب الزيتون والحمضيات والدفليات واليكياس... قنصب الثمان الاسود بالإضافة إلى اضرارها || تكاتف باستعمال الحشرات المضادة او الزيتوت الشوية البيضاء او الحواشير الفعالة الصيفية.

٢١٩٢٨ - قرمزية السديان، كرميس السديان  
Lecanium ilicis (S).  
Cochenille du chêne vert, Lécane du chêne vert, Kermès du chêne (F).

حشرة من القرمزيات. درتها مستديرة. سودا القرمص صفراء الجسم، مرتفعة الخنار تحقو مادة شمعية لزجة،



قرمزية الحمضيات



قرمزية الخرنوب



قرمزية الزيتون السوداء



قرمزية الكرمة العنبراء




قرمزية الكرمة البيضاء



قرمزية الكرمة الحمراء



قزمية اللوز



قزمية النخيل



قزمية اللوز



قزمية فئكة



قزمية فرومزه



قزمود

باستعمال اسد الحواشير الفعالة موزجاً بالزيت الابيض .  
وقد تجرى مكافحة على عدة مرات ابتداء من زين القملة .

### ٢١٩٣٨ - قزمية فرومزه \* ، مفترية مذبذبة ، وعف صيني

*Lepidosaphes gloweri* (S). *Serpette* (F).

حشرة من القرميزات ، مقصية الشكل سمراء اللون طولها ينسبط من ٣ م . الى ٣ م . وخمسة خطوط ، بينها عرضها من خطين الى ثلاثة خطوط غشاء يغطي شهي المادة ، نحيل النسيج ، ابيض اللون . مكانها يحوي نحو ٢٠٠ مكنة رقيقة الشكل ، وردية اللون || اجيالها الحولية ثلاثة . تركب اوراق الحشويات والكاميلية . تكاثرها مكافئة قزمية الحشويات .

### ٢١٩٣٩ - قرميزات ، مفترية ، كرميات Coccidae (S). Coccidae (F). Coccidae, Scale Insects (E). Schildläuse (D).

نصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة المدججها صفة الله ، مزدوجة الشكل ، لا نظامية تتناسل منها البيوضة والبيضة والسرودة || ذكورها مستطيلة الشكل مجنسة . اجناسها شائعة ، ثنائية العروق القاطبة . اناتها عادمة الجناح ، مستعرضة بسيطة ، وروشها وجوانبها متدحجة ، متاكها ثابتة ماصة . قوائمها قصيرة ، ارجلها وبيضة المقلقة ، مقاطها فردية ، مدبية . اغشية اجسادها غدية تفرز بعض المواد الالقية كالشمع والصمغ واللصق والحرير وما اشبه || اشهر اجناسها القرميز والخناخير .

### ٢١٩٤٠ - قرميل Chameaux (F). Camels (F).

الابل الصغار الكثيرة الاوار ذات السنين .

### ٢١٩٤١ - قرمكة Capselle (F).

نبات حشبي بري يلقى كيس الرامي . اطبله . ج قرم .

### ٢١٩٤٢ - قرمود \* Tragelaphus selousi (S). Tragelaphe de Selous (F). Sitatunga (E).

نوع من الجبل قدرة قدر القلب . ثوبه اشبه احمر يطو تجنح وتجنح || يالفت المنافع ويقيم كئنه بقرها . ج . قراميد . والاني قرمية .

### ٢١٩٤٣ - قرموص ، أحموص Nid en terre (F). Nest in land (E).

وكر الطائر حيث ينضم في الارض .

### ٢١٩٤٤ - قرموص \* ، سلور النيل Clarias anguillaris (S). Clarias commun, C. du Nil (F). Common catfish (E).

نوع من السلور يكثر ويوجد في النيل وهو قريب الشبه بالحنكليس الا انه مفلطح الرأس . طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه الى السمرة الزرقية يطو موج اخضر || لحمه حادي الصنف والمذاق .

### ٢١٩٤٥ - قرميدكة Bouquetin femelle (F). She ibex (E).

هي انثى الويل . ج قراميد .

### ٢١٩٤٦ - قرميدكة Tuile (F). Tile (E).

نصينة من الصلصال الجاهد او المصنعت المشوي .

### ٢١٩٤٧ - قرن Attelage (F). Coupling, Harnessing, Yoking (E).

هو شد او ربط البهائم للمرث او للجر ...

٥ م . وتعرض من ٣ الى ٤ م . ثوبها الى السمرة اللامعة . مكانها كبير القند طولي المادة اللامعة البيضاء يحوي من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ مكنة رقيقة الشكل ، سمراء اللون ، جزوية المواج || جيلها الحولي واحد . تنجح مكانها من اواخر ايار الى اواخر فيفنت في تموز وآب . تركب الكرنية والبقول والفت . تكاثرها كثيرا من القرميزات باستعمال اسد الحواشير الفعالة .

### ٢١٩٤٨ - قرمية الور \* ، كوشيل الور Lecanium amygdali (S). Cochenille de l'amygdier, Lécainio de l'amandier (F).

حشرة من القرميزات . مستدرة الشكل قطرها نحو ١ م . وخمسة خطوط . ثوبها الى الرمادي . انزاعها لزوج اسمر . مكانها مركزي ، اطبل اللون ، يحوي نحو ٢٠٠ مكنة وشحية الشكل ، حطيلة اللون || جيلها الحولي واحد . تركب اوراق واوراق جميع الانواع الحولية انصها الور . تكاثرها في الشتاء باستعمال مزيج من الزيت الابيض والنبالي المركز بمعدل ٢٪ .

### ٢١٩٤٩ - قرمية النخيل \* ، ورمكة النخيل Koushil el nakhil

*Parlatores blanchardi*, *Websteriella blanchardi* (S).  
*Cochenille du dattier* (F).

حشرة من القرميزات . اصطنها تشمل نخيل العالم . اذكر دقيق نخيل ابيض الشكل يطول نحو ١ م . الاثني بنفسجية اللون ريمية الشكل تطول نحو ١ م وثلاثة خطوط . ردتها مراء اللون يحويها ثور من الرطب شهي المادة اطبل اللون . مكانها يحوي من ٤٠ الى ٨٠ مكنة كروية الشكل وردية اللون || اجيالها الحولية ثلاثة او اربعة . تركب نخوص النخيل فتؤذي اشد الاثني || تكاثرها باستعمال الزيت النباتية او بعض الحواشير الفعالة الجبرية .

### ٢١٩٥٠ - قرمية الور \* ، ديسبوس الور قملة الور ، كرميس الور ، كوشيل الور

*Diapris rosae*, *Aulacaspis rosae* (S). *Cochenille du  
rosier*, *Diapris du rosier*, *Kermes du rosier*, *Pou  
du rosier* (F).

حشرة من القرميزات . ردتها صابية الشكل قطرها يراوح من ٢ الى ٣ م . ثوبها الى الجزوة حادها ابيض . اذكر خري الور . ابيض الجناح ، يطول نحو ١ م . الاثني مستطيلة الشكل حمراء اللون . مكانها جراب مستعرض يحوي نحو ١٠٠ مكنة رقيقة الشكل خرية اللون || جيلها الحولي واحد . تركب الوردة والرميح . تكاثرها باستعمال الزيوت البيضاء مزوجة بالزيت النباتية بمعدل ١٥ ٪ .

### ٢١٩٥١ - قرمية فئكة \* ، قملة سنان جوزة ، كوشيل سنان جوزة

*Aonidiella perniciosus*, *Aspidiotus perniciosus*, *Quadrasipterus perniciosus* (S). *Pou de San José*, *Cochenille de San José* (F).

حشرة من القرميزات . ردتها صابية الشكل قطرها نحو ٢ م . ثوبها الى الرمادي الاسمر تملو رقة بيضاء . الاثني سرودة صفراء اللون ، حطيلة المواج تنجح بطول سنة اسابع ما قدره ٤٠٠ رقة || اجيالها الحولية تراوح من ٣ الى ٤ تركب التناع والاباص والدرائن والخوخ والخش والكوز والصربة والقرون والوردة ... || تتركز على سوق واغصان بطوع النبات حيث تنجح الفسح || تكاثرها

حيات سامة من فصيلة الانعام لها نتوان صغيران في راسها كأنها قرنان . أنواعها أربعة جميعها خبيثة تسرح في الليل . موطنها الصحاري من مراكش الى جنوب الهند . تكثر في تونس وليبيا ومصر والجزيرة العربية حيث تنسج في الرمل فاذا مر بها احد لدغته || أنواعها : ابن قرة ، حارية ، قرنا مصرية ، قصري .

٢١٩٥٦ - قرنيش  
Lotier cultivé (F).  
هو اصابع المرسى ، راجمه .

٢١٩٥٧ - قرنيش  
Capricorne, Longicorne (F).  
Longicorn, Long horned beetle (E).  
جنس حشرات من فصيلة القرنيشات . أنواعه كثيرة المدد تتميز باجسامها الكبيرة القلعة الحديثة الظهور وبجرامها وقرنها الاستثنائية المستطيلة . قال الاخطل يصف جارية وبهنا :

الا يا حياء الله قلبي ميم  
ياحسن من صل واتجهم بعل  
ينام اذا ناست حل عكناها  
ويلم قساعاً كالسلافة او اسل  
يدب الى اسنانها كل ليلة  
دييب القرني بات يملو نفا مهلا

٢١٩٥٨ - قرنيش الدب \*  
Xystocera globosa (S). Xystocère globuleux (F).  
حشرة من القرنيشات . وفيه الشكل عديمة الظهر . طولها نحو ٢٢ م . ثوبا الى البني تشوبه حمرة قائمة واخايد خضرة تملأ الاغاد || يرقاتها تركيب الدب والسنت والقيح فتتشر السوك وتعلبها .

٢١٩٥٩ - قرنيش السنديان \*  
Cerambyx cardo (S). Capricorne (le grand). Capricorne du chêne (F). Great capricorn beetle (E). Grosser Eichenbock (D).  
حشرة من القرنيشات . طولها نحو ٥ م . ثوبا الى السرة ، ماجتها حنطية لامة . زبانها مستطيلة . تسرح عند الغروب || يرقاتها كبيرة القلعة تعيش اربع سنوات داخل السرايد التي تحفرها في خشب السنديان .

٢١٩٦٠ - قرنيش الصفصاف \*  
Lamia textor (S).  
الصفصاف

حشرة من القرنيشات طولها نحو ٢٧ م . ثوبا الى السواد الفضي || يرقاتها نحيلة القلعة تركيب جلودع وسوق الصفصاف وأخورد قنصرها وتعلبها .

٢١٩٦١ - قرنيش صغيرة \*  
Cerambyx scopoli (S). Capricorne (le petit) (F). Capricorn beetle (E). Buchenbock (D).  
حشرة من القرنيشات طولها نحو ٢٢ م . ثوبا الى السرة الداكنة . تعيش حل ازهار الفروديات والقيشيات والبلسان . تسرح في النهار || يرقاتها تركيب سرق الاشجار المرجية ولا تمتل عن الاشجار المثمرة اعصها التفاح والكرز واللين .

٢١٩٦٢ - قرنيش مسكة  
Aromie musquée  
هي الاروية المسكية ، اطبا .

٢١٩٤٨ - قرن - هو السفة ، اطبا .

٢١٩٤٩ - قرن  
Corne (F). Horn (E).  
ج قرن . والقرن بوز قاسية مختلفة الاجسام والاشكال تنشأ حل رؤوس بعض الحيوانات كالبقير والنم والظباء والماعز وغيرها ...

٢١٩٥٠ - قرن إسكسكاري ، وبياتي ، ريسان  
Antenna (F). Antenna (E).

عضو مفصل متحرك شكله كالقرن يكون في رأس الحشرات وبعض الحيوانات الدنيا . وما قرنان وزبانيان تستعملها الحشرات للحمس كما في الجراد او القس كما في الذباب او اللسع كما في اليموس او لتفاهم كما في النمل || والقرن الاستثنائية عديدة الاشكال مختلفة الاجسام والتركيب وقد وضع لكل شكل منها كلمة تعريف خاصة . أشهرها :

أرسي  
Aristée (F). Aristate (E).  
عيطي  
Filiforme (F). Filiform (E).  
رأسي  
Capitulée (F). Capitata (E).  
رشي  
Pennée (F). Pinnate (E).  
شوكي  
Sétacée (F). Setaceous (E).  
صيني  
Lamellée (F). Lamellar, Scaly (E).  
صواني ، صق  
Calviforme (F). Calviform (E).  
قلادي ، سبهي  
Moniliforme (F). Moniliform (E).  
غزالي  
Stylée (F). Stylata (E).  
مرقي  
Coudée (F). Bent (E).  
مشطي ، عالي  
Pectinée (F). Pectinate (E).  
مشطي مزدوج  
Bipectinée (F). Bipectinate (E).  
منشاري  
Serrulée (F). Serrate (E).

٢١٩٥١ - قرن الأروس  
Platycerium bifurcatum (S). Platycérion à cornes d'élan (F). Common staghorn fern, Elk's horn fern (E). Geweihfarn (D). Aldorne (I).

نبات عشبي يساهج بمعر من السرخسيات يزرع القرين . أرواته قرصية الانتشاب ، فستقية اللون ، حنطية الفلج ، منشبة كقرن الاروس .

٢١٩٥٢ - قرن الأيل  
Coronope (F).  
هو لسان الحمل القرني ، اطبا .

٢١٩٥٣ - قرن الغزال  
Lotier corniculé (F).  
هو اللوس القرني ، اطبا .

٢١٩٥٤ - قرنلاء  
Ceratoccephalus (S).  
Cératocéphale (F).

جنس نباتات شعبة ، حولية ، برية من فصيلة الشقيقيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها جبال البلاد المعتدلة الحارة من الشرق الاذن || سوقها قصيرة فرعاء . أرواقها متعاقبة ، منقطة ، كفية ، مفروسة وبشرية . انزاعها صغيرة صفراء اللون ، خامسة التركيب ، قليلة الاسدية ، مثدية ، يحرسها النمل || تنويعها ديمي . أشهر أنواعها القرناء المبدولة والمنحجلة .

٢١٩٥٥ - قرنلاء ، حريش  
Cerastes (S).  
Céraste (F). Ceraste, Horned viper (E).  
ويدعوها مرقنة وذات القرنين وذات الزبيبين . جنس



قرود



قرنا



قرني الدب



قرني السنديان



قرني الصفصاف



قرني صغيرة

## ٢١٩٦٣ - قَرْنُفَلَات ، زُحُفُفَلَات

Cerambycidae (S). Cérampycidae, Capricornes, Longicornes (F). Cerambycidae, Longicornes, Longhorned beetles (E). Bockkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة غدييات الجناح، عماراتها واجناتها وأنواعها تعد نحو ٢٠ ألف. أجسامها مستطيلة، أشكلها مختلفة، أطولها تمتد من ١٠ إلى ٨٠ سم. أوتلوها عديدة الألوان. قرونها الاستشعارية خيطية مركبة من ١١ فاصلة وهي في الذكر أطول ما هي عليه في الأنثى. أرباسها خماسية أما تيمون كاتها رباعية لأن خالصها صغير القد لاظم الارتكاز. غالبا سادة. تطير في الليل أو في النهار. قوتها الأزهار وجميع المواد النباتية. جهلها يمتد من سنتين إلى أربع سنوات. مكنتها لاقياسي الشكل، أصفر اللون، تجمعه الأثني في لحاء النبات أو تحت ثشوره أو ترز في التربة قرب الجلود || يقاها مودية الشكل، غليظة الرووس والمنطقة الصدرية، تحلة الأطراف والمنطقة الشرجية. قوتها المواد الليفية والخشبية، تسردب الانفاذ والافروع والغصن والسوق والجذوع والجذور. حورياتها تتلحم بفشاره خشنة تصنعها من فئات الخشب المصنوع بالارول في آخر سرداب سقرته عند آخر النسلخ.

## ٢١٩٦٤ - قَرْنُفِلَيْط \* ، قَرْنُفِلَيْط

Brassica oleracea botrytis (S). Chou-fleur (F). Cauliflower (E). Blumenkohl (D). Cavolfiore, Cavolflore (I).

بقلة زراعية حولية شائعة الاستعمال من فصيلة الصليبيات. ترغب في الآتية المسقوية التركيب الحكسي، للمتلة الاندماج، المعيقة الغرور، الغنية بالمواد الآتوية والنضوية. تتكاثر بالبزر. تنقل الشتول من الإكواد إلى المستقر عد بلد نشوء المادة البغية وتغرس حل إبعاد ترواح من ٦٠ إلى ٧٠ سم.

## ٢١٩٦٥ - قَرْنُفَل

Corindon (F). Corundum (E). حجر من اللوين الصرف وهو أصلب الأجسام بعد اللاس. أنواعه عديدة منها الحجارة الكريمة كالسفير. كسره يستعمل في صنع المادن.

## ٢١٩٦٦ - قَرْنُفَلَة

Mue des oiseaux de proie (F). Moulting (E).

الفرقة زين تحير الريش عند الجوارح.

## ٢١٩٦٧ - قَرْنُفَل

Dianthus (S). Cillet (F). Pink (E). Nelke, Sommernelke (D). Garofano (I). جلس نباتات شبيهة مصرة من فصيلة القرنفليات، أنواعه البرية والزراعية نحو ٨٠ أما ضروبه المشهورة فزهاء ٥٠٠ صيغها زراعية تزيينية. سوقها عقدية فراء. أورتاها حاصنة متقابلة. نصلها سنائي الشكل تحين الصفعة البحرية اللون. أزهارها جميلة الشكل، تاجية الارتكاز، غنلفة التجميع والألوان، عطرية العرف الفواح. بزورها صلبة القد، مستديرة الشكل، رقيقة الجرم، سمره اللون || يتكاثر بالبزر والمقل. يرغب في الآتية المتوسط الاندماج والطرية الغنية بالمواد النضوية والمضوية للعناصر المعدنية || أشهر أنواعه الرئيسية ما يتبع.

## ٢١٩٦٨ - قَرْنُفَل أَحْمَر زَنْجَفَرِي

Dianthus cinnabarinus (S). Cillet rouge cinabre (F). نوع من القرنفل مهدد اليونان، ساقه فراء تملو من ٣٠

إلى ٤٠ سم. أورتاه شديدة الخضار، خالصة العروق. أزهاره إلى الحسرة الزنجفرية، أكسها تطول نحو ٢٥ سم. وقطر بتلاتها أيضا || أزهاره يستمر من تموز إلى آب.

## ٢١٩٦٩ - قَرْنُفَل لَوِصِيَرِي

Dianthus armeria (S). Cillet velu, O. armeria (F). Armeria pink, Deptford pink (E). Rauhe Nelke (D). Armeria, Garofano peloso, Vioin da lepra (F).

نوع من القرنفل ضروبه وهما لجة عديدة، سوقها فراء خلية تملو من ٢٠ إلى ٣٥ سم. أورتاها الجلمعية مستطيلة. أورتاها سوقها وفروها أقصر من سلاحياتها، نصلها ثلاثية العروق، بحرية اللون. أزهارها صغيرة القد، وديدة، ملونة الزرقعة || يرغب، مع سائر ضروبه، في الآتية الرملية. أزهاره يستمر من حزيران إلى أيلول.

## ٢١٩٧٠ - قَرْنُفَل أَزْوَق

Dianthus caesius, D. gratianopolitanus (S). Cillet bleuët (F).

نوع من القرنفل ساقه فراء مسطحة. أورتاه قصيرة بحرية اللون، نصلها سنن الحافة، ثلاثي العروق. أزهاره عطرية العرف، بتلاتها وديدة اللون، مسنة الحار الحاريجي، قطرها يتفرج من ٢٠ إلى ٢٥ سم. || أزهاره يستمر من أيار إلى تموز.

## ٢١٩٧١ - قَرْنُفَل أَسْفَع

Dianthus ferrugineus (S). Cillet ferrugineux (F).

نوع من القرنفل مهدد إيطاليا. ساقه متضخمة فراء تملو من ٣٠ إلى ٤٠ سم. أورتاه الجلمعية ضيقة. أورتاه الساقية والقرعية أقصر من السلاحيات، نصلها حلق الخفسار البحري || أزهاره صغيرة القد، بتلاتها ثنائية التجميع، ثلاثية التنسين، صفر الصفحات الحاريجية، سمر الناخلعية، منع المواج || أزهاره يستمر من تموز إلى أيلول.

## ٢١٩٧٢ - قَرْنُفَل الْبَلْقَان ، قَرْنُفَل بَلْسِيَمِي

Dianthus Pancici (S). Cillet de Pancic (F).

نوع من القرنفل مهدد البلقان. ساقه فراء تملو من ٣٠ إلى ٤٠ سم. أورتاه خيطية، ضيقة، نصلها مالى البشرة، سيمك الصفعة، بحري اللون. أزهاره صغيرة القد، مستطيلة الكأس، أرجوانية اللون، سمر المواج. أزهاره يستمر من حزيران إلى آب.

## ٢١٩٧٣ - قَرْنُفَل الرِّمَال

Dianthus arenarius (S). Cillet des sables (F).

نوع من القرنفل منته الرمال. ساقه قليلة الفروع تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. أورتاه قصيرة النصل الضيق الأخضر. أزهاره فردية التجميع، متوسطة القد، بتلاتها إلى البياض الناصع تملو مشعة وسطى خضراء || أزهاره يستمر من حزيران إلى آب.

## ٢١٩٧٤ - قَرْنُفَل الزَّهَّارِين \*

Dianthus caryophyllus (S). Cillet des fleuristes, O. flamand, O. remontant, O. perpétuel, O. fantaisie (F). Carnation, Clove pink, Picotee (E). Gartennelke, Gartennelken gefüllte, Nelke (D). Garofano dei fioristi, G. scempro (I).

نوع من القرنفل التزييني المشهور. ضروبه وأصمراه كثيرة العدد. سوقها فراء. أورتاها بحرية، نصلها جانبد الصفعة. أزهارها مكعبة، فواحة العرف العطري،



قَرْنُفِلْ



قَرْنُفَل أَحْمَر زَنْجَفَرِي



قَرْنُفَل أَمِيرِي



قَرْنُفَل أَزْوَاقِين

## \* ٢١٩٨١ - قَرْنَفُلٌ صِينِيٌّ

*Dianthus chinensis* (S). *Éillet de Chine*, O. régence (F). *China pink*, *Indian pink* (E). *Chinesische Nelke*, *Indisches Nagelein* (D). *Garofano della Cina*, *G. della roggenna* (I).

نوع من القرنفل المحول. مهدد الصين. ضروب عديدة سيقها فراء تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها مستطيلة تعرض نحو ٢ سم. نصلها شديدة الخضار البحري. أزهارها بسيطة أو مكبسة، بتلاتها مهددة الخثار. ألوانها مختلفة منها السوية والبياض والموشة والمزجوشة || أزهارها يستمر طوال الصيف.

## \* ٢١٩٨٢ - قَرْنَفُلٌ مُنْتَصِبٌ

*Dianthus strictus* (S). *Éillet dressé* (F).

نوع من القرنفل ساقه منتصبة، قليلة الفروع، مستطيلة السلاحيات النحيلة، تملو من ١٥ إلى ٢٥ سم. أوراقها ضيقة النصل، بحرية اللون. أزهاره فردية أو ثنائية التجميع، مستطيلة المالحق، خافتة اللون. بتلاتها بيضاء اللون متفصلة الانتشاب مقرضة الأطراف. أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز.

## \* ٢١٩٨٣ - قَرْنَفِلِيَّات

*Caryophyllaceae* (S). *Caryophyllacées*, *Caryophyllées*, *Dianthées* (F). *Caryophyllaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القائلات. اجناسها وأنواعها كثيرة العدد تنقسمها ثلاثة أساط: السيلانيات والفلقليات والذخنيات. جميعها عشبية، معظمها معمر وبعضها محول وحولي. ومنها أيضاً البرية والبطية والصناعية والزرينية.

## \* ٢١٩٨٤ - قَرْنَفُلٌ

*Eugenia aromatica*, *E. caryophyllata*, *Caryophyllus aromaticus* (S). *Giroffier*, *Géroffier* (F). *Clove tree* (E). *Gewürznelken* (D). *Garofano*, *G. aromatico*, *Eugenia aromatica*, *E. coriifolia*, *Chido flore* (I).

جنية معمرة من فصيلة الآسيات. مهددا البلاد الحارة ساقها وأغصانها سلسة. أوراقها متعابلة، نصلها جامدة، وريشة العروق. أزهارها صغيرة القد، كروية وباعية التفصيص، بتلاتها ثمانية، أسديتها كثيرة العدد، مبيض مفتحة ثنائي الخياء المنظم. ثمارها نورية متوتجة وجزوها قليلة. تزود لأزهارها العطرية الشائعة الاستعمال المعروفة باسم «كيش القرنفل».

## \* ٢١٩٨٥ - قَرْنُوسٌ

*Chorinus* (S). *Chorine* (F). *Chorinus* (E).

جنس ذويابت بحرية من القشريات مشاريات الأبريل قصيرات الذليل وفصيلة الجنيات. أنواعه المعروفة ستة، اعطاهما بحار البلاد الحارة || أجسامها صغيرة شبه ريمية الشكل. سكاكها تنتهي بزوائد. قرنية المادة، جالسة الانتشاب. قوائمها الامامية ملقطة الأطراف، لامتناوية الطول والنشانة. أوثابها متباينة الألوان تكثر فيها الألوان والسرعة الحديدية المولج.

## \* ٢١٩٨٦ - قَرْنُوسٌ \* قَرْنَبَا

*Cornus* (S). *Cornouiller* (F). *Cornel-tree* (E).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة القزوينيات. أنواعه المعروفة نحو ٢٥ منها الأشجار والشجيرات والجنبات والأعشاب. أوراقها كاملة حاملة. أزهارها

كبيرة القد، قطرها ينبلج من ٦ إلى ١٢ سم. ألوانها عديدة تغلب فيها السوية.

## \* ٢١٩٨٥ - قَرْنَفُلُ الشَّاعِر \* قَرْنَفُلٌ مُنْتَصِبٌ

*Dianthus barbatus* (S). *Éillet barbu*, O. de poète, *Bouquet parfait*, *Jalousie*, *Tête de chat* (F). *London tute*, *Sweet William* (E). *Bartnelke*, *Sämtelke* (D). *Garofano barbuto*, *G. poeta*, *Mazetto perfetto* (I).

نوع من القرنفل، ساقه منتصبة فراء، دقيقة السلاحيات المستطيلة، تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها سانية النصل تعرض نحو ١٠ سم. لونها إلى الخضار المالحق، أزهاره كثيرة العدد، بتلاتها تطول نحو ٢ سم. وهي مستعرضة الطرف المسنن. ألوانها مختلفة متعاطلة عديدة || أزهاره يستمر من أيار إلى آب.

## \* ٢١٩٨٦ - قَرْنَفُلُ الصُّخُورِ

*Dianthus petraeus* (S). *Éillet des rochers* (F).

نوع من القرنفل البري يعيش بين الصخور وفي الجبال. ساقه دقيقة نحيلة قليلة الفروع تملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. أوراقها لينة نصلها ثلاثي العروق، أخضر اللون، مذيب المقصة الشالكة. أزهاره وردية، صغيرة القد، فردية التجميع، حادمة العروق. يوجد منه في لبنان || أزهاره يستمر من أيار إلى تموز.

## \* ٢١٩٨٧ - قَرْنَفُلُ الهِنْدِ

*Taget souffu* (F). هو الخشمية الجليدية، أطلسيا.

## \* ٢١٩٨٨ - قَرْنَفُلٌ بَرْيَ

*Dianthus sylvestris* (S). *Wood pink* (E). *Steinnelke*, *Wilde Nelke* (D). *Garofano salvatico* (I).

نوع من القرنفل، ساقه فراء تملو من ١٥ إلى ٣٥ سم. أوراقها جامدة النصل الأخضر المذهب الطرف. أزهاره حادمة العروق، فردية التجميع، بتلاتها مسننة الخثار الخارجي، وردية اللون أو حمراء. يوجد منه في لبنان حتى ارتفاع ٧٠٠ م.

## \* ٢١٩٨٩ - قَرْنَفُلٌ بَرْيَ

*Dianthus superbus* (S). *Éillet superbo*, O. *frangé* (F). *Fringed pink* (E). *Prachtnelke* (D). *Garofano frangato*, *G. superbo* (I).

نوع من القرنفل، ضروبها عديدة سيقها فراء تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها تطول من ٤ إلى ٧ سم. وتعرض من ١٠ إلى ١٥ سم. نصلها ثلاثي العروق، أخضر المقصة. أزهارها عديدة، متوتجة القد، فواصة العروق، قطرها يتراوح من ٢٥ إلى ٤٠ سم. ألوانها سوية مختلفة منها الأبيض والبيجي والوردي والاحمر والبنفسجي || أزهاره يستمر من أيار إلى أيلول.

## \* ٢١٩٩٠ - قَرْنَفُلٌ رِيْنِيٌّ \* قَرْنَفُلٌ عَطْرِيٌّ

*Dianthus plumarius* (S). *Éillet mignardise*, O. *musqué* (F). *Feathered pink*, *Garden pink* (E). *Federnelke* (D). *Garofano a plumino*, *G. pennino*, *Garofanini* (I).

نوع من القرنفل ساقه منتصبة فراء تملو من ١٥ إلى ٣٠ سم. أوراقها لينة تطول نحو ٥ سم. نصلها جامد الصفحة مذيب المقصة، يامت الخضار البحري. أزهاره فواصة العروق المطري قطرها نحو ٥ سم. بتلاتها مستطيلة التثعيم مختلفة الألوان السوية || أزهاره يستمر من أيار إلى آب.



قَرْنَفُلُ الشَّاعِر



قَرْنَفُلٌ بَرْيَ



قَرْنَفُلُ صِينِي



قَرْنَفُل



قَرْنُوس

## ٢١٩٩٣ - قُرْنُوسٌ كَبِيرُ الْوَرَقِ

*Cornus macrophylla*, C. brachypoda (S). Cornouiller à grandes feuilles (F).

شجرة سبروتية تملو من ١٠ إلى ١٥ م. أثمارها وأغصانها رابعية التضلع. أوراقها متقابلة تطول نحو ١٦ سم. وتعرض نحو ٨ سم. نصلها منزهة البشرة على صفحيه. عروقه سداسية أو ثمانية الاضلاع. أزهارها بيض. ثمارها إلى السواد الأزرق المالح.

٢١٩٩٤ - قُرْنُوسٌ كَسْدَاكُ (S). *Cornus canadensis* (F). Cornouiller du Canada (F).

عشبة سبروتية معمرة تملو من ١٢ إلى ١٦ م. أوراقها السفل لاطئة متقابلة أما العليا فضيقة ثلاثية. أزهارها نورية التجميع، بيض اللون، خضر المالح. ثمارها شويولة الشكل، سائمة الطعم، مأكولة. يستمر من حزيران إلى آب.

٢١٩٩٥ - قُرْنُوسٌ مَحْبَرٌ (S).

*Cornus controversa* (S). Cornouiller discuté (F). شجرة فناء تملو من ١٠ إلى ١٥ م. أثمارها وأغصانها زباه. ألصاء. أوراقها متقابلة مستديرة المقاطعة، نصلها يطول نحو ١٥ سم. ويعرض ٨ سم. عروقه شديدة سداسية أو ثمانية الاضلاع. أزهارها بيضاء اللون. ثمارها زيتونية الشكل واللذ، سوداء اللون، زرقاء المالح، سائمة الطعم، مأكولة. اغصانها شديدة الصلابة، ناعمة الرقة، فائقة الصف.

## ٢١٩٩٦ - قُرْنُوسِيَّاتٌ، قُرْنِيَّاتٌ

*Cornaceae* (S). Cornacées (F). Cornaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القممالات. اجناسها وأنواعها عديدة. جميعها نباتات معمرة منها الاغصان والجنات والاشجار. أوراقها بسيطة لكنها لا تقياسية الاكثران منها المتقابلة والمتعاقبة. أزهارها عشوية، صبوابة أو عقدوية التجميع. ثمارها نورية صغيرة القند مأكولة. اغصانها شديدة الصلابة، صناعية، مرغوب فيها.

٢١٩٩٧ - قُرْنُونٌ هو الشوكة الصفراء، اطليا.

٢١٩٩٨ - قُرْنِيَّةٌ *Cératoide* (F). Ceratoid (F). نمت تعريبي يوصف به ما كان شكله كالقرن.

## ٢١٩٩٩ - قُرْنِيَّاتٌ، قُرْنِيَّاتٌ

*Leguminales* (S). Légumineuses (F). Leguminosae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القممالات. اجناسها وأنواعها كثيرة العدد تجمعها ثلاثة اسباط: القرشييات والسميتيات والسنطيات. نباتاتها مخلفة الاشكال والاحجام فيها الاغصان والجنات والاشجار. أوراقها مركبة لا تقياسية الاكثران. أزهارها عشوية. اغصانها صنفودية صنفودية. وهي تشمل العديد من النباتات الزراعية الغذائية والعلفية اشهرها الفول والبس والحصى واللوبيا والبرسيم والنفل والبيبة والتيل والسنط.

٢٢٠٠٠ - قُرْنِيَّةٌ *Cornée* (F). Cornea (E). الجزء الخارجي الشفاف من العين.

٢٢٠٠١ - قُرْهَبٌ *Taureau corpuient* (F). *Stout bull* (E). الثور اللسن الضخم. وقيل الثور الكبير الضخم.

٢٢٠٠٢ - قُرْهَدٌ ولد البوم ج. قراحيه.

عشوية، رابعية التركيب، صغيرة القند، صبوابة التجميع. ثمارها نورية مستطيلة مأكولة. يزورها دغنية يستخرج منها زيت حاد يستعمل في صناعة الصابون اغصانها شديدة الصلابة، صناعية. اشهر انواعه ما يتبع.

٢١٩٨٧ - قُرْنُوسٌ أَيْبُص *Cornus alba* (S). Cornouiller blanc (F).

جنبه سبروتية تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم. أثمارها ربحانية اللون أو صفراء. أوراقها بيضية، تطول نحو ١٠ سم. وتعرض ٨ سم. نصلها خلى الصفحة السفلى، عروقه خماسية أو سداسية الاضلاع. أزهارها غبراء اللون. ثمارها حصى القند والشكل، بيضاء اللون، سائمة الطعم، مأكولة.

٢١٩٨٨ - قُرْنُوسٌ السُّوَيْدُ *Cornus suecica* (S). Cornouiller de Suède (F).

عشبة معمرة تملو نحو ١٥ سم. أوراقها لاطئة متقابلة. أزهارها نورية التجميع، جوية اللون تحضها أربع قنابات بيض. ثمارها صيرة القند سائمة الطعم مأكولة. اغصانها يستمر طولان مهر حزيران.

٢١٩٨٩ - قُرْنُوسٌ ذَكَرٌ، قُرْنُوسٌ مَبْدُولٌ

*Cornus mas* (S). Cornouiller mâle, C. commun, Courgeiller (F). Common cornel tree, Cornelian cherry (F). Kirschenhartriegel, Kornelkirsche, Kornelbeern, Kornelbaum (D). Corniolo, Corniale, Cornio (I).

شجرة سبروتية مبذولة تملو من مترين إلى خمسة أمتار. أثمارها حطوية اللحاء مبذولة الزغب. أوراقها متقابلة، صغرة القند، مائفة البشرة، خماسية أو سداسية العروق المزدوجة. أزهارها صغر التجميعات، خضر القنابات. ثمارها حاضرة مأكولة، رقيقة الشكل تطول نحو ١٥ م. لونها إلى الحمرة.

٢١٩٩٠ - قُرْنُوسٌ عَشْفُودِيٌّ

*Cornus racemosa* (S). Cornouiller à grappes (F). جنبه تملو من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ سم. أثمارها وأغصانها حطوية اللون، سرسة. أوراقها متقابلة تطول نحو ١٠ سم. وتعرض ٢ سم. نصلها خلى الصفحة السفلى، عروقه رابعية الاضلاع. اغصانها عقدوية هري. أزهارها وثمارها بيض.

٢١٩٩١ - قُرْنُوسٌ فُلُورِيدَا، قُرْنُوسٌ كَبِيرُ الْزَّهَرِ

*Cornus florida* (S). Cornouiller de Floride, C. à grandes fleurs (F). Dog-wood, Flowering dog-wood (E). Bluman Hartriegel, Hartriegel (D). Corniolo florido (I).

شجرة سبروتية تملو من ١٢ م. إلى ١٢ م. أوراقها متقابلة تطول نحو ١٦ سم. وتعرض ٨ سم. نصلها ذات الزمام الأخير، مذهب البصصة، خلى الصفحة السفلى، سداسية أو سداسية العروق المزدوجة. أزهارها وردية اللون، كبيرة القنابات الحامضة. ثمارها زيتونية القند والشكل، جوية اللون، حاضرة، مأكولة.

٢١٩٩٢ - قُرْنُوسٌ قَلِيلُ الْعُرُقِ

*Cornus paucinervis* (S). Cornouiller paucinerve (F). جنبه صيرة تملو نحو ٢٠٠ سم. أثمارها رابعية التضلع، زباه اللحاء. أوراقها متقابلة، صغرة، ضيقة، نصلها يطول نحو ٥ سم. عروقه ثنائية أو ثلاثية الاضلاع، خلية البشرة من الجهة السفلى. أزهارها بيضاء اللون. ثمارها رقيقة الشكل حصى القند، حراء القشرة واللباب، حاضرة الطعم، مرة المذاق.



قُرْنُونٌ



٢٢٠١٤ - قُرَيْس هي الصابونة ، اطلمها .

٢٢٠١٥ - قُرَيْسِيَّات

هي الصابونيات ، فصيلة اسماك بحرية ، اطلمها .

٢٢٠١٦ - قُرَيْص *Ortie (F)* هو القراص ، اطلمه .

٢٢٠١٧ - قُرَيْص أَحْمَر *Lamier pourpre (F)* هو اللاميون الأرجواني ، اطلمه .

٢٢٠١٨ - قُرَيْص الْحَجُوز *Ortie brûlante (F)* هو القراص المحرق ، اطلمه .

٢٢٠١٩ - قُرَيْص رُومَانِي *Ortie à pilules (F)* هو القراص الكروي ، اطلمه .

٢٢٠٢٠ - قُرَيْص \* وُيُونَا *Urena (S)* *Urena, Herbe aux paniers (F)* *Indian mallow (E)* *Urena (D)* *Urena (I)* .

جلس نباتات جنينية ليلية من فصيلة الحبابيات ، أعطائها بلاد الشرق . أنواعها المزروعة اربعة ، سوقها منتصبة . اوراقها مصفحة متعاقبة ، نصلها مستعرض الشكل ، خلسي الفصوص . جابد الصفحة . ازهارها فردية التجميع ، ابطينة الاذنكار ، خلسية التركيب || ذرع لايانها الخشنة المثنية الشائمة الاستعمال الصناعي .

٢٢٠٢١ - قُرَيْق *Coryphaena (S)* *Coryphène (F)* *Dolphin, Dorado (E)* .

جنس اسماك بحرية من الاسقمريات شاتكانت الزعانف ، أنواعه المعروفة نحو ١٥ أعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . جميعها من الاسماك اليمية || اجسامها اهليجية الشكل ، كبيرة اللد ، تطول من ٨٠ الى ١٦٠ سم . أنواعها متعلقة الالوان المتباينة تكثر فيها الربعة القصبية المنقطة بالاخضر والاصفر الذهبي . زعانفها الظهرية قاطبة ، الذيلية قارئة او وعيدة الفلقة || لحومها جيدة الصنف مرغوب فيه .

٢٢٠٢٢ - قُرَيْق مَوَاكِب \*

*Coryphaena pompilus (S)* *Coryphène pompile, Lampuge, Sourcil d'or (F)* *Pompil (E)* .

نوع من القُرَيْق . سمكة بحرية بيوض . أعطائها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي والهادي || جسمها اهليجي الشكل يطول من ٨٠ الى ١٠٠ سم . ثوبها الى الشهية الزيتية المنقطة بالاخضر والاصفر الذهبي . غورها الى الحضانة الانسى الاسف الملاج ، رأسها معدن الجرم ، قصير الخلع المستدير . صيها كيرتان . حاجباها مذهبان . زعنفتها الظهرية قاطبة . الشرجية مستطيلة رفيعة . الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٢٠٢٣ - قُرَيْن *Cornicule (F)* *Cornicle (E)* . هو السرك ، اطلمه .

٢٢٠٢٤ - قُرَيْسَا *Ambrevade (F)* هي الكنجوس الهندي ، اطلمه .

٢٢٠٢٥ - قُرَيْسَة هي الماروسية الزراعية ، اطلمها .

٢٢٠٠٣ - قُرُوح

النخلة للماء الطويلة التي انجد كرمها ج . قراوبح .

٢٢٠٠٤ - قُرُوة المَلْفُوف \* و فَيْق المَلْفُوف

*Plasmiodiophora brassicae (S)* *Hernie du chou, H. des crucifères, Maladie digitale, Gros pied (F)* *Clubroot of cabbages (E)* *Kohlhernie, Kohlkropf (D)* .

وصم فطري يترى معظم الصليبيات واخصها الملقوف . شعث مركب من الجذور فيسبب فتق التسج وارتفاخها . الموالب التي تنشط انتشاره وفكته : ثربة متدجعة وحرارة معتدلة ورطوبة تفوق ٩٠ ٪ || وكأنها يظهر القباد والثرية ويستبدال الثرية المتدجعة والمواقع الرطبة بغيرها اقل انتشاراً ورطوبة .

٢٢٠٠٥ - قُرُود دَيْمِيَّة \* أَقْرَام القُرُود

*Hapalidae (S)* *Arctopithèques, Hapalides (F)* *Arctopitheci, Hapalidae (E)* *Krallenaffen (D)* .

فصيلة قرد من الخنازير موطنها امريكة الوسطى والجنوبية . أنواعها المعروفة ٢٨ تنضم الى جسيين : الميلاس والهيلال . اجسامها مسنونة اللد ريمة ، اذنانها جنتلة مستطيلة . اثنواها سوية الالوان ، وافرقة الشعر التأثير المستطيل . تعيش حياة السناجب . جماعتها كبيرة العدد . قوتها الفأر والحشرات اثنائها تنضم من جرو الى جروين وربما ثلاثة .

٢٢٠٠٦ - قُرُود ذَيْنَالَة \* قُرُود مَدَنِيَّة

*Cercopithecidae, Cercopithèques (F)* *Cercopithecidae, Cercopithecus, Tailed apes (E)* *Meerkatzen (D)* .

هي المجرسيات فصيلة قرد من سفليات المنخرين تشمل ستة اجناس : المجرس والحودل والملاكك والشديم والقشة والقرودح .

٢٢٠٠٧ - قُرُوس *Bar (F)* هي القاروس سمكة مأكولة من القرشيات .

٢٢٠٠٨ - قُرُوس مَبْدُول *Loubine vulgaire (F)* سمكة بحرية تدعى قاروس مبدول ، اطلمها .

٢٢٠٠٩ - قُرَيْة التَّمَل *Fourmillière (F)* *Ant-hill (E)* هي جرثومة التمل حيث يبيت ويتكاثر ويخزن الغذاء . وتسمى ايضاً للزربة والمنضلة .

٢٢٠١٠ - قُرَيْث *Anguille (F)* هو الانقليس ، اطلمه .

٢٢٠١١ - قُرَيْثِي الشَّكَل *Anguilliforme (F)* *Anguilliform (E)* .

نمت ثمريني يطلق حل كل حيوان مائي او قارب شكله كالقُرَيْث أي الانقليس .

٢٢٠١٢ - قُرَيْدَس *Crevettes (F)* هو الارايان ، اطلمه .

٢٢٠١٣ - قُرَيْدَسِيَّات *Carididae (S)* *Caridides (F)* *Carididae (E)* .

فصيلة حيوانات بحرية من القشريات المشاريات الاقدام . اجناسها واناها كثيرة العدد . أعطائها بحار الملاج . جميعها صغيرة اللد ، مستطيلة الشكل ، منقعة المؤخر .



قُرُوة المَلْفُوف



قُرَيْص



قُرَيْن مَوَاكِب

## ٢٢٠٢٦ - قَرِينَة ، شَيْبَة

Adminicule, Présomption, Contexta (F). Presumption, Context (E).

عنصر من عناصر الاليات قد لا تقوم به الحية تماماً ولكنه يساعد .

## ٢٢٠٢٧ - قَرِينَة عَدَم التَّمْيِيز

Présomption de non-discernement (F). Presumption of not discernment (E).

قَرِينَة قانونية يستدل بها ما إذا كان القاصر الذي اقترف جريمة أي أو لا يمي مسؤولية جرمه . وفي القانون اللبناني إذا لم تتجاوز سن القاصر المحرم ثلاث عشرة سنة عوقب بتأديبه ورقابته .

## ٢٢٠٢٨ - قُرَاح

مرض يصيب النمل فينبأ ويذهب بلذرها .

## ٢٢٠٢٩ - قُرَاحِي \* Iridescent (F). Iridescent (E).

نمت تعريفية يوصف به الشيء الذي يعكس ألوان قوس قزح .

## ٢٢٠٣٠ - قُرَحِي ، قُرَحِي

Irid (F). Iridescent, Irid (E).

نمت تعريفية يطلق على ما كان لونه كألوان قوس قزح .

## ٢٢٠٣١ - قُرَحِيَة

Iris (F). راجع حلقة .

## ٢٢٠٣٢ - قُرَع

Alto-cumulus فوج من السحاب الميذب البعيد الارتفاع . وهو من النجوم الماطرة . القطعة من قزعة .

## ٢٢٠٣٣ - قُرَع \* Deverra (S). Deverre (F).

جنس نباتات شبيهة معمرة بيرة من فصيلة الخيميات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من ثبوت بعض مراحل البصر الابيض المتوسط || سطوها فروع قليلة الازواك أو عديماتها . والازواك عند وجودها في بعض الانواع تكون متعاقبة ، مركبة وريشة التفصيل . ازهارها صويالي التجميع . ازهارها متباينة الالوان منها الابيض والبنّي والاصفر والاعصر الاصفر . تنويرها ربيعي .

## ٢٢٠٣٤ - قُرُول \* Polyypier de Corail (F).

Polypary of Coral (E). القزول وكثرة البسد ، أي المرجان ، حيث تنشب المدينة .

## ٢٢٠٣٥ - قُرَي \* Séricicole (F). Silk-producing (E).

نمت تعريفية يطلق على ما هو شخص يتربيه ديد القز .

## ٢٢٠٣٦ - قُرَبَات Bombycidae, Liparidae (S).

Bombycidae, Liparidae (F). Bombycidae, Liparidae (E). فصيلة حشرات من حشرقيات الاجنحة اجناسها وانواعها كثيرة العدد . فرائشاتها متوسطة الحجم ، خليطة الجسم ، عديمة الخطم ، قصيرة الحياة ، لا تتنلى . اجناسها كثيفة المرافشات الزباء . ورائشها الى الياض الاخير تعلمو رشفة سمره خفيفة . قزونها الاستعمارية شطية مزدوجة || مكها كروي الشكل ، فري المنح ، ورقاتها كبيرة القد لمسا الجلود وحيدة القرن الترسجي . خادراتها تقتلف بشرافق حرورية المحيط || اشهر اجناسها القزرة .

## ٢٢٠٣٧ - قُرَيَة ، بُمْبِيكْس Bombyx

جنس حشرات قزاشية من فصيلة القزيات . انواعها عديدة منظها غار وبضها اقتصادي . نافع كعيدة القز . اشهر انواعها ما يلي .

## ٢٢٠٣٨ - قُرَيَة اخْزِر \* قُرَيَة الثَوْت

Bombyx mori, Sericaria mori (S). Bombyx du mûrier, Ver à soie (F). Silk-moth, Silk-moth worm (E). قزاشة من القزيات متوسطة القد لا تدره لها حل الطيران تعيش نحو عشرة ايام . تسافه بعد اليوم الرابع . اناتها تبيض بعد السفاد بنحو ٢٤ ساعة . زين مشها يشمر من يوبين الى ثلاثة ايام . عدم مكها لا يقل عن ٥٠٠ يعرف عنه المربين (بالبور) || جسمها ثخين حرشي . طولها نحو ٣ سم . ويصطبها ٤ سم . زبابانها شطية مزدوجة . ثوبها الى الياض الاطلل كملو مائة سفراء . تحصل على الجناحين الامامين بعض الطلوط المتفرعة السمره اللون . لا تافق خارجي بين الذكر والانثى سوى الحجم فالانثى اكبر وغلظ من الذكر . مكها كروي الشكل يبدو اصفر اللون . عند متحه ، ثم ينحرف الى اليسرة ويسود قبيل التلقف || البقرة تفرغ بدودة الحرير ، اطلبها ، براوح طولها عند تمام انسلخاتها من ٧ الى ٩ سم . جسمها مائل البشرة . وأسها صغير القد اسود اللون . قزها الترسجي دقيق ومهدب . ثوبها الى الياض الاغبر . يملو حلقات جسمها من جانبيها سمات سود تسمى سمام التسم وتليفتها التفس || ضرورها عيدة فوارقها الحجم والتوب وقدر الشرفة ولونها وشكلها .

## ٢٢٠٣٩ - قُرَيَة اخْزِر \* بُمْبِيكْس اخْزِرَة

Bombyx ricini, B. arrindia, Attacus arrindia (S). Bombyx du ricin (F). موطنها البلاد الحارة اخصها الاسيرية . ترى حل ورق الخروع . صلجتها متوسطة الحجم والامتص . حريرها اغبر اللون .

## ٢٢٠٤٠ - قُرَيَة اخْزِر \* بُمْبِيكْس اخْزِر

Bombyx cecropia, Saturnia cecropia (S). Bombyx du prunier, Ver à soie du prunier (F). موطنها بلاد امريكا الجنوبية . ترى حل ورق الخوخ والزعرور . صلجتها متوسطة الحجم ، حريرها قوي المحيط ، غلظ ، اسر اللون .

## ٢٢٠٤١ - قُرَيَة السِّنْدِيَان \* قُرَيَة البَلُوط ، بُمْبِيكْس السِّنْدِيَان

Bombyx mylitta, Saturnia mylitta (S). Bombyx du chêne, Ver à soie du chêne (F). موطنها الهند . ترى حل ورق السنديان . صلجتها صغيرة لثة مستطيلة . حريرها براق المحيط متوسط الصنت .

## ٢٢٠٤٢ - قُرَيَة السِّنْدِيَان الْجَزَارَة \* بُمْبِيكْس السِّنْدِيَان الْجَزَار

Gnethocampa processionnea (S). Bombyx processionnaire du chêne (F). Oak processionary caterpillar (E). Eichen-Processionsspinner (D). حشرة ملقولة قزبة في جميع البلاد المعتدلة الحارة . رقبها سمره اللون . كثيفة الملب . لسها سيج الجله كالقزاس . تركب اوزا السنديان على اختلاف انواعها فتقرضها وتؤذيها .



قزرة الحرير



قزرة الخوخ



قزرة السنديان



قزرة السنديان الحارة

المائل || السرة تطول من ٢٢ الى ٣٨ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، كثيف الغلب القصير ، مبهر الغلب الطويل القوي التجميع . اطحل اللون ، اريد الموج ، يملؤ غط ليجي ابيض وسطان جانبيان احمران وغطان متغلطان اصفران . رأسها جوزي اللون . مدنها ورواجها الى السرة || طول الاكسال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقص ضمن صلجة تحبها على النبات المائل .

#### ٢٢٠٤٧ - قَوَّاةُ الْكَرَزِ \* ، مُمْبِيكْس الْكَرَزِ

*Porthesia similis* (S). *Bombyx cul doré* (F).  
*Gold-tailed moth* (E). *Schwan* (D).

حشرة من القزليات يرقها شجرة تركب اوراق الكرز والنفاح تغرضها وقد تقضي عليها .

#### ٢٢٠٤٨ - قَوَّاةُ شَارِدَةِ \* ، مُمْبِيكْس شَارِدَةِ

*Liparis dispar*, *Lymantria dispar* (S). *Bombyx disparata*, *Spongileus* (F). *Gipsy moth*, *Gypsy moth* (E). *Schwammspanner* (D).

حشرة من القزليات يرقها شجرة تركب اوراق الاجنار الحرجية وللشجرة اخصها السديان والصفصاف والنفاح .

#### ٢٢٠٤٩ - قَوَّاةُ مَبْرَقَةِ \* ، مُمْبِيكْس مَبْرَقَةِ

*Liparis monacha* (S). *Bombyx nonne*, *Nonne*, *Bombyx moine* (F). *Nun moth*, *Black arches moth* (E). *Nonne*, *Fichtenspanner* (D).

حشرة مبدلة مولها للبلاد المشتلة الحارة . يرقها شجرة تركب اوراق عدة نباتات اخصها اجنار الفصيلة للصنوبرية

#### ٢٢٠٥٠ - قَوَّاةُ يَمَامَايَ \* ، مُمْبِيكْس يَمَامَايَ

*Bombyx yamamai* (S). *Bombyx yamamai* (F).  
حشرة من القزليات مولها الصين . ترى على ورق السديان ، صلجها متوسطة القد ، حررها جيد الصنف نعين الخيط .

#### ٢٢٠٥١ - قَسَابَةِ \* ، رَدِي التمر .

#### ٢٢٠٥٢ - قَسَاحَةِ \* ، رَتْرَاقِيَّةُ (F). Retractility (E).

القَسَاحَةُ قابلية الانقباض .

#### ٢٢٠٥٣ - قَسْبَارِيَّاتِ (F).

سبط من فصيلة السبائيات . اجناسه وانواعه عديدة جميعها اجنار وجنيات . اصطناعها للبلاد الحارة اخصها امريكا الجنوبية . بعض انواعها طلي دافع للحيات .

#### ٢٢٠٥٤ - قَسْبَارِيَّةُ الْحَمِي \* ، قَسْبَارِيَّةُ قَسْرُوْلَا

*Cusparia febrifuga* (S). *Cusparie* (F). *Cusparia* (E).  
*Cusparbaum* (D). *Cusparia* (I).

شجرة من القسباريات . ساقها منتصبه فروع تملو من ٧ الى ١٥ م . اوراقها عابلة ، متيقة ، متعاقبة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات . ازهارها عنقودية التجميع ، يضاء اللون ، خلسة البلات ، جبلة الشكل ، متعاقبة العرف . يزورها سد احادية || لحاء الشجرة عطري رائحة غزير المركبات المعالة ينتشر منه مادة القسبارين التي تعتبر من المقويات المرموقة ومن دوائج الحيات المشهورة .

#### ٢٢٠٥٥ - قَسْتُ \* ، قَسْلُسْ

*Costus* (S). *Costus* (F). *Costus*, *Kust-root* (E). *Kostuspflanze* (D). *Costo* (I).

جنس نباتات جذمورية عشوائية برية وزراعية من فصيلة الزنجبيليات . انواعه المعروفة ١٥ منها المناطق الحارة .

#### ٢٢٠٤٣ - قَوَّاةُ الصَّنَوْبَرِ الْجَرَّارَةِ \* ، مُمْبِيكْس الصَّنَوْبَرِ الْجَرَّارِ

*Cnethocampa pityocampa* (S). *Bombyx processionnaire du pin* (F). *Pine processionary caterpillar* (E). *Pinien-Prozessionsspinner* (D).

حشرة شديدة الاذى . يرقها كيفية الغلب تركب باناق واهداب الصنوبر تنفضي عليها .



قزاة الصنوبر الجارارة



قزاة الصيف



قزاة الكرز



قزاة شاردة



قزاة مبرقة



قسبارية الحمى



قست

اوراقها خضراء ، لائقة ، متعاقبة . ازهارها كبيرة اللثة ، ناجية الاذكار ، لا قياسية التجميع منها النورية والسليبية . جلديها غنية ، كانت ولا تزال تستعمل في الثرياق .

٢٢٠٥٦ - قُسُوس  
Ciste (F).  
هو اللادن ، اطلبه .

٢٢٠٥٧ - قُسُوس لَادِي  
Ciste ludanifère (F).  
هو اللادن الاساني ، اطلبه .

٢٢٠٥٨ - قُسُوس بَرِّي  
Sisymbre (F).  
هو البشارة ، اطلبه .

٢٢٠٥٩ - قُسُوس شَامِي  
Aunée grande (F).  
هو الرأس الشامي ، اطلبه .

٢٢٠٦٠ - قُسُوسَان ، قُوس قُزَح

Arc-en-ciel (F). Rainbow (E).  
ويدهى أيضاً قوس السحاب . ظاهرة جوية تشاهد في أثناء سقوط المطر أو تنجم ألبو بقطرات الماء . ذلك ان أشعة الشمس عند مرورها خلال هذه القطرات تنكسر كما ينكسر الشعاع الضوئي النائد الى مشهور زجاجي ويتحلل الى ألوان الطيف فيشاهد في السماء قوس يتكون من الاحمر والبرتقالي والاصفر والاخضر والازرق والنيلي والبنفسجي . ويشاهد القوسان أيضاً في بعض الليالي القليلة السحب نفسه .

٢٢٠٦١ - قُسُوسَانِي  
Irisé (F).  
راجع قزحي .

٢٢٠٦٢ - قُسُوسَان  
Bétoine (F).  
هو البطونيقا ، اطلبه .

٢٢٠٦٣ - قُسُوس  
Châtaignier (F).  
هو الكتنة ، اطلبه .

٢٢٠٦٤ - قُسُوس الْأَرْضِي  
Jacinthe orientale (F).  
هو الجوزن الشرقي ، اطلبه .

٢٢٠٦٥ - قُسُوس الْمَاء  
Macre (F).  
هو السكر ، اطلبه .

٢٢٠٦٦ - قُسُوس هِنْدِي  
Marronnier commun (F).  
هو القندلي المبلول ، اطلبه .

٢٢٠٦٧ - قُسُوسَة  
Châtaigne (F).  
هي الكتنة ثمرة الكتنة .

٢٢٠٦٨ - قُسُوسُورَة ، قُسُوسُورِيوم ، قُسُوسُورِيُون  
Castoreum (F).  
هو الجندبادستر ، اطلبه .

٢٢٠٦٩ - قُسُوس  
Ciste (F).  
هو اللادن ، اطلبه .

٢٢٠٧٠ - قُسُوسُوس اِثْرِيْطِي  
Ciste de Crète (F).  
هو اللادن الاكريني ، اطلبه .

٢٢٠٧١ - قُسُوسُورَة \*  
Echiostoma (S).  
Echiostome (F). Echiostoma (E).

جنس اسماء بحرية من مفتوحات المائدة وفصيلة الزراعاتيات . انواعها المنرفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الممتدة الحرارة . مسرحها الاغوار البعيدة والجميع . تتميز بجهازها

الفسفوري المخفي . اقسامها مستطيلة الشكل ، قريبة الشبه بالرماس تطول من ٢٠ الى ٣٥ سم . رؤوسها غليظة ، مقطوعة الاطعام ، كبيرة الاشداء ، مسنة الفكين . اسنانها مستطيلة ذرية . فكوكها السفلى وحيدة الذبة . عيونها جاسطة . قشورها مائل الصفحة . زعانها الظهرية وسيدة ، صغيرة الحجم ، خلفية الاركان ، تقابل الشريسة ومثلها قداماً وشكلاً . زعانها الحوضية والبطنية خفيفة الشكل ، مستطيلة . زعانها الذيلية صغيرة فارقة . اثيوبيا الى السمره السوداء يطوها موج اسفع .

٢٢٠٧٢ - قُسُوسَة ، مَهْرُ الْجَنَّة

Iris oratoria (S). Iris orateur (F).  
حشرة غاصلة من مستعبات الاجنحة وفصيلة السرعوليات اصابها المناطق الحارة من الشرق الاوسط والاندلس واربوة الغربية وافريقية النالية . تألف البراري والمواقع الدقلة . جسمها مستطيل نحيل يطول نحو ٤ سم . قويه الى السرعة . اخضرها الموج . رأسها صغير مستعرض . عينها جاسطتان . زباناها دقيقتان مستطيلتان . قوائمها مستطيلة . الزوج الامامي مستنصف ضليح . اجنسها متدلة الطول قسطانية الالوان الزاهية الجميلة ، تلحف البطن عند الذكر ولا تلحف عند الانثى . الانثى اكبر قدماً من الذكر ورايت لونها منه . قرّر مكنا في التربة قرب جذوع النباتات .

٢٢٠٧٣ - قُسُوس

نبت كالكرس اخضر خيش الريح ينبت في سيل الماء له زهرة بيضاء .

٢٢٠٧٤ - قُسُوس  
Técanos (F).  
هو الكراز ، مرض خبيث ، اطلبه .

٢٢٠٧٥ - قُسُوس  
Division, Embranchement (F).  
Division (E).

يأتي التقسم في التصنيف العام بعد الملكية وهو يتألف من صفوف والصفوف من طوائف والطوائف من سبب والسبب من طبقات والطبقات من رتب والرتب من مراتب والمرتبات من فصائل والفصائل من اسباط والاسباط من عمارات والعمارات من اجناس والاجناس من انواع والانواع من ضروب والضروب من اصرام وسلالات ويعرّف .

٢٢٠٧٦ - قُسُوس ، قُسُوس  
Lotir (F).  
To divide into lots (E).  
جزأ الملك الى عدة عقارات تسهيل ليه .

٢٢٠٧٧ - قُسُوسَة  
Division

٢٢٠٧٨ - قُسُوسَة  
Partage (F). Sharing (E).  
عملية يقرر بها ملاكو اموال كل الشيوع ازالة حالة المشاع وتخصيص حصص مميزة لكل مالك بنسبة ما كان يملكه في عموم الاموال المنقسومة . وهذه القسمة قد تكون وقتية او نهائية وودية او قضائية .

٢٢٠٧٩ - قُسُوس ، زِينَة  
Cosmos  
جنس نباتات عشبية حولية وبمعمر من فصيلة المركبات الشماعية . انواعها عديدة جميعها زراعية تربوية . اورقها متعاقبة ثنائية التفلق الريشي ، تحورت ازهارها مزينة بالبطابح الحرفي الملون . اشهر انواعها الثلاثة التالية .



قُسُوسَة



قُسُوس

٢٢٠٩٢ - قَشَاب \* Toxicifère, Toxicophore (F).  
Toxiferous (E).  
نمت ثمريني يطلق على كل حيوان أو سمكة أو طائر يأكل مواد سامة فلا تؤذي أما تؤذي الإنسان أن أكل من لحمه.

٢٢٠٩٣ - قَشَار Pellicule, Tégument (F).  
Pellicle, Tegument (E).  
بشرة جلد الحية وسائل الزحافات التي تسلك مرة كل عام.  
٢٢٠٩٤ - قَشَامَة Relief  
هي التواء الذي يبدو على الاجسام المنبسطة.

٢٢٠٩٥ - قَشَب، قَشِين، ذَيْفَان Toxine (F).  
Toxin (E).  
كل مادة سامة، منها كانت عناصرها، تفردا الميكروبات أو البكتيريا.

٢٢٠٩٦ - قَشَب Kerria (S). Kerrie, Corète (F).  
جنس نباتات برية وزراعية تريينية من فصيلة الورديات مدها البتوق الاصفر. اوراقها متعاقبة، معتقة، ازهارها انبواسية التجميع، كبيرة القد، جميلة الشكل || اشهر انواعها التريينية قشب اليابان.

٢٢٠٩٧ - قَشَب اليابان Kerria japonica (S).  
Kerrie du Japon, Corète du Japon, Spirée du Japon, Corchorus (F). Jew's-mallow, Summer-rose (E).  
Japanischer Ranunkelstrauch (D). Kerria japonica (J).  
نوع من القشب وهو جنبة معمرة صغيرة اتقد تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. جلورها مدادة، فروصها جالسة، منتسبة، سرسجة، لامة البشرة الخضراء. اوراقها متعاقبة، صلبها يطول نحو ١٠ سم. ويعرض ٥ وهو لامع البشرة، جبل اخضر الزاهي. ازهارها فردية التجميع، ذهبية اللون، تحورها نصل وريقة الشكل سقتية اخضر || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار.

٢٢٠٩٨ - قَشْبَة \* قَشْبَة Ashbia gossypii, Nemastopora corylfi, Spermophthora gossypii, Eramothecium ashbyii (S). Stigmatomycose (F).  
وصم يصيب ثمار القطن والبرتقال والارنج واليوسفي والبطورة والفاصوليا والصوجه سببه نطر مجهرى من الفطريات يتدخل نسج القطن على اثر ونش بعض الحشرات فومطها ويعضها.

٢٢٠٩٩ - قَشَة Guenuche (F).  
Young she-monkey (E).  
هي النسية الصغيرة اي القردة الاثني النتية.

٢٢١٠٠ - قَشَة Cynopithecus niger (S).  
Cynopithecus niger, Singe à toupet (F).  
قرد وحيد الجنس والنوع من فصيلة المجرسيات. مركزه بين الماكاك والقردوس. جسمه يطول نحو ٩٥ سم. ويرتفع ٥٠ سم. ذنبه جدمة طوطا ٢٠ م. ثوبه الى السواد القاتم. شعره قصير، ناعم، احمى، وجهه جزوى اللون. راسه مكمل بشعفة منتسبة حدية الشعر || قوته الثار والحبوب والجذور والحشرات. انشاء تسع جروا واحدا ترعسه نحو ٦ شهور.

٢٢١٠١ - قَشْدَة \* قَشْطَة، كَشَا، قَشْدَة، كَشْدَا، كَشْدَا Crème (F). Cream (E).  
مادة صمينة في الحليب تسلك عنه بالفرز الحلي (الميكانيكي)

٢٢٠٨٠ - قَشْسُ جُؤُوي، اُصَالِيَا كُشْمُوس Cosmos atrosanguineus (S). Cosmos rouge-brun, Dahila zimapani (F).  
حشبة تريينية سرورية معمرة تملو نحو ٦٥ سم. جذرها جنبي غليظ، ساقها منتسبة فراءه. اوراقها فردية التشرج. ازهارها حشكوية التجميع، تحورها الزهرية جؤوية الطباب. ازهاره يستمر من تموز الى تشرين.

٢٢٠٨١ - قَشْسُ كَبْرِيّ Cosmos sulphureus (S). Cosmos jaune soufre (F).  
جملة تريينية سرورية معمرة تملو من ١٥٥ الى ٢٥٠ سم. ساقها فراءه زباه. اوراقها سنائية التشرج مهدبة. ازهارها فردية متتابعة، تحورها الزهرية كبرية الطباب والسينات. ازهاره يستمر من آب الى تشرين الاول.

٢٢٠٨٢ - قَشْسُ مُزْدَوِج الرئش Cosmos bipinnatus (S). Cosmos bipinné (F).  
حشبة تريينية سرورية حولية تملو من ٤٥ الى ١٢٥ سم. ساقها منتسبة فراءه فناء. اوراقها مزدوجة التشرج الرشي. ازهارها فردية التجميع. تحورها الزهرية صفر الطباب، ودية السنات قشرا نحو ٦ سم. || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول.

٢٢٠٨٣ - قَشِيل Lionceau (F). Young lion (E).  
وله الاسد لم يبلغ الحول.

٢٢٠٨٤ - قَشُور \* Chasmanthère (F).  
جنس نباتات برية طيبة عارضة من فصيلة القرميات. انواعه عديدة اصطناعا البلاد الاستوائية والحارة. سوقها متسقة تطول من ٣ الى ٧ امار. اوراقها معتقة، كفة، خالصة التخصيص. ازهارها حشوية سداسية التركيب. جلورها طيبة يستخلص منها يهد التجهيف والسحق مادة الكوليين ومادة البر برين. واحدة قشورة.

٢٢٠٨٥ - قَشُوس Iris à l'ail (F).  
هو السون المنتر، اطلبه.

٢٢٠٨٦ - قَشُوس هو شاي المروج، اطلبه.

٢٢٠٨٧ - قَشُوس مُسَلَّق Lierre commun (F).  
هو الشقة المبلولة، اطلبها.

٢٢٠٨٨ - قَشِيج Rétractile (F). Retractable (E).  
نمت ثمريني توصف به الاعضاء القابلة الانتشار والانقباض.

٢٢٠٨٩ - قَشِيمَة ضَامِيَة هي مند الحزن، اطلبه.  
٢٢٠٩٠ - قَشْر Paille (F). Straw (E).  
هو قشب الزرع اليابس الذي يصبح تينا بعد درسه.

٢٢٠٩١ - قَشْ السُت Glut (F).  
Straw for thatching (E).  
هو قشب السلت اليابس يتمثل كراباط. وقد يتمثل في ثفلت قناني الحمر وما اشبه لفظها من السطب عند الصدم.



قشور



قشب اليابان



قشب



قشة

وقشورها عديدة المنائم والقوالب الصحية || انواعها الزراعية المأكولة الثأر نحو ١٢ اشوها ما يتبع :



نشطة

### ٢٢١١٦ - قِشَّة سَهْبِيَّة \* - قِشَّة مَكْمُونُزَا

Anona squamosa (S). Attier, Anone caillouze, Pomme-cannelle (F). Custard-apple, Sugar-apple, Sweet-sop (E). Honigapfel, Zuckersapfel (D). Anona scallous, Pomo cannella, Mela cannella (I).

نوع من القشطة، تصنيفه يأتي بعد الشريموليا. ثمرته تشبه التفاح شكلاً وألواناً وهي تملو نحو أربعة أمتار. اورانها بيضية النصل مستطيلة، ازهارها مستقيمة اللون، ثمارها كأكواز الصنوبر، لبها ابيض المادة غزير المصارة السكرية، بذورها سود كبيرة.



قشطة سهبية

### ٢٢١١٧ - قِشَّة شَائِكَة \*

Anona muricata (S). Corossoller, Anone hérissée, Corosol épineux (F). Sour-sop, Prickly custard-apple (E). Sauresobbe, Sorer blissen (D). Anona spinosa, Casimentaria (I).

نوع من القشطة، ثمرته متوسطة الحجم. اورانها مستطيلة، ملساء، لامعة، شديدة الخضار، فريدة اللون. ازهارها قصيرة القند، غليظة الشكل، ثمارها كبيرة مستطيلة، شكلها شكل كوز الصنوبر جرفاته ناضرة مرفوعة شائكة. أما طول الثمرة فيراوح من ٢٥ الى ٣٠ سم. وزنها من ٨٠٠ الى ١٠٠٠ غرام. قشورها صميكة، واتينية اللون، حامزة المذاق، لبها ابيض اللون، حلو الطعم لا تخلو من الحاموضة المستعجة.



قشطة شائكة

### ٢٢١١٨ - قِشَّة شَبَكِيَّة \*

Anona reticulata (S). Anone cœur de bœuf, Cachimau (F). Bullock's heart, Common custard-apple (E). Gustardapfel, Rahmapfel (D). Anona cuore di bus (I).

نوع من القشطة، تصنيفه يأتي بعد السكامورا. ثمرته كبيرة الحجم تملو نحو ثمانية أمتار. اورانها مستطيلة زغبية الصفة السفل. ازهارها كبيرة، بيضاء اللون يشوبها شيء من الخضار. ثمارها كبيرة القند، قليلة الشكل. قشورها الى الصفار الناري. لها جامد المادة، متوسط الصنف، ابيض اللون او احمر.



قشطة شبكية

### ٢٢١١٩ - قِشَّة شَرِيمُولِيَا \*

Anona cherimolia (S). Chirimolier, Chirimoyer (F). Chirimoya, Purple-apple (E). Chirimoya, Purpurapfel (D). Anona cherimolia (I).

نوع من القشطة وهو أجودها صفواً، ثمرته صغيرة القند تملو نحو خمسة أمتار. اورانها بيضية لضاء، زبابة، جميلة الخضار. ازهارها عمورية متدلية، بتلاتها مستطيلة الشكل بيض الصفة العليا الداخلية، خضر السفل الخارجية. ثمارها ردهاء اللون حجمها حجم البرتقال. لبها عاجي المادة، غزير المصارة، عذب المذاق، لذيق الطعم، فواح الطعم المستعجب.



قشطة شريموليا

### ٢٢١٢٠ - قِشَّة مُنْبِيَّة \*

Anona palustris (S). Corossoler des marais, Corosol des marais (F). Alligator apple, Cork wood (E). Alligatorapfel, Wasserpapfel (D). Anona di stagno (I). نوع من القشطة يوجد في الاماكن الرطبة. ثمارها صغيرة القند قليلة الشكل، عادية الصنف، غبراء الالباب الزنبر المصارة المعتدلة الحرارة.

نظراً لخصتها الدسيسة. وهي دسمة، للذقة الطعم، بيضاء اللون. ومنها تستخرج الزبدة بعد غسها.

### ٢٢١١٢ - قِشَّة هِنْدِي Cavequi (F).

هي البرساء الهندية، أطلها.

### ٢٢١١٣ - قِشَّيَات Annonacées (F).

هي القشطات فصيلة نباتية، اطلها.

### ٢٢١١٤ - قِشْر Ebossage (F).

هو تقشير الحبوب لاسب البزور.

### ٢٢١١٥ - قِشْر، حِثَاء، قِرْف، قِلْث Ecorces (F). Barks (E).

هو في النبات الجزء الخارجي الذي يلف الخشب من الجذور والسوق والاغصان والاغصان.

### ٢٢١١٦ - قِشْر Lacté (F).

جنس اسماك ثورية تدهى لاطس.

### ٢٢١١٧ - قِشْر حِثْرَ Cascarille (F).

هو الكروتن الحثري، اطله.

### ٢٢١١٨ - قِشْرَان Ailes de sauterelles (F).

Wings of the locust (E).

جانحا الجرادة اليرقان كالنشاء الشفاف.

### ٢٢١١٩ - قِشْرَكَة Pellicule (F). Pellicle (E).

غشاء الشيء، حلقة او حراً. ج قشر وقشور.

### ٢٢١٢٠ - قِشْرِي Cortical

نمت تعريتي يطلق على كل ما له صلة بالقشور او يشبهها.

### ٢٢١٢١ - قِشْرِيَات Crustacea (S).

Crustacés (F). Crustacea (E).

صف حيوانات منفصلة مائية عديدة الرتب والصفات ولاجناس، التي تنضم الى طائفتين: حشريات الصدف وليئات الصدف.

### ٢٢١٢٢ - قِشْرِيَات دُنْيَا Crustacés inférieurs (F). Inferior Crustacea (E).

طائفة من القشريات كانت تدعى في التصنيف السابق «حشريات الصدف».

### ٢٢١٢٣ - قِشْرِيَات عَلْيَا Crustacés supérieurs (F). Superior crustacea (E).

طائفة من القشريات كانت تدعى في التصنيف السابق «ليات الصدف».

### ٢٢١٢٤ - قِشْقَة Crème (F). Cream (E).

هي القشدة، المادة السنية في الحليب.

### ٢٢١٢٥ - قِشْقَة \*، قِشْدَة Anons (S).

Annona, Anone (F).

جنس نباتات يوية وزراعية من فصيلة القشطات. انواعها نحو ٥ جميعها اثمار وجفريات وجينات. اورانها متعاقبة، مستقة، بيضية او اهليلجية. نصلها جامد الصفة، بارز العروق. ازهارها فردية عمورية او جامعية تاجية. ثمارها كروية لحمية || معظم انواعها البرية طعمي. اورانها

تركب جلود وسوق التجليات اخصها الشعر والثرفان والدخن والذرة .

## ٢٢١٢١ - قشريات ، قشيبات

Anonaceae (S). Annonacées, Anonacées (F).  
Anonaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الملقطين عديدة الغلات . اجناسها المعروفة ٣٠٠ أنواعها نحو ٣٢٠ . اصلها البلاد الحارة . منها الاجنار والصعيرات والجنبات ، اورانها معتقة ، متعاقبة ، بسيطة ، ازهارها ثلاثية التركيب او سداسية . ثمارها اكواز خبثية ، يزودها دهنية .



قشام ارش

## ٢٢١٢٢ - قشيبان اُزْبَع

*Dascillus pubescens* (S). *Dascille pubescent* (F).  
*Dascillus pubescens* (E).

حشرة واشمة خاضعة من فصيلة القشيبانيات روتية منفذات الاجنحة . تألف الموائل القريبة من الماء . خنافسها تعيش على ازهار الصبوانيات . يرقاتها تركب جلود النباتات التي تنمو في الاراضي الرطبة || جسمها صغير القد يطول من ١٠ الى ١٢ سم . ثوبها الى الوردية الخنطية الموج . رأسها صغير الحجم . فكها ضليمان . عينها صغيرتان زباناها غطيتان ، مستطيلتان . ظهرها مستدير الطرف اللامع ، بين التضخيد الغدي القاطب . ارساغها خاسية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار تسامد بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع . تمتع المكان تحت الجملانة والمبل وبين اشطاء الاغشاب الحولية || البرقة عند بلوغها الادراك الجسودي تطول من ١٦ الى ١٩ سم . جسمها مدني الشكل ، سداسي الرواجب القصيرة ، اغبر اللون اصفر الموج ، اسمر الرأس ، ضليع التأثير الفكية || طول الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما ينقضي في التربة تحت الجملانة او تحت ارومات النباتات المشبية .

## ٢٢١٢٣ - قشام ، قشيبان

جنس طير من الكواس وفصيلة التريبات . انواعه ثلاثة جميعها كبيرة القد ، رؤوسها مستطيلة غفيرة ، محاسرها ضلع . صيبتها سود المقل ، صفر الاسحاق . مناسرها قصيرة ، خيلقة ، منققة الجهر . اعناقها مستطيلة غفيرة . سراقها كبيرة شارفة . اذنانها قصيرة || والقشام شرس الاخلاق قوي التشكيب جسدو يطول على جميع انواع النصور التي تنابه ونحشاء . طيرانه متدل القوط يفرق بسرعة سرعة جميع النصور لكنه لا يجاري المتحان . يألف الحياة الجاهية ، سره يمد من ١٠ الى ٥٠ قوته الجيف . مأواه الجبال النائية .



قشام اكلف

## ٢٢١٢٤ - قشام اُرْتَش \* قشبة

*Gyps rupellii* (S). *Gyps de Ruppell, Vautour-épervier* (F).

طائر من القشام طول نحو ١٥٠ سم . بسطته نحو ٢٧٥ سم . ثوبه الى السمرة الزاهية . عنقه اسهب . طوق جزؤيته طويل الزغب اغبر اللون ، ظهره وبطنه وباطن مقطبه ونخذه الى السمرة . ظاهر مقطبه الى الرقعة الموشمة يطولها تجذيع ابيض متفرش || موطنه البلاد الافريقية . يطن وكرو في اوتاب الصغور الفسحة . الانثى تبيض رفته واحدة تحضنها بمناوبة الذكر نحو خمسة اسابيع . سره يمد من ٤٠ الى ٥٠ .

## ٢٢١٢٥ - قشيبانيات

*Dascillidae* (S). *Dascillides* (F). *Dascillidae* (E).

فصيلة حشرات من خنديات الجنج اجناسها واتواعها عديدة جميعها ست عمارات . اصلها العالم جميعها ثارية خاضعة . اجسامها مستطيلة الشكل ، متوسطة القد او صغيرة .

## ٢٢١٢٦ - قشمر

*Concombre serpent* (F).

هو قشام ، اطليه .

## ٢٢١٢٧ - قشام اكلف \* عتق

*Gyps fulvus* (S). *Gyps fauve, Vautour fauve, Griffon* (F). *Griffon-vulture* (E).

طائر من القشام طول نحو ١٢٠ سم . بسطته نحو ٢٧٥ سم . ثوبه الى الكلفة الغبراء زخرف في الظهر وتبين في البطن . سقله اائل كبير تفرغ الغطوط يبيض || اعنانه قسيمة الارباء تمتد من اشدن الى الوراء وافرغية النبالية والشرقية || يطن وكرو في صنوع اللصوص الشائعة الموشمة . الانثى تبيض رفته واحدة تحضنها بمناوبة الذكر نحو خمسة اسابيع . سره يمد من ٣٠ الى ٥٠ وهو من الطيور التواضع .



قشام هندي

## ٢٢١٢٨ - قشقرش \* ، حسان المتوسط ،

### هبة المتوسط ، تركك

*Atherine hepsetus* (S). *Athérine de la Méditerranée, Saulet* (F). *Silvride, Sand smelt* (E).

سمكة بحرية يبيض من فصيلة الحسانيات شاكاتك الزعانف اصلها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تتميز من امحاك النفاث . مسرعاها المنحاد والشطوط || جسمها شبه وشي الشكل يطول من ١٠ الى ١٥ سم . ثوبها الى الشبه يطولها في جانبتها تمشيع ازيق ومواج فهي يسمر في الظهر ويغير ويبيض في البطن || رأسها معتدل الحجم ، يرمي الشكل ، فكها السفلي يتقدم العلوي بعض الشيء . عينها كبيرتان ، مستديرتان ، جاحظتان . زعانفها نظامية التركيب . زعنفتها الابدالية فارقة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

## ٢٢١٢٩ - قشام هندي \* هوزب

*Gyps indicus* (S). *Gyps des Indes* (F).

طائر من القشام طول نحو ١١٠ سم . بسطته نحو ٢٥٠ سم . ثوبه الى السمرة القاتمة . عنقه اسهب . سقلها جملدان بلخني ويطولها غط ابيض متفرش . ذنبه مجذع بالابيض . موطنه جبال الهند وجوارها . انثاء تبيض رفته واحدة . سره يمد نحو ٢٠ .



قشبان

## ٢٢١٣٠ - قشيبان

جنس حشرات من فصيلة القشيبانيات انواعه ١٢ اجسامها اهليلجية الشكل مفلطحة ، قرونها الاستشعارية خبيلية ، مستنة ، مركبة من ١١ فاصلة . سدافرها ضيقة . بطونها خنسية الاقسام . اوتابها سوية الالوان يكثر فيها الالوان الرمادي . اتحادها مخددة خلية || خنافسها ورقانة

## ٢٢١٣١ - قشلب

جنس نباتات عشبية سولية من فصيلة المركبات الانبوية الزهر . سوقها غبراء تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم . قرونها متعاقبة فرقة . اورانها مغرفة خلية التصل على فصعته . ازهارها رؤوسية ، عطرية العرف ، صفر الطياب والصبغات النائية الصف || اشهر انواعه قلب الجزيرة .



قشقرش

## ٢٢١٣٢ - قُصْبُ الجَزِيرَةِ ، أَفْحُوَانُ الجَزِيرَةِ

Cladanthus arabicus, Anthemis arabica, A. prolifera (S). Cladanthus d'Arable (F).

نوع من القُصْبِ الحولي يملو نحو ٧٠ سم. ساقه كثيرة الفروع المتعاقبة الفرقة . أوراقه لسنة التبريض . خلية النصل . أزهاره عديدة ، صفراء اللون ، فواصة العرف . ازهاره يستمر من حزيران إلى ايلول .

## ٢٢١٣٣ - قُصْبُ

Lit d'un ruisseau (F).

Brook bed, Stream bed (E).

القُصْبُ مجرى النهر وبهم من قال سيله .

## ٢٢١٣٤ - قُصْبِيَّة

Chloroea andive (F).

واحدة القُصْبِيَّة ، بقلة مشهورة تعرف بالهتنب ، اطليه .

## ٢٢١٣٥ - قُصْبَةٌ

هي القُصْبَةُ ، اطلبها .

## ٢٢١٣٦ - قُصْبُ

Légume sec (F).

Dried vegetable (E).

القُصْبُ ج ثُغْرُ هي البقول الناشفة . القُصْبُ منها كالبايسا أو الهبي كاللوب والعدس والحمص والفاصوليا .

## ٢٢١٣٧ - قُصْبٌ ، قُصْبُ

Sternum

هو في الطير عظم مقدم الصدر الذي يرتكز عليه هيكل القُصْبِ الجُشْشِي .

## ٢٢١٣٨ - قُصْبَاة

Boucherie (F).

هي سَنتَةُ القُصْبِ أي الجِزَار . Butcher's shop (E).

## ٢٢١٣٩ - قُصْبَاة

Tubicoles (F).

Tube-worm (E).

اسم يطلق على الخلقايات الملائمة لخللات اقنايا والتي تعيش ضمن قصبات كلسية المادة أو رملية أو شطائية .

## ٢٢١٤٠ - قُصْبَارُ الأَعْمَادِ

Brachélytres (F).

Brachelytron (E).

اسم يطلق على كل حشرة من غدييات الجُتَاحِ الحادها لتلحف جزءاً من بطونها فقط .

## ٢٢١٤١ - قُصْبَارُ الأَلْسِنَةِ

Brévilingues (F).

Brevilingual (E).

رَبِيَّةٌ من العظايات اجناسها وأزواجها عديدة تجتمع إلى فصليتين المستقرديات والصفريات . دويباتها تتميز بقصر السَّيْبِ وصغر قروانها وقرب فبهما من الحيات .

## ٢٢١٤٢ - قُصْبَارُ الدَّلِيلِ

Brachyours (F).

Brachyours (E).

رَبِيَّةٌ من القُصْبِيَّاتِ المشاريات الارجل ، أشهر اجناسها السرطان .

## ٢٢١٤٣ - قُصْبَارُ السَّوَالِقِ

Brachycères (F).

Brachypters (E).

رَبِيَّةٌ من الطير تتميز بقصر سواقطها مما يجعلها عاجزة عن الطيران ولذا فيضع طيورها مائية قُرْباً لاسماك . أشهرها البطريق والطرع والنعاس والناس ...

## ٢٢١٤٤ - قُصْبَارُ القُرُونِ

Brachycères (F).

اطلب قُصْبَارَاتِ القُرُونِ .

## ٢٢١٤٥ - قُصْبُ ، قُصْبُ

هو القُصْبَةُ الشجرية ، اطلبها . الواحدة قُصْبَاة وهو نبات مثثري تجرسه النمل فيقال لسلها حبل قُصْبُ .

## ٢٢١٤٦ - قُصْبَاة

Epinastie (F). Epinasty (E). حالة كل عضو نباتي ينمو الجزء الباطني منه على حساب الجزء الظاهري كالورقة المقعرة الصفحة العليا المنحنية السفل .

## ٢٢١٤٧ - قُصْبَاة

Coniocybe (S).

جنس فطور مجهرية من الرغيبات وفصيلة الحشاريات . يتميز بنكهته القلنسوية التي تملو الويسه . تكاته مستطيلة بورقها قرصي الشكل ثنائي الخلية . تكاته غطية مفصيلة تشابع التكاثر || له نوع واحد ملى يهى قُصْبَاة الكزرة .

## ٢٢١٤٨ - قُصْبَاة الكَزَرَةِ

Coniocybe pallida, Pilacre pallida, Rosleria hypogaea, Coniocybe nivea (S).

فطر مجهرى يصيب بجلور الكزرة وقد يصيب عرفاً وفي ظروث بيئية خاصة بجلور الإجامس وتكاته والذراق وألغوخ والورد والقيش والمثث || فطوره الحاربي على الكزرة في اضمائها الحوائية ، يتميز شامل يتيه وفوف في النمو وتجمع في الارواك . وهو في الجلول عفن خلى ناشف اصعب اللون يلحف الجرادات فيسبب تفرقها وتفجير طريدها المكافية || لم يكلف حتى الآن لان فوضه وانتشاره سطوان بعدة عوازل بيئية منها الطوبسية الموسمية ، وعلم التوبة ، وتركيب التربة وتماكها .. لذلك فالاعمال الحرفية والعناية بالترية هي انجع علاج له .

## ٢٢١٤٩ - قُصْبَاة

Aphélie (F). Aphellion (E). القُصْبَاة البهد الاقصى لسيارة عن الشمس . الكزرة الاضوية تكون في قُصْبَاةِها في اول شهر تموز من كل عام .

## ٢٢١٥٠ - قُصْبُ ، تَرْبُوع ، تَحْتِ

Equarrissage (F). Squaring (E).

هو قطع الشيء وتقسيمه وترتيبه كالحجارة وجلول الاشجار الخ .

## ٢٢١٥١ - قُصْبٌ ، بُوْصُ

Arundo phragmites (S). Roseau, R. commun, R. à balais (F). Common reed, Ditch reed (E). Deckrohr, Taichrohr (D). Canna, C. a spazzola, Spazzole (I). ويلى غاب وقُصْبُ المكاس . نبات كمبوري من فصيلة النجيليات ، ساقه قصبية ، جامدة ، متشابكة السلاحيات الجوفاء . اوراقه صفية كبيرة القد مشددة متناحية . ازهارها مجموعة عناقيد حامية ترتكز على سراج واحد . يكثر في المنافع وعلى ضفاف الماء . يستعمل للحواجر وفي صناعاتي السلال والمكاس .

## ٢٢١٥٢ - قُصْبُ الدَّرْبَرَةِ

هو حرد الوج ، اطلبه .

## ٢٢١٥٣ - قُصْبُ الرِّمَالِ

Arundo arenaria (S). Arunde, Goubet (F). Cane, Reed grass (E). Mahbrohr, Rohr (D). Cannuccia marina (I). نبات كمبوري قصبي من فصيلة النجيليات . اعطانه البلاد الحارة والمعتدلة . يكثر ويبرده في الرمال الرطبة وفي المنافع . ساقه تستعمل في عدة صناعات زراعة اعصها البراير .



قُصْبَاة الكزرة



قُصْبُ



قُصْبُ الرمال



## قصب بوربون ، قصب أوتاهيتي

Canne de Bourbon, C. d'Otaïiti (F).  
ساقه كبيرة مستطيلة غضراء اللون غزيرة العصارة السكرية .  
والقصب يحدد في جميع الأترية المروية الغنية بالمواد العضوية  
والناصر الغذائية غوط أن لا تغتفر إلى الكلس وأن لا  
تكون كثيرة الانفراج || أما كمية السكر الممكن  
استخراجها من عدد القصب فتراوح من ١٠ إلى ١٥ ٪  
من وزن البرد .

22166 - قَصَب النِيل  
Roseau canne (F).  
هو القصب الروبي ، أطله .

22167 - قَصَب بَلَكْدِي  
Canne de Provence (F).  
هو القصب الروبي ، أطله .

22168 - قَصَب دَرَاكُو  
Jong de l'Inde (F).  
هو أصل الهند ، أطله .

22169 - قَصَب ذَهَبِي  
Lysimaque commune (F).  
هو السرايية ، أطله .

22170 - قَصَب رُومِي \* ، قَصَب بَلَكْدِي ، قَصَب  
النِيل  
Arundo donax (S).

Canne, Canne de Provence, Roseau canne (F). Giant  
reed-cane (E). Echtespährohr Grosses-schiff (D).  
Canna comune, Canna di giardino (I).  
نوع من القصب الكبير المستطيل يكثر وجوده في المناطق  
المعتدلة والحارة وفي الأماكن الرطبة أنحصر ضفاف الأنهر  
حيث يظل ويوجد تمامًا || يستعمل كسائر أنواع القصب.

22171 - قَصَب قَارِسِي ، بُوَص قَارِسِي  
Arundo isiac (S). Canne de Perse (F). Persian cane  
(E). Persische Pährohr (D). Canna di Persia (I).

نوع من القصب الكبير القد . يكثر في المناطق وعلى  
ضفاف الأنهر والجداول الرطبة || يستعمل في مختلف  
الصناعات القصبية .

22172 - قَصَب هَرَّو  
هو السمرويا ، أطله .

22173 - قَصَبَات  
Bronchea (F). Bronchia (E).  
هي مجموعة الشعب الرئيسية والثانوية التي تزين الاتصال  
بين الحويصلات الرئوية والرقاضي فتضغ الجبال للسعال  
الحار وشروجه .

22174 - قَصَبَة  
Bronche (F). Bronchi (E).  
اسم تعريبي يطلق على جزء من الجهاز الانبوري التنفسي  
الذي يصل الرضائي أي قصبة الرئة بالحويصلات الرئوية .

22175 - قَصَبَة  
Paspale (F).  
هي أبو بيض ، أطله .

22176 - قَصَبَة  
Roseau (F). Reed (E).  
وأحدة القصب .

22177 - قَصَبَة ، قَلَم  
Chaume (F). Thatch (E).  
ساق التجليات كالخطة والشبر والشوات والذرة وغيرها .  
وهي مجموعة مركبة من عدة سلاحيات وعقد ينشأ عليها المصف  
أي الورق .

22178 - قَصَبَة الْأَنْف  
Chanfrein (F).  
Forehead (E).  
جزء من رأس الدابة يمتد من بين عينها إلى منفرجها .

## 22164 - قَصَب الرَّمْل \* ، غَزَار

Calamagrostis (S). Calamagrostide (F). Small reed,  
Sea sand-reed (E). Schilf, Rohrgass (D). Calama-  
grostis (I).  
جنس نباتات كمبودية قصية من فصيلة التجليات .  
انواعه نحو ٨٠ أصلها البلاد الحارة والمعتدلة . ترضب في  
الأراضي الرطبة ولا تنشأ المناطق البحرية . بعضها يستعمل  
في تثبيت رمال الكثبان القاسلة لأنه لا ينشأ الطش .

## 22165 - قَصَب السُّكَّر \* ، مَصَّان ، بَرَسُوم

Saccharum officinarum (S). Canne à sucre, Canna-  
melle (F). Common sugar cane (E). Zuckerrohr (D).  
Canna da zucchero, Cannamelle (I).

نبات زراعي من فصيلة التجليات مهدد البلاد الآسيوية  
الحارة ومنها انتقل وتطش في ثلاثة أقطار العالم الباقية لأنه  
كان حتى عام ١٨٠٠ النبات الوحيد الذي تستعمل عصائره  
في صناعة السكر . أما الأقاليم الصالحة لزراعته فهي مبدئياً  
أقاليم البرتغال التي لا يقل متوسط حرارتها الرطبة عن ٢٢°م  
والتي لا ينخفض متوسط حرارتها الدنيا عن ١٠°م .  
ساقه منتصبه مصقولة تعلو من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ سم .

سلاحياتها تعلو من ١٠ إلى ٣٠ سم . وقطرها يراوح  
من ٢ إلى ٨ سم . أليافها الخارجية خشية التركيب جامدة  
تتلفها مادة شمعية يغطى اللون . أما الألياف الداخلية  
فأستغنية النسيج غزيرة العصارة السكرية . أوراثه متعاقبة ،  
عصيفة الشكل ، حافسة . تصلها بطول من ١٠٠ إلى  
٢٠٠ سم . وهو جامد الصلابة من الحافة . أفراره حشوي  
التجميع ، هامى الارتكاز . أزهاره صغيرة الحجم ، فضة  
اللون ، ثنائية ، متعاقبة ، كثيفة الأزغب للمستطيل || حمراء  
بر تحيل دقيق || ضرب القصب الزراعي عديدة أشهرها  
وأهمها ما يلي :

## قصب أزرق ، قصب جاييك

Canne bleue, C. jamaïque (F).  
ضرب سروري قوي المذاقة يتحمل الطش وهو متوسط  
القد والإنتاج السكري .

قصب أسود  
Canne noire (F).  
ساقه صلبة جزوية اللون سمره الموج متوسطة المصارة  
السكرية . تكثر زراعته في ملقا وجزيرة موريس .

## قصب أصفر ، قصب صيني

Canne chinoise, C. de Penang (F).  
متوسط القد ، أصفر اللون ، أغصن الملوأ ، كثيف  
المادة القصبية غزير العصارة السكرية تكثر زراعته في  
الصين ولومبونا وجزر الفانج .

قصب الصين  
Canne de Chine (F).  
صغير القد ، شطلي اللون ، أصفر الملوأ متوسط المصارة  
السكرية لكنه سروري وقوي المناعة ضد الأصوام الفطرية .  
تكثر زراعته في الصين وهايت والهند الصينية .

قصب الكوششين  
Canne de Cochinchine (F).  
ساقه غليظة غضراء اللون متوسطة المصارة السكرية .

قصب الهند  
Canne guinghan (F).  
كبير القد بطول نحو ٦ أمتار . ينشأ التربة ويسترب  
حانصرها الغذائية . ساقه غزيرة المادة السكرية ، صفراء  
اللون مجنعة بالبنفسجي .

قصب باتافيا  
Canne de Batavia (F).  
أصراة عديدة موتها كبيرة القصد ، مجنعة بالألوان  
الماءقة والفاضة ، غزيرة المصارة السكرية .



قصب الرمل



قصب السكر



قصب رومبي

٦٠ سم. أوراقه احليلية قليلة القاعدة نصلها خشن  
الملس أزغب البشرة. أزهاره وردية اللون زرق المالح .  
ثمارة تقاسية الشكل حقة التركيب .

٢٢١٨١ - قَصِيْف  
Frangible (F).  
Frangible, Breakable (E).  
نمت تمريني يطلق عل ما كان سهل الانكسار او  
الانغلاق .



قصة الماء

٢٢١٨٢ - قَصِف  
هو ألياء ، اطلبها .  
٢٢١٨٣ - قَصْفَة  
Brize (F).  
هي البريزه ، اطلبها .

٢٢١٨٤ - قَصْمَة  
Conceptacle (F).  
حق يحسن اعضاء التنسل في بعض اجناس الطور .  
ج قسم .

٢٢١٨٥ - قَصِيل  
Osteoclaste (F).  
Osteoclasty (E).  
وعن يصيب العظم في الحيوانات اخصها المربة قشغ ويسهل  
انصاعها وكسرها .

٢٢١٨٦ - قُصَوَان \*  
Cirsium (S).  
Cirse (F). Horse-thistle (E).  
جنس نباتات شائكة مبلولة رية من فصيلة المركبات .  
انواعها عديدة منها الحولية والمحولة والمعررة . سورها اسطوانية  
تطول من ٥٠ الى ٣٠٠ سم. أوراقها ساعدة شائكة .  
ورئيسياتها كبيرة القد. أزهارها انبوية . قناياتها مهدبة  
الاطراف . بزورها مغلفة مستطيلة || اعرف انواعها  
واشهرها ما يتبع :

قُصَوَان افريقي  
Cirsium afrum (S).  
Cirse d'Afrique (F).

قُصَوَان الحقل  
C. arvense (S). Cirse des champs (F).

قُصَوَان المالح  
C. oleraceum (S). Cirse potager (F).

قُصَوَان سنائي  
C. lanceolatus (S). Cirse lanceolé (F).

قُصَوَان شوكي  
C. ferox (S). Cirse féroce (F).

قُصَوَان كثير الشوك  
C. spinosissimum (S).  
Cirse très épineux (F).

قُصَوَان لبناني  
C. libanoticum (S). Cirse du Liban (F).

قُصَوَان مصوف  
C. eriophorum (S). Cirse laineux (F).

٢٢١٨٧ - قُصَوَان الحَيَال  
هو العلاج ، اطلبه .  
٢٢١٨٨ - قُصُوص \*  
Textor (S).  
Alecto (F). Textor (E).  
جنس طير من فصيلة التوتويات . انواعها المعروفة قليلة  
العدد موطنها بعض مناطق افريقية الراسل والجنوبية .  
تألف المرامي والاحراج البصرة الانجار . لمطنها الحيائي  
جامي افواحيها قليلة البند || اجسامها متوسطة القد تطول  
من ٢٦ الى ٣٦ سم. مناقبها كبيرة غرطية الشكل  
اجنحتها مستطيلة . اذناها مغلفة الاطراف او مستديرة ||  
قوتها الحشرات والديدان وبعض البذور البرية || اعرف  
انواعها واشهرها قصوص اخر المنقاد .

٢٢١٨٩ - قُصُوصُ أَخْصَرِ الْمُنْقَادِ \*  
Textor erythrorhynchus (S).

Alecto à bec rouge (F).  
طائر من القصوص . موطنه يمتد من افريقية الجنوبية الى

## ٢٢١٩١ - قَصْبَةُ الرِّثَةِ ، وَخَاصِي

Trachée-artère (F). Trachea, Windpipe (E).  
النفس في الجسم الذي يرسل الحنجرة يشغبي القصبة .  
وعى التي ير منها الهواء الى الرئة ان داخل او خارجاً .

٢٢١٩٠ - قَصْبِي  
Tubiforme (F).  
Tubiform, Tubular (E).  
ما كان شكله كالقصبة او الانبوب .

٢٢١٩١ - قَصْبِيَّات  
Trachéates (F). Tracheates (E).  
هي المصفليات التي تتصلل بمجرأ تنفسي انبوي يقابله جهاز  
تنفسي شعبي .

٢٢١٩٢ - قَصَّةُ الْحَيَّةِ  
Petite centauree (F).  
هي مرارة اخفش ، اطلبها .

٢٢١٩٣ - قَصْد  
Ronca (F).  
القصد الموج . وقصد الموج فروعها النامية .

٢٢١٩٤ - قَصْدِير  
Étain (F). Tin (E).  
معدن معروف منذ زمن الفينيقيين الذين نقلوه الى مصر  
قبل عهد موسى . لونه الى البياض الفضي الازرق المالح .  
يصهر في ٢٢٨° مع ويل في ١٢٠٠° مع. رمزه (Sn-)  
وزنه الانبوي ١١٨,٧ ثقله الانبوي ٧,٢٩ اصيلاته  
الكهربائية في ٢١° مع. تبلغ في ١١,٤٥ || وهو اطرى  
من الزنك واشد صلابة من الرصاص كما انه لا يتأثر  
بالخامض النيتية والامصارات العضوية || يوجد في الطبيعة  
على هيئة اكسيد القصدير « قصديريت » Cassitérite .  
Oxyde d'étain .

٢٢١٩٥ - قَصِيرَة ، ذَسِيع  
Base du cou (F).  
قاعدة العنق او ممرز العنق في الكاهل .

٢٢١٩٦ - قَصْرَة  
Gemmule (F).  
هي البادرة ، اطلبها .

٢٢١٩٧ - قُصْرَى  
Ceraistes cornutus (S).  
القصرى والقصرى نوع من القزراء صغيرة القد خيفة  
تنفس في الرمال .

٢٢١٩٨ - قَصْمَةُ الْمَاءِ \* ، سُرَّةُ الْبَحْرِ ، هَيْدْرُوكَيْتِل  
Hydrocotyle (S). Hydrocotyle, Ecuelle d'eau (F).  
Marsh pennywort, Sheep-bane, White-rot (E).  
Nabel Necke, Wassernabel (D). Idrocotile, Scodella  
d'acqua (I).

جلس نباتات عشبية رية مائية من فصيلة الحياتيات تكثر  
في الشام وفي المراتع المستدبة الرطاب . انواعها عديدة.  
سورها مدادة . أوراقها ثنائية الانتشاب ، مستطيلة الزناد،  
دقيقة النصل المستدير المامد الانقسام . أزهارها صغيرة  
خاصية البتلات .

٢٢١٩٩ - قُصْلٌ ، قُصْلٌ  
Scorpiion  
هو المقرب . وقيل ولعاباً .

٢٢١٩٠ - قَصَصِين \*  
Salvia pommifera (S).  
Sauge pommifère (F). Sage apple (E). Salbaïpfele (D).  
Salvia baccifera, S. Spirea (I).  
نوع من القوصية . يقال ان مناهه الصمعية عديدة . يكثر  
في الاراضي البرية المنحسة . ساقه فروعها تطول من ٣٠ الى



قصة الماء



قُصَوَان

٢٢٢٠١ - قُصْبُصٌ نبت ينبت في أصول الكُمَّة (أ. م).

٢٢٢٠٢ - قُصْبَةٌ Pygidium  
هي آخر مفصل بطي من جسم الحشرة .

٢٢٢٠٣ - قُصْبِيعٌ ، لُقْبِيسٌ ، مِثْخَارٌ Tardif (F).  
Tardy, Late (E).  
هو ما كان بطيء النمو أو ما طلح زن نحو أن في الحيوان  
أم في النبات . م. قصبة .

٢٢٢٠٤ - قُصْبِيعٌ \* Epinaste (F).  
نمت تعريفي يطلق على كل نبات أو جزء منه أصابته  
القصاصعة .

٢٢٢٠٥ - قُصْبِيعَةٌ \* Biscutella (S).  
Biscutelle (F). Biscutella (E).  
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الصليبية . أنواعها  
المعروفة قليلة العدد . منها : بعض مناطق حوض البحر  
الابيض المتوسط || سورها قمره مستقيمة . أوراقها متعاقبة .  
نصلها لمعوية ، مقلوبة ، مستطيلة النصال ، مسننة  
الختار . أزهارها طرفي . أزهارها صفراء اللون . ثمارها  
قصبيية الشكل .  
أعرف أنواعها وأشهرها :

٢٢٢٠٦ - قُصْبِيعَةُ الْعُمُدِ ، قُصْبِيعَةُ جَبَلِ عَمْرُقِ Biscutella columnae (S).  
Biscutelle de Gibraltar (F).  
أوراقها الجلدية لمعوية الشكل ، مستطيلة النصال ،  
متعادلة التسنين . أما الساقية والفرعية فرمحية الشكل  
مقاربة الإسنان . تنويرها ربيعي .

٢٢٢٠٧ - قُصْبِيعَةُ حَقِيقَةٍ Biscutella genuina (S). Biscutella vraie (F).  
منها بعض المناطق الجافة من لبنان وسوريه . أوراقها  
الجلدية متراكبة ، أما الساقية والفرعية فقليلة العدد  
متعادلة التسنين . تنويرها ربيعي .

٢٢٢٠٨ - قُصْبِيعَةُ مُسَنَّنة Biscutella dentata (S). Biscutelle dentée (F).  
منها بعض المناطق اللبنانية . تتميز بكثرة عدد أوراقها  
الساقية والفرعية وبكبر أسنانها الحادة الشائكة ، تنويرها  
ربيعي .

٢٢٢٠٩ - قُصْبِيعَةٌ \* Patella (S).  
Patelle (F). Patella (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهديات الأرجل  
أصمات الخياشيم الجلدية وفضيلة القصبيات . أنواعها  
المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على  
الصخور المنورة || أصدانها جلونية أو صاجية أو  
مظلية أو أهليلجية . جميعها وسيدة المصاريع ، مألوفة  
النشأ الداخلى الأولي المأذبة ، غدة النشأ الخارجى  
الكتبان الأولان ، مسنة الختار || أجسامها متباينة  
الأحجام التي تراوح من ٣ إلى ١٠ سم . أذننها رمية  
فضفاضة . رؤوسها صغيرة ثنائية اللواس المعبوة القواعد  
الخارجية . خياشيمها مجموعات متساوية الترتيب تطلق  
الجسم تحت الدماء || جميع أنواعها مأكولة مستحبة الطعم .

الشرقية . يالفت المراعي وضافات بحاري الماء حيث تكثر  
تطامن البقر الرعي والقطا . ملجئة الحياتي جماعي ،  
نوربه يمد من ١٠ إلى ٣٠ زوجا || جسمه مستدل القد  
يطول نحو ٢٥ سم . ثوبه الى السواد القمعي . قوامه  
جناحه بيض المعاطد الخارجية . متفاد مرجاني اللون .  
حذقة عينه كسكتية . رساه الى السرعة الخنطية || قوته  
الخطرات والديان والبلور ويلتقط القراد والطلح من على  
ظهور النبات والافطار || يدثن عنه في السط المشوك .  
عنه شارب الرعيه والكبر ، قطره نحو ١٢٠ سم . شكله  
كالصالح يملوه طوي يرتفع نحو ١٥ سم . الاثنى تنفع من  
٥ الى ٧ بياض تحفها بجناوبة الذكر نحو ١٣ يوما .

٢٢١٩٠ - قُصُوعٌ ، إِذْبَاسٌ Levée (F).  
Gathering (E).  
خروج الزرع من الارض او ظهور بؤاد البرور على  
سطح التربة .

٢٢١٩١ - قُصْبِيبٌ \* Phragmites (S).  
Phragmite, Canne à balais (F). Reed (E).  
نبات مغموري من فصيلة النجيليات . ساقه  
قصبيية ، متشاببة السلاحيات والكمابر ، تطول نحو ٣  
امتار . أوراقه غمدية ، حاشية ، صفيقة النصل الجلمد ،  
المسن الحافة ، البحري اللون || أزهاره علمي الاوتكاز ،  
يشكل مجموعة من السنايل المتباينة . أزهاره بنفسجية اللون ||  
منته جميع الاستماع المتعددة الحرارة من العالم القديم .  
يكثر زوجه في الموامع الرطبة وعل ضفاف بحاري الماء ||  
ويدعى في مصر والسودان « الحنطة » .

٢٢١٩٢ - قُصْبِيبَةٌ Tube  
هي في بعض النباتات انبوبة الزهرة التي ترتكز عليها  
البتلات . ج. قصاب .

٢٢١٩٣ - قُصْبِرُ الْجَذْعِ Brévicaque (F).  
Brevicaque (E).

٢٢١٩٤ - قُصْبِرُ الْجِنَاحِ Brévipenne (F).  
Brevipennate (E).

٢٢١٩٥ - قُصْبِرُ الرُّسْعِ Court-jointé (F).  
Shore-patterned (E).  
من كان رسخه دون المدلل الوسط وهو من حيوب الخيل .

٢٢١٩٦ - قُصْبِرُ الْعُمُرِ Brachybiote (F).  
نمت تعريفي يطلق على كل حيوان قصير العمر من اي  
جنس كان .

٢٢١٩٧ - قُصْبِرُ الْقَدَمِ Brépède (F).  
Brevipede (E).

٢٢١٩٨ - قُصْبِرُ الْمِثْخَارِ Brévirostre (F).  
Brevirostrate (E).

٢٢١٩٩ - قُصْبِرَاتُ الْقُرُونِ Brachycera (S).  
Brachycères (F). Brachycera (E).  
لغة حشرات من ذوات الجناحين فصائلها وأجناسها وأنواعها  
نحو ٢٥٠٠٠٠ أصنافها جميع أصناف العالم || أشهر  
فصائلها : اللبابيات والثريرات والعتريات والثريرات  
والهبيات .

٢٢٢٠٠ - قُصْبِرَةُ الْقَلَمِ Brachystylée (F).  
نمت تعريفي يطلق على كل زهرة قصيرة قلم السمة .



قُصْبِيبٌ



قُصْبِيبَةٌ



قُصْبِيبَةٌ



قَصَب أَحْمَر لِلْعَاد

٢٢٢١٧ - قَصَب لُبْنَانِي (S).  
Vinca libanotica (S).  
Pervanche libanaise (F). Lebanon Periwinkle (E).  
نوع من القصاب. عشية طيبة معمرة. منبهاً يمتد من السواحل اللبنانية حتى ارتفاع ٢٠٠٠ متر من سطح البحر. ساقها مسطحة لا مجاذرة. أوراقها متعاقبة، حاشية، مستطيلة الأضلاع، نصالها شبه قلبية الشكل، جملة الخضار، جرداء البتلة. أزهارها مجرورة الإزهار، معنقة، حشامية البتلات، ورقة اللون، وقد تكون بيضاء في بعض الموائل. أرواقها الخضراء والجملة لا تخلو من المنافع الطبية أعصها في السيلان وأنتطاع الطمخ. وقد تحوي بعض القصابيات الكثيرة النفع.

٢٢٢١٨ - قَصَب مُسْتَح (S).  
Vinca herbacea (S).  
Pervanche herbacée (F).  
عشبة برية معمرة قليل وتزوي في الشتاء. ساقها مسطحة تطلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أرواقها أحليجية مهدبة الختار. أزهارها إلى الزرقة البنفسجية. أزهارها يستر من أيار إلى حزيران.

٢٢٢١٩ - قَصَب وَرْدِي (S).  
Vinca rosea (S).  
Pervanche rose, P. de Madagascar (F).  
نوع من القصاب المسمر وقد يزرع كزولي في البلاد المعتدلة الحرارة. ساقه منتصبية لينة تطلو من ٣٠ إلى ٤٠ سم. أرواقها أحليجية مقبولة القاعدة. أزهاره عرسولة القد، وردية اللون. أزهاره يستر من الربيع إلى الخريف.

٢٢٢٢٠ - قَصَابَة (F).  
Volls (F). Lop and top (E).  
الأعصاب والاعضاء المفصلة من الشجرة.

٢٢٢٢١ - قَصَابَة \*، قَصَب الْمَاء، قَصَبُ لُتْرَا (S).  
Lutra (S). Loutre (F). Otter (E).  
جنس حيوانات لبونة من السرمويات ورتبة القارسم. أنواعه ثمانية موطنها غصاف جريف بعض الأنهار الآسيوية والأوروبية والأمريكية. بجيها قاذبة. قوتها الأصالة. أجسامها مستطيلة، وروبيها عريضة، قوتها قصيرة، حطب أصابها تميمها هل السباحة. أذنانها طويلة. أرواها بكثافة الورير القصير. ألوانها إلى الجوزة مواسمها يختلف باختلاف الأنواع.

٢٢٢٢٢ - قَصَابَة \*، هَيْج (F).  
Etiollement (F).  
Etiolation, Sickness (E).  
اصفرار النبات ونحوه من جراء فقدان الخصب سبه النفل أو القطر أي قلة النور أو انعدامه.

٢٢٢٢٣ - قَصَام (F).  
Judiciaire (F). Judiciary (E).  
ثبت من الحنض وثلل هو الطهارة. كل ما هو مختص بالقضاء.

٢٢٢٢٤ - قَصَابِي (F).  
Luzerne (F).  
هو القصة. الحلبا.

٢٢٢٢٥ - قَصَب (F).  
Recéper (F).  
To cut down close (E).  
قصب الكر. قطع أعصانه أيام الربيع.

٢٢٢٢٦ - قَصَبَة \* (S).  
Dendrochélidon (S).  
Dendrochélidon (F).  
جنس طير من الجواثم مشروبات المنقير وقصيلة السبانيات. أنواعه المعروفة خمسة. أصلها تمتد من الهند إلى جزر

٢٢٢١٠ - قَصَبِيَّات \* (S).  
Patellidés (F). Patellidées (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مهديات الأبريل أمابيات الخياشيم الحلقية. أجسامها قليلة العدد اما أنواعها فكبيرة منتشرة في جميع بحار العالم. تعيش على الصخور المدورة قرب الشواطئ. أعرف أجسامها وأشهرها القصبة والشنكولة.

٢٢٢١١ - قَصِيل (F).  
زرع الشمر يحرق أعصر لعلل الدواب.

٢٢٢١٢ - قَص \*، قَصَص \*، قَصَصَة (F).  
Gravier pour béton (F). Gravel of concrete (E).  
حصى صخرة القد متساوية الحجم عادة المكسر تستعمل في الباطون.

٢٢٢١٣ - قَصَاب أَحْمَرِ الْمُنْعَاد \*، أَو مُنْعَام (S).  
Xiphorhynchus procurrens (S).  
Falcistroste à bec en sabre (F).  
نوع من القصاب. طائر من فصيلة الطروبيات. موطنه بعض مناطق أمريكا الجنوبية وأصغها النوريات. يألف الأراجح الجبلية حيث يكثر الرق والرقول. جسمه معتدل القد بطول نحو ٢٥ سم. بما فيه اللقاع الذي يبلغ ٧ سم. يتبين بمقلاده المستطيل الأحمر كالحسام العربي وبذيله المستطيل المتدور الطرف. ثوبه متداخل الألوان. وداؤه ويطنه إلى السمرة الزيتية المولاج. زوره أبيض. رأسه وعقده وصدره إلى البياض الأصفر يعلوه تشيز مستطيل احمر. جناحاه وذنبه إلى الجوزة. حدة عينه كسنتية اللون. منقاده وساقاه إلى النقشة السوداء. طيارته خفيف الحركة. قصير القوط. قوته البندان وإساربع الحشرات يتلصقا إينما كانت بواسطة منقاده المستطيل. يلدش عنه في تجاويب الأجار. الآش تنفع من يبيضن في ثلاث يعضات تحضنها بجناوية الذكر نحو ١٥ يومًا.

٢٢٢١٤ - قَصَاب \*، عَنَابَة \*، وَنْكَا (S).  
Vinca (S). Pervanche (F). Periwinkle (E). Stinngrün (D). Pervinca (I).  
جنس نباتات عشية وعشوية من فصيلة الدفليات. أنواعه ١٢ منظرها بري وبهشها زراعي زُرْبِي. أرواقها متعاقبة معنقة كاملة. أزهارها أبليية فردية طويلة الزناد قيمة الكأس حشامية البتلات، يكثر فيها اللون الأزرق. أشهر أنواعه ما يتبع:

٢٢٢١٥ - قَصَاب صَغِير \*، قَصَاب مِصْرِي (S).  
Vinca minor (S). Petite pervanche, Violette des serpents (F).  
نوع من القصاب للمسمر ضروريه هدية. ساقها عشوية فرعاء تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم. أرواقها مسنحة بالابيض أو بالأصفر. أزهارها عادية أو مكسبة منها الابيض والأزرق والبنفسجي والوردي والاحمر. أزهارها يستر من شباط إلى حزيران.

٢٢٢١٦ - قَصَاب كَبِير \* (S).  
Vinca major (S).  
Grande pervanche, Violette des sorciers (F).  
نوع من القصاب للمسمر. ساقه عشوية فرعاء تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أرواقه صلبة القد نصلها سنائي الشكل، قلمي القاعدة، مسنح الصلصة أو مطوق الختار بالأصفر. أزهاره كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم. ألوانها إلى الزرقة الجبلية. أزهارها يستر من آذار إلى حزيران.



قَصَاب صَغِير



قَصَاب كَبِير



قَصَاة

S. sempervirens (S). **قصيب الذهب الدائم الخضار**  
Verge d'or toujours vert (F).

S. latifolia (S). **قصيب الذهب العريض الورق**  
Verge d'or à larges feuilles (F).

S. graminifolia (S). **قصيب الذهب العصي الورق**  
Verge d'or à feuilles de graminées (F).

S. multiflora (S). **قصيب الذهب الكبير الزهر**  
Verge d'or multiflore (F).

S. canadensis (S). **قصيب الذهب الكندي**  
Verge d'or du Canada, Gerbe d'or (F).

S. serotina (S). **قصيب الذهب المتخار**  
Verge d'or tardive (F).

S. virga-aurea (S). **قصيب الذهب المبدول**  
Verge d'or commune (F).

S. nutans (S). **قصيب الذهب المنحنى**  
Verge d'or penchée (F).

Bactériacées (F). **٢٢٢٢٧ - قَصِيَّات**  
Bacteriaceae (E).

فصيلة من البكتيريا تتميز بشكلها القفصية . خلاياها أسطوانية مستقيمة تنقسم عمودياً وباتجاه واحد . أجناسها ثلاثة : البكتيريوم والبليسلوس والزاوائف . أما الأنواع فمديدة وهي مذكرة في مواقعها التسلسلية .

Procès (F). Law-Suit (E). **٢٢٢٣٨ - قَصِيَّة**  
هي النزاع الذي يعرض على المحكمة .

Affaire en état (F). **٢٢٢٣٩ - قَصِيَّة مُعَدَّة للحكم**  
هي القضية التي استوفيت فيها المرافعات .

Chat (F). **٢٢٢٤٠ - قَطْ**  
هو السنور ، أظليه .

Serval (F). **٢٢٢٤١ - قَطْ - سَمِير**  
هو اللبج ، أظله .

Gangas, Pterocles (F). **٢٢٢٤٢ - قَطَا**  
Pterocles, Sandgrouse (E).

جنس طير من فصيلة الجوبيات وأحد قطاة قطا . أنواعه عديدة جميعها قريبة الشبه من الحام تتميز باستطالة ردة ريشتين من أفنيكها تكشفتان الذهب . وهي سريرة الطيوران تظهر مسافات شاسعة في طلب القوت والمساء تألف الفاني ، قوتها الحبوب والبرور ونواحي بعض النباتات . تعيش سرايا كبيرة . تدفن في أنفوس ترصمه بالقش والوبر . أناثها تحضن أربع بيضات صغيرة القذ مرطلة || وقوصت القطا بالمهداية والعرب تضرب بها المثل في ذلك . ومن قول الشاعر :

« والناس اهدى في القبيح من القطا  
واضل في الحسن من الغربان »

وقيل في وصفها :

« أما القطاة فباني سرف انثها  
نمناً يوافق متى بعض ما فيها »

« سكا مخفورية في ريشها طوف  
سود قوادها صهب غوافها »

أعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع .

الزجاج وبعض الاقاليم الافريقية || أجسامها صغيرة تطوي من ٢٥ الى ٢٢ سم . أجنحتها ضيقة مستطيلة . أذناها فاقرة . رقابها بالغة الطول . أنوابها الى السواد الأسع يملو مزاج أخضر او بنفسجي . مخاسرها مخططة بالأبيض . صدورها وبطنها الى الأبيض الاخر || ملاجئها الخياطة جماعية . تدفن عشاشها في قم الاجنار الباسقة . الاثى تحضن من بيضة الى بيشتين ثلاث مرات في الحول .

٢٢٢٢٨ - قَصْبَةٌ ، سَرْحٌ ، طَرْحٌ  
Cadaba (S). Cadaba (F). Esel-wood (E). Eselbaum (D). Cadaba (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الكبريات . أنواعه قليلة . جميعها مجبريات ونباتات سرحة او شائكة . أوراقها كاملة متعاقبة ، نصلها جامد النسيج ، بحري القرن . أزهارها فردية ، عورقة وتاجية . ثمارها قرنية أسطوانية ، لونها الى الخضار البحري ، لبها جامد المكسر غزير الحصاراة الحامزة المرة || يقال ان عصارها تلثم الجرح وتطرد الديدان الحورية .

٢٢٢٢٩ - قَصْبَةٌ  
نبت من الحنص ينبت في السهل . ج قصبات .

Terrain peu caillouteux (F). **٢٢٢٣٠ - قَصْبَةٌ**  
Pebbley ground (E).  
هي التربة القليلة الحصى . أما التربة الكثيرة الحصى فتدعى حصية .

Pépins de raisin sec (F). **٢٢٢٣١ - قَصِي**  
هو زرع الزبيب الذي لم ينبت الخفيف .

Pénis (F). Penis (E). **٢٢٢٣٢ - قَصِب**  
اسم شامل يطلق على ذكر كل حيوان .

Branche (F). Branch, Bough (E). **٢٢٢٣٣ - قَصِب**  
كل نبت من الأغصان يقصّب . ج قصب وقصبان .

Ente (F). **٢٢٢٣٤ - قَصِيب التَطْمِيع**  
Grafte, Branch bearing a grafte (E).  
قصيب أو غصن دقيق له من زيمة واحدة الى ثلاث زيمات وهو يصلح لتطعيم وقد يستعمل لمعاً للشرة .

٢٢٢٣٥ - قَصِيب الحَمَل  
Courson, Coursonne (F). Shooe cut down to three- or four eyes (E).  
كل قصيب قلم عليه من ثلاث الى أربع براعم ثمرة .

٢٢٢٣٦ - قَصِيبُ الدَّهَبِ ، عَصَا الدَّهَبِ  
Solidago (S). Solidago, Verge d'or (F). Golden-rod, G. wings (E). Goldrute (D). Solidago, Verga aurea (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة المركبات الشامية الزهر . أنواعه نحو ٩٠ معظمها عشبي وبعضها شجري . أوراقها متعاقبة رعيّة . أزهارها غصية شامعية متتالية بحيلة الشكل صفراء اللون || أعراف أنواعه وأشهرها :

قصيب الذهب الأرمود  
S. glabra (S).  
Verge d'or glabre (F).  
قصيب الذهب الثنائي اللون  
S. bicolor (S).  
Verge d'or bilocore (F).  
قصيب الذهب الجامد  
S. rigida (S).  
Verge d'or rigide (F).



قَصْبَةٌ



قَصِيبُ الدَّهَبِ



قطاة كدرية

## ٢٢٢٥٢ - قُطاس \* ، قُوتاش و خُشَقَاء ، ياك

Poephagus (S). Yack (F). Yak (E).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة البقرليات أنواعه الممرقة اثنتان موطنها جبال التبت من ارتفاع ٢٤٠٠ الى ٥٥٠٠ م. من سطح البحر || والقطاس حيوان كبير اخن يملو من ١٦٠ الى ١٨٠ سم. ويزن من ٥٠٠ الى ٦٠٠ كيلو. شكل جسمه يأخذ من البيسون والجاموس والثور. رأسه كراس الثور الا انه محدد القحف ، مستطيل القرون المنصبة ، خنثائه متباعدتان ، عيناه كبيرتان ، اذناه مستطيلتان ، قوائم قوية ، ثوبه الى السرة المايقة السوية تملوها رقعة صهابة ، خطه وذعره وزممة ذنبه بيض . ذنبه يشبه ذنب الفرس وكان الترك يزبنون فيه العلم . قوته الاعشاب . سره كثير المدد . اننا نضع يبقوفاً واحداً في الحول يسير وراء امه فور وضعه || اما ثوبها فيها :

P. mutus (S). Yack muez (F).

القطاس الاخضر  
P. grunniens (S). Yack commun (F).  
ومذاك القطاس الداخن وهو قرب من الاخضف يشمل بعض الفروق . يستعمل في الجر والقتل والحراثة . حليب انائه غزير المادة السكرية ، مستحب العرف .

Secteur, Domaine (F).

Sector, Domain (E).

## ٢٢٢٥٣ - قُطَاع

Coupe (F). Cutting (E).

## ٢٢٢٥٤ - قُطَاعَة

## ٢٢٢٥٥ - قُطَاف و خِرَاف و صِرَاف

Cuellette (F). Gachering (E).

اجتباء الكسر او خلافه من الانتاج النباتي عند الادراك .

Vendange (F).

Vintage, Grape-gathering (E).

## ٢٢٢٥٦ - قُطَاف الكَرَمَة

اجتباء حناقيد العنب او وزن قطاف العنب .

Polyandrie (F).

Polyandry (E).

## ٢٢٢٥٧ - قُطَامَة \*

القطامة تعدد الأزواج عند المرأة الواحدة .

Rostrhamus (S).

Rostrhame (F).

## ٢٢٢٥٨ - قُطَامِي \* ، قُطَامِي

جنس طير من حمار الحداة وقصيلة الصقريات ، أنواعه ثلاثة موطنها البلاد الحارة . وهو حزين الوجد ، كبير الجثة ، يمتد من اعظم الطيور التي يصاد بها || يألف الجيحات ويجاري الله . يئن حته في الانجار القرية من لئام . اننا نقيض وتحسن من رقتين الى ثلاث زينات مستطيلة الشكل طلاء اللون .

Légumineuses (F).

## ٢٢٢٥٩ - قُطَانِيَّات

هي الفزليات فصيلة نباتية ، اطليها .

Henné (F).

## ٢٢٢٦٠ - قُطَب

هو الحناء ، اطليها .

Pôle (F). Pole (E).

## ٢٢٢٦١ - قُطَب

القطبان ، جغرافياً ، هما طرفا عود الارض الذي يمر بمركز الكرة الارضية ، وهما القطب الشمالي والقطب الجنوبي . وتبلغ للسافة بين خط الاستواء وبين كل من القطبين نحو عشرة الاف كيلومتر . اما القطر القطبي للارض فهو



قطامي

Catapodium (S).

## ٢٢٢٦٢ - قُطَاب \*

Catapode (F). Catapodium (E).

نبات عشبي بري مسمر من فصيلة النجيليات . يألف الرمال البحرية . يمتد من النباتات الطوعية في لبنان .

## ٢٢٢٦٤ - قُطَاة الرمال ، دِيَلَم

Pterocles arenarius (S). Ganga des sables (F).

اكثر انواع القطا ، طولها نحو ٣٥ سم . ثوبها الى الصهبة الحمراء يملو توشيح رداوي واصفر . بطنها هابت اللون . متقاربا سود ، موطنها شاسع الاطراف يمتد من رمال آسية الى رمال افريقية .

## ٢٢٢٦٥ - قُطَاة شَرْقِيَّة ، جَوْنِيَّة

Pterocles orientalis (S). Ganga oriental (F).

طائر من القطا ، طولها نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الصهبة الخفيفة يملو توشيح ابيض ارقط . صدره الى الجؤوة الباهتة ، بطنه الى السرة ، متقاربا وبطن جناحيه وقوامه الى السود . موطنه قياض الشرق الادنى .

## ٢٢٢٦٦ - قُطَاة صَحْرَاوِيَّة ، عَطَاف

Pterocles exustus (S). Ganga brûlé (F).

طائر من القطا ، متوسط القد طولها نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الصهبة الخفيفة تملو رقعة الى الجؤوة القاتحة الزامية . صدره وبطنه الى الصفرة الموشية بالاسمر || سره متوسط المدد . موطنه الصحاري .

## ٢٢٢٦٧ - قُطَاة كُدْرِيَّة \* ، كُدْرِيَّة

Pterocles alchata (S). Ganga cata (F). Large painted sandgrouse (E).

طائر من القطا ، طولها نحو ٢٧ سم . ثوبه الى القرية ارقش الظاهر والبطن . اصفر الخلق . اسود الحار . موطنه قياض صحاري الشرق الاوسط وافريقية الشمالية والغربية . اسراهه كثيرة المدد .

## ٢٢٢٦٨ - قُطَاة مَرْقَطَة

Pterocles senegallus (S). Ganga du Sénégal (F). Spotted sandgrouse (E).

طائر من القطا ، صغير القد طولها نحو ٢٥ سم . ثوبه الى الصهبة المرقطة بالاسمر والاخر || موطنه رمال السنغال والصحراء الكبرى .

## ٢٢٢٦٩ - قُطَاة مُكَتَلَة

Pterocles coronatus (S). Coronetted sandgrouse (E).

طائر من القطا ، صغير القد طولها نحو ٢٦ سم . ثوبه الى الصهبة البهراء تملو رقعة صهراء . رأسه ناشق بعض الريش الذي يبدو كالاكليل . سره متوسط المدد . موطنه المناطق الاسوائية افريقية .

## ٢٢٢٧٠ - قُطَاة مَرْشَحَة ، دِلْهِيَم

Pterocles lichtenheini (S). Ganga rayé (F). Close-barred sandgrouse (E).

طائر من القطا متوسط القد ، طولها نحو ٢٨ سم . ثوبه الى الصهبة الغبراء يملو توشيح اسمر يقتطب البسائط والليل . صدره اطحل ارقش . بطنه وزمكاه الى البياض النقي . سره متوسط المدد . موطنه افريقية الاسوائية .

## ٢٢٢٧١ - قُطَارَة ، مَشَقَّاف

Compte-gouttes (F). Drop-tube (E).

انبوب من قزاز مذهب الطرف المستدق يستطاع بواسطته تنقيط المراد السائلة نقطة نقطة .

اقصر من قطرها الاستوائي بنحو ٤٣ كيلومتراً .  
والقطبان منطوياً يتجاذبان إذا كانا مختلفين ، موجب  
وسالب ، ويتنافران إذا تشابه .

٢٢٢٦٢ - قُطْب جَنُوبِي  
Pôle sud (F).  
South pole (E).

٢٢٢٦٣ - قُطْب حَيَوَانِي  
Pôle animal (F).  
Animal pole (E).

٢٢٢٦٤ - قُطْب سَالِب  
Cathode (F).  
Negative pole (E).  
هو المهبط ، اطلبه .

٢٢٢٦٥ - قُطْب شَمَالِي  
Pôle nord (F).  
North pole (E).

٢٢٢٦٦ - قُطْب عَوْتَد  
Pôle conséquent (F).  
Consequent pole (E).

٢٢٢٦٧ - قُطْب مَغْنَطِيسِي  
Pôle magnétique (F). Magnetic pole (E).

٢٢٢٦٨ - قُطْب مَرْجِب  
Anode (F).  
Positive pole (E).  
هو للمعد ، اطلبه .

٢٢٢٦٩ - قُطْب لَبَاقِي  
Pôle végétal (F).  
Vegetal pole (E).

٢٢٢٧٠ - قُطْبَان \*  
Brachypodium (S).  
Brachypodium, Bromes chloëndent (F). False  
brome grass (E). Kurzstamm, Zwenke (D). Paleoe,  
Pennacchi (I).

نبات عشبي يري من فصيلة النجيليات قريب النخس من  
المكرش يكثر في البور وفي الاراضي المنحطة يرعى الال  
ويسن عليه . وهو اذا كثر بين الزروع وفي الاراضي  
المزدرة استوجب الابداء .

٢٢٢٧١ - قُطْبَة ٥  
Ketupa (F).  
هي الخروزة ، طائر من البويات .

٢٢٢٧٢ - قُطْبَة \* ، سَهْمُ الْمَاءِ  
Sagittaria (S). Sagittaire, Fléchière (F). Adder's tongue,  
Arrow-head (E). Pfeilkraut (D). Sagittaria,  
Barba silvana (I).

جنس نباتات عشبية ، جلمورية ، مائية ، معمرة ، من  
فصيلة الزمرايات ، انواعه ١٧ جميعها من نباتات البلاد  
الحارة والمستنلة اوراقها صهية الشكل ، مستطيلة الزناد  
قرصية الانتشاب . ازهارها ثلاثية التكوين والتجميع  
يطلب فيها القرن الابيض ثم الاحمر || اشهر انواعه  
ما يتبع .

٢٢٢٧٣ - قُطْبَة شَالِمَة ، سَهْمُ الْمَاءِ الشَّامِك  
Sagittaria sagittifolia (S). Sagittaire commune, Sa-  
getta, Flèche d'eau (F).

عشبة تريليية سبوتية معمرة مبلولة في المناطق والاحواض .  
تتلون من ٤٥ الى ١٥٠ سم . اوراقها قرصية وشراعية  
فالقروية طويلة الزناد كبيرة القند مستعرضة اما الشراعية  
الحوائية فضيقة السنان حادة الزناد . ازهارها ضمية  
ثلاثية او خماسية التجميع . بتلاتها شفافه النسيج  
بيضاء اللون ، وردية الحمار || ازهارها يستمر من  
ايار الى آب .

٢٢٢٧٤ - قُطْبَة صِيْنِيَّة ، سَهْمُ الْمَاءِ الصِّينِي  
Sagittaria sinensis (S). Sagittaire de Chine (F).  
عشبة تريليية سبوتية معمرة مهلهما الصين . جذاميرها



قطبان



قطبة

٢٢٢٧٥ - قُطْبَة عَالِمَة ، سَهْمُ الْمَاءِ الْعَالِمِ

Sagittaria natans (S). Sagittaire flottante (F).  
عشبة سبوتية تريليية معمرة تعيش في الاكواريم . شراعيها  
يملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها قرصية الانتشاب ،  
طويلة الزناد ، نصلها لا يقاسي الشكل والحجم يوم  
حل سطح الماء . ازهارها ضمية التجميع ، بتلاتها بيضاء  
اللون شفافه || ازهارها صيني .

٢٢٢٧٦ - قُطْبَة نَجِيلِيَّة ، سَهْمُ الْمَاءِ النَجِيلِي  
Sagittaria graminea (S). Sagittaire graminée (F).  
عشبة تريليية زهرية . شراعيها دقيق نجيل يملو من ٣٠  
الى ٦٠ سم . اوراقها قرصية وشراعية فالقروية مستطيلة  
الزناد ، نصلها متوسط الحجم عايق الخضار اما الشراعية  
الحوائية فضيقة النصل اللاطئ الباهت الخضار .  
ازهارها ملاطية . اسديتها كبيرة وافضة الجسم ، خلية البيرة .  
ازهارها صيني .

٢٢٢٧٧ - قُطْبَة هَانِكَة ، سَهْمُ الْمَاءِ الْهَانِكِ  
Sagittaria heterophylla (S). Sagittaire hétéro-  
phyllie (F).

عشبة جاذبة معمرة مهلهما امريكية للشالية . شراعيها  
يملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . ازهارها السفلى لاطئة مربعة ،  
ازهارها العليا منقطة مجدية . اوراقها قرصية الانتشاب ،  
مستطيلة الزناد . نصلها هالك الشكل والحجم واللون .  
ازهارها صيني .

٢٢٢٧٨ - قُطْبَرُوس  
Catabrosa aquatica (S).  
Catabrose aquatique (F).  
نبات عشبي يري حولي من فصيلة النجيليات . منيته  
ضفاف مجاري الماء . يعتبر من النباتات الطوعية في لبنان .

٢٢٢٧٩ - قُطْبِي  
نبات يصنع منه جبل مرم وهو غير من الكنبار (السان)

٢٢٢٨٠ - قُطْبِي  
Polaire (F). Polar (E).  
نمت تعريفي يطل على كل ما له صلة بالقطب .

٢٢٢٨١ - قُطْبِيَّة  
Polarité (F). Polarity (E).  
خاصة اتجاه الابرة المنقطعة الى القطب .

٢٢٢٨٢ - قُطْة  
Tranche (F). Slice, Chop (E).  
التقطيع من البليغ وغيره . تقول حات قطه من البليغ .

٢٢٢٨٣ - قُطْر  
Diamètre (F). Diameter (E).  
خط مستقيم يمر بمركز الدائرة وينتهي عند طرفيها المتقابلين  
فيقسمها الى قسمين متساويين . وهو في مساحته ثلث  
الخط . وقطر المربع والمستطيل والمعين والشبه بالمعين هو  
الخط المستقيم الواصل بين الزاويتين المتقابلتين من هذه  
الاشكال .

٢٢٢٨٤ - قِطْرَاس حَقْلِي ٥  
Lycotocoris campestris (S).  
Lycotocoris champêtre (F).  
حشرة مفترسة من فصيلة القترسيات . جسمها صغير القد

Lagocle (F).

## ٢٢٢٩٠ - قَطْرَب

نبات عشبي بري ، طبي ، من السكيات يدهى لقوتها ،  
اطلها .

## ٢٢٢٩١ - قَطْرَب

القُطْرَب ، ويدهى أرطيقون ، نبات شائك الأزهار ،  
ينشب بمن يمر به . داجع أرطيقون .

Clibanarius (S).

## ٢٢٢٩٢ - قَطْرَبَة

Clibanarius (F). Clibanarius (E).

جنس دويات بحرية من القشريات عشاريات الارجل  
طوال الذيل وفصيلة الباغوريات . أنواعها المعروفة عديدة  
منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة || تعيش في الاغوار  
قرب الشواطئ . ملجأها الحيائي جماعي ، جامعاها متوسطة  
العدد || اجسامها تطلو من ٤ الى ٦ سم . انوثها زاهية  
الالوان الجميلة وبمضها مجلج .

Alkalurops

## ٢٢٢٩٣ - قَطْرَبُوس

القطربوس نجم من كوكبة المواء مركزة على رأس البقار  
اي المواء .

Diomedea (S).

## ٢٢٢٩٤ - قَطْرَس \*

Albatros (F). Albatross, Diomedes (E).

جنس طيور بحرية من كليات القدم . موطنها البحار  
الجنوبية من جهتي خط الاستواء . انواعها سبع جميعها  
كبيرة الحجم - عظيمة القدة ، طولها يراوح من ١٦٠ الى  
١٨٠ سم . ويصلها تراوح من ٣٠٠ الى ٤٠٠ سم .  
وهي تطير ضلقل وتومق قنسر وتسرع وتقتس تسعيد ذلك .  
انوثها الى البياض الناصع يلمسناها اجنحتها السوداء اللون  
او الطملاء . مناتهاها كبيرة القدة ، منمنقة المنسر ،  
حنطية اللون ، صفر المولج || قوتها الاسماك والقشريات  
والجيف البحرية . تثنى في انصوص ترصه بالثقل .  
حنطتها بيضة واحدة ترخمها نحو حبة اسابع .

## ٢٢٢٩٥ - قَطْرَس مَرْتِيك \*

Anthocoris confusus (S). Anthocoris confus (F).

حشرة مفترسة من فصيلة القُطْرِسيات . جسمها صغير القدة ،  
يطول نحو ٤ سم . رأسها صغير الحجم ، اسود . غطها  
معتدل الطول . عينها صغيرتان . زياتها دقيقتان ، مبشرا  
الحلب . كوسلها اسود وصحبتها كلك . ظهرها لاسن  
ويتجاوز البين بزايين . بطنها الى السرة السوداء . قوتهاها  
الى الشقة السرا . || تألف المواق التي يكثر فيها الحور  
والصفصاف . تعيش تحت القشور . قوتها ما تقتنه  
من حشرات .

## ٢٢٢٩٦ - قَطْرِسيات \*

Anthocoridae (S). Anthocoridae (F). Anthocoridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة خنطانات الاجنحة وطيفة نصفيات  
الجنح . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة  
في معظم اصقاع البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة والباردة ||  
اجسامها صغيرة ، معتدلة التبطيط ، ملونة . رؤوسها  
صغيرة . اعطالها نشطة ، لثلاثة الاجزاء . عينها جانبية ،  
ناشرة . قوتهاها الاستعمارية رباعية الفصل . كوسلها  
محببة . حباتها صغيرة . ظهرها ورواشها لاحقة في  
منظر الاقتراف . حناجب ظهرها لاثنية ، تكثر فيها  
الاستطالة . قوتهاها صغيرة || الحشرة الجملانة مفترسة في

يطول نحو ٤ سم . رأسها محرم ، جزوي اللون . غطها  
معتدل الطول . عينها صغيرتان ، ناشرتان . زياتها  
دقيقتان ، مهدبان . كوسلها بني اللون ، جزوي المولج .  
حنطتها صغيرة . ظهرها لا يلمس كامل البطن ،  
حنطتها بلون الكوسل بملوها تدبج حنطي ونغة سمره .  
بطنها الى الجورة الباهتة . قوتهاها حنطية || تألف القنابات .  
قوتها الحشرات الصغيرة والهورم .

## ٢٢٢٩٥ - قَطْران ، قير

Goudron, Polx (F).

Tar, Pitch (E).

مادة راتنجية تستخرج بالتقطير من احشاش الصنوبر  
والتنوب والسرو وغيرهما . ومن القوم الحجري .  
قُطْران الخشب

Goudron de bois

قُطْران الفحم الحجري  
يحمس في الهواء ويستعمل لطلاء جروح الشجر .

Sapin gracieux (F).

## ٢٢٢٩٦ - قَطْراني

هو التنوب الجليل ، اطله .

Sapin de Cilicie (F).

## ٢٢٢٩٧ - قَطْراني اصغر

هو التنوب الاناضولي . اطله .

## ٢٢٢٩٨ - قَطْرَب

جاء في كتاب الجلسط : || القُطْرَب طائر يحول الليل  
كله لا ينام . وقالوا اجبول من قُطْرَب واسهر من قُطْرَب . ||

## ٢٢٢٩٩ - قَطْرَب \* ، قَطْرَب

Colobus (S).

Colobe (F).

جنس قرد من فصيلة الهباريات . انواعها المعروفة ١٢  
جميعها افريقية تألف غابات واحراج المناطق الاستوائية  
وما جاورها || اجسامها رشيقة القوام تطلو من ١٠  
الى ٨٠ سم . تتميز بانعدام اهام ايديها . انوثها جيلة  
الشعر . الوانها تختلف باختلاف الانواع فيها الاسود  
والابلق والاسمر والاصهب . اذنهاها تطلو من ٥٠ الى  
٩٠ سم . || قوتها التبار والحبوب والجذور . تعيش  
جماعات كبيرة يراوح عددها من ٤٠ الى ١٥٠ .  
اناثها تصعب جروا واحدة ترصمه نحو ٥ اشهر || اما  
انواع القُطْرَبيدي فهي :

C. palliatus (S).

قُطْرَب ابيض المنكبي

C. à épaules blanches (F).

C. angolensis (S). C. d'Angola (F).

قُطْرَب انكولا

C. ferrugineus (S).

قُطْرَب سديدي اللون

C. ferrugineux (F).

C. ursinus (S). C. ourson (F).

قُطْرَب دلي

C. kirki (S). C. de Zanzibar (F).

قُطْرَب زنجبار

C. Satanas (S). C. satan (F).

قُطْرَب ساتان

C. guereza (S). C. guérza (F).

قُطْرَب فروزه

C. vellerosus (S). C. à fourre (F).

قُطْرَب فروي

C. foal (S). C. de Foa (F).

قُطْرَب فوا

C. cristatus (S). C. à huppe (F).

قُطْرَب تنبراني

C. fuliginosus (S). C. fuligineux (F).

قُطْرَب كفتي

C. polycomus (S). C. à camail (F).

قُطْرَب مردن



قطر



قطرس



قليلة العدد. تألف الاغوار والمناقع وضفاف مجاري المياه الدلبة || اجسامها مستطيلة ، اسطوانية الشكل او قرصية. رؤوسها مبطلة الجرم ، شبه مخروطية التلوزن. جميعها رباعية القوائم والاصابع || اعرف اجناسها واشهرها القلطورس والقلطور.

Chotorhea (S).

Chotorhé (F). Chotorhea (E).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الدثائيات. موطنه يمتد من الهند الى جزر الزابج. يألف الرياض والحراج القريبة من مجاري الماء || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٧ سم. يتميز بكبر منقاده الفصليح الشبه مخروطي الشكل وباسطالة سباله التي تمتد حتى الزور. جناحاه معتدلا الطول. ذنبه هشاري الزفال ، مستدير الطرف. ثوبه العلوي الى الخضار الالامى. واسه احر. عسرام الى الزرقه. عيناه كبرتان ، مطوقتان بالاخر. صدقه عينه ذهبية اللون. عنقه واعل صدره الى الزرقه المرقوشه بالابيض. بطنه وافيئكه الى الخضار الاصفر المواج. منقاده ورسفاه صغريه. واصابعه الى الطلعه السمره || قوته اخشرات من صغريه الى كبريها وبعض البآر اعصها العنبيه وبعض البلور || يدخن افسوسه في حبر محتفزه في الثرية. الاثني ثيبض ٣ الى ٤ بيضات تحضنها متناوبه الذكر نحو ١٣ يوما.

Diamétral (F). Dismetrical (E). **قَطَرِيّ** ٢٢٣٠٤ -  
ما كان تابعا لقطر ككوكب خط قطري .

Abattage, Coupe (F). **قَطْل** ٢٢٣٠٥ -  
Felling (E).  
فصل الاشجار عن اربابها وطرصها على الارض .

Jugulation ٢٢٣٠٦ - **قَطْعُ الْوَدَجِ**  
اسدى طرائق جزر الماشية .

Section longitudinale (F). **قَطْعُ طَوِي** ٢٢٣٠٧ -  
Longitudinal section (E).

Section conique (F). **قَطْعُ مَخْرُطِي** ٢٢٣٠٨ -  
Conic section (E).

Ellipse ٢٢٣٠٩ - **قَطْعُ نَالِيس**

٢٢٣١٠ - **قَطْعَاوَات** هي صدمات الارجل ، اطلها .

Parcelle (F). Parcel, Portion (E). **قِطْعَة** ٢٢٣١١ -  
هي القطة من الارض التي تؤلف في مفهوم المساحة وحدة مقاربه .

٢٢٣١٢ - **قِطْعَة الْفَرَسِ** ، **قَرَسِ صَغير**

Petit cheval (F). Equuleus (E).  
قطعة الفرس او الفرس الصغير كوكبة نجوم شمالية المربع مركزها بالقرب من كوكبة الفرس الاعظم || نجومها قليلة العدد منها اربعة مزدوجة ونجمان مثلثان . اشهرها « ثير قطعة الفرس » .

٢٢٣١٣ - **قَطَفَت** ، **قَطَفَت** ، **اخترقت** ، **خترقت** ،

**جَتَّى** Cueilir (F).  
To gather, To cull, To pluck (E).  
اتقطع الانتاج من صدره كالثآلر من الاشجار والاعزار من السوق والاغصان والاوراق من النباتات ، الخ .

جمع الانواع . اما البرقة فانما توش على النبات وتمت لها الاجزاء حيث تقترس ما تستطيع من حشرات ودويبات .

Nepeta (S).

Népète, Cataire, Chataire (F).

جنس نباتات عشبية عطرية برية ممرسة من فصيلة الشفويات. انواعه نحو ١٥٠ معظما افرقي المنبت يكثر في البراري الخمر . سرفها مستقيمة فراءه . اوراقها متقابلة متنفقة يفضية الشكل ، فصلها سنن الحافة ، خلل الصفحة السفلى . ازهارها عتودي التجميع . ازهارها فراسه العرف الاغاذ لونها الى الزرقه المتباينة المواج || اعرفها واشهرها ما يتبع .

٢٢٢٩٨ - **قَطَرَمُ الْهَرِّ** \* ، **حَضِيضَة الْهَرِّ** ، **قَالْدَنْجِ جَبَلِيّ**

Nepeta cataria (S). Népète cataire, Herbe aux chats (F). Catmint, Catnip, Nep (E). Echtes Katzenkraut, Nept (D). Cataria comune, Erba gattaja, Gattala (I).

نوع من القطرم المينول يعيش في المواقع الرطبة . ساقه منتصبه فراءه تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقه عطرية الرائحة ، زيا النصل . عتايده ليدة . ازهاره صغرية القند ، يبيض اللون زرقاه المواج || ازهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢٢٩٩ - **قَطَرَمُ بَنْسَجِيّ** \* ، **زَهْر مَرِيَم**

Nepeta mussini (S). Cataire violet, C. de Mussini (F). Violet catmint (E). Neptpflanze (D). Cataria violacea (I).

نوع من القطرم . ساقه مسطحة تعلو نحو ٤٠ سم. فرونها منتصبه تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. جميعها خلية الماء ، طلاء اللون . اوراقه يفضية الشكل ، قليلة القاعدة . فصلها غشخ للامس اغضر الصفحة العليا ، خلل السفلى . البزراه اللون . عتايده ازهاره رطه . ازهاره بنفسجية . ازهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢٣٠٠ - **قَطَرَمُ كَبِيرُ الزَهْر**

Nepeta grandiflora (S). Cataire à grandes fleurs (F).  
نوع من القطرم ساقه منتصبه تعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه كبيرة القند مزففة النصل . عتايده رطه . ازهاره كبيرة زرقاه اللون فواسه العرف || ازهاره يستمر من سيزان الى آب .

٢٢٣٠١ - **قَطَرُوس** \* Proteus anguinus (S).  
Protée anguillard (F).

حيوان قارب وحيد الجنس والنوع من فصيلة القلطورسيات ورتبة السرفويات . موطنه بعض اغوار يوفولافيه واعصها قدامية || جسمه قرني الشكل ، رباعي القوائم ، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. رأسه مبط الجرم ، شبه مخروطي الشكل . عيناه شديدا الصغر لذلك يبدو كأنه اكه . ثوبه الى البياض الوردي الباهت ، خصه الحشوية حراء اللون || قوته الكبدان واللوبات الصغيرة .

٢٢٣٠٢ - **قَطَرُوسِيَّات** \* Proteidae (S).  
Protéidés (F). Protéides (E).

فصيلة حيوانات قازية من الضفديحات ورتبة السرفويات وفئة مستقرات الحائشم . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة



قطرم الهر



قطرم بنسجي



لطورف



قطن



قطن شائع



قطن



قطن

## ٢٢٣٢٤ - قُطْلَب مَنزِيَس

Arbutus menziesi (S). Arbousier de Menzies (F). نوع من القُطْلَب، مِهْدَة البلاد الأمريكية، ثَمَرُهُ تَمْلُو من ١٥ إلى ٣٠ م. أوراقها كبيرة القد. ازهارها عَنُقُودِي التَّجْمِيع. ازهارها بَيْض، ثَمَرها وريدَة تَمْلُو نحو ٣ سم.

## ٢٢٣٢٥ - قُطْلَبَة ، مَلَاعِيْبَة \*

Cattleya (S). Cattleya (F). Cattleya (E). جنس نباتات حَمْليَّة من الجُملَنِيَّات، أنولُها المَرْصِيَّة عَديَّة، مِنْهَا أَمْرِيكَة الاسْوَليَّة || أرواقها مَسْطِيعة التَّصَال للمُتَسَاكِنَة المَقْصَرَة كَالْمَلَّاح. تَصَالها جَبَلَة الخُصَار البَحْرِي. ازهارها كَبِيرَة البَيَلات الْفَارِشَة التَّصْمِجَة || تَزْدُر في المَرَاكِن لَكِنها تُخْشَى الْبَرْد.

## ٢٢٣٢٦ - قُطْم

Orgasme (F). Orgasm (E). حَالَة الشَّيْء أَي الْإِعْطَاف الْمَطْلُوق الَّتِي تَعْقِب النَّج وَتَسْقِي الرُّوْض.

## ٢٢٣٢٧ - قُطْطَار

Hille (F). Hilum (E). هو الْفُوقَة الَّتِي فِي التَّنَوُّة يَحِي نَكْتَة بِيضَاء عَنُقُودَة الْآبَات.

## ٢٢٣٢٨ - قُطْمِير

Tégmen, Tégumen (F). Tegument (E). هو السَّيْرَاء أَي الرُّشَاق الْبَاطِي الَّذِي يَغْلُف الْبُورِصَة وَالْبُورَة.

## ٢٢٣٢٩ - قُطْن

Croupion (F). Parson's nose (E). هو مَنِيَت ذَنْب الطَّائِر رَاجِع ذَنْك. ح أَفْطَان.

## ٢٢٣٣٠ - قُطْن ، حَقْو

Lombes (F). Lombar (E). ٢٢٣٣١ - قُطْنِيْن ، بَرَس ، طُوْط ، عَطْب ، كُرْسُف

Gossypium (S). Cottonier (F). Cotton plant (E). Baumwolle (D). Cotone (I). جنس نباتات زراعية صناعية من فصيلة البُورِيَّات. أنولها عَديَّة مِنْهَا ثَمَرِيَّة مَعْمُورَة تَعِيْش عِدَّة أَعْوَام وَمِنها سَوِيلَة تَعِيْش بِضْعَ الشُّهُور أَلِ أَنْ تَم دَوْرَتُهَا الْحَيَاتِيَّة وَتَبْس.

تَعْرِفُه - الْقُطْن الزَّرَاعِي، يُوْرِه عَام، يَنْصَف بِالْحَتْلِيَّة التَّالِيَة : جَنَة فَنَوَاء تَرْتَفِع من ٨٠ إلى ٣٠٠ سم. تَزْكُر

عَل جَنَت مَسْتَقِم تَمْلُو سَال لَغِيْف ثُمَّ عَظِيْبَة التَّرْكِيْب تَنْفَرع مِنْهَا الْفُتُود وَالْأَفْئَان || أرواقها مَسْتَقَة كَنِيَّة

مَقْصَصَة رَاحُوح عِدَّة فَرْصُوسِها مِنْ ٣ إلى ٩ || ازهارها فَرْدِيَّة ، كَبِيرَة الْقَد، جَرْمِيَّة الشَّكْل تَزْكُر عَل مَالِيْق

مَحْرُورَة . الرُّوْثَانِيَّة تَتَبَايَن اِعْمَا الْأَصْفَر وَالْأَحْمَر وَالْأَبْيَض، وَالزَّرْعَة كَامِلَة التَّرْكِيْب ، عَظْوِيَّة ، خُصَايَة الْعُقَالَات

وَالْبَيَاتَلَات ، عَديَّة الْأَسْلِمِيَّة وَالْمَقَات. عَظْمَا يَحْرِي مِنْ ثَلَاثَة إِلَى خَمْسَة مَصَارِيْع يَتَأَلَّف مِنْهَا الْمِيْشُ الثَّلَاثِي أَوْ

الْحَامِي. الْفَلَق || ثَمَرها اِرْجَوَانِيَّة الْوَرْن تَعْمِي فَزَاة ثُمَّ كَتْمُج . وَالْمَاذِيَّة يَمْد تَكُون زُرُوحًا وَيَذْأَتَا التَّالِيَة تَنْتَضِع

عَنْ لَدَلَة أَوْ خَمْسَة أَرْبَاع مَلُوءَة بِالتَّيْل يَحْمِلُ كُلُّ مِنْهَا مِنْ خَس إِلَى طَرِ زُرُور وَفِيَّة الشَّكْل سَوِيْد الْفَلَاث يَنْشَاقُ

الرُّزْب اللَّاصِق بِهَا. أَمَّا نَسْبَة التَّيْل إِلَى الزُّرُور فَشَارُوح

مِنْ ٢٦ إِلَى ٤٢ ٪. وَالتَّالِيَة حَلَه فِي الْمَادَّة الصَّنَاعِيَّة الْحَامِي

الَّتِي تَصْجِع بِدَهْنًا وَنَسْجِها تِلْكَ الْأَقْلَافَةُ الْمَشْهُورَة الَّتِي تَبْلُغ نَسْبَة اسْتِخْلَامِها فِي الْعَالَمُ نَحْو ٧٠ ٪. فِي مِيزَان

سَائِر الْأَقْلَافَة الْأُخْرَى مِنْ حَرِيرِيَّة وَصُوفِيَّة وَفِيْعَهَا لَا يُزِيد اسْتِخْلَامُها عَنْ ٣٠ ٪.

## ٢٢٣٣٤ - قُطْن ، اِغْتِرَاف ، جَنِي

Cueilage, Cuellaison (F). Gathering, Gathering-time (E).

هو اِقْتِطَاع الثَّمَر من الْأَشْجَار وَهُوَ أَيْضًا اِغْتِرَافُ وَالْعُطَاف وَالْمَرَام وَأَجْزَار أَي وَقْتِ الْقُطْف.

## ٢٢٣٣٥ - قُطْب

Grappe (F). Bunch (E).

الْعَنُقُود سَاعَة يَقْلُف .

## ٢٢٣٣٦ - قُطْن \*

Commiphora kataf, Balsamodendron kataf (S). Baumiier de Kataf (F). Balsam of Kataf (E). Kataf Myrrhenbaum (D). Balsamo di Kataf (I).

نوع من البَلَسَان يَنْتَمِي إِلَى فَصِيلَة الْبُخُورِيَّات. ثَمَرُهُ مَتَوَسِّطَة الْقَد رَاجِعِيَّة الْعَصَاة يَسْتَخْرَج مِنْهَا صَوْرُغ وَادْعَان

مَطْرِيَّة شَالَمَة اِسْتِمَال. اِنْشَاقُهَا مَتِيْنَة، صَنَاعِيَّة.

## ٢٢٣٣٧ - قُطْف

Arroche (F). هو الْبَرْصُ هَ أَطْلِبُه. الْوَاحِدَة قُطْفَة. وَتَه الْأَبْيَض وَالْبَحْرِي.

## ٢٢٣٣٨ - قُطْطَار

Pluvian (F). هو - التَّوْدُم، طَائِر يَدْخُلُ فَمِ اِلْتِصَاق تَرَاكُل مَا فِيهِ مِنْ الْبَرْد.

## ٢٢٣٣٩ - قُطْطَلَة

صَوْت اَلتَّمَا.

## ٢٢٣٤٠ - قُطْل

Blanc étoc, Blanc estoc (F). Felling clear (E).

قُطْع شَجَر اَلْحَرِيْبَة مِنْ اَمْرِيَا قَطْلًا كَامِلًا.

## ٢٢٣٤١ - قُطْلَب ، قُطْلَبِيْن ، بِيْج ، قَاتِل أَيْبَة

Arbutus (S). Arbousier (F). Arbutus (E). جنس نباتات حَمْريَّة مِنْ فَصِيلَة اَلْعُطْنِيَّات، أَنْوَالُها عَديَّة مِنْهَا الْأَشْجَار وَالشَّجَرِيَّات. سَوَقُهَا مَتَصِّبَة فَرَاه. أرواقها

أَبِيْدَة، شَبَّ بِيْضِيَّة، مَسْطِيعة، مَسْنَة اَلْحَالَة؛ تَصَالُها مَالِش الْبُشْرَة، لَاصِق الصَّنْفَعَة اَلْبَالِيَا اَلْخُصَار اَلْوَرْن، اَلْحَلَق السَّكَل.

أرواقها عَدَّة تَصَلُّح لِدَلَاة لِأَنها غَرِيْرَة الْمَادَّة اَلْمَانَعَة.

ازهارها جَلْبَلِيَّة الشَّكْل. ثَمَرها حَنْبِيَّة نَاشِقَة وَهِيَ بَلِيْطَة اَلنَّجِص حَامِزَة اَلْمَالِق ، لِلدَّيَّة اَلطَّم || أَشْهَر أَنْوَالُها مَا يَتِيْع.

## ٢٢٣٤٢ - قُطْلَب شَائِع \* ، عَمِير الدُّب ، جِنَاء اَخْمَر

Arbutus unedo (S). Arbousier commun, Arbre aux fraises (F). Arbutus, Strawberry, Cane apple (E). Echter Erbeerbaum, Laudbeere (D). Albatro, Corbezzolo, Brichello (I).

نوع من القُطْلَب الْمَبْدُول فِي الْأَشْجَار الْبَنَانِيَّة. ثَمَرُهُ تَمْلُو مِنْ ٣ إِلَى ١٥ اَمْتَار. سَاقُهَا وَأَعْصَانُها حَر اَلْقَاد.

أرواقها مَتَاقِيَّة مَسْتَقَة، تَصَالُها جَانِب الصَّفْحَة اَللَامِة الْمَسْنَة اَلْإِطَارِث.

ازهارها عَنُقُودِيَّة التَّجْمِيع وَرِدِيَّة الْوَرْن. ثَمَرها شَبْكِيَّة الشَّكْل اِرْجَوَانِيَّة تَمْلُو نَحْو ٢ سم. لَهَا نَاشِق

اَلْمَادَّة.

## ٢٢٣٤٣ - قُطْلَب عُنُقُودِي

Arbutus andrachne (S). Arbousier paniculé (F).

نوع من القُطْلَب، مِهْدَة اَلشَّرْق اَلْأَسْوَط. ثَمَرُهُ تَمْلُو مِنْ ٥ إِلَى ١٢ م. سَاقُهَا وَأَعْصَانُها جُزْوِيَّة اَلْحَاد. أرواقه بِيْضِيَّة

الشَّكْل ، قَلْبِيَّة اَلْقَاعِدَة، جَامِدَة اَلنَّصَل. اِنْزَارُها عُنُقُودِي التَّجْمِيع. اِنْزَارُه اَسْفَلِيَّة الْوَرْن. ثَمَرُه قُرْزِيَّة.

تنتمي إلى ثلاثة عناصر رئيسية هي الآزوت والفسفور والبوتاس . انضغاض القطن تلك التي تركيبها يشمل ما يحتاج إليه القطن دون نقص أو زيادة || ولما كانت الحاجة تختلف باختلاف مقتضيات التربة والنبات لذلك فلا بد من احتياجه صلبة وسطية يجوز فيها التحويل وفقاً لحالة التربة . والصيغة الفضل الممكن احتياجه تتركب من ١/٢/١ أي واحد آزوت واثنين فسفور وواحد بوتاس . وقد يجوز تحويلها ما يزيد الآزوت من واحد إلى اثنين أو يتخفيض البوتاس من واحد إلى ثلاثة أرباع الواحد || أما الكمية اللازمة للقدم الواحد فتراوح من ٧٥ إلى ١٠٠ كيلو .

حراثة — يجب أن تكون الأرض المدة لزراعة القطن خالية من الأعشاب ، معتدلة الرطوبة ذات تربة ناعمة لا تلغ فيها ولا من || ولكي تأتي الحراثة بالنتيجة المنشودة يجب القيام بها في الأوقات المناسبة وفقاً لحالة التربة والعوامل الجوية .

زراعته — من مستلزمات زراعة القطن العناية المستمرة والسرور الدائم . ومن الواجب ألا تكون كثيفة لأن الكثافة تمنع النمو وتقتض الشواذب والأوصام وتسبب التخلص من الأضرار والكناج .

ميعاد الزراعة — ليس لزراعة القطن وقت معين كل من تقدمه أو جازوه كان نصيبه الإخفاق . ولكن لزراعة أي نوع كانت أوقات ملائمة لا يجوز الاستعجال بها . وسيت أن القطن يتطلب الكثير من الحرارة للوصول إلى كامل انتاجه ، وهو يخشى أمطار الخريف وصقيعه . لذلك يحسن بذرهما باكراً للاستفادة من الأحوال الجوية الملائمة أطول مدة ممكنة . وأنسب وقت لبذرهما من ٢٠ آذار إلى ٢٠ نيسان || وأن يذر باكراً في العقد الأول من آذار وكانت زراعته تقرأ لا بد من تقطيع البذور بالبرميل منماً لتسبك التربة

تحديد المسافات — لتحديد المسافات شروط عديدة أولاً الصرم المستحب ثم طريقة البذر أن آلية أو يدوية ثم حالة التربة وظروفها الخاصة ثم الاقليم وعوامله المناخية ثم الموقع والمعرض ثم نوع الزراعة أن مروية أو عذبة || لذلك فالنسب المسافات تلك التي تراوح خطوطها من ٥٠ إلى ٧٠ سم . ولا تقل فسماتها البينية في الخط الواحد من ٤٠ سم .

البذر — يذرع القطن إما نثراً أو لقطاً أو نثراً فاليدل نثراً لا يلائم أقاليم البلاد العربية وعواملها الجوية وطرق دجا وظروف زراعتها || أما اللقط حل فرصة التلم أو بواسطة المبادر الآلية فهو عملية شائعة سريرية لكنها تستلزم الكثير من البذار وتستوجب عناية خاصة تابعة قلاً يقوم بها المزارع || أما طريقة البذر نثراً بقصد التخطيط فهي الأسمن أعما يجب أن تكون البذر أنما في فج التلم أن كانت الزراعة عذبة أو في الرعي الأخير من سقمه إذا كانت الزراعة نصف مروية أو حل غارب التلم إذا كانت مروية || وكيفية كانت الطريقة المثبتة فلا بد من الانتباه الكلي لوضع البزرة في التربة مع العلم الانسب لنباتها ونشورها لأن البزرة العذبة تكثر الرطوبة عليها ويقل عنها الهواء ويقل فوقها الغطاء فتتوت من العفن . والبزرة الطائفة يخف عليها الغطاء ويكثر حولها الهواء ويخف عنها الرطوبة فيفسد بعد الاثناس ولا تنبت أصلاً || أما البزرة التي صار طمرها حل العفن الانسب وهو نحو ٤ سم . فأنها تكون في محيطها الطبيعي الواجب بيده من تأثيرات العوامل الجوية الضعيفة ومن الظروف التي تلتقطها والرطوبة الزائدة التي تلتكمها .

تاريخه — من المؤرخين من قال أن القطن أزين من التاريخ . ومنهم من يقول أنه قدم العهد غير أن قسمة لا يتفق أصحاب المصور الفرعونية . والدليل حل ذلك عدم استعماله في أقطه القراصة بينما كانوا يستعملون الكتان والقطن || لأن صقلاً أو موطاً فالخيز والقرس عروق فزرعه واستعملوه وكذلك الكبر منذ أن استولوا ما بين البحرين . والرب هم الذين نقلوه إلى سورية فصر فاجازر صقلية فالاندلس . ثم الذين عروق بجميع شعوب شواطئ البحر المتوسط . فادخله الأوروبيون فأنهم أخذوا الخفلة بلفظ العربي (قطن cotton) دون تحريف .

القيمة — ينمو القطن في جميع الأقاليم التي لا يقل متوسط حرارتها مدة نمو الخضري وأدراك ثماره من ١٨ أو ٢٠ درجة مع بشرط أن لا تكون فوارق الحرارتين القصوى وأدراك كبره ونباتية . وهو يخشى الصقيح في نيسان وأيار وهما الحريف الجارد المساطر . وكل زراعة تخرج من نطاق هذه القنوس المناسبة تعتبر من المغامرات الخطرة هذا أن لم يتوصل العلم إلى الآلي القريب إلى استنباط هماغ جديدة سريرية النمو الخضري والذرة الحياتية تتفوق بتكثيرها وأدراكها الإصرار المعروفة حالياً .

تربته — يوجد القطن في الآرية الطبيعية الرملية والرملية الطبيعية التي لا تقتصر إلى الكلس والتي يربو غورها من ١٠٠ سم . لأن معظم جلود القطن وشرشه يلتصق هذا القاع || وقد تلازمه أيضاً كل تربة عيقة الغور قليلة الانساج بشرط أن لا تتفد منها الرطوبة بسرعة || وحيت أنه من النباتات المفروسة فيها سرعة النمو والأدراك لا يستحسن زهره في الآرية المنعجة المتأسكة عوفاً من تأخير نموه واستطالة دورته الحياتية || أما الأراضي الرملية والقلية التي لا تحتفظ برطوبة الري أكثر من ستة أيام فأنها لا تصلح أبداً لزراعة القطن وكذلك الآرية الكثيرة الحمص لأن الحمص تمتع التربة من استيعاب كامل مغذوها من الحرارة الضرورية .

تسميده — يعتبر القطن من النباتات الفسرة التي تجهد التربة وتستهز خواصها . فتكرار زراعته في التربة حينها يفقد هذه التربة جزءاً من عناصرها الأولية والثانوية . لذلك لا بد من البحث عن أنجح طرق الإخصاب وإتباع أفضلها حفاظاً حل التربة وزراعتها || وسيت أن الدورة الزراعية والتسميد هما المبدأان الأساسيان اللذان يرتكز عليهما محور الحصب . فنقول في الدورة الزراعية أنها ضرورية جداً بشرط أن لا تكون ثنائية لأنها تصبح قليلة الفائدة . أما الدورة الثلاثية التي تلجح تربة الوقت اللازم لتعزير نشاط جراثيمها وتجنب بعض ما فقدته من العناصر . فأنها أصح الدورات || أما التسميد والغاية منه إعادة العناصر التي صدرتها التربة مع حاصلها فهو حل شكلين متضوي ومعدني .

١- الأسمدة العضوية : الأسمدة العضوية أشهر من أن تعرف وهي شائعة الاستعمال أهمها غني البقر والجاموس فرث الخيل وصر اللباب فيبر اللحم والماغز || وألحي الذي يعتبر من الأسمدة الباردة يستعمل في الآرية الثقيلة الاندماج لأنه يخفف من مقدور استيعابها الحرارة ويقوي فيها خاصة الاندماج وينشط حل الجراثيم المفيدة ورسب البيئة الدبالية اللازمة لنبات فضلاً عما يتركه من غذاء عصري لنبات || أما الروث فيستعمل في الآرية المنتجة لأنه يحما بحرارة ويخفف من انفساجها ورطوبتها بد لا يمتها حل القيام بجميع أعمالها الجروفية والكياوية .

ب- الأسمدة المعدنية : الأسمدة المعدنية كما هو معروف

ترقية - تظهر عادة بؤادر القطن بعد القطف أو النقر بنحو عشرة أيام. ويصير إلى الترقيع بعد ظهور البؤادر بيوتين ولا يجوز تأخير هذه العملية خوفاً من اتساع فارق النمو بين النباتات الأولى ونباتات الترقيع فتأتي هذه الأخيرة متخلفة ضعيفة وقد لا تسلم من شر الحشرات والأمراض.

عده - الخلف أو التقدير عملية لا بد منها أثناء لزاسم النبات على الغذاء وتنشيطها ولالاتاج. وقد تم على مرحلتين في الأول وذلك بعد ظهور البؤادر بنحو ٢٠ يوماً ينتزع من النقرة كل ما هو ضعيف ويزيد من الثلاثة. وفي المرحلة الثانية وذلك بعد الأولى بمسرة أيام تنتزع النباتات الضعيفة ولا يترك في النقرة الواحدة إلا نبات واحد ولا يجوز تأخير الخلف عن الزمن المعلن خوفاً من الإصابة بالثآليل من الضعف والسقم. وإذا كانت الزراعة قليطاً فلا موجب لخلفها على مرتين بل يباشر تقريعها عندما يرايح ارتفاع نباتاتها من ١٢ إلى ١٥ سم.

ريه - ليس الري مواعيد مقررة ثابتة لانه مرتبط بمحالة جفاف التربة والجفاف يبين عليه شئ العوامل الجوية من رياح وحرارة وتبخر ورطوبة جوية نسبية وضوح وضوء... ومن المستحسن ري القطن بمعدل ينمو بنحو ٢٠ يوماً إلا في حالة الترقيع. وقد يتطلب القطن مبدئياً ثلثي ريات. الري الأول بعد البذر بنحو ٣٠ يوماً ومن ثم كل أسبوعين مرة حتى أواسط شهر آب حيث يجب توقيف الري خوفاً من تعجيل النمو الخضري الذي يؤثر الإدرار ويضرس النواحي الحديثة إلى فتك البودة القزنفلية التي تكثر في هذه الأونة. أما إذا كانت الزراعة بحاجة ماسة إلى الماء ولا خوف عليها من البودة القزنفلية فلا مانع من ريهما من جديد.

٢ - مهاد الجني : يستمر الجني عادة من أواخر آب إلى أواخر تشرين الأول وهو منوط بمعدل كمية وموسمية تسطير عليها عناصر المناخ. وفي سبيل التذكير نقول انه لا يجوز أبداً جني الكنايف قبل أسبوعين زروها لأن الاطكان التي يتخللها زرع آخر يمن عن علم الكنايف نفسها لا يمكن استيعابها من الاصناف الجديدة المادسة الشوايف.

٣ - طرق الجني : يجنى القطن إما باليد أو آلياً بواسطة القطناط. لذلك فطرق جنيه تختلف مع البلاد المنتجة لانها منوطه بإمكانات اليد العاملة وسهولة النقل والجمع والحفظ.

١ - طريقة الجني الشامل : إنها لا شك أهم الطرق استعمالاً في البلاد العربية، تقوم على ترك الملقطة حتى اكتمال نضج جميع ثمارها فيصار إذا ذاك إلى جني وجمع كل ما تقطع من الكنايف وما سقط منها على الأرض فتنتقل إلى مكان الفرز حيث تنظف من القشور والأوراق والقصوص المبرومة. جيوب هذه الطريقة عديدة لأن كثرة تغليب القطن في أثناء مختلف عمليات الفرز لاتزاح القصوص المبرومة والقشور والأوراق بسبب التلغاف القصوص الجيدة وتلوينها بجراثيم الففن الأسود الموجود في القصوص المبرومة فتسقط من ذلك رتبة القطن فيبقى منه وتقل أنتاجه.

٢ - طريقة الجني المتتابع : قوامها جني الكنايف تباعاً. وهي عملية موفقة تزيد من وزن الحصول لأنها تبعد البتلة من أشعة الشمس اللاذعة ومن مفاصل السدى والذي المضره فتسقطها من أعطاط صفحتها الرئيسية. اللون والمثانة، وتحول دون سقط الكنايف على الأرض.

٣ - طريقة الجني الآلي - عملية اقتصادية تقوم بها القطناط الآلية لكنها تقع بالمخاطر منها إذا ذكرناها في طريقة الجني الشامل.

٤ - جمع القطن وفرزه : يجمع القطن بعد جنيه في المكان المده لفرزه وهذا المكان قد يكون أما ثابتاً وبهدي المستوعب أو نقلاً وبهدي الحظية كالشودع يجب أن تكون نظيفة مفرقة بالحش منها من تلويث القطن بشئ الاقذار. يتبنى عملية الفرز حد وصول القطن إلى الملقطة إلا إذا كان القطن من جني الصباح الباكر ولا يزال رطباً من الندى فمعدنا يقتضي نشره بعض الوقت ريهما يجب ثم يفرز القطن عادة إما بالأيدي أو بواسطة.

عده - ان كانت رطوبة التربة تحجب النبات فمزق التربة الذي ينظفها من الاعشاب الضارة ويحافظ على رطوبتها على واجب جليل النفع. يمزق القطن عادة في ثلاث مرات. المرة الأولى بعد الخلف وتقبل الري الثانية. من الضروري ان تكون سطحية، طائفة ما يمكن، خوفاً من اقتلاع النباتات الفتية أو قطع شروشها الدقيقة. والمرة الثانية ثم عادة بعد الري الرابعة. الغاية منها اقتلاع الاعشاب الضارة وتفكيك التربة وتهويتها وتصلحها للطرول ويجاري الماء وتخفيف النباتات إذا كان ذلك واجباً. أما المرة الثالثة المبروقة بالسقم فنورها يأتي بعد الري السادسة. قوامها ركش التربة لتجديد عزم الجذرات المتأخرة ثم كتم النبات وضعفه بالقرب ليقوى على استحالة صف الرياح. وإذا كانت الزراعة حديثة فن الواجب أيضاً عرقها وكهسا في الاوقات التالية : يباشر بالمزقة الأولى بعد الخلف بأسبوع وليس أكثر خوفاً من ان تقعد التربة الكثير من رطوبتها. ومن الأفضل ان تكون هذه المرة خفيفة سطحية. أما المرة الثانية والتخفيف فيباشران بعد المرة الأولى بنحو ثلاثين يوماً ومن الواجب ان يكون الفرق حقيقاً لتضرب كل ما أمكن من أنابيب استهلاك الرطوبة.

جنيه - ١ - معاومات عامة : القطن كما ذكرنا جنية فناء يستمر ازدهارها نحو ثلاثة أشهر. وهي تبشر عند استيعابها نحو ٢٠٠٠ مسرة وقد يتم ذلك في غضون ثلاثة أشهر. ومن التمييز إلى اكتمال البرعمة الزهرية وأنبلاجها عن زهرة كاملة نحو ٥٥٠ مسرة التي يمكن الحصول عليها بمدة ٢٥ يوماً. ويستمر الزهرة نضرة زاهية نحو ٤٨ ساعة إلى ان يتم تأيرها فيسرح لها وتذبل بضع ساعات

## ٢٢٣٣٨ - فُطْن مُسَجَّر

*Gossypium arboreum* (S). *Cotonnier en arbre* (F). *Tree cotton* (E). *Baumwollenbaum* (D). *Cotone arbusto*, *C. dipietra* (I).

نوع من الفُطْن المعمّنة الهند. شجرته تعلو من ٤ إلى ٦ أمتار. أوراقه ثلاثية أو خاسية التفصيص. سلاخها قليلة القاعدة، خلية الصفحة السفلى. كنانته كبيرة القد، قصيرة التيلة، ناصعة البياض، محدودة الاستعمال الصناعي.

٢٢٣٣٩ - فُطْنَجَة ٥  
*Ampelis* (S). *Cotinga* (F). *Cotinga* (E).

جنس طير من فصيلة القطنجيات ورتبة الجوارم سياتيات المناير. أنواعه المعروفة نحو ٢٠ موطنها غابات ومنافع أمريكا الوسطى والجنوبية. أجسامها صغيرة القد تعلو من ١٤ إلى ١٨ سم. ألوانها ساطعة الألوان الجميلة. مناقبها صغيرة مستعرضة القواعد. قوتها الثار البانمة والخشرات الصغيرة والنمل. أشهر أنواعها القطنجة الزرقاء القلادة.

## ٢٢٣٤٠ - فُطْنَجَة زُرْقَاء القلادة ٥

*Ampelis cincta* (S). *Cotinga cordon-bleu* (F).

طائر من القطنجة. موطنها بعض مناطق أمريكا الجنوبية. تألف الغابات والحدائق القريبة من الأماكن الآهلة. جسمها صغير، معتدل الرقعة يطول نحو ١٦ سم. ثوبها العلوي إلى الزرقة البحرية السفعة المروج. ثوبها السفلي إلى الخضار البنفسجي المروج تملو في الصدر قلادة من لون الظهر يطوقها الأجر. علاطها مشيرة بالأجر. رأسها وأطراف جناحها وذنبها موشة بالأصفر الاسف. طيراتها خفيفة الحركة طويل الشوط. قوتها الثار البانمة والخشرات الصغيرة والنمل. تداث عشها في شجر كمل فناء قليلة الارتفاع. الاثنى تضع من ٤ إلى ٥ بيضات على مرتين في الحول. الترخيم يستمر نحو ١٥ يوماً تقوم به الاثنى بتناوبة الذكر.

٢٢٣٤١ - فُطْنَجِيَّات ٥  
*Cotingidae* (S). *Cotingidae*, *Ampelidae* (F). *Cotingidae* (E).

فصيلة طير من الجوارم سياتيات المناير. أجسامها وأنواعها المعروفة عديدة. موطنها القارة الأمريكية أعصها أمريكا الجنوبية والوسطى. تألف غابات المناطق الحارة. ملجأها الحياتي زوجي باستثناء بعض الأنواع الجماعية. أجسامها مستطبة القد أو كبيرة. تتميز برسابة أهدائها وبألوانها الجميلة الألوان السقاء الحاماة. أعرف أجسامها وأشهرها القطنجة والطرغيب.

٢٢٣٤٢ - فُطْنِيَّيَّ، حَمَوِيَّ  
*Lombaire* (F). *Lombar* (E).

٢٢٣٤٣ - فُطْرِب ٥  
*Catops* (S). *Catops* (F). *Catops* (E).

جنس حشرات من فصيلة القوطيات ورتبة غديات الإجنسة. أنواعه المعروفة نحو ١٠٥ منتشرة في جميع مناطق البلاد المعتدلة والحارة والمنحرفة نحو الباردة. أجسامها صغيرة القد، أهليجية الشكل، تعلو من ٤ إلى ٨ سم. رؤوسها مستعرضة. عيونها صغيرة، ماصعة. تأثيرها ولكوكها نظامية. سلاخها مستطبة. قرونها الاستعاضة غليظة. كواسلها مستعرضة. عذبة. اغداها عذبة، لاسفة. قوتها مستطبة. ألوانها تراوح

الفرزات أو الترابيل الغائرة وعلى حال الفرز ان يقترب جيداً لتنافسة الفُطْن وتختلف مراتبه لانها أساس لشترى وطليا التموليل و بعد فرز الفُطْن وتقسيمه الى الرتب والدرجات المطلوبة يصار الى تعبته ضمن اكياس خاصة نظيفة ثم ينقل الى حابر المخلج حيث يفرز من جديد قبل تقديمه الى الماكنت الحاملة التي تفصل التيلة من البذور.

## ٢٢٣٤٤ - فُطْن آزَب، فُطْن امريكي

*Gossypium hirsutum* (S). *Cotonnier américain*, *Coton à courte soie*, *C. velu* (F). *Upland cotton plant* (E). *Amerikanische Baumwolle*, *Kurze Baumwolle* (D). *Coton peloso* (I).

نوع من الفُطْن الأمريكي المنبت. ساقه وقبره وأوراقه مزينة. ضروبه وأصرامه وهالجه كثيرة البند معظما زراعي وافر الانتاج الجيد. تيلته متوسطة القد مشكورة الصنف.

## ٢٢٣٤٥ - فُطْن البَرَبَادَة، فُطْن مِصْرِي، فُطْن جَزِيرَة البَحْر

*Gossypium barbadense* (S). *Cotonnier égyptien*, *Coton à longue soie*, *C. d'Egypte* (F). *Egyptian cotton*, *Sea Island cotton* (E). *Ägyptische Wollpflanze* (D). *Cotone egiziano* (I).

نوع من الفُطْن الشرقي تيلد في مصر واتصف بمخصائص مميزة منها استطالة التيلة واستطالة الدورة الحياتية وكثرة الانتاج. ضروبه وأصرامه وهالجه عديدة لكنها محدودة الانتشار نظراً لطول مدة بقائها في التربة.

## ٢٢٣٤٦ - فُطْن البِيرُو

*Gossypium peruvianum* (S). *Cotonnier péruvien* (F). *Peruvian cotton plant* (E). *Peruvian Baumwolle* (D). *Cotone peruviano* (I).

نوع من الفُطْن، متوسط التيلة جيد الانتاج، مهد أمريكا الجنوبية. ضروبه وأصرامه عديدة معظما وافر الانتاج لكنه مستطيل الدورة الحياتية.

## ٢٢٣٤٧ - فُطْن الهند

*Gossypium indicum* (S). *Cotonnier indien*, *Indian cotton plant* (E). *Indische Baumwolle* (D). *Cotone indiano* (I).

نوع من الفُطْن الزراعي الجيد الانتاج للتوسط الدورة الحياتية. أصرامه عديدة منها الهند وأند الهند الصينية.

## ٢٢٣٤٨ - فُطْن حَشْفِيَّيَّ، فُطْن الشَّرْقِيَّ، فُطْن مُلْتَبِّ

*Gossypium herbaceum* (S). *Cotonnier d'Asie* (F). *Levant cotton plant* (E). *Kurze Georgia Baumwolle* (D). *Cotone erbacea*, *C. annua*, *Bambagia* (I).

نوع من الفُطْن الشرقي الناصر الصنف القليل الانتاج. كنانته كبيرة القد قليلة البند. تيلته مستطبة ناعمة ويتينة. ضروبه وأصرامه لا تحصى لانه دخل في تجميعه. معظما ألقان العالم أعصها الاطمان المصرية والأمريكية.

## ٢٢٣٤٩ - فُطْن شَرَقِيَّ

*Gossypium obtusifolium* (S). *Cotonnier oriental* (F). *Oriental cotton plant* (E). *Nanking Baumwolle* (D). *Cotone orientale* (I).

نوع من الفُطْن الصناعي المعتدل الانتاج والجودة. مهد البلاد الاميرية تكثر زراعته في الصين والنام، تيلته متوسطة القد يفضاه الالن.



ملجبة زرقاء القلادة



فُطْرِب

٨٠ الى ١٠٠ سم. هيئتها هريية الشكل. اوراتها ثلاثية الالوان المتباينة. ازهارها سليلي التجميع متدلي الاطراف. والدردي النباتي.

### ٢٢٣٥٣ - فُطَيْمَة جَمِيلَة \* ، دَلَّاق ، رُغَاف

*Amarantus retroflexus* (S). *Amarante réfléchi* (F). *Wild beet* (E). *Gemüseamarant* (D). *Fior bellosa* (I). نوع من القطيفة الأزرقية. ساقها منتصبه تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. هيئتها هريية الشكل. اوراتها ملونة. ازهارها عقودي التجميع منتصب الطرف. ازهارها الى الالهرة المختلطة المواج.

### ٢٢٣٥٤ - فُطَيْمَة حَسْبِيَة \* ، فُطَيْمَة ذَيْل الثَعْلَب ، فُطُظُور الجَنْدِي

*Amarantus caudatus* (S). *Amarante d'Abyssinie*, *A. queue de renard*, *Discipline de religieuse* (F). *Love-lies-bleeding*, *Prince's feather* (E). *Fuchschwauz*, *Floramour* (D). *Amaranto codato*, *Bilto maggiore*, *Stafille* (I). نوع من القطيفة الأزرقية. ساقها منتصبه تملو من ٩٠ الى ١٠٠ سم. اوراتها متبارجة الالوان المابقة. ازهارها متكولي التجميع، مستطيل القد، شديد التحسين والالتواء.

### ٢٢٣٥٥ - فُطَيْمَة عَصْفَرَاء ، شَدَحْ هِنْدِي

*Amarantus oleraceus* (S). *Amarante oléracée*, *Brède de l'Inde* (F). *Edible amaranth*, *Pot amaranth* (E). *Kohlamarant* (D). *Amaranto oleraceo*, *Spinnacio marrone* (I). نوع من القطيفة الأزرقية. ساقها منتصبه تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراتها زاهية الخضر الجليل. ازهارها عقودي التجميع، مردني الشكل، بحسن الطرف، ازهارها فستقية اللون، اربوانية المواج.

### ٢٢٣٥٦ - فُطَيْمَة بَالَعَة ، شَدَحْ ، بَقْلَة عَرَبِيَّة

*Amarantus blitum* (S). *Amarante blette*, *A. sauvage* (F). *Blite*, *Wild amaranth* (E). *Gemeiner Erdmarant* (D). *Amaranto salvatico*, *Bledire*, *Blito* (I). نوع من القطيفة الزرقية البقلة. ساقها منتصبه تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراتها كبيرة القد مأكولة. ازهارها عقودي التجميع، هريي الشكل.

### ٢٢٣٥٧ - فُطُويَّات

*Amarantaceae* (S). *Amarantacées* (F). *Amarantaceae* (E). فصيلة نباتية من ذوات الاثلاث، واجناسها واورانها قليلة العدد معظمها عشبي وبعضها جنبي. سوقها لينة. اوراتها بسيطة متعاقبة. ازهارها القامسي التجميع والارتكاز. ازهارها غثولوية او وحيدة او ثنائية المسكن. اكثر نباتاتها برية صالحة لتقيد للمعدة والامعاء.

### ٢٢٣٥٨ - فُطُوم \* ، Polyandrus (E).

لقطم من الاناث من تزواج اكثر من ذكر. والقطم من النبات من كانت ازهارها كثيرة الاعدية.

### ٢٢٣٥٩ - فُطَيْمَة \* ، Eriocrania (E).

حشرة من فصيلة القطميات ورتبة غرغرافيت الاجنحة. اصطناعها فسيحة الاربعاء تشتمل معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || جسمها صغير، نحيل، مردني الشكل. سبطها نحو ١٤ م. راسها متثل الجرم. عينها صغرتان، بارزتان. عظمها ولسانها شديدة القصير. ذنانها

من الخططي الاسمر المواج الى الاسود || تعيش في المزاب والدردي النباتي.

### ٢٢٣٥٤ - فُطُويَّات \* Catopidae (S).

*Catopides* (F). *Catopidae* (E). فصيلة حشرات من عذبات الاجنحة. اجناسها واورانها المعروفة عديدة منتشرة في جميع انظار العالم واصعبها المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة، الحليجية، تطلو من ٣ الى ٨ م. رؤوسها شبه مكورة. عينها صغيرة، بارزة. تأثيرها وفكوكها لظافية. قرونها الاستشعارية شيطية، مختلفة الاطراف، مركبة من ١١ فصلة. كواسلها عذبة. المهادها لاحفة. قوائمها نشطة || تعيش في المزاب والدردي وبحار الدنيات الصغيرة واكثر الطير وعشاشها || اشهر اجناسها القطروب.

### ٢٢٣٥٥ - فُطُظُوراء Cotula (F).

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة المركبات اوراقها عديدة اصطناعها البلاد الحارة والمعتدلة. سوقها منتصبه او مسطحة. اوراتها مفصصة او مفرغة. نصلها خلية البشرة بمعمرة الندد. ازهارها رؤسية فردية صغيرة القد صفراء اللون. يزورها نحيلة مستطيلة عادمة الجناح والافرة.

### ٢٢٣٥٦ - فُطُظُوش Nonette de Calcutta (F).

طائر من النساقي الصغيرة يدعى دحسوم مكبم، اطلبه.

### ٢٢٣٥٧ - فُطَيْمَة Astragalus drusorum (S).

هو الاسطرغالوس الدردي، اطلبه.

### ٢٢٣٥٨ - فُطُيع Troupeau (F).

*Flock*, *Herd*, *Drove* (E). الطائفة من النعم كالابل والبقر والتم. ج قطاع وقلمان.

### ٢٢٣٥٩ - فُطَيْمَة ، أملاك Domaine (F).

*Domain*, *Property* (E). اراض زراعية واسعة يملكها شخص واحد.

### ٢٢٣٥٠ - فُطَيْمَة ، سَالَف الحُرُوس

*Amarantus* (S). *Amarante* (F). جنس نباتات عشبية حولية برية وزرقية من فصيلة القطميات. انواعها عديدة. سوقها منتصبه. اوراتها بسيطة متعاقبة. ازهارها صغيرة القد، لا قياسية التجميع. احرف اورانها واشهرها ما يتبع.

### ٢٢٣٥١ - فُطَيْمَة بَشْهَامَ Amaranthus albus (S).

*Amarante blanche*, *Fleur de jalousie* (F). *White cockscomb*, *Tumbleweed* (E). *Weisse Amaranth* (D). *Amaranto alba*, *Erba di gelosia* (I).

نوع من القطيفة الزرقية. ساقها منتصبه تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراتها شديدة الخضر القاتم. ازهارها متكولي التجميع. ازهارها بيض. عشكوكها مستطيل الشكل بحسن.

### ٢٢٣٥٢ - فُطَيْمَة لُذْلَابِيَّة الَانُوكَان ، دِجَّة الِامِير

*Amarantus tricolor* (S). *Amarante tricolore* (F). *Amaranth*, *Joseph's coat* (E). *Fuchschwanz*, *Tricolor* (D). *Amaranto a tre colori*, *Pappagallo* (I). نوع من القطيفة الزرقية. ساقها منتصبه تملو من



فُطَيْمَة جَمِيلَة



فُطَيْمَة حَسْبِيَة



فُطَيْمَة

منها البرية التي تنابت الكمأة في الربيع تجرى بيوضها فتسوى وتطبخ فتفكر . ومنها الزينية الشائعة الاستعمال || سرورها فراءه ، اوراقها متعاقبة ، رؤوساتها الزهرية كبيرة القند مستعرضة . بذورها غريزية الشكل ، ثنائية الجناح ، عادمة الاغرة || اشهر انواعها الزينية ما يلي .

#### ٢٢٣٧١ - فُطَيْوْلُ الحَطَر

*Dimorphotheca pluvialis* (S). *Dimorphothèque pluviale*, *Souci pluvial*, *Souci hygrométrique* (F). نوع من الفطويل الزينبي . ساقه متعصب كثيرة الفروع تملو نحو ٤٠ سم . اوراقه سنائية الشكل ، صلبة الحافة ؛ فصلها جلل البشرة دبق الملمس . رؤوساتها الزهرية كبيرة القند قطرها نحو ٦ سم . طباقها اصفر اللون ، لسانياتها بيض الصفحة العليا حر السفل ، تتليج وزهر في النهار من الساعة السابعة صباحا الى الخامسة بعد الظهر وتتكشف في الليل وفي الايام الماطرة || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

#### ٢٢٣٧٢ - فُطَيْوْلُ بَرْمَقَالِي

*Dimorphotheca suratiaca* (S). *Dimorphothèque orangée* (F). نوع من الفطويل الزينبي . ساقه متعصب فراءه تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . اوراقه السفلى كبيرة القند مقطوعة الاطراف قليلة الزغب . اوراقه العليا سنائية صلبة . رؤوساتها الزهرية كبيرة القند قطرها نحو ٥ سم . طباقها اصفر اللون ، لسانياتها برمقالية || ازهارها يستمر طوال فصل الربيع .

#### ٢٢٣٧٣ - قَمْعَبَانُ اَزْرَقٌ\* ، قَمْعَبَانُ يَنْكَسَجِي\*

*Xylocopa violacea* (S). *Xylocope violet*, *Abaille charpentière* (F). حشرة عاشبة من فصيلة القمعيانيات قريبة الشبه من النحل طولها يراوح من ٢٥ الى ٣٥ سم . لونها الى الازرق يطلوه موج اسود || تشبه خلياتها في الاغشاب التي تحفرها وقد شاعدها مراراً في غيب البيون المصنوع والاذرعت والازان .

#### ٢٢٣٧٤ - قَمْعَبَانُ مُسَجَّسٌ\* ، قَمْعَبَانُ مَعَجُوقٌ\*

*Xylocopa aestuans* (S). *Xylocope agité* (F). حشرة عاشبة من القمعيانيات طولها نحو ٢٢ سم . تركيب الاغشاب المصنوعة والاعمدة تضعفها وتشيد فيها خلياتها . الاثنى اكبر قدماً من الذكر ، ثوبها الى السرة السوداء يطلوه موج ازرق . جوفها كثيف الحلب اصفر اللون . الذكر صغير القند اصفر اللون اخضر الموج . اجنته معتدلة الطول عابطة الزرقة السوداء .

#### ٢٢٣٧٥ - قَمْعَبَانِيَّاتٌ\*

*Xylocopidae* (S). *Xylocopidés* (F). *Xylocopidae* (E). فصيلة حشرات عاشبة من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة معظمها متوسط القند قريب الشبه من النحل . اجناسها كثيفة الحلب . بطونها غليظة . تتأخرها قوية مدبة تمككها من ثقب وغمر الاغشاب اليابسة اعصها المصنوعة والاعمدة تحفر فيها الانفاق المستطيلة والسراريب المنرجمة .

#### ٢٢٣٧٦ - قَمَد

القمد : النخل الصادر . وقعدت الفسيلة وهي قاعد :

خيطيان . اجنتها خفيفة . مستعرضة القديب الختاري . كوسلها ويطبقها كثيفا الخمل اللينق الناعم . ثوبها الى السرة || الاثنى اميز قدماً من الذكر وابت ثوباً منه || السرة لامعة تدبش حل وثن النصال . تركيب الكثير من الثبات اعصها البندق والسنديان .

#### ٢٢٣٧٦ - قَمْعَبَانِيَّاتٌ\*

*Eriocranlidés* (S). *Eriocranlidés* (E). فصيلة حشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، نحو ٣٥ منتشرة في معظم الاجسام المعتدلة الحرارة من الشرق الاذن واروبة واسريكة || اجسامها صغيرة . نحيلة . رؤوسها مستعرضة . صوبها بارزة . اعطالها وملابسها شديدة القصر . قرونها الاستشارية خفيفة . اجنتها خفيفة ، شبه سنائية الشكل مهدبة الخار . بطونها وشية الشكل ، متكاثفة الخمل . الاثنى ملونة || اساريها دقيقة ، عادمة الراجب . تلم الاوراق وتميش في وثن النصال || اشهر اجناسها القطمية .

#### ٢٢٣٧٦ - قَمَد

*Couvrier* (F). *To couple with, To serve* (E). قما الفحل الاثنى وقما عليها : ارسل نفسه عليها .

#### ٢٢٣٧٢ - قَمَد

*Immobilité* (F). *Immobility* (E). داء يصيب الخمل فيقشده عن العمل اذ يجعل بعض حركاتها متعذراً احياناً . وقد يعتبر من الصيوب المبطلة للبع .

#### ٢٢٣٧٣ - قَمْعَاصٌ ، قَمْعَاشٌ

*Clavelée* (F). هو جندي الفان ، اطليه .

#### ٢٢٣٧٤ - قَمْعَاعَةٌ\*

*Saunage* (F). *Salo-making* (E). التماع استحلاص الملح من مياه البحر ، وتضيق الملح ولتأخر به .

#### ٢٢٣٧٥ - قَمْعَاعِي\*

*Halophyte* هو النبات الذي ينمو في الارربة للملحة او التي تخضع لتأثير المياه للملحة .

#### ٢٢٣٧٦ - قَمْعَالَةٌ

*Pétale* (F). هي البتلة ، اطليه .

#### ٢٢٣٧٧ - قَمْعَالِبٌ ، قَمْعَبٌ

*Renard mâle* (F). هو الثعلب الذكر .

#### ٢٢٣٧٨ - قَمْعَبَارُونٌ

هو السلي الاسود ، اطليه .

#### ٢٢٣٧٩ - قَمْعِيلٌ\*

*Actinomma* (F). *Actinomma* (E). جنس شعاعيات بحرية تتميز ببيكلها الصواني التركيب المؤلف من ثلاث كرات شبكية الشكل متلاحقة تركز على مناسخ شعاعية مخروطية تجمع بين الكرات || انواعها عديدة يكثر ويوجد في البحر الابيض المتوسط .

#### ٢٢٣٧٠ - قَمْعِيلٌ\* (زهرة الزولوا الافريقية)

*Dimorphotheca* (S). *Dimorphothèque* (F). *African orange daisy* (E). *Regenblume*, *Kapkröbchen* (D). *Dimorfotea* (I). جنس نباتات حولية من فصيلة المركبات . انواعها عديدة



فحل



فطويل



قميان ازرق



قميان مسجس

## ٢٢٣٨٧ - قُفَّاعُ الْآجَامِ \* ، زَمَّارُ الرَّمْلِ

Actitis hypoleucos (S). Guilinette vulgaire (F).  
طائر من القُفَّاع طوله نحو ٢٠ سم. ثوبه الى السمره الزيتونية يعلوه موج جزوي ورقشة سوداء. بطنه ابيض. صدره موشع بالاسود. منقاره وبادي. سيقانه الى الخضار الزيتي || اقليمه فسح الاجرام يحوي البلاد الاسيويه والاروبيه والافريقيه. يرتاد المناطق وفضات المياه العذبة ورمال اخوار الاصح.



نقش

## ٢٢٣٨٨ - قُفَّاعُ مُلْتَخِعِ

Actitis macularia (S).  
Guillette griselee (F).  
طائر من القُفَّاع طوله نحو ١٨ سم. اقليمه البلاد الامريكيه. يتصف بميزات واختلاف وصفات قُفَّاع الاجرام. ثوبه اقل سمره ورقشة. منقاره الحمل القوي. سيقانه رمادية.

## ٢٢٣٨٩ - قُفَّاعَةُ

Cri du faucon (F).  
Cry of the falcon (E).  
صوت الصقر.

## ٢٢٣٩٠ - قُفَّاعُ صَرْبِ مِنَ الْكَبَا.

## ٢٢٣٩١ - قُفَّاعَةُ

اصل النطق. ج. قس.

## ٢٢٣٩٢ - قُفَّاعُ الشَّاةِ الَّتِي تَمْنَعُ الدَّرَّةَ.

## ٢٢٣٩٣ - قُفَّاعُ

القعيد : الجراد اذا لم يستو جناحاه بعد.

## ٢٢٣٩٤ - قُفَّاعَةُ

Perdrix chukar (F).  
هي الحجل الشقر ، اطلبه .

## ٢٢٣٩٥ - قُفَّاعُ

Bouquin (F). Buck-rabbit (E).  
هو الخنزير اي الارنب الذكر .

## ٢٢٣٩٦ - قُفَّاعُ

Monticule (F). Hillock, Knoll (E).  
القفج . قفأ وقافأ : ما ارتفع من الارض دون الغضبه .

## ٢٢٣٩٧ - قُفَّاعُ

Nuque (F). Nape (E).  
هو القذال الجزء الخلفي من المتى مركزه تحت القفص .

## ٢٢٣٩٨ - قُفَّاعُ الْجَلْبُزِ \*

Apodérus coryll (S).  
Apodère du coudrier (F).  
حشرة من فصيلة السوسيات طوطها نحو ٧ م. راسها اسود ، ثوبها وسائر جسمها الى الخمره || ترتكب اوراق الجلبوز فتنقلها وتعيش عليها فتسلطها .

## ٢٢٣٩٩ - قُفَّاعُ صَوْرِيٍّ

Campanule gantée (F).  
هو جريس البت ، اطلبه .

## ٢٢٤٠٠ - قُفَّاعُ

Bouquetin d'Abyssinie (F).  
هو الوتل الحيشي ، اطلبه .

## ٢٢٤٠١ - قُفَّاعُ

داه يصيب الدواب قتيص قوائمها .

## ٢٢٤٠٢ - قُفَّاعُ

داه في قوائم الشاة يمسيها .

## ٢٢٤٠٣ - قُفَّاعُ

Diots (S). Diotide (F).  
جنس نباتات شبيهة بيرة مصرة من فصيلة المراكبات . انواعه المروقة قليلة . سيقانها خلية زياء تملو من ١٠ الى ٥٠ م. لورافها متعاقبة ، حاسنة ، اهليلجية ، صغيرة .

صار لها جذع تقعد عليه . وفي ارض فلان من القاعد كلنا وكلنا ...

## ٢٢٣٩٧ - قُفَّاعُهُ

كل اسيل ذلك للقرابة الى البه .

## ٢٢٣٩٨ - قُفَّاعُ

Déracinement (F).  
Rooting up, Eradication (E).  
هو الانجاء . يقال قُفَّاعُ الشجرة : اقتلعها مع جذورها .

## ٢٢٣٩٩ - قُفَّاعُ

القفس : الثراب المتين .

## ٢٢٣٩٠ - قُفَّاعُ

Formica animosa (S).  
Fourmi féroce (F).  
نوع من النمل الحربي كبير القدر احر اللون اسير المواجه يكثر وجوده في غابات واسراج البلاد الاستوائية والحارة .

## ٢٢٣٩١ - قُفَّاعِيَّاتُ

Saprolégniacées (F). Saprolégniacées (E).  
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة التنسيات ورتبة البيضييات .

## ٢٢٣٩٢ - قُفَّاعُ

Arcure (F). Arching (E).  
قوس العود : عطفه كما تحطف هروش الكرم .

## ٢٢٣٩٣ - قُفَّاعُ

Extirpation  
القصف هو تلع البنية ان جنية او شجرة من اصولها .

## ٢٢٣٩٤ - قُفَّاعُ \* ، طَيْرُ التَّصَيِّبِ

Serpentarius secretarius (S). Serpentinaire, Secrétaire (F). Secretary bird (E).  
طائر من فصيلة القمقييات وسيد المجلس والنوع ، كبير الجثة ، رشيق القوام ، ابيض اللد ، طوله نحو ١٢٠ سم. راسه قصير وعريض . قنته متوج يكتشف من الريش الضيق المستطيل . وهو اشهل العين الكبيرة . احر الجفن. غليظ المنسر الاضعف الحاد . طويل المتى والذنب والساق كبير السط . كثيف الريش . ظهره اريد اللون يعلوه موج ازرق . صفه ويطفه وينكبه الى الحلقة الزاهية . قوادسه الى السمره الداكنة . ذنبه مجذع الطرف || الاثنى اكبر صحيحا من الاكبر لكثا صغرة للكنة . نبيش من ٣ الى ٤ رفعات تحضها نحو ٦ اسابيع في اصوص تشيده بالطين وتبيله بالقش والريش التام || اصطناه البلاد الحارة . يالفت الاماكن الاطلة ويدفن بسهولة . قوته الافاعي حل اختلاط اجناسها وانواعها يقتصها ايضا فاحدها ولا ينف من سائر الزحافات والقواغم اغصها الجرادان والقثاران والبراغيث وترباه .

## ٢٢٣٩٥ - قُفَّاعِيَّاتُ

Gypogéraniidés (S). Gypogéraniidés (F).  
فصيلة طير من كواسر البهار ورتبة الجوارح ، وحيدة الجنس والنوع يميلها القمقب .

## ٢٢٣٩٦ - قُفَّاعُ ، قُفَّاعُ ، وَبَيْتُهُ

Actitis (S).  
Guillette (F). Small hoe (E).  
جنس طير من مزارع الطوطانيات وفصيلة دجائيات الارض . صغير اللد منقسم الشكل . ثوبه مرقط لراس والظهر ابيض البطن . منقاره معتدل الطول . رسنه دقيق وقصير . ذنبه كثيف الانيكس مستديره || يرتاد المناطق وفضات المياه العذبة . قوته الحشرات والديدان والعناكب والذباب . ينش منه في الانجار القريبة من الماء اغصها الخلف والصفصاف والائل || الاثنى قتيص ويضات تحضها بمنابيه الذكر نحو الاسيوسين || له ثومان قفط .



قُفَّاعُ الْجَلْبُزِ



Cage (F). Bird-cage (E). **قَفَص** - ٢٢٤١٦  
عجس الطير وقد شاع استعماله للصائير البيتية .

Couvrir (F). To cover (E). **قَفِطَ ، قَفِطَ** - ٢٢٤١٧  
قفط وقط الطائر أثناء : سفدها . وقطط الماطر : رزا .

**قَفِصَاء** - ٢٢٤١٨  
حشية عذراء ثمارها قرون دقيقة تستدر كالحلق دون أن تلتقي أطرافها . وهي من أسرار البقل (السان) .

Claveau (F). Arch-stone (E). **قَفْل** - ٢٢٤١٩  
كل من الحجارة الواقعة بين القلق والحجرين الأسفلين في القعد .

Balsamodendron kafal (S). **قَفْل** - ٢٢٤٢٠  
Baumier de Kafal (F). Balm of Kafal (E). Kafalischer Balsambaum (D). Balsamo di Kafal (I).  
نوع من البلسان ، شجرته صغيرة القند فروعها غارشة . أوراقه مركبة . أزهاره غليظ التجميع . أزهاره صغيرة القند بيضاء اللون فواحة العرف الطري . أخشابها بخورية الرائحة . يستخرج من سوقها بالحز عصاره رائحة بخورية طيبة الاستعمال .

Arbre desséché (F). **قَفْلَة ، قَفْلَة** - ٢٢٤٢١  
Dried tree (E).  
هي الشجرة اليابسة وقد كثر استنادها إلى الشجرة الحرجية اليابسة .

**قَفْلُوط** - ٢٢٤٢٢  
هو الكراث الاندلسي ، أطيبه .

Occiput **قَفْن** - ٢٢٤٢٣  
الجزء الخلفي للأسفل من رأس الحيوان يعرف عنه بالبحق في الحشرات .

Occipital **قَفْنِي** - ٢٢٤٢٤  
كل ما له صلة بالقفن .

Fontanesia (S). **قَفُور ، قَفُورِيَّة** - ٢٢٤٢٥  
Fontansia (F).  
قَفُور هو الاسم العربي ، أما العلمي فيفقده التحريف على اسم العلامة « Desfontaines » . جنس جنينات وشجيرات برية وزراعية صابغية وتزيينية من فصيلة القفوريات أو أنواعها المعروفة قليلة الندى ، مهددا يمتد من الشرق الأدنى إلى الصين || سوقها فروعها تملو من مترين إلى أربعة أمتار . شكلها قريب إلىه بالياسم . أثمارها بحيلة متدلية ، أوراقها متعاقبة ، سنائية النصال اللرية . أزهارها صغيرة ، رباعية البتلات الصغيرة ، عاجية اللون . حياء سوقها وفروعها صابغية ، صابغها إلى الصفار الكبريتي الجميل || تنويرها يستمر من حزيران إلى آب .

Desfontainacées (F). **قَفُورِيَّات** - ٢٢٤٢٦  
Desfontainaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقين متصلة القناعات مرتقمة المبيض . أجناسها وأنواعها قليلة العدد . أعطائها تمتد من الشرق الأدنى إلى الأسي || جميع نباتاتها شجيرات وجنينات برية . سوقها فروع . أغصانها متباعدة أو متدلية . أوراقها متعاقبة ، قصيرة الأضلاع ، سنائية النصال . أزهارها رباعية البتلات ، صغيرة القند ، عاجية اللون أو تبتنية || أشهر أجناسها القفوز .

القند . رؤسها الزهرية صفراء اللون ، عادمة السينات . قوتجها غارشة استفجبة التسنج . يزورها مضلة عادمة الجناح والاذرة .

**قَفَالَة** - ٢٢٤٠٤  
Mys (S). Mys (F).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة القفالات . أنواعها الممارسة المعروفة قليلة العدد جميعها من صنف عجم المناطق الشالية || أصدانها بيضاء اللون ، شبه بيضبة الشوزن تملوها تنوات صغيرة || أجناسها مستطيلة الثامب المزودجة التجميع . مصاريها لامتسارية القند ، منفصلة الأطراف || تمش في الرمال والامال المنسورة . لحومها مأكولة .

Myidae (S). **قَفَالِيَّات** - ٢٢٤٠٥  
Myidae (F). Myidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . أجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في صنف عجم العالم || أصدانها لاقامية الشكل والقند ، قليلة الاحدياب ، مائسة السطوح . تتميز بمصاريها اللامتسارية المنفصلة الأطراف || أعرف أجناسها وأشهرها القفالة والقيقب والكربولة .

Couffe, Couffin, Cabas (F). **قَفْة** - ٢٢٤٠٦  
Hamperfrail, Basket (E).  
وعاء ثنائي الفتحة من الأسر أو القنب أو الخيف أو الكوتشوك يستعمل في نغل الاشياء .

**قَفَر** - ٢٢٤٠٧  
راسع يادية .

**قَفَرُ البود ، قَفَرُ البود** - ٢٢٤٠٨  
Bitume de Judée (F). Bitumen of Judaea (E).  
نوع من الحمر جيد الصنف يكثر في البحر الميت .

Xérophyte (F). Xerophyta (E). **قَفْرِي** - ٢٢٤٠٩  
نمت ترعبي يطلق على كل نبات يستطيع مقاومة الجفاف .

**قَفَرَاتُ الظباء** - ٢٢٤١٠  
قفرات الظباء كوكبة من ستة نجوم وتسمى قفزات النزلان أيضا .

**قَفَرَة أُولَى** - ٢٢٤١١  
القفرة الأولى نجم ثير من كوكبة الدب الأكبر .

**قَفَرَة ثَالِثَة** - ٢٢٤١٢  
القفرة الثالثة نجم ثير من كوكبة الدب الأكبر .

**قَفَرَة ثَانِيَة** - ٢٢٤١٣  
القفرة الثانية نجم ثير من كوكبة الدب الأكبر .

**قَفْرِي** - ٢٢٤١٤  
Saltatoire (F). Saltatory (E).  
نمت تعريف يطلق على كل عضو من أعضاء القفز أو صالح القفز عند الحشرات .

**قَفَسَاء** - ٢٢٤١٥  
Estomac des ruminants (F).  
Stomach of the ruminants (E).  
معدة الحيوانات الهجرة تشمل الكرش والفلسوة وأم التلافيف والجوثر .



قفالة

٢٢٤٣٥ - قُلُقُتْس هو التِّمّ، اطبخه .

٢٢٤٣٦ - قُكِلِيل Cakile (F).  
جنس نباتات حشوية حولية برية من فصيلة الصليبيات .  
اصطلاحاً الشطوط الرملية .

٢٢٤٣٧ - قُلْ Murette (F). Small wall (E).  
هو الحائط القليل الارتفاع .

٢٢٤٣٨ - قُلَاب Zygophyllum (S). Zygophylle (F).  
جنس نباتات جنبية من فصيلة الفرقدليات ، انواعه نحو ٦٠ معظله بري وبمضها زُرْبِيّ . ساقها فرعاء جالسة .  
اوراقها متقابلة حركية وريشة . ازهارها نغرافية خاسية التركيب . ثمارها حنطة || اشهر انواعه الزُرْبِيّ قُلَاب القرم .

٢٢٤٣٩ - قُلَاب الْقُرْم Zygophyllum fabago (S).  
Zygophylle de Crimée, Fabagelle, Faux caprier (F).  
Syrian bean caper (E). Bohnenkapsarn (D). Fabaria, Favaglina (I).

نوع من القلاب وهو جنبية زُرْبِيّ شائعة الاستعمال .  
موطنها بلاد القرم وقد عمت زراعتها الزُرْبِيّية . جمع البلاد  
المعتلة الحرارة . ازهارها كبيرة اللقد جميلة الشكل أرجوانية اللون .

٢٢٤٤٠ - قِلَادَة

القلادة من كواكب يمرقن بالقوس .

٢٢٤٤١ - قِلَادِيّ ، سُبْحِيّ Moniliforme (F).  
Moniliform (E).  
شكل من الزباني فواصله كمحب القلادة أو السبحة .

٢٢٤٤٢ - قَلَار Figue (F). Fig (E).  
فرب من التين ابيض اذا جف اصفر لونه وهو اجود  
من اللباز .

٢٢٤٤٣ - قَلَّاس Merycose (F).  
القلاس من استعمال القلس للنبذية .

٢٢٤٤٤ - قَلَاع Muguat, Stomatite (F).  
Stomatitie (E).  
القلاع مرض معد يعرف بالتهاب غشاء الفم . يصيب البشر  
والنمّ . سببه فطر مجهري شديد الاذى . مظهره الخارجى  
يقع بيض تركب اللسان ودخل الخد .

٢٢٤٤٥ - قَلَاع Brunella (F).  
Self-heal, Sickle-wort (E). Brunella (D). Brunella (I).  
جنس نباتات حشوية برية عطرية معمرة من فصيلة الشفويات .  
انواعه عديدة جميعها صغيرة القند . ساقها فرعاء . اوراقها  
متقابلة منقطة كاملة . ازهارها مثلج التجميع طرفي  
الارتكاز . ازهارها عطرية متوسطة الحجم خططة الالوان  
سُحًا الاحمر والأزرق والبنفسجى والابيض || اُعرف  
انواعه واشهرها ما يلي .

٢٢٤٤٦ - قَلَاع حَسَكِي الْوَرَق Brunella hyssopifolia (S). Brunella à feuilles d'hyssop (F).  
نوع من القلاع البري الزُرْبِيّ ساقه فرعاء تملو نحو ٤٠ سم .  
اوراقه شقيقة كاملة تشبه اوراق الزُرْبَا . سبكه

٢٢٤٢٧ - قُفُول Blettissement, Blettissure (F).  
Becoming over-ripe or sleepy (E).

القفول كالقبوب والثمار هو تمام نضج الثمر .

٢٢٤٢٨ - قُلُور \* ، خُلُورِيّة ، قِبَاة Ruche à cadres (F). Frame hive (E).

هو مأوى النحل مصنع من الخشب ويجهز بالنحالت والاقراص الشمسية .

٢٢٤٢٩ - قُلِيل Haplophyllum (S).  
Haplophylle (F).

جنس نباتات حشوية برية معمرة من فصيلة السلابيات .  
انواعه المعروفة عديدة منها حُصَاب ونجاد الشرق الاوسط  
وبعض الاصناف الادوية || ساقها متصلة فرعاء  
متصبية . اوراقها بسيطة او ثلاثية التخريم . ازهارها  
عُنِي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها متباينة الاجسام  
والالوان || اُعرف انواعه واشهرها الخمسة التالية .

٢٢٤٣٠ - قُلِيل حَرَجِيّ Haplophyllum sylvaticum (S).  
Haplophylle sylvestre (F).

نوع من القليل . منته اجراج المناطق الجردية . ساقه  
فرعاء ملسة . اوراقه ربيعية النصال الحادة الاطراف .  
ازهاره صغيرة القند ، يضاء اللون . تنويره صيفي .

٢٢٤٣١ - قُلِيل سُورِيّ Haplophyllum syriacum (S).  
Haplophylle de Syrie (F).

نوع من القليل . منته معظم الاصناف السورية باستثناء  
القلب البحري . ساقه متصبية فرعاء تملو نحو ٦٠ سم .  
اوراقه شبه بيضية الشكل ، ملوكة . اما العليا فثلاثية  
التخريم . ازهاره صفراء اللون . تنويره يمتد من الربيع الى  
اوائل الصيف .

٢٢٤٣٢ - قُلِيل مُسْتَطِيل الْوَرَق Haplophyllum longifolium (S).  
Haplophylle à feuilles longues (F).

نوع من القليل . منتهه جللاه الادوية . ساقه فرعاء متباينة  
التند المخضراء الزرجة . اوراقه سنانية النصال الضيقة  
تطلى من ٤ الى ٥ سم . ازهاره صغيرة متكاثفة ، لونها الى  
الحمرة المرجانية . تنويره ربيعي .

٢٢٤٣٣ - قُلِيل مُهْدَب Haplophyllum villosus (S) Haplophylle velu (F).

نوع من القليل . ساقه مزغبة الجعاء فرعاء . اوراقه السفلى  
اطليجية النصال اما الوسطى والعليا فثلاثية التخريم .  
ازهاره مهدبة الكورس ، وردية اللون ، معتدلة الحجم .  
تنويره في اوائل الصيف .

٢٢٤٣٤ - قُلِيل تَجْمِيّ Haplophyllum fruticosum (S).  
Haplophylle branchu (F).

نوع من القليل . منتهه الحُصَاب والنجاد . ساقه كثيرة  
الفروع المترامية . اوراقه السفلى بيضيه الشكل اما العليا  
فرمجة . ازهاره صغيرة القند لونها الى الياض الاصفر  
المليح . تنويره صيفي .



قُفِير





فلبوس الرزال

## ٢٢٤٧٢ - فَلْبُوسُ الرِّزَالِ Mallophages

رَبَّةٌ حشرات قارضة من طبقة القمليات ، فصائلها عديدة جميعها عادمة الجناح . أجسامها صغيرة مفلحة . وورسها كبيرة وعريضة . تأثيرها قوية ، قربها الاستعمارية قصيرة || تميش طفيلية على البعير وبعض الحيوانات البويرة فتقرض الريش والصوف والوبر وبشرة الجلد والدلم الجاف ، صنها وبشي للشكل غير القرن تتلصق حيث تمسح إن بالريش أو بالصوف أو بالشرم فينتفخ عن حوريات تتسلق عدة مرات قبل اكتمال تطورها || أشهر فصائلها القرطليات والمفرنيات والنمانيات .

## ٢٢٤٧٣ - فَلْبُوسُ Alrain (F). Brass (E).

سبيكة من معادن مختلفة انصهبا لتحاس والتصدير .

## ٢٢٤٧٤ - فَلْبُوسُ Régurgitation (F). Regurgitation (E).

الفلس طريقة تليذية خاصة ببعض الحشرات انصهبا لتل . راجع لتقام .

## ٢٢٤٧٥ - فَلْبُوسُ Drainage (F).

هي عملية تصريف المياه من الآلية الربطة .

## ٢٢٤٧٦ - فَلْبُوسَةُ ، فَلْبُوسَةُ ، فَلْبُوسَةُ Calotte (F).

هي الاسوسه ، اطلبها .

## ٢٢٤٧٧ - فَلْبُوسُ

جاء في السان : نبات يكون منه اللادنت .

## ٢٢٤٧٨ - فَلْبُوسُ Cyon dukhunensis (F).

Coloun (F). Coloun (F).

نوع من الكلاب المتوسعة المفترسة . ونهم من جملة نوما من الفل . موطنه غابات غشاة الغنوس وودية حلايا وكشمر وأصام . جماعته تد من ٧ الى ١٢ زوجا يرأسها ذكر سن . يقتصر الايل الاقرب وايل المسك وادوية الشرق وجميع الحيوانات الضعيفة || جسمه مسطح التقاطع ، أخف القد ، يطول نحو ١٠٥ سم . ذنبه نحو ٥٠ سم . وارتفاعه ٥٠ سم . اذنه ٨ سم . ثوبه الى الشفة الصنايية تسمر بعض التي ، في الصيف . بطنه بني اللون . سباله اسود الملب . ذنبه جيزل الورير الكيث ، متخفف الطرف || يسرح في النهار ويبيت في الليل .

## ٢٢٤٧٩ - فَلْبُوسُ أَسَدِ الرِّاسِ Malathus

Malathus melanocephalus (S). Malatha melanocephale (F). Malathus melanocephalus (E).

حشرة دامتة من فصيلة البقوسيات وربة غديبات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع البلاد الممتدة الحرارة من الشرق الاقصى واوروبية . تألف الاراضي الممتدة الجباري الكثيرة الصغور حيث تراكم المواد النباتية من اوراق وميل نقش وسطام ... || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٨ سم . رأسها اسود اللون ، قصير المقل . زباناها عيطيان مستطيلان . عينها كيرتان جاسطتان . كيرتها محذوب السطح ، احر اللون . ظهراتها جزوي اللون ، معتدل الاحدياب ، مستدير الطرف الاثمت ، ثمانى التحزيز النمدى القاطب . ارساغها خامية المقل || الانثى اصفر قدما من الذكر وابنت ثوبا هه واقصر زبانا || لها جيل



فلبوس أسود الرأس

المكن مبياديا على الصفحات السفلى من نصال اوراق النبات المائل || السرة تطول نحو ٢٢ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، خلي التشار . ثوبا اخضر يملو تجعيع منضصر اسفر . رأسها كشي القرن . مدبها ورواجبها الى الطلعة المخرم || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي ضمن صلبة تحببها السرة على النبات المائل حيث تتدل .

## ٢٢٤٨٠ - فَلْبُوسُ الرِّزَالِ Piebelus argus (S).

Argus bleu des genets (F). Piebelus argus (E).

حشرة من القمليات وربة حرشيات الاجنحة . موطنها بعض المناطق الممتدة الحرارة من الشرق الاقصى وادوية . فراشها واسعة قربا رحيق الاثمار . سرتها تميش على اوراق الرزال والتقصير والتشيع والتدول || جسمها صغير القد يطول نحو ٩ سم . سبطها نحو ٢٥ سم . رأسها صغير الجرم . عينها كيرتان . زباناها مستطيلان ، شبه صولجانيان . حوشها ويطها الى الزرة يطولوا موج غير عنه الذكر والى السرة الكستنية عند الانثى || وراش الذكر الى الزرة البنفسجية يطولها حشار اسود وتهديب ابيض . وراش الانثى الى السرة الكستنية يطولها تنابيه || لها جيل واحد في الخول . تظهر الفرائة في حزيوان . تسرح في النهار . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد المكن مبياديا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرة تطول نحو ٢٢ سم . جسمها يفي الشكل ، كيث الحمل القصير ، اخضر اللون اسفر المراج تملو خمسة خطوط سود . رأسها اسود . مدبها ورواجبها الى السرة القائمة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي معلقا في النبات حيث تتدل السرة .

## ٢٢٤٨١ - فَلْبُوسُ Cordiforme (F).

Cordiform, Heart-shaped (E).

نمت تمريني يوصف به الشكل الذي يشبه القلب .

## ٢٢٤٨٢ - فَلْبُوسُ في فصيلة البقوسيات ، اطلبها .

## ٢٢٤٨٣ - فَلْبُوسُ

القلت النقرة في الجبل يشتق لها الماء . ج قلات .

## ٢٢٤٨٤ - فَلْبُوسُ Salière (F). Eye-pit (E).

القرة فوق عين القرس .

## ٢٢٤٨٥ - فَلْبُوسُ هو الدجر ، اطلبها .

## ٢٢٤٨٦ - فَلْبُوسُ

القلع : الحار السن .

## ٢٢٤٨٧ - فَلْبُوسُ

قلع الزرع : سقا .

## ٢٢٤٨٨ - فَلْبُوسُ

التله هو البتي ويوم السبي ويقال : ما بين القلدين ظرم .

وغير التصيب من الماء . يقال اخذ قلده اي نصبه من الماء . ج قلد وقلاذ .

## ٢٢٤٨٨ - قَلْقَاسٌ هَلَالِيَّةٌ \*

Calophasia lunula (S). Calophasie à croissant (F). Calophasia lunula (E).

حشرة من فصيلة النسيقات ورَبَّة حورثيات الاجنحة. موطنها المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم. فراشها واثمة قوتها رقيق الازهار. سرتها تعيش على اوراق نباتات الفصيلة الخنازيرية || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٢ م. بسيط نحو ٣١ م. رأسها خطي القن. عيناها كبيرتان. زباناها عظيمان. جوشها وبعثها الى الخطي الاسمر الموج || روشها الاماميان، عند الشقين، الى الخطي يطوى علال ابيض ويتبعج اسمر وتجذع بني. روشهاا الخلفيان الى الخطي يطوى اسمر عند الذكر || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز. تسرح في الليل. تعاظم بعد ظهورها باسبوعين وتمتد المكن لطحا على المسطحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة تطول نحو ٣٠ م. جسمها اسطواني الشكل، ماس التشار. ثوبها الى الرتبة السواد ملوكة خسة خطوط مزدوجة قاطبة جزوية. رأسها الى الحمة المرجانية. مدها ورواجها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي في التربة حيث تلتحف بجلباب من اللبن.

## ٢٢٤٨٩ - قَلْقَاسٌ

وما تقرر من اسفل مياه السيول متشققا بعد نضوبها. والقلمقة: قشرة الارض التي ترتفع عن الكماء فتدل عليها (السان).

٢٢٤٩٠ - قَلْقَاسٌ \* قَلْقَاسٌ  
Colophane (F). Colophany (E). هو صمغ البطم.

## ٢٢٤٩١ - قَلْقَاسٌ \*

Colocasia antiquorum, C. esculenta, Arum esculenta (S). Colocase, Colocasie, Arum colocasie, A. d'Egypte, Taro, Mon, Sonje, Madère (F). Colocasia, C. estable arum, Egyptian arum, Egyptian colocasia, Taro (E). Echte Blattwarz, Agyptisches Arum, Colocase (D). Colocasia, Aro egziano, Gichero (I).

نبات سنقولي زراعي معمر من فصيلة القلقاسيات. اصطناعه البلاد الحارة. ساقه ارضية عشوية غليظة. اوراقه قرصية التجميع تقوم على معايق مستطيلة منتصبة تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. وهي كبيرة القد، قليلة الشكل، نصلها جامد الصفحة المتأرجة قائم الخضار يطول من ٥٠ الى ٧٥ سم. ويعرض من ٣٠ الى ٤٠ سم. ضروبه الزراعية عديدة جميعها ترفع في الارربة الدبالية الرطبة. زراعتها تستقيم في التربة من ٧ الى ١٤ شهرا. محصيله وافر الانتاج. لباب حساقله يفركل بعد طبخه او نغمة بالماء لزوال ما فيه من مواد قارصة كاوية. ولبابه هذا يحوي نحو:

- ٢,٦٥ ٪ من المواد الازوتية.
- ٥,٦ ٪ من المواد الدهنية.
- ١٦,٨٢ ٪ من المواد الهيدروكربونية.

## ٢٢٤٩٢ - قَلْقَاسٌ رُومِي

هو عباد الشمس السنقولي، اعلمه.

واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف. تسرح في الليل وتبيت في النهار. قوتها المواد النباتية المنحلة والصابرة نحو الانحلال || البرقة عند بلوغها الادراك الجسوري تطول من ١٢ الى ١٦ م. جسمها شبه اسطواني الشكل. رأسها وصدرها وظهور سكهما وشرجها الى السرة الكسنتية القائمة. بقعها الظهيرة تصبغ وتضمر تدريجيا من سكة الى سكة مع ابتعادها من الرأس. مدها ورواجها اقل سرة من رأسها. دروتها بجهر باستان حادة. فكاهها ضليمان || طور الاكمال الذي ينتهي بظهور الحشرة في اوائل نيسان يستمر نحو اربعة اسابيع وينتهي في هجر البرقة طليقا من كل غلاف.

٢٢٤٨٠ - قَلْقَاسٌ  
Arracher (F). To pull (E). قلع النبات : استخرجه من التربة.

٢٢٤٨١ - قَلْقَاسٌ \* حَكِي، \* احْتِفَافُ  
Arrachage (F). Pulling up (E). استفراج النبات من التراب.

٢٢٤٨٢ - قَلْفٌ  
Phloem القلف هو ابيزء الداخلي من لحاء الشجر يتميز بوجود الاوعية النربالية المقطع التي تنقل النسغ النذالي الكامل.

٢٢٤٨٣ - قَلْفٌ  
Ecorcer (F). To bark, To strip (E). قلف الشجرة: نزع منها لحاءها.

٢٢٤٨٤ - قَلْقَاقٌ \*  
Calophaca (S). Calophaque (F). Calophaca (E).

جنس نباتات بحلية معمرة من فصيلة النسيقات. موطنها يمتد من الشرق الاذل الى اواسط القبايق الروسية. صمغها قراء تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها مركبة وثرية المدد. ازهارها صفراء اللون، عشوية التجميع || انواعه الحمرودة قليلة المدد، اشهرها التالية:

## ٢٢٤٨٥ - قَلْقَاقٌ السُّرْكَا \*

Calophaca Wolgarica (S). Calophaque de la Volga (F).

نوع من القلقاق. موطنه القبايق الروسية. ساقه تملو نحو ١٠٠ سم. افئاده منبسطة الاعتداد، الحولية منها حلية اللحاء، مبشرة اللند الدهنية. اوراقه مركبة وثرية المدد الذي يراوح من ١١ الى ١٩. وريقاتها صغيرة، حلية النصال. ازهارها صفراء اللون، تطول نحو ٣ سم. || تنويره يستمر من ايار الى حزيران.

## ٢٢٤٨٦ - قَلْقَاقٌ كَبِيرُ الزُّهْرِ \*

Calophaca grandiflora (S). Calophaque à grandes fleurs (F).

نوع من القلقاق. موطنه يمتد من جبال تركية الى ايران وافتان. ساقه تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. افئاده جرداء اللحاء، عادمة اللند الدهنية. اوراقه مركبة وثرية اللند الذي يراوح من ٢١ الى ٢٧. ازهارها صفراء اللون، تطول نحو ٣ سم. || تنويره يستمر من حزيران الى تموز.

## ٢٢٤٨٧ - قَلْفَةٌ

نبات اخضر له ثمرة صغيرة وللال عليها حريس (السان).



لفزة ملالقة



قلقاس

٢٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها تشبه ورق الزراب. أزهارها صغيرة القذ صويالية التجميع || أزهارها يستمر طوال فصل الصيف.

### ٢٢٥٠٢ - قُتُنِيَّة مَلْبِيَّة

*Minuartia laticifolia* (S). *Alsine à feuilles de mûle* (F).

نوع من القُتُنِيَّة مِنبَهَا الأترية الرملية. ساقها تملو من ١٢ إلى ٢٠ سم. أوراقها ملبسية الشكل ريشية النقي. أزهارها مصابة الارتكاز على الساق ، كبيرة القذ مستطيلة البتلات || أزهارها يستمر من تموز إلى آب.



قُتُنِيَّة

*Alsineas* (F).

### ٢٢٥٠٣ - قُتُنِيَّات

سبط من فصيلة القُتُنِيَّات.

*Geotrupes* (S). *Géotrupe* (F). **قُتُنِيَّة**

جنس شحات من الجمليات. أنواعه عديدة جميعها راسية نائلة تسرح في الليل وتعيش على البراز وتضلل المواد العضوية المتحللة || أشهر أنواعه قُتُنِيَّة البراز.

### ٢٢٥٠٥ - قُتُنِيَّة البَرَكز \*

*Geotrupes stercorarius* (S). *Géotrupe stercorale* (F). نوع من قُتُنِيَّة طويلا يراوح من ١٨ إلى ٢٥ سم. جسمها بيضي الشكل مفلطح الجنب صفحت البطن إلى السواد الأخضر المزاج صفحته السفلى إلى الزرقاء الخضراء المزاج. تسرح من غروب الشمس إلى أوسط أو أواخر المربع الثاني من الليل. قوتها البراز أحمر ووث اللواب. يحفرها سرداب ينور من التربة تصف فيه كامل مكها بعد أن تلتفه بملحف تحين من الثروت بهذه الحرارة اللازمة حتى تنقب ثم الثروت الفرووي حتى الانسلاخ.

### ٢٢٥٠٦ - قُتُنْم ، قُتُنْم السِمْ ، حَامِل السِمْ

*Styla*

أسد أجزاء مقلدة الزهرة وهو غيب أجوف يحمل السمة ويوصلها بالمبيض.

*Greffon* (F). *Graft* (E).

### ٢٢٥٠٧ - قُتُنْم

هو العلم.

*Bouture* (F). *Slip* (E).

### ٢٢٥٠٨ - قُتُنْم

أقلم والمقلدة والفلسه قصب أو جزء من قصب ينقل من النبات ويغرس. راجع مقلدة.

### ٢٢٥٠٩ - قُتُنْمَت

هو نمش البر ، أطلقه.

### ٢٢٥١٠ - قُتُنْمَتَاقي ، رُشْدِيَّة

*Averrhoa* جنس أشجار مشمرة من فصيلة الحسانيات. أنواعه المعروفة اثنتان. مِنبَهَا البلاد الحارة أحصيا الهند. سورها متصب. أعضائها داخلة مغرقة. أوراقها مصابة مركبة ريشية. وريقاتها اعطليجية شغيفة. أزهارها صفوية التجميع محورية الارتكاز ، طرفية. ثمارها بيضيه مستطيلة ، لهايا سامز العلم مستحب النكهة يؤكل رطباً ودرجياً. وهو من النباتات البربرية التي تجود في جميع الأترية القليلة والمتوسطة الانتماج || يتكاثر بالزبر. أشجاره زهر وتثمر طوال السنة.



قُتُنِيَّة البراز

### ٢٢٤٩٣ - قُتُنَسِيَّات

*Araceae, Aroidaceae* (S). *Aracées, Aroïdées, Aroidacées* (F). *Araceae, Aroidaceae* (E).

فصيلة نباتية من وحدات الفلقة. أجناسها وأزهارها كثيرة ألمعد تجتمع إلى ثلاثة أساط ، الرسات والرنيات والروجات. نباتاتها صمودية أو صقلية معمرة. مظهرها بري وبضها زراعي وزيبي || حاشاتها لا تتخلو من المواد الكاوية السامة التي يضمحل مفعولها بعد الخل أو التمع بالماء أو التخميص على النار.

### ٢٢٤٩٤ - قُتُنِيَّة كُوبِيَّة

*Starnæna cyanocephala* (S). *Colombi-perdrix cyanocephale* (F).

طائر من القُتُنِيَّات وفصيلة الحماميات. طوله نحو ٢٠ سم. قمة رأسه وصافية اللون زرقاء المزاج ، عماره وقته وزوره سود ، ثوبه مخلي اللون العاين بعلوم مجزوي. صدره إلى الجؤرة صفوية. منقاره احمر الانتشاب أزرق اللوانط. أرجله حر || يألف الإخراج والمناطق الصخرية. أسيابه صغيرة يراوح عدد أفرادها من ١٢ إلى ٤٠. قوته الثار والحبيب واليلور. يدن في الجينات والأشجار القليلة الارتفاع. أناته تبيض بيضين.

### ٢٢٤٩٥ - قُتُنِيَّات

*Colombi-perdrix* (F). جنس صير من فصيلة الحماميات. أنواعه قليلة تتميز بشكلها الذي يشبه شكل الحجل. مناقرها قوية مخدة. أجنسها قصيرة شبه مستديرة ، أذناها حريضة مستديرة. أسيانها طويلة ، أصابعها قصيرة. غالباً قوية || أشهر أنواعها قُتُنِيَّة كُوبِيَّة.

*Vitriol vert* (F).

### ٢٢٤٩٦ - قُتُنْدَس

هو الزاج الاخضر ، أطلقه.

*Vitriol vert calciné, Calcitis* (F). **قُتُنْدَس**

هو الزاج الاخضر المكلس.

### ٢٢٤٩٨ - قُتُنِيل ، قُتُنِيل

هو السنا البري. شجرة تتأرب أريان تحمل حياً اسود مستديراً في سيم الفلل أو اكبر يبرأ ألس فيه لزوجة وسلاوة حسن الشم وورق هذا الشجر للمناث.

*Minuartia, Alsineas* (S).

### ٢٢٤٩٩ - قُتُنِيَّة

*Alsine* (F). *Alsine* (E). *Steinmier* (D). *Alsine, Centocchio* (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة القُتُنِيَّات. أنواعه المعروفة نحو ١٢ مِنبَهَا الشرق الأدنى وأروبة الجنوبية. جميعها صغيرة القذ قليلة الفروع. أوراقها متقابلة نصفان مخزنية أو عديبة الشكل. أزهارها صغيرة الحجم يبيض اللون || أفرعها ما يتبع :

### ٢٢٥٠٠ - قُتُنِيَّة كَانِيَّة

*Minuartia liniflora* (S). *Alsine à fleurs de lin* (F).

نوع من القُتُنِيَّة ، مِنبَهَا الأترية الكنسية. ساقها تملو من ١٥ إلى ٣٠ سم. أوراقها متصب جامدة مهدية. أزهارها صفوية القذ متتامة تشبه زهر الكتان. أزهارها يستمر من تموز إلى أيلول.

### ٢٢٥٠١ - قُتُنِيَّة لَزَاكِيَّة

*Minuartia juniperina* (S). *Alsine à feuilles de genévrier* (F).

نوع من القُتُنِيَّة ، مِنبَهَا الحضاب والجبال. ساقها تملو من

## ٢٢٥١١ - قَلْبِيّاق لَدِيد \*

Averrhoa carambola (S). Averrhoa carambole, Carambolier (F). Caramba, Carambola (E). Karambolabaum, Karambola (D). Averroa carambola, A. acellare (I).

نوع من القلبيّاق، شجرته صغيرة القند تملو نحو ٤ أمتار. أوراقها مائلة. وريقاتها ثلاثية أو خماسية الأزواج. نصلها مائل البشرة، قائم الخضار. أزهارها صغيرة القند، بيضاء اللون أو وردية. ثمارها أهليلجية الشكل، خماسية التضخيد، صفراء اللون، غصراء المذاق. لهاها غزير العصارة، ذكي العرق، مأكول.

٢٢٥١٢ - قَلْبَسُوءَة Plexus (E). Bonnet, Réseau (F). قسم من أقسام معدة الخبثات صغرى الحجم يتصل بالكرش من جهة وبألم التلافيف من الجهة الثانية. راجع معدة.

٢٢٥١٣ - قَلْبَسُوءَة هي الارسوة، اطلبها.

٢٢٥١٤ - قَلْبَسِيَة Collinsia (F). Collinsia (S). جلس نباتات عشية حولية من فصيلة الخنازيريات. أنواعها عديدة منها البرية والزراعية الصبائية والزيينية. منها البلاد الامريكية. أوراقها كاملة متعاقبة. أزهارها زاهية الألوان فصيحة تنجيب متتالية || تتكاثر بالبزور. ترطب في التربة الحارة الجافة المواد البتائية. امروا أنواعها وأشهرها ما يلي :

٢٢٥١٥ - قَلْبَسِيَة ثَلَاثِيَة اللون Collinsia bicolor (F). Collinsia bicolor (S). عشية زينة زياء تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. أوراقها معتقة نصلها سائي المسطحة، مسن الحافة، قلبى القاعدة. أزهارها ثنائية اللون فيها البنفسجي والاييض. أزهارها يستمر من ايار الى تموز.

٢٢٥١٦ - قَلْبَسِيَة رِيْمِيَة Collinsia verna (S). Collinsia printanière (F). عشية زينة مزهجرة. ساقها منتصبه فراءه تملو نحو ٤٠ سم. أوراقها معتقة نصلها خلل البشرة مسن الحافة. أزهارها الى الزرقه اطراف بتلاتها يبيض وهي متوسطة القند مستطيلة الامن || أزهارها يستمر من نيسان الى حزيران.

٢٢٥١٧ - قَلْبَسِيَة صِبَاغِيَة Collinsia tinctoria (S). Collinsia tinctoria (F). عشية صناعية زياء. ساقها منتصبه تملو نحو ٣٠ سم. أوراقها لائقة، أهليلجية، نصلها غدي الصلصة الزرقه. أزهارها الى البياض الاصفر المذوق يملو توضيح ارجواني. أزهارها صغرى.

٢٢٥١٨ - قَلْبَسِيَة كَبِيرَة الزهر Collinsia grandiflora (S). Collinsia à grandes fleurs (F).

عشبة زينة سرسة. ساقها تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. أوراقها أهليلجية سيمكة النصل المادمت التنتين. أزهارها الى الزرقه الموضحة بالوردى. بتلاتها كبيرة مستطيلة مجتمه. أزهارها يستمر من ايار الى تموز.

٢٢٥١٩ - قَلْبَسِيَة Stylidium (S). Stylide, Stylidier (F). جلس نباتات عشية. محمرة برية وتزيينية من فصيلة القلبيّاق. أنواعها المعروفة ثلاثة جميعها زينة تزود



قلبيّاق لَدِيد

في المراكن وفي المواقع الرطبة شرط ألا تتعرض للصقيع في فصل الشتاء. أوراقها مجانبية الاشكال وبها الصغرى. أزهارها حيلة ملونة.

٢٢٥٢٠ - قَلْبَسِيَّات Stylidiaceae (S). Stylidiaceae (F). Stylidiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذات الفلقتين متحدة القمالات منخفضة المبيض. اجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة المدد جميعها نباتات عشية وعشوية تقرب في المواقع الرطبة والمناطق اشهر اجناسها القلبيّة.

٢٢٥٢١ - قَلْبُوءَة هي القصور، نبات بري طبي معمر.

٢٢٥٢٢ - قَلْبُوء Outardeau (F). Young bustard (E). فرخ الجباري (السان).

٢٢٥٢٣ - قَلْبُوء Chamelle jeune (F). Young she-camel (E).

قال الجاحظ : « الشاة من النبق. وهي اول ما يركب من اناث الابل الى ان تنثى فاذا انثت فهي ناقة ».

٢٢٥٢٤ - قَلْبُوءَة، قَلْبُوءَة Alcalin (F). Alkaline (E). نسبة الى القلي. يقال تربة قلوبية وصالح قلوبى وأصلاح قلوبية.

٢٢٥٢٥ - قَلْبُوءَة، قَلْبُوءَة، تاشقي Alcalinéd (F). Alkalinity (E). خاصية المواد القلوبية. وهي ايتداد مقدار المذلف، في علول ما أو محيط ما، من رقم الاحتمال الممين وقدره سبعة الى ما فوق ذلك الرقم. راجع دالف.

٢٢٥٢٦ - قَلْبُوءَة، شِبْه قَلْبُوءَة Alcaloide (F). Alkaloid (E).

مادة عضوية تتميز بخواصها المشابهة لخواص القلي.

٢٢٥٢٧ - قَلْبُوء هو اثنان القلي او الخرس، اطلبها.

٢٢٥٢٨ - قَلْبُوء، قَلْبُوء Alkali (F). Alkali (E).

مواد مركبة من معدن واكسجين كالكلس والبوتاس والصودا والمختزبا.

٢٢٥٢٩ - قَلْبُوء Pâcurin commun (F). هو تف البر، اطلبه.

٢٢٥٣٠ - قَلْبِيَة عَظْمَاء، قَلْبِيَاء الزرع Aelia rostrata (S). Aelia rostré, Punaise des céréales (F).

حشرة مؤذية من فصيلة القاسيات، جسمها مفلطح، أهليلجي الشوزن، يملو نحو ١٢ مم. قوتها الى الخفسار الاصفر المذوق يملو تبيسر اسمر يمتد من الرأس الى الكوسل فالجيفة فالخنجين. رأسها مخروطي. عظمها مستطيل. عينها صغيرتان. زباناها مستطيلتان. كوسلها قعصي الشوزن. جسمها وحشها سائنة الاطراف، ومقاربة الطول. فتراتها شفافة. يعلها وقوتها الى الخفسار الاصفر الاسمر المذوق || مرتتها النباتات النجيلية وبها الزروع || راحتها كرجية.

واجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها عشوية . النماثل  
يتم البيل على البيل واست الواحد في قم الآخر في شهر  
فصائلها الخروطيات .

Callianthemum (S).

٢٢٥٣٩ - قَلْبَت

Callianthemum (F).

جنس نباتات عشية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعه  
المعروفة قليلة جميعها احشاش جبلية برية تعيش في المناطق  
التي يرتفع ارتفاعها من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ م . جلدها  
جلدية يتوسطها شراخ يملأ حسب الانواع من ١٥ الى ٣٠  
سم . وينتهي بزرقة متوسطة القند يفضاء اللون او وردية  
واوح عدد بتلاتها من ٦ الى ١٦ . اوراقها جلدية  
الانتشاب مستطيلة الزناد مشرمة ومفرصة . احرف انواعه

C. rufae-folium (S).

قلبت سداي الورق

C. coriandrifolium (S).

للبت كزري الورق

Saillir (F). To serve (E).

٢٢٥٤٠ - قَم

قم واقم القمل الايل : اشتغل عليها وضرها كلها .

٢٢٥٤١ - قَمَاء

القَاء : الاماكن التي لا تصيبها الشمس . الواحدة قَاء .

Ectopistes

٢٢٥٤٢ - قَمَارِي

جنس طير وحيد النوع من فصيلة الحيات . يتميز  
بامتلاحة جناحيه واكتفيه . منقاره دقيق البنية . ريشه  
قصير وسرود . غلبه الاوسط بين الانعقاد . ولسده  
قري اظليه .

Reproduction des oiseaux (F).

٢٢٥٤٣ - قِمَاط

Reproduction of the birds (E).

القِطَاط : سفاد الطير . وقيل زين رصاص الطير .

Acidie (F). Ascidium (E).

٢٢٥٤٤ - قَمَاعَة

عارض جسمودي يكثر في المالح ، يشو اوراق النبات  
بتردياته النصيلة التي تشبه القمع او البرق او الاناء .

Polycarpon (S).

٢٢٥٤٥ - قَمَاعَة

Polycarpon (F). Polycarpon (E).

جنس نباتات . عشية حولية برية من فصيلة النوبانيات .  
انواعها المعروفة ستة منها يبيض اصفاق البلاد الحارة  
والمعتدلة الحارة من العالم القديم || سقوا فراءه ، معظها  
متنصب وبضها مستلق . اوراقها متفرقة ، فصالحا  
لحمية ، صناعية الشكل ، لحمية ، لحمية الشرة . ازهارها  
لاقيامية التجميع ، منها الفردية والثنائية والثلاثية والارباعية .  
الاوراق تفرح بين الوردي والوردي الاخضر او الازرقالي  
المواجم .

٢٢٥٤٦ - قَمَام

ايام من آخر ايلول بقدر شهور السنة يستدل منها فيما قيل  
عن حالة الهواء في كل شهر من السنة المقابلة .

٢٢٥٤٧ - قَمَام

هو الاس المحذب الورق ، اظليه .

Vaccinium (S).

٢٢٥٤٨ - قِمَام

Airelle, Vaccinier (F).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الخنجيات انواعه  
نحو ٤٠ فيها الشجيرات والجنات والجنات . صوبها  
فراءه . اوراقها متعاقبة متبادلة . ازهارها ورية التجميع ،

Kellya (S).

٢٢٥٣١ - قَلْبَة

Kellya (F). Kellya (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم  
وفصيلة البرسويات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في  
معظم بحار العالم . اجسامها صغيرة . اصدانها قبابية شبه  
صويانية الشكل . تعيش لاصقة بالصخور . ليفها غزير  
المادة .

٢٢٥٣٢ - قَلْبِس

ما يترك من السل عند اشتياحه او ما تحبه النحل من السل  
في ظروف معينة .

٢٢٥٣٣ - قَلْبَسَة مُتَبَجِّجَة

Callistus lunatus (S). Calliste orné (F).

Callistus lunatus (E).

حشرة وانجمه قانصة من فصيلة القليسيات ورتبة غدييات  
الاجنحة . تألف الاراضي الكلسية في التهام والحضاب  
البحرية المرش || جسمها صغير القند يطول من ٦ الى ٧  
م . رأسها قصير الخيط ازرق اللون فكاهها ضليمان .  
زبانها غطيان ، مستطيلان . عيناهما صغيرتان . كسلها  
احمر اللون . ظهورها الى الحرة الزاوية تملو اربع بقع  
كبيرة ويقعجان صغيرتان لونها الى السواد الازرق المواج ||  
ها جبل واحد في الحلق . تسرح في النهار وتبيت في الليل ||  
يرتقها طول من ١٥ الى ١١ م . جسمها مربع السك ،  
احمل اللون اسمر اللب ، اسود الرأس والشرج ، ضلع  
التأثير الحادة . قوتها المواد العضوية تسمى ليا بدون  
انعطاع لانها شديدة النهم || طور الاكمال يستمر نحو  
خسة اسابيع .

Callistidae (S).

٢٢٥٣٤ - قَلْبِسِيَّات

Callistidae (F). Callistidae (E).

فصيلة حشرات لاحة وقانصة من رتبة غدييات الاجنحة .  
اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع اصفاق  
العالم واصفها اولاد الحارة || جميعها صغيرة القند او  
متوسطة الطول الذي قلما يتجاوز ٢٥ م . اجسامها خلية  
القشار ، جميلة الالوان الزاوية الاحم . رؤوسها شبه  
اسطوانية الجسم ، نازقة العين ، مستطيلة الزبان ،  
معتدلة الكواحل اللاقيامية الشكل ، لاحفة الاتحاد التساعية  
الاعايد الخنوزية || تسرح في النهار وتبيت في الليل .  
تسمى بسرعة ورشاقة وتعتبر بحفة || قوتها المواد العضوية  
المختلفة المأخذ ولا تمتد من فريسة تستطيع اليها سيلا ||  
احمر اجناسها القليلة والشلوس .

٢٢٥٣٥ - قَلْبِسِي

هو ابلق القند ، صفور من الجواثم صغير القند ابلق الثوب  
يكثر من الزوف على الصخور ولذا سمي قليسي .

Fruits desséchés (F).

٢٢٥٣٦ - قَلْبِف

Dried fruits (E).

هي الثمار المجففة الموضبة .

٢٢٥٣٧ - قَلْبِقَلَة

هي البهرولة ، اظليه .

Oligochaeta (F).

٢٢٥٣٨ - قَلِيلَاتُ الْحَبَب

Oligochaeta (E).

رتبة من الحليقات المفرديات تتميز بخلوها من الورايس  
والايرل وانفاشيم . اما حلها فشدية القصر ، قليل العدد  
اذ لا يتجاوز اربعة ازواج في كل فتحة || فصائلها



قَلْبَة



قَلْبَة بَهْجَة



اوراقه ابيدة نخيلة ملثفة الاطراف تطول نحو ١٥ سم. ازهاره الى الحمرة الفاتحة. ثماره وردية اللون مأكولة ويستعمل منها مشروب كسولي لذيد الطعم. اوراقه رفيقته ويجذره خاصة تستعمل في الدبابة.

### ٢٢٥٥٥ - قِيَامُ كَبِيرِ النَّصَر

*Vaccinium macrocarpum, Oxycoccus macrocarpa* (S). *Airelle à gros fruits, Canneberge à gros fruits* (F). نوع من القِيَام، جنينه مثمرة تطول نحو ١٥٠ سم. اوراقه ابيدة سائنية تطول نحو ٣ سم. نصلها جامد الصفعة ملثف الحنار. ازهاره لاقامية التجميع فيها الاحادية والتلاوية والخناسية والسبابية والتسابية. ثماره مأكولة قطرها نحو ٢ سم.

*Vaccinium arboreum* (S). *قِيَامُ شَجَر*. *Airelle en arbre* (F).

نوع من القِيَام، شجرته تملون من ٤ الى ٨ امتار. فروعها واقفاها خلية اللحاء. اوراقها هابطة سائنية تطول نحو ٦ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصلها جامد التسنج، مائل الصفعة العليا الالامة الحنار، خلي السفل البحرية اللون. ازهارها الى البياض الودي. ثمارها سود حامزة حافصة لا تتركز.

*Ordures des villes* (F).

*Ordures of city* (E). بقايا الماطين وكناسة البيوت والشوارع تستعمل في تسميد التربة وهي من الاسمدة الضعوية.

*Vacciniées* (F).

سبط من فصيلة الخنبيات يشمل بعض الاجناس والالتواع. معظمها من نباتات جبال البلاد المعتدلة الحرارة. اشهر اجناسه القِيَام.

*Nanisme* (F). *Nanism* (E). *قَسَامَة*، *قَسَامَة*.

خاصة في بعض النباتات والحيوانات تمنعها عن اتخاذ حجمها المألوف فتلبث صغيرة. من اسبابها الرئيسية، النبات فقر التربة ببعض العناصر الغذائية.

*Vertex*

*قمة الرأس*، *قمة الرأس*، *قمة الرأس*.

*Triticum* (S).

*Blé, Froment* (F). *Wheat* (E). *Weizen* (D). *Fromento* (I).

جنس نباتات عشبية زراعية حولية من فصيلة النجيليات بطورها جرة دقيقة. سرقها شطاء، قصية، اسطوانية، مستقيمة، فارغة، صلبة التركيب، مصمتة العقد والاطراف التي تنتهي بالسنايل. سنايلها بحورية مركبة من حدة سقيليات متتالية. اما الاشطاء فانها ترسم الانتشاب وهي حل فتيين انمهاث وبنيات فالامهاث تلك التي سرقها وسنايلها تطول قدر السلة الرئيسية اما البنيات فتلك التي تتأخر عن الامهاث وقد تكون سنايلها عادمة البر. اوراقها متعاقبة مستطيلة مركبة من قسمين، غمد طويل ملثف يرتكز على العقد ويخفف السلاي ونصل ضيق مستطيل بدعي المصلى يرتكز عند قاعدة انفصاله عن العقد على لسن مسن الحنار وعلى اذنيته تكتنفلان السك || اما ثمارها فيايسة لا منفجرة تدعى البر. الواحدة برّة. تاويغه - راجعه في كلمة حنطة.

بحورية الارتكاز. ثمارها عنبة الشكل، حامزة الطعم. مأكولة || احرف انواعه واهرها ما يلي.

### ٢٢٥٤٩ - قِيَامُ أَحْمَر

*Vaccinium vitis-idaea* (S). *Airelle rouge, Myrtille ponctuée, Vigne de l'ida* (F). *Cow-berry, Whim-berry* (E). *Preistelheidebeere* (D). *Baceri vite idea, Mortella punctuata, Vigna d'orso* (I).

نوع من القِيَام جنينه تنبال البلاد المعتدلة الحرارة. جنينه تطول من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقه سائنية صغيرة تطول نحو ٣ سم. نصلها بحري اللون على صفحته. ثماره الى الحمرة القرمزية يستخرج منها بعد تحميرها وتقطيعها مشروب كسولي لذيد الطعم.

### ٢٢٥٥٠ - قِيَامُ آسِي

*Vaccinium myrtillus* (S). *Airelle myrtille, Abrader, Myrtille* (F). *Bilberry, Blackberry, Whortle-berry* (E). *Echte Heidelbeere* (D). *Baceri mirullo, Mirtillo, Uva ursina* (I).

نوع من القِيَام. جنينه فناء تملون من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها صغيرة القد آسية الشكل، نصلها جامد التسنج اخضر الصفعة. ازهارها وردية، خناسية الفصوص، عشارية الاسدية. ثمارها خرية اللون مأكولة ويستعمل منها كسول لذيد الطعم || جذوره وافئاته واوراقه تستعمل في الدبابة.

### ٢٢٥٥١ - قِيَامُ الْمَتَاع

*Vaccinium uliginosum* (S). *Airelle des marais, Canneberge* (F). *Crauberry, Moss-berry* (E). *Mosshaidelbeere* (D). *Mortella di palude, Mortellina di lago, Scopa frutifera* (I).

نوع من القِيَام الملبول يكثر في المناطق الرطبة، ساقه فراءا تطول نحو ٨٠ سم. اوراقه هابطة صغيرة، القد، نصلها سائني الشكل تطول نحو ٣ سم. صفحته بحرية اللون. ازهاره احادية او ثلاثية التجميع. ثماره سكرية الطعم مأكولة وصالحة لتقطير.

### ٢٢٥٥٢ - قِيَامُ جَبَكِي

*Vaccinium arctostaphylos* (S). *Airelle de Cappadocia, Thé de Trébizonde* (F). *Oriental whortle-berry, Trebizond tea* (E). *Broussatee* (D). *Tà di Brouse, Vaccinio di Cappadocia* (I).

نوع من القِيَام يكثر في بعض مناطق البلاد التركية. اوراقه ابيدة، نصلها جامد الصفعة الضيقة المسنة الاطراف. ازهاره قسبة الشكل بياض اللون احادية او ثلاثية التجميع. ثماره حامزة عصفا حراء اللون || اوراقه صعبة تستعمل استعمال الشاي.

### ٢٢٥٥٣ - قِيَامُ عُنْكَرُلِي

*Vaccinium corymbosum* (S). *Airelle à corymbes* (F). نوع من القِيَام جنينه تملون من ١٥٠ الى ٤٠٠ سم. ساقها وفروعها واقفاها سرسة. اوراقها هابطة تطول نحو ٧ سم. نصلها منفذ الصفعة، قليل اللمعة. ازهارها وردية اللون، خناسية او سبابية التجميع، عنكركلية الترتيب. ثمارها الى الزرقة السوداء وهي مأكولة وصناعية كسولية.

### ٢٢٥٥٤ - قِيَامُ صَغِير

*Vaccinium oxycoccus, Oxycoccus palustris* (S). *Airelle commune, A. à maurets, Canneberge commune, Brimbelle* (F). *Small crauberry, Bog-berry, Feu-berry* (E). *Moosebeere* (D). *Baceri canneberg, Vaccinio dei paduli* (I).

نوع من القِيَام، ساقه مسطحة تطول من ٢٠ الى ٨٠ سم.



قام احمر



قام آسي



قام المتاع



قام جبلي



قام صغير

## ٢٢٥٩٧ - قَمْحُ صَبْ ، قَمْحُ قَاس

*Triticum durum* (S). *Blé dur* (F).  
من الانواع الجرد تكثر زراعته في بلاد حوض البحر المتوسط. غشوه واصرامه كثيرة العدد. ساقه مستقيمة او جوفاء. سنابلها صلبة. برء مستطيل الشكل صلب المكسر.

٢٢٥٩٨ - قَمْحُ تَيْن  
*Triticum sativum* (S).  
*Blé tendre* (F). *Common wheat* (E). *Saatweizen* (D). *Fromento comune, Frumento, Blada, Grano* (I).  
من الانواع الجرد تكثر زراعته في البلاد الأوروبية والأمريكية غشوه كثيرة العدد واصرامه ايضا. ساقه جوفاء سنابلها كبيرة اللقذ منها البقوية واللايقوية. لانياسي الشكل والذرن. لين المكسر اللينقي.

٢٢٥٩٩ - قَمْحُ تَشْوِي  
*Triticum dicoccum, T. amyleum* (S). *Blé de Jérusalem, Amidonier* (F). *Two grained wheat, Emmer wheat* (E). *Emmer, Emmerweizen, Emmerkorn* (D). *Fromento di Gerusalemme* (I).  
من الانواع المكسية. زراعته محصورة ببعض جبال اودية الوسطى والشرق الاقصى. غشوه واصرامه قليلة. ساقه فارغة. سنابلها كثيفة صلبة. برء حنطلي اللون، ابيض المكسر، غزير للمادة النشوية.

٢٢٥٩٠ - قَمْحُ وَحِيدُ الْحَبَّةِ  
*Triticum monococcum* (S). *Blé locular, Engrain, Petit épeautre* (F). *One grained wheat, Small spelt* (E). *Einkorn, Einkornweizen* (D). *Fromento loculare, Piccola spelta* (I).  
من الانواع المكسية. زراعته معروفة في ألمانيا وبغماريا وروسيا. ساقه فارغة. سبلك مستطيلة صلبة. سنابلها وسيدة الحبة. برء حنطلي اللون اسمر المواج.

٢٢٥٩١ - قَمْحُ  
*Lune* (F). *Moon* (E).  
جرم شمسي كروي الشكل يمتد غشوه من الشمس ويمكس على الارض. وهو اقرب الاجرام اليها قطر يبلغ نحو ٣٥٠٠ كلم. وحجمه نحو ثلث من حجم الارض وهو ينور حولها في ذلك اقليمها بعد اوجبه منها، وهو المسافة القمرية، يبلغ نحو ٣٥٤٥٨٠ كلم. ويمسك كمينه، وهو المسافة البعيدة، يبلغ نحو ٤٠٤٧٥٠ كلم || ولقمر ثلاث حركات، اليومية واليلية والصمودية وهو ينتج دورته حول الشمس في اربعة اسابيع. والحركة الصمودية هي التي يمتد عليها في حساب السنة القمرية التي يبلغ عدد ايامها ٣٥٤ يوما اي انها تقضي ٥٨ دقيقة من السنة الشمسية || اما الشهر القمري فلهذه ٢٩ يوما و١٢ ساعة و١٤ دقيقة.

٢٢٥٩٢ - قَمْحُ  
*Caranx luna* (S).  
نوع من الشم. وهو سمكة بحرية مأكولة كبيرة اللقذ تغول نحو ٦٥ سم. اطائها مياه بحار البلاد المطلة لتوسد في المتوسط. تكثر في مناطقه الشمالية.

٢٢٥٩٣ - قَمْحُ الْبَرْ  
*Sarrasin ménager, Bucali* (F).  
هو البرازان المعروف، اطله.

٢٢٥٩٤ - قَمْحُ بُولُونِي  
*Blé de Tartarie* (F).  
*Triticum polonicum* (S). *Blé de Pologne, Froment de Pologne* (F). *Polish wheat* (E). *Polnischer Weizen* (D). *Fromento di Polonia* (I).  
من الانواع الجرد تكثر زراعته في بعض مناطق اودية وافريقية الشمالية. غشوه واصرامه عديدة. برء شديد الاستطالة. جامد الحبة صلب.

٢٢٥٩٥ - قَمْحُ تَحْنِيْن  
*Triticum turgidum, T. vulgare* (S). *Blé renflé, Froment renflé, Poulard, Gros blé* (F). *Humpy grained wheat, Turgid wheat, River wheat* (E). *Englischer Weizen* (D). *Fromento turgido, Grani grosso* (I).  
من الانواع الجرد. تكثر زراعته في الشرق الغربي لكنه يرغب في الاربة الحارة الوفرة المواد الغذائية. ساقه مستقيمة في اقلها. سنبلته مربعة الاصلع، كثيرة الجبر. برء غليظة عديدة. صلبة المكسر.

٢٢٥٩٦ - قَمْحُ رُوْبِي، قَمْحُ مَكْتَسِر، عَكْس، حَمْدُ رُوْس  
*Triticum spelta* (S). *Blé vètu, Epeautre, Grand épeautre* (F). *Spelt wheat, Dinkel wheat* (E). *Spelz-Weizen* (D). *Spelta, Marzolo, Fromento rosso* (I).  
من الانواع المكسية. زراعته محصورة بالاقام الباردة والجبلية. غشوه واصرامه معدودة. ساقه عالية فارغة. سنابلها فرقة، مستطيلة، صلبة، لونها يختلف باختلاف الغشوب منها الابيض والاسمر والاحمر.



تج

٢٢٥٨٠ - قَمَرُون هو الاربيان ، اطلبه .

٢٢٥٨١ - قَمَرُون رَشِيق (F). *Gnatophylle élégante*

دوية من القشريات وفصيلة القريدسيات مشهورة باسم قمر . اطلبه .

٢٢٥٨٢ - قَمَرِي (F). *Lunale* (F). *Lunar* (E).

٢٢٥٨٣ - قَمَرِي (F). *Lunifforme*, *Lunulaire* (F). *Lunifirm* (E).

نمت تعريفي يوصف به ما كان شكله شكل القمر .

٢٢٥٨٤ - قَمَرِي \* (F). *Ectopistes migratoria*

*Ectopiste migrateur* (F).  
طائر من القاربي وفصيلة الحماميات كنيته ابو ذكري وابو طلحة . الاثنى قرية والجمع قاري وكل من يروي ان حبه الرحمن ين ابي بكر الصديق لما تلقى زوجته عاتكة ، نزولاً عنه رغبة ابيه ، كان يشد :

احاتك لا انساك ما ذر شارق

وسا نرق اح الحمام المظوق

ولم ار مثلي طلق ايوام مثلي

ولا مثلي من غير جرم يطلق

احاتك قلبي كل يوم ويلي

ليك يسا تحتي القفوس معلق

ها خلق جزل ورأي وينصب

وخلق سوي في الحياة ومنطق

فرق له ابوه وامره ان يرجعها || والقري طائر طوله نحو ٤٥ سم. ظهره الى الزرقه الرصاصية منه بنفسجي المزاج . صدره وبيضه الى الصبغة الصفائية . زيكاه ابيض الريش . انفيكه رصاصي الانتشاب اريد الطرف متعرجه يقع سود . جناحه اسود الوسط رمادي الاطراف واخاظة . منقاره اسود . عيناه برتقاليان ، جنفوها حر . الاثنى اصغر قدماً من الذكر وادكن قوياً واقل ماجة || موطنه فسح الارباء يم جميع البلاد . وهو من الطيور القواطع التي تجوب البلاد سبياً وراء الرزق وليس في سبيل المصيف والمشي . اسرايه كثيفة يراوح عدد افرادها من ٥٠ الى ١٠٠٠٠ وأكثر . قوته الحبيب واليدور . يدن حته في الانجار . اناته تبيض من المزين الى الثلاث مرات في السنة .

٢٢٥٨٥ - قَمَرِيَات (F). *Menispermaceae*

*Menispermaceae* (F). *Menispermaceae* (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . اسماها ١ . اجنبها ٣٠ وانواعها ١٥٠ . اصطلها البلاد الاسيوية والامريكية تكثر في المناطق رمل شفاف الانهار . معظمها من اجنبات المارسة . اوراقها متعاقبة مننقة . ازهارها صغيرة القدة ، متعقودية التجميع ، محورية الارتكاز . ثمارها نووية صغيرة الحجم .

٢٢٥٨٦ - قَمَرِيَّة هي حشيشة القمر ، اطلبها .

٢٢٥٨٧ - قَمَرِيَّة \* ، حَبَّ الهلال ، سَمَّ الحَوْت

*Menispermum* (F). *Menisperme* (F). *Moonseed* (E). *Mondsperme* (D). *Menispermum* (I).

جنس نباتات عارشة من فصيلة القمريات ، انواعها عديدة معظمها بري وبضها ترابي . اوراقها متعاقبة مننقة كاملة او مفصصة . ازهارها صغيرة القدة ، ثنائية المسكن ، متعقودية التجميع ، ثمارها نووية لا تحلوا من الحادرة تستعمل في صيد السمك || اشهر انواعها ما يا . :

٥ م . || يمكن اجتنابه : ١ بالتبريد المستمر والتبرية الطبيعية . ٢ بعدم الافراط في ري الاشجار قبل ثمن الجلي . ٣ بجني الثمار حته بده ادراكها حيث تكون نسبة المواد الاثيرة المختلفة على احسن حال .

٢٢٥٨٤ - قَمَرُ اللَّيْلِ \* (F). *Citharinus Geoffroyi*

*Citharine du Nil* (F). *Citharinus* (E).  
قر الليل هو الاسم المصري . سمكة نهريه ييوس من مفتوحات المائنة وفصيلة السمكيات . موطنها النيل من منتهى الى مصبه . تعيش في الاسمال والارواح || جسمها كبير القدة ، مبطط الجسم ، يطول نحو ٥٥ سم. عرضها من حافة بطها الى قاعدة زعنفتها الظهرية الاولى ، نحو ٢٥ سم. رأسها صغير الحجم ، شبه اسنفي الشكل . شدتها قليل الانفرج . اسنانها صغيرة حادة ، على صف واحد . زعنفتها الظهرية الاولى كبيرة القدة شبه هرمية الشكل ، اما الثانية صغيرة . زعانفها الصدرية والخصوية صغيرة الحجم . زعنفتها الشرجية مستطيلة ناعمة المقدم . زعنفتها الذيلية فارقة ، ردية الانفرج || نوتها الى الشبهة الغضبية مما دس الى تسميتها بقمر الليل || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٢٥٨٥ - قَمَرَاة (F). *Fauvette des Jardins*

القمراء طائر من الدغاعيل يدعى دخلة اليساين ، اطلبها .

٢٢٥٨٦ - قَمَرُوش \* (F). *Glomeris*

*Glomeris* (E).  
جنس دويات من فصيلة القمروشيات . انواعها عديدة جميعها شبه اسطوانية الشكل طولها يراوح من ١٢ الى ٢٠ م . اجسامها مبططة من ١٢ سلقه . جرابها ٢٤ . اثلواها الى السرة . تعيش تحت الحجارة . قوتها المواد النباتية المتحللة تسرح في الليل وتتكور في النهار .

٢٢٥٨٧ - قَمَرُوش مُهَدَّب \* (F). *Glomeris marginata*

*Glomeris marginata* (F). *Glomeris marginé* (F). *Marginated glomeris* (E).  
دوية دامتة من فصيلة القمروشيات وربة الدغاعيات شغوفات الاحتكاك || جسمها صغير القدة ، محبب السطح الملوي ، مبطط المدب . الذكر اصغر قدماً من الاثنى يطول نحو ١٢ م . والاثنى تطول نحو ٢٠ م . || رأسها مستعرج الشكل ، قليل التنوء . حينما زعمينا من متكا قارض قاصم . زياناها صغيران مغلغلان . جرابها قصيرة تدب ١٧ زوجاً عنه الذكر و١٩ زوجاً عنه الاثنى . ثوباها اسود اللون ، احمل الحمل الكثيف . مدبها الى الطلعة للبراء || تعيش تحت الحجارة وفي المواقع المعتدلة الرطوبية وفي الاقضية والسكن الارضية . تسرح في الليل وتتكور في النهار . قوتها المواد النباتية المتحللة || تعتبر من الدويات اللامؤذية .

٢٢٥٨٨ - قَمَرُوشِيَّات \* (F). *Glomeridae*

*Glomeridés* (F). *Glomeridae* (E).  
فصيلة دويات من الدغاعيات الشغوفات الاحتكاك . اجنبها وانواعها عديدة اشهرها واعها القمروش .

٢٢٥٨٩ - قَمَرُوش (F). *Amande dure*

*Hard almond* (E).  
هو اللوز الصلب الذي يوجب الكسر .



قر الليل



قروش



قروش مهذب



قري



قرية

## ٢٢٥٨٨ - قمرية الصين

*Menispermum dauricum* (S). Ménisperme de Daourie, M. de Chine (F).

جنية ترينية عارشة تملو نحو ٤ امار ، اوراقها مستطيلة المثلث ، احليجية الشكل ، خماسية التفرص ، نصلها مائل مائل البثرة اللامعة على صفحتيه . ثمارها الى الجؤة القاتمة || انزعارها يستمر من حزيران الى تموز .

## ٢٢٥٨٩ - قمرية كندا

*Menispermum canadense* (S). Ménisperme du Canada (F).

جنية ترينية عارشة تملو نحو ٤ امار . اوراقها لولية الشكل خماسية او سباعية التفرص ، نصلها مائل الصفحة العليا ، خلي المروق على السفلى . ثمارها الى السواد اللامع || انزعارها يستمر من حزيران الى تموز .

## ٢٢٥٩٠ - قميص أسود

*Tipula nigra* (S). *Tipule noire* (F). Black tipule (E).

حشرة من فصيلة القمصيات . جسمها اسطواني الشكل ، معتدل القد ، يطول من ١١ الى ١٥ سم . || ثوبها الى السواد الاسفع . وراثها الى السرة العاقبة ، زباناها خيطيان ، مهدبان || الاثني اكبر قدماً من الذكر واصفر ووشناً منه || تظهر الحشرة الجملانة في حزيران وتبقى حتى ايلول . تألف المئات والعنايات الظليلة || تمتع الاثني مكها في التربة فينتف من يرقات تعيش على المواد النباتية والمضوية المحللة .

## ٢٢٥٩١ - قميص البقول

*Tipula olivacea* (S). *Tipule potagère* (F). Leatherjacket (E). Wiesenschnake (D).

حشرة من القمصيات طولها يراوح من ١٥ الى ٢٣ سم . جسمها واجنتها وارجلها مستطيلة . لوها الى الخطي تشوبه صفرة زيتية . ذكرها اصفر حبيبا من انثاه . والاثنى تمتع مكها في ايارن الربيع على سوق الزروع ومختلف نباتات المراعي والمروج فينتف من يرقات صفرة همة تلهم الجلود وقد تركب الاوراق وتؤذيها . وهي تسرح في الليل وتبيت في النهار . لها جيلان في الحول ، الاول في الربيع والثاني في الصيف .

## ٢٢٥٩٢ - قميص كبير

*Tipula maxima* (S). *Tipule maximale* (F). Major tipule (E).

حشرة لامؤذية من فصيلة القمصيات . جسمها مستضخم كبير ، يطول من ٢٧ الى ٤٠ سم . || ثوبها الى الخطي الاسفر . وراثها مبدبان بالابيض والوردي الباهت || زباناها مرفقيان ، مهدبان ، تتميز بكمز القدرة وبامتدالة القوائم || الذكر اصفر قدماً من الاثني . تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى تشرين الثاني . تألف الاسكن الربطية وصفاف مجاري الماء . تمتع الاثني مكها في التربة . يرقها تعيش على المواد المضوية والنباتية المحللة .

## ٢٢٥٩٣ - قميصية

*Sauterelle à l'éclotion* (F).

الجراة عند تفقيها . ج قص .

*Tipulidae* (S). *Tipulidae* (F). *Tipulidae* (E). Schnaken, Riesenschnaken (D).

فصيلة حشرات من رتبة ذرات الجناحين . اجناسها وانواعها

عديدة لا تقل عن ٥٠٠ معظمها من الحشرات الثامنة او القليلة الضرر . تعيش على ريق الانهار واوراق الاوراق . تكثر في الاسكن الربطية الظليلة وعلى صفات الانهار . يرقاتها تعيش في الماء او قرب الماء وفي التربة والريال على مختلف المواد المضوية والنباتية المحللة .

## ٢٢٥٩٤ - قملطول

*Antedon* (S). *Antédon, Comastule* (F). Comastule (E).

جنس حيوانات بحرية من زنايق البحر وفصيلة القملطولات . انواعها المعاصرة المدونة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميعها حشاية الاصابع القابلة الانطاط والتحصين . احادية الساق النحيلة المنقصة عند الادراك || تسبح بواسطة اصابعها . يكثر وجودها حيث يكثر الخث والطوح || اعرف انواعها القملطول الاحمر والقملطول الوردي .

## ٢٢٥٩٦ - قملطولات

*Comatulidae* (S). *Comatulidae* (F). *Comatulidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من زنايق البحر . اجناسها وانواعها المعاصرة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميع انواعها ثابثة مستقرة حتى نهاية زين قوتها ثم تتحول الى متفلة بجولة تقوم وتلتصق بالاشياء بواسطة زوائد هدية || اشهر اجناسها القملطول .

## ٢٢٥٩٧ - قنق

*Entonnoir* (F). *Funnel* (E).

جهاز يوضع على فم الاناء فيسب فيه الماء ويغير . ج افع .

## ٢٢٥٩٨ - قنق ، قنق

*Cupule* كاس صغيرة قلمية غشبية التركيب تحيط بمار بقف الاشجار كاليلوط واليدق .

## ٢٢٥٩٩ - قنقة

ذباب يركب الايل والطياب اذا اشتد الحر . ج قنق وق (السان) .

## ٢٢٦٠٠ - قنقيل

*Bourgeonner* (F). *To bud* (E).

قمل للنبات : خرجت قاعيله اي براعه .

## ٢٢٦٠١ - قنقيلة

*Bourgeonnement* (F). *Budding, Sprouting* (E).

هي نمو قاعيل النبات وزمعاها . وهي مجموعة المناشع التي تشابع تكوين البراعم وراثها .

## ٢٢٦٠٢ - قمرية حمرار

*Catocala nupta* (S). *Catocala nupta* (E).

حشرة من الفسقيات مرشقات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اردوة . فرائثها واثمة قوتها رقيق الانهار . سرقتها تعيش على اوراق الحور والصفصاف و اجسامها اكبر القد يطول نحو ٣١ سم . بسطها تراوح من ٧ الى ٧٨ سم . رأسها كسني اللون . صياها كيرنان . زباناها خيطيان . جوشها ويطها الى الكسني الاكلت || وراثها الاماميان الى الريدة السمره يملوها زراكنش وتزاولن خلفه الاوانن فيها البني والكسني والازرق الاطلح . حناها الخاويج متتابع الاقواس الحملالية السمره . وراثها الخلفيان الى الحمرة القرمزية يملوها طرق مجوي ودية وسطى من اللون نفسه || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تماثل ظهره بدهورها بنمو سمة اصابع وتمنع المكن مياديا



قمل البقول



قمرية حمرار



قُمُوتَةُ زَرْقَاءَ



قُمُوتَةُ التِّينِ



قُمُوتَةُ

في شقوق لحاء السوق والافصان || السرة تطول نحو ٧٠ م. جسمها شبه اسطواني الشكل . ثوبها الى الطلحة الخضراء يملؤها تمشيش دقيق اسود ونقط جانبية فردية حراء اللون . رأسها الى الجؤوة . مدنها ورواجبها الى الطلحة السراة || طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينتهي ضمن صلبة تحميها السرة بين الاوراق التي تجسمها الى بعضها بعض .

### ٢٢٦٠٣ - قُمُوتَةُ زَرْقَاءَ \*

Catoxala fraxini (S). Lichénée bleue, Lichénée bleue (F). Catoxala fraxini (E).

حشرة من النعقيات حرشيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الانص الى اوروبا وافريقية الشمالية . فرائشها واحة قوتها مغر الاضرار . سرتها تعيش على نعال الاوراق || جسمها كبير القند بطول نحو ٣٥ م . يسطها تراوح من ٩٢ الى ٩٩ م . رأسها كسني اللون اسمر المواج . حينها كيرتان . وبناتها عيخيان . جوشها ويطها الى الكسني الاسمر تملو ماجة غيرة || روشنها الاماميان الى الطلحة السراة يملوها ستة صفوف من الزراكش الكسنية اللون . روشنها الخلفيان الى الكسني الكلف تملو جدة مقوسة قاطبة زرقاء اللون || لها جبل واحد في الحول . تظهر الفرائش في تموز وتبقى حتى ايلول . قسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو حصة اسابيع وتتحس الممكن ميماديا في شقوق لحاء السوق والافصان || السرة تطول نحو ٨٠ م . جسمها شبه اسطواني الشكل . ثوبها الى الطلحة تملوها نمشة زرقاء ونقط سود جانبية . رأسها الى الطلحة الذي الى السرة . عليها دقيق اشقر || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينتهي ضمن صلبة تحميها السرة بين طيات القشور او تحت الحاء .

### ٢٢٦٠٤ - قُمُوتُورُ ، قُمُوتُورَةُ دوية (السان) .

٢٢٦٠٥ - قُمُوتُورَةُ Bourgeon à feuille (F). هي البرعمة الورقية . ج قاعيل . Leafy bud (E).

٢٢٦٠٦ - قُمُيجِي Infundibuliforme (F). Infundibular, Infundibuliform (E).

نمت تعريف ي يطلق على ما كان شكله كالقبع . ويطلق في علم النبات على التوجيجات و متحدة القعالات و القسمية الشكل .

### ٢٢٦٠٧ - قُمُيجِيَّة التِّين \* ، حَشْرَةُ التِّينِ

Asterolecanium كوشليل التين sambuci (S). Cochenille du figuier (F). حشرة صغيرة من القرمزيات . جسمها مستدير الشكل قطره نحو ٣ م . لونها الى الصفرة الخضراء المواج . تركب في التين الانسجة اللينة قسبب حيث تغل تجاوبف صغيرة يزداد ارتفاع حافها مع طول اقامة الحشرة .

### ٢٢٦٠٨ - قُمُيجِيَّات Anaplores

رئية حشرات من طبقة القمليات . فضائلها واجناسها وأنواعها عديدة، زهاء ٢٠٠ منها ٢٤ نوعاً يركب الانسان والحوانات البهية المداجنة . اما الانواع البالية ضمري الحيلوانات البرية من القردة الى الفئران || والقسميات حشرات مادمة التطور والاجنحة . جسمها صغير القند مفلطح الشكل . رأسها وتدي . متكها ثاقب ماص . قمرنسا

الاستشعاري مركب من ٥ فواصل صغيرة . رسنها وسيد العقلة ينتهي بمقل حاد قوي || تمشيش طفيلية وصل الانسان والحوان الكيون . تحسس الدماء وتسبب الامراض التي تنقلها || اشهر فصائلها القرميزات والقرميزات .

٢٢٦٠٩ - قُمُيجِي Flacon (F). Case-bottle (E). انا من نحاس او زجاج يحكم السد يحفظ فيه السائل

### ٢٢٦١٠ - قُمُيلُ الجُبِين راجع سكية الجبن .

٢٢٦١١ - قُمُيلُ الحَيْثَان Cyame (F).

هو القشر ، دوية بحرية من القشريات ، اطلبه .

٢٢٦١٢ - قُمُيلُ الرَّأْس هو القرفة ، اطلبه .

٢٢٦١٣ - قُمُيلُ الْعَاقَةِ هو الطبروع ، اطلبه .

٢٢٦١٤ - قُمُيلُ الْكُتُب هو ناس الكتب ، اطلبه .

٢٢٦١٥ - قُمُيلَةُ هي الدمة ، اطلبه .

٢٢٦١٦ - قُمُيلَةُ الْبُرْتُقَالِ السُّودَاه هي قمرزية البرتقال السوداء ، اطلبه .

٢٢٦١٧ - قُمُيلَةُ الْفُتَاح هي رزية الفتح ، اطلبه .

٢٢٦١٨ - قُمُيلَةُ التُّوت هي قمرزية التوت ، اطلبه .

٢٢٦١٩ - قُمُيلَةُ النَّبَات هي القمرزية ، اطلبه .

٢٢٦٢٠ - قُمُيلَةُ الزُّود هي قمرزية الزود ، اطلبه .

٢٢٦٢١ - قُمُيلَةُ سَاحُورُهُ

هي القمرزية الفتاكة ، اطلبه .

### ٢٢٦٢٢ - قُمُيلِيَّات

Psocoptéroïdes (F).

Psocoptéroïdes (E).

طبقة حشرات صغيرة لقد ثابتة ماصة وقارضة من شعبة الحليات . تطورها تدريجي . لا ملامس شرجية لها . قوتها المواد العضوية والنباتات القطرية || رتبها ثلاث القمليات والقمليات والقمليات .

٢٢٦٢٣ - قُمُيلِيَّاتُ الْمَاء Hydrachnidae (S).

Hydrachnidae (F). Hydrachnidae (E).

فصيلة حشرات صغيرة لقد من رتبة القمليات اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها مائية معظمها طفيلي .

٢٢٦٢٤ - قُمُيلَاة Tique (petite) (F).

Tick (small) (E).

القرادة اول ما تكون صغيرة ثم تصير حنطة ثم قرادة .

### ٢٢٦٢٥ - قُمُوتُورَةُ \*

Calceola (S).

Calcéole (F). Calceola (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة التحشيات . انواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من متصبرات الاسحاب الاول والطبقة الطباشيرية ، وبعضها يعيش على الصغور المنقورة الجيدة الثور في بحار البلاد المعتدلة الحارة || اصداها قميصة ، شبه غروطية الشوزن ، للؤلؤة الغشاء الداخلي .

٢٢٦٢٦ - قُمُيجِي Bruant proyer (F).

صغور من الدرس يدعى الاكل اطلبه .



Connaraceae (S).

٢٢٦٥٦ - قناريات \*

Connaracées (F). Connaraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . مركزها التصنيفي يأتي بين الورديات والقطانيات . اجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد ، أغلبها منظر المناطق الحارة من المابين القديم والجديد باستثناء أستراليا || نباتاتها جنبات شائكة . أوراقها صغيرة ، متقابلة فصالحا سنانية الشكل ، بحرية الخضار . أزهارها محورية ، صغيرة ، منعقة || أشهر اجناسها القنارة .

Pimelia (S).

٢٢٦٥٧ - قنار \*

Pimélie (F). Pimelia (E).

الواحدة قنارة . جنس حشرات من غمديات الاجنحة مختلفات الاجزاء وفصيلة البشيات . أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم القديم || اجسامها مختلفة الاحجام يكثر فيها الاعتدال ويقلب فيها الشكل الاهليجي رؤوسها صغيرة . قرونها الاستشعارية معتدلة الطول . كوتلسها خروطية . الحماها لاحقة ، منها المخذدة ومنها المحزرة . جرابها بين المعتدلة والمستطيلة . انثاهيا تراوح من السمرة القاتمة الى السواد الامفر .

Pimélie géante (F).

٢٢٦٥٨ - قنارة جبارة

هي الدحلول حشرة من غمديات الاجنحة ، اطلبها .

Rhinopterus (S).

٢٢٦٥٩ - قناصة \*

Rhinoptère (F). Rhinopterus (E).

جنس اسماك بحرية من السفنقيات وفصيلة السفينقيات البحرية . أنواعها المعروفة ستة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . جميعها كبيرة القد . اجسامها شبيهة باجسام المورمية . رؤوسها اسطوانية يملؤها ميزاب قليل العمق يقسمها الى شطرين متساويين . اذناها مسطيلة كالسياط تحميها عند قواعدها منشارية . منشارية التركيب قاعدتها الزعنفة الشرجية . قوتها الاسماك . تألف المحاذج الصخرية حيث تكمن للانقضاض على فرائسها || لحومها كاعنة الصنف ، قل من يرغب في اكلها .

Masque (F). Mask (E).

٢٢٦٦٠ - قناع

جهاز يوضع على الرأس لوقاية سواه أو بعضها .

Radiéschalste (F).

٢٢٦٦١ - قنائل

Dowser (E).

من عالج اشعاع التلسنت الكهربى يعرف بوجود الماء والمعادن في جوف الارض .

٢٢٦٦٢ - قناب ، قناب (F). To ease (E). Alléger (F).

قنب الكرم : قنبا وقطع ضها ما يؤذي حلقها .

٢٢٦٦٣ - قناب (F). Sheath, Cover (E). Fourreau (F).

جراب فقصيب الدابة ، وكيل وعاء فقصيب كل ذي حافر . كتركب قناب الحمار : وعاء جردانه . وقناب الجمل : وعاء ثيله .

٢٢٦٦٤ - قناب \*

Epanouir (s) (F).

To blow, To expand, To open (E).

قنب الزهر : خرج عن اكمامه .

٢٢٦٦٥ - قناب \*

Cannabis sativa (S).

Chanvre commun, Chanvrier, Pantagruellon (F).

٢٢٦٦٥ - قنابكة ، قنابكة (F). Bract (E). Bractée (F).

كل ورقة شدت في شكلها أو تركيبها ليربدها قرب الزهرة كالكانفور في البتلة والمصينة في التسع . الخ .

٢٢٦٦٦ - قنابي

Bractéaire, Bractéal (F).

Bractéal (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالقنابة .

Ostrya (S).

٢٢٦٦٧ - قنابيسية ، قنابيسية

Ostryar, Iron-wood (F). Lever-wood, Brone-wood (E).

Hopfenbaum (D). Ostrya, Legnoferro (I).

جنس اشجار حرجية وريزينة من فصيلة السوليات .

انواعها قليلة العدد هيكلها وأوراقها وأزهارها تشبه الشرم (الحريبيوس) . سوتها تملن من ١٥ الى ٢٥ م . اغشائها

شديدة الصلابة ، ثقيلة الوزن النسي . أوراقها عايلة

متناحية طول من ٦ الى ١٣ سم . وتعرض من ٣ الى ٦ سم .

نصلها مزنب الصفصة ، متغارب المروق المتقابلة التي

يرواح بعدها من ١١ الى ١٧ . ثمارها كوزية الشكل

كأار الجنبيل . زورها حلقة الطرف الدقيق || احرف

انواعها واشهرها :

Ostrya japonica (S).

Ostryer du japon (F).

Ostrya carpinifolia (S).

Ostryer à feuilles de charme (F).

Ostrya virginiana (S).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).

Ostryer de Virginie (F).



قنار

قنابة شرمية الورق

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية

قنابة فيرجينية



قناسة

٢٢١٧٧ - قُبُ *Chénévis (F). Hemp-seed (E).*  
هو بذر القنب ويستخدم بأكله الطير ويستخرج منه زيت صناعي بنسبة تراوح من ٢٠ إلى ٢٤ ٪ كسبه يستعمل في تدبيل التربة .

٢٢١٧٨ - قُبُ *Glumella (F). Glumella (E).*  
القنبية قنبية تحيط برؤس الثجيليات وطليها يشق الساق وهما قنبتان لكل زهرة من زهرات السليقة .

٢٢١٧٩ - قُبُ *Pavonia (S).*  
*Pavonie (F). Scarlet mallow (E). Pavonie (D).*  
*Pavonia (I).*

جنس اشجار ونباتات برية وتربيتين من فصيلة الحليزيات. انواعه قليلة العدد، اعطائها البلاد الحارة، جميعها ممررة فراء فناء. اوراقها ابيدة منتنة ، يضيئة او رحيمة النصل، عطرية العرف عند اللس . ازهارها لا قابلية التجميع والاركاناز، طويلة الزناد مخفلة الالوان . ثمارها رباعية الفلق . يزورها مزغبة القشور || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٢١٨٠ - قُبُ *Pavonia semperflores (S). Pavonie toujours fleurie (F).*  
شجرة تربيتية فراء فناء تملو نحو حشرة اثمار . اوراقها سنانية الشكل ، نصلها جامدة الصلصة سنن الزام الاخير . ازهارها متدلية ، كبيرة القد ، حاملة الكيم ، ناشرة الاسدية ، لونها الى الحمرة الفاتحة || ازهاره يستمر طوال السنة .

٢٢١٨١ - قُبُ *Pavonia multiflora (S). Pavonie multiflora (F).*  
جنية تربيتية سرورية تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. ساقها فراء فناء . اوراقها سنانية النصل ، منشورية الحافة، تملو من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض نحو ٦-٨. ازهارها حثولية التجميع ، تاجية الاركاناز ، ارجوانية اللون و كيم ازهارها كثيف الورديات الصبغة الخلية || ازهاره يستمر طوال شهر ايلول .

٢٢١٨٢ - قُبُ *Pavonia mackoyana (S). Pavonie de Mackoy (F).*  
جنية تربيتية سرورية تملو من ١٠ الى ١٢٥ سم. ساقها غليظة فناء . اوراقها كاملة ملسة سنانية النصل خلية المنق . ازهارها خيمية التجميع ، تاجية الاركاناز ، قرمزية اللون . كيم ازهارها خاسي الورديات القليلة الشكل. ازهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢١٨٣ - قُبُ *Pavonia speciosa (S). Pavonie specieuse (F).*  
جنية تربيتية زهنة تملو نحو ٢٠٠ سم. ساقها فراء فناء . اوراقها يضيئة الشكل ، قلبية الفاتحة؛ نصلها سنن الحافة ، مزغب الصفحة السفلى الثراء اللون . ازهارها يتجميعة للظاهر حر الباطن . قطرها نحو ٥ سم. نصلها تعد من ٧ الى ٩ يكتنفها كيم يحمل ذات العدد || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٢١٨٤ - قُبُ *Cannabaceae (S).*  
*Cannabaceae (F). Cannabaceae (E).*  
منهم من جعلها فصيلة نباتية مستقلة ومنهم من قال انها سبط من فصيلة القرصيات || اشهر اجناسها القنب والجنجل .

٢٢١٨٥ - قُبُ *هو القرنيط . اعطيه .*

*Common hemp (E). Echter Hanf, Riesen Hanf (D). Canapa, Canape (I).*

نبات عشبي حولي زراعي ليني صناعي من فصيلة القنبيات. وهو نبات وحيد الجنس والنوع عديد الثروب اشهرها الهندي والجنجل . ساقه منتصبه تملو من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم. اوراقه كفية مركبة ومنعقة. السفل منها متعاقبة والديا متعاقبة . جميعها خاسية او سباعية الورديات الصبغة اللذيذة . نصلها عشن للملس، ازغب الصلصة المنشارية الحافة . ازهاره ثنائية المسكن، الذكورية منها عثودية التجميع اما الانثوية فمسيمة || ثماره فقيرة منتفخة تملو القنز والشهدانج وهي مأكلة بعض الحشرات ويستخرج منها زيت صناعي لا بأس به تبلغ نسبته نحو ٢٢ ٪ || يزود القنب لاستخراج الياث سوه التي تستعمل خاصة في صناعة الاكياس والحبال .

٢٢١٦٦ - قُبُ *هو البتولا المنعقة، اعطيه .*

٢٢١٦٧ - قُبُ *Cannabis sativa gigantea (S). Chanvre géant (F).*  
عرب من القنب منته الحد . ساقه فراء تملو من ٣ الى ٥ اثمار . فروعه اقية فارشة مستطيلة يحمل قطر دوسمة النبات اطول من ارتفاعه || الياث ساقه وفروعه صناعية تستعمل في جدد حبال القنب .

٢٢١٦٨ - قُبُ *هو الرامي ، اعطيه .*

٢٢١٦٩ - قُبُ *هو الجوت ، اعطيه .*

٢٢١٧٠ - قُبُ *هو الابن ، اعطيه .*

٢٢١٧١ - قُبُ *Cannabis sativa indica (S). Chanvre indien, Bang, Hachlach (F). Indian hemp (E). Indischer Hanf (D). Canapa indica (I).*  
عرب من القنب ساقه تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. يزود لاستخراج ما تفرزه النباتات الاثنى من مادة واثنية تكثر في هتاقيدا الزهرية واوراقها العليا يصنع منها والحشيش او الخيشة او والكيف الذي يستعمل لتخفيف ينفذ اسباب ملغنيه ويحلل عقولهم || زراعته محظورة في لبنان .

٢٢١٧٢ - قُبُ *هو القبرية ، اعطيه .*

٢٢١٧٣ - قُبُ *Huppa (F). Crest (E).*  
هي فضل ريش قائم . اعطى قنزعة .

٢٢١٧٤ - قُبُ *هي القبرة ، راجعها .*

٢٢١٧٥ - قُبُ *Arenaria incarper, Strepelis incarper (S). Tourne- pierre incarper, T. vulgaire (F).*

طائر من طوال الاقراطع . صغير القد طوله نحو ٢٢ سم. ثوبه ابيض اللون كثير البياض والازغاف والنداءة للمركبة من الاسود والاحمر || يأنف الشطوط البحرية ، قرنه النشريات والنديان يتلفها بين الحصى . يدن انموصه في الكشيان . حصته تراوح من ٣ الى ٤ يضا .

٢٢١٧٦ - قُبُ *هو ابو منقار ، اعطيه .*



قنب



قنب هندي



قنب الماء



قنب



٢٢٦٨٦ - **قَنْبِيل** \* ، وَّرَس مَلَوَن  
Mallotus (S). Rottlère, Rottlérie (F). Kamela tree (E). Kamelabaum (D). Kamela (I).  
جنس شجيرات برية من فصيلة البتريجات . منبتها المناطق الاستوائية الآسيوية . انواعها قليلة جميعها متوسطة القد . يستخرج من ثمارها صباغ احمر قرميدي مرغوب فيه .



قنبيل

٢٢٦٩٣ - **قَنْح** (F). To bend, To arch (E).  
قنح العود : عطفه حتى يصير كالحصين .

٢٢٦٩٤ - **قَنْدَاش** \*  
Candacus (S). Candace (F). Candacus (E).  
جنس دوبيات بحرية من القشريات مجذبات الاجرل وفصيلة الكلنوسيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الاستوائية والحرارة والمعتلة الحارة .

٢٢٦٩٥ - **قَنْدَاق** \*  
Sucre candie (F).  
هي الابلوج ، اطليه .

٢٢٦٩٦ - **قَنْدَاقَة** \*  
Potologie (F). Potology (E).  
القندقة علم يبحث في المشروبات الرحيحة وفي تراكيبها .

٢٢٦٩٧ - **قَنْدَرُ** \*  
Castor (F).  
هو الحارود ، اطليه .

٢٢٦٩٨ - **قَنْدَرُوس** \*  
Chondrus (S). Chondre (F). Chondrus (E).  
جنس نباتات بحرية من الخليات الحمر . انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اعرف انواعها واشهرها القندروس المنقبض Chondrus crispus (S).  
والشجر Chondrus crispus الذي يستعمل طبيا في معالجة بعض الامراض الصدرية .

٢٢٦٩٩ - **قَنْدُس** \*  
Loutre commune (F).  
هو القنفصة ، حيوان من البرعوييات .

٢٢٧٠٠ - **قَنْدُكِي** \*  
Aesculus (S). Marronnier (F). Horse-chestnut-tree (E).  
جنس نباتات معمرة من فصيلة القندليات . انواعها نحو ١٥ جميعها اشجار وشجيرات وسببات فارشة ، غضة ، حيلة الشكل . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، منقطة ، مركبة ، كثيفة خامسة او سباعية او تساعية الوريقات . ازهارها عقدوية التجميع او عطقية ، مديدة اللونان منها الاصفر والبنديري والوردي والاحمر || اشهر انواعها ما يلي :

٢٢٧٠١ - **قَنْدُكِي حَلَزُونِي** \*  
Aesculus turbinata (S).  
Marronnier à fruit turbiné (F).  
شجرة دائمة فارشة مهداة اليابان تملو من ٢٠ الى ٣٠ م . اوراقها خامسة او سباعية التركيب وريقاتها كبيرة القد ، نصلها خلي السطح السفلي ، سنن الحافة . ازهارها كبيرة القد ، لونها الى البياض الاخضر تملو رقة حراء . ثمارها اجاصية الشكل حلزونية ، قشرها مثاقلة شائكة ، لبها حنطي اللون .

٢٢٧٠٢ - **قَنْدُكِي مَبْدُول** \* ، **قَسْطَل هِنْدِي** \*  
Aesculus hippocastanum (S). Marronnier commun (F). Common horse-chestnut-tree (E).  
شجرة مبدولة دائمة فارشة تملو من ٢٠ الى ٣٥ م . اوراقها خامسة او سباعية التركيب . وريقاتها لا متساوية الطول والعرض ، نصلها مابق الخصار . ازهارها كبيرة القد لونها الى البياض الناصع تملو رقة حراء او صفراء . ثمارها كستنية الشكل والقد قشورها شائكة ، لبها اسمر .

٢٢٦٩٠ - **قَنْشَر** \* ، **قَمْلُ الْحَيْثَان** \*  
Cyamis (S). Cyame, Cyamide (F). Cyamis (E).  
جنس دوبيات بحرية من القشريات العليا وفصيلة القنثريات . انواعها المعروفة قليلة البد : جميعها طفيلية تنشب في جلود الحيتان وفي طيات وروسها وثنايا زعانفها || اجسامها متباينة الاحجام يغلب فيها الصغر ، جميعها بسيطة . قوائمها الصدرية خامسة الازواج ، نشيطة ، تنتهي بمخاط ذرية . قرونها الاستشعارية ثلاثية الفصل . لولاسها رباعية الازواج متغايرة الطول ، شبه انبوية الشكل . اثنائها الى الشبهة او الشقعة .

٢٢٦٩١ - **قَنْشَرِيَّات** \*  
Cyamidae (S). Cyamidae (F). Cyamidae (E).  
فصيلة دوبيات بحرية من القشريات العليا مزدوجيات الاجرل . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة البد : جميعها طفيلية تركب الحيتان || تتميز باجسامها المبطة ولولاسها او لمساتها المتغايرة الطول والجمع . قوائمها الصدرية مجهزة بمخاط مجعد ذرية || اشهر اجناسها القنشر .

٢٢٦٩٢ - **قَنْجُول** \*  
Abacetus (S). Abacète, Astigis (F). Abacetus (E).  
جنس حشرات من فصيلة السلكوكيات ورتبة مفصليات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٤٠ اعطائها بعض مناطق ايلاند الحارة من العالم القديم اغصان افريقية الثالائية وبعض الانواع يعيش في للشرق الافد وفي اوبوية الجنوبية ||

٢٢٦٩٣ - **قَنْجُولَة** \*  
Ferula communis (S). Férule commun, Pameller, Grand fenouil (F). Giant fennel (E). Gemeines Steeukraut (D). Ferula comune, Ferola, Fregola (I).  
نوع من الالانجان ويور نبات عشبي بري معمر مبدول . ساقه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها كثيرة التفرع والتفرع نصلها احضر الصفحة العليا بحري السفلي . جنودها قليلة يستخرج منها بعض الناصر الطبية الصحية النافعة . ويستخرج من ساقه صمغ يدعى الحلتيت لكنه دون الحلتيت الاصلي خواصا ونفعاً .

٢٢٦٩٤ - **قَنْجُولَة** \* ، **بَارْدَة** ، **قَنْسَا** و**سَق** \*  
Ferula ferulago, F. galbanifera (S). Férule bâtarde, Galbanum (F). Galbanum plant (E). Galbanpflanze, Galbenkraut (D). Galbano (I).  
نوع من الالانجان ويور نبات عشبي طيب بري معمر . ساقه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . يستخرج من ساقه عصارة صفمية لزجة تدعى الباربد وتشارق وتعرف عند الصائرين بالوشق تستعمل في الامراض الصدرية وعلاها وهي مضادة للتشنج .

٢٢٦٩٥ - **قَنْجُولَة** \*  
Ferula communis (S). Férule commun, Pameller, Grand fenouil (F). Giant fennel (E). Gemeines Steeukraut (D). Ferula comune, Ferola, Fregola (I).  
نوع من الالانجان ويور نبات عشبي طيب بري معمر . ساقه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها كثيرة التفرع والتفرع نصلها احضر الصفحة العليا بحري السفلي . جنودها قليلة يستخرج منها بعض الناصر الطبية الصحية النافعة . ويستخرج من ساقه صمغ يدعى الحلتيت لكنه دون الحلتيت الاصلي خواصا ونفعاً .

٢٢٦٩٦ - **قَنْجُولَة** \*  
Ferula communis (S). Férule commun, Pameller, Grand fenouil (F). Giant fennel (E). Gemeines Steeukraut (D). Ferula comune, Ferola, Fregola (I).  
نوع من الالانجان ويور نبات عشبي طيب بري معمر . ساقه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها كثيرة التفرع والتفرع نصلها احضر الصفحة العليا بحري السفلي . جنودها قليلة يستخرج منها بعض الناصر الطبية الصحية النافعة . ويستخرج من ساقه صمغ يدعى الحلتيت لكنه دون الحلتيت الاصلي خواصا ونفعاً .

٢٢٦٩٧ - **قَنْجُولَة** \*  
Ferula communis (S). Férule commun, Pameller, Grand fenouil (F). Giant fennel (E). Gemeines Steeukraut (D). Ferula comune, Ferola, Fregola (I).  
نوع من الالانجان ويور نبات عشبي طيب بري معمر . ساقه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها كثيرة التفرع والتفرع نصلها احضر الصفحة العليا بحري السفلي . جنودها قليلة يستخرج منها بعض الناصر الطبية الصحية النافعة . ويستخرج من ساقه صمغ يدعى الحلتيت لكنه دون الحلتيت الاصلي خواصا ونفعاً .

٢٢٦٩٨ - **قَنْجُولَة** \*  
Ferula communis (S). Férule commun, Pameller, Grand fenouil (F). Giant fennel (E). Gemeines Steeukraut (D). Ferula comune, Ferola, Fregola (I).  
نوع من الالانجان ويور نبات عشبي طيب بري معمر . ساقه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها كثيرة التفرع والتفرع نصلها احضر الصفحة العليا بحري السفلي . جنودها قليلة يستخرج منها بعض الناصر الطبية الصحية النافعة . ويستخرج من ساقه صمغ يدعى الحلتيت لكنه دون الحلتيت الاصلي خواصا ونفعاً .

٢٢٦٩٩ - **قَنْجُولَة** \*  
Ferula communis (S). Férule commun, Pameller, Grand fenouil (F). Giant fennel (E). Gemeines Steeukraut (D). Ferula comune, Ferola, Fregola (I).  
نوع من الالانجان ويور نبات عشبي طيب بري معمر . ساقه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها كثيرة التفرع والتفرع نصلها احضر الصفحة العليا بحري السفلي . جنودها قليلة يستخرج منها بعض الناصر الطبية الصحية النافعة . ويستخرج من ساقه صمغ يدعى الحلتيت لكنه دون الحلتيت الاصلي خواصا ونفعاً .

٢٢٧٠٠ - **قَنْجُولَة** \*  
Ferula communis (S). Férule commun, Pameller, Grand fenouil (F). Giant fennel (E). Gemeines Steeukraut (D). Ferula comune, Ferola, Fregola (I).  
نوع من الالانجان ويور نبات عشبي طيب بري معمر . ساقه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها كثيرة التفرع والتفرع نصلها احضر الصفحة العليا بحري السفلي . جنودها قليلة يستخرج منها بعض الناصر الطبية الصحية النافعة . ويستخرج من ساقه صمغ يدعى الحلتيت لكنه دون الحلتيت الاصلي خواصا ونفعاً .



قن مبدولة



قن مبدولة



قن



قن



قندوس



قندل ميلول



قندوس



قندول



قزاق



قنديل

٢٢٧١٠ - قندوكي هندي \* مفتاح Machetes (S).  
Combatant (F). Ruff (E).

مائل وحيد الجنس والنوع من عائلة الطوطيات. وفضيلة  
دجاجيات الارض. طوله نحو ٣٠ سم. بسطته من ٦٠  
الى ٧٠ سم. قوية الى الصعبة اليرقان. تطورها رقطة خطية  
يعوقها اطراف ابيض. الذكر قشري الرأس مقلق السن،  
قلقه مستطيل الريش يتصب عند القتال والباردة.  
مبارزة الذكر تدوم نحو ثمانية اسابيع قتيبت نحو  
الساد وتستمر حتى نهاية الحضانة || الاثني نحو ١٧  
بيضات تحضنها من ١٧ الى ١٩ يوما. تدش عشها في  
للتايع بين الاشباب || قوته الحشرات والديدان والرخويات.

٢٢٧١١ - قندوكي Astragale (F). Astragalus (E).  
في رصع القدام وشم الكعب .

٢٢٧١٢ - قندوكي \* قندوكي \* قندوكي Algetta  
ريش قائم مجتمع على رأس بعض الطيور .

٢٢٧١٣ - قندوس Norme (F). Norm (E).  
القندس ج قندوس . مبدأ يتخذ كقاعدة . او غلط قياسي  
يتخذ كقاعدة .

٢٢٧١٤ - قندوس Aunée (F).  
جنس نباتات عشبية برية معمرة مشهورة باسم رائحة  
أطليها .

٢٢٧١٥ - قندوكي أبيض Aesculus parviflora, Pavia alba (S). Pavier blanc (F).  
شجرة زينة غضة من فصيلة القندليات تملو من متر  
الى خمسة أمتار . اوراقها خالصة التركيب ، وورقاتها  
تطوي نحو ١٩ سم . وتعرض ٧ سم . نصلها يجري اللون ، على  
الصفحة السفلى . ازهارها سنبلية تتجمع لونها الى البياض  
الاخضر . ثمارها كستنية الشكل واللقد مالة القشور .

٢٢٧١٦ - قندوكي أحمر Aesculus pavia, Pavia rubra (S). Pavier rouge (F).  
شجرة زينة برتوية من فصيلة القندليات تملو من مترين  
الى ستة أمتار . اوراقها خالصة التركيب ، وورقاتها  
سنائية ، مسنة الحافة . نصلها جامد الصفحة يطوي نحو  
١٥ سم . ويمرض ٦ سم . ازهارها مفردة تتجمع ، بتلاتها  
حراء اللون ، مهدبة الاطراف . ثمارها كستنية صلبة  
مالة القشور .

٢٢٧١٧ - قندوكي أصفر Aesculus octandra, Pavia lutes (S). Pavier jaune (F).  
شجرة كبيرة دافئة من فصيلة القندليات تملو من ٢٠ الى ٢٥  
م . اوراقها خالصة التركيب . وورقاتها سنائية دافئة ،  
نصلها ارغب الصفحة السفلى ، مسنة الحافة . ازهارها  
مفردة تتجمع ، بتلاتها مهدبة ، صفراء اللون . ثمارها  
كستنية الشكل كبيرة اللقد مالة القشور .

٢٢٧١٨ - قندوس Ciste ladanifera (F).  
هو اللادن الاسباني ، المله .

٢٢٧١٩ - قنديل \* قندوكي \* قندوكي Tragulus (S).  
Tragule (F).  
جنس حيوانات لبونة بجرة . ازهارها حبة جميعها صغيرة  
اللقد ، وشيقة القوام ، فيها من الايل والماغز والارانب .  
طولها من ٥٠ الى ٧٠ سم . علوها من ٢٥ الى ٣٢ سم .

٢٢٧١٣ - قندوكي هندي Aesculus indica (S).  
Marronnier de l'Indus (F). Indian horse-chestnut.  
trees (E).

شجرة هرمية الشكل مملها المثلثين تملو من ٢٠ الى  
٢٥ م . اوراقها لانياسية التركيب منبا الحامية والسباعية  
والسباعية . وورقاتها مستطيلة ، نصلها جامد الصفحة ،  
مسنة الحافة . ازهارها كبيرة اللقد . عنابها هرمية الشكل ،  
تطوي نحو ٥ سم . بتلاتها لا متساوية اللقد لونها الى الازرق  
المزرقين والاصفر او الوردي . ثمارها رنية ، قشورها  
تؤولية حادة الشوك .

٢٢٧١٤ - قندوكي Aesculaceae, Hippocastanaceae (S). Aesculaceae,  
Hippocastanaceae (F). Aesculaceae, Hippocastanaceae (E).

فصيلة نباتية وسيدة الجنس ، عديدة الانواع . نباتاتها  
اجار ونجيرات وجنيات برية وزينة . اوراقها مركبة  
مقابلة . ازهارها غشوية خالصة التركيب والاقسام . صالحة  
الاشدية ، مفردة تتجمع او حذقية او سلبية .

٢٢٧١٥ - قندوس \* Coedus (S).  
Coedous, Synèchère, Orico, Couly (F).

جنس حيوانات لبونة قاصصة من فصيلة الشحميات . انواعها  
١٣ موطنها امريكا الجنوبية || اجسامها غضة مستطيلة  
براح طولها من ٥٠ الى ٧٠ سم . وذانها من ٢٥ الى  
٥٠ سم . رؤوسها عظيمة . مقاصصها قصيرة مقطوعة .  
عنابها عريضة . حوتها وذانها صغيرة . جوامزها متدلة  
اللقد . اطرافها قوية حادة . اذنانها طويلة أعادة . شعرها  
جليبي هدي نغاز يتخلل شوك قصير كاسال تفقه للذخاج  
عن النفس فيند ويطلب حيث يبرز || تألف الثبات  
والاحراج . تسرح في الليل . تسكن الاجار وتستن  
بازنانها للانتقال من غصن الى غصن || قوتها الثار  
والزيمات والاوراق والازهار والجذور ولحاء الاجار .

٢٢٧١٦ - قندوكي \* ذكار شيشعان، عود البوق Spartium spinosum, Cytisus spinosus, Calycotome  
spinosa (S). Cytise épineux, Genêt épineux, Caly-  
cotome épineux, Aspalot (F). Spiny broom, Spiny  
cytisis (E). Stacheliger Ginster (D). Cito spinoso (I).  
شجرة برية معمرة شالكة من فصيلة القريبات . اوراقها  
صغيرة مركبة . ازهارها صفراء اللون صطرة . يكثر وجودها  
في وعر الجبال البنيانية السورية .

٢٢٧١٧ - قندوكي \* عود البوق Eau-de-via (F).  
Brandy (E).  
سائل كسولي يحصل من تقطير الثار بعد تخميرها وهو  
يجري من الكحول ما يراوح حياره من ٤٥ الى ٨٥ درجة  
مئوية وهذا القادر للتساق بالنسبة يمد الى نوع الخروب  
وما يقتضيه من حيار خفيف او متوسط او ثقيل .

٢٢٧١٨ - قندوكي \* Potologique (F).  
Potological (E).  
نعت تمريني يطلق على كل ما له صلة مباشرة بالقتة .

٢٢٧١٩ - قندوكي \* قندوكي \* قندوكي Cryscore (F).  
Sea nettle (E).  
نوع من المموس ، يكثر في البحر الاحمر وعلى جرف شاطئ  
المتوسط . راجع مدوس .

### ٢٢٧٢٥ - قنصور صغير الورق

*Colutea halepica*, C. *Istria* (S). *Bagueaudier microphylla* (F).

جنية برية سرورية مهددة الشرق الاوسط بكثرة وبيوتها من حلب الى سيناء. تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. وريقاتها دقيقة تمد من ٩ الى ١٣ نصلها يطول نحو ١٠ سم. وهو يجري اللون ابيض الصفحة السفلى. ازهارها برتقالية كبيرة القد. سفاتها صغيرة جرابية مطبقة. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

٢٢٧٢٦ - قنطار  
*Quintal* (F).

القنطار العربي العالمي وزن مئة رطل اي الف ويثنى اوقيه او ما يماثلها من الوزن المتري وقدره ٢٥٦ كيلو. اما القنطار المتري فوزنه ١٠٠ كيلوغرام.

٢٢٧٢٧ - قنطير  
*Goura couronné* (F).

هو الهبي المنفوخ، اطليه.

### ٢٢٧٢٨ - قنطريون، قنطارون

*Centaurea* (S). *Centauree* (F). *Centaury* (E).

جنس نباتات عشبية خشبية من فصيلة المركبات. انواعه زهاء ٤٠٠ منها الحولية والمحولة والمصره معظمها بري وبعضها تربسي. اوراقها متعاقبة لا قطامية. قناباتها لا قياسية. ازهارها رؤسية. بزورها عديمة الاغرة مختلفة الاشكال والاحجام. احرف انواعه واشهرها ما يلي:

### ٢٢٧٢٩ - قنطريون اسمر \* ، رأس الدوري

*Centaurea jacea* (S). *Centauree jacie*, *Jacée des prés*, *Chevalon*, *Malon*, *Tête de moineau* (F). *Black centaury*, *Brown ryeed*, *Knapweed* (E). *Weissenfloekenblume* (D). *Giacea*, *G. dei prati*, *Erba della ferita* (I).

نوع من القنطريون البري المعمر. ساقه زهاب فراء تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم. رؤسياته الزهرية عديدة، صغيرة القد ليلكية اللون، قناباتها الى السرة. يكثر في المراعي والزرور فيصبح من النباتات الضارة. جملونه غليظة غزيرة المادة اللبية التي تستعمل في علاجات امراض الدم والخلقوم.

### ٢٢٧٣٠ - قنطريون القفقاس

*Centaurea depressa* (S). *Bleuet du Caucase* (F).

عشبة سرورية حولية تربسية ساقها فراء منذ السبع تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم. اوراقها احليلجية الشكل خلية البشرة. رؤسياتها الزهرية حادة العرف لونها الى الزرق الزاوية تتوصلها الحمرة، قناباتها مائلة الصفحة، مهددة الحنار. اهدائها نفية. ازهارها يستمر من تموز الى آب.

### ٢٢٧٣١ - قنطريون امريكي

*Centaurea americana* (S). *Centauree américaine* (F).

عشبة تربينية سرورية حولية. ساقها مزينة منتصبة قليلة الفروع تملو من ٦٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها سنانية النصل مسننة تملو من ٥ الى ١٣ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥ سم. رؤسياتها الزهرية فردية تتجميع حادة العرف قطرها يراوح من ٥ الى ١٠ سم. لونها الى الزرق او الحمر. قناباتها مهددة الحنار. ازهارها يستمر من ايار الى آب.

### ٢٢٧٣٢ - قنطريون بابل

*Centaurea babylonica* (S). *Centauree de Babylone* (F).

عشبة تربينية سرورية محولة. ساقها مجنحة تملو من ٢٠٠

ورويها مستطيلة جهاء. اذناها قصيرة عريضة منتصبة. قناباتها دقيقة. اخلاها اربعة. اذناها مرتفعة كاذناب. لئامز. صفها خلل نام المس. انبواها الى الصلبة المتخللة المشعة والمواج. مهددة فصح الاربعاء عند من سرتنيد واهند الى الصين. تألف النابات الجبلية الرطبة. قربها الاشباب. تيش جماعات قليلة العدد. اجلها يتألف من ٤ او ٥ اناث يقودها ذكر واحد.

### ٢٢٧٣٠ - قنصور \* ، قنوتة

*Colutea* (S). *Bagueaudier*, *Colutea*, *Faux séné* (F). *Bladder-senna tree* (E). *Baumartiger blasenstrauch*, *Gewöhnlicher blasenstrauch* (D). *Colutusa*, *Cantamaggio*, *Saluno*, *Sena falsa* (I).

جنس نباتات برية طيبة معمرة من فصيلة القرقيات الفراقية. انواعه عديدة، جميعها جنات صغيرة أو متوسطة القد. اوراقها متعاقبة مركبة تشبه اوراق السناء. ازهارها عقدية والتجميع وحمورية الازتكاز، صفراء اللون. ثمارها سنقات منتصبة مثانة الشكل. احرف انواعه واشهرها ما يلي.

### ٢٢٧٣١ - قنصور اسود الكيم

*Colutea melanocalyx* (S). *Bagueaudier à calice noir* (F).

جنية سرورية مبلولة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها مركبة كبيرة وثرية العدد مؤلفة من ٩ او ١١ وريقة بيضية الشكل، نصلها خلل الصفحة السفلى. ازهارها صفراء اللون صغيرة القد قطرها نحو ٢ سم. اكائها زهاب البشرة زهاب اسود اللون. سفاتها متوسطة القد تطول نحو ٦ سم. وتعرض نحو ٣. ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

### ٢٢٧٣٢ - قنصور الشرقي

*Colutea orientalis* (S). *Bagueaudier d'Orient* (F).

جنية سرورية مبلولة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها سباعية أو تساعية الورقيات. نصلها بيض الشكل، يجري اللون يطول من ١٠ الى ١٥ سم. ويعرض من ٧ الى ١١. ازهارها الى الجفوة يطولها تمحيج اسفر. سفاتها تطول نحو ٤ سم. لونها الى الخضار الموشح بالبنيجي. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

### ٢٢٧٣٣ - قنصور الحمر

*Colutea persica* (S). *Bagueaudier de Perso* (F).

جنية سرورية تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. وريقاتها صغيرة القد، حادة العرف، خلية الصفحة السفلى. ازهارها الى الصفرة الزاوية يطولها تقيج اسمر. سفاتها متوسطة القد شدقة الطرف. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

### ٢٢٧٣٤ - قنصور شائع

*Colutea arborescens* (S). *Bagueaudier commun*, *Arbre à vessies*, *Balsadrier* (F).

جنية سرورية مبلولة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها وثرية الترتيب مركبة من ٧ الى ٩ وريقة احليلجية الشكل تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥. نصلها يجري الصفحة السفلى متلاحق المروق. ازهارها الى الصفرة البرتقالية. سفاتها متدلية مطبقة تطول نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٣. ازهارها يستمر من ايار الى تموز.



قنصور



قنطريون اسمر

Blue-bottle, Corn-flower (E). Kornblume, Kornflockenblume (D). Ciano, Battesegola, Fioraliso, Fioralino (I).

عشبة سرولية برية برية طيبة وتزيينية. ساقها منتصبة فرعها زياة تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم. أوراقها الجذعية خطية. ورؤسائها الزهرية زرقاء اللون مدامه العرف. قناباتها حناكية النصل صر الحنار || كانوا يمترونه نيا مضى من انتفج عذجات العين والبصر. انفراده يستمر من ايار الى ايلول.



قَطْرُونٌ صَيفِي

**٢٢٢٣٩ - قَطْرُونٌ قَنْزَل (S). Centaurea fenzi (F).**  
Centauree de Fenzl (F).  
عشبة تزيينية سرولية عمو. ساقها قليلة الفروع تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. أوراقها بيضيه الشكل، قلبية القاعده، مجنحة المت، ورؤسائها الزهرية فردية التجميع، كبيرة القد، صفراء اللون، مدامه العرف. قناباتها الى البيضاء الناصع || انفراده يستمر طوال الصيف.

**٢٢٢٤٠ - قَطْرُونٌ قَيْصَمِي الرَّق (S). Centaurea rutaeifolia (S).**  
Centauree à feuilles de rue (F).  
بجلة برية وتزيينية عمرة. ساقها فرعا منتصبة تملو نحو ٩٠ سم. أوراقها كبيرة القد فيجبة الشكل بالة الخضري. ورؤسائها الزهرية كثيرة العدد صغيرة القد ودية اللون. قناباتها مهدبة الحنار. احداها سود قاسية || انفراده يستمر طوال فصل الصيف.



قَطْرُونٌ عَنَبِي

**٢٢٢٤١ - قَطْرُونٌ قَصِيرَة السَّاق (S). Centaurea scabula (S).**  
Centauree acaule (F). Centaury (E). Flockenblume (D). Centaurea (I).  
نوع من القَطْرُونِ البري وهو نجمة جعقة الساق فرعا تملو من ١٠ الى ٢٠ سم. أوراقها قرصية طرحة الارنكاز، صغيرة القد، سنانية النصل الحبل البشرة. ورؤسائها الزهرية فردية، زرقاء اللون، قناباتها حنطية || يكثر في المراعي والبرود يقال ان مصاربه جلوده نافعة تنقي المعدة وتنشط الدم.

**٢٢٢٤٢ - قَطْرُونٌ كَبِير \* ، عَرَطَب (S). Centaurea centaurium (S).**  
Centauree officinale, C. commune, Grande centaurée (F). Great centaury (E). Grosse Flockenblume, Tausendgüldenkraut (D). Centaurea maggiore, C. comune, Fiele di terra (I).  
نوع من القَطْرُونِ الطبي البري الممر. ساقه فرعا تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. أوراقه كبيرة سنانية سلتة. رؤسائها الزهرية عديدة حنطية القد زرقاء اللون || يكثر في الاراضي الجبلية الملحاح. بطوره عطرية، حامزة الطعم، مرة اللذاق، عديدة الفوائده الصحية المعقوية المنبهة الماددة الاثر الرجي.



قَطْرُونٌ كَبِير

**٢٢٢٤٣ - قَطْرُونٌ مِسْكِي (S). Centaurea moschata (S).**  
Centauree ambrette, Ambrette, Barbeau musqué (F).  
نات تزييني سرولي حولي. فروعه واصرامه عديدة. ساقه فرعا تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه سنانية الشكل صغيرة القد. رؤسائها الزهرية ذكية العرف الطعري، كبيرة القد، عذبة اللوان التي تختلف مع للضروب والاصرام || انفراده يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

الى ٣٠٠ سم. أوراقها الجذعية حنطة رجيحة. نصلها جامد الصلحة. أوراقها العليا رباعية صغيرة القد حناكية الصلحة السفل، ورؤسائها الزهرية كثيرة العدد، كبريتية اللون، مدامه العرف. قناباتها نجيلة مهدبة بالاسمر || انفراده يستمر من تموز الى ايلول.

**٢٢٢٣٣ - قَطْرُونٌ بَهْمَن \* ، بَهْمَنُ اَيْفِس (S). Centaurea behen (S).**  
Centauree blanche, Béhen blanc, Rhapsotic blanc (F). White behen, White rhapsotic (E). Weisses Behen (D). Behen bianco (I).  
عشبة سرولية برية بلبه تكثر في الحقول وفي الاراضي الملحاح. ساقها زياة منتصبة فرعا تملو نحو ٧٠ سم. أوراقها مزفرية البشرة على صفتها، زغبها لبد التجميع ابيض اللون، ورؤسائها الزهرية قرصية اللون صفر المواج. قناباتها ضيقة مستطيلة، عديدة الملاحق || يقال ان قوائده الصحية جليلة اعصها التنشيط لانه مقر ناض وقد يستعمل في التوابل.

**٢٢٢٣٤ - قَطْرُونٌ دَلْمَاسِي (F). Centaurea ragusina (S).**  
Centauree de Dalmatie (F).  
بجلة تزيينية عمرة. ساقها منتصبة سرعة مدامه الفروع تملو من ٥٠ الى ٧٠ سم. أوراقها ريشية فضية اللون. ورؤسائها الزهرية قليلة العدد ملحية اللون بمراء المراج. قناباتها بيضيه الشكل مالمه الصلحة مهدبة الاطراف. انفراده يستمر من حزيران الى تموز.

**٢٢٢٣٥ - قَطْرُونٌ رَيْشِي (S). Centaurea phrygia (S).**  
Centauree plumbeuse (F).  
بجلة تزيينية عمرة ساقها فرعا تملو نحو ٧٥ سم. أوراقها اهلجية النصل، حنار منشاري التسنين. ورؤسائها الزهرية صغيرة القد طرها نحو ٣ سم. لونها الى الحمرة البنفسجية المراج، قناباتها ريشية انفرغص حنطية اللون، سرد الملاحق || انفراده يستمر من تموز الى آب.

**٢٢٢٣٦ - قَطْرُونٌ شَرُوفِي (S). Centaurea cineraria (S).**  
Centauree cinénaire (F).  
جنبة سرولية تزيينية عمرة فروها واصرامها عديدة. ساقها فرعا تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. أوراقها كثيرة التفصيص والتفرغص، حلية البشرة، فضية اللون. ورؤسائها الزهرية حنطية القد والحنار لونها الى الصفار المذهب. قناباتها حنطية اللون والحنار المذهب || انفراده يستمر من تموز الى آب.

**٢٢٢٣٧ - قَطْرُونٌ صَبِير \* ، مَرَاةُ الْخَشَش (S). Erythraea centaurium, Chironia centaurium, Gentiana centaurium (S).**  
Erythraea centaurée, Petite centaurée, Herbe à la fièvre (F). Earth-gall, Feverwort (E). Echtes Tausendgüldenkraut (D). Centaurea minore, Biondella, Caccia-febbra (I).  
نبات عشي طبي ممر من فصيلة الجلبانيات. يكثر في البرود. ساقه قصيرة فرعا تملو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقه لاطنة متعاقبة رجيحة النصل، انفراده حنطية التجميع هامة الارنكاز ودية اللون || يستعمل في الطب لملاج بعض الحميات ولطرد الديدان المعوية.

**٢٢٢٣٨ - قَطْرُونٌ عَنَبِي \* ، لُرُنْشَاه (S). Centaurea cyanus (S).**  
Bleuet, Bluet, Aubifoin, Barbeau bleu, Casse-lunettes (F). Bachelor button,

## ٢٢٧٤٤ - قَنْطَرُونٌ مُعَمَّرٌ \*

Pytho (S).

Pytho (F), Pytho (E).

جنس شجرات من فصيلة القنطريئات ورتبة غديات الاجنحة. انواعها الممرقة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق الصنوبريات || اجسامها مستطيلة الشكل ، مبططة ، تطول من ٨ الى ١٠ سم. رؤوسها معتدلة الجسم ، عيونها بارزة. تأثيرها وعلامتها ضليمة. قرونها الاستشعارية غليظة. كواسلها محصورة. اتحادها لاسفة. قوائمها نشيطة. الاطراف ملونة بكثر فيها البنفسجي الاسود المواجه || يكثر وجودها تحت غطاء السرو والشرين حيث تخفي فصل الشتاء .

*Centaurea montana* (S). *Centaurea vivace*, *Bluet vivace*, *Barbsau vivace* (F).

نبات ليفي ترابي ممر شكل. ضروب واصراره عديدة ساقه فرعاء زياه تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه سنانية، نصلها سرح الصفحة العليا عناكبي السلسل. رؤوساته الزهرية كبيرة القد ، حافية الزرقة. قناباتها سود الاهداب || انزهاره يستمر من ايار الى آب .

## ٢٢٧٤٥ - قَنْطَرُونٌ تَجْمِي \* و مَرَاكِر

*Centaurea calcitrapa*, *C. stellata* (S). *Centaurea étoilée*, *Chausse-trape*, *Chardon étoilé* (F). *Caltrop*, *Mouse-thorn*, *Star thistle* (E). *Calcatrapa*, *Sternflockenblume* (D). *Calcatraps*, *Calcatrappola*, *Cardo stellato* (I).

حشبة برية محولة تكثر في البرر والمراعي وعلى حافة الطرقات ، جذورها مأكولة نافعة طعمها كطعم الارضي شوكي .

## ٢٢٧٤٦ - قَنْطَرُونٌ وَحِيدُ الزَهْرَةِ

*Centaurea uniflora* (S). *Centaurea uniflora* (F). برية ورتبية ممرية . ساقها فردية زياه تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها حاصنة ، سنانية الشكل ، مستديرة القاعدة ، ثنائية الاذنيات . رؤوسها الزهرية ودية، قطرها ٣ سم. لونها الى الحمرة القرمزية . قناباتها مفرقة حنطية اللون || انزهاره يستمر من تموز الى آب .



قنطرون ممر

## ٢٢٧٤٧ - قَنْطَرُونِيَّات \*

Pythidae (S).

Pythidae (F), Pythidae (E).

فصيلة شجرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها الممرقة قليلة العدد منتشرة في بعض حراج البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، مبططة ، تطول من ٨ الى ١٠ سم. رؤوسها معتدلة الجسم . ميوها بارزة. تأثيرها وعلامتها ضليمة. قرونها الاستشعارية غليظة مركبة من ١١ فصلة . كواسلها محصورة . اتحادها لاسفة. قوائمها نشيطة. ارساغها خماسية العقل باستثناء الزوج الخلفي الرباعي العقل . اطرافها ملونة || تعيش تحت غطاء الصنوبريات اخصها السرو والشرين || اشهر اجناسها القنطريث .

## ٢٢٧٤٨ - قَنْطَرُونَكَ ، قَنْطَرُونِيَّة

*Centaureidum* (S). *Centaureide*, *Xanthisme* (F). *Centaureidum* (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى شبيه بالقنطريون . جنس نباتات حولية ومحولة . برية وزراعية تزيينية من فصيلة المركبات الشعاعية . منبتها بعض اصقاع امريكية الشمالية. ضروبها التزيينية شائعة الاستعمال الحدائقي || سوقها عقالية ، فرعاء . اوراقها متعاقبة ، ضيقة النصال . انزهارها طرفي الارتيكانز . ازهارها شعاعية ، فردية ، كبيرة القد ، بنفسجية اللون او سمجنجية ، عطرية العرف المحمود .

le Centaure (F).

the Centaure (E).

## ٢٢٧٤٩ - قَنْطَرُونُ

كوكبة نجوم جنوبية المرقع مركزها تحت برج الدبزه. وهي تمثل صورة حيوان خرافي مقدس مقدم انسان من رأسه الى آخر ظهره. اما مؤخره ، من منشأ الظهر الى الذنب ، فؤخر فرس . ويهجه الى المشرق وذنبه الى المغرب . ويده شراخان وقد قبض بيده الاخرى على يد السبع || عدد نجومها ٣٧ بعضها من المرتبة الاولى والثانية والثالثة . والمرب تسمي النير الذي على بطن قنطروس « بطن » والنير الذي على حافر يده اليسى « حصار » . والنير الذي على يده الاخرى « الوذن » . والمخضار والوزن هما اللذان يسميان « الخلدن » .

## ٢٢٧٤٩ - قَنْطَرُونَكَ إِجْصَافِيَّةُ الْوَرَقِ \*

*Cantua pyrifolia* (S).

*Cantua à feuilles de poirier* (F).

نوع من القنطرة تزود قنطرين . ساقها كثيرة الفروع النصبية ، تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها كاوراق الاجاص . نصلها جيلة اخضار الاسفر المواجه . انزهارها عتيق التجميع القيد . انزهارها معتقة ، يضاء اللون ، صفراء المواجه . محبنة النديجات مستطيلة الاسدية البالغة التثتوز || تنويرها يستمر من آذار الى حزيران .

## ٢٢٧٥٠ - قَنْطَرُونَكَ بَقْسِيَّةُ الْوَرَقِ \*

*Cantua buxifolia* (S). *Cantua à feuilles de buis* (F).

نوع من القنطرة ، تزود قنطرين . ساقها فرعاء تملو من متر الى مترين . اوراقها كاوراق البقس . نصلها جيلة اخضار الاسفر . انزهارها عتيق التجميع . انزهارها معتقة معتدلة حرار اللون ، صفراء التويج تطول نحو ٦ سم. || تنويرها يستمر طوال شهر نيسان .



قنطرون نجمي



قنطرون

Xanthusidae (S).

Xanthusidae (F), Xanthusidae (E).

فصيلة حيوانات زساق من رتبة الطائيات قابيات الاسنان. اجناسها الممرقة ثلاثة وانواعها خمسة . تطول بعض مناطق امريكية الوسطى وكليفيونية || اجسامها مبططة من ٨ الى ٢٥ سم. رؤوسها شبه محرمة الشكل . اسنانها صغيرة كثيرة

السرة المابقة || قُتَبًا رقيق الأزار . الاثنى اكبر قدًا من الذكر . تمتع الممكن على بطون الزناير والجنادب .

#### ٢٢٧٦٢ - قُتَبِيَّات \* Conopidae (S).

Conopidae (F). Conopidae (E).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . جميعها مقترية || قُتَبًا رقيق الأزار || اجسامها بيانية المجرد ، طول من ٣ م الى ٤ م . رؤوسها مسطحة ، نافرة الأوتاع . اعطائها مرقية . حورتها كبيرة . قُتَبًا الاستعارية لاقحية الطول ورصد النصل . وراثتها مستطيلة و فيقة . صدرها معتدلة . بطونها مستطيلة . اجسامها عريضة او حلقة التشار ، خلفها شديد القصر || انثاها اكبر قدًا من ذكورها . مكها شديد الصغر مستطيل الشكل . يمتصه الاناث على بطون الزناير والنسوح والجراد والجنادب فينتفخ عن يرقات دقيقة تنقب قشار بطن المائل فتدخله وتمش كمثل حياتها البرقية التي تنتهي مع حياة المائل || اشهر انواعها القنعة المذهبة والمزرة والقفار .

#### ٢٢٧٦٣ - قُتَعَر Conopidae (S).

القنعر : شجر مثل الكبر الا انما اغلق شوكا وودًا وثمرتها كثرته ولا ينبت في الصخر . حكاة ابو حنيفة .

#### ٢٢٧٦٤ - قُتَشَاشَة \* Cryptops

جنس دويبات من فصيلة القنقاشات . انواعها المرفقة ٦ اجسامها مركبة من ٢١ حلقة تحمل ٢١ زوجًا من الجرازم . ج قنقش .

#### ٢٢٧٦٥ - قُتَشَاشِيَّات \* Scolopendridae (S).

Scolopendridae (F). Scolopendridae (E).

فصيلة دويبات من السحاشيات القنقشيات الاربيل . اجناسها وانواعها كثيرة العدد اشهرها القنقشة وام اربع واربعين (الحريش) .

#### ٢٢٧٦٦ - قُتَشُج Diotis

maritima, D. candidissima (S). Diotides argentea, Herbe blanche (F). Cotton weed, Sea cud-weed (E). Silberzwelehr (D). Santolina maritima (I).

نبات شجري بري معمر ويسود الجلس والزرع من فصيلة المركبات . منبتة السواحل البحرية . ساقه افراء زياء تلو من ١٠ الى ٥٠ سم . زيتها مستطيل القدر قطعي الشكل . اوراقه متعاقبة لائفة ، نصلها اعليجي الصفة . مقطوع القاعد ، خلي البشرة . رويته الزهرية عديدة صفراء اللون ، قنابا جرمي الشكل ، ترمجها اسفنجي النسيج . بزورها مضطربة عادة الجناح والاذراع || انثراها يستمر من حزيران الى ايلول .

#### ٢٢٧٦٧ - قُتَد \* Diotis

كتيبة الشوك ، اُنشد حَسْبَكَة ، ذالغ ، ذرام ، كَبْكَب ، كَبْكَب الشوك ، لَشْطَة ، مِيلِج .

Erlinaceus (S). Hérisson (F). Hedge hog, Urchin (E). Igel (D).

كينة ابو صفيان وابو الشوك والاثنى لم دلال ج قناذ ويقال لها الصاص || جنس حيوانات لينة ناعمة من آكلات الحشرات صغيرة القدر طولها يراوح من ١٦ الى ٣٠ سم . بطونها من ٧ الى ١٢ م . اجسامها مسطحة بغطاء من الشوك يكتنفها بكاملها دون الرأس والفتق والبطن والجرازم . قُتَبًا الحشرات والقنار والحرد والمظاء والحيات

العدد . انثها قصيرة منها المألوسة ومنها المظلمة . حورتها صغيرة ، سراجها لامتحركة . قوتها معتدلة الطول . رؤوسها وطيها حرشية القشار . ظهورها مغلقة . انثها الى الركة السراء .

#### ٢٢٧٦٨ - قُتَشَاب Physoccephalus

rufus (S). Physoccephalus rufus (F). حشرة من فصيلة القنقشيات . جسمها متوسط القدر ، بطول من ٨ الى ١٢ م . رأسها مستطيف ، اصفر اللون . جنبها وبصرها جملة بالاسود . عظمها معتدل القدر . عينها كبيرة ، مرجانية . زباناها مستطيلان . اصفران . رؤسها مستطيلان و ضيقان ، تملوها مشقة صناعية في النطر الاسامي . صدرها قنسي الشكل ، اصفر اللون ، حطلي الموج . بطنها قنسي الشكل ، اشجع اللون ، مجلج بالاسود . قوتها الى الشقة السراء || قُتَبًا المفسر ثرشفه من ازارها فصيلة المركبات || تمتع الاثنى مكها على بطون الثنائ والقنقشيات فينتفخ عن يرقات تنقب بطون الموائ وتدخلها وتمش فيها حتى الاكمال .

#### ٢٢٧٦٩ - قُتَعَار Tragelaphus

gratus (S). Tragelaphus des marais (F).

نوع من الجمل كير الجلة بقدره قدر القنيس لكنه اصغر قرنا واعين ثوبًا واسجى اخلاقًا . يتميز باستعانة واتساع انظاره الى تحول دون غوصه في امال ورمال المتناقص . مولده فسح الارباء تمتد من الكامرون الى النابون . يعيش قرب الماء يرتاد المتناقص في الليل والناهار .

#### ٢٢٧٧٠ - قُتَعَة Regard

(F). Look (E).

الكرة في الحائط .

#### ٢٢٧٧١ - قُتَعَة مَذْهَبَة Conops

flavipes (S). Conops doré (F).

حشرة من فصيلة القنقشيات . جسمها متوسط القدر ، بطول نحو ١٠ م . رأسها كبير ، شبه هرمي الشوزن ، ملعب اللون ، يملو في النافوخ والجهة زركشة سوداء . عظمها معتدل الجرم ، مرقتي الشكل . عينها كبيرة ، كستنائية . زباناها مستطيلان ، اشحاش . رؤسها مستطيلان ، ضيقان ، تملوها مشقة صناعية في النطر الاسامي . صدرها قنسي الشكل ، تملو لفتخان حادتي الازنكار . ذبيبا اللون وطوق ضيق ملعب . بطها الى الجلوة الرصاصية الموج تملو ثلاثة اطواق ذبيبة الخضاب . قوتها الى الشقة . اغناها مسطوقة الاطراف بالاسود || تمتع الاثنى مكها على بطون الطنائ والعداس والزبور فينتفخ الممكن من يرقات تنقب بطون الموائ وتدخلها وتمش فيها حتى الاكمال .

#### ٢٢٧٧٢ - قُتَعَة مَزْرَرَة Conops

quadrifasciatus (S). Conops bandé (F).

حشرة من فصيلة القنقشيات . جسمها بطول نحو ١٢ م . رأسها كبير ، شبه هرمي الشوزن ، اصفر اللون اسود الجمية . اصفر النافوخ . عظمها مرقتي مستطيل . عينها كبيرة كستنائية . زباناها مستطيلان اصفران . رؤسها ضيقان ، صدرها قنسي الشكل ، حديدي اللون ، يملو زوجان من القنقش الصفرة والبيضاء . بطها الى الصفرة الصناعية الموج تملوها اربعة اطواق سود : قوتها الى



قُتَبَا



قُتَشَاشَة



قُتَد

٢٢٧٧٨ - **فُقُولَةُ الْبَحْرِ** \* ، **شَيْتَمُ بَحْرِي**  
Diodon (S), Hérissou de mer (F), Sea-urchin (E).  
جنس سمك بحري شائك من فصيلة الفهقيات ورتبة  
لمحومات الفكوك. أنواعه نحو ٤٠ معظمها من سمك بحار  
البلاد الحارة . مقدمها يشبه مقدم القنفذ || قوتها  
الحشرات والمرجان . لحمها مؤذية وله تكون سامة .

٢٢٧٧٩ - **فُقُولَات**  
Erinacidae (S).  
Erinacidae (F), Erinacidae (E).  
فصيلة القنافذ من الحيوانات البرية ورتبة الحشرات أي  
آكلات الحشرات .

٢٢٧٨٠ - **فُقُولَةُ** هي الآفة ، اطبا ، ج قنقش .

٢٢٧٨١ - **فُقُولُ** \*  
Acomys  
جنس دويبات لبونة قاضية من فصيلة الفأريات. أنواعه  
١٦ موطنها أفريقية الشرقية والجزيرة العربية وفلسطين .  
أجسامها صغيرة القد مستطيلة تحمل في مؤخر ظهورها  
خطوطاً من الحب اللبيل الشائك . تألف القفر. قوتها  
الحشرات والورغ والحبوب والجذور || أحراف أنواعه  
وأشهرها قنفعة القاهرة والقنفعة المصرية .

٢٢٧٨٢ - **فُقُولَةُ الْقَاهِرَةِ**  
Acomys cahirinus (S).  
Acomys du Caire (F).  
موطنها مصر السفلى . حجمها حجم الفأرة . ثوبها بلون  
الرميل . بطنها أبيض . ذنبها قصير . أذناها كيرتان .

٢٢٧٨٣ - **فُقُولَةُ مِصْرِيَّة**  
Acomys dimidiatus (S).  
Acomys de l'Égypte (F), Spiny mouse (E).  
موطنها مصر وفلسطين والجزيرة العربية . ثوبها بلون الرملي  
يسمى عند الظهور ويبيض عند الصدر والبطن . طولها نحو ١٢  
سم . وذنبها ٨ سم . أذناها كيرتان || تألف القفار  
والتياني .

٢٢٧٨٤ - **فُقُولُ**  
Chèvre (F), Goat (E).  
المز السمين الفخمة .

٢٢٧٨٥ - **فُقُولُ** \*  
Gomphosus (S).  
Gomphosus (F).

جنس سمك بحري من شائكات الزعانف وفصيلة الكيديات.  
أنواعه المعروفة أربعة أصلها المحيط الهندي || أجسامها  
أحليجية الشكل ، مستتلة البطيخ ، تحمل من ١٧ إلى  
٢٣ سم . أنوثها تراوح بين السمرة والجودة الزينية الموج .  
بطنها أبيض كثيراً من ظهورها . زعانفها مبلقة بالأصفر  
والأسود . رؤوسها صغيرة ، غروية الشكل ، مستطيلة  
الخطم . حيوتها ماهرة . زعانفها الظفورية مستطيلة . زعانفها  
الذيلية مستعرضة ، محدودة الأطراف العليا والسفلى بمناخس  
غضروفية لينة || غوتها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٢٢٧٨٦ - **فُقُولُ**  
Canavalia (S), Canavale (F).  
جنس نباتات برية وزراعية ، حارشة أومدانة ، من فصيلة  
القرنيات . أنواعه المعروفة نحو ٢٥ جميعها من نباتات  
المنطق الحارة والأمريالية الآسيوية والأفريقية . أرواقها  
مركبة ثلاثية تشبه أرواق الفاصوليا . أثمارها عقدية  
التجميع ، محورية الارتكاز . ثمارها قرون كبيرة القد ،  
مديدة الحب ، ثنائية الجناح الدرزي || أشهر أنواعه  
الزراعية ما يلي .

وهي مولة بالتمام إلا في لا تأثر بسها . ترح في  
الليل وترقد في النهار وهي في وقادها تنقبض وتتكور فتبدو  
ككرة من الشوك . الأثر أكبر حجماً من الذكر تنصع  
من ٣ إلى ٨ جراء تنصر اللور بعد وضعها بأربعة أسابيع .

٢٢٧٨٨ - **فُقُولُ**  
Erinaceus auritus (S).  
Hérissou oreillard (F).  
موطنه العراق والأناضول وسورية ولبنان . جسمه يطول  
نحو ٢٩ سم . ويملو نحو ١٢ سم . أذناه كيرتان .  
خطمه وجرازه مستطيلة . شوكه أبيض القاعدة اسمر الجرم  
أصفر الطرف يطول نحو ٣ سم .

٢٢٧٨٩ - **فُقُولُ أُرُوبِي**  
Erinaceus europaeus (S).  
Hérissou d'Europe, Echinus (F).  
موطنه أوروبا . جسمه يطول نحو ٣٠ سم . ويملو ١٥ سم .  
خطمه يشبه قنفصة الخنزير . عتقه قصير . أذناه صغيرتان .  
شوكه اسمر الجرم أبيض الطرف يطول نحو ٣ سم .

٢٢٧٩٠ - **فُقُولُ الْمَغْرِب**  
Erinaceus algirus (S).  
Hérissou algérien (F).  
موطنه أفريقية الشمالية من مراکش إلى طرابلس الغرب .  
جسمه يطول نحو ٢٢ سم . بطنه حنطي اللون . شوكه فضي  
القاعدة ، أصل الجرم ، أسود الطرف ، يطول نحو ٢٥ سم .

٢٢٧٩١ - **فُقُولُ السَّمَل**  
Echidné (F).  
هو النضاض ، أصله .

٢٢٧٩٢ - **فُقُولُ حَبَشِي**  
Erinaceus aethiopicus (S).  
Hérissou abyssin (F).  
موطنه الحبشة وجورجيا . جسمه يطول نحو ١٨ سم .  
بطنه اسمر اللون . شوكه أبيض القاعدة مضلع الجرم  
الأسمر ، أسود الطرف ، يطول نحو ٢٥ سم .

٢٢٧٩٣ - **فُقُولُ سُكْرِي**  
Erinaceus megalotis (S).  
Hérissou à longues oreilles (F).  
موطنه الأفانان ، جسمه كبير القد يطول نحو ٣٠ سم .  
أذناه كيرتان وذنبه كذلك . شوكه اسمر اللون يطول نحو  
٣ سم .

٢٢٧٩٤ - **فُقُولُ طَوِيلُ الشَّوْكَةِ**  
Erinaceus macrocanthus (S).  
Hérissou à longs piquants (F).  
موطنه البحر والأفانان والكرديستان . جسمه متوسط القد يطول  
نحو ٢٤ سم . أذناه كيرتان ذلقتان . شوكه أبيض الجرم ،  
أصعب الطرف ، يطول نحو ٤ سم .

٢٢٧٩٥ - **فُقُولُ بَطْنِي**  
Erinaceus albiventris (S).  
Hérissou à ventre blanc (F).  
موطنه أفريقية الشرقية والجنوبية من مصر والسودان وسائر  
المرتديك . جسمه يطول نحو ٢٥ سم . بطنه أبيض  
اللون . شوكه إلى الصبهة يطول نحو ٢٧ سم .

٢٢٧٩٦ - **فُقُولُ مَطْوِق**  
Erinaceus collaris (S).  
Hérissou à collier (F).  
موطنه الهند والسند والبنجاب . يرغب في التلياني والصمغاري  
الزيلة . جسمه اسمر اللون يطول نحو ١٨ سم . عتقه مطروق  
بالأبيض . شوكه اسمر الجرم ، أسود الطرف ، يطول نحو  
٢٨ سم .

٢٢٧٩٧ - **فُقُولَةُ**  
Hérissoune (F).  
She-hedgehog (E).  
أنثى القنفذ .



قنفذ البحر



قنقش



نفوس

## ٢٢٧٨٧ - قُفُول بَايز ، قُفُول هِنْدِي

Canavalia gladiata (S). Canavalle en glaive, Pois d'inde (F). Jamaica horse-bean (E). Kanavalbohne (D). Dolico Indiana (I).

نوع من القفول الزراعي. منته البلاء الاستوائية والحارة وهو قريب الشبه من النوع السنّي. يتميز بإزهاره الخمر وقرنه الجمالة كصعل الخلدوم وجهه الخشن اللون الاسمر المزجج. خواصه لا تختلف من خواص السنّي وهو مأكول مثله.

## ٢٢٧٨٨ - قُفُول سَبِيّ ، قُفُول سَبِيّ

Canavalia ensiformis (S). Canavalle ensiforme, Haricot-sabre, Pois-sabre (F). Sword-bean, Jack-bean (E). Kanavalbohne (D). Canavalia (I).

نوع من القفول وهو نبات زراعي مأكول البأر كالقوياء والفول. منته البلاء الحارة. يعيش من ٣ إلى ٥ سنوات. ساقه عارضة ملتفة. أوراقه كبيرة. وريقاتها بيضيه ذلقة، نصلها جلدي الصفرة. أزهاره جزئية اللون. مغنونة التجميع. مستطيلة المالحق. ثمارها قرون متدلية، مقوسة كالسيف طول نحو ٣٠ سم. وتقرض ٣ سم. تنفث من ٨ إلى ١٢ حبة كبيرة القند مفلطحة الشكل يضاء اللون أو وردية. قرونه الخضراء تستعمل استعمال القوياء وهي لذينة العلم جيدة الصنف. حيوية مأكولة، غزيرة المواد الغذائية، تحوي ما تحريه وقدره:

مواد ازوتية	٢٥,٦٢ ٪
مواد دهنية	٢,٣٢ ٪
مواد هيدروكربونية	٤٧,٩٤ ٪

## ٢٢٧٨٩ - قُفُور \*

Macropus (S). Kangourou, Kangaroo (F). Kangaroo (E).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة القفريات ودية الجرابيات، أنواعه ستة، موطنها أستراليا، قوتها الاضباب. تتميز بفعر اليدين واستطالة الرجلين والذنب. تألف النباتات والورج تعيش بجاعات صغرية يقودها فضل من.

## ٢٢٧٩٠ - قُفُور مَسْكُوق \*

Dendrolagus (S). Dendrolagus (F).

جنس حيوانات لبونة جرابية من فصيلة طواي الأربيل. أنواعه المعروفة أربعة موطنها أستراليا وغينيا الجديدة. اجسامها شبيهة بأجسام القنقر إلا أن قوائمها الأمامية أطول من قوائمها الخلفية القصير. رؤوسها صغيرة. أذنانها مستطيلة. تنسلق الأشجار بصفعة وتسير على الخفيض وتغترز بهدوء خلافاً لما يفعله القنقر. لحونها مسكية الدوف قل من يرغب فيها.

## ٢٢٧٩١ - قُفُورِيَّات

Kangourous (F). Kangaroo (E).

فصيلة حيوانات لبونة عاشبة من الجرابيات طويولات الأربيل. أنواعها المعروفة نحو ٢٥ تنضم إلى ثلاثة أجناس القنقر والوراب والثلاثاب. اجسامها متباينة الاحجام التي تقراوح من قد الأربيل إلى قد البعلاة. رؤوسها شبه غروبية الشكل. أذنانها كبيرة منتصبه. أعناقها وأذنانها مستطيلة. قوائمها الخلفية بالغة الطول. أناتها رباعية الاخلاص. موطنها أستراليا وتسمانية وغينيا الجديدة والجزر المجاورة.

## ٢٢٧٩٢ - قُفُورِيَّان

صنّف بحري.

## ٢٢٧٩٢ - قُفُورِيَّات \*

Trigona (S).

Trigone (F). Trigona (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الحياشيم. فصيلة القنفذيات. أنواعها المعاصرة المعروفة خمسة أصنافها تمتد من البحر الاحمر الى الهند وأستراليا. اصنافها ثنائية المصاريع الاستوائية الاصغر، مخددة السطح الخارجية، مألّة الداعلية الثلاثية التركيب الجميلة الألوان القسطنطينية.

## ٢٢٧٩٤ - قُفُورِيَّات

Trigonidae (S).

Trigonidae (F). Trigonidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الحياشيم. اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم. اصنافها ثنائية المصاريع، متباينة الاحجام، شبه غروبية الشكل، مخددة الصفحات المخزقة في اشهر اجناسها التقنية والجمية.

## ٢٢٧٩٥ - قُفُور

Rancissement (F). Rancidity (E).

فساد اللحن أو الزيت رغبث ورجحما.

## ٢٢٧٩٦ - قُفُور

Thyrse

شكل من اشكال الازهار المقنودي تكون فيه الاجزاء الوسطى أطول من السفلى وأعلى.

## ٢٢٧٩٧ - قُفُور، قُفُور، قُفُور، قُفُور

Régime de dattes (F). Cluster (E).

هو البذق الذي يحمل ثمار النخل وهو كالمتنوع من العنب ج أقاء وقتان وقنوا.

## ٢٢٧٩٨ - قُفُور

Bourgeons à fleurs (F).

Blossoms buds (E).

هي أين النبات أو أكنة زهرة فإذا بدت قبل قد أتب.

## ٢٢٧٩٩ - قُفُور التَغْدِيَة

Normes d'alimentation (F). Feeding norms (E).

ما يجب اعتياده في تمييز مقادير العناصر الغذائية اللازمة لكل حيوان أو فئة من الحيوانات بالنسبة إلى سنه ووزنه وجيرمه وعمله.

## ٢٢٨٠٠ - قُفُور

Chanos salmoné (F).

سمكة بحرية من الصابوغيات تدعى شنوص، أطلقها.

## ٢٢٨٠١ - قُفُور

Mormyrus (S). Mormyre (F).

جنس اسماك نهري من فصيلة القنقريات. أنواعه نحو ١٨ منطها من اسماك المياه الإفريقية اعصها النيل والنيجر. اشهر انواعه القنقريه أطولها وقنقري النيل والقنقري.

## ٢٢٨٠٢ - قُفُورَة خَطْمَاء

Mormyrus caschive (S).

Mormyre rume (F).

سمكة مستطيلة الجسم، لينة الزعانف، صغيرة الفم، مستطيلة الخطم الطويل. يتكرر رسودها في النيل. كانت من الاسماك المكرمة عند قدماء المصريين.

## ٢٢٨٠٣ - قُفُورَة خَطْمَاء ، أَمُورِيُول

Mormyrus oxyrhynchus (S). Mormyre à bec (F).

نوع من القنوم وهي سمكة لينة الزعانف، موزية الخطم، تتكرر في النيل والنيجر.



قنقر



قنقر منقش



قنقنة



قنوم



22820 - قَتَوِيَّة Ductule  
قناة جهازية دقيقة تكون في الحشرات والحشرات الدنيا .  
22821 - قَتَبَلَة كل حشرة تنتمي الى القهليلات .

22822 - قَتَبَس قتل حشرة تنتمي الى فصيلة القهليلات .

22823 - قَهْلِيَّات Psocidae (S), Psocidés (F), Psocidae (E).  
فصيلة حشرات من رتبة القهليلات اجناسها وانواعها عديدة  
جميعها صغيرة القد طويلاً يراوح من 1 الى 3 مم . اثنائها  
الى الرتبة السوداء يطولها موج اسفح || قوتها ما ينمو  
على النبات من الفطور .

22824 - قَهْلِيَّات Corrodentia, Psocoptera (S), Psocoptères (F), Psocoptera (E).  
رتبة حشرات من طبقة القمليات تشمل القهليلات  
والناسيات .

22825 - قَهْبِي Perdreux robuste (F).  
هو الحجل النباهي ، اطلبه .

22826 - قَهْد Narcisse (F).  
هو النرجس ، اطلبه .

22827 - قَهْب Aubergine blanche (F).  
ضرب من الباذنجان ابيض الثمار يستعمل كنبات تزيين .

22828 - قَهْقَر Fibres du dattier (F). قَهْقَر  
قشرة حمراء مسعرمة الالياف الهبوكية تكون على لب النخلة .

22829 - قَهْقَع صوت اللب .

22830 - قَهْم Anorexie (F), Loss of appetite (E).  
قلة الشهوة الطعام عند الحيوان .

22831 - قَهْبِي Perdreux robuste (F).  
هو الحجل النباهي ، اطلبه .

22832 - قَهْبَرَان Amphibienus (S). Amphibène (F).  
جنس عظام من فصيلة القهقرانيات انواعه ثلاثة طويلاً  
من 30 الى 50 سم . اجسامها اسطوانية . اثنائها  
الى السمرة السوداء يطولها تجذيع اغبر . قوتها الحشرات .  
تعيش في التربة وتكثر قرب القمامال حيث تؤمن الغذاء .

22833 - قَهْبَرَانِيَّات Amphibienidae (S). Amphibénidés (F).  
فصيلة من العظائيات الديمات الارجل والروح الجنيهي .  
اجناسها قليلة العدد . تعيش تحت الارض . جميعها من  
الزحافات الناعمة .

22834 - قَوَادِم Rémiges primaires, Flèches (F). Wing primaries (E).  
ريش مقدم جناح الطائر وهي الاغشار والواشر .

22835 - قَوَاضِيهم Rongeurs (F), Rodentia (E).  
رتبة حيوانات من الحيوانات تسمى باجسامها الصغيرة القد  
وفشائها المستطيلة الحادة الاطراف التي تمكنها من القضم .

22804 - قَتَوِيَّات Mormyridae (S). Mormyridés (F), Mormyridae (E).  
فصيلة اسماك نهريّة من مفتوحات الشفة اشهر اجناسها  
القنوم .

22805 - قَتَوِيّ ، وَعَاي Vasculaire (F). Vascular (E).  
نمت تعريفي يطلق على النباتات القنوية اي الجائية النسيج .

22806 - قَتَرِيّ Botryolide (F), Botryoid (E).  
نمت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالقنر .

22807 - قَتَوِيَّات هي المارزوانيات ، اطلها .

22808 - قَتَوِيّة ، وَعَايِيّة Vascularisation (F). Vascularization (E).  
القنوية ، جسورياً ، تكون رويّة اوعية جديدة في النسيج  
المضوية . وهي ايضاً النمط الذي تتخذه الاوعية في حالة  
عضوية معينة .

22809 - قِنْتَل Nuque de l'éléphant (F). Nape of the elephant (E).  
رتبة الفيل حيث يجلس الفيل .

22810 - قَتِيب Nuage épais (F), Thick cloud (E).  
سحاب متكاثف التجميع عائق اللون .

22811 - قَتِيب Involucelle (F).  
قنابة صغيرة القد تملو قاعدة الرؤية الزهرية .

22812 - قَتِيبَة Bractéole (F), Bracteole (E).  
قنابة صغيرة الحجم تملو قاعدة القتيب .

22813 - قَتِيبَرَة Feuilles mortes de pins (F).  
اوراق الصنوبر اليابسة تلحف الارض .

22814 - قَتِيبَعَة Glumellule (F).  
حبة شفاة صغيرة القد تحت العنيفة ملاصقة للزهرة . وما  
قريبها لكل زهرة من زهرات السنبلة .

22815 - قَتِيس Phénotype (F), Phenotype (E).  
هو من النبات الذي يتحل بالصفات الشوزية المنسوبة  
الى صكره .

22816 - قَتِيشَمَة راجع صيد .

22817 - قَتِيشَمَة راجع أناسيكوس .

22818 - قَتِيشَمَة Verticilliosis (S).  
جنس فطور مجهرية من الفتيخيات وفصيلة اللوطيات .  
جره الكبدية منتصبة ، فرومه ريشة الشكل ، قاعدة  
الارتكاز . كتالته شمعية التجميع ، يفضي للشكل شفاة  
انواعه قليلة العدد والاذا تبار في تكاثرها ككتل من المغن  
الايش تركب المواد النباتية والمضوية المنحلة .

22819 - قَتِيشَمَة راجع أناسيكوس .

22819 - قَتِيشَمَة Rongeurs (F), Rodentia (E).  
رتبة حيوانات من الحيوانات تسمى باجسامها الصغيرة القد  
وفشائها المستطيلة الحادة الاطراف التي تمكنها من القضم .

22819 - قَتِيشَمَة Rongeurs (F), Rodentia (E).  
رتبة حيوانات من الحيوانات تسمى باجسامها الصغيرة القد  
وفشائها المستطيلة الحادة الاطراف التي تمكنها من القضم .

22819 - قَتِيشَمَة Rongeurs (F), Rodentia (E).  
رتبة حيوانات من الحيوانات تسمى باجسامها الصغيرة القد  
وفشائها المستطيلة الحادة الاطراف التي تمكنها من القضم .



قَهْبَرَان

٢٢٨٤٣ - قُوَيْمَةُ الرُّبْعَةِ Malandre (F).  
مرض جلدي يَمرِّي رُبْعَةً القُرْسِ .



قَواع

٢٢٨٤٤ - قُوَيْمَةُ الْكُتْمِ Dartrose de la vigne (F).  
Dartros of the vine (E).  
رسم نباتي يظهره الحارسي قروح وفلوج في اصول وسروع الكرمة . سببه حال مختلفة احصاها التسمية .

٢٢٨٤٥ - قُوَيْمَةُ رَطْبَةٍ ، اَكْرَمِيَا رَطْبَةٍ Impétigo, Eczéma humide (F). Impetigo, Eczéma damp (E).  
مرض جلدي يركب الحيلون .

٢٢٨٤٦ - قُوَيْمَةُ أَلُوَيْتَةِ Alouette cochevis (F).  
في القبرة المنحوسة ، اطلبها .

٢٢٨٤٧ - قُوَيْمَةُ Sternite (F).  
في الاسرة مفصل من مفاسل بطن الحشرة . ج قوب .

٢٢٨٤٨ - قُوَيْمَةُ Coque d'oeuf (F). Shell (E).  
قشرة البيض بعد انفلاتها عن الفرج . ج قوب وقواب .

٢٢٨٤٩ - قُوَيْمَةُ Bergeronnette printanière (F).  
رأج ذرة الربيع .

٢٢٨٥٠ - قُوَيْمَةُ الارضي شوكي Depressaria subpropinqua (S). Teigne de l'artichaut (F).  
حشرة من القربيات فراشها صغيرة القد ، حنطية اللون ، يسطها نحو ١٠ م . يرقها غبار اللون ثلاثية الخطوط القلابة .  
تركب الارضي شوكي .

٢٢٨٥١ - قُوَيْمَةُ الازالية ، قُوَيْمَةُ الْجُلْجُلَانِ Gracilaria azulula, G. azulella (S). Teigne de l'azalea (F). Azalea leaf miner (E). Azalea-motte (D).  
حشرة من القربيات يسطها نحو ١٠ م . وراشها خبيثة حنطية اللون فضية اللونج . يرقها دقيقة الجسم غبار الخروب تلثم الوردك وتلذها .

٢٢٨٥٢ - قُوَيْمَةُ الأشجار المثمرة Teigne des arbres fruitiers (F).  
في التبيكة المثمرة ، اطلبها .

٢٢٨٥٣ - قُوَيْمَةُ البراعم Teigne des bourgeons (F).  
في التبيكة المثمرة ، اطلبها .

٢٢٨٥٤ - قُوَيْمَةُ التفاح Teigne des pommiers (F).  
في غرطيط التفاح ، اطلبها .

٢٢٨٥٥ - قُوَيْمَةُ التَّيْنِ ، لَاحِمَةُ التَّيْنِ Simaechia nemorana (S). Mineuse du figuier, Teigne du figuier (F). Fig moth (E). Feigenblatt-motte (D).  
حشرة من القربيات فراشها سمراء اللون تظفر نحو ١٠ م . يسطها براوح من ١٥ الى ١٨ م . وراشها مستعرضة حنطية يعلوها تيجاج اسفج اللونج || لها جيلان في السنة . يرقها صغيرة دقيقة تركب في جيلها الاول السطح العلوي من الورقة وتركب في جيلها الثاني الورقة والشرة حماً .

٢٢٨٥٦ - قُوَيْمَةُ Migrateurs (F). Migratory (E).  
الطيور التي تذهب من بلاد الى بلاد يغي ضد الازايد .

٢٢٨٥٧ - قُوَيْمَةُ Lepus (S). Lièvre (F). Hare (E).  
جنس حيوانات ليفة قاصصة من فصيلة الارنبات . اناوله ٦٩ موطنها العالم . اجسامها مستطيلة منسجمة . طولها الكامل ، من برطمانها الى طرف ذنبها ، لا يقل من ٩٠ سم . ولا يفوق ٧٥ سم . اذنانها مستطيلة خبيثة متصبة . عيونها كبيرة . برامها مقلوبة . جرابها الازالية قصيرة القد . خنسية الاصابع ، اما الخلفية لمستطيلة ورواية الاصابع . اظفارها قوية حادة . اقلها سوية اللون منها الاكعب والاصفر والاصهب والابيض الخ ... || تألف البحر والجبال والمايات والاحراج والغضاب والسهول . ترحل في الليل . اجرتها رداء مستطيلة الشكل تحلقها على اعناق حنطية تراوح من ٤٠ الى ٧٠ م . مدخلها وغربها نقر واحد مستقيم || قوتها النبات والحيوب . اناثها ثثورة تضع من ٣ الى ٥ مرات في السنة وكل مرة من الفريسين الى الخمسة تخلف باصرة كاسية ترحل برفقة امهاتها بعد وضعها ياسبع . واثي القرواح تدعى درامة . وقواع || احرف اناوله واسهرها :

قَواع ابيض ، قَواع جعول Lepus timidus (S).  
قَواع اروبي Lièvre timide, L. blanc (F).  
قَواع اروپي Lepus europaeus (S).  
قَواع اوروبى Lièvre européen, L. commun (F).  
قَواع التبت Lepus tolai (S). Lièvre du Thibet (F).  
قَواع الشمال Lepus arcticus (S). Lièvre arctique (F).  
قَواع القطب Lepus capensis (S). Lièvre du Cap (F).  
قَواع المتوسط Lepus mediterraneus (S).  
قَواع المتوسط Lièvre méditerranéen (F).  
قَواع المراعي Lepus campestris (S).  
قَواع امريكي Lièvre des prairies (F).  
قَواع امريكي Lepus americanus (S).  
قَواع امريكي Lièvre américain (F).  
قَواع مصري Lepus aegyptius (S).  
قَواع مقلد Lièvre d'Egypte (F).  
قَواع مقلد Lepus nigricollis (S).  
قَواع مقلد Lièvre mosse, L. à cou noir (F).  
٢٢٨٥٨ - قَوَال Eudynamis orientalis (F).  
القوال طائر معروف باسم عديس شرقي ، اطلبه .

٢٢٨٥٩ - قَوَامِكَة ٢٢٨٦٠ - قَوَامِكَة Membras (F). Limbe (E).  
اعضاء الحيوان كالكايين والرجلين التي توتن انتقال الجسم .

٢٢٨٦١ - قُوْب Poussin (F).  
هو الصوص والكنكوت . ج اقواب .

٢٢٨٦٢ - قُوَيْمَةُ Eczéma (F).  
هي الاكزيما ، اطلبها .



قوِمة الازالية



قوِمة التين

## ٢٢٨٦٥ - قُوْبَعَةُ الشَّحْمِ

*Aglossa pinguinalis* (S). Teigne de la graisse (F).  
حشرة من القوربيات. يرقاتها صغيرة دقيقة وردية اللون تعيش  
على اللحم الجاف.

## ٢٢٨٦٦ - قُوْبَعَةُ الشُّوْكَدَرِ ، لَيْتِه

*Lica ocellatella* (S). Teigne de la betterave (F).  
حشرة من القوربيات. يسطها تراوح من ١٥ إلى ١٢ م.  
نوبها إلى الطحلة المائلة. يرقاتها خضراء اللون حمراء الحواف  
نظم جلود الشوكدر وتقع بها أشد الأذى.

## ٢٢٨٦٧ - قُوْبَعَةُ الصِّلَيبَاتِ

*Teigne du colza* هي القوبعة المائية ، أطلها .

## ٢٢٨٦٨ - قُوْبَعَةُ الصُّوفِ \* ، سَعْفَةُ الصُّوفِ

*Tineola biselliella* (S). Teigne de la laine. Mite  
des vêtements (F). Webbing clothes moth (E).  
Kleidermotte (D).

حشرة من القوربيات يرقاتها صغيرة دقيقة رمضاء اللون تركب  
جميع الانسجة الصوفية بما فيها السجاد .

## ٢٢٨٦٩ - قُوْبَعَةُ الْفِرَاكِ \* ، سَعْفَةُ الْفِرَاكِ

*Trichophaga tapetzelia*, *Tinea tapetzelia* (S). Teigne  
des fourrures, Mite des fourrures, Mite des  
tapis (F). Carpet moth (E). Tapetanmotte (D).

حشرة من القوربيات يرقاتها صغيرة اللون رمضاء اللون تركب  
الفراء وتقرضها .

## ٢٢٨٧٠ - قُوْبَعَةُ الْفَلَيْنِ ، سَعْفَةُ الْفَلَيْنِ

*Aenophila flavum* (S). Teigne du liège (F).  
حشرة من القوربيات يرقاتها صغيرة اللون دقيقة رمضاء اللون  
سحقية المروج تلم الفلين المصنوع تعلقه .

## ٢٢٨٧١ - قُوْبَعَةُ الْكُرَاتِ

*Acrolepis assectella* (S). Teigne du poireau (F).  
Leak moth (E). Lauchmotte (D).

حشرة من القوربيات صغيرة اللون يسطها نحو ١٢ م.  
نوبها إلى الطحلة السوداء ورأسها منشفة بالأسود . يرقاتها  
دقيقة سحقية اللون تلم الكرات بأوراقه وقمرس سافه .

## ٢٢٨٧٢ - قُوْبَعَةُ الْكَرَزِ \*

*Argyresthia aphipella* (S). Teigne du cerisier (F).  
Cherry fruit moth (E). Kirschblütenmotte (D).

حشرة من القوربيات . يسطها تراوح من ١٥ إلى ١٢ م.  
ورأسها الاخضر الى الرمادي يعلوها تمريج أسود .  
ورأسها الاخضر الى السمره الخفيفة السوية يعلوها أطار  
من الخمل الأصعب الناعم . يرقاتها تركب أزهار وتؤمر  
الاجارح المشرقة اعصها الكرز .

## ٢٢٨٧٣ - قُوْبَعَةُ الْكَيْشِشِ

*Incurvaria capitella* (S). Teigne du groseillier (F).  
حشرة من القوربيات يسطها نحو ١٥ م. ورأسها جوية  
اللون يعلوها تبييض اصفر مثلث الزوايا . يرقاتها تهب حراء  
اللون في اول مهادها ثم خضراء زاهية فقاومة وهي تقرض  
براعم وتؤمر الكشمش .

## ٢٢٨٥٦ - قُوْبَعَةُ النَّبَاتِ \* ، سَعْفَةُ النَّبَاتِ

*Tinea pellionella* (S). Teigne des vêtements (F).  
Pelt moth (E). Palzmotte (D).

حشرة من القوربيات . يرقاتها صغيرة دقيقة تعيش على  
النسيج الصوفية . أجيالها الحولية من ٣ إلى ٥ . فيالنج  
عادتها غدية الشكل متينة النواص .

## ٢٢٨٥٧ - قُوْبَعَةُ الْجَزْرِ

*Depressaria nervosa* (S). Teigne de la carotte (F).  
Carrot moth (E). Kümelmotte, Möhrenschebe (D).

حشرة من القوربيات . يرقاتها صغيرة خضراء اللون تعيش على  
أزهار الجزر وفيرة من نباتات الفصيلة الخيمية تنقص  
على الأضرار وقد لا تمتص من البذور .

## ٢٢٨٥٨ - قُوْبَعَةُ الْخُبُرِ \* ، حَسْطَبُ الْخُبُرِ

*Tinea granella* (S). Teigne des grains (F).  
European grain moth (E). Kornmotte, Weisser  
Kornwurm (D).

حشرة من القوربيات . يسطها تراوح من ١٥ إلى ١٤ م.  
ورأسها إلى البياض الأخير يعلوها تبييض حنطي ومجاة نفعية.  
يرقاتها وسيدة الجبل الحولي، صغيرة اللون، تركب . جميع أنواع  
المواد الغذائية المخزونة ولا تمتص من الحنطة والشعير .

## ٢٢٨٥٩ - قُوْبَعَةُ الْخَمِصِيَّاتِ \*

*Prays citri* (S). Teigne du citronnier (F).

حشرة من القوربيات. صغيرة اللون يسطها نحو ١٥ م.  
نوبها إلى الطحلة. ورأسها مرقشة. ثلاثية الأجيال الحولية.  
يرقاتها صغيرة اللون، تركب أزهار وتؤمر الحمصيات .

## ٢٢٨٦٠ - قُوْبَعَةُ الْخَشَبِ

*Teigne du bois mort* (F).

هي المربية النبيكة ، أطلها .

## ٢٢٨٦١ - قُوْبَعَةُ الدَّرَاقِنِ \* ، سَرَسْتُوم \*

*Cerostoma persicella* (S). Cérostome du pêcher (F).  
حشرة من القوربيات كبيرة اللون يسطها نحو ٢٥ م.  
ورأسها إلى الامام إلى الصفار الكبريتي والخلفان إلى  
الطحلة . يرقاتها وسيدة الجبل الحولي تركب أوراق الدراق  
والوز .

## ٢٢٨٦٢ - قُوْبَعَةُ الدَّرَاقِنِ الصَّغِيرَةِ \* ، أَنْرَسِيَا \*

*Anarsia lineatella* (S). Petite mineuse du pêcher (F).  
Peach twig borer (E). Pfirsichmotte (D).

حشرة من القوربيات. يسطها تراوح من ١٤ إلى ١٦ م.  
ورأسها ضيقة حلاوة اللون . لها حيلان في الحول . تركب  
رقعة الجبل الأول الاثنان الثانية فتلصقها وتحول دون نموها .  
أما يرقات الجيل الثاني فتتركب التار وتنخرها .

## ٢٢٨٦٣ - قُوْبَعَةُ الْزُعُورِ

*Teigne de l'aubépine* (F).

هي التبيكة الصغيرة ، أطلها .

## ٢٢٨٦٤ - قُوْبَعَةُ الزَّيْتُونِ \*

*Prays oleella* (S). Teigne de l'olive (F). Olive moth (E). Oliven-  
motte (D).

حشرة من القوربيات . صغيرة اللون يسطها نحو ١٥ م.  
نوبها رمادي اللون نضي المروج . أجيالها الحولية ثلاثة .  
يرقاتها صغيرة اللون سحقية اللون ثلاثية الخطوط السمر القاطية  
تركب الأوراق فتلصقها والأزهار تقصب أعلاصها والتار  
فتنخرها وتعلقها .



قوبعة النياب



قوبعة الحبوب



قوبعة الحمصيات



قوبعة الدراقن الصغيرة



قوبعة الزيتون



قوبعة الصوف



قوبعة الفراء



قوبعة الكرز

مكنها ذوي القَد مستدير الشكل لاقامي التجميع . رِقَاتُهَا صغيرة ملونة تَلْم الاوراق والازهار . خادراتُها تَحْمَلُ ضَمْن نِجَالِهَا حَبِكُهَا نَوَاسٌ لَبَدٌ مَتِين .



قُوْبَعَةُ مَاسِيَة

٢٢٨٨١ - قُوْبِيَّاتٌ  
Cobecaeae (S). Cobacaeae (E).

فَصِيلَةٌ نَبَاتِيَّةٌ وَسَيِّدَةُ الْجِنْسِ . نَبَاتَاتُهَا عَاشِرَةٌ مِمَّا هِيَ أَمْرِيكِيَّةُ الْأَسْتَوَاتِيَّةُ . وَبَيْنَ الْبَاتَيْنِ مِنْ قَالِ أَنَّهَا عَامَرَةٌ مِنَ الْقَبَسِيَّاتِ وَبَيْنَهُمْ مِنْ أَهْرَفِهَا عَمَارَةٌ مِنَ الْبَلَنْغِيَّاتِ .

٢٢٨٨٢ - قُوْبِيَّةٌ  
Cobaea (S). Cobéa, Cobén (F).  
جلس نباتات عارشة معمرة من فصيلة القويبيات، أنموذجها أربعة أصنافها البلاد الأمريكية، جميعها تريبيئية، أزهارها جرسية الشكل ملونة، ثمارها حقيفة مستطيلة، يزورها بسلطة ۥ أهرق أنموذجها وأشهرها القويبة العارشة .

٢٢٨٨٣ - قُوْبِيَّةٌ عَاشِرَةٌ \*  
Cobaea scandens (S). Cobéa grimpante (F). Cups and saucers, Cathedral bells (E). Klettertulpen, Glockenrabe (D). Cobea (I).



قُوْبَعَةُ نَاسِجَةٍ

نوع من القويبة ساقها ليفية عارشة طول نحو ١٨ سم. أوراقها مركبة وريقاتها يقيفة النصل تطلو من ١٥ إلى ٢٢ سم. أزهارها كبيرة القَد تطلو نحو ٨ سم. أكلهاها بنفسجية مضلعة، توريجها جرسية الشكل، أخضر اللون، بنفسجي الملوحة ۥ أزهارها يستمر من أيار إلى تشرين الأول.

٢٢٨٨٤ - قُوْبِيُونُ، حَوْتُ الْجِن \*  
Gobius (S). Gobie (F). Goby (E).

جنس أسماك بحرية بؤرية ترشِب في لمياه الرابكة، أجسامها صغيرة. رؤوسها كبيرة، أشفاتها واسعة، أنوفها هدية. جميعها من الأسماك الثنائية التي تغفر قوق الماء. منطها في الأسماك السامة وبعضها مأكول. أنموذجها لكثير من البحر الأحمر والخليج الفارسي وبحر مَدَمِي.

٢٢٨٨٥ - قُوْبِيُونُ أَسْوَدُ \*، كُرُوجُ أَسْوَدُ  
Gobius niger (S). Gobie noir, Boulérot noir (F). Black goby, Rock-fish (E).

سكة بحرية يبيض من فصيلة القويبيات ودية شالكات أصنافها معظم أقام البحر الأبيض المتوسط. تتميز من أسماك الغراف والجماد، تعيش بين الصخور وفي الأوجال ۥ جسمها مستطيل الشكل، مستعدل، يطول نحو ٢٠ سم. قوفا إلى الكعبة السمراد يطولها تمسح أسود في الظهر وتنقش أسود في الجانبين تتخلله بقع القلق الصف. رأسها كبير الحجم، برمي الشكل، قصير الخطم، شفتها معدل الانفرج، فكها متعادلان، أسنانها صغيرة، ذرية ثنائية الصف، عينها يبيضان، رديتا الانكاز، زعانفها متباعدة التركيب والأشكال، زعنفتها الذيلية رعية الشكل ۥ لها سجد الصف، مرغوب فيه.

٢٢٨٨٦ - قُوْبِيُونُ مَدَمِي \*، كُرُوجُ مَدَمِي  
Gobius cruentatus (S). Gobie sanglant (F). Bloody goby, Sea-gudgeon (E).

سكة بحرية يبيض من فصيلة القويبيات. أصنافها معظم أقام البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الأطلسي ۥ تتميز من أسماك الغراف والجماد. جسمها معدل القَد، شبه أحليجي الشكل، يطول من ٢٠ إلى

٢٢٨٨٤ - قُوْبَعَةُ الْبَلَك  
Gracilaria syringella, Xanthosipateris syringella (S). Taighe du lilas (F). Lilac leaf miner (E). Filodermotte (D).

حشرة من القويبيات صغيرة القَد يسفلها تراوح من ٩ إلى ١٠ م. ثوبها حنطي اللون. رِقَاتُهَا تَلْم الاوراق الكيك وتقتل أطرافها شملتها.

٢٢٨٨٥ - قُوْبَعَةُ الْمَضَافِ  
Hyponomeuta cognatella, H. evonymella (S). Hyponomeute du fusain (F).

حشرة من القويبيات فراشها صغيرة القَد ودهاء الثوب، رِقَاتُهَا خِزَابُ اللّون تَلْمُ رَوَقُ الْمَضَافِ بَعْدَ أَنْ تَجْلِبِ بِشَافَةِ مِنَ النَّوَاسِ الْمَنَكِيوَتِي تَمِيشُ فِي دَاخِلِهَا حَتَّى أَكْثَلِ تَطْلُوَهَا .

٢٢٨٨٦ - قُوْبَعَةُ النَّجِيلِيَّاتِ \*، أَكِيْسَةُ  
Elachista argentella (S).

### فَلَسِيَّةٌ

Teigne des graminées, Elachista argentea (F).

حشرة مؤذية من القويبيات. فراشها صغيرة القَد، يسفلها تراوح من ١٢ إلى ١٥ سم. رؤسها الإماميان إلى الطلبة الفضية. رؤسها الخلفيان إلى الصلبة يحويها أطار من الحبل المهدب الصنابي اللون ۥ رِقَاتُهَا صغيرة دقيقة حنطية اللون تركب صفت النجيبات قتلن النصل بين بشرته ۥ تظهر الفرائشة في أيار وتبقى حتى أواخر حزيران. لها سبل واحد في الحبل، تنشق البرقة وتظهر دها ليزعا في النصلان في شهر نيسان.

٢٢٨٨٧ - قُوْبَعَةُ الْهَلْبِ، سَعْفَةُ الْهَلْبِ  
Tinea crinella (S). Teigne des crins (F).

حشرة من القويبيات رِقَاتُهَا صغيرة القَد سمراد اللون تركب الهلب وتقرعه.

٢٢٨٨٨ - قُوْبَعَةُ مَاسِيَّةٌ \*، قُوْبَعَةُ الصَلْبِيَّاتِ  
Plutella maculipennis (S). Teigne du colza, Teigne des crucifères (F). Diamond moth (E). Kohlschabe, Kohlmoete, Schleirmotte (D).

حشرة من القويبيات. يسفلها تراوح من ١١ إلى ١٢ سم. رؤسها حنطية اللون تغربها صفرة تطلو الحبل المستطيل قلع كالكاس. رِقَاتُهَا زَبَابُ، ثوبها إلى الأخضر الفاتح تطلو نحو ١٢ م. تركب نباتات الفصيلة الصليبية أخصها السليم تغرب الأيزاد والبزور.

٢٢٨٨٩ - قُوْبَعَةُ نَاسِجَةٍ \*  
Hyponomeuta padella, H. malinella (S). Hyponomeute, Chenille fleuve (F).

حشرة من القويبيات، تحيلة الجسم ضيقة الرواشن، يسفلها تراوح من ١٦ إلى ٢٠ م. جيلها الحولي واحد. رِقَاتُهَا تركب التفاح والخوخ والزعرور فتسج حل الاوراق جلباباً مزياً من النواص تَمِيشُ فِي دَاخِلِهَا .

٢٢٨٩٠ - قُوْبَعِيَّاتٌ، سَعْفِيَّاتٌ  
Tineidae (S). Tineides (F). Clothes moths (E). Echte motten (D).

فصيلة حشرات من رتبة سرشفيات الإجمية. أجسامها وأزوارها زده ١٤٠٠٠ منطها من الحشرات النامسة، صغيرة القَد ضيقة الرواشن المهدبة الأطراف، ملاسها الشفوية صغيرة مدببة. قروها الاستشارية غيبطة سرورية.



قُوْبِيَّةٌ عَاشِرَةٌ



قُوْبِيُونُ أَسْوَدُ



قُوْبِيُونُ مَدَمِي

٢٢٨٩١ - **قُوَّةُ الإِنْتِاشِ** (F). Pouvoir germinatif (F).  
Germinal power (E).  
من المعلوم ان لكل نوع من النبات مدة فصل من الزمن تستغلها البلور الى ان يتم انتاشها || قُوَّةُ الانتاش قياس نسبي نوعي يقدر بواسطته نسبة البلور الجيدة والسريعة الانبات .

٢٢٨٩٢ - **قُوَّةُ جَذَابِيَّة** (F). Force centripète (F).  
Centripetal force (E).  
هي القوة التي تدفع الشيء نحو المركز .

٢٢٨٩٣ - **قُوَّةُ غَامِصِيَّة** ، **قُوَّةُ غَمِصِيَّة** ٥  
Force marémotrice (F). Tide-moving force (E).  
هي القوة التي تكونها امواج البحر الطاغية النامية في مدحا وقد توصلوا في فرنسا الى استخدامها لتوليد الحركة الاندفاعية .

٢٢٨٩٤ - **قُوَّةُ قَائِدِيَّة** ، **قُوَّةُ طَائِدِيَّة** ، **قُوَّةُ مَبْعِدِيَّة**  
Force centrifuge (F).  
Centrifugal force (E).  
هي القوة التي تدفع الشيء لابتعاد من المركز .

٢٢٨٩٥ - **قُوَّتَانِش** (F). Yack (F).  
هو القطاس ، اطلبه .

٢٢٨٩٦ - **قُوِّيَّة** ٥  
Bromatologie (F).  
Bromatologie (E).  
القويَّة علم يبحث في الاعتداء مع وصف الاغذية وتراكيبها وموادها العنصرية .

٢٢٨٩٧ - **قُوَّتِج** هو الظلم ذكر النعام .

٢٢٨٩٨ - **قُوَّتِس** (F). Arc (F). Arch (E).

٢٢٨٩٩ - **قُوَّتِس** (F). Cintre (F). Curve of an arch (E).  
٢٢٩٠٠ - **قُوَّتِس**  
القوتس مجموعة من ستة كوابك تدعى القلادة .

٢٢٩٠١ - **قُوَّتِس قُرُج** (F). Arc-en-ciel (F).  
هو القسطن ، اطلبه .

٢٢٩٠٢ - **قُوَّتِسِيَّات** (F). Arctotées, Arctotidées (F).  
سبط من فصيلة المركبات الهيدريات .

٢٢٩٠٣ - **قُوَّتِصَرَّة** (F). Pot (F).  
هي المكن تركع فيه الزهور . ج قواصر .

٢٢٩٠٤ - **قُوَّتِلَّة**  
كلمة عامية تستعمل لادلة على الثمر وصل البندورة .

٢٢٩٠٥ - **قُوَّتِطِي** ٥ ، **قُوَّتِوَكَة** ٥ (F). Nasas (S). Coast (F).  
جنس حيوانات لينة من فصيلة الرتوليات . انواعه المعروفة خسة وبهم من قال انها نويان وثلاثة غروب . جميعها امريكية الموطن ، صغيرة القد ، جميلة الشكل ، مستندرة الاذن و كثيفة الصوف الناعم ، مستطيلة الذيل المجمل . انها تصنع من ٣ الى ٥ جراء . تألف المابات الكثيفة . قوتها البار والبوبيات والحشرات .

٣٥ سم . حراشفها صغيرة ، جامدة . ثوبها الى الوردية والبنرة الحمره بطولها في رأسها وظهرها ويطلبها يتجيج عابن الحمره كالدلم . زعانفها الظهرية والصدوبية والذيلية مرفوعة بالاسر والاخر || رأسها كبير الجرم مستعرض الخلف والمقل . شفها واسع الانفرج فكها الاسفل يتقدم الاسل قليلا . اسنانها صغيرة ذرية ، ثنائية الهكف . عيناها كيرتان ، مستديرتان ، ناشرتان ، رفيعتا الاوتكار . زعنفتها الظهرية الاولى مستطيلة المناخس . زعنفتها الذيلية مستديرة الطرف || الاذن تقرأ في لقلق من الصدف الكبير بده تنظيها من الرمال والاورال وتتناوب مع الذكر على حراسة السره حتى التقف || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٢٨٨٧ - **قُوِّيِيُونُ مَصْبِي** ٥ ، **كُرُوجُ أَصْبَر**  
Gobius nebulosus (S). Gobie nébuleux (F).  
Gobius nebulosus (E).

سمكة بحرية بيوض من القويون . اعطائها تمتد من الخليج الى البحر الاحمر فالبحر الابيض المتوسط عبر قناة السويس || تتميز من اسماك التفاح والمجذع . جسمها صغير الحجم ، مستطيل الشكل ، متدل التليط ، يطول من ١٢ الى ١٥ سم . حراشفها مبيبة جامدة . ثوبها ابيض اللون ويعلو من الخلف الجانبي الى الظهر تمسح غير متفاوت الكثافة يبدو كالصباغ . اما القسم السفلي فغفي المراج . زعانفها الظهرية والشرجية شفافة . الصدريه والحوضية الى الخضر البحرى ويعلو الحوضية موج اسمر . الذيلية شفافة ملوكة بخمار اسود || رأسها كبير الحجم ، غروبى في الشكل ، قصير الخلف الذلق . اسنانها صغيرة ، متراسة . عيناها صيرتان ، مستديرتان ، ناشرتان ، رفيعتا الاوتكار || زعانفها الظهرية اثنتان تتميز باستطالة الشماخ الثاني من الظهرية الاولى الذي يبدو كسلك دقيق ، مستطيل اسود اللون . زعنفتها الحوضيتان متلاصقتان لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .



قويون مصب

٢٢٨٨٨ - **قُوِّيِيُونِيَّات** (S). Gobliidae (S).  
Gobliidae (F). Gobliidae (E).

فصيلة اسماك بيوضة من شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها كثيرة البدن ، معظمها بحري وبعضها نهري والبحري يكثر وجوده عند الاغوار . اعطائها مياه البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد او صغيرة . رؤوسها كبيرة . اشداقها معتدلة الانفرج . عيناها مستديرة ، ناشرة . زعانفها الظهرية الاولى منخسية الاطراف || اشهر اجناسها القويون .

٢٢٨٨٩ - **قُوَّة** (F). Force (F).  
هي صفة الاتزامية المفروضة وهي تستعمل في الصيغ التالية:  
قوة الاتبات Force probante (F).  
قوة الاتزام الخاص Force d'obligation privée (F).  
قوة القانون Force de loi (F).  
قوة المحكوم به Force de chose jugée (F).  
قوة تنفيذية Force exécutoire, Exécution parée (F).  
قوة قاهرة Force majeure (F).

٢٢٨٩٠ - **قُوَّةُ الْاِتِمَاصِ** ، **قُوَّةُ الْمَصِّ**  
Pouvoir absorbant (F). Absorptive power (E).  
خاصة الترابط التي تمكنه من الاحتفاظ بين ذراته بعض العناصر الغذائية القابلة للربان .

والبور. ساقه فراء تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقه صفوة  
قصبة زباد النصل. وريساته الزهرية فردية التجميع،  
لقنوسية الشكل، صفراء اللون.

### ٢٢٩١٧ - قُوتَحان المُرُوج \*، كَرِيْتَم البَر \*، مَنَدِيلَه

*Chrysanthemum coronarium* (S). *Chrysanthème à carène*, C. des jardins, Marguerite des champs (F). Crown daisy, C. marigold, Garden chrysanthemum (E). Krisanwucherbäume (D). Crisantemo da mazi, Bambagelle, Margherita gialla (I).

عشبة سولية برية وردينية، ساقها فراء متشعبة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها قدية التفريض. وريساتها الزهرية متوسطة القد قطرها نحو ٤ سم. طليها اصفر اللون اخضر الملاج. لسيناتها ال صفراء الزاهي || ازهاره يستمر من سيزان الى ايلول.

### ٢٢٩١٨ - قُوتَحان ذَهَبِي \*، لُؤْبِيَا، كَرِيْتَم مُحَصَّل

*Chrysanthemum segetum* (S). *Chrysanthème des blés*, Marguerite dorée, M. jaune (F). Corn chrysanthemum, C. marigold, Yellow corn-flower (E). Echte Wucherblume, Kornringelblume (D). Margherita dorata, M. delle messi, Crisantemo (I).

عشبة سولية برية وردينية ساقها قليلة الفروع تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها قدية التفريض، بحرية اللون، تحية للنصل، متباعدة التنسج. وريساتها الزهرية ذهبية اللون، متوسطة القد، قطرها نحو ٤ سم. طليها متفتحة حقبة الشكل || ازهاره يستمر من سيزان الى آب.

### ٢٢٩١٩ - قُوتَحان كَبِير \*

*Chrysanthemum leucanthemum*, *Leucanthemum vulgare* (S). *Chrysanthème grande marguerite*, C. de bœuf (F). Ox-eye daisy, White-weed, Dog daisy (E). Gänsewucherbäume, Riesenmargherite, Goldblume (D). Margherita grande, M. dei prati, Margaritone (I).

عشبة برية مفلولة معمرة ساقها فراء تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها لاقباسة الشكل والقد، وريساتها الزهرية كبيرة الحجم قطرها يراوح من ٦ الى ٨ سم. لسيناتها غيفة مستطيلة. ازهارها يستمر من ايار الى تشرين الثاني.

### ٢٢٩٢٠ - قُوتَحان مَحْزُونِي \*، زُيْدَكَة، سُمُيِي

*Calendula officinalis* (S). Souci officinal, S. des jardins, S. à bouquet, S. double, Mirliton (F). Hen and chickens, Pœrmarigold (E). Ringelblume, Garten-ringelblume (D). Calendula, Calta dei giardini (I). نبات عشبي حولي ويحول من فصيلة المركبات. فروعها الزراعية عديدة ساقها تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها ستائفة متعاقبة. وريساتها الزهرية كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الصفرة الذهبية المائلة.

### ٢٢٩٢١ - قُوتَحان مَنِيات \*، شَجَرَة مَرْتَم \*، كَرْكاش

*Chrysanthemum parthenium* (S). *Chrysanthème-Matricaire*, Grande camomille (F). Feverfew chrysanthemum (E). Goldfederwucherbäume, Grosse Kamillen (D). Amarella, Matricale, Morella, Partenio (I).

عشبة برية معمرة فواحة اللف. ساقها حيداء فراء تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقها ولقة لاقباسة التفرع تطول

*Nasua rufa* (S).

*Coati roux* (F).

نوع من القوطي. جسمه يطول نحو ٤٨ سم. وذنبه ٤٢ اما ارتفاعه فنحو ١٩ سم. ثوبه الى الخثرة الزاهية يمتد حتى الظهر. رأسه وبصره الى السمرة الرمادية. ذنبه اصعب اللون ملقح بالاسود || اعطانه شامسة الحدود تم جمع بلاد امريكا الجنوبية.

### ٢٢٩٠٧ - قُوطِي مَعْرُوف \*، قُوطِي مَسْجَابِي \*، Nasua narica (S). Coati ordinaire (F).

نوع من القوطي. جسمه يطول نحو ٥٥ سم. وذنبه ٤٢ اما ارتفاعه فنحو ٢٥ سم. ثوبه الى السمرة السوداء الملاج. بطنه الى الصفرة. خطمه ابيض الطرف. جوارحه قصيرة وقوية. خاله حادة خاسية || اعطانه لسيمة الارباء تشمل المكسيك وغواتمالا وهندوراس وكوستاريكا.

### ٢٢٩٠٨ - قُوتَحان \*، مَسْكَارَة، صِيَوَان

*Pavillon de l'oreille* (F). Pavillon, Auricle (E).

قوتح الاذن وعارة الاذن وصيوان الاذن، ثلاثة اسماء لسمي واحد.

### ٢٢٩٠٩ - قُوتَحان \*، Sillex meulier, Pierre meulière (F). Millstone grit (E).

حجر اسود اسفنجي شديد الصلابة تعمل منه الرسى.

### ٢٢٩١٠ - قُوتَحان \*، هَر البَج، اطليه.

### ٢٢٩١١ - قُوتَحان \*، Caquet (F). Cackle (E).

صوت الدجاجة على البيض وصوت الازرق.

### ٢٢٩١٢ - قُوتَحان \*، Pyrola (S). Pyrole (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة القرواقيات انواعها المعروفة نحو ١٢ اصلها بلاد الاقاليم المتحدة. جذورها ليفية. ساقها مثبوتة. اوراقها متعاقبة متفتحة بيضية. شاربخها الزهرية متبعية. ازهارها سلبية التجميع يبيضه اللون.

### ٢٢٩١٣ - قُوتَحانِيات \*، Pyrolaceae (S). Pyrolacées (F). Pyrolacées (E).

فصيلة نباتية من ذوات الثلقنتين متحدة القصات. اجناسها وانواعها عديدة جميعها برية لا تنفع لها. اشهرها القوقاز.

### ٢٢٩١٤ - قُوتَحان \*، طائر يَأْتِف الخربة من الاماكن.

### ٢٢٩١٥ - قُوتَحان \*، Chrysanthemum (S). Chrysanthème (F).

جنس نباتات عشبية سولية ومغولة ومعمرة من فصيلة المركبات. انواعها عديدة منها البرية والبريانية واللبية. ساقها فراء. اوراقها متعاقبة مغرسة. ازهارها وريسية صفراء اللون او بيضاء || اشهر انواعها ما يتبع.

### ٢٢٩١٦ - قُوتَحان الحَقْل \*، Calendula arvensis (S). Souci des champs, Fleur de tous les mois (F). Field marigold, Gools (E). Feld-ringelblume, Wilde Ringelblume (D). Calendula, Calta dei campi, Forancio (I).

نبات عشبي بري من فصيلة المركبات يكثر في الحقول



قُوطِي مَعْرُوف



قُوتَحان



قُوتَحان المُرُوج

قُوتَحان الحَقْل



قُوتَحان كَبِير

قُوتَحان ذَهَبِي



قُوتَحان مَنِيات

قُوتَحان مَحْزُونِي

٢٢٩٢٠ - **قَوْشَات** \*  
 Delphinapteridae (S).  
 Delphinapteridae (F). Delphinapteridae (E).  
 فصيلة حيوانات بحرية لبونة من مرتبة مثالثات الانسان  
 ورتبة الحوتيات || انواعها المرفقة قليلة تتميز بصغر  
 الحماط وباندغام الزعانف الظهرية || اشهر انواعها  
 واعرنها القوتي والبالوفة .

٢٢٩٣١ - **قَوْسِس** \*  
 Otocoris (S).  
 Otocoris, Alouette de montagne (F). Otocoris (E).  
 جنس طير من فصيلة القريبات انواعه قليلة جميعها قاطعة  
 تجوب جبال البلاد الاسيوية والاروبية . تتميز بقصتها  
 الرأسية الفارقة التي تبدو كقرنين صغرين . انواعها متباينة  
 الألوان و ظهورها الى الريدة الحمراء المزاج يملؤها تجذيع  
 اسمر . بطونها الى الكهية البغراء . رؤسها واعناقها موشحة  
 بالاصفر || قوتها الحشرات والبرور البرية .

٢٢٩٣٢ - **قَوْلَان**  
 Koulan  
 هو فرس الهندي ، نوع من جنس الوشش ، اعطيه .

٢٢٩٣٣ - **قَوْلَد زَعْفَرَانِي** \* ، **قَوْلَد زَعْفَرَانِي** \*  
 Colias croceus (S). Coliade safran, le Souci (F).  
 Colias croceus (E).  
 حشرة من فصيلة الكرنيبات حرشغيات الاجنحة . موطنها  
 المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم . فراشها واثمة  
 قوتها مشر الازهار . شرقها تعيش على اوراق فصيلة  
 القرنيبات الفراشية || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٩ سم .  
 يسقطها نحو ٤٨ سم . رأسها اسمر اللون . عينها كبيرتان .  
 زباناها صولجانيان . جوشها يرتقالي الحلقة الصدرية  
 الاولى و اريد الثانية والثالثة . بطنها احمر اللون ، اسمر  
 المزاج عند الذكر ، اللمعة عند الانثى || رؤسها الالامانيان  
 الى الصفار . الزعفراني تملوه نقطة سوداء وجعدة كستنية عند  
 الذكر ، سوداء اللون عند الانثى . رؤسها الخلفيان الى  
 الصفار الزعفراني تتوسطه بقعة حمراء يملؤها اطراف اسمر  
 عند الذكر ، اسمر عند الانثى || لها جيلان في الجيل .  
 تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل  
 الثاني في آب . تسرح في النهار . تقابل بعد ظهورها  
 بستة اسابيع وتضع المكن مهادها على نصال الاوراق ||  
 البرقة تطول نحو ٤٢ سم . جسمها اسطواني الشكل . قوتها  
 الى الخضار الاصفر يملوه بطنان جانبيين اغبران قاطبان  
 وعشرة اطواق كستنية وتغطي متتابع اسود واصفر . رأسها  
 اسود . مدنها ورواجها الى السمرة || طول الاكمال الذي  
 يستمر في الجيل الاول نحو ثلاثة اسابيع ، يستمر في  
 الجيل الثاني نحو ٢٢ اسبوعا .

٢٢٩٣٤ - **قَوْسَس** العظم الثاني بين اذني الفرس .

٢٢٩٣٥ - **قَوْسَة** ، **قَوْسَة** \*  
 Salvia (S). Saugé (F). Sage (E).  
 جنس نباتات برية وحريرية من فصيلة الشفويات . انواعه  
 نحو ٥٠٠ مغطاة بجلي وبضفها جنيبي . منها الحولي  
 والحول والمعمر . سوقها خشبية فراءة سريعة الانقاص  
 اوراقها متعاقبة معتقة . ازهارها متباينة الاشكال والاحجام  
 والالوان . لاقية التجميع والارتكاز || اعرف واشهر  
 انواعها البرية والطيبة والحريرية ما يتبع .

نحو ٨ سم . وتعرض نحو ٥ سم . رؤسها الزهرية صغيرة  
 القد قطرها نحو ٢ سم . لسنتها متساوية الطول والمرض .  
 ضرره عديدة منها الاصفر والابيض . والنهي والبحري .

٢٢٩٣٢ - **قَوْشَس**  
 Milvgo (S).  
 جنس طير من فصيلة الاثيوريات ورتبة الجوارح جسمه  
 ربع القد طوله نحو ٤٠ سم . رأسه مستطيل الشكل .  
 سقطة غيبق مستطيل وذنبه كذلك وهو مسرول الرخ ،  
 دقيق الحبل || موطنه البلاد الاسيوية والامريكية .  
 اشهر انواعه قَوْشَس شيشيا .

٢٢٩٣٣ - **قَوْشَس شِيَشِيَا**  
 Milvgo chimachima (S). Chimachima (F).  
 طائر من القوقش ، طوله نحو ٤٠ سم . ثوبه الى الصمبة  
 الداكنة . قوادم سقطة موشحة بالابيض . منسره ازرق  
 اللون . رجلاه الى الخضار البحري . غاليه دقيقة || موطنه  
 امريكة الجنوبية يكثر في البرازيل والشيلى يعيش منفردا  
 الا في زمن الرضع والحضانة || قوته الجيف والزحافات  
 والاناعي والحشرات على اختلاف اجناسها . اثناء تحضن  
 من ٥ الى ٦ بيضات .

٢٢٩٣٤ - **قَوْشَس**  
 Helix (S). Escargot (F).  
 هو الحلزون ، اعطيه .

٢٢٩٣٥ - **قَوْشَس**  
 Cantharellus (S). Chantarelle (F).  
 جنس فطور من فصيلة الماريقونيات . انواعه قليلة تتميز  
 بطاريسها الخارجية الخادة المنتظمة التي تكثف كاسل  
 المسقلان || اعرف انواعه واشهرها الاصفر والبرتقالي .

٢٢٩٣٦ - **قَوْشَس اصْفَر** \*  
 Cantharellus cibarius (S). Chantarelle comestible.  
 Girolle, G. comestible (F).  
 فطر مأكول كبير القد ، يوتي الشكل ، عني الصفار ،  
 تحن الصفرة . يتباع الاطراس .

٢٢٩٣٧ - **قَوْشَس بُرْتَقَالِي** \*  
 Cantharellus coronilla (S). Chantarelle orangée.  
 Girolle orangée, Fausse girolle (F).  
 فطر مئذ وقد يكون ساقا في بعض الاحيان . مسقلان  
 اتل تجويفا من مسقلان البرتقالي الاصفر ، لونه الى البرتقالي .  
 اطراسه متقاربة الارتكاز خادة الاطراس .

٢٢٩٣٨ - **قَوْشَس**  
 Tetraogallus (S).  
 Tétragalle, T. du Caucase, T. Caspien (F).  
 Tetraogallus (E).  
 طائر وحيد الجنس والنوع من حمارة الحجلليات وفصيلة  
 الطيوريات . كبير الجثة طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه الى  
 الطحلة الربداء الموشة بالاسود والاصهب . متقار احدب  
 اسحب . عنقه مطروق الزور ، قوادم يفس القواعد سود  
 الاطراف ، اذنيكه كثيف الريش المستطيل اللبضع بالصمبة  
 والاسود . رصفه وغاليه الى الريدة || موطنه الجبال الريفية  
 المنقلية الاخمار . قوته الاحشاب والحويوب والساقل والجفور .  
 اثناء تبيض من ١٢ الى ١٦ بيضة تحضنها وحدها .

٢٢٩٣٩ - **قَوْشَس**  
 Narval (F).  
 هو حريش البحر ، اعطيه .



قَوْشَس اصْفَر



قَوْشَس بُرْتَقَالِي



قَوْشَس



قَوْلَد زَعْفَرَانِي



فَوَيْسَةُ الْجَبَل



فَوَيْسَةُ الْمَرْج



فَوَيْسَةُ غَمِيَّة



فَوَيْسَةُ قَاسِيَة

وفروعها خالية زباد. أوراتها يضيئة الشكل، نصلها مذهب الطرف سنن الحافة. أزهارها كبيرة القند مستطيلة لونها الى الحرة المايقة. توجبها تريبول الى اكمامها نحو ست مرات || أزهارها يستمر طوال الصيف .

**٢٢٩٤٣ - فَوَيْسَةُ سَمَاجُولِيَّة \* Salvia azurea (S). Sauge azurée (F).**  
جنية تريينية سروتيئة معمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها فروع خالية اللحم. أوراتها سائبة مضطوية، نصلها سنن الحافة اخضر اللون يطول من ٦ الى ٨ سم. أزهارها سبيلية التجميع، كبيرة، القند مسنجوية اللون. اكمامها لا قياسية الشكل والقند لونها الى الخضار المشرب الزرقاء || أزهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول.

**٢٢٩٤٤ - فَوَيْسَةُ صِينِيَّة \* Salvia flava (S). Sauge chinoise (F).**  
بجلة سروتيئة معمرة فروعها تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. أعطافها الصين. أزهارها غنقدوية التجميع، متشعبة، كبيرة القند، تطول من ٦ الى ٧ سم. اكمامها الى الاصفر الكبريتي يملو توضيح البرجواني || أزهارها يستمر من ايار الى ايلول.

**٢٢٩٤٥ - فَوَيْسَةُ غَمِيَّة \* Salvia verticillata (S). Sauge verticillée (F). Whorled blue flowered sage (E). Quiralsalvei (D). Salvia verticillata (I).**  
بجلة تريينية معمرة. ساقها فروع تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم. أوراتها قليلة الشكل نصلها جامد الصفعة الخشنة الزباد. أزهارها سبيلية التجميع. أزهارها سائبة مستطيلة القند زرقاء اللون || أزهارها يستمر طوال الصيف .

### ٢٢٩٤٦ - فَوَيْسَةُ هَيْكَلِيَّة الْوَرَق

**Salvia angustifolia (S). Sauge à feuilles étroites (F).**  
جنية تريينية سروتيئة معمرة . ساقها فروع تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. أوراتها ضيقة القند مدببة الاطراف تطول من ٤ الى ٨ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ أزهارها سبيلية التجميع ، زرقاء اللون ، صغيرة القند || أزهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

**٢٢٩٤٧ - فَوَيْسَةُ فِصِيَّة \* Salvia argentea (S). Sauge argentée (F).**  
جنية تريينية بجملة . ساقها فروع مزينة اللحم تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. أوراتها كبيرة القند نصلها خالي البشرة على صفحتي يملو كانه مطلي بالفضة. أزهارها متوسطة الحجم تطول نحو ٤ سم. لونها الى البياض العاجي يملو مزاج وردي . اكمامها غدية بدقة || أزهارها يستمر من ايار الى تموز .

### ٢٢٩٤٨ - فَوَيْسَةُ قَاسِيَّة \* وَ كَثَرُ الدَّب

**Salvia sclarea (S). Sauge sclairée, Sclairée, Toute-bonne, Orvale (F). Clary (E). Muskatalsalvei (D). Salvia sclarea, Matrisalvia, Tuttosana (I).**  
جنية رية مبدولة معمرة مسكية العرف الفواح . ساقها فروع تملو من ٤٠ الى ١٢٠ سم. أوراتها بسيطة يضيئة الشكل، نصلها يطول من ٧ الى ١٨ سم. ويوخل البشرة على صفحتي. أزهارها وردية اللون، ليلكية المزاج . اكمامها مسنة شاذكة قليلة الخمل || أزهارها يستمر من ايار الى ايلول.

### ٢٢٩٤٩ - فَوَيْسَةُ كَثِيرَة الزَّهْر

**Salvia patens (S). Sauge à grandes fleurs (F).**  
جنية تريينية معمرة . تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم. ساقها

**٢٢٩٣٦ - فَوَيْسَةُ الْجَبَل \* Salvia sylvestris (S). Sauge de montagne (F). Wild sage, Wood sage (E). Waldsalvei, Wilde Salvei (D). Salvia montana, S. salvatica (I).**

بجلة رية طيبة مبدولة معمرة . ساقها زباد فروع تملو من ٤٠ الى ٤٠ سم. أوراتها اطيالية ضيقة ، نصلها جامد الصفعة المسنة الخلية البشرة . أزهارها غنقدوية التجميع زرقاء اللون بنفسجية المزاج || تكثر في الاراضي الجبلية المخجاة منهاها الصعية المعوية عديدة ويقال انها تستعمل في علاجات الفالج .

### ٢٢٩٣٧ - فَوَيْسَةُ الْمَرْج \* Salvia pratensis (S). Sauge des prés (F).

جنية رية مبدولة معمرة . ساقها فروع زباد بدقة تملو من ٥٠ الى ٩٠ سم. أوراتها يضيئة الشكل ، قليلة القناعة . نصلها متشح الصفعة ، سنن الحافة يطول من ١٢ الى ١٧ سم. أزهارها غنقدوية التجميع ، زرقاء اللون ، بنفسجية المزاج ، متوسطة القند || أزهارها يحصل على دفتين الاول من ايار الى حزيران والثانية طوال الحريف .

### ٢٢٩٣٨ - فَوَيْسَةُ بَهِيَّة \* Salvia splendens (S). Sauge éclatante (F).

جنية تريينية معمرة ترعب في الموانع القليلة الرطبة . ساقها فروع تملو من ٥٠ الى ١٧٥ سم. أوراتها يضيئة بشدة نصلها رمل التسج الناعم ، سنن الحافة ، مائل البشرة على صفحتي. أزهارها سبيلية التجميع ، ياقوتية اللون تطول من ٥ الى ٧ سم. || أزهارها يحصل على دفتين الاول في الصيف والثانية في الشتاء .

### ٢٢٩٣٩ - فَوَيْسَةُ ثَنَائِيَّة الْوَلْن

**Salvia bicolor (S). Sauge bicolorée (F).**  
جنية تريينية معمرة فروعها تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. أوراتها مفردة ، مزينة ، دقيقة . أزهارها ثنائية اللون . اقسامها العليا الى الزرة البنفسجية المنسقة بالاصفر الدخعي ، اقسامها السفل الى البياض السوي . اكمامها متوسطة القند ، غدية النصل . غنقدودا الزهري يطول من ٥٠ الى ٦٠ سم. || أزهارها يستمر من ايار الى تموز .

### ٢٢٩٤٠ - فَوَيْسَةُ حَبَشِيَّة & اَيْثْيُوس

**Salvia aethiops (S). Sauge d'Ethiopie, Ethiopienne. (F). Ethiopian sage (E). Ungarische Salvei (D). Salvia di Candia, S. lanata (I).**

جنية رية طيبة معمرة . ساقها فروع زباد تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. وهي كثيفة الخمل والرب السوي الشكل . أوراتها متوسطة الطول ، نصلها خلي الصفعة . أزهارها صندرة القند يضيء اللون . اكمامها مزينة عادمة التنديق . توجبها يطول نحو ٢ سم. || أزهارها يستمر من حزيران الى تموز .

### ٢٢٩٤١ - فَوَيْسَةُ دَقِيْقِيَّة \* Salvia glutinosa (S). Sauge glutineuse (F).

جنية مبدولة معمرة تكثر في الجبال . ساقها فروع تملو نحو ١٠٠ سم. أوراتها السفل كبيرة القند تطول من ١٨ الى ٢٠ سم. نصلها غدي الصفعة . أزهارها تطول نحو ٤ سم. لونها الى الصفرة الجبلية . اكمامها انبوبية الشكل غدية البشرة || أزهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

### ٢٢٩٤٢ - فَوَيْسَةُ وَشِيْقَة \* Salvia elegans (S). Sauge élégante (F).

جنية تريينية معمرة تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. ساقها



٢٢٩٥٧ - قِيَاسٌ ، تَقْيِيصٌ ، انْفِطَاحٌ Grasserie  
مرض يصيب دودة القز في طورها النهائي أي قبل الصمود  
على الشَّح فَيَنْتَفِخُ جَسْمُهُ وَيَسْفِرُ لَوْنُهُ وَيَصْبِحُ جِلْدُهُ  
شَفَافًا يَفْرُزُ مَالِدًا غَرِيبًا يُلَوِّثُ الورق فَتَضْمَلُ أجهزةُها  
الدَّاخلية وتَمُوتُ ، ويمكن لَدُودِ المصاب بهذا المرض أن  
يَنْجُو سَلْبَتُهُ ويَتَحَوَّلُ فيها إلى خَادِرَةٍ وَلَكِنْ لَا يَلِثُ أَنْ  
يَمُوتَ فَيَصْبِحُ مَادَّةً فَاسِدَةً مَاتَةً تَعْلَبُ الغِلْبَةُ .

٢٢٩٥٨ - قِيَاسٌ Jockey  
هو الجُرْحُ ، اطْلُبْ .

٢٢٩٥٩ - قِيَاسٌ Mesure

٢٢٩٦٠ - قِيَاسُ الارتفاع ، تَقْدِيرٌ  
Nivellament (F). Levelling (E).  
تعيين الارتفاع النسبي لِمُخْتَلِفِ أجزاء الشيء .

٢٢٩٦١ - قِيَاسُ الأشعة Actinométrie (F).  
Actinometry (E).  
هو قياس قُوَّةِ الأشعة .

٢٢٩٦٢ - قِيَاسُ التَّحْلِيلِ Acétimétrie (F).  
Acetimetry (E).  
قياس درجة تَحْلِيلِ الخَلِّ أي حُوضَتِهِ .

٢٢٩٦٣ - قِيَاسُ الحُمُوضَةِ Acidimétrie (F).  
Acidimetry (E).  
قياس الحماض مجردة عن مائها .

٢٢٩٦٤ - قِيَاسُ الرُّطُوبَةِ ، وَزَاكَةُ  
Hygrométrie (F). Hygrometry (E).  
قياس كِبَةِ بخار الماء في الجو .

٢٢٩٦٥ - قِيَاسُ السُّكَّرِ Saccharimétrie (F).  
Saccharimetry (E).  
طريقة تَعْيِينِ مقدار السكر في السوائل والمُعَادَاتِ السكرية

٢٢٩٦٦ - قِيَاسُ القَلْبِي Alcalimétrie (F).  
Alkalimetry (E).  
معرفة مقدار القلبي الحقيقي في البوتاس وغيره .

٢٢٩٦٧ - قِيَاسُ الكُحُولِ Alcooolométrie , Alcométrie (F).  
Alcoholometry (E).  
مجموعة الأساليب أو الطرائق المتصلة لتحديد مقادير  
الكحول الموجودة في السوائل أو المشروبات الروحية .

٢٢٩٦٨ - قِيَاسُ أملاح الماء Hydrotimétrie (F).  
Hydrotimetry (E).  
قياس مقدار الأملاح الجصية الموجودة في الماء .

٢٢٩٦٩ - قِيَاسُهُ Mensuration (F).  
Measurement (E).  
وسيلة استقصاء تستعمل في الطب وفي علم الطابع والحيوان  
لتحديد بعض القياسات وتقدير مواقع وأحجام بعض  
الأعضاء .

٢٢٩٧٠ - قِيَاسِيٌّ ، تَنَاسُفِيٌّ Symétrique (F).  
Symmetrical (E).  
نعت تعريفي يطلق على ما كان منقسم التركيب منسوبه .

٢٢٩٧١ - قِيَاسِيَّةُ الشَّكْلِ Actinomorphe (F).

فروع زِيَاهٍ . أوراقها رحيمة الشكل ، نصلها خشن اللس  
متشعب الخنجر . أزهارها كبيرة القند زرقاء اللون . أكادها  
تطول نحو ٢ سم . وهي خلية البشرة || أزهارها يستمر  
من آب إلى تشرين .

٢٢٩٥٠ - قُوَيْسَة كَرْدِيْنَالِيَّة Salvia cardinalis, S. fulgens (S).  
Sauge cardinale (F).  
جَنِبَةٌ زُرِّيَّةٌ معمرة . ساقها متصبية فروعها تملو من ١٠٠  
إلى ١٢٠ سم . أوراقها بيضيه الشكل قليلة القاعدة تطول  
نحو ١٢ سم . نصلها جامد الصفحة خلي البشرة الخسل  
مدبب الطرف . أزهارها كبيرة القند أرجوانية اللون سلبية  
التجميع تتعاقب على إبعاد متساوية قدرها نحو ٣ سم .  
أزهارها يستمر من أيار إلى تشرين الأول .

٢٢٩٥١ - قُوَيْسَة مُتَقَابِلَةُ الْأَزْهَارِ Salvia oppositiflora (S).  
Sauge à fleurs opposées (F).  
جَنِبَةٌ بَرِيَّةٌ وَزُرِّيَّةٌ معمرة تملو من ٣٠ إلى ٨٠ سم .  
أوراقها بيضيه مقلوبة تطول من ٢٠ إلى ٥٠ سم . وتعرض  
من ١٥ إلى ٤٠ سم . نصلها خند الصفحة ، بارز المروق .  
أزهارها متقبلة التجميع ، متقبلة ، برتقالية اللون .  
أزهارها يستمر طوال الخريف .

٢٢٩٥٢ - قُوَيْسَة مَخْزَرِيَّةٌ \* ، مَرْمِيَّةٌ ،  
أَسْفَلَسٌ Salvia officinalis (S).

Sauge officinale, Herbe sacrée, Thé de France, Thé  
de Grèce (F). Common sage, Garden sage (E).  
Echte Salbei, Garsen Salbei, Salbay (D). Salvia offi-  
cinalis, S. grande, S. cultivata (I).  
جَنِبَةٌ بَرِيَّةٌ طَلِيَّةٌ مُمِزَلَةٌ معمرة . ساقها فروع زِيَاهٍ تملو من  
٢٠ إلى ٧٠ سم . أوراقها كاملة ، اعليجية ، اذينية للقاعدة .  
نصلها خلي البشرة على صفتيه . أزهارها بتضجية اللون  
تطول نحو ٣ سم . أكادها ملونة خلية || أزهارها يستمر  
من حزيران إلى تموز . وهي تستعمل استعمال الشاي . نمانها  
الصحية حديثة .

٢٢٩٥٣ - قُوَيْسَة مُشَدُّوْلَةٌ Salvia hians (S).  
Sauge béante (F).

جَنِبَةٌ بَرِيَّةٌ جبلية معمرة . ساقها فروع غدية لزجة تملو  
من ٦٠ إلى ٩٠ سم . أوراقها لا قياسية الشكل منها القبيضة  
والقلبية والرحمية ، جميعها مسطيلة الأضلاع المثلثية التي يبلغ  
طولها نحو ٢٥ سم . نصلها تطول من ١٣ إلى ١٥ سم .  
وهي مسنة الحانة خلية البشرة . أزهارها إلى الزرقعة الزاهية ،  
توجهها يطول نحو ٤ سم . قسمها العلوي منصف إلى الخارج  
يتميز كأنه مشقوق الشفة || أزهارها يستمر من تموز  
إلى آب .

٢٢٩٥٤ - قُوَيْسَة مُهَيَّجَةٌ  
هي المردكوش الآخر ، اطْلُبْ .

٢٢٩٥٥ - قُوَيْسَة يَابَانِيَّة Slavia nipponica (S).  
Sauge japonaise (F).  
بجلة بمرئية فروعها تملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم . أطرافها  
اليابان . ساقها وفروعها زِيَاهٍ القماء . أوراقها صغيرة القند  
خلية النصل . أزهارها صمية الارتكاز ، صقودية التجميع ،  
مسطيلة الشكل ، صفراء اللون . أكادها رطلة ضففاضة  
خلية البشرة || أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول .

٢٢٩٥٦ - قُوَيْسَة ، قُوَيْسَة Sauge (F).  
هي القويسة . راجعها .



قُوَيْسَة مَخْزَرِيَّة



المالية . بلايعطها عادة الحماط القرنية والاسنان الشفوية . لكنها مزودة بلواس مستطيلة تمحو زوايا الانشقاق ||  
سها أنواع تميش وتتكاثر في الاكواريوم ، اعصها قيطم  
لغيس (Xenopus laevis) .

٢٢٩٩٨ - قَيْصُومٌ هو السنور .

٢٢٩٩٩ - قَيْصُونٌ Chellanthus (S). Chélanthe (F).  
جنس سراسخ من البسباجيات . انواحه نحو ٣٠ اصلها  
تختلف مناطق العالم اعصها الاستوائية والحرارة .

٢٣٠٠٠ - قَيْقَبُكَائِسُ Céphalanthus (F).  
هو الرأسية ، اطليه .

٢٣٠٠١ - قَيْصَاوُسُ Cephé (F). Cephus (E).

كوكبية نجوم شمالية الموقع . مركزها بين الدجاجة والتنين  
وذات الكريسي . عدد نجومها ٢١ || والعرب تسمي النجم  
الذي على الصدر «النثرة» والذي على الكتف الايمن  
«الفرقة» . والذات التي تحصل من نجوم ذراعها وثا هو  
«خارج ضها» «القدر» . والذي على الرجل اليسرى يدعى  
«الراعي» . والنجوم الصغار الموجودة بين الرجلين تدعى  
«الاغنام» .

٢٣٠٠٢ - قَيْصَةُ Physionomie (F).  
Physiognomy (E).

هي مجموعة التفاضل والملامح والصفات الفارقة التي تميز بين  
شيء وشيئه .

٢٣٠٠٣ - قَيْصُوعٌ  
نبته ذات ثمرة في قرون وهي ذات ورق وغصنة تثبت بكل  
مكان (السان) .

٢٣٠٠٤ - قَيْقَبٌ \* ، زُرِّيَابٌ Garrulus lanceolatus (S). Geal lanceolé (F). Jay (E).  
طائر من الزرياب وفصيلة الغرابيات . يألف القفص  
فيقتبس الاصوات ويردها || وهو طائر مؤذ صار .  
شكله كالبومة ، جسسه يطوي نحو ٥ سم . اصدا الثوب .  
اسود الرأس . ازرق الزنكي . يجزع الجناحين والذنب  
بخطوط متراكبة السوداء والزرق والبياض || قوته الحبيب  
والثائر البانعة ويختلف انواع الصائير الصغيرة ويضعها  
وفراخها والمغاة والحشرات الكبيرة والصغيرة || يدن في  
الاشجار الحرجية الغظيلة ، اثناء تضع من ٤ الى ٦ بيضات  
تحضنها ١٦ يوماً .

٢٣٠٠٥ - قَيْقَبٌ هو القوقاز ، اطليه .

٢٣٠٠٦ - قَيْقَبٌ \* ، أُسْفُتْدَانٌ Acer (S).  
Erable (F). Maple-tree (E).

جنس اشجار حرجية ورزينة من فصيلة القيقبيات . انواعه  
نحو ١٨٠ منها الكبيرة القد والصغيرة . جميعها حسنة  
المحلول والقالب . سكرية المعصرة . اوراقها متعاقبة ،  
لاقياسية الشكل ، مسطحة هابل وبعضها ابيد . ازهارها  
تختلفة التجميع والالوان ، غزيرة الرحيق ، يجربها النحل .  
ثمراها جناسية مركبة من جناسيتين ملتصقتين || اعرف  
انواعه اشد حاداً منه .

يدوم من تموز الى آب . ثمارها لينة صغيرة تشبه حب  
الآس ، طعمها مر ، رائحتها ذكية . يقال انها مفادة  
للحيات نافعة وتختلف اوجاع الصدر وضيق النفس  
والمناسل . ويمن من قال انها من اللقويات وقد تستعمل  
ايضاً كطاردة للديدان || اما اسم مسك الجن فيطلق  
على عدة نباتات اعصها القيصوم والشفرور والزريرج والرامرام  
وشيشة الريح .

٢٢٩٩٠ - قَيْصُومٌ أَنْثَى Santoline (F).  
هو القيصون ، اطليه .

٢٢٩٩١ - قَيْصُومٌ جَبْكِي Achillé suave (F).  
هو الايجليا المنعشة ، اطليه .

٢٢٩٩٢ - قَيْصُومٌ طَبِي Armoise santonique (F).  
هو الشيح الخراساني ، اطليه .

٢٢٩٩٣ - قَيْصُومٌ كَانْفُورِي \* ، مُسِيكَةِ Artemisia camphorata (S). Armoise camphrée, A. dorée (F). Gold wormwood, Rock wormwood (E).  
Wermut (D). Assenzio salvatico (I).

نبات عشبي طوي يري من المركبات الانبوية الزهر .  
ساقه فراء تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه منعقة صغيرة  
القد ، غدية النصل . روحياته الزهرية خلية القناب ،  
ذوية اللون ، عذوية التجميع ، كافورية العرف المستحب .  
ازهاره يستمر من تموز الى آب .

٢٢٩٩٤ - قَيْصُ Coquille d'oeuf (F). Egg-shell (E).  
القشرة العليا اي الخارجية البايمة على البيفة اما القشرة  
الداخلية فتسمى الغرق .

٢٢٩٩٥ - قَيْطَايَا Noisetier de Turquie (F).  
هي البندق التركي ، اطليه .

٢٢٩٩٦ - قَيْطَسٌ ، قَيْطُوسُ Baleine (F).  
Cetus (E).

كوكبية نجوم جنوبية الموقع تشرق على خط الاستواء وتمتد  
جنوبي برج الحمل وبرج الحوت . وهي على صورة حيوان  
بحري مقدمه في ناحية المشرق ويؤخره في ناحية المغرب ||  
عدد نجومها ١٠٢ والعرب تسمي الكواكب التي في الرأس  
«الكف الجنباء» ومنها ثني يدعى «المنقب» . وتسمى  
الحسة التي في اواسط البدن «النامات» . والتي على اصل  
الذنب «النظام» . والتي على الشعبة الجنوبية من الذنب  
«الضفدع الثاني» . والتي على الشعبة الشمالية «ذنب قيطس  
الثاني» . وفي قعر قيطس نجم يدعى «الاصبوية» او  
«اصبوية قيطس» لان جسمه يتحول في اثناء مداره من  
المرئية الثانية الى الثالثة ولان لونه يتحول ايضاً من الاحمر  
الى الاصفر .

٢٢٩٩٧ - قَيْطَمٌ \* Xenopus (S).  
Dactylète (F). Xenopus (E).

جنس شفادع من فصيلة اللياليات عاداته السان .  
انواعه المعروفة قليلة العدد مهددا بعض المياه الافريقية  
اعصها مياه المناطق الاستوائية || اجسامها صغيرة تطول  
من ٧ الى ١٠ سم . رؤوسها مستطيلة . عيونها عادية  
الاجفان . كوكبها العليا عادية الاسنان . اصابع قوائمها  
الامامية عادية الخطاب اما الخلفية فكاملة الخطاب والثلاث  
الداخلية منها مفردة الاطراف باغداد قرنية المادة تبدو  
كالحبال || انشأت له ٢٠٠٠ دجلة تلتصقا بالثلاث



قَيْصُومٌ كَانْفُورِي



قَيْطَمٌ



قَيْقَبٌ

صفحة ثلاثية العروق ، بحرية اللون ، زيتية الملمح .  
أزهارها خضراء اللون . تنور في شهر شباط .

### ٢٣٠١٣ - قَيْبٌ لَتَرِي Acer tataricum (S). Erable de Tartarie (F).

شجرة حرجية سريرية تملو نحو ٨ أمتار. مدها آسية الصغرى ، أوراقها عابطة منقطة . نصلها بيضي الشكل ، قلبى اللامعة ، مذهب الطرف ، مسن الحافة ، أغصان الصفحة السفلى ، باهت الخضراء . أزهارها عذقية التجميع ، خاسية البتلات البيض جناحياتها متوازية المشافر . تنور في أيار .



قَيْبٌ حَبَرِي

### ٢٣٠١٤ - قَيْبٌ لَثَلِي الْأَجْرَاءُ Acer trifidum (S). Erable trifide (F).

شجرة حرجية وريديئة جادة تملو نحو ٨ أمتار. مدها اليابان ، أوراقها عابطة منقطة ثلاثية التفتيس . نصلها أسفني الشكل لامع الصفحة الخضراء . أزهارها عذقية التجميع ، فسقية اللون ، جناحياتها متصالبة المشافر . تنور في أيار .

### ٢٣٠١٥ - قَيْبٌ حَبَرِي \* جَرْمَشَق Acer pseudoplatanus (S). Erable sycamore, Faux platane, Grand érable (F). Great maple, Sycamore maple, Mock-plane (E). Bergahorn, Falscher platane (D). Acero liso, A. sicomoro, A. fico, Mollacero (I).

شجرة حرجية جبلية مبلولة تملو من ١٥ إلى ٤٠ م. أوراقها عابطة منقطة ، ثلاثية أو خاسية التفتيس ، تقوّل وتقرض من ١٠ إلى ١٥ سم. نصلها مائل البشرة على مسطحته وهو أخضر العليا بحري للسفل يتشعب ثم يحمر في الخريف . أزهارها عذقية التجميع متدلية . جناحياتها متبادعة المشافر ، حادة الزوايا . تنور من نيسان إلى أيار .



قَيْبٌ مَقْلِي

### ٢٣٠١٦ - قَيْبٌ حَقْلِي \* شَجَرَةُ الرَّبِّ Acer campestre (S). Erable champêtre, Auzevole (F). Bird's tongue, Dog oak, Maple tree, Master tree (E). Angerbinbaum, Feldshorn, Maszholder (D). Acero campestre, Averliello, Ceppolo (I).

شجرة سريرية مبلولة تملو من ١٥ إلى ٢٠ م. ساقها مغلقة اللحم . أوراقها عابطة منقطة صغيرة اللد ، ثلاثية أو خاسية التفتيس . نصلها جانبد الصفحة ، مبهر الحمل ، أخضر اللون . أزهارها عذقية التجميع خضراء اللون . جناحياتها أفقية المشافر . تنور من نيسان إلى أيار .

### ٢٣٠١٧ - قَيْبٌ دَلْبِي \* Acer platanoides (S). Erable plane, E. platane, Plane (F). Norway maple (E). Spitzahorn, Norwegischer ahorn (D). Acero platano, Amilacero, Acero riccio (I).

شجرة حرجية مبلولة تملو من ١٥ إلى ٣٠ م. أصطابها البلاد الباردة . ساقها ملساء ، مصاترة لبية . أوراقها ثلاثية التفتيس تقوّل من ٨ إلى ١٨ سم. وتقرض من ٩ إلى ٢٥ سم. نصلها مائل البشرة مذهب الطرف . أزهارها عذقية التجميع صفراء اللون . جناحياتها أفقية المشافر . تنور من نيسان إلى أيار .



قَيْبٌ دَلْبِي

### ٢٣٠١٨ - قَيْبٌ رَاحِي Acer palmatum, A. polymorphum (S). Erable palmé (F).

شجرة حرجية وريديئة تنفر من الآربة الكلسية . مدها الصين واليابان . تملو من ٥ إلى ١٥ م. أوراقها عابطة ،

### ٢٣٠٠٧ - قَيْبٌ أَيْضٌ Acer saccharinum, A. dasycarpum (S). Erable blanc, E. tendre (F). Silver leaved maple, White maple (E). Silber-ahorn, Weissahorn (D). Acero bianco (I).

شجرة سريرية حرجية وريديئة تملو من ١٥ إلى ٣٠ م. أوراقها عابطة منقطة ثلاثية أو خاسية التفتيس . نصلها يقوّل من ٦ إلى ١٥ سم. ويرمض من ٥ إلى ١٣ صفحته العليا باهتة الخضراء ، صفحته السفلى خلية البشرة ، غبراء اللون ، عادمة البتلات . جناحياتها كبيرة اللد متبادعة المشافر طولها يراوح من ٥ إلى ٧ سم. تنور من شباط إلى نيسان .

### ٢٣٠٠٨ - قَيْبٌ أَحْمَرُ Acer rubrum (S). Erable rouge, E. femelle (F). Red flowered maple, Swamp maple (E). Roter ahorn, Virginischer ahorn (D). Acero rosso (I).

شجرة سريرية حرجية وريديئة، مدها أمريكية الشالية . تملو من ١٠ إلى ٢٥ م. أوراقها عابطة منقطة ثلاثية أو خاسية التفتيس . نصلها يقوّل ويرمض من ٥ إلى ١٥ سم. صفحته العليا مائلة البشرة ، زاهية الخضراء ، صفحته السفلى خلية البشرة ، أزهارها عذقية التجميع حراء اللون . جناحياتها حر الأجن ، متبادعة المشافر . تنور من آذار إلى نيسان .

### ٢٣٠٠٩ - قَيْبٌ أَرْدِي Acer griseum (S). Erable gris (F).

شجرة حرجية وريديئة مدها الصين . تملو من ١٠ إلى ١٢ م. أوراقها مركبة ثلاثية الوريقات . نصلها بيضي الشكل ، ذرب الطرف يقوّل من ٥ إلى ٦ سم. وهو مسن الحافة ، خلي الصفحة السفلى . أزهارها متدلية ثلاثية أو خاسية التجميع ، مهدبة التوجعات والبتلات . تنور في أيار .

### ٢٣٠١٠ - قَيْبٌ الْيَابَانُ Acer japonicum (S). Erable du Japon (F).

شجرة وريديئة سريرية مدها اليابان. تملو نحو ٤ أمتار. ساقها ملساء اللحم ، فروصها مستطيلة، مستدقة ، جؤوية اللون . أوراقها عابطة منقطة خاسية أو سباعية أو تساعية التفتيس . نصلها مسن الحافة ، مائل البشرة ، أخضر اللون ، مذهب الملمح ، يحمر في الخريف . أزهارها عذقية التجميع حراء اللون . جناحياتها متوازية المشافر . تنور في أيار .

### ٢٣٠١١ - قَيْبٌ أَمْرَطُ Acer glabrum (S). Erable glabre (F).

شجرة حرجية جادة تملو من ٧ إلى ١٢ م. أوراقها عابطة منقطة ثلاثية التفتيس ، عنها جلوي اللون ، نصلها يقوّل ويرمض نحو ٧ سم. صفحته العليا لامعة البشرة شديدة الخضراء ، صفحته السفلى خلية غبراء . أزهارها عذقية التجميع . جناحياتها متبادعة المشافر . تنور في أيار .

### ٢٣٠١٢ - قَيْبٌ إَهْلِيَجِي الْوَرَقُ Acer oblongum (S). Erable à feuilles oblongues (F).

شجرة حرجية سريرية تملو نحو ١٨ م. مدها الصين . أوراقها عابطة منقطة ، نصلها حاد التفتيس ، إهليجي الشكل يقوّل من ١٥ إلى ٢٠ سم. ويرمض من ٥ إلى ٦ سم.

ويرض من ٩ إلى ١٢ سم. وهو مسن الحافة، خلى الصفحة السفلى، يصفر ويحمر في الخريف. جناحياتها مستطيلة الاذن متوازية المشافر. تنور في نيسان.

#### ٢٣٠٢٥ - قَيْبُ كَبِيرِ الْوَرَقِ

*Acer macrophyllum* (S). Erable à grandes feuilles (F).  
شجرة حرجية جاذحة تملو من ١٨ إلى ٢٥ م. أوراقها عابلة منقطة خاسية أو سباعية التفصيص تطول نحو ٣٥ سم. وتعرض نحو ٢٥ نصلاها لامع الصفحة العليا الخضراء اللون، أزغب السفلى. أزهارها عنقودية التجميع، متدلية، فصلها واسديتها خلية البشرة. جناحياتها متوازية المشافر الزباء. تنور من نيسان إلى أيار.

#### ٢٣٠٢٦ - قَيْبُ مَرَايِي الْوَرَقِ

*Acer negundo*, *Negundo fraxinifolium* (S). Erable à feuilles de frêne (F).  
شجرة حرجية وريينية مهدا امريكة الثنائية تملو من ١٥ إلى ١٥ م. أوراقها مركبة وريّة التجميع. وريقاتها خمس أوسع، نصلاها لا قياسية الشكل تطول من ٥ إلى ١٣ سم. لونها أل الخضار الجميل اللامع يملوه توشيح اصفرارياض. أزهارها عنائيد مستطيلة متدلية. جناحياتها متساوية المشافر الدقيقة المستعرة. تنور في نيسان.

#### ٢٣٠٢٧ - قَيْبُ مُسْتَدِيرِ الْوَرَقِ

*Acer circinnatum* (S). Erable à feuilles rondes (F).  
شجرة حرجية وريينية تملو من ٨ إلى ١٢ م. فروصها واخفافها إلى الجؤوة. أوراقها عابلة، منقطة، ثلاثية التفصيص. نصلاها مستدير الشكل قطره نحو ١٠ سم. صفحته خضراء اللون، خلية العروق، مسنة الحافة، تحمر في الخريف. أزهارها عنقودية التجميع، متدلية. فصلها إلى الحمرة. يتلأها إلى البياض. جناحياتها صغيرة اللد شبه مستديرة. تنور في أيار.

#### ٢٣٠٢٨ - قَيْبُ مِلْثَانِ

*Acer opalus* (S). Erable opale, Duret, Ayzale (F).  
شجرة سبروتية مبدولة تملو من ٨ إلى ٢٥ م. أوراقها عابلة ثلاثية التفصيص. نصلاها يميني الشكل، مستطيلة الطرف، مسن الحافة، بارز العروق المتتامة. أزهارها عنقودية التجميع. جناحياتها متبادلة المشافر. تنور من نيسان إلى أيار.

#### ٢٣٠٢٩ - قَيْبُ مِيَايِي

*Acer miyabei* (S). Erable de Miyabe (F).  
شجرة حرجية تملو نحو ١٢ م. مهدا اليابان. ساقها مغلقة المعاد. أوراقها عابلة ثلاثية التفصيص. نصلاها اخضر الصفحة العليا، خلى السفلى، باهت العروق. أزهارها عنقودية التجميع، جناحياتها خلية البشرة. تنور من أيار إلى حزيران.

#### ٢٣٠٣٠ - قَبَائِلَات، أَسْتَدَ كَابَات

*Aceraceae* (S). *Acéracées*, *Acérinées* (F). *Aceraceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين كثيرة التعلات، اجناسها وانواعها عديدة اشهرها القيقب || جميع نباتاتها شجرية. اغصانها صناعية مرموقة يكثر فيها اللون الاحمر.

منقطة، خاسية أو سباعية التفصيص. نصلاها جامد الصفحة، راسي الشكل، اخضر اللون، مذهب الموج. أزهارها عنقودية التجميع حراء اللون. تنور في أيار.

#### ٢٣٠١٩ - قَيْبُ رُبَاعِي الْأَجْزَاءِ

*Acer tetramerum* (S). Erable tétramère (F).  
شجرة حرجية سبروتية تملو من ٥ إلى ٨ امتار. مهدا الصين. أوراقها عابلة منقطة يمينية الشكل. نصلاها يطول من ٥ إلى ٨ سم. ويرض من ٣ إلى ٥ صفحته السفلى خلية البشرة، خاسية العروق البارزة، حتاره مزدوج التنسين. أزهارها عنقودية التجميع، رباعية الاجزاء والبتلات اخضر. تنور في أيار.

#### ٢٣٠٢٠ - قَيْبُ زُرْعُورِي الْوَرَقِ

*Acer crataegifolium* (S). Erable à feuilles d'aubépine (F).  
شجرة حرجية تملو نحو ٨ امتار. مهدا اليابان. أوراقها عابلة منقطة. نصلاها ثلاثي التفصيص مسن الحافة يطول من ٤ إلى ٨ سم. ويرض من ٣ إلى ٦ سم. وهو اخضر الصفحة العليا، بحري السفلى، يحمر في الخريف. أزهارها عنقودية التجميع لوناً إلى الخضار القستي. جناحياتها مستقيمة الزوايا. تنور في أيار.

#### ٢٣٠٢١ - قَيْبُ سَكْرِي

*Acer saccharum*, *A. barbatum* (S). Erable à sucre, E. dur (F). Hard-maple, Rock-maple, Sugar-maple (E). Zuckerahorn, Zucker massholder (D). *Acero zucherino*, *A. del Canadie* (I).  
شجرة سبروتية داتحة تملو من ٣٠ إلى ٤٥ م. ساقها ملساء، عصارتها غزيرة للمادة السكرية. أوراقها عابلة، منقطة، ثلاثية التفصيص، تطول من ١٥ إلى ١٥ سم. وتعرض اللون ١١ إلى ١٦، نصلاها مائل البشرة، مدب الطرف، اخضر الصفحة العليا، بحري السفلى، يحمر في الخريف. أزهارها عنقودية التجميع، غبراء اللون. جناحياتها اقنية المشافر. تنور من نيسان إلى أيار.

#### ٢٣٠٢٢ - قَيْبُ سَكْسِي الْوَرَقِ

*Acer dissifolium* (S). Erable à feuilles de cissus (F).  
شجرة سبروتية وريينية مهدا اليابان تملو من ١٥٥ إلى ٣٠٠ م. أوراقها مركبة، وريّة التجميع، لا قياسية اللد. وريقاتها غريرية الشكل تطول نحو ٨ سم. نصلاها مائل البشرة على صفحته، مسن الحافة. أزهارها خلية، رباعية الفصول والبتلات. جناحياتها صغيرة اللد، متبادلة المشافر. تنور في أيار.

#### ٢٣٠٢٣ - قَيْبُ شَرْمِي الْوَرَقِ

*Acer caprinifolium* (S). Erable à feuilles de charme (F).  
شجرة حرجية سبروتية تملو من ٥ إلى ٨ امتار. مهدا اليابان. أوراقها عابلة منقطة. نصلاها لامع الصفحة المحبونة المسنة الحافة، بارز العروق التي يراوح حددها من ١٦ إلى ٢٥ زوجاً. أزهارها عنقودية التجميع متدلية، رباعية البتلات الاخضر. جناحياتها مستقيمة المشافر. تنور في أيار.

#### ٢٣٠٢٤ - قَيْبُ شَيْطَانِي

*Acer diabolicum* (S). Erable diabolique (F).  
شجرة جاذحة مهدا اليابان تملو من ٦ إلى ١٥ امتار. أوراقها عابلة، منقطة، ثلاثية التفصيص. نصلاها يطول

Hématocèle (F). **ثِقَّة دَمَوِيَّة** ٢٣٠٣٦  
 Haematocèle (E).  
 ورم يسببه ارتشاح الدم في بعض أجزاء الجسم .

Despotique (F). Despotie (E). **ثِقَتِيَّة** ٢٣٠٣٧  
 تمت تعريفه يطلق على كل ما هو استبدادي أو تصفي .  
 كقولك سلطة ثِقَتِيَّة أو حاكم ثِقَلِي .

Curateur (F). **ثِقَم** ٢٣٠٣٨  
 Guardian, Trustee (E).  
 هو الذي يمين لإدارة مال المحجور عليه أو لإدارة شؤون القاصر .

Valeur (F). Value (E). **ثِقَمَّة** ٢٣٠٣٩  
 هي من الشيء أو قدره أي ما يقوم مقامه . ج ثِقَم . والثِقَمَة تستعمل في تمايز عديدة . أشهر حينها ما يلي :

Valeur locative (F). **ثِقَمَة إيجارية**  
 Valeur déclarée (F). **ثِقَمَة مصرَّحة** ، **ثِقَمَة مبنية**  
 Valeur vénale (F). **ثِقَمَة متعامل بها**  
 Valeur agréée (F). **ثِقَمَة معتمدة**  
 Valeur fournie (F). **ثِقَمَة مقدَّمة**  
 Valeur mobilière (F). **ثِقَمَة منقولة**

Coquillière (F). Conchiferous (E). **ثِقَلِيَّة** ٢٣٠٣١  
 قشرة البَيْضَة الرقيقة الداخلية تغلف البياض تحت القيقص ج قيقص .

Taon des bœufs (F). Ox-fly (E). **ثِقَلِيَّةُ بَقَرِيَّة** ٢٣٠٣٢  
 ذبابة مؤذية من البقرات . أُناسُها تلسع البقر ولا تمتع من الجُحيل والحُمير ، راجع نمرة البقر .

Cuculidae (S). **ثِقَلِيَّوِيَّات** ٢٣٠٣٣  
 Cuculidés, Cuculés (F). Cuculidae (E).  
 فصيلة طير من رتبة المُسلَّقات . اجناسها وأنواعها عديدة

تجميع إلى ثمان عائر ، أشهرها البُرَقَاتِيَّات . أصلها العالم .  
 تألفت الأراجح الكثيفة . معظمها من القواطع التي تجوب البلاد في طلب الحُصيف والمُشَى . قوتها الحشرات والذويويات وهي لا تحسن يبيها ولا ترق فراسها .

Despote (F). Despot (E). **ثِقَل** ٢٣٠٣٤  
 الثقل الحاكم المطلق التصرف المستبد .

Hydrocèle (F). **ثِقَلَة** ٢٣٠٣٥  
 هي الأذرة ، أظها .

جدول ١  
 القيمة الغذائية في لتر واحد من الثمار للمرحلة ادناه

النوع	خلاصة جافة غ	حواض <sup>(١)</sup> غ	سكر منحل <sup>(١)</sup> غ	سكروز	رمان	بروندي ٦,٢٥ × ٨ غ	سرعة (وحدة حرارية)
اجاص	١٧٢	٢,٧	٩٠	١٣	٣,٥	٣,٥	٥٦٧
اناس	١٦٠	٦,٧	٣٥	٧٥	٥,٢	٤,٣	٥٩٥
برتقال	١٥٧	١٣,٥	٦٠	٢٥	٤,٨	٧,٠	٥٨٠
نفاخ	١٦١	٦,٥	٨٣	١٦	٤,١	٣,٧	٥٧٠
تين	٢١٥	٠	١٥٨	٠	٧,١	١١,٥	٧٤٥
عنوخ	١٩٦	٩,٥	٧٥	١٨	٥,١	٦,٩	٧١٨
عنوخ زركلود	١٨١	١٢,٥	٦٥	٣٦	٦,٠	٦,٥	٧٠٤
دراق	١٧٣	٨,١	٣٥	٤٢	٥,٨	٦,٦	٦٠٨
سفرجل	١٨١	٩,٣	٦٧	٦	٥,٨	٤,٨	٥٨٥
شمشون ثوت	١٥٠	٨,٦	٥٥	٤,٧	٥,٠	٩,٦	٤١١
شبلك (فرارلة)	١٤٦	١٨,٤	٥١	٧	٧,٤	١٠,٦	٤٣٣
عنب	٢٠٩	٧,٧	١٥٠	٠	٤,٨	٥,٩	٥٥٧
قام احمر	١٦٣	١٩,٨	٨٢	٥,٣	٢,٦	٥,٩	٥٦٠
قام آسي	١٦٤	٨,٥	٥٤	٢,٢	٣,٧	٦,٨	٥٢٧
كرز	١٨٣	٦,٨	١٠١	٥,٧	٤,٩	٧,١	٦٨١
كشمش شالك	١٤٥	١٩,٠	٥٥	٤,٨	٤,٩	٧,٧	٤٤٥
كشمش هنودي	١٦٢	٢٣,٠	٥٠	٢,٤	٦,٦	١١,٢	٤٤٠
ليون حامض	١٧٤	٥٤,٠	٣٠	٣٠,٠	٥,٦	٦,٣	٥٧٥
شمش	١٤٨	١٢,٧	٣١	٣٦,٠	٦,٧	٨,٠	٥١٦
موز	٢٦٢	٣,٨	١٠٨	٨٩,٠	٨,٩	١١,٣	٩٧٠

(١) الحواض هي تمثل في تركيب الثمار عديدة ، لا مجال للذكرها الزائد ، لتبسيطها نقض في المليون في المليون في الجدول .

جدول ٢  
القيمة الغذائية في أشهر البقول وفي بعض الثمار الجافة<sup>(١)</sup>

النوع	ماء %	مواد معدنية %	بروتين %	مواد دهنية %	غليسيريد %	عدد السعرات في كيلوغرام واحد
بازيلا خضراء	٧٨	٠,٨٠	٤,٧٠	٠,٣٠	١٠,٤٠	٦٥٠
بصل	٨٨	٠,٦٠	٠,٦٠	٠,٠٧	٦,٢٠	٢٨٩
بطاطا	٧٥	١,٠٠	١,٥٢	٠,٠٧	٢٠,٧٠	٩١٨
بندورة	٩٣	٠,٥٠	٠,٧٠	٠	٢,٢٠	٢١١
ثوم	٦٤	١,٤٠	٣,٤٠	٠,١٣	١٧,٤٠	٨٥٤
جزر	٨٨	٠,٧٠	٠,٧٧	٠,١٣	٦,٩٠	٣٢٥
حمص (جاف)	١٤	٢,٨٠	١٦,٣٠	٠,٦٠	٤٤,٧٠	٢٥٦٠
عُرشوف	٨٦	١,٣٠	١,٣٠	٠,٠٥	٥,٥٠	٢٨١
عُش	٩٢	١,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٢	٣,٠٠	١٨٩
عُيار	٩٥	٠,٤٠	٠,٤٥	٠,١٠	٠,٧٠	٥٩
دجاج زراعي	٨٠	١,٠٠	٠,٥٠	٠,٢٠	٩,٨٠	٤٤٥
سبانخ	٩٣	١,٩٠	١,١٠	٠,١٠	١,١٠	١٠٧
سرفل لقي	٦٥	١,٧٠	١,٩٥	٠,١٦	١٨,٤٠	٨٣٨
سلق	٩٢	١,٦٠	١,٢٠	٠,٢٠	١,٩٠	١٤٧
شعير	٩١	٠,٥٠	٠,٦٠	٠,٠٨	٥,٣٠	٢٥٠
شندر سكري	٨٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,١٠	١٥,٤٠	٦٧٩
سوجا (جافة)	١٠,٢٠	٥,٢٠	٢٣,٦٠	١٧,٢٠	٢٣,٠٠	٣٥١٤
عُش (جاف)	١٢,١٠	٣,٠٠	١٨,١٠	٠,٦٠	٤٤,٦٠	٢١٣٠
فاصوليا (جافة)	١٤	٣,١٠	١٨,٠٠	٠,٥٠	٤٠,٢٠	٢٤٣٠
فجل	٩٣	٠,٧٠	٠,٩٠	٠,١٠	٣,٢٠	١٧٦
فستق عبيد	٧,٥٠	٢,٤٠	١٩,٣٠	٤٠,٠٠	١٣,٢٠	٥٠٦٠
فول أخضر	٨٢	٠,٨٠	٤,٣٠	٠,٢٠	٧,٤٠	٥٠٢
قرع	٩٠	٠,٧٠	٠,٥٠	٠,٠٧	٤,٢٠	٢٠٢
قرنيط	٩٤	٠,٨٠	١,٢٠	٠,١٧	٣,٠٠	١٨٩
كرات أندلسي	٧٥	٠,٥٠	١,٣٠	٠,٠٥	١٧,٠٠	٧٥٥
كرات معروف	٨٨	١,٢٠	١,٤٠	٠,١٥	٤,٣٠	٢٤٩
كرنس	٩٠	١,٤٠	٠,٥٠	٠,١٧	٤,٣٠	٢١٠
كرنب	٩٠	٠,٧٠	٠,٦٠	٠,١٠	٤,٠٠	٢٠٠
لفت	٨٩	٠,٧٠	٠,٧٠	٠,١٠	٤,٩٠	٢٣٦
لوبيا خضراء	٨٩	٠,٧٠	١,٣٠	٠,١٠	٤,٢٠	٢٣٤
ملفوف	٨٠	١,٥٠	٢,٤٠	٠,٤٥	٦,٨٠	٤٢٠
هليون	٩٤	٠,٦٠	١,٠٠	٠,٠٧	١,٦٠	١١٠
هدب (طرعشقون)	٨٥	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٤٠	٦,٣٠	٢٥٠
بندق	٧,١٠	٢,٥٠	١٢,٢٠	٥٦,٣٠	٦,١٠	٦٠٢٦
جوز	٧,٢٠	١,٦٠	١١,٧٠	٥٢,٦٠	١١,٠٠	٥٨٢٤
فستق	٧,٠٠	٢,٠٠	١٣,٥٠	٥٠,٢٠	١٠,٥٠	٥٧٦٠
لوز	٦,٣٠	٢,٣٠	١٥,٠٠	٤٧,٨٠	١١,٢٠	٥٥٢٠
كستناء	٤٧,٥٠	٢,٠٠	٤,٣٠	٣,٧٠	٣٣,٥٠	١٩٠٠

(١) القيم الغذائية المدونة في الجدولين ١ و ٢ هي قيم مريضة لا تعمل نيا كغشور والبدور.

مستطيلة ذرية . ألوانها متراكبة الألوان || تألف النباتات ويجاري الماء . قوتها المطاء والخشرات اخصها الجراد . تنش في تجاريف الاشجار . اناثها تضم من ٣ الى ٤ بيضات مستديرة الشكل تحضنها بمناوبة الذكور .

٢٢٠٤٦ - قِوْن الجَبَل (F). Cuon de montagne  
حيوان مفترس يدعى شهل الشال ، اطلقه .

٢٢٠٤٧ - قِوْن العَاب \* ، قِوْن اِزْمِرْتِي (F).  
Halcyon smyrnensis (S). Halcyon de Smyrne (F).  
Halcyon (E).

طائر من المازوريات . موطنه يمنة من الشرق الاوسط الى الهند وسيام وجزر الزابج . اعطاه اليناثية تشمل بعض الرياض وصفات الأخر في فصل الخريف || جسمه متوسط القد ، منكش الشكل . طوله نحو ٢٢ سم . وبسطه نحو ٢٨ سم . ثوبه متراكب الألوان . رأسه وصفه وخوشاه ويطنه الى الكتكتائي الداكن . زوره وأعل صدره الى البياض . رداؤه وظهره وصبره الى الزرقه الخضراء . جناحه متراكب الازرق والاخضر والامود والكتكتائي والابيض . قوادمه الى الزرقه الخضراء . كلاه الى السمرة القاتمة . اياهره الى السمرة المنطية . مناكبه مجذعة بالابيض حينه كيرتان . حلقه حينه صناعية . متقاده كبير الجرم . مستطيل الشكل ، محدوب الذك الاسفل ، احر اللون . ساقاه الى الجؤرة وصفه قصيرة سَرْدِيَة القشار || يألف الغايات والرياض ويجاري الماء . قوته المطاء والخشرات اخصها السحالي والجنادب والجراد || يذش عشه في تجاريف الاشجار . الانثى تضم من ٣ الى ٤ بيضات كروية الشكل ، عاجية اللون تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٨ يوماً . يعتبر من الطيور النافعة .



قِوْن العَاب

٢٢٠٤٨ - قِيمَة غِذَائِيَة (F). Valeur alimentaire (F).  
Alimentary value (E).

القيمة الغذائية هي ما يحويه الغذاء من عناصر تتحول في الجسم بعد الانضمام والتشيل الى طاقة ومواد استيعابية لا حياة الجسم بدونها || وقد وضعنا في الجدول الاول ما نيسر لنا من القيم الغذائية المائدة لبعض الثمار المشهورة . اما الجدول الثاني فللبقول والبعض الثمار الجافة .

٢٢٠٤٩ - قِيمَة مَرِيئِيَة (F). Valeur alibile (F).  
Nutritive value (E).

هي نسبة ما تحويه كل مادة من عناصر غذائية قابلة التشيل والانسجام .

٢٢٠٥٢ - قِيتَس (S). Tragelaphus angasi (S).  
Tragelaphe d'Angas (F).

نوع من الجهيل وهو اكبر جفء من البرع واصغر من البلب . ثوبه احمر اللون يملوه موج اصفر وتجذيع ابيض . موطنه جنوبي شرقي افرقية .

٢٢٠٥٣ - قِيشَل \* ، قِيشَلَة (F). Face (F).  
وجه الشيء كقولك قيشل البناء ...

٢٢٠٥٤ - قِيشَلِي (F). Facial (F).  
نعت تعريضي يطلق كل ما له صلة بالثعلب .

٢٢٠٥٥ - قِوْن ، دِلِك البَحْر (F). Halcyon (F). Halcyon, Kingfisher (E).

جنس طير من المازوريات . انواعه قليلة العدد اعطاهها البلاد الافريقية واسترالية . اجسامها متوسطة القد . مناتيرها



٢٣١٤١ - **كاميلية ٥**  
Contidiphore  
جهاز تكاثرى تتميز به بعض الفطور الخيطية . قوامه سوط نواصى التركيب ، قاعدة ارتكازه المشيج ، طرفه صني الشكل ، ينتهي بشقيرة أو يشماغ من الشفاير يحمل الكائنات المرصوفة المتتابعة كجويب السحبة .

٢٣١٤٢ - **كانون الأول**  
D cembre (F).  
December (E).

يعرف أيضاً بـسبتمبر . الشهر الثاني عشر من السنة الشمسية وهو من شهور الخريف والشتاء . مدته واحد وثلاثون يوماً . في اليوم الرابع عشر منه يتبدئ الأريبيينيات . وفي الواحد والعشرين ينتهي فصل الخريف ويكون الانقلاب الشتوي وهو ما يعنون به مخرج النور من حد نقصان إلى حد الزيادة . وفي الثاني والعشرين يتبدئ فصل الشتاء فتخرج الشمس من برج الرامي لتدخل في برج الدلو . **تقويمه الزراعي** - احص اعماله الزراعية ما يتبع :

١ - في الزراعات العامة الموسمية . متابعة وإهاء بذر الفول والعدس والباقية وسائر النباتات العطفية . متابعة توصيب وورم أوراق التبغ الجافة . تحضير مشاتل التبغ وتوزيع الاسمدة العضوية حل الاكباد .

٢ - في الاشجار المثمرة ، متابعة اعمال المكافحة الشتوية والتسميد الكيماوي في المناطق الساحلية والوسطى . الابتداء بالتقليم مع الانتهاء إلى وجوب جمع كل ما انتظم من الاشجار وحرقه يونياً . المباشرة بفرض النصبوب في المناطق التي لا تحضن التلج والاعتناء بالسقاية بعد الفرس لتأمين البيئة الفضل الضرورية . اتخاذ الحيطه اللازمة لمنع ركود المياه في تربة البساتين . متابعة تشذيب وتسميد وحرق الكرمه والزيتون . وتوزيع الاسمدة العضوية حل الموز . تغليف كيانسه اي طروحه لوقايتها من البرد والتصقيع . إنجاز تفضيد البزور ثم تليطها في المشاتل الخاصة بها او في مستقرها . اقتلاع النصبوب المدة الفرس قبل طفر البزرام .

٣ - في الحفصيات : متابعة قطاف البرتقال وتوزيع الاسمدة الكالمة والحامسة وفرس نصبوب التاننغ (ابو صفيه) في البساتين المستحدثة وتقليم نصبوب المشاتل .

٤ - في الاشجار المختلفة : فرس نصبوب الاشجار الحرجية والتريينية وتفرع وتشذيب وتقليم معظم اشجار الحدائق والطرقات .

٥ - في البقول واللوز . متابعة العناية بالتربة والنبات ومشاتل البنورة والخس والباذنجان وباكود الزبيب والرجس والسون .

٢٣١٤٣ - **كانون الثاني**  
Janvier (F). January (E).

يعرف أيضاً بـيناير . الشهر الاول من السنة الشمسية وهو من شهور الشتاء الغزيرة الامطار . مدته واحد وثلاثون يوماً . في اليوم الثاني والعشرين منه تنتهي الاربيينيات . **تقويمه الزراعي** - احص اعماله الزراعية ما يتبع :

١ - في الزراعات العامة الموسمية . تفقد زروع المحطة واستلحاقها بالاسمدة الازوتية التجارية اذا كانت متأخرة او سقيمة . حرق التربة المملدة لزراعة التبغ اذا كان سرحها لم يتيسر في الشهر المنصرم . اعداد مشاتل التبغ وتحضير الاكباد والمباشرة بنف البزور .

٢ - في الاشجار المثمرة : متابعة فرس الاشجار المثمرة والمكافحة الشتوية والتسميد والتقليم . المباشرة بمعالجة فسائل السفرجل والربان والتفاح الجست مولين والكرمه والزيتون . متابعة تغليف كبائس الموز .

التركيب ، مسننة الاطراف . انماها فردية او صندوقية التجميع كبيرة القند يبيض اللون او حمره || أشهر اجناسها الاناي والكانيليا .

٢٣١٣٣ - **كاميلية**  
Cam line (F).  
هي النصار ، اطلبه .

٢٣١٣٤ - **كاميلينيات**  
Cam lin es (F).  
هي النصاريات سبط من فصيلة الصليبيات .

٢٣١٣٥ - **كامين**  
Latent (F). Latent, Hidden (E).  
ما هو مقدور الوحيد الخفي .

٢٣١٣٦ - **كامليات ٥**  
Chamidae (S).  
Chamid s, Camac s, Chamac s (F). Chamidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشم . اجناسها وزواحف المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الاراضي الجورية والطباشيرية . انواعها المعاصرة منتشرة في سبط بحار البلاد الاستوائية والحرارة || اعدادها متفاوتة الاشكال والحجوم . ثنائية المصاريح الانطماضية للانتماسوية جميعها عادمة المناشب . مستغلة الاربيل || اعرف اجناسها واشهرها الكامة والظفير .

٢٣١٣٧ - **كاميليا \***  
Camellia (S).  
Camellia, Camelia (F). Camellia (E).  
جنس اشجار وشجيرات وسجات برية وتربينية من فصيلة الكاسليات . انواعها نحو ١٤ سوفها منتصبة قوام . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، متعقة ، كاملة . فصالحا جامدة الصلصة حيلة الخضار الزاهي . انماها ابطية او تاجية الارتكاز ، كبيرة القند ، خالصة او مسابية الفصل وخاصة او مسابية او تسمية البيلات المندمجة القواعد || اعرف انواعها وأشهرها ما يلي .

٢٣١٣٨ - **كاميليا سرديّة**  
Camellia reticulata (S). Camellia r ticul  (F).  
نوع من الكاميليا افاخر الصنف . جنبه جاذبة متوسطة القند فرح تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها سرديّة حابة الخضار . انماها عادمة البرف ، كبيرة القند ، ظهرا براوح من ١٣ الى ١٥ سم . لوها الى الحمة الكروية انماها يستمر من آذار الى نيسان .

٢٣١٣٩ - **كاميليا سستكا**  
Camellia sasanqua (S). Camellia sasanqua (F).  
نوع من الكاميليا وهي جنبه سرديّة فرح تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها مقطوعة القاعد مسنة الحافسة . انماها مكسبة ظهرا براوح من ٦ الى ٨ سم . لوها الى البياض المالحى || انماها يستمر من شباط الى حزيران .

٢٣١٤٠ - **كاميليا يابانية**  
Camellia japonica (S). Camellia du Japon, Rose du Japon (F). Camellia, Japan rose, Rose of the world (E). Japansche Kamellie, Japansche Rose (D). Camellia, Rosa del Giappone (I).  
نوع من الكاميليا الشائع الزواحف . ضروب واصرامه نحو ١٥٠٠ جميعها هريبة الشكل تملو من ٤ الى ٦ امتار . اوراقها ماسلة ، لامة ، حيلة الخضار . انماها عادية او مكسبة ، كبيرة القند ، عادمة البرف ، يبيض اللون او حمره .



كاميليا



كارشیر

Cédrat (F). ٢٣١٥٨ - كُنْدَاكَة \*

في الآترية، ثمرة الآرج، اطلبها .

Lasius (S). ٢٣١٥٩ - كُنْبَار \*

Lasius (F). Lasius (E).

جنس بل من فصيلة المبرويات يتميز باستطالة القوائم وبضخامة البطن || أنواره المبروة عديدة اعطائها البلاد الحارة والمتعددة الحرارة من العالم القديم . بعضها حرجبي بألف الغابات والبعض الآخر يعيش في الحدائق قرب المنازل المسكونة وفي الخربات || معظم أنواعه يتغذى ثرية الآرق اما في ذوالجب قراه او على النباتات البطيبة والرائجة والاشجار المثمرة .

Cârier (F). ٢٣١٦٠ - كُنْبَار

هو الكبر، اطلبه .

Capparidées (F). ٢٣١٦١ - كُنْبَارِيَات

سبط من الكبريات أشهر اجناسه الكبر .

Epoque de fructification (F). ٢٣١٦٢ - كُنْبَاس

Epoch of fructification (E).

الكباس هو الزمن الذي يتسبق تفتح اكام الاشجار عن ازدهارها وقد يشمل ايضا زمن الانزهار والعقد .

Régime de dattes, R. de bananes (F). Bunch, Cluster, Stem (E). ٢٣١٦٣ - كُنْبَاسَة

هي القنار والقنر وهي من النخل كمنقود العنب من الكروية . وهي في الموز مجموعة امشاط الطرح الشري . ج كُنْبَاس

Plantain triomphe (F). ٢٣١٦٤ - كُنْبَاش

هو لفحة النجمة ، اطلبها .

٢٣١٦٥ - كُنْبَان

داه يصيب الايل ينقبض ثم تسكن كالي اعياما الصب .

Balayures des étables et routes ٢٣١٦٦ - كُنْبَة

كناسة المزاب والفرقات وهي من الاسمدة الغضوية النافعة . ج كُنْبُون .

Cirsium spectabile (S). ٢٣١٦٧ - كُنْبَة \*

Chardon spectaculaire (F).

نوع من القصوران المحول، أوراقه خلية النصل على صفحته وهو نبات من الحنص يصلح ورقه لاذناب الخيل يحسبها ويطلقها وله كروب وشوك مثل السلق ينبت فيا رقة من الارض سهل . ج كُب .

Liberticide (F). Liberticide (E). ٢٣١٦٨ - كُنْبَشِيَة \*

الكبشة تقويض الحرية .

Foie (F). Liver (E). ٢٣١٦٩ - كُنْد، كُنْدَة، كُنْد

الكبد والكبد والكبد . ج اكباد وكبد هي احد اعضاء الجهاز الهضمي في الجسم . وهي غدة كبيرة اللد شبه هرمية الشكل تفرز الصفراء . مركزها وراء الحجاب الحاجز ، في الكشح الامين من التجويف البطني . وهي تحضن حوصلة الصفراء الغروية الشكل التي تخزن المادة المرارية . وفضلًا من وظائفها في اختزان الصفراء فالكل تحول كل ما زاد من سحابة الجسم من السكر الى نشا سكريا . تدهرو الحسابة حيث تحولوه حته الانتفاضة الى سكر ناقله مائل . ويعرف من حالة عجز الكبد عن القيام بهذه المهمة بمرض السكري .



كُنْدَة

٣ - في الحنصيات : متابة اعمال كائون الاول الحاصة بالقطاف وتوزيع الاسمدة ونصب وتنظيم المزاب . . .

٤ - في الانجاز المختلفة ، غرس نصوب الاشجار اليبدة الارواك من حرجية ورتيبية يضاف اليها الارواكيتوس والصفصاف والسيوزا والكزورينا والشكنيس والورد . . .

٥ - في البقول والزهور : متابة اعمال الشهر المنصرم والمتابة بالملحوظ والتبسيط والنس والاسبانغ والثرم والتفل والجزر والكرفس والفتت والبقندوس والشوندر والهلين والاراضي شوكة والروبياء والبازيلا والشيلك . . . تمهد زراعات ويشال الزهور على اختلاف انواعها والمتابة مختلف اوضاعها الخاصة واستمرار مكانة اوصامها ومشارتها .

Caniche (F). Poodle (E). ٢٣١٤٤ - كُنَالِيَش

سلالة من الكلاب الصغيرة القد تتميز بصورها الجمني وبفرد حرصها على اصحابها .

Caustique (F). Caustic (E). ٢٣١٤٥ - كُنَاو

Bourrache officinale (F). ٢٣١٤٦ - كُنَاوَزَوَان

هو الحنص الخنزري ، اطلبه .

٢٣١٤٧ - كُنَاوَشِيَر \* ، كُنَاوَشِيَر \* ، سِيَسَارُون بَرِي

Opopanax (S). Opopanax, Panais sauvage (F). Opopanax, All heal (E). Gummi pastinak, Pastinake (D). Opopanax, Panaces (I).

جنس نباتات برية طيبة ممررة من فصيلة الحلييات . انواره ثلاثة جذورها جنبية غليظة . سوقها متصبية دقيقة صلبة . اولها مركبة ريشية . ازهارها خيمية التجميع ، صفراء اللون ، صغيرة القد . يستخرج منها سمع رائحي يستعمل في الطارة والطب .

Caiman (F). ٢٣١٤٨ - كُنَايْمَان ، كُنَيْمَان

هو تمسح كيان ، اطلبه .

Fosse à fumier (F). ٢٣١٤٩ - كُنْبَا ، كُنْبِي

المزبلة . ج اكباب . Dunghill (E).

٢٣١٥٠ - كُنْبَايَة

هي فلفل كباب ، اطلبه .

Hérissou (F). ٢٣١٥١ - كُنْبَايَة الشوك

هي الشنفلة ، اطلبه .

Salvadore (fruit) (F). ٢٣١٥٢ - كُنْبَاش

نفسج ثمر الاراك واحده كباية . والبرير ما لم ينضج من اكبايات .

٢٣١٥٣ - كُنْبَاس ، كُنْبَاس ، مَنَع

Inhibition ٢٣١٥٤ - كُنْبَاسَة ، كُنْبَاسَة ، قُرمَل

Frein (F). Brake (E).

٢٣١٥٥ - كُنْبَاسِيَة \*

Inhibiteur, inhibitif (F). Inhibitory (E).

نعت تعريفي يوصف به كل عامل يحول دون سير الحركة الطبيعية لغيرتها او يوقفها كليًا .

Hépatite (F). Hepatitis (E). ٢٣١٥٦ - كُنْبَاد

التهاب الكبد ، ويكون حادًا او مزمنًا .

Cédratier (F). ٢٣١٥٧ - كُنْبَاد

هو الآرج ، اطلبه .

Câpre (F), Caper (E).

٢٣١٧٧ - كَبْرَة

ثمرة الكبر. ج. اكبار وكبار :

Coprâh (F), Coco-nut (E).

٢٣١٧٨ - كَبْرَة

هي لب الناربيل ، اطلبه .

Soufrage (F), Sulphuring (E).

٢٣١٧٩ - كَبْرِيَّة

هو التغير بالكبريت أي ذر مسحوق الكبريت على النباتات لوقايتها من بعض الاوصام الفطرية أو لمكافحة تلك الاوصام .

Coléoptère mâle (F).

٢٣١٨٠ - كَبْرَقْل

He-coleopter (E).

ذكر الخنفساء ، وهو ايضاً جحر الجمل المقدس .

Capromys (S).

٢٣١٨١ - كَبْرُفَيْس \* ٥

Capromys, Houtia, Chemi (F), Capromys (E).

جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة الباغيات . انواعه عديدة قريبة الشبه من الجراد . اجسامها رمية خضرة طولها من ٤ الى ٥٥ سم . وذناها من ١٥ الى ٢٧ سم . ورونها مستطيلة ، مقاضها مقعولة ، اذناها مستعرضة متحدة الخلف . عيونها كبيرة . براطها العليا مغلوقة . اعناقها قصيرة غليظة . جريزها الامامية رباعية الاصابع اما الخلفية فخماسية . اخافرها طويلة مقوسة سادة . اذناها حشوية الجلد يكسوها حلب مستطيل دقيق . ثآلف موطها فزولاً وهنتوراس وكوبا والجاييك ... تألف الباغيات والاحراج والادغال . تتسلق الاشجار بحفة ونسبر على الارض ببطي || قربها الاوراق والتأثر والحاء .

Capros (S).

٢٣١٨٢ - كَبْرُوس \*

Capros (F), Capros (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الكبروسيات شكاكات الزعانف . انواعه المعروفة عديدة . اعطانها بجار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . سارسها حثث المجاهد في الاعماق التي يراوح غورها من ١٠ الى ٣٠ م . || اجسامها صغيرة القد ، مستعرضة الجرم ، مستطيلة الرأس والحلق ، كبيرة العين . زعانفها الظهرية الامامية تساعية المناسخ الحادة الأطراف || اعرف انواعه واشهرها الكبروس الخنزيري .

Capros aper (S).

٢٣١٨٣ - كَبْرُوس خنزيري \* ٥

Capros sanglier, Sanglier (F), Boar-fish (E).

سمكة بحرية من الكبروس . اعطانها البحر الابيض المتوسط ، جسمها صغير القد ، بهضي الشوزن ، مبط الجرم ، يطول نحو ١٥ سم . واسها متفطرس الارتكاز ، غروطي الحلق المستند الطرف كفتطسية الخنزيري . عينها كبريتان . زعنفتها الظهرية الامامية تساعية المناسخ الحادة . سفنها مهدبة الصفة الخشنة . فوها الى الجلوة الغضبية المواج || لهاها كاعن الصفن ، مستهجن الرائحة ، قل من يأكله .

Caproidae (S).

٢٣١٨٤ - كَبْرُوسِيَّات \*

Caproides (F), Caproidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شكاكات الزعانف . اجسامها وانواعها صغيرة . اعطانها بجار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . اجسامها صلبة مستعرضة . اعطالها ذلقة . عيونها كبيرة . زعانفها الظهرية كثيرة المناسخ الحادة حشافة خشنة || اشهر اجناسها الكبروس .

Hépatiques (F), Liverwort (E).

٢٣١٧٠ - كَبْدِيَّة

صنف من قسم الطحليات .

Capparis (S).

٢٣١٧١ - كَبْر ، كَبَار

Câprior (F), Caper-tree (E).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الكبريات . انواعه زهاء ١٢٥ منظرها من نباتات المناطق الحارة ، منها الاشجار والشجيرات والجنات ومنها الشائكة والرسمة . اوراقها منقطة متناحية بيضيه النسل . ازهارها فردية التجميع ، ابطية الارتكاز ، طويلة الزناد ، بحلة الشكل ، كبيرة القد ، مستطيلة الاسدية المديدة للملوة || اعرف انواعه واشهرها الكبر الشائك .

٢٣١٧٢ - كَبْر شَالِك \* ، كَبَار شَالِك ، اصْف ،

صَف ، كَبَار

Capparis spinosa (S).

Câprior commun, C. épineux (F), Caper tree, Common caper-bush (E), Kappernstrauch, Echter Kappernstrauch, Kapper (D), Cappero, C. spinosa (I).

نوع من الكبر وهو جنبة قراءه فناء شائكة تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . منهاها اقلم البحر المتوسط . فروعها دقيقة متبسة ، اشراكها محنطة . ازهارها وردية اللون كبيرة الحجم قطرها يراوح من ٤ الى ٦ سم . ثمارها كالتليار شكل وقالب لكن لا تطول اكثر من ٥ سم . || ازهارها وثمارها تستعمل في الخللات . جلورها طيبة يقال انها نافعة وسطمة ومدرة البول .

Coccinia (S).

٢٣١٧٣ - كَبْر هِنْدِي

Coccinie, Céphalandre (F), Scarlet fruited gourd (E), Scharlachranke (D), Cefalandro (I).

جنس نباتات برية زراعية معمرة من فصيلة القرعيات . انواعه المعروفة قليلة اعطانها البلاد الحارة . جلورها صقولة . سوقها مدادة أو عارشة . اوراقها مفصصة أو مثلثة الزوايا . ازهارها كبيرة القد ، بيضاء اللون او صفراء . ثمارها رنية الشكل ، صغيرة الحجم ، جامدة الياب . يزورها الى السواد المرقط بالابيض || اعرف انواعه ما يلي .

٢٣١٧٤ - كَبْر هِنْدِي لَلْبِي الورقي

Coccinia cordifolia (S), Coccinie à feuilles en cœur (F).

نوع من الكبر الهندي وهو نبات زراعي مداد يطول نحو ٢٠٠ سم . اوراقه صغيرة القد ، خماسية التفصيص ، قليلة الشكل ، تطول نحو ١٥ سم . فصلها لامع البشرة على صفحتي . حوافه بسيطة . ازهارها الى الياض المايح ، قطرها يراوح من ٣ الى ٤ سم . ثماره رنية تطول نحو ٥ سم . لونها الى الاحمر ، لهاها جامدة المادة ارجواني الخضاب . ثماره وصقله مأكلة .

٢٣١٧٥ - كَبْر هِنْدِي كَلْبِي الورقي

Coccinia palmata (S), Coccinie à feuilles palmées (F).

نوع من الكبر الهندي وهو نبات متسلق يطول من ٦ الى ٨ امتار . اوراقه كلبية الشكل طولها يراوح من ٨ الى ١٠ سم . حوافه فارقة . ازهاره الذكرية عقدوية التجميع صفراء اللون . ثماره بيضيه الشكل والحجم ، حقيقي اللون ، لهاها جامدة الصفراء || ثماره وصقله مأكلة .

٢٣١٧٦ - كَبْرَت

Sulfurer (F), To sulphurate (E).

استعمل الكبريت .



كبر شالك



كبروس



كبروس خنزيري

## ٢٣١٩٢ - كبريتات البوتاسيوم

Sulfate de potasse (F). راجع سلفات البوتاس .

## ٢٣١٩٣ - كبريتات الحديد

Couperose verte, Mélanterie (F). Green vitriol (F). مركب معدني طبيعي اخضر اللون يوجد في بعض الكنان.

## ٢٣١٩٤ - كبريتات الزئبق

Couperose blanche, Goslarite (F). White vitriol (E). مركب معدني طبيعي ابيض اللون ، سهل الكسر واللويان ، طعم الطعم ، قليل الذوبان .

Sulfate de soude كبريتات الصوديوم ٢٣١٩٥ راجع سلفات الصود يوم .

Sulfate de calcium كبريتات الكلس ٢٣١٩٦ راجع سلفات الكلسيوم .

## ٢٣١٩٧ - كبريتات النحاس

Couperose bleue, Cyanose, Chalcantitha (F). Blue vitriol (E).

مركب معدني ازرق اللون ، زجاجي الحمر ، طعم الطعم ، يذوب في الماء . يوجد في مناطق النحاس .

## ٢٣١٩٨ - كبريتات الأمونيوم

Sulfate d'ammoniac (F). راجع سلفات الأمونيوم .

## ٢٣١٩٩ - كبريتات الحديد

Pyrite (F). هو البيريت ، مركب من كبريت وحديد .

## ٢٣٢٠٠ - كبريتات الكربون ، سلفور الكربون

Sulfure de carbone (F). Sulphide of carbon (E). مائع ثن الرائحة شديدة الفعالية لا لون له يذوب في الزرارة

لقضاء حل الحشرات وتطهير التربة من بعض الاوصام الفطرية المستعصية .

## ٢٣٢٠١ - كبريتات الكبريت

Sulfureux (F). Sulphurous (E).

## ٢٣٢٠٢ - كبريتات ، لوزة الآلهة

Caboese (F). ثمر الكاكو ، راجع كاكو .

## ٢٣٢٠٣ - كبريتات الزرور

Caprodes flavomarginatus (S).

Caprodes de l'aubépine (F).

حشرة غاشلة من فصيلة السمجيات . جسمها صغير يطول نحو ٨ مم . رأسها مجرسم ، اصعب اللون . عظمها شديد السمرة . حينها بارزتان . زبانا مستطيلان ، امران . كوسلها اصعب يطول موج امير . حجبها صفراء صناعية . ظهرها لاحف ، حجبها الى الشبهة البيضاء المالح ، يطوقها حار ضيق اصفر ذهبي يتحول في الزرارة الاخضر الى صناعي . بطنها شديد السمرة ، اخر الحنار . قوائمها مقلقة بالامر والاصفر ٦ تألف الحراج والمواقع التي يكثر فيها الزرور .

## ٢٣٢٠٤ - كبريتات

Bélier (F). Ram (E).

ذكر الفان يستطيع السداد . ج اكيش واكاش وكيش .

## ٢٣٢٠٥ - كبريتات

Fascine (F). اغشاب واغشان واغشاب توضع في سبيل الماء لتحويل

قسم منه الى مجرى آخر .

## ٢٣١٨٥ - كبريتات محزوز

Coprothile strié (F).

هو الطروب المحزوز ، اطليه .

Copolithe (F). Coprolithe (E). كبريتات ٢٣١٨٦ سداد الغائط المتحجر . وقد يجتر من الفضلات الطبيعية .

٢٣١٨٧ - كبريتات ٢٣١٨٧ Coprosma (S). Coprosma (F). نباتات معمرة بفترة من فصيلة الغويات ، انواعها جنس قليلة ، مهدا بلاد زيلندا الجديدة . سوقها تملو للمعززة قليلة ، اوراقها مستديرة الشكل ، مقنطرة القاعدة ، فصلها يطول ويعرض من ٢ الى ٨ سم . صفحته جميلة الخضار الزاهي تملو حنارها زرقشة صفراء ، والكبريتة تستعمل في الحقائق استعمال المضاض الياباني .

## ٢٣١٨٨ - كبريتات

Capparidaceae (S). Capparidaceae (F). Capparidaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ، اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها اربعة اسباط : البانيات والزفرينات والكليارات والميرويات . نباتاتها مختلفة الاشكال والاجسام منها الاثمار والشجيرات والجنات ومنها الاغشاب الحولية والمعمرة . اوراقها متعاقبة ، معتقة ، اذننية . اثمارها حيلة القالب فردية او عنقودية التجميع . ثمارها حبة ثنائية الفلق ٥ معظمها من نباتات المناطق الحارة وهي تحوي بعض الزيوت الطيارة والقلية وبعض العناصر المختلفة اغصها الصلبة والشفافة والسامة .

## ٢٣١٨٩ - كبريت

Soufre (F).

Sulphur, Brimstone (E).

جسم صلب اصفر اللون قابل للكسر يرمز (ك - S) وزنه الذراري ٣٢٠٠٦٦ يتحصر في ١١٣ سم ٣ ويتخذ في ٢٥٠ سم ٣ حبة استرقاه زرقاء اللون ساطعة خائفة . وهو ردي الاصل الحرارة والكهرباء يلوي في الاثير والييزن والزيوت ولا يلوي في الماء ٥ حرقة الانسان واستخدمه منذ قدم الزمان وهو يوجد في الطبيعة اما نقيا واما مزوجا ينيره من العناصر كالحديد والنحاس والزرارص . يستهلك منه العالم سنويا ملايين الاطنان في صناعة الاسمدة والاصباغ والنفاب والبارود والادوية الطبية الجلدية والادوية الزراعية ... من انواعه ثمانية التي تستعمل في الزراعة ضد الاوصام الفطرية :

الكبريت الميكروني Soufre micronisé (F).

الكبريت الزهر Soufre sublimé, Fleur de soufre (F).

الكبريت المسحوق Soufre trituré (F).

الكبريت المبلور ، الكبريت العمود Soufre cristallisé

٢٣١٩٠ - كبريت الرصاص ٢٣١٩٠

Galène (F). Galena (E).

مركب معدني يتسمى نحو ٨٦.٥٠ ٪ من الرصاص و ١٣.٥٠ ٪ من الكبريت وبعض الشبه الزر من الفضة او الحديد او الزنك او الالمنيوم . وهو رصاصي اللون ، ازرق المالح ، اسفغ البريق ، سريع الكسر . ثقله الذري ٢٠٧ من ٧٤ الى ٧٦ وهو شائع الاستعمال الصناعي يستخدم خاصة في طلي الآلية الخزفية مناسا لاتصاها الماء .

## ٢٣١٩١ - كبريتات

Sulfate (F).

راجع سلفات .

البياض الفضي. اخاديد صدرها وصفائح حنكها الى السواد الباهت .

### ٢٢٢١٤ - كَبُوعَة مَلَوَانَة

*Megaptera versabilis* (S). *Mégaptère changeante* (F). موطنها شمالي المحيط الهادي طويلا يراوح من ١٨ الى ٢٥ م. رأسها وظهورها الى الازرقاء السمره الزرقاء المزاج . بطنها الى البياض الماسي تعلوه مائة ماجة وريدية . اخاديد صدرها وصفائح حنكها الى السمره القاتمة .

٢٢٢١٥ - كَبُوكَابُ الشُّوَلَة  
*Hérissor* (F). هو القنغذ ، اطلبه .

٢٢٢١٦ - كَبَل  
*Fourrure garnie* (F). الكبيل : الكثير الصوف من الفراء .

٢٢٢١٧ - كَبُوعَة  
*Cabomba* (S). جنس نباتات مائية معمرة من فصيلة النيلوفرديات . انواعها المعروفة قليلة ، سوتها شجيلة . جلورها كالشمر تنشاهها مادة لزجة . اوراقها متناقصة صافية النصل تركّز حل معاليل مستطيلة . ازهارها فردية التجميع ابطية الارتكاز سداسية البتلات . بتلاتها صفراء الانتشاب بيض الاطراف . اوراقها وازهارها تنطقو حل سطح الماء . وهي تعيش في الاكواريوم وتتسمل كرمي لاسماك المياه العذبة ا عرّف انواعها ما يلي .

### ٢٢٢١٨ - كَبُوعَة كَرُولِيَّة

*Cabomba caroliniana* (S). *Cabomba de la Caroline* (F). نوع من الكبوعة المعمرة السبروتية الشائعة الاستعمال كرمي للاسماك . اوراقها صافية طافية . ازهارها بيض الاطراف ، صفر الانتشاب والاقراس || تنورها يستمر من ايار الى آب .

### ٢٢٢١٩ - كَبُوعَة مَالِيَّة

*Cabomba aquatica* (S). *Cabomba aquatique* (F). نوع من الكبوعة المعمرة السبروتية الشائعة الاستعمال كرمي للاسماك . اوراقها طافية بيضية النصل الاخضر الذي يطول من ١ الى ٣ سم . ازهارها صفراء اللون تشبه زهر الخيوان المائي || تنورها يستمر من نيسان الى تموز .

٢٢٢٢٠ - كَبُونْدُ  
*Capnodium* (S). هو الرّيح ، قطر مجهرى ، اطلبه .

٢٢٢٢١ - كَبُولُ  
*Chabot, Chabotage* (F). مرض جرثومي يصيب الكرمة ينشطها على افراخ الجلودو الحوائية الشيتة .

٢٢٢٢٢ - كَبُولُ  
*Copris lunaris* (S). *Copris* (F).

حشرة من الجمليات يكثر وجودها في الربيع والصيف . طويلا يراوح من ١٥ الى ٢٢ سم . ثوبها الى السواد اللامع . ذكرها مسلح بقرن مستطيل حاد . انتفاها سلسلة بشفرة ذرية عمودية الارتكاز . وهي من الحشرات الصرصرية النائلة التي تعيش على مختلف انواع البراز . معبرها سرداب فردية فسيحة تنجح فيها اكر الزبل التي تحفرها الانثى بالاشتراك مع الذكر ثم تمتع في كل اكرة مكثه وتقوم على حراستها حتى اكثال التفث الذي يستمر اكثر من اسبوعين .

٢٢٢٠٦ - كَبَشُ الْجَبَل  
*Mouflon* (F). *Mountain Sheep* (E). حيوان لبون يجتر يعرف بالاروية ، اطلبه .

٢٢٢٠٧ - كَبَشُ الْقَرْنَفُول  
*Girofle, Clou de giroflier* (F). *Clove* (E). هو زهرة القرنفل المجافة . طعمها حريف ، ورائحتها ذكية المرّف فواحة . يستخرج منها زيت شائع الاستعمال الطبي وهو مفاد لآله والتشنج يخمد الاعصاب ويسكن ألم الانسان .

٢٢٢٠٨ - كَبَشِي الرّاس  
*Cricocéphale* (F). *Criocephalous* (E). نعت ثمرقي يطلق على كل فن كان رأسه كراس الكبش .

٢٢٢٠٩ - كَبُوع  
*Megaptera* (S). *Mégaptère* (F). *Humpback whale* (E). الواحدة كبية . جنس حيتان عظيمة القدر مدنية الشكل . ازماره المعروفة حدة ثائف المحيطات . طويلا يراوح من ١٢ الى ٣٥ م . تتميز زمامها الصدرية المستطيلة الضيقة الرباعية الاصابع . رؤوسها ضخمة ، صفائح احداها قصيرة مستعرضة مطاطة . صدرها مبنية متزاوية التشنجيد الطويل || قوتها الاسماك الصغيرة . تجوب الاعماق والمياه السطحية والاقليمية في طلب الرزق . انائها تقص من جرو الى جرون ترضعها بصفة شهود . سرعتها تفوق سرعة المراكب البخارية . صيدها غطر وشاق دهنها مرغوب فيه وقد يراوح انتاج الكبكة الواحدة من ٤ الى ٥ اطنان . اما انواعه الخمسة فهي ما يتبع .

٢٢٢١٠ - كَبُوعَة الْجَنْتْرِبُ ، كَبُوعَة لَانْتَد  
*Megaptera Islandi* (S). *Mégaptère de l'Islande* (F). موطنها جنوب المحيط الاطلسي . طويلا يراوح من ٢٠ الى ٢٥ م . رأسها وظهورها الى السمره الزرقاء . بطنها الى البياض الاخضر . صفائح حنكها الى السمره القاتمة .

٢٢٢١١ - كَبُوعَة الْخَلِيج  
*Megaptera Indica* (S). *Mégaptère Indienne* (F). موطنها الاقيايس الهندي تكثر في الخليج الفارسي . طويلا يراوح من ١٢ الى ١٥ م . رأسها وظهورها الى الكبوة السمره الصفراء المزاج . بطنها الى البياض الاخضر الكدر . اخاديد صدرها وصفائح حنكها الى السواد الباهت .

٢٢٢١٢ - كَبُوعَة الْقَطْبُ ، جَبَلُ الْبَحْرِ  
*Megaptera Boops* (S). *Mégaptère Boops, M. longimane, Baleine à bosse, Jubarte, Gibbar, Poisson de Jupiter, Képorak* (F). اكبر انواع الكبج واطمها جنة واطمها هيكله واغرها شكلا . طويلا يراوح من ٣٠ الى ٣٦ م . تتميز بسلام كسام الجبل بقلع فيج الظهر ويزعقة ظهرية منجلية الشكل صغيرة القدر . رأسها وظهورها الى السواد اللامع . بطنها الى البياض . اخاديد صدرها الى السمره القاتمة . صفائح حنكها سود || موطنها فيج الاربياء يشمل بحار القطب الشمالي والقسم الاحل من المحيط الاطلسي .

٢٢٢١٣ - كَبُوعَة كُوْزِيْزَا  
*Megaptera Kuzira* (S). *Mégaptère Kuzira* (F). تكثر في مضيق باردين والبحار المجاورة . طويلا نحو ٢٠ م . رأسها وظهورها الى السواد الأزرق المزاج . بطنها الى



كَبُوع



كَبُوعَة كَرُولِيَّة



كَبُولُ (١)



كَبُولُ (٢) منظر جانبي

Swine-book ٢٣٢٣٧ - كِتَاب أَنَسَابِ الْخَنَازِيرِ  
يحمل تدون فيه أنساب سلالات الخنازير .

Stud-book ٢٣٢٣٨ - كِتَاب أَنَسَابِ الْخَيْلِ  
يحمل تدون فيه أنساب سلالات الخيل .

Flock-book ٢٣٢٣٩ - كِتَاب أَنَسَابِ الْفُصَانِ  
يحمل تدون فيه أنساب سلالات الفصان .

Cants-book ٢٣٢٤٠ - كِتَاب أَنَسَابِ الْكَلَابِ  
يحمل تدون فيه أنساب سلالات الكلاب .

٢٣٢٤١ - كِتَابُ نَبَاتِ كَالْجَرِيرِ . (السان) .

Agglomérat, Conglomérat (F). ٢٣٢٤٢ - كِتَابُ  
Agglomerate, Conglomerate (E).  
حالة تدبج طليعية تكون عليها بعض المواد المختلفة . أحيانا طبقات الحصى والريال المتناسكة .

Imperméabilité (F). ٢٣٢٤٣ - كِتَابُ  
Impermeability (E).  
خاصة مسك الماء في بعض أنواع القربة . وفي من حيرب التربة الزراعية لأنها تجعلها شديدة الصلابة والانتساج .

Linum (S). Lin (F). Flax (E). ٢٣٢٤٤ - كِتَابُ  
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الكتانيات . أنواعه المعروفة زهاء ١٠٠ معظمها حولي وبضها مصر . سوقها خشبية أو ليفية منتصبة خفيفة . أوراقها لائقة متعاقبة سنانية النصل أو غطية . أزهارها خالية التركيب متقوية التجميع مختلفة الألوان منها الأبيض والأصفر والوردي ولساء أزرق والأحمر . ثمارها حقية ، بزورها بفضية صغيرة والأوراق مختلفة الألوان منها الأبيض والأصفر والوردي ولساء أزرق والأحمر . ثمارها حقية ، بزورها بفضية صغيرة تستعمل في النعان والطلاء . كما وأنه يستخرج من خاء سوقها اللبغية اللياث صناعة نسجية تحمل المركز الثاني بعد القطن || أشهر أنواعه البرية والزراعية الصناعية والزراعية ما يتبع .

Linum suffruticosum (S). ٢٣٢٤٥ - كِتَابُ أَيْفُس  
Lin blanc (F). White flax (E).  
نوع من الكتان البردي الزرني . وهو عشبة حولية تملو نحو ٣٠ سم . ساقها خشبية ، منتصبة ، معمرة ، فراءه ، خلية اللحاء . أوراقها غزوية الشكل ، جامدة النصل . أزهارها إلى البيضاء الناصع . حنار تلتها إلى الحمرة البنفسجية المزاج || أزهاره يستمر من أيار إلى آب .

٢٣٢٤٦ - كِتَابُ الزَّرِيرِ \* ، كِتَابُ زَهْرِي ، كِتَابُ  
كَبِيرُ الزَّهْرِ  
Linum grandiflorum (S).  
Lin à grandes fleurs (F). Flowering flax (E).  
Leinblume (D). Lino d'Africa (I).  
نوع من الكتان وهو عشبة حولية زرينية تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . ساقها فراءه ، فروتها منتصبة منتصبة . أوراقها سنانية ، فصلها بحري اللون . أزهارها كبيرة لثقة خفيفة الحمرة مهدبة النصل || أزهاره يستمر طوال شهر حزيران

٢٣٢٤٧ - كِتَابُ الشَّرْق  
Lin orientale (S).  
Lin d'Orient (F). Oriental flax (E).  
نوع من الكتان الطبي البري البذل ، منبته الشرق الأوسط . شتته معمرة تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم . ساقها خشبية فراءه . أوراقها صغيرة لثقة ، فصلها وحيد المرق

Productif (F). Productive (E). ٢٣٢٣٣ - كَبُوس  
كثير الحمل . يقال نقاعة كبوس ونقاعة كبوس .

Capucine (F). ٢٣٢٣٤ - كَبُوسِيْن  
هي السليبة ، نيبسات عشي تريني مأكول الأوراق والأزهار ، اطلبها .

Loche (F). ٢٣٢٣٥ - كَبِيْت  
هو اللع من الاسماك البحرية ، اطلبه .

Copalfra (S). ٢٣٢٣٦ - كَبِيْت \* ، كَبِيْتِيَّة  
Copaier, Copahier, Copsyar (F). Copaiba-tree (E).  
جنس الشجار حرجية من فصيلة القرنيات . أنواعه المعروفة نحو ٢٠ اصنافها البلاد الحارة الافريقية والامريكية .  
٢٥ م . اغصانها منتصبة ، أوراقها مركبة متعاقبة .  
أزهارها سلبية التجميع . ثمارها قرون صغيرة رقيقة وحيدة البزرة المستطيلة البطة || اغصانها جووية اللون صلبة تستعمل في التجارة . يستخرج من سوقها صلب ورائحي المادة ، يسمي المرق يستعمل في الصيدلة .

Macrocarpe (F). ٢٣٢٣٧ - كَبِيرُ الشَّعَر  
Macrocarpus (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل نبات ينتج ثماراً كبيرة .

Mégalocephale (F). ٢٣٢٣٨ - كَبِيرُ الرَّاس  
Megalcephalous (E).  
نعت تعريفي ووصفي يطلق على الحيوانات الشاذة بفضامة رؤوسها .

Renoncule des fleuristes ٢٣٢٣٩ - كَبِيْتِج  
هو الخواند الأسوي ، نبات قصير الساق ، كزبه الرائحة ، اطلبه .

Biométrie (F). ٢٣٢٤٠ - كِتْ ، بِيَوْمَتْرِيَا  
Biometry (E).  
بحث بيولوجي يطبق القواعد الاحصائية وحساب الاحالات على حياة الكائنات الحية .

٢٣٢٤١ - كِتْ  
الواحدة كتاة . نبات كالجرجير يطبخ فيوكل (السان) .

Book ٢٣٢٤٢ - كِتَاب  
يحمل الانساب في الحيوانات الداجنة .

Lettre de crédit (F). ٢٣٢٤٣ - كِتَابُ الإِعْتِمَاد  
Letter of credit (E).  
رسالة يبعث بها صاحب المصرف إلى وكلائه لكي يحتفظوا مبلغاً من المال رهن تصرف شخص سمي .

Pedigre (F). ٢٣٢٤٤ - كِتَابُ الْأَنْسَاب  
Pedigre (E).  
يحمل تدون فيه انساب سلالات الخيول العرب وحياد الرهان وسائر الحيوانات الموصلة .

Lettre de garantie (F). ٢٣٢٤٥ - كِتَابُ الضَّمَان  
Letter of guaranty (E).  
كتاب يتعهد به شاحن البضائع ونقلها بأصالحها على الحالة المثبتة في تذكرة الشحن .

Herd-book ٢٣٢٣٦ - كِتَابُ أَنَسَابِ الْبَقَر  
يحمل تدون فيه أنساب سلالات البقر .



كَبِي



كتان الزرير

Linum viscosum (S).  
Lin visqueux (F).

نوع من الكتان الزيتي وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ساقها قرصاء مزففة . أوراقها سنائية ثلاثية أو خماسية المروق . نصلها مبهرم الغدد ، خلي البشرة على صفحتي . أزهارها وريدية اللون موشة بالبنفسجي . أزهاره يستمر من أيار إلى تموز .

٢٣٢٥٣ - كُتَان مُسَهِّل \* ، قَرَق

Linum catharticum (S). Lin purgatif (F). Purgin flax, Fairy flax, Cathartic flax (E). Purgier-Lein, Purgier-Flachs (D). Lino a foglia purgative (I).  
نوع من الكتان البري الطبي المبلول وهو عشبة معمرة تملو من ١٠ إلى ٢٥ سم. ساقها غشوشية قرصاء . أوراقها طيبة صهلة ، السفل منها ضمية التجميع ، سنائية النصل ، الوسطى والعليا متناقية غشوة . أزهارها كبيرة القد لوها إلى الصفار النبي || أزهاره يستمر طوال شهر تموز .

Linaceae (S).  
Linacées (F). Linaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة التعلات. أجناسها ١٤ تشمل ٢٣٠ نوعاً متبهاً جميع الاصناف المتعددة ، معظمها عشبي حولي أو معمّر وبعضها شجري أو جنبي . أوراقها متناقية أو متقابلة . أزهارها تاجية الارتكاز ، لاقياصة التجميع منها الفردية والمتقوية والمشكولية . أشهر أجناسها الكُتَان والكوكوا والرديولا .

Démographie (F).  
Demography (E).

٢٣٢٥٥ - كِتَابِيَّة

الكِتَابِيَّة علم إحصاء الجماعات البشرية .

٢٣٢٥٦ - كُتُبُ الْإِنْسَانِ

Livres généalogiques (F). Genealogical books (E).  
مجلات تدون فيها الخبرات بآسائها وإفكائها مع أسماء وأشكال الآباء والأمهات وصفاتها المميزة وما اشتهرت به الخ .

٢٣٢٥٧ - كَتَد ، كَتَد

الكِتَد والكِتَد هو أصل الكَتَف وقيل هو الكاهل وقيل هو ما بين الكاهل إلى الظهر . ج . اكِتَاد وكِتَد .

٢٣٢٥٨ - كَتَر ، كَتَر ، كَتَر

Milieu d'une chose (F). Middle of one thing (E).  
هو جوار كل شيء ، أي أوسطه .

٢٣٢٥٩ - كَثْرِيَّات \* ، جَمِيسِلُ الشَّعْرِ

Callitriche (S). Callitriche, Callitriche (F). Wasserstern (E). Wasserstern, Sternkraut (D). Callitriche (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الكثرشيئات . أنواعه قليلة العدد ، أصلها البلاد الحارة والمعتدلة تعيش في المياه العذبة || يستخرج منها عصارة لزجة ملينة تقيد الشعر وتحمده ملده وسهته .

Callitrichaceae (S).  
Callitrichacées (F). Callitrichaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين أجناسها وأنواعها قليلة العدد . جميعها مائية . أشهرها الكثرشي .

يطول نحو ٦ م . ويمرض نحو ٢ م . حصصه تنتهي بهلية دقيقة خرية . أزهارها برتقالية اللون ، غدية النصل الشفافة . أزهاره يستمر من نيسان إلى حزيران .

٢٣٢٤٨ - كُتَان بَرِّي \* ، كُتَان هَبِّي الْوَرَقِ ،

فِينَكْس

Linum angustifolium (S).  
Lin sauvage (F). Pale flowered flax (E). Wilder Lein (D). Lino salvatico (I).

نوع من الكتان البري المبلول وهو عشبة معمرة تملو من ٢٠ إلى ٣٥ سم. ساقها غشوشية قليلة المروق المتصبة . أوراقها ضيقة ، نصلها غشوة الصفحة ، وسيد المروق . أزهارها قليلة العدد لوها إلى الزرقة اليلكية المسلوخ . أزهاره يستمر من نيسان إلى حزيران .

٢٣٢٤٩ - كُتَان دَهَبِيّ

Linum flavum (S).  
Lin jaune d'or (F).

نوع من الكتان البري الزيتي وهو عشبة معمرة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. ساقها غليظة قرصاء . أوراقها ملوئية الشكل ، نصلها يطول من ٢ إلى ٣ سم. ويمرض من ١٥ إلى ١٠ م. وهو ثلاثي المروق ، بحري اللون . أزهارها فرقة ، كثيرة العدد ، ذهبية اللون || أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز .

٢٣٢٥٠ - كُتَان زِيلَنْدَة

Lin de la Nouvelle Zélande (F).

هو القريوم المتصلب ، أطليه .

٢٣٢٥١ - كُتَان شَاعِج \* ، مَلَسَج

Linum usitatissimum (S). Lin cultivé, Lin commun (F). Common flax (E). Echter Lein, Gemeiner Flachs (D). Lino usuale, Lino comune (I).

هو الكتان الزراعي الصناعي المشهور - ضرره عديلة . جوده وثنية متوسطة الانتعاب . ساقه متصبة قرصاء تملو من ٤٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقه سنائية النصل ، غضراء اللون . أزهاره إلى البياض أو الزرقة الباهتة . ثمار جرداء كروية مقطوعة الرأس والمقعب ، عشارية المصاريح وفي كل مصراع بذرة . والبذرة مائلة ، لامعة ، حمراء اللون ، مغلطحة : تطول من ٤ إلى ٦ م. وتعرض من ٢ إلى ٣ سم.

لهاجا زيتي للمادة ياتج من ٢٢ إلى ٤٢ ٪ من الزيت . يقال انه من أقدم النباتات الصناعية لان زراعتها وصناعة اليافه في بلاد ما بين النهرين في مصر تمتد إلى أبعد من اربعة الاف سنة || زراعتها الحالية فيسحة الارباب تشمل الولايات المتحدة والارجنتين وروسيا وبولوية ولتوانية والمانيه وفرنسة وهولنده وبلجيكا وتركيا || وهو موجود في الاقاليم المعتدلة ويفضل المناخات الرطبة على الجافة والأجواء العذبة البمشرة اليوم على الصائفة الادم || وهو رطب في الأرضية الخصبه الغنية المنسوبة التركيب الحكيمي ، المتوسطة الاندماج ، لانه من النباتات القشرية التي تستنزف كل ما وصل اليها من العناصر المغشوية والمعدنية || يذو عادة في اوائل الربيع ويقطع عندما تصفر ساقه وقد يكون ذلك في اوائل الصيف . فيترك في الحقل بغصة ايام إلى ان تجف ساقه ثم ينقل إلى المغارب حيث تفصل البذور من السوق . أما الالياف الصناعية النسيجية فتفصل من السوق أما بواسطة الحرارة في ماميل خاصة مجهزة هذه الداية وأما بواسطة الماء وهو ما يسمونه التطنين وقد يتم بنقع حزم سوق الكتان بالماء أرا كده من الزمن تقررها حرارة الموقع لكنها صديقاً تراوح من اسبوع إلى اسبوعين .



كتان بري



كتان شائع



كتان سهل



كثريش

## ٢٣٢٧٠ - كَتَلْبَةُ صِيْغِيَّة

Catalpa bungei (S).  
Catalpa de Bunge, Arbra puant (F).  
نوع من الكتلة بهذا الصن. تجربها صغيرة لقد تملو  
من ٧ الى ١٢ م. أوراقها رعية الشكل مقفولة القاعدة .  
نصلها بطول نحو ٢٠ سم. ويبرس ١٤ وهو مائل البشرة  
خلى الروق حل الصفحة السفل . أزهارها تطول نحو  
٤ سم. وتقرض ٥ سم. لوها الى البياض المشوح بالاصفر  
والجلوي . ثمارها مخروطية تطول من ٢٥ الى ٤٠ سم.  
أزهارها يستمر طوال شهر سزيران .

## ٢٣٢٧١ - كَتَلْبَةُ ظَرْفِيَّة

Catalpa speciosa (S).  
Catalpa elegant (F).  
نوع من الكتلة وهو شجرة سريعة النمو تملو من  
٢٠ الى ٣٠ م. مهدا أمريكية الشالية . ساقها منتصبه  
فرصه . أوراقها تطول نحو ٣٠ سم. وتقرض ١٨ سم.  
نصلها ذرب المقصبة المستطيلة . أزهارها صفودية التجميع  
كبيرة لقد تطول نحو ٧ سم. وتقرض ٨ سم. لوها الى  
البياض المرقط بالاصفر . ثمارها تطول نحو ٥٠ سم.  
أزهارها يستمر طوال شهر سزيران .

## ٢٣٢٧٢ - كَتَلْبَةُ يَابَانِيَّة

Catalpa ovata (S).  
Catalpa du Japon (F).  
نوع من الكتلة السبروتية مهدا اليابان . تجربها صغيرة  
لقد تملو من ٦ الى ١٠ امتار . أوراقها ثلاثية اوحاسية  
التفصيص البيضي الشكل . نصلها بطول نحو ٢٠ سم.  
ويقرض ١٥ سم. أزهارها صغيرة القد . صفراء اللون  
لمطخة بالبنفسجي . ثمارها مستطيلة دقيقة كالاصابع .  
أزهارها يستمر من سزيران الى تموز .

## ٢٣٢٧٣ - كَتَلْبَةُ صَفْرَاء

Immortelle des sables (F).  
هي الخالية الطاقية ، اطلمها .

## ٢٣٢٧٤ - كَتَلْبَةُ هَوَاة

Masse d'air (F).  
Mass of wind (E).  
تعريف جوائي يدل على مجرى الهواء المتحرك الى اتجاه  
معين .

## ٢٣٢٧٥ - كَتَم

نبات جبلي ورقة كورق الاس يحضب به مقفوا وله  
قمر كثر التفلل ويسود اذا الفج وقد يمتصر منه  
دهن (ا. م.).

## ٢٣٢٧٦ - كَتْن

Tubercularia (S).  
جنس فلوريجورية من عارة الرطمانيات ونصيلة الكنتيات.  
جرباه الكندي كثير الفروع البامدة الترتيب . كئانه  
وسيدة الخلية . كروية او اسطوانية الشكل . وساده  
مجنبة تيمو عند انفلثها خلية اللؤلؤ زاهرة اللون || انواعه  
قليلة . اعرفها الثلاثة التالية .

## ٢٣٢٧٧ - كَتْنُ الإِجَاصِ

Tubercularia piricola (S).  
نظر مجهري يركب البار المندوخة . لفزونة اخصها  
الاجاص والتفاح || ينشط ويتكاثر في بيئة خاصة  
سوارتها تفروق الاربع درجات ستيفراد ورويتها من  
٨٠٪ وصاعدا || مظهره الخارجي ندف خلي آخر اللون  
ابيض المزاج ، يركب البشرة فيعطها ثم ينور في الب ينفعه  
ويهره .

## ٢٣٢٦١ - كُتُسُوس

Chatossus (S).  
Chatossus (F). Chatossus (E).  
جنس اسماك بحرية زهرية من مفتوحات اللثانة وفصيلة  
الصابوريات . انواعه المعروفة عديدة معظمها هري وبعضها  
بحري . والبحري منها يلزم النهر في زمن الاسراء ||  
اجسامها اعليجية الشوزن ، تطول من ٢٠ الى ٢٦ سم.  
وربها صغيرة ، ممتلئة الاشراق . صوبها ماصة . زانفها  
الظهرية صغيرة ، شبه مزوانية . الصادية والحوضية  
صغيرة . الترجية مستطيلة ، اللذلية فارقة . انواعها متقاربة  
تسر في القسم الاعلى وتندر في الاسفل || يكثر ويوجد  
في الهند والصين واليابان || لحومها مأكولة وبعضها جيد  
الصنف .

## ٢٣٢٦٢ - كُتْسُول

Catchol (F).  
بلورات ارية حامدة اللون براقه تستخلص من الكاشو  
والفمبر والطلان الخ ... تغلي عند ١٧٥/١٧٧ سغ.

## ٢٣٢٦٣ - كُتْعَاد

Cornier (F).  
سمكة بحرية تدعى قباب ، اطلمها .

## ٢٣٢٦٤ - كُتْف ، عَاتِق ، مَتَكِب

Epaula (F). Shoulder (E).  
الجزء العلوي من الفضه .

## ٢٣٢٦٥ - كُتْشَان

الكشنان الجراد اول ما يطير . ويقال هو الجراد يمسد  
الذواء اوله للسره ثم اللب ثم الغشاء ثم الكشنان . الواحدة  
كشانة .

## ٢٣٢٦٦ - كُتْكُوت

Poussin (F).  
هو القروب والصوس .

## ٢٣٢٦٧ - كُتْكَلَز

Catalase  
خيرة نباتية تهيم على انتاج واتزان هيدرات الاوكسجين  
في النبات .

## ٢٣٢٦٨ - كَتَلْبَةُ

Catalpa (S).  
Catalpa (F). Catalpa (E). Trompetenbaum, Trom-  
petenstrauch (D). Catalpa (F).  
جنس نباتات برية وتربية من فصيلة البنزنديات . انواعه  
المروفة ا جميعها اشجار صغيرة او متوسطة القد . سوطها  
منتصبه . اغصانها غائرة . أوراقها بسيطة ، حابله  
متغافلة . نصفانصة التصل . أزهارها جربية الشكل .  
ثمارها جرد مستطيلة كالحيار || اعرف انواعه واشهرها  
ما يتبع .

## ٢٣٢٦٩ - كَتَلْبَةُ شَالَمَة

Catalpa bignonioides (S). Catalpa commun, C. de  
la Caroline (F).  
نوع من الكتلة الحرجية السبروتية المبالة مهدا أمريكية  
الشالية . ساقها تملو من ٥ الى ١٥ م. أوراقها كبيرة  
لقد ، بيته الفصوص نصلها بطول نحو ٢٥ سم. ويقرض  
٢٠ وهو ازيف للورق كربه الزائفة عند المس . أزهارها  
صفودية التجميع تطول نحو ٥ سم. وتقرض ٦ . لوها الى  
البياض المزلف بالاصفر والاحمر . ثمارها تطول من ٢٠  
الى ٤٠ سم. وتقرض من ٦ الى ١٥ || أزهارها يستمر  
من سزيران الى آب .



كلته شالمة



تعيش على الصغور المشورة قرب الشطوط || اصداها داخلية رقيقة صغيرة . اجسامها لحمية ، بيضية الشكل او اهلجية تغلفها الادية الغفافة . خياشيمها عينية الاركانز نظامية الترتيب الثاني الصف . افواها عظمية الشكل . لواسها ثنائية انبوية مغلوقة السطوح الخارجية .

٢٢٢٨٧ - كَتِيحِيَّات \* Pleurobranchidae (S).  
Pleurobranchidés (F). Pleurobranchidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل غلفيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || دويباتها تتميز باصداها الرقيقة الصغيرة التي تلتحف الظهر . خياشيمها هدية يمينية الاركانز . افواها عظمية الشكل || ثنائية اللواس الانبوية المغلوقة من الخارج || اعرف اجناسها واشهرها الكتيحة والغسوجة والبيدة .

٢٢٢٨٨ - كَتِيحَة الكتيحة هي النحلة فالت ايد . ج كئائل .

٢٢٢٨٩ - كَتِيح \* Catène (F).  
Catena (E).  
مجموعة ترابية لقيامية التركيب الحكمي جمعها الموائل الطبيعية تتميزت برسبتها للشكلية .

٢٢٢٩٠ - كَتِيحَة Lotier corniculé (F).  
هي القرص القرني ، اطلبه .

٢٢٢٩١ - كَتَاَم Brachycome (F).  
هي البراكيم ، اطلبه .

٢٢٢٩٢ - كَتَاب \* ، زَقْرَاقِ النَحْص \* Sarcophorus (S). Sarcophore, Vanneau à caroncule (F).

جنس طير من طوال الساق وفصيلة الزرقائيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض الفلوات الافريقية القريبة من مجاري الماء . ملجنها الحيالي جماعي . قوتها الخشرات والذباب . تتميز بسرعة عدوها على الرمال || اجسامها صغيرة القدة ، متراكبة الالوان الجميلة ، فيها الاخضر والاسود والجلوي والاشهب والابيض . رؤوسها صغيرة . مناقبها مبطلة الصفحات السفلى وتعلوها في قواعدها العليا لخص صغيرة لحمية المادة . اجنتها لائحة . اذنانها شديدة الصغر . سيقانها دقيقة سمراء القرن كالمناظير .

٢٢٢٩٣ - كَتَاَم Sarcophorus tectus (S).  
Sarcophore du Sénégal (F).  
٢٢٢٩٤ - كَتَاَم Sarcophorus latifrons (S).  
Sarcophore des Somalis (F).

٢٢٢٩٥ - كَتَاَم Crème (F).  
هي القشدة ، المادة السمنية في الحليب .

٢٢٢٩٦ - كَتَاَم Roquette (F).  
هي الجرجير من احرار البقول ، اطلبه .

٢٢٢٩٥ - كَنَافَة Densité (F). Density (E).  
هي مقدار الشيء في وحدة معينة . كترك ١٠ شتول في المتر المربع .

٢٢٢٧٨ - كَنَّ البُحْس \* Tubercularia versicolor (S).

فطر مجهرى يعيش على اغصان البُحْس اليابسة وقد شجده على لحاء المطاط في الاوشدا .

٢٢٢٧٩ - كَنَّ شَالَع \* Tubercularia vulgaris (S).

فطر مجهرى يبي بكثر في الخريف والشتاء . يركب لحاء الاغصان اليابسة في مختلف الانحاء الحرجية والمشرية .

٢٢٢٨٠ - كَنَّ حَة ، كَوْبَالِيَة Hymenaea verrucosa (S). Copalier, Hyménée ver-

ruqueuse (F). Gum copal tree (E). Henschreckenbaum (D). Imeneo (I).

شجرة حرجية من فصيلة القرنيات . مهدا افريقية الجنوبية وبندشكر . ساقها كثيرة الثمول متوسطة الارتفاع تملو نحو ١٠ امار . غشها صلب المكسر احمر اللون مرغوب فيه . يستخرج من ساقها بالثق عصارة صمغية رائتجية صفراء اللون فواحة العرف المستحب تدعى كوبال شائعة الاستعمال الصناعي .

٢٢٢٨١ - كَنَّ حَات \* Tuberculariaceae (S).

Tuberculariacées (F). Tuberculariaceae (E).  
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة الميفانديات ورتبة الزويحات . اجناسها وانواعها عديدة تجمعها مخرتان : اللطحاتيات والوطحاتيات .

٢٢٢٨٢ - كَنَّ حَة Tuberculina (S).

جنس فطور مجهرية من عارة الوطحاتيات وفصيلة الكنتيات . جراهه الكندي ، بسيط التركيب قليل الفروع . كئائله وحيدة الخلية كروية او اسطوانية الشكل || انواعه قليلة العدد والاذى تركب اوراق بعض الصنوبريات والاجاص البري فتوشها ببثور صغيرة للقد لوها الى الحمرة البنفسجية .

٢٢٢٨٣ - كَتُوم Imperméabilité (F).

Impermeability (E).  
الكثوم والكثام هي خاصة مسك الماء في بعض انواع التربة . وهي من هيوب لثربة الزراعية لانها تجعلها شديدة الصلابة والاندماج .

٢٢٢٨٤ - كَتُوم ، كَتِيم ، مِكنَام

Imperméable (F). Impermeable (E).  
نمت وصفة التربة التي تمسك الماء .

٢٢٢٨٥ - كَتِيحَة \* Kitaibella (S).

Kitaibé (F).  
جنية معمرة برية وقزيبينة من فصيلة الهازيات معودة التعريف على اسم البوتاني المخاضري بولس كيتيل (١٧٥٧-١٨١٧) ساقها قرماء تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقها متعاقبة خامية التفصيص . نصلها جيل الخضار . مسن الحافة . ازهارها ابطية الاركانز ، كبيرة القد ، خامية البتلات ، يضاء اللون .

٢٢٢٨٦ - كَتِيحَة \* Pleurobranch (S).

Pleurobranche (F). Pleurobranch (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل غلفيات الخياشيم وفصيلة الكتيحاتيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البالد الحارة والمعتدة الحارة .



كَنَّ حَة



كَتَاب



٢ الى ٤ سم. رؤوسها صغيرة ، ملحوفة . عيونها بارزة .  
تأثيرها وولاسها نظامية . قرونها الاستشارية دبوسية  
الاطراف ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها نصف دائرية  
الشكل . اغادها لاحقة ، قوائمها نشيطة . اراسها خاسية  
المقل . اناؤها ملونة || جميعها واثمة تعيش على الازهار  
وتعطي بيئاتها الشتري تحت الشعاء . يرقاتها مؤذية تقضم  
تغوت الازهار والمبيض والجراهم فتقتضي عليها || اشهر  
اجناسها الكحيصة .

Eternuement des bêtes (F). **كُدَامَس** ٢٣٣٩  
Sneezing of beast (E). هو عطاس البهائم .

Moyette, Dizeau (F). **كُدَاسَة** ٢٣٣٥  
Hay cock, Shock, Stook (E). مجموعة عامات من الحصيد تهرم وتكسح وتحفظ وربما  
تُدْرَس .

٢٣٣١ - **كُدَال مُتَوَجَّه**  
Gubernatrix cristatella (S).  
Commandeur huppé, Cardinal vert (F).

طائر من فصيلة التشرشوريات ورتبة الجواثم غروريات  
الناقير . موطنه بعض مناطق امريكا الوسطى ومنها البرازيل.  
يألف الغابات والاحراج القريبة من الماء . نظامه الحياتي  
جماعي الا في زمن الترخيم || جسمه صغير القد ، بطول  
من ١٨ الى ٢٥ سم. ثوب الذكر متراكب اللون الجميلة.  
ظهره الى الشبهة انقراض المراج . صدره ورينه ولواصف  
جناحيه وافيته الى الصفار الزاهي . قبتيره ورأسه وعنقه  
الى السواد الاسفع . منقاده حطلي اللون . رسنه الى  
السرة السوداء . أما الانثى فصدرها الى الشبهة وبطنها الى  
الخضار الباهت . صدغها وصعراها الى البياض الناجي ||  
قوته الحشرات والبلود . يألف حياة الاسر ويعيش  
ويتكاثر في القفص شرط ان يكون قسماً || يذئن عشه  
بين أنفاد الانجار القريبة من سطح الارض . الانثى  
تحضن على مرتين في الحول . حفتها من يرضين الى ثلاث  
بيضات تقوم برعيها دون الذكر الذي يؤن لها الغذاء .

Mouvement (F). **كُدَامَة** ٢٣٣٢  
Movement (E). الكدامة هي الحركة ، اطلبها .

٢٣٣٣ - **كُدَامَة**  
Leptodactylus (S).  
Leptodactyle (F). Leptodactylus (E).

جنس ضفادع قاذبة من فصيلة الكداميات . انواعه المعروفة  
مقت منها المناطق الاستوائية الامريكية || اجسامها  
صغيرة القد تطول من ٦ الى ٨ سم. عند الذكور ومن ٧  
الى ١٥ سم. عند الاناث . رؤوسها معتدلة الطول والعرض .  
عيونها مستديرة جاحضة . فكوكها السفلى عامدة الانسان .  
اصابع قوائمها الخلفية نفسية الخياط . جلودها مثاقلة  
دقيقة الثعل || اناؤها الى السرة الخضراء الباقية اللداسة  
تلعوا رقة جزوية على الظهر . صفراء على البطن ||  
تعيش قرب المنابع ويجاري الماء اكثر من عشرة اعوام .  
تسرح في الليل وينتبي في النهار بين اوراق النبات او في  
المنابع . قوتها الحشرات والديدان || الانثى تدرأ نحو ٥٠٠  
دعيلة في شلة تطرحها في مكان منتخب قليل الملق لا  
تتجاوز مساحته المتر المربع الواحد تطوقه بالسبال والخز  
والنباتات المائية المختلطة .

٢٣٣٠ - **كُحُولَاز ، زِيمَاز**

Alcoolase, Zymase (F). Alcoholase, Zymase (E).  
خيرة كياوية تحول السكر على اختلاف اشكاله الى كحول  
وفاز كربوني .

Spiritueux (F). **كُحُولِي** ٢٣٣١  
Spirit, Spirituous (E).

نعت تعريبي يطلق على السوائل التي تحوي بعض الكحول.

٢٣٣٢ - **كُحَيْبَة**  
Stilbella (S).  
جنس فلور مجهرية من عارة الغنيات وفضيلة الكحيثيات .  
يشير بكرمياته المستطيلة القصبان الدبوسية الرأس .  
بروناته كروية الشكل ، صغيرة القد || انواعه المؤذية  
قليلة اهرها كحيبة الشاي .

٢٣٣٣ - **كُحَيْبَة الشاي**  
Stilbella theae (S).  
نظر مجري يتطفل على افاد الشاي . مظهره الخارجي يقع  
خلية زياء تشبه القنار تركب لها الافناد . ثيمو وردية  
القرن ثم يضاء . مشيجه يسير في الارضية وقد يستقر في  
قلم الاغناد فيوقت نموها ويسيب يباسها || يكالغ  
١) باقطاق الاغصاء الموصية وحرقتها . ٢) يطهر  
الجرح . ٣) بتجفيف التربة لسرف المياه الزائدة التي  
تسب هذا الرعم .

٢٣٣٤ - **كُحَيْبَة**  
Stilbaceae (S).  
Stilbacées (F). Stilbaceae (E).

فصيلة فلور مجهرية من مرتبة الميفانيات ورتبة الزوجيات  
تتميز بكتلتها المجهرية الى كرميات . هيها لا نظامي  
الارتكاز منه المنتصب الخوازي وت المشاكك اللقياسي  
الترتيب . مشيجه فرعي الزلل . بوناتها قلادية التنجيب .  
اجناسها عديدة تجمعها عمارتان الغنيات والمعدانيات .

٢٣٣٥ - **كُحَيْبَة**  
Crypte (F). Crypte (E).  
كحيبة ج كحيثات . الكحيثات ، جسورياً ، اسم  
يطلق على هذيدات صغيرة او انايب نحيلة ، غير نافذة ،  
تنشب في القناة الهضمية عند بعض الحشرات .

٢٣٣٦ - **كُحَيْبِيلَة**  
Fauvette orphée (F).  
طائر من البخلل ، اطلب دخلة غريبة .

٢٣٣٧ - **كُحَيْمَة**  
Phalacrus (S).  
Phalacre (F). Phalacrus (E).

جنس حشرات واثمة من فصيلة الكحيصيات ورتبة هذيات  
الاجنسة . اناؤها المعروفة متوسطة البد منتشرة في بعض  
المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ،  
بيضة الشكل ، تطول نحو ٣ سم. رؤوسها غروروية ،  
صغيرة . عيونها بارزة . تأثيرها وولاسها نظامية . قرونها  
الاستشارية دبوسية الاطراف . كواسلها معدوية نصف  
دائرية الشكل . اغادها لاحقة يملوها تحفيد نحيل  
قالب . قوائمها نشيطة . اناؤها ملونة || جميعها واثمة  
تعيش على الازهار . يرقاتها تقضم تغوت الازهار ويبشاشها .

٢٣٣٨ - **كُحَيصِيَّات**  
Phalacridae (S).  
Phalacridés (F). Phalacridae (E).

فصيلة حشرات واثمة من هذيدات الاجنسة . اجناسها  
وانوعها المعروفة متوسطة البد منتشرة في معظم اقطار  
العالم || اجسامها صغيرة ، بيضة الشوزن . تطول من



كحيبة الشاي



كحيصة



كُدُوَّة الارز

Lenteur (F).

Slowness, Tardiness (E).

يقال كدت الارض اذا بطل نباتها . وربة كاداة اي بطيئة الانبات .

\* كُدُوَّة ٢٣٣٤٨ -

Leptosphaeria (S).

جنس فطور مجهري من السخاميات وفصيلة المشويات . تتميز باصنافها الغائرة في نسج النبات للنحار وبيوضها الوشي الشكل الملون والتدريج الزئاري للمرضة || انواعه عديدة اشهرها ما يتبع .

\* كُدُوَّة الارز ٢٣٣٤٩ -

Leptosphaeria salvinii, Malmthosporium sigmoideum, Sclerotium oryzae (S).

فطر مجهري يركب الارز في جميع اصفاء الحولية فيؤذيها ويحطبا || منظره الخارجي يقع صغيرة مستديرة ممددة ، لون غورها الى الجوزة ثم يزداد اسمرارا مع اقترابه من الاطوار الهبطي ، تركب النمف والسوق والسابل || اغراضه تختلف باختلاف انتشاره واذا || يكثف يتطهر الشلب للمعد الى البذار .

\* كُدُوَّة الحنطة ٢٣٣٥٠ -

Leptosphaeria tritici (S).

نظر مجهري يركب صنف الزروع واصعبا الحنطة ثم الشعير والشونان والشليم || منظره الخارجي يقع صفر تنتشر على النمف والاعقاد تسبب جفافها الباكر . اغراضه تقوم على مدى نتائج انتشاره لانه يبقو عن النباتات ويحد من نشاطه .

\* كُدُوَّة السعدن ٢٣٣٥١ -

Leptosphaeria rusci (S).

نظر مجهري يصيب بعض انواع السعدن واخصها السعدن الاربع || منظره الخارجي نكت كثيفة لثولية الشكل تكثف الانفاد تسبب ذبولها ويغلفها || يكثف باستمال سائل يورود وغيره من السوائل السلفوكسية .

\* كُدُوَّة السليم ٢٣٣٥٢ -

Leptosphaeria napi, Pleospora napi, Alternaria excitosa, A. brassicae, A. herculeae, Macrosporium brassicae, Sporodermium excitosum, S. brassicae (S).

فطر مجهري يصيب بعض النباتات السليبية واصعبا السليم واللفت والملفوف والفجل ... || منظره الخارجي يقع شقر تمارو سطح المادة الخضراء في السوق والاوراق واخرى نباتات تسبب يباس النسج ويغلف الخريجات وتعييدها وانفلاتها || ينهم من قال ان حفن جلور القث يمد الى هذا النظر الذي يتكاثر بسرعة مدهشة اذا لامته المومال الجوية واصعبا الرطوبة || يكثف يتطهر البذار .

\* كُدُوَّة الشونان ٢٣٣٥٣ -

Leptosphaeria avenaria, Septoria avenae (S). Maladie des taches sombres (F). Oat leaf spot (E).

فطر مجهري يركب صنف الشونان فيؤذيها ويبيد الى نمو . منظره الخارجي يقع صغيرة ممددة على نصال النمف ، تبول اقل اخضراراً من النسل ثم تسمر بعد ان يملوها في وسطها نكتات خلية بيضاء || اغراضه زهيدة لانه قليل الاذي والاماسة .

\* كُدُوَّة الصَّجَمَان ٢٣٣٥٤ -

Leptosphaeria herpotrichoides, L. culmifraga, L. amphibola (S). Piécin-verse des céréales (F).

فطر مجهري يركب سوق الزروع اصعبا الشليم والحنطة

Leptodactylidae (S). \* كَدَامِيَّات ٢٣٣٤٤ -

Leptodactylidae (F). Leptodactylidae (E).

فصيلة حيوانات درياء قازية من الرقيات السويات ورتبة البتروات اي عديمات الذنب || اجناسها وانواعها عديدة . مهدا امريكة النسل واسترالية . منظر انواعها قارب وشيا البري والمائي والشاجر والباس . جميعها سحنة التكرك العليا ، عادمة الانسان في السفل ، وقرعة صينعا شبه غالية من التثوات العظمية الجالانية || اشهر اجناسها واعرفها الكدامة والالوزيا والهيلود والسيراثيريس .

\* كَدَان ٢٣٣٥٥ -

Schiste (F). Schist, Slaty rock (E).

اثرية صفيحية التركيب مرامسة متوالية صلبة المكسر .

\* كَدَر ٢٣٣٣٦ -

Lie (F). Lees, Dregs (E).

كل مادة ترسب في قعر الابوعية التي تحفظ فيها المشروبات الكحولية ويورها كالمخبر والزيت .

\* كَدْرَبَة ٢٣٣٣٧ -

Ganga cata

طائر من القطا يعرف بقطاة كدرية ومنهم من قل كدارية .

الجمع كدري وكداري وكدر .

\* كَدَس ، كَدَسِس ٢٣٣٣٨ -

Bottelage (F).

Tying up in bundles (E).

جمع الحشيش وامثاله الى اكداكس .

\* كَدَس ، كَدَسِس ٢٣٣٣٩ -

Entasser (F).

To hoard up (E).

جمع الشيء كدسا بضمه على بعض .

\* كَدَم ٢٣٣٤٠ -

Tondre le gazon (F).

To mow a grass (E).

كدم الحضر جزء بالكدامة او المكسة .

\* كَدَم ٢٣٣٤١ -

نوع من الجراد سرد الاجسام خضر الرؤوس الواحدة كدمة .

\* كَدَمَة ٢٣٣٤٢ -

Brebis grasse (F).

Fatted ewe (E).

نجة سمين غليظة .

\* كَدَمَة ٢٣٣٤٣ -

Ecchymose (F). Ecchymosis (E).

أثر ينفجس او احمر اللون يظهر في الجلد عقب جرح او رضه سببه انكسار الدم تحت الجلد .

\* كَدَمِيَّوم ٢٣٣٤٤ -

Cadmium

معدن ثنائي الذرة ، ابيض اللون ، ازرق المواج ، لدن المادة ، قابل التصفيح ، شديد المطفولة ، اصلب من القصدير . ثقله النوعي يراوح من ٨٦٠ الى ٨٦٩٠ ريزه (ك-ك) وزنه الانبوي ١١٢,٤١ ينصهر تحت ٣٢٠ مع . ويبل في ٨٦٠ مع . يحترق في ثمانية الارجاس من المعدن التي الحر . وهو يذوب في بعض المحامض منها الكبريتي والازوتي والكلوريدريك .

\* كَدَن ٢٣٣٤٥ -

Frutescent (F). Graze (E).

نمت تمرين يذلل على الاصول الصلبة في النباتات الأجنبية .

\* كَدَو ٢٣٣٤٦ -

Talure (F).

عارض فيزيولوجي يعترض حلاه الاجبار .



كُدُوَّة السليم



كُدُوَّة الشونان

٢٣٣٦٣ - كُرَات ، كُرَاب ، كُرَاب  
هو السلف أي الحُرث السطحي يبعثر ذرات التراب  
ويقتل المد وال يقلب التربة .



كُدْوَة المُر

### ٢٣٣٦٤ - كُرَات

شجر كبير يجبال الطائف . الواحدة كرات (١ م.) .

### ٢٣٣٦٥ - كُرَات البَرَّ ، طَيْطَان

*Allium vineale* (S). Ail des vignes, Porreau sauvage, Porrette (F). Crow garlic, Crow onion (E). Hundslauch, Feldlauch (D). *Aglio cipolla* (I).

نوع من الكرات البري ينكر في الكروم . دوفسته مستديرة مبطلة . أوراقه مستطيلة تعرض من ٨ إلى ١٥ سم . لونها إلى الأخضر البهري المائيق . شراخه الزهري يملو نحو ٦٠ سم . ثورته صيوانية كروية الشكل ، أزهارها إلى ألبياض الودي المواج .



كُدْوَة المُر



كُدْوَة المُر



كُدْوَة المُر

### ٢٣٣٦٦ - كُرَات الدُّب ، كُرَات الدُّب

*Allium ursinum* (S). Ail des ours, Ail des bois (F). Bear's garlic, Ramsons, Wild-leek (E). Bärenlauch, Wilder Knoblauch (D). *Aglio confoglio pedunculata* (I).

نوع من الكرات البري الميزل . أوراقه مستطيلة مستديرة . شراخه يملو من ٤٠ إلى ٨٠ سم . ثورته صيوانية كروية ، أزهارها غبراء اللون ودية المواج .

### ٢٣٣٦٧ - كُرَات الصُّخُور ، كُرَات إسْبَانِيَا

*Allium scorodoprasmum* (S). Ail rouge, Rocambole, Ail d'Espagne (F). Rocambole, Sand leek, Spanish garlic (E). Graslach, Rocambole (D). *Aglio di Spagna*, *Scalogni di Spagna* (I).

نوع من الكرات للممر . شراخه الزهري ينتهي بنورة صيوانية كروية تكتنفها الأوراق الزهرية والفصوص الخلفية الشكل . أزهاره إلى البياض الأخضر يملو مواج آخر . زراعته شائعة في أروبة وهو أقل مادة حريفة وفعالة من الثوم . يتكاثر بالفصوص لأنها أصغر وأسرع من البذور . يجد في جميع الأتربة غير أنه يفضل الدبالية .



كُدْوَة المُر



كُدْوَة المُر



كُدْوَة المُر

### ٢٣٣٦٨ - كُرَات عَسَقَلُون ، كُرَات أندلسي

#### كُرَات أبُو شُوْشَة ، قُفْلُكُوط

*Allium ascalonicum* (S). Echallotte (F). Ascalonian garlic, Shallot (E). Eschlauch, Schalotte (D). *Cipollina*, *Scalogni* (I).

نوع من الكرات الزراعي الشائع الاستعمال . زراعته من البزرة إلى النضجة تستلزم ثلاث سنوات . يجد أنها ذرع ولا تخشى سوى الآفة الكليسية . يقال أنه لطبي ويستعمل كطارد للديدان الموية .

### ٢٣٣٦٩ - كُرَات مَعْرُوف ، كُرَات رُوْمِيَّ

*Allium porrum* (S). Poirreau, Porreau (F). Leek (E). Lauch, Porree, Porrei (D). Porro (I).

بقلة زراعية محولة شائعة الزراعة والاستعمال . يصلها اهليلجية الشكل . أوراقها قرصية متتابعة حاشية ، نصلها مستطيل الصنفه عابق الخضار . شراخه الزهري يملو نحو ٦٠ سم . ينتهي بنورة صيوانية كروية الشكل أزهارها إلى الحمرة . يرغب في الأتربة الدبالية لتنضج الاندماج . يذر في أكواد خاصة وينقل إلى مستقره عندما يبلغ ارتفاعه نحو ١٥ سم . تقطع أوراقه وتكدم جلوره ثم يصار إلى غرسه .

والشعير والثونان فيسب قصفها في إبان تحبيب السنايل أو قبل تمام الإدراك . مظهره الخارجي بقعة حمراء مستطيلة تكتنف غدة الشرايف فالسالية الأولى حيث تغلب جدار القصبه . ثم يملو مع الزرع من غدة إلى غدة بعد أن يدخل في التربة حتى مستوى الجذور الأولى فينتقلها بنشأة نسبية لبنة تعزل التبادل النسي أن لم تقض عليه .

### ٢٣٣٥٥ - كُدْوَة الفِصَّة

*Leptosphaeria circinans* (S).

نظر مجهرى يصيب الفصّة فيؤذيها ويشل نشاطها . مظهره الخارجي بقع خلية بنفسية اللون لاقياسية الشكل والحجم تركب الجنت والجذور فتغطها وتشل نشاطها وقد تسب ذبول النبات وموته . لم تنجح فيه مكانة حتى الآن .

### ٢٣٣٥٦ - كُدْوَة المُر

*Leptosphaeria musarum* (S).

نظر مجهرى يركب أوراق المُر فيؤذيها بعض الشيء . مظهره الخارجي لمخ حنطية لاقياسية الشكل والحجم تركب نصل الأوراق وتسب جفاف النسيج للمحار . أضراره زعينة لانه قلما يمرق ويؤخر تبادل التسع . يكافح باستعمال الفطائر غير المركزة على النحاس .

### ٢٣٣٥٧ - كُدْوَة المُر

*Leptosphaeria coniothyrium*, *Coniothyrium Fuckelii*, *Septoria sarmentii* (S).

نظر مجهرى واسع الانتشار يصيب الورد والمليق والموج والكشمش والخمضيات . مظهره الخارجي كلف باهت اللون لاقياسي الشكل والحجم يملو الزواحي فيسب ذبولا كما في الورد والموج . ويملو نصل الأوراق كما في الخمضيات فيؤذيها ويؤخر نشاطها . ومن الملاء من قال انه يصيب النبات الضعيف دون غيره . يكافح بتسديد النباتات الضعيفة وباستعمال أحد الادوية الفطورية اعصها سائل بودرو وسائل مفلوكسليك .

*Cystocarp* (F).

*Cystocarp* (E).

اسم يطلق على كل مجموعة من البوغ أو أكياس البوغ عند الخليات الحمر .

### ٢٣٣٥٩ - كُدَيْس الزَّاد هو دباح دقله ، اطليه .

### ٢٣٣٦٠ - كُدَّان ، لِسْكَة ، عَفَّان

*Ponce* (F). *Pumice* (E).

سحابة خفيفة نخرة يكثر وجودها عند مرعى الموج .

### ٢٣٣٦١ - كُدْو ، كُورْبَرِيل

*Hymenaea courbaril* (S). *Hyménéea courbaril*, *Courbaril* (F). *Courbaril tree* (E). *Kourbaril* (D). *Courbaril* (I).

شجرة حرجية كبيرة القد جملة الشكل من فصيلة القُرْبَات . مهدها البلاد الافريقية الحارة . ساقها منتصبه فرما تملو من ١٥ إلى ٢٥ م . خشبها صلب المكسر ، ناعم الرقة ، جزوي اللون ، صناعي الاستعمال ، مرغوب فيه . يستخرج من ساقها بالخز حليب غزير المادة الراتنجية ، أصفر اللون ، منتحب العرف يدعى « كُورْبَرِين » يستعمل ككلاء فاخر الصنف .

*Louze* (F).

### ٢٣٣٦٢ - كِرَاء

رابع اجارة .



كُدْوَة المُر



كُدْوَة المُر



كُدْوَة المُر



كُدْوَة المُر



كُدْوَة المُر

## كُرَاتٌ نَبَطِيَّةٌ - كُرَّام



كُرَاتٌ نَبَطِيَّةٌ



كُرَاتٌ وَرْدِي



كُرَاتُةُ الْحَرَجِ



كُرَاتُةُ الْخَوْخِ



كُرَاتُةُ الْوَرْدِ



كُرَاتُةُ الشَّمْسِ

كُرَاتُةُ الْمَيْسِ  
الصَّغِيرَةِ

كُرَاتُةُ خَشَنَةِ

٢٣٣٧٨ - كُرَاتُةُ الْجَيْسِ \*، سَكُولِيَتُ الْجَيْسِ  
Scolytus scolytus (S). Grand scolyte de l'orme (F).  
Larger European elm bark beetle (E). Großer  
Ulmenplintzkäfer (D).

حشرة من الكرشيات. جسمها مفلطح الشكل مفلطح  
الطرف. طولها نحو ٦ سم. رأسها وصدرها وكسولها الى  
السواد الازرق للملوح. غداها الى الجزء الناعبة. تركيب  
الميس وبفس الانجار الزيتية فتخلج الشكير وتوقع به  
اشد الأدنى.

٢٣٣٧٩ - كُرَاتُةُ الْمَيْسِ الصَّغِيرَةِ \*

Scolytus multistriatus (S). Petit scolyte de l'orme  
(F). Lesser European elm bark beetle (E). Kleiner  
Ulmenplintzkäfer (D).

حشرة من الكرشيات. جسمها مفلطح الشكل اسطواني  
الحية يطول نحو ٤ سم. رأسها اسود اللون. جسمها كسني  
الثوب. غداها سطحية للتخديد. تركيب الميس ولا تنف  
من الانجار الثمرة فتخلج شكير الاغصان والافناد وتوقع  
به اشد الأدنى.

٢٣٣٨٠ - كُرَاتُةُ خَشَنَةِ \*، سَكُولِيَتُ خَشَنِ

Scolytus rugulosus (S). Scolyte rugueux, Petit scolyte  
des arbres fruitiers (F). Fruit bark beetle, Shot-hole  
borer (E). Runkelzeller Obstbaumpinnkäfer (D).

حشرة من الكرشيات، طولها نحو ٣ سم. كسولها اسود اللون،  
غداها الى الجزء البنية. تركيب جميع الانجار الثمرة  
اغصانها الفتاح والكرز والمخوخ فتخلج شكير الاغصان  
وتوقع به اشد الأدنى. لها جيلان في الحول. يباها الشتوي  
يحصل في الطور البرقي.

٢٣٣٨١ - كُرَاتُةُ لَامْتَجَانِسَةِ

Xylébore dispartite (F).  
خنفساء مؤذية تدعى كُرَاتُةُ الْحَرَجِ، اعلمها.

٢٣٣٨٢ - كُرَاتُشِيَّاتُ \*، سَكُولِيَتِيَّاتُ \*

Scolytidae (S). Scolytidae (F). Scolytidae, Bark  
beetles, Engreuer beetles (E). Borkenkäfer (D).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها  
عديدة جميعها صغيرة القد. اجناسها اسطوانية: الزواهي  
الى السواد ومشتقاته والجوزي والبي والحلي. قرونها  
الاستشارية صغيرة، رفيقة او صرمانية. ارباغها رداية.  
تميش باكثرها تحت لحاء الانجار وفي الشكير فتخلجه  
وتعطيه ثم تمتع مكها الذي يتغذى من رقات دقيقة تميش  
على المواد النشوية والسكرية التي يفرزها النبات.

٢٣٣٨٣ - كُرَاتُاسُ \*

Sperme des oiseaux (F).  
Sperm of the birds (E).

هو افراز الغدد التناسلية للذكورية عند الطير.

٢٣٣٨٤ - كُرَاتُ

الكرام من اللحم والبقير بمنزلة الوظيف من الفرس وهو  
مستحق الساق. وقيل هو ما دون الكعب من البهائم، ج  
اكرع واكارع وكرومان.

٢٣٣٨٥ - كُرَاتُ

Vigneron, Viticulteur (F).  
Vine-dresser, Viticulturist (E).

من تعامل زراعة الكرمة لاستثمار العنب.

٢٣٣٧٠ - كُرَاتٌ نَبَطِيَّةٌ \*، بَسَلُ الْعِصْرِيتِ،  
ثُومُ الثَّرِقِ

Allium ampeloprasum (S). Ail d'Orient, A. à cheval,  
Poireau sauvage, Pourrai, Pourriole (F). Blue-leek,  
Vine-leek, Wild-leek (E). Perl Lauch, Wilder Lauch  
(D). Porro salvatico, Porro bastardo (I).

نوع من الكرات البري البهلل، اوراقه مستطيلة،  
مستعرضة، شديدة الغضار. شمره يملو من ٣٠  
الى ٦٠ سم. ينتهي بنورة صيونية قلنسوية الشكل،  
ازهارها الى البياض الاخير.

٢٣٣٧١ - كُرَاتٌ وَرْدِيَّةٌ \*، قُرْطُ

Allium roseum (S). Ail rose (F). Rosy-flowered garlic  
(E). Rosen Lauch (D). Porro piccolo (I).

نوع من الكرات البري والزواهي المأكول. دوفسته يفضية  
الشكل سمره اللون تحرقها فصوص غليظة صغيرة القد.  
اوراقه مستطيلة محددة تعرض من ٥ الى ١٢ سم. شمره  
الزهرى يملو نحو ٧٠ سم. ينتهي بنورة صيونية كروية،  
ازهارها وردية اللون.

٢٣٣٧٢ - كُرَاتُ

Menon (F).

ثيس أو كيش يقدر القطيع.

٢٣٣٧٣ - كُرَاتُوسَلَا

Crassula (F).

هي الكرنب، اعلمها.

٢٣٣٧٤ - كُرَاتُةُ الْحَرَجِ \*

Xylébore dispar, Anisandrus dispar (S). Xylébore  
dispartite (F). Shot hole borer (E). Ungleich, Holzbohrer  
(D).

حشرة من الكرشيات. ثوبها الى السمرة السوية. الذكر  
اصفر قدماً من الاثني التي يراوح طرفاً من ٣ الى ٤ سم.  
تركب الانجار الحرجية حل اغتلاف فصائلها واجناسها  
ولا تنف من الدراق والمشمش والجوز. تخلج الشكير  
وترسده على حدود الخشب حيث تمتع المكان.

٢٣٣٧٥ - كُرَاتُةُ الْخَوْخِ \*، سَكُولِيَتُ الْخَوْخِ

Scolytus pruni (S). Scolyte du prunier, Grand scolyte  
des arbres fruitiers (F).

حشرة من الكرشيات طولها نحو ٥ سم. رأسها وكسولها  
وصدرها الى السواد اللامع، غداها وبطنها الى النعابي  
الزاهي. تركيب المخوخ وسائر الانجار الثمرة فتخلج  
الشكير في السوق والافصان. لها جيلان في الحول.  
يباها يتم في الطور البرقي.

٢٣٣٧٦ - كُرَاتُةُ الْوَرْدِ \*، سَكُولِيَتُ الْوَرْدِ

Scolytus amygdali (S). Scolyte de l'amandier (F).

حشرة من الكرشيات طولها يراوح من ٢ الى ٣ سم. ثوبها  
كسناثي اللون سطلي الملوح. تركيب معظم الانجار  
الورزية اغصانها الفرز فتخلج الشكير وتعطيه.

٢٣٣٧٧ - كُرَاتُةُ الْمَشْمِشِ \*

Xylébore saxeus, X. xylographus (S). Xylébore  
de l'abricotier, X. xylographe (F). Flat-celled shot  
borer (E). Borkenkäfer, Kleiner Holzbohrer (D).

حشرة من الكرشيات جسمها اسطواني الشكل، قصير القد،  
يطول نحو ٢ سم. ثوبها الى الحنطي المالبث || تركيب  
اغصان المشمش فتخلج الشكير وتعطيه.

٢٣٣٩٤ - كَرَبَس \*  
Porcello scaber (S).  
Porcellon (F). Porcello (E).

دوبية من القشريات مساويات الأرجل من فصيلة  
الظروبيات مبلولة في معظم مناطق البلاد الحارة والمتدلة  
الحارة || جسمها قليل الصلابة ، صغير اللدغ ، سمي  
التركيب ، بطول نحو ٨ سم. عند الذكر ونحو ١٤ سم.  
عند الانثى. رأسها صغير الحجم ، متكها قاصم قارض ،  
قربها الاستعمارية اربعة ، جرابها صلبة ، فربها  
ينتهي بأربع زوائد لامتناهية القد. ثوبها الى الطحلة  
والقضية والمساكن الاضية حيث تعيش بمئة حمار قبان ،  
وهي مثله بطيئة الحركة تسمى جهده وتتكور عند الشعور  
بالخطر || تسرح في الليل وتبيت في النهار . قربها المواد  
النضوية المنحلة وبعض اوراق البقول وسوقها وصافها  
ويطورها .

٢٣٣٩٥ - كَرَبَثُوت  
Grape-fruit  
هو ليون الجنة ، اكله .

٢٣٣٩٦ - كَرَبَل  
هو الشفش ، نوع من الاسماك ، اكله .

٢٣٣٩٧ - كَرَبَل \*  
Kalmia (S).  
Kalmie (F). Calico-bush (E). Kalmie (D). Calmia (I).  
جس نباتات معمرة من فصيلة الخلنجيات . انواعها عديدة  
جميعها سامة الاوراق والازهار. منها الاربية الربلية . منها  
الاجبار والشجيرات والجنبات والاعشاب. معظمها بري  
وبعضها زرعى . اوراقها كالملة ابيدة لا قياسية النظام  
الدوري . ازهارها لا قياسية التجميع والارتكاز ، خاصة  
البتلات الثنائية للفضن ، عشارية الاسدية ، بحلة الشكل ،  
مختلفة الالوان || اشهر انواعها ما يلي .

٢٣٣٩٨ - كَرَبَل بَحْرِي الْوَرْق  
Kalmia polifolia, K. glauca (S). Kalmie glauque (F).  
نوع من الكربل وهو بحلة سبروتية معمرة تملو من ٥٠ الى  
٧٠ سم . ساقها فراء فرونها مضلمة . اوراقها متقابلة  
سنائية الشكل ، نصلها بطول نحو ٥ سم. ويعرض نحو ١ سم.  
صفحة السفل خلية البشرة بيضاء اللون ، صفحة العليا  
الى الخضار البصري . ازهارها طليقة التجميع ، هامة  
الارتكاز ، وردية اللون ، ليلكية الحواج || ازهارها يستمر  
من نيسان الى ايار .

٢٣٣٩٩ - كَرَبَل زَهْبِي الْوَرْق  
Kalmia hirsuta (S). Kalmie velue (F).

نوع من الكربل وهو عشية سبروتية معمرة . شكلها شكل  
الصنوبر . ساقها ليفية فراء تملو نحو ٥٠ سم . اوراقها  
متعاقبة لاطنة صغيرة اللدغ . نصلها بطول نحو ١٠ سم .  
ويعرض من ١ الى ٣ سم. وهو خلي البشرة على صفحتيه .  
ازهارها ابيطة ، فردية ، حواء اللون || ازهارها يستمر  
من ايار الى حزيران .

٢٣٤٠٠ - كَرَبَل صَيْقِ الْوَرْق  
Kalmia angustifolia (S). Kalmie à feuilles étroites (F).  
نوع من الكربل وهو بحلة سبروتية معمرة تملو من ٦٠  
الى ١٠٠ سم . ساقها غشوية فراء . اوراقها متقابلة  
منقطة تملو نحو ٧ سم. وتعرض نحو ٢ سم . ازهارها عذيفة  
التجميع ، تاجية الارتكاز ، وردية اللون || ازهارها يستمر  
طوال شهر حزيران .

٢٣٣٩٦ - كَرَابُيَا \* ، كَرَوِيَا ، كَمُون اُرَمِي  
Carum carvi (S). Carvi, Cumín des prés, Kummel  
(F). Common caraway (E). Echter Kümmel, Kümmel  
(D). Carvi, Comino tedesco, Kummel (I).  
نبات من الاناربية وهي عشية سولية من فصيلة الخيميات.  
منها المروج والمرابي الجبلية وزرع بكثرة . جميع اجزاء  
النبات عطرية من الجذور الى الازهار والبزور وهي  
تستعمل استعمال الانثيسون وتدخل في تطهير الاجبان وسائر  
المأكلا || بزورها حاضرة تفتح الشبهة وتلدو القالب  
وتنشط العصائر للمعدة وتفتح التنف وحض الطعام  
وتحلل النغف وتطرد الرياح وتدر البول . غير ان الاكثار  
من استعمالها يضر بالكلى || ويستخرج من بزورها  
زيت طيار فاخر الصنف ذكي السوف .

٢٣٣٩٧ - كَرَب  
اصول السنف الغلات النراض التي تقطع معها . الوحدة  
كرية .

٢٣٣٩٨ - كَرَبِيَا ، وَهَم  
Emblaver (F).  
حرت الارض وسعها وبذرها .  
To sow with wheat (E).

٢٣٣٩٩ - كَرَبَايَا  
Entelurus (S).  
Entelure (F). Encelurus (E).

جس ايملا بحرية من غصليات الحياشم وفصيلة زماروات  
البحر . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطاها بعض مناطق  
البحر الابيض المتوسط . جميعها دقيقة الاجسام المستطيلة .  
الاولاها تزاوج من ٣٠ الى ٦٠ سم. وقوسها ضيقة الاعظام  
الحاغرية الاطراف .

٢٣٣٩٠ - كَرَبَايَايَا  
Flagellariaceae (S).  
Flagellariacées (F). Flagellariaceae (E).  
فصيلة نباتية من سحبات الفلقة قريبة للشبه من الاسليات.  
اشهر نباتاتها الكر بابية .

٢٣٣٩١ - كَرَبَايَايَا \*  
Flagellaria (S).  
Flagellaire (F). Wild ratan (E). Wilder Ratan (D).  
Flagellaria (I).  
جس نباتات سيمودية معمرة متسلقة من فصيلة  
الكر بابيات . انواعها عديدة مهدا البلاد الحارة . تألف  
النامق وضفاف الأنهار . اوراقها حاضرة ، عصفية الشكل ،  
متستطيلة . نصلها سيمك الصلصة ، بحري اللون ، ينتهي  
بحواق حلزونية مزدوجة .

٢٣٣٩٢ - كَرَبِيَا \*  
Carapa (S). Carapa.  
Carapa, Bois de Crabe (F). Crab-wood tree, Carapa-  
oil tree (E). Carapa-Baum, Crabbaum (D). Carapa (I).  
جس اشجار حرجية وصناعية من فصيلة الازدرقيات ،  
مهدا البلاد الاستوائية . تثبت قرب الشواطئ وصل صفات  
الاشجار . اشجارها كبيرة اللدغ داحضة وراوح ارتفاعها من  
٢٠ الى ٣٠ م . ثمارها جراء ليفية التركيب تحفن بعض  
البزور المختلفة الاشكال والاصجام ، يستخرج من لبها  
مادة دهنية مرة الطعم صفراء اللون يستعملونها في افريقية  
لقاية من الاجرات فيعذبون بها اجسادهم واخشاب منازلهم .  
وقد يستعمل دهن الكربة في صناعة الصابون . اما لحاء  
الاشجار فليفية ويستخرج منها مادة مرة تستعمل استعمال  
الكينا في مكانة الحمايات .

٢٣٣٩٣ - كَرَبِيَا  
الكربز : الفتاه الكبار الطولاء .



كرابويا



كرابوية




كرية



كرس



كربل



رقم ٦

### شبكة صفائح الكرة الأرضية وما يحفّ بها من أسرار دالية

للساحل البحرية والبحرية.

عوارض بطنية - أعرفها حتى الآن الصدح الوسط -  
الحلبي الذي يمتد من رقم ١٠ إلى ٣٧.

الإشعاع الشمسي - الموانئ المرفوعة للصحّ الأقصى  
نوع في الأرقام ١ و ١٧ و ٤١.

الانحسار الأعمى - يقولون، بعد الأليات العلمي،  
أن الانحسار نوباً وقع ثلاثاً منذ ١٧٠٠ مليون سنة في  
حدود الرقم ٤٠. أما سبه فيمرد إلى الأورانيوم ٢٣٥.

المعادن - مناجم المعادن تحتشد طوال الخطوط

التوالج الرهية - عشر مناطق، توزعها حول الكرة  
الأرضية متناسق الخطوط، تتميز بولاجها المدفحة.  
يشغل في أطرافها مثلك البرمود. للمناطق المشر تحصل  
الأرقام ١٦، ١٨، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٦، ٢٨، ٣٠، ٣٢، ٣٤، ٣٦، ٣٨، ٤٠، ٤٢، ٤٤، ٤٦، ٤٨، ٥٠، ٥٢، ٥٤، ٥٦، ٥٨، ٦٠، ٦٢، ٦٤، ٦٦، ٦٨، ٧٠، ٧٢، ٧٤، ٧٦، ٧٨، ٨٠، ٨٢، ٨٤، ٨٦، ٨٨، ٩٠، ٩٢، ٩٤، ٩٦، ٩٨، ١٠٠.

البراكين - معظمها واشتدّها نشاطاً يقع على خطوط  
التحام صفائح الغلاف اليابس الذي يأتي مباشرة تحت  
الغلاف الجوي.

جويكات - مراكز الحصف محصورة في بعض عقد  
الشبكة وقد تنجم عنها زوايا وأعاصير لا تأسية  
الفيض والسرعة تسير مع الخطوط كما هي الحال في

الشبكة للتفتية بتقوم الصفائح الكوردية. أما مناجم  
الفضة صد التفاعل. والدليل على ذلك منجم  
«ديومن» الذي يلقى كل حد.

تركيب التربة - الغصص المنصري في تركيب التربة  
يسبب بعض التذبذب والقرابات في تطور النبات كما  
هي الحال في القرنين ٢ و ٤ إذ أن ٧٥٪ من الأنواع  
الجويكية والنباتية لا توجد إلا في هاتين المنطقتين.  
انحصرت منطقة بحيرة بيكال.

تزوج الطير - أنواع الطيور القواطع التي تجوب البلاد  
معدلة أشهرها تلك التي رجاعها محصور بمناطق معينة  
لا تتخطاها وهي رقم ١٢ و ٢٠ و ٤١.



٢٣٤٠١ - كَرْبَل عَرِيضُ الْوَرَقِ ، غَارِ سَامَ ،  
لُورَة

*Kalmia latifolia* (S).  
Kalmie à feuilles larges, Laurier de montagne (F).  
Mountain laurel (E). Breitblättrige Kalmie (D).  
Calmia a foglie larghe, Lauro di montagna (I).

نوع من الكربيل وهو شجرة جميلة الشكل تلو من ٧ إلى ١٢ م. أوراقها مقابلة أو خمسة ثلاثية، تسلمها بطول نحو ١٣ سم. ويزرع في سم. أزهارها متكررة التجميع تاجية الارتكاز عديدة الألوان التي تختلف مع الضروب || انظره يستمر من حزيران إلى تموز.

٢٣٤٠٢ - كَرْبَلَة  
هي إنباء ، اطلية .٢٣٤٠٣ - كَرْبَلَة  
المعالجة بالكربونيل وفي عملية تقوم على طلاء الاشياء الخشبية أو تغطها بالكربونيل لحفظها من التلف .٢٣٤٠٤ - كَرْبُر  
نصم ثنائي أو هيدروجيني .٢٣٤٠٥ - كَرْبُوس  
*Pelodytes* (S).  
*Pelodytes* (F). Parsley-frog (E).

جنس ضفادع من فصيلة الحكسيات. أنواعه المعروفة قليلة ائسد مدها بعض اصقاع العالم القدم || اجسامها صغيرة القد تلو من ٤ إلى ٦ سم. عيونها كبيرة ناشزة. صدقات عيونها عمودية الارتكاز. جلدها مبررة التلو ولغند || اقوالها || الطحلة الخضراء تملوها زراكن متبينة الاشكال تختلف مع اختلاف النوع || من ميزات هذا الجنس رائحة الثوم الخاصة التي تفوح منه واستمراره على التفرقة نحو تسعة اشهر من كل عام || اشهر انواعه الكربوس المنقط .

٢٣٤٠٦ - كَرْبُوسُ مُنْقَطٌّ  
*Pelodytes punctatus* (S). *Pelodytes punctatus* (F).  
Spotted Parsley-frog (E).

نوع من ضفادع الكربوس وفصيلة الحكسيات . اعطاه تمتد من الشرق الاوسط الى اطراف البلاد الاسبانية دون ان تتجاوز الاقاليم المتدلة || جسمه صغير القد . الذكر يعطون من ٤ إلى ٥ سم. والانثى تطلو من ٦ إلى ٧ سم. رأسه متوسط الحجم . خطمه مستدير الطرف . عيناه كبيرتان ناشزتان . صدقة عينه عمودية الارتكاز . اصابع قوائمه الخلفية قليلة الخطاطب الذي يكتنف قواعدها فقط . جلده مثل البشرة . ظهروه مجهز ببعض التلو والتند المتدلة الشوز تنضج المادة النوية الرائحة التي يتميز بها || فوه الى الطحلة الخضراء تملوها لكت خضر عابقة || يعيش في المناطق وجاري الماء . يصر نحو عشر سنوات . مسرعه دجوي يستمر من الدروب الى الفجر . قوته الحشرات والديدان || الانثى تقرأ خلال موسمها السنوي الذي يستمر نحو تسعة اشهر من ١٢٠٠ الى ١٦٠٠ دجلة ضمن حبال مستطيلة تلتها على بعض النباتات المائية . التف يثم بعد التفرقة بنحو ثلاثة اسابيع واللبلايح عند اكتمال طورها البلوغ تلو نحو ٦ سم.

٢٣٤٠٧ - كَرْبُوبِيلُ حَنْطِي  
هو الوذعة الخنثية ، اطلية .  
*Carpophila bruna* (F).٢٣٤٠٨ - كَرْبُوكِيلَاز  
نوع من الانزيم الكثير الانتشار في معظم اعضاء النبات . نشاطه ينصمر بتأثيره في الحوامض .٢٣٤٠٩ - كَرْبُوبَلَة  
*Corbula* (S).  
*Corbula* (F). *Corbula* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم وفصيلة القفاليات . انواعها المعروفة عديدة نحو ٧٠٠ ، قسم منها اي نحو ٢٥٠ من متحجرات الاراضي الثانوية والثالثية ، اما الباقى فتنتشر في جميع بحار العالم || اصداها صبيكة الصفحة ، بيضية اللون ، لامتناهية المصاريع المنفصلة الاطراف .

٢٣٤١٠ - كَرْبُولِيغَاز  
انزيم شاذلة توجد في الحفيرة وفي التفاح وفي بعض اوراق النبات . جهدها يماكس جهده انزيمًا .٢٣٤١١ - كَرْبُون  
*Carbone* (F). *Carbon* (E).

جسم بسيط وزنه (ك-٤) وزنه الاتومي ١٢.٠١ وهو من عناصر المركبات العضوية الاسمية ان نباتية او حيوانية . ونظراً لكثرة اهمية هذه المركبات الكربونية فقد جعلوا الكيمياء العضوية لدراساتها || والكربون لا ينصهر وهو قابل للاقتاد ومحل وبيد الانصالة الحرارية والكهرية || يوجد في الطبيعة على اشكال مختلفة اصغها الليبورة كالاسر والاسرب وغير الليبورة كالكسم والساج .

٢٣٤١٢ - كَرْبُونَات  
ملح الحامض الكربوني .٢٣٤١٣ - كَرْبُونَاتُ الْبُوتَاسِيُوم  
*Carbonate de potassium* (F). *Potassium carbonate* (E).  
ملح ابيض سريع اللويان في الماء يحوي من ٢ الى ١٢ ٪ من البوتاس || يستعمل ككاس يوتاسي .٢٣٤١٤ - كَرْبُونَاتُ الْكَلْسِيُومُ ، كَرْبُونَاتُ الْكِلْس  
*Carbonate de calcium* (F).  
*Calcium carbonate* (E).

ملح الكلسيوم الطبيعي الذي يؤلف معظم الطبقة السطحية من الكرة الارضية .

٢٣٤١٥ - كَرْبُونِي  
*Carbonifère* (F).  
*Carboniferous*, Coal-bearing (E).

نمت تربوي يطلق على الصخور والتراب التي تحوي بعض الكربون أو الفحم الحجري || ويطلق خاصة على الطبقة الرابعة من الاياح القدم وفي الطبقة الارضية التي ترتكز على التيلفونية . راجع مادة حياة .

٢٣٤١٦ - كَرْبُونِيل  
*Carbonyla* (F). *Carbonyla* (E).  
مركب مضاد تنفث يستعمل في صيانة الاخشاب .٢٣٤١٧ - كَرْبُونِيَاوَال  
*Carbohydraz*  
هو السائل الذي تقوم به الانزيمات في مضافة الحلويد والمترسيد .٢٣٤١٨ - كَرْبُوبِيَة  
*Couroupita* (S).  
*Couroupita* (F).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الآسيات . انواعها المعروفة خمسة منها بعض اصقاع امريكا الجنوبية اصغها



كربوس منقط



كربلة



كريمة



كريس

تسردب لحاء وشكير جلوع النباتات البرية || جسمها صغير القند يطول من ٨ الى ١٢ سم. رأسها وكسبها وبطنها وجرايزها الى السواد الاسفع. ظهرها الى الخضار الازرق المواج. صيهاا كبيرتان جاحظتان. زباناها دقيقان مستطيلان || غلظهاا مقطوع الطرف الاصح. غمداها متباعدتان التعديد. ارسافها رباعية العقل الظاهرة || الاثنى امين قدام من الذاكر واخصم بطناً منه واخصر زبانا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانية في نوسان وميش حتى اواخر سبزيان. تسرح في البهار || البرقة عند ادراكها الكلال الجسموري تطول نحو ١٨ سم. جسمها مستطيل المقدم والرأس، مستدق المؤخر، قليل الحلب المبيشر. ثوبها الى الخنطي الاسمر. رأسها وشرجها الى السمرة السوداء.

Corbis (S).

Corbis (F). Corbis (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة اللوريفيات. انواعها المعروفة عديدة منها المعاصرة ومنها النابرة المتحجرة التي تعود الى الحقبة السيلورية || اصدهاا شبه بيضيه الشكل متساكنة و غمدة ، هابكة الاولان ، يكثر فيها الجزوي القاتم || اجسامها متوسطة الحطب او صغيرة و ثنائية الشاغب المستطيلة الطليقة || اعطائها معظم بحار العالم. تعيش منفردة في الرمال المغسورة بالماء المعتدل القور .

Karst

٢٣٤٢٥ - كَرْتَش

هي الطريقة الطبائية السطحية كُتُرَتْ فيها الإمات والكنتل للاقياسية الارتكاز والاجرام .

Corrigiola (S).

Corrigiole (F). Corrigiola (E).

جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة التوبانيات. انواعها المعروفة ستة منهاها الشرق الاذق واروبية وبعض مناطق افريقية وامريكة الجنوبية || سوقهاا نجيلة . اوراقهاا لحية مستطيلة. ازهارهاا حامي ضمي التجميع . ازهارهاا صغيرة خاسية البتلات والاسدية و ثنية اللون . تنويرها ربيعي. اعرفت انواعهاا واشهرهاا كرجولة السواحل .

Sphère, Globe (F).

Sphere, Globe (E).

جسم مستدير الشكل يتميز بشاري جميع خطوطه المستقيمة المستدة من المركز الى السطح . تؤخذ مساحة الكرة بضرب مربع قايهاا بعدد ١٢,٥٦٦٤ و يؤخذ حجمهاا بضرب مكعب قايهاا بعدد ٤,١٨٨٨ .

Globe terrestre (F).

Terrestrial globe (E).

الكرة الارضية كوكب سيار من النظام الشمسي . (راجع ارض) || كيف تكونت وتى ؟ بحث يقودنا الى عدة نظريات لا مجال لكردهاا جميعها ، انما نذكر اشيعهاا واقربهاا لطقن || عند حصول الانفجار السديمي ، ابي منذ نحو ٧ مليارات سنة ، تكون الشرح الرقيعي المعروف بالنظام الشمسي ، لانه يتألف من الشمس وكواكبهاا ومنها الكرة الارضية التي بعد ان دارت حول الشمس مليارات السنين اصبحت ما نعرف عنها الآن ؛ ارض متباينة التضاريس والقشامة تطلوها مياه البحر ، حركة مستمرة لا يمكن ان ترقف لان وقونهاا يعني الزوال . وسياة تنبت من كنه الخالق فتجسد وتنو ثم تلوي وتندثر . (راجع تاريخ الكرة الارضية) || اما الخواطل الاربع المدرجة تايغاا فاتهاا تبين مدى التطورات العظيمة المفعلة التي حصلت عبر الازمنة السميعة النابرة ، وما سيحصل في المستقبل البعيد بعد مرور ٤ او ٥٠ مليون سنة .



كركوم أسود الرأس

Base du cou (F).

Basis of the neck (E).

هو اصيل العنق ار قاعدة ارتكازه .

Ferme, Métairie (F).

Farm, Lease, Land (E).

المشارنة من المزارع . ج. كرو .

٢٣٤٣٠ - كَرْدَة ، عَشْبَة السَّيْح ، دَقْنَة

قَاتِيَة

Daphne tatonraire, Thymelaea tatonraire (S).

Daphné cartonraire, Tartonraire, Herbe terrible (F).

Silver leaved daphne (E). Tartonraire (D). Laureola bianca, Salamandra (I).

نوع من الدفنة البرية السامة صيهاا منهاها المواتع الكنسية الرطبة . شكلهاا يشبه الخلج ، ساقهاا فراء تملو نحو ١٢٠ سم. اوراقهاا متقابلة ضيقة ، نصلهاا جامد الصلصة ، باهت الخضار . ازهارهاا صبيالة التجميع ، هامة الارتكاز ، صغيرة القند ، يضاء اللون .

Boule de neige (F).

هي الافلاس الثلجي ، اطلبه .

Photosphère (F).

Photosphere (E).

سطح الشمس المضي .



كرد

٢٣٤٣٤ - كَرْتَشْلُومِ اسْوَدِ الرَاسِ \*

Cartallum ebulinum (S). Cartallum à tête noire (F).

Cartallum ebulinum (E).

حشرة واشمة غاشلة من فصيلة القرنيبات ورثة مدمغات الانجينة . تألف البراري والزارواتين . غناقصهاا تعيش حل بتلات الازهار واخصهاا ازهار الصروانيات . يرقاهاا همة

Cordana (S).

٢٣٤٣١ - كَرْدَة كَلَه \*

جنس فطور مجهرية من عمارة الزناخيات وفصيلة اللطحيات. جربه الكندية اسطوانية قصيرة تعلوهاا كاتل صربانية ضمية التجميع قنائة الخلية || انواعهاا قليلة العدد والاذى ، ارفهاا كردانة الموز .

## ٢٣٤٤١ - كُرْدُ هَانِ الْغَاب

*Codonopsis silvestris* (S). *Codonopsis* des bois (F).  
نوع من الكردان. ساقه فرواء متسلقة متلغو نحو ١٥ سم.  
أوراقه متفقة قليلة الشكل، نضالها مبهر الزغب  
الجامد. ازهاره لا قياسية الارتكاز، كثيرة العدد، صفراء  
القد، فستقية اللون || ازهاره يستمر من تموز الى آب.



كردانة الموز

## ٢٣٤٤١ - كُرْدُ هَانِ بَيْضِي الْوَرَق

*Codonopsis ovata* (S). *Codonopsis* à feuilles ovales (F).  
نوع من الكردان. ساقه متسلقة متلغو نحو ٨٠ سم.  
فروعها متقابلة قليلة الاستطالة. أوراقه بيضيه الشكل،  
خلية البصرة، متطول من ٢ الى ٣ سم. ازهاره متطول نحو ٣ سم.  
لونها الى الزرقة الباهتة يملؤها تزيين عايق || ازهاره  
يستمر طوال الصيف.



كردون

## ٢٣٤٤٢ - كُرْدُ هَانِ مَرَعَانِي

*Codonopsis clematidea* (S). *Codonopsis*-clematide (F).  
نوع من الكردان. ساقه متسلقة متلغو نحو ١٢٠ سم.  
فروعها لا قياسية الارتكاز. أوراقه متفقة كاملة،  
السلخ منها متقابلة والعليا متعاقبة، نضالها خلية البصرة،  
بيضية الصفحة اللينة عند زأها الاخير. ازهاره طرفية  
الارتكاز، بيضاء اللون، مغطاة بالازرق || ازهاره  
يستمر من تموز الى آب.



كردلس

## ٢٣٤٤٤ - كُرْدُولَه \*

*Cordylura* (S). *Cordylure* (F). *Cordylura* (E).  
جنس حشرات قاصصة من فصيلة الكردوليات ورتبة ذوات  
الجناحين. أنواعها المعروفة متوسطة المدد منتشرة في معظم  
أقطار العالم || أجسامها هيفاء، متطول من ٨ الى ١٢ سم.  
رؤوسها كبيرة، مستعرضة. جوفها ناشزة، متباعدة عند  
الفتحين. قرونها الاستشعارية شديدة القصر، تنتهي  
بنسيلة دقيقة، اعطائها ضيقة، ملاسها صغيرة، يطرأها  
صقبة الشكل. كواسلها ويطرأها ورؤوسها وقواسلها  
متكاثفة الملب. ورأسها ضيقة، ملونة، قواسلها نسيطة ||  
الحشرة الجملانة قاصصة، البرقة قازية واجبة.



كردوله

## ٢٣٤٤٥ - كُرْدُوم \*

*Cardium* (S). *Cardium*, *Bucarde* (F). *Cardium* (E).  
جنس حيوانات بحرية وقماص من الرخويات صفيحات  
الغياشيم وفصيلة الكردوميات. أنواعها المعروفة كثيرة العدد  
معظمها نهري وبضها قماص يعيش في مياه الأغوار ||  
اصداؤها شبه قليلة الشكل، متساوية المصارع. اصداؤها  
ماسية أو مخرطة أو مفصلة، جميعها محززة ملونة ماعدة  
الافضية. مفصلاتها رباعية الاسنان. مشاهبا ثنائية  
طليقة || تعيش منتشرة في الاسماك والزمايل.



كردوم

## ٢٣٤٣٢ - كُرْدَانَةُ المَز \* \*

*Cordana musae* (S).  
فطر مجهري يركب أوراق الموز فيؤذيها بغض الشيء.  
مظهره الخارجي زخفة عدية الشكل تركيب النصل حل  
صفحته العليا، تبرز سره، اللون ثم تنصرف الى الخلفي  
يعطيها حمار اشهب قائم || ازهاره زبدية لا تتدعي  
الذانية.

## ٢٣٤٣٣ - كُرْدَرَة

*Kruberia* (S). *Krubère* (F).  
جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة الخيميات.  
انواعها المعروفة عديدة منهاها معظم مناطق حوض البحر  
الابيض المتوسط || سوقها مستضخمة، غضة، لمساء  
الماء و فراء، أوراقها محززة متباينة التفصيل الريشي.  
ازهارها صيراني التجميع، طرفي الارتكاز، لاستساوي  
الاشمة عددا وطولها. ازهارها صفراء، بيضاء اللون أو  
صفراء أو أرجوانية || تنويرها ربيعي.

## ٢٣٤٣٤ - كُرْدُولُون \*

*Cordulia*  
جنس حشرات من فصيلة البسمويات، انواعها المعروفة  
قليلة جميعها مفترسة تقضي على الحوام، طول أجسامها يراوح  
من ٤٨ الى ٥٠ سم. بسطة اجنتها تراوح من ٦٠ الى  
٦٤ سم. ألوانها الى الخضار الزرقي. انثاها اصعب ثوبا من  
ذكورها.

## ٢٣٤٣٥ - كُرْدَالِيَس \*

*Corydalis* (S). *Corydalis* (F). *Corydalis* (E).  
جنس حشرات من فصيلة الكردوليات ورتبة سادات  
الاجنحة. انواعها المعروفة عديدة موطنها الاقطار الامريكية ||  
اجسامها مستطيلة، شبه اسطوانية الشكل. رؤوسها  
غلطية، متضادة التبطيط. جوفها صغيرة. قرونها  
الاستشعارية ضيقة. تتميز بتأثيرها المستطيلة خاصة  
عند الذكور. اجنتها غشائية، شبه متساوية. ألوانها  
تراوح من السمر الى الكهبة || يرقاتها مفترسة تعيش  
كامل طولها الريفي في الماء.

## ٢٣٤٣٦ - كُرْدَالِيَسِيَّات \*

*Corydalidae* (S). *Corydalidae* (F). *Corydalidae* (E).  
فصيلة حشرات من رتبة سادات الاجنحة. اجناسها  
وانواعها المعروفة عديدة، منتشرة في معظم اقطار البلاد  
الامريكية || اجسامها مستطيلة، شبه اسطوانية الشكل.  
رؤوسها مستطيلة يكثر فيها التبطيط. قرونها الاستشعارية  
ضيقة. جوفها صغيرة جانبية. اجنتها غشائية ||  
مسرها دجوي. يرقاتها مائية مفترسة.

## ٢٣٤٣٧ - كُرْدُولِين

*Cordylina* (F).  
هو القلب، جنس نباتات زينة، اطلب.

## ٢٣٤٣٨ - كُرْدَمَانَة

*Garou* (F).  
نوع من الدفنة، اطلب مثان.

## ٢٣٤٣٩ - كُرْدُ هَان

*Codonopsis* (S). *Codonopsis* (F).  
الاسم العلمي من البولاني يمين يشبه الجرس. جنس نباتات  
عشبية معمرة من فصيلة الجريسيات. انواعها عديدة معظمها  
بري وبضها ترابي. اعطائها بلاد الشرق. جنورها  
طبية. سوقها متسلقة متلغو أو ملقة. أوراقها لا قياسية  
الشكل والارتكاز يلب فيها التقابل. نضالها بحرية اللون.  
ازهارها جريسية متدلية || اشهر انواعها ما يتبع.

Cerasus (S).

Cerisier (F). Cherry tree (E).

جلس الجمار برية وزراعية مشرفة من فصيلة الوردية .  
أنواعه وفروبه كثيرة العدد تختلف بأحجامها ومياكلها  
وأركانها وأغصانها وقد ثمارها وأشكالها . ورق هذا الثابتين  
في الإصم الجسورية فالصفات الشجرية الجنية  
الرئيسية واحدة : جذور عمودية ثم حزبية ، سوق منتصبة ،  
حالة حاملة ، غشب جزوي اللون ، أوراق منتقة ، مسنة  
الحافة ، نصلها بيضيه الشكل أو رمية . أزهار نوري  
التجميع يشمل من ٣ الى ١٢ زهرة ، أزهار بيض ، خاسية  
الثلاث ، عديدة الاسدية ، ثمار لحمية ، مستطيلة الاذن ،  
كروية الشكل ، مألسة القشور اللامعة ، لذيلة للباب  
الدم ، مستديرة البزور الصلبة || وهو من الانجار  
التي تألف المناطق البادية في الاقاليم الممتدة لكنه يخفى  
المواقع المرفعة لرياح الموسم لانها تسبب اغلاص الزهار .  
يعد في جميع الاثربة من الفقيرة بالماءو الذالية الى الخسبة  
ومن الرولية الى الطينية غير انه لا يتحمل الاثربة الشديدة  
الانحماص ، المستحكة الرطوبه . وهو يتكاثر بالبزور  
والنقل وبالتقريد والتعلم . منع واجود معلهاه الخشب  
والبري والشرية وسناليويه .

Cerasus avium (S).

Cerisier des oiseaux, C. des bois, Mèrisier (F). Gean  
cherry, Hedge-berry, Sour-cherry (E). Süskirsche  
(D). Ciliegio visciolo, Cilegolo (I).

نوع من الكرز الزراعي المشر . اليه تنسب أكثر وأشهر  
الضروب الموصوفة المرفوعة ، انجاره كبيرة اللد تملو من  
١٠ الى ٢٠٠ . سوقها وأغصانها منتصبة ، ثمارها مستديرة ،  
كروية ، صغيرة ، سكرية الطعم ، مستحبة المذاق ،  
لذيلة النكهة .

Cerise des Juifs (F).

كرز القديس

هو الحبة الكاكجية ، أغلبها .

٢٣٤٥٥ - كَرَزْ عَادِي \* كَرَزْ حَامِض

Cerasus vulgaris (S). Cerisier acide, Griottoer, Bi-  
garreaulier (F). Cherry tree (E). Sauerkirsch, Sau-  
kirschen (D). Ciliegio agerotto, Ciliegio (I).

نوع من الكرز الزراعي المشر المديد الضروب . ساقه  
منتصبة تملو من ٦ الى ١٢ م . اغصانها منفرجة مسترسلة .  
ثمار كروية ، قليلة الحمرة ، خريزة المادة ، لذيلة الطعم ،  
بينه الحامضة التي تختلف نسبها مع الضروب وقد تكون  
حامزة في الضروب المرفوعة بالوشنة .

٢٣٤٥٦ - كَرَزْ عَشْدَوِي \* Cerasus padus (S).

Cerisier à grappes, Putier, Putlet (F). Bird-cherry,  
Hach-berry, Hog-cherry (E). Gemeine Trauben-  
kirsch (D). Pado, Ciliegio à grappoli (I).

نوع من الكرز البري المشر . ثماره صغيرة اللد ، عقدية  
التجميع ، حامزة الطعم مأكولة . منيته الأغصان والجبال  
الصخرية . شجيرة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ م . اغصانها  
مسترسلة متدلية ، لوراتها اعليجية ذرية مسنة الحافة .

٢٣٤٥٧ - كَرَزْ غَارِي \* كَرَزْ الْغَار

Prunus lauro-cerasus (S). Laurier-cerise (F). Cherry  
laural (E). Larbeer-kirsche (D). Lauro ceraso, l.  
mandorlo (I).

جنس نباتات برية ورزيتين من فصيلة الورديات . أنواعه  
قليلة العدد منها الانجار والشجيرات والجنيات . سوقها

المضلة والمنسنة الاطراف المنفرجة . جميعها ثنائية المشاب  
الطليقة || اعرف اجناسها واشهرها الكروم .

٢٣٤٥٧ - كَرْدَيْت \*

Cardita (S).

Cardite (F). Cardica (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشم  
وفصيلة الكرديتيات . انواعها المرفوعة كثيرة العدد منتشرة  
في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداها  
شبه قلبية الشكل ، مسنة التخديد . مشاب ثنائية ،  
طليقة || تعيش لاسقة بالصخور المغمورة القليلة الغور ،  
ليغنها غزير المادة النشيلة .

٢٣٤٥٨ - كَرْدَيْتَات ٥ Carditidae (S).

Carditidae (F). Carditidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشم .  
اجناسها وانواعها عديدة . المعاصرة منها منتشرة في جميع  
بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . اما القائرة فن  
متحجرات الاثربة الديونية || اصداها شبه قلبية الشكل ،  
مدية الفتن . خياشيمها لاسقوية اللد ، خلفية الرباط .  
مصاديها متساوية ، منفرجة الاطراف || اعرف اجناسها  
واشهرها الكرديت .

٢٣٤٥٩ - كَرْدَيْتَال Cardinalis (S).

Cardinal (F). Cardinal (E).

جنس طير من فصيلة الشرشوريات . انواعها المرفوعة اربعة  
مولها بعض مناطق امريكا الشمالية والوسطى . يألف  
الغابات . فوسه يزاح من ٢٠ الى ٧٠ زوجا || اجناسها  
صغيرة اللد . رؤوسها متوجة بفتازع شباينة الاحجام .  
اثوابها ملونة يكثر فيها الاحمر والجذوي . تتميز بمناقيدها  
الشبه غرولية الشكل القصيرة والفصلية . اذنانها مستطيلة ،  
مقررة الاطراف او مستديرتها || طيراتها خفيفة الحركة ،  
معتدلة الشوط ، كثير التصيد والتبييط . تتنقل على الارض  
مخففة وعلى الاغصان برشاقة || فونها الثار النعينة والبلور  
واشيرات لا تنف عن ثمار الناكهة والحلوب والذرة ||  
اشهر انواعه كريدنال فيرجينية .

٢٣٤٥٠ - كَرْدَيْتَال فيرجينية \*

Cardinalis virginianus (S). Cardinal de virginie (F).

Cardinal canager (E).

طائر من الكريدناتل . مولته بعض مناطق امريكا الشمالية  
اغصانها فيرجينية . يألف الغابات ويحبو البلاد باستمرار  
الا في زدن الترخيم . فوسه يعد من ٢٠ الى ٤٠ زوجا ||  
جسمه صغير اللد . ربع القامة ، يطول نحو ٢٣ سم . بما  
فيه الذنب الذي يطول نحو ١١ سم . ثوبه الى الحمرة  
القرمزية تبهت في الظهر وتيمق في الجناحين والذنب .  
جبهته الى الجوزة وكشته كذلك . ذره اسود . صدقه عينه  
ياقوتية اللون يطوقها حطار جزوي || طيرانه غفيف  
الحركة ، سريعها ، معتدل الشوط || يدن عشه في  
الادغال برى الانجار القليلة الارتفاع الملتفة الانداد  
والانفان . الاثني تنص من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها وسدها  
نحو ١٣ يوما بينا الذكر يؤن لها الغذاء .

٢٣٤٥١ - كَرَزْ Cône, Strobile (F).

Cone, Pine-cone, Strobile (E).

ثمرة انجار النصلية السنورية وفيها من الثار الخروطية  
او الخروطية الشكل .



كرديت



كريدنال فيرجينية



كرز



كرز الطير



كرز عادي



كرز عقدوي

## ٢٣٤٦٣ - كَرْسُوفَة ذَرِيَّة

*Botryodiplodia tubercicola* (S). Java black-rot (E).  
نظر مجهرى يتطفل على ذريات البطاطا الملوة قطنها .  
مظهره الخارجي احتلال خيطي البياض والقشور تتسمر  
وتسود وتسلخ ثم تنفصن ويلبوا المغن || علاجه الرشيد  
يقوم باجتناى الزواحة في الموانئ الرطبة وفي الاربة  
المويدة مع تلكا كى بضروة تطهير البذار قبل الزرع .

٢٣٤٦٤ - كَرْسُوف \*  
*Coton* (F).  
هو القطن ، اطليه .

٢٣٤٦٥ - كَرْسُوفِيَّة \* عَشَقَال \*  
*Gnaphale* (F).  
جنس لياتات برية طلية من فصيلة المركبات ، انواعها  
عديدة منها المشبية الحولية والخشبية الممرة . سوتها واوراقها  
زباء ، زغبها ابيض اللون . اوراقها متمتلة لاطقة كاملة  
صغيرة للقد ستانية النصل . ازهارها وريسات طرفية .  
منظم انواعها طبي يستعمل ضد السعال ويضع الصدر .  
اعرف انواعها وانهرها ما يلي .

٢٣٤٦٦ - كَرْسُوفِيَّة جَبَلِيَّة \* عَشَقَال جَبَلِي  
*Gnaphalium leontopodium* (S). *Gnaphale pied-de-*  
*lion* (F). *Lion's paw cudweed*, *Everlasting* (E). *Ruhr-*  
*kraut*, *Ruhrpflanze* (D). *Canapicchia*, *immortali* (I).  
نوع من الكرسفية البرية الطلية منها الجبال العالية ،  
زغبها ليد أغبر اللون . ازهارها ليلكية . تفيد السعال .

٢٣٤٦٧ - كَرْسُوفِيَّة حَمْرَاء \* عَشَقَال أَحْمَر \*  
*Gnaphalium sanguineum* (S). *دم الغزال*  
*Gnaphale rouge* (F). *Red cudweed* (E). *Roter*  
*Ruhrkraut* (D). *Canapicchia rossa* (I).  
نوع من الكرسفية البرية الطلية المملولة . تنبت في الاراضي  
للحشاح من ارتفاع ٤٠٠ الى ١٢٠٠ م . عن سطح البحر .  
زغبها ابيض اللون برآق . ازهارها الى الحمرة الجملية . تفيد  
السعال والصدر .

## ٢٣٤٦٨ - كَرْسُوفَة \*

*Ervum ervilia*, *Vicia ervilia* (S). *Ers*, *Erville*, *Lan-*  
*tille ervillière*, *Vesce noire*, *Faux orobe* (F). *Ers*, *Ervil*,  
*Bitter vetch* (E). *Stachelwicke* (D). *Ervo*, *Frageolini*,  
*Girto*, *Lero*, *Moco*, *Veggiolo* (I).

نبات عشبي حولي علني من فصيلة البقوليات ، يزهر فيه  
رشته . وهو يسلط فلفا للبهائم اخصها البقر والتمر الا ان  
كثرت مستشيلة لذلك يحسن الثوري في استعماله || جلونه  
سطحية متوترة الانشباب . ساقه غزوة قليلة الفروع  
تتلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه متعاقبة ، مركبة ، شضية ،  
مؤلفة من ١٥ او ١٢ او ١٤ زوجا من الورديات  
الامتتالة ، نصلها يضي الشكل ، أسس الصمعة .  
ازهاره صغيرة القد ، بنفسجية اللون مسطيلة الزناد . ثماره  
سنت صغار وكل سفة تحسن من حين الى ثلاث حبات  
صغيرة القدر لا قياسية الشكل لونها في السرة البنية .  
زراعت بهلية وهو يحمى بعد الحطة او الشعر . من جميع  
الارربة الخلفية والمتوسطة الانماج ولا يخشى سوى المراتق  
الرطبة || ينذر عاده في الكواكن لزوم الدم رباح  
من ١٠ الى ١٢ كيلو .

٢٣٤٦٩ - كَرْسُوفِيَّات \* هي البقيات ، اطلبها .

٢٣٤٧٠ - كَرْسُوعِي \*  
*Grégaire* (F).  
*Gregarious* (E).

صفة النبات الذي يعيش ويتكاثر سباعيا متجانسا .

منتمية ، اوراقها ابيدة ، احليابية ، ستانية ، نصلها  
جامد الصفحة ، منشاري الحافة . ازهارها عتدية التجميع  
ثمارها صغيرة القد زيتونية الشكل ذوبة القنب ، لونها الى  
الحمرة او السواد .

٢٣٤٥٨ - كَرْزَة  
*Cerise*, *Guigne* (F).  
*Cherry*, *Sweet cherry*, *Heart cherry* (E).

هي ثمرة الكرز ، اشكالها والوانها عديدة جميعها مستحبة  
العلم المركب . لباب سوتها يحوي نحو :

من الماء	٨٠,١٠ ٪
من المواد السكرية	١١,٩٠ ٪
من المواد الاستخلاصية	٣,٨٥ ٪
من المواد الازوتية	٣,٢٥ ٪
من المواد المعدنية	٢,٢٥ ٪
من السليولور	٢,٥٢ ٪
من الرماد	٢,٤٣ ٪

وهو يحوي ايضا بعض الحماض الضوية اخصها الحامض  
التفاسي وما لا يستأن به من العناصر المعدنية كالبريتاس  
والفسفور والفلينزيوم والكلسيوم والصوديوم  
والحديد والنحاس واليود ... اخصف الى ذلك نحو ١٥ ٪  
من الفيتامين د١٥ وما لا يقل عن ٥٠٠ وحدة من الفيتامين  
د١٥ .

٢٣٤٥٩ - كَرْزِي  
*Bacciforme* (F).  
*Bacciform*, *Berry-shaped* (E).

ما كان شكله شكل حبة القنب او الكرز .

٢٣٤٦٠ - كَرْسُوس ، صَاغُورَة ، مِرَاع  
*Chèvrerie* (F). *Goat-pan* (E).

مأوى الماعز المبني للمسقوف . والكرس هو ما تلبه من  
البر والابل . ج . اكراس ومرح ويوايز .

٢٣٤٦١ - كَرْسُوفَة \*  
*Botryodiplodia* (S).  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات . يكتبداته  
شمية كثيفة تجمعها ونية غليظة شارفة . بويضاته حطية  
اللون ثنائية الخلية || انواعه الموزة قليلة ، يكثر وجودها  
في البلاد الحارة ، اعرفها ما يتبع .

٢٣٤٦٢ - كَرْسُوفَة الكَاكَاو \*  
*Botryodiplodia theobromae*, *Lasiodiplodia theobromae* (S).

فطر مجهرى يصيب عدة نباتات مختلفة الفصائل اخصها  
الككاو والتماري والبن والمطاط والقطن والموز || فهو على  
الككاو اكثة تنخر الجلود فتذبل الاوراق بعد ان تمتلح  
السنخ يفسخ من العفن الاسود وبعد ان توشع لحاء الساق  
بعض البقع المنخفضة السواء اللون || وهو على الموز  
فمن يركب قلب الارومة فيزورها او يصيب الطرح فيوش  
الثار يبعث قطرها وصمغها نحو ٨ م . لونها الى الخضار  
الزيتوني || وهو على المطاط ذبول على بقعة الشجرة يبعث  
اسمرار واسوداد في لحاء الساق || ويصيب الشاي والبن  
فيابل الينان والاناد وبنجوا || وهو في القطن يرم  
يركب المغازة فيمنها من النسو بعد ان يركم تيلها ويغيب  
يشبهه الاسود || يكافح بالقسطاق وحرق الاضواء المروية ،  
بظهير الجروح ، ويستأكل أحد الفواطر المغلاة أما  
نفسها حل النبات او تفتيرا على الربة والنبات .



كرز غاري



كرسفية جبلية



كرسفية حراء



كرسفة

قصيرة وغليظة ، جلورها عمودية . أوراقها لاطئة متناوبة مركبة ، السفلى منها قرصية الانشقاب مستطيلة الاضلاع الصليبية ، اما العليا فتنباعدة وكثيرة التفريش . ازهارها صيوانية التجميع ، لونها الى الياض الاصفر || وهي من النباتات القلبية تدر البول وتنفع الصدر وتحلل الورم وتنفع الحمى || تنكاثر بالزهر وترغب في الازربة للبدانة الحسنة .

### \* كُرْسِيّ الجَبَل \* ٢٣٤٨٢

Athamanta oreoselinum, Petroselinum oreoselinum (S). Ache de montagne (F). Moutain parsley (E). Augen Wurz (D). Appio di montana (I). نبات عشبي بري طلي معمر من فصيلة الخيميات ، منبته الجبال الريفية . ساقه محشوشة تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . أوراقها مستطيلة الاضلاع كثيرة التفريش والتشريح . ازهارها صيوانية التجميع صغيرة اللقد وردية اللون .

### \* كُرْسِيّ الماء \* ٢٣٤٨٣

Stium latifolium (S). Ache aquatique, A. d'eau, Berle (F). Water parsley (E). Breiter Merk, Wasser Peterlein (D). Erba crociana, Sedano d'acqua (I). ومن اسمائه أنس النفس وجرجير الماء وهو نبات عشبي طلي معمر ، من فصيلة الخيميات ، يتكاثر في المنابع والأراضي الرطبة . أوراقها وجلورها مضادة الحفر ومدرة البول . يزور منطقة كاكول في هيجية لقوة الجنسية وقد تكون شاقبة نظراً لما تحواه من النشور والكلسيوم . وإذا رعت الماشية من غم وماعز وبقر كثر دجها وصنفه .

### \* كُرْسِيّ بَرِّي \* ٢٣٤٨٤

Smyrniolus olusatrum (S). Maceron, Mac. potager, Ache large, Gros persil (F). Alexander's, Horse parsley, Wild celery (E). Gespenstgeißel, Smyrnerkraut (D). Macerone, Olosatro, Smirino (I). نبات عشبي بري يغلي من فصيلة الخيميات . ينبت في معظم الاصااح الممتدة الحارة . قريب الشبه من البقدونس والكرفس . أوراقها مأكلة مستحبة العرف والطمع .

### \* كُرْسِيّ رُؤْيِي \* ٢٣٤٨٥

Persil (F). هو البقدونس ، اطليه .

### \* كُرْسِيّ لَفْيِي \* ٢٣٤٨٦

Apium graveolens rapaceum (S). Céleri-rave, Céleri navet (F). Turnip rooted celery, Celeries (E). Kohl-rabstaller, Selleriak, Knoll-Sellerie (D). Sedano rapa (I). ضرب من الكرسي يزرع جلجوره وأوراقه المأكولة . وهو نبات محلي يندر في الأكراد ثم ينتقل الى مستقره . يرغب في الازربة لطوارة الحسنة .

### \* كُرْسِيّ ٢٣٤٨٧

Auchenoglanis (S). قال الفريق أمين الملوغ : « الكرسي أو شال كرسي ، سلك سلوري ذكر منه بولنجة تودين في النيل » .

### \* كُرْسِيّ كُرْ ٢٣٤٨٨

Carvacrol سائل زيتي حاد اللون يتخلط من سطور الشفويات والسيوانيات ، انحصا بطور العصم والقودنج والندج . نقله النسيبي عند ١٠ مغ ٩٨٥٦ . وهو يغلي عند ٢٣٦ مغ .

### ٢٣٤٧١ - كُرْسِيّ الجَزْء

كرسي الجزء مجسمة كواكب بالقرب من الجزء .

### ٢٣٤٧٢ - كُرْسِيّ

Souchet à nattes (F). هو سد الحصر ، اطليه .

### ٢٣٤٧٣ - كُرْسِيّ

Panse, Rumen (F). Belly, Paunch, Rumen (E). اكبر اقسام معدة الخيترات تتصل بالمريء وتشغل ثلاثة ارباع الجوف .

### ٢٣٤٧٤ - كُرْسِيّ ٥

Calyptra (F). Calyptra (E). حوقل الجرثائم الفطرية واشباهها .

### ٢٣٤٧٥ - كُرْسِيّ ٥

Calyptra نمجد شالي مركزه عند الازاربة الخلفية من قاعدة ظهور الحشرة .

### ٢٣٤٧٦ - كُرْسُون \* ، وأس الحنّس

Hertis cheirifolia, Othonna cheirifolia (S). Hertie, Othonne à feuilles de giroflée, Souci d'Afrique (F). Barbary ragwort (E). Schleierkraut (D). Fiorrancio d'Africa (I). نبات عشبي سبروتي معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة المركبات المشرديات . ضروبه التريينية عديدة . سورها محشوشة مسطحة ، فروعه متضعية . أوراقها عروية وهي متناوبة مشورة للشكل واللون نصلها سيمك التنج الشبه للحمي . ازهارها وريسية كبيرة اللقد صفراء اللون . ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

Oursin melon هو التوتياء ويدهى السور نوع من الاخنيوس المأكول ويكثر على الشواطئ الصخرية اللبنانية .

### ٢٣٤٧٧ - كُرْسَان

Echinides, Oursins (F). Echinides, Sea-urchins (E). رتبة حيوانات بحرية شائكة الاصداف . فصائلها واجناسها وانواعها الحالية والمنذرة عديدة ، معظمها شائع على الشواطئ البحرية في جميع اصفااح العالم .

### ٢٣٤٧٨ - كُرْسَانِيَّات \*

Echinocystis (S). Echinocystis (E). بحلة معمرة هائشة من فصيلة القرعيات . مهدا بعض مناطق امريكا الشمالية . ساقها تطول نحو ستة امتار . حورائها ثلاثية الشعب . أوراقها كفية ، خماسية الفصوص . ازهارها بياض اللون ، نجمية الشكل ، المتكبة منها عنقودية التجميع ، المدقة فردية . ثمارها بضيصة الشكل ، لونها الى الاصفر ، تطول نحو ٥ سم . وترش نحو ٤ سم . طليها تافه اللقد توكال مطبوخة .

### ٢٣٤٧٩ - كُرْسَانِيَّة \*

Echinocystis (S). Echinocystis (E). بحلة معمرة هائشة من فصيلة القرعيات . مهدا بعض مناطق امريكا الشمالية . ساقها تطول نحو ستة امتار . حورائها ثلاثية الشعب . أوراقها كفية ، خماسية الفصوص . ازهارها بياض اللون ، نجمية الشكل ، المتكبة منها عنقودية التجميع ، المدقة فردية . ثمارها بضيصة الشكل ، لونها الى الاصفر ، تطول نحو ٥ سم . وترش نحو ٤ سم . طليها تافه اللقد توكال مطبوخة .

### ٢٣٤٨٠ - كُرْف

كُرْف وكُرْف : تسم . يقال كُرْف الفعل او الحار عندما يشم طروقة ثم يرفع رأسه ويقب جفنفه .

### ٢٣٤٨١ - كُرْسِيّ \* ، كُرْسِيّ تَبْطِي

Apium graveolens (S). Ache, A. des marais, A. douce, Céleri (F). Celery, Marsh parsley, Smallage (E). Sellerie, Echter Sellerie (D). Accio, Appio, Sedano, Seleno (I). نبات بقلية محولة من فصيلة الخيميات ، ساقها عشبية



كرسيون



كرسي



كرسي الجبل



كرسي الماء



كرسي بري



كرسي لفي



كرنة جبنفا



كرنة ذروية



كرک



كرکب



كرکند افريقى

صغيرة ، مخروطية الشكل ، ضيقة الاشداد . عرونها ماسحة ، محاسرها متراكبة السهف . زعانفها الظهرية ضيقة مستطيلة . الذيلية فارقة || انثاها فضية يملؤها نيجديع ممترس اسمر ورقة سمراء تمتد من الرأس الى شبح الظهر والذنب || لحومها جيدة الصفت مرطوب فيها .

٢٣٤٩٧ - كركش (F) *Chrysanthème matricaire*  
هو قوتحات منيات ، اطليه .

٢٣٤٩٨ - كركب \* كركسلا  
*Crassula (S). Crassula (F). Crassula, Thick-leaf (E). Dickblatt (D). Crassula (I).*

جنس نباتات لحمية معمرة من فصيلة الحدائق ، انرواه زهاء ١٠٥٠ ، منها افريقية الجنوبية . معظمها بري وبعضها زيبى . اشهر انرواه الكركب القرزى . اعزاهو قرنزية اللون ، لوزية التجميع ، جميلة الشكل ، فواحة اللون اليابس .

٢٣٤٩٩ - كركة  
*Alambic (F).*  
هي الامبيق ، اطليه .

٢٣٥٠٠ - كركج  
*Sarcelle d'été (F).*  
هو الخداف الصيبي ، اطليه .

٢٣٥٠١ - كركندن \* كركند ، هرئيس  
*Rhinoceros (S). Rhinocéros (F). Rhinoceros (E).*  
جنس حيوانات ليونة من الحافريات وفصيلة الكركنديات . انرواه خمسة ، موطنها البلاد الحارة ، منها ثلاثة اسبوع واثنان افريقيان . جنبها ضخمة الاجرام . قوائمها قصيرة ثلاثية الاصلاب . رؤوسها غليظة وكبيرة ، اذناها قصيرة مستقيمة ، عيونها صغيرة . منها اشحن بالغ السمك . تحمل قرنا تحمل قرنا او قرنان فوق انفها || وهي هينة الطعم لكنها شرسة اذا هوجمت . تقم قرب الماء . قوتها الجلود والاصقان والراسخ والاشباب الغليظة . تعيش ازواجا ذكر وانثى .

٢٣٥٠٢ - كركندن ابنيص ، هرئيس  
*Rhinoceros simus (S). Rhinocéros camus (F).*  
اكبر واضخم أنواع الكركند وهو من ذوات القرنين . سفنه الى البياض الاغبر . جنبه تطول نحو ٣٧٥ سم . وتطول ١٩٠ سم . ذنبه نحو ٧٠ سم . قرنه الكبير يطول من ١٢٥ الى ١٦٥ سم . والصغير من ١٨ الى ٢٢ سم . موطنه يمتد من الحبشة الى اواسط افريقية وضفاف بحر الأورنج .

٢٣٥٠٣ - كركندن الإفريقى \* عوريت  
*Rhinoceros bicornis (S). Rhinocéros bicornis (F).*  
كبير الجثة البليظة الضخمة . طوله نحو ٣٥٠ سم . وطوله ١٧٠ سم . ذنبه ٧٠ سم . سفنه الى السرة الخفيفة الداكنة . وهو من ذوات القرنين ، قرن كبير طوله زهاء ١٠٠ سم . وقرن صغير مستعرض القاعدة طوله نحو ٢٠ سم . موطنه يمتد من الحبشة الى القطب . يرغب في المنافع وضفاف البحيرات .

٢٣٥٠٤ - كركندن البحر  
*Licorne de mer (F).*  
هو سرخس البحر ، اطليه .

٢٣٥٠٥ - كركندن السنڊ ، كندة  
*Rhinoceros sondaicus (S). Rhinocéros de la Sonde, R. de Java (F).*  
كرکند وحيد القرن كبير الجثة . جرمه يسفر جرم الهندي .

٢٣٤٩٩ - كركنول ، كركنون  
*Carvol, Carvone*  
سائل زيتي مادم اللون يستخلص من بطور الثبار والكرابوا والكمون والسنج الجديع والسمتري . ثقله النسبي عند ١٧ سم<sup>٣</sup> = ٩٦٠ ، وهو يغلي عند ٢٢٥ سم<sup>٣</sup> .

٢٣٤٩٠ - كركفة  
*Coque d'oeuf (F). Chell, Empty egg (E).*  
قشرة البيضة المليا اليابسة وتلقى القوة .

٢٣٤٩١ - كركفة  
*Corypha (S). Coryphe (F).*  
ج . كركف . جنس اشجار رفيعة الجلع المنصب الجالس من فصيلة النخلات . منها المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية . اوراقها هامة الارتكاز ليفية التركيب ، يستخرج منها نسج الكرف الذي يستعمل في صناعة القبعات وبسبب اللزائم المنزلية || وهي من الاشجار الزينية التي تموش في بعض المزارع الخاصة من شواطئ المتوسط || اشهر انواعها الزينية ما يلي .

٢٣٤٩٢ - كركفة جبنفا \* كركفة مستديرة  
*Corypha gebanga, Gebanga rotundifolia, Taliara gebanga (S). Coryphe à feuilles rondes, Tallère (F).*

نوع من الكرف . الزينية الشائع الاستعمال ، يوجد في جميع الاربة واقلاها خصبا اما لا يتحمل الطقس الشديد والمعرض الباردة التي ينخفض فيها لقر الى خمس درجات مع . فوق الصفر || تجتره تطول من ٤ الى ٦ امار مدة ٢٠ سنة . جنبها منتصب القوام ، مائل السواء ، ينهي بقصة من الاوراق المستديرة المروحية والمستطيلة الجريدة المشوكة .

٢٣٤٩٣ - كركفة ذروية \* شكلج  
*Corypha umbraculifera (S). Coryphe parasol, Tailpot de Ceylan (F). Great fan-palm, Tailpot palm (E). Tailpotbaum, Gross Schirmpalme (D). Palma corifia, Corifa del Malabar (I).*

نوع من الكرف . جنبها اسطواني الشكل منتصب كالشمة يطول نحو ١٠ امار . قشرته ماسلة . اليافه الخشبية شديدة الصلابة . اوراقه هامة مروحية كبيرة اللد مستطيلة السهف جميلة الخفاز الالسن .

٢٣٤٩٤ - كركفيات  
*Coryphinées (F).*  
سبط اشجار برية وثرينية من فصيلة النخلات . اجناسه وانواعه المعروفة لا تتجاوز الشرة . منها الاقاليم الاستوائية . يكثر وجودها في بعض مناطق الهند وجاوا وجزر الزابج وسيلان || سرفها منتصبه رفيعة . اغشائها حلة تستعمل في البناء . اوراقها هامة الارتكاز صناعية الاستعمال || اشهر اجناسها الكركفة .

٢٣٤٩٥ - كركلة  
وقف عن الي . يقال كركت الذجاجة وهي كركة اذا وقفت عن البيض .

٢٣٤٩٦ - كركلة \*  
*Charax (S). Charax (F). Charax (E).*

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الاسبوريات . انرواه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || اجناسها بسيطة ، شبه بيضية اللون ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . رؤوسها

عيناه جؤريتا اللون . متفاداه اسمر القاعدة والجسم ، اسود البهره . سافاه الى السمره السوداء || قوته كل ما استطاع الزفير من اسماك . وحيوانات وطيور وحشرات ، ويطارد الزبج ويغريها من طير الماء فينازعها ما تصعد من سمك || يذئق عشه في اقصوص يطنه بالخشيش والطحلب . الاثنى تنقع بيضتان في اوائل شهر محوز . الحفص يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الاثنى بمناولة الذكر . الفرخ يستقل بيطرائه ابتداء من اوائل ايلول .

### ٢٣٥١٣ - كَرَكُرُود \* Carcharodus (S).

جنس حشرات من فصيلة الحسيريوات . انواعه الفضارة قليلة تركب الخبازيات || فراشاته صغيرة اللقد طولهسا براوح من ٢٨ الى ٣٢ م . اجسامها غرورية الشكل ، كستنية اللون . وراشها بيضاء يعلوها تجلجج وتبين وزرا كش غخلقة الالوان || تظهر من حزيران الى ايلول . تمتع مكها حل الازرق ينفث من رقات صغيرة اللقد مستفقة الجسم . رؤوسا سود ، انواها الى الزرقه يعلوها تحطيط وتجلجج اسمر .

### ٢٣٥١٤ - كَرَكْسَة مُدْبِيَّة \* Charaxes jasius (S).

Charaxes jasius (S). Charaxe jasini, Pacha à deux queues (F). Charaxes jasius (E). حشرة من فصيلة البشوريات حشرقيات الاجنحة . موطنها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها واسعة قوتها مشر الزهار . سرفتها تمش على اوراق الخنجيليات و اجسمها كبير اللقد يطول نحو ٢٢ م . بسطها نحو ٧٥ م . رأسها جؤري اللون ، عيناه كبيرتان . زبابان صرغايان . مرفها دقيق الجرم . جوشها يطنها الى المرة الزبداء المولج || وراشها الاماميان الى الصمرة الخنطية تملوها بيقع وتزويق فيها الازرق والاسود والبرتقالي والاصفر الصنابي والاحلج . وراشها الخلفيان الى السواد الازرق المولج تملوها بيقع وتزويق كما في الزوج الامامي وثلاث جدات الاول بيضاء . الثانية سراكية الالوان ، الثالثة صفراء || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في آب . تسرح في النهار . تعامل يمد ظهورها بسنة اسابيع وتمتع الممكن لطحها على نصال اوراق النبات المائل || السرة تطول نحو ٦٥ م . اجسمها اسطواني الشكل ، مالن القشار . فوها الى الخصار الاطلس يملوها الى السمكتين الخفاصة والسابعة بقتان مستطيرتان مركزها اسود يحوقه الاصفر ويطرفه اطار اسفر . رأسها سداسي الزواطة القرية الجلورية اللون . سمكتها الشرجية مفلوطة الطرف الاخاذ || طور الاكمال الذي يستمر في الجبل الاول نحو ثلاثة اسابيع يستمر في الجبل الثاني نحو ٢٢ اسبوعا .

### ٢٣٥١٥ - كَرَكُم \* Curcuma

جنس نباتات جذبورية صفولية عشبية معمرة من فصيلة الزنجبيليات . مهدها المناطق الاسيوية الحارة . انواعها قليلة اعرفها الكركم الاسود والكركم الزردار والكركم الصياغي || اوراقها منتصبه مستطيلة الزناد سناكة الشكل الشاروف . ازهارها صفراء اللون سفلية التجميع ترتكز على شراخ قصير || يستخرج من صافلها مادة تشوية ما كولة تدعى اردوت الهند ويستخرج من ازهارها وزبدانها مادة صباغية صفراء اللون ومادة طيبية تدعى كركين (Curcumine) .

طوله نحو ٢٨٠ سم . وارتفاعه ١٧٠ سم . اثناء جها لا قرن لها . يقم في الثابات الكثيفة قرب جداول الماء على ارتفاع ٢٠٠ م . من سطح البحر . موطنه الهند وبرمانيا وبنجا .

### ٢٣٥١٦ - كَرَكَدَنْ سُونَمَرَا ، كَشَان ، كُوشَان Rhinoceros sumatrensis (S). Rhinoceros of Sumatra (F).

اصغر انواع الكركدن جرما وانها غلاظة . جسته تطول نحو ٢٤٠ سم . وتصل ١٣٠ سم . ذنبه ٦٠ سم . اما وزنه فلا يقل من ١٠٠٠ كيلو . قرنه غليظ القاعلة البطولة . ذرب الطرف يطول نحو ٧٠ سم . || موطنه صومرا وسيام وملقة ...

### ٢٣٥١٧ - كَرَكَدَنْ هِنْدِي \* ، وَحِيد الْقَرْن ، رَيْبَعَرِي Rhinoceros unicornis, R. Indicus (S). Rhinoceros unicornis, R. de l'Inde (F).

احضر انواع الكركدن الاسيوية وسيدة القرن . وهو كيرن الينة الغليظة طوله نحو ٣٠٠ سم . وطوله ١٧٥ سم . اما ذنبه فنحو ٦٥ سم . وقرنه ٣٥ سم . وزنه براوح من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ كيلو || موطنه مستنقعات الهند وصفاف نهر الكنج .

### ٢٣٥١٨ - كَرَكَدَنْيَات Rhinocerotidae (S). Rhinocerotidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة من الحافريات . اشهر اجناسها الكركدن .

### ٢٣٥١٩ - كَرَكَدِيَّات \* Palinuridae (S). Palinuridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الاربيل ، طوك الذيل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اعرف اجناسها واشهرها المقيوس والجراد البحري المعروف ايضا بالكركند او الكركند .

### ٢٣٥٢٠ - كَرَكُر \* Fourreau (F). Sheath (E).

الكركر وعاء قصب الثور واليس .

### ٢٣٥٢١ - كَرَكُر \* Stercorarius (S).

Stercoraire, Mouette pillarde (F). Jaeger, Skua (E). جنس طير بحرية من كتيات القدم . انواعه ثلاثة تجوب البحار من النيك الى الجنوب . اجسامها هيفاء اللد ، حيلة الشكل ، بلباء الذرب ، مستطيلة الاذنان . بسطة جوارحها براوح من ٨٠ الى ١٢٠ م . مناقرها طويلة منتفخة الماشد || تملأ زبج الماء والغرشة فتنازعها ما يصيدان من سمك وقد ترجمها حل لفظه لتفتحه .

### ٢٣٥٢٢ - كَرَكُر غاصب \* Stercorarius catarractes (S). Stercoraire ravisseur, Labbe cataracte (F). Cataracta Skua (E).

نوع من الكركر . طائر بحري من كتيات القدم وفصيلة النورسات . اعشاه البحار القطبية . ملحته الحيات فردى . لا تقرب الذكور من الاناث الا في زين الكوم والحفص || جسسه ابيض الشكل ، مستطيل الذنب والجانج . طوله نحو ٥٧ سم . وبسطه نحو ١٠٠ سم . قويه الى السرة المايقة المخلصة بالشقعة السعداء . بطنه الى السرة الرمادية .



كركدن الهند



كركر



كركرود



كركسة مدبنة



كركم





كركي



كر كند الزيتون



كركي ربادي



كركي مششورية

Grus (S).

Grue (F). Crane (E).

جنس طيور كبار من فصيلة الكركي رتبة طيور الساق، كنيته ابو حريان وابو حن وابو العيزار وابو نيم وابو المصم. ج. كراكي. ١٢ انواعه ١٢ جميعها من القواطع. طريقة اللقن والساق. قوية المنظر اغروبي المشطيل. انواها تختلف باختلاف انواها يكثر فيها الابيض والارادي. رومها ملس او ثنائية القشرة || تألف المناقع وشطوط الانهار. قوتها الاشباح والحبوب والارز والديدان والخشرات والصفاد والزيادات من عظام واناعي || تنتن في انفوس رثيه في الادخال السرحة او بين الاشباح الرقيقة. الاش تقص من ٢ الى ٥ يبيضات تحفها بجنرة الذكر || احرف انواها واشهرها ما يلي.

Grus cinerea (S).

Grue cendrée, G. commune (F). Common grey crane (E).

نوع من الكركي، كبير الجثة، طوله يراوح من ١٣٠ الى ١٤٠ سم. ثوبه اريد اللون. رأسه ويقدم عنقه الى السواد الازرق للمواج. مخراجه وبناتبا عنه الى البياض الناصع. اباهره وانتيكه وساقه الى السرة النعسية الالام. منقاره اسود اللون اخضر المواج. عيناها جؤورتان مستديرتان. يآلف المناقع واخوار الارز ويزرعها. يحوب الماء في طلب الرزق ويعود مع البرد الى مشاته الذي يمتد من السودان الى الهند.

٢٣٥٢٧ - كُرْكُمِي مَشْشُورِيَّة \*

Grus viridirostris (S). Grue de Mandchourie (F). Demoiselle crane (E).

نوع من الكركي اكبرها جثة واجملها ثوباً. طوله يراوح من ١٤٠ الى ١٥٠ سم. ثوبه الى البياض العاجي جبهته الى الخضرة. عيناها كالياتوت. قاعدة منقاره ويقدم عنه الى السواد الازرق للمواج. منقاره الى الخضرة الزرقية. اباهره وانتيكه الى السواد العاجي يملو مواج اخضر. ساقاه الى اخضر الاسمر || مشاته بعض الاتاميل الصغية. يكثر في مششورية. يآلف للشطوط النهرية والبحرية.

Gruidae (S).

Gruidae (F). Gruidae (E).

فصيلة طير من رتبة طيور الساق. اجناسها وانواعها قليلة العدد اشهرها الكركي والقرنوق.

٢٣٥٢٩ - كُرْكُمِي شَمْسِي

Camomille odorante (F).

هو ابيالونج السطر، اطليه.

Crocus (F).

هو الزفران، اطليه.

Stapelia (F).

هي النلف، نبات من السقليات، اطليه.

٢٣٥٣٢ - كَرَلِين \*

جنس نباتات عشية برية طيبة معمرة من الحشريات وفصيلة المركبات. انواعه عديدة تكثر في الاربة القاحلة وفي الاراضي المنحاة وبين الصخور. سوقها قصيرة جدحة. اوراقها كبيرة، مستطيلة، ملساء، شاذكة. ازهارها ورمسية ملونة، قطرها يراوح من ١٠ الى ١٤ سم. احرف انواها واشهرها ما يلي.

٢٣٥١٦ - كُرْكُمِي اسود، جَدْوَار اسود

Curcuma caesia (S). Curcuma vert, Zédoaire noir (F). Black zedoary (E). Schwarze Zedoarwurzel (D). Zedoaria nera (I).

نوع من الكركم وهو نبات طبي صقولي معمر تكثر زراعته في الهند وسائر بلاد الشرق الاقصى. مساقله تشوية غشائية مأكولة ويستخرج منها ومن الازهار بعض المواد الطبية والعصبية.

٢٣٥١٧ - كُرْكُمِي زَدْوَار، زَدْوَار، جَدْوَار

عَقِيدَة سَطْوَال

Curcuma zedoaria (S). Curcuma zédoaire, Zédoaire (F). Zedoary, Setwall (E). Zedoarwurzel, Zittwer-kurkuma (D). Zedoaria (I).

نوع من الكركم تكثر زراعته في الشرق الاقصى ويستخرج من مساقله مادة تشوية غشائية تدعى ابروت الهند. ازهاره صباغية نقيها منه وسق.

٢٣٥١٨ - كُرْكُمِي صِبَاغِي، هَرْد، عَقِيدَة

هندي، ماميران، اصابع صفر

Curcuma longa, C. tinctoria (S). Curcuma long, Safran des Indes (F). Long rooted curcuma, Turmeric (E). Gilber ingwer, Gilbwurzel (D). Curcuma longa, C. di Levante, Croco Indiano (I).

نوع من الكركم وهو نبات طبي صقولي معمر. ينه المضم ويدار البول ويكثر افراز الغالب ويفتح الشهية. يزرع ويحضر في الهند ويباع تحت اسم «كاري».

٢٣٥١٩ - كُرْكُمِيَان

Mélilot-bleu (F).

هو الخنثوق الازرق، اطليه.

٢٣٥٢٠ - كُرْكُمِيَس \*

جنس حشرات من فصيلة اليمسويات انواعه قليلة العدد جميعها مفترسة تقتضي على الحوام. ذكورها حرة، انثاها الى الصغار الخنثي. اجسامها طولها ٣٥ الى ٤٠ سم. وبسطة اجنتها تراوح من ٥٢ الى ٦٠ سم.

٢٣٥٢١ - كُرْكُمِيَان

هو الكركدن وهو ايضاً الجراد الجري، اطليها.

٢٣٥٢٢ - كُرْكُمِيَان الزَيْتُون \*

Oryctes nasicornis (S). Rhinocéros de l'olivier (F). خنثفاس كبيرة القدم من الجمليات. طولها نحو ٤٠ سم. ثوبها الى الكستاني يعلو مواج اسمر لامع. رأس الذكر مسلح بقرن منحنك الى الوراء. الانثى جاء لاقرن لها || يآلف الزوازين. يسرح من الغروب الى الشروق ويبين في النهار. يعيش على الاشجار اليابسة وبين نشارة الخشب. يرمته كبيرة القدم، غليظة الشكل، حلزونية الجسم مقوية، خيرا اللون، سمراء الرأس، تركيب جلود الزيتون فظفها.

٢٣٥٢٣ - كُرْكُمِيَان

Amethystes (S).

Amethyst (F). Amethyst (E). Amethystpflanze (D).

نبات عشبي حولي زراعي تربيني من فصيلة الشفويات. يزرع لزهوه الازرق الجميل المستحب العرف. تبته صغيرة القد، نحيلة الساق، قصيرة الفروع المستندة || يكثر بالبذر. ازهاره صبي.

٢٣٥٢٤ - كُرْكُمِيَان

طائر من الزوازين يدهى ميناها، اطليه.

## ٢٣٥٣٣ - كَرَلِين اقشئ الورق \*

*Carlina scanthifolia* (S). *Carline à feuilles d'ascanthe*, Chardousse (F).

نوع من الكرلين الملبول في الجبال. ساقه جذمة تملو من هـ ١٠ سم. أوراقه كثيرة القند اقشئة الشكل. نصلها خيل البشرة على صفحتيها الخلفية، وورسها قصيرة الزناد، قطرها يراوح من ١٢ إلى ١٤ سم. قناباتها صفراء اللون. ازهارها يستمر من تموز إلى ايلول.



كرلين ساق

## ٢٣٥٣٤ - كَرَلِين شائع \*

*Carlina vulgaris* (S). *Carline vulgaire* (F). *Carline thistle* (E). *Kleine Eberwurz* (D). *Carlina vulgaris* (I).

نوع من الكرلين الملبول يكثر في المراعي الجبلية وفي الاراضي المنخفضة. ساقه تملو من ٢٥ إلى ٤٥ سم. أوراقه كثيرة القند، شديدة التفرع، خلية الصفحة السفلى. رعاها المائية قبل الادراك والهج. ورسها الزهرية ملونة، قطرها يراوح من ١٥ إلى ١٢ سم. قناباتها حنطية اللون. يقال انه من النباتات الطبية التي تفيد اعادة الحرفش والاراضي شوكي.



كرموس المراعي

## ٢٣٥٣٥ - كَرَلِين عديم الساق \*

*Carlina acaulis* (S). *Carline scaule*, *Baromètre*, *Loque* (F). *Carline* (E). *Eberwurz* (D). *Carlina*, *Carlo pinto* (I).

نوع من الكرلين الملبول. ساقه جذمة تملو من هـ ١٢ سم. أوراقه كثيرة مستطيلة مفروعة، نصلها اخضر اللون، سانس البشرة على صفحتيها. ورسها كثيرة القند ملونة، قطرها يراوح من ١٥ إلى ١٣ سم. قناباتها قنصية. ازهارها يستمر من تموز إلى تشرين وهو يتكشش عند وجود التيم ويبلغ مع اشعة الشمس.

## ٢٣٥٣٦ - كَرَم \*

*Vignoble* (F). *Vineyard* (E).

ومن اسمائه الفندوس. كل ارض مفروسة كرم.

## ٢٣٥٣٧ - كَرَم \*

*Cépage* (F). *Vine-plant* (E).

للصرب المعروف المورسوف من الكرم.

## ٢٣٥٣٨ - كَرَم زَيْتُون، بَسْتَان زَيْتُون، زَوَالِين

*Olivale*, *Olivaraie*, *Oliveraie* (F). *Olive-plantation* (E).

كل ارض حرس فيها الزيتون.



كرميس النجيليات

## ٢٣٥٣٩ - كَرَمَبُوس الراعي \*

*Crambus pratensis* (S). *Crambe des prairies*, *Taigne des prairies* (F). *Crambus pratensis* (E).

حشرة من فصيلة التاربات حرشيات الاجنحة. موطنها معظم اقاليم البلاد الممتدة الى الحارة من الشرق الاوسط واوربية. فراشها واسعة قوتها رحيق الازهار وطلما، رشتها خاضعة تميش على اوراق النباتات المرصية. جسمها صغير قشبي، يطول نحو ٨ سم. بسطها نحو ٢٤ سم. رأسها صغير الجسم، عينها زرقانية صيرتتان. زباناها خيطيان. ملاسها دقيقة، مرشها معتدل الطول. جوشها وبطنها الى الرملة. ورسها الاماميان الى السرة الكنتية يملوها ذكركة مفرقة صفراء ويدة مستطيلة يضاء. ورسها الخلفيان الى السرة الكنتية السوية. اهدابها الى التبي. الانثى اميز قدام من الذكر واغلظ بطنها منه واطول مرشها. لها جيل واحد في الحول. تطهر الفراشة في ايار. تسرح في النهار وتبيت في الليل. الانثى تلقي المكن ميعادها على الصفحات السفلى من نصال الاوراق في الطور



كرمة العنب

الاسروي يستمر نحو عشرة اشهر والسرقة عند بلوغها الادراك تظل نحو ١١ م. جسمها اسطواني الشكل، واسع التقسيم السكي، اريد اللون يملو تنقيط اخضر الس. يمتد من الكويل الى الشرج. رأسها اسود، مدها ووراجها الى السرة. طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي ضمن صلجة تنسجها السرة في الجلالة او تحت قشور الاشجار الحرجية القريبة من المراعي.

## ٢٣٥٤٠ - كَرَمَبُوس النجيليات \*

*Crambus perillus* (S). *Crambe perle*, *Taigne des graminées* (F). *Crambus perillus* (E).

حشرة من فصيلة التاربات حرشيات الاجنحة، موطنها معظم الاقاليم المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط واوربية. فراشها واسعة قوتها رحيق الازهار وطلما، رشتها خاضعة تميش على النجيليات البرية والزرابية. جسمها صغير يطول نحو ٩ سم. بسطها تراوح من ٢٨ إلى ٣٠ سم. رأسها معتدل الجسم. عينها زرقانية، بارزتان. زباناها خيطيان. ملاسها دقيقة، مرشها معتدل الطول. جوشها وبطنها الى الرملة القنصية المراج. ورسها الاماميان الى الرملة القنصية يملوها خفيف متداخل الاخضر والازرق. ورسها الخلفيان الى الرملة السمر المراج. اهدابها عاجية. الانثى اميز قدام من الذكر واغلظ بطنها منه واطول مرشها. لها جيل واحد في الحول. تطهر الفراشة في مطلع حزيران وتبقى حتى اواخر تموز. تسرح في النهار. الانثى تلقي المكن ميعادها تغلته مادة غروية تنسج على صف النجيليات في الطور الاسروي يستمر نحو عشرة اشهر. والسرقة عند بلوغها الكال الجسوري تظل نحو ١٢ م. جسمها اسطواني الشكل، واسع التقسيم السكي، اريد اللون يملو تنقيط جزوي يمتد من الكويل الى الشرج. رأسها اسود اللون، مدها ووراجها الى الطحلة. طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي ضمن صلجة تنسجها السرة بين فروع النجيليات او تحت اوراقها.

## ٢٣٥٤١ - كَرَمَة \*

*Vitis* (S). *Vigne* (F). *Vine* (E).

جلس نباتات معمرة عارشة من فصيلة الكرديات. انواعها عديدة، معظمها بري وتربي وبعضها زراعي. اشهر انواعها واعها زراعة واكثرها غروباً واجزها نغماً للكرمة النمنية.

## ٢٣٥٤٢ - كَرَمَة العنب \*

*Vitis vinifera* (S). *Vigne commune*, *Vigne noble* (F). *Cultivated vine*, *Grape vine* (E). *Weinrebe* (D). *Vite* (I).

نوع من الكرمة شروها المعروفة زهاء ٢٥٠٠ سم. جوشها زراعية مفرقة. سوقها عارشة لينة مخشوشة. جنورها حزنية منسطة لا تضرب الثور العميق، فروعها سروح عابلة تنمو على القند. نصلها كفي الشكل يكثر فيه التفصيص الخاسي وهو سنن الحافة. انقب البشرة على صفحتيها او على الصفحة السفلى. حوافها فارقة حلزونية تنمو قبالة الاوراق. ازهارها حنطية. حنطتها تكون على عقد سلاحيات الزجون الحولي ازاء الاوراق. ازهارها صغيرة القند خضراء اللون وهي مركبة من كاسي خاسي الفصل وتوج خاسي البتلات المندمجة التي تبدو كالعنفة فوق السرة والسدة والمقدة. والاسدية خاسي والمقدة ذات مفروق يحسن كل منها يوفهتان تصبجان بعد التاير والاصخاب

٢٣٥٤٨ - كُرْمِيْس الزَيْتُون (F). Kermès de l'olivier  
هي قُرْمِيَّة الزَيْتُون الخُطْطَة ، اطْلُبَا .

٢٣٥٤٩ - كُرْمِيْس السَّنْدِيَّان (F). Kermès du chêne  
هي قُرْمِيَّة السَّنْدِيَّان ، اطْلُبَا .

٢٣٥٥٠ - كُرْمِيْس الْوَرْد (F). Kermès du rosier  
هي قُرْمِيَّة الْوَرْد ، اطْلُبَا .

٢٣٥٥١ - كُرْمِيَّيَّات (F). Coccidés  
فَصِيلَة مُشْرَتَات مُشَهَوْرَة بِأَسْمَ مُغْفِرِيَّات ، اطْلُبَا .

٢٣٥٥٢ - كُرْمِيَّيَّ (F). Vinicole, Viticole  
Wine-growing (E).  
كُل مَا هُوَ مُخْتَصَّ بِالْكُرْمَة مِنْ زُرْعَة وَصِنَاعَة .

٢٣٥٥٣ - كُرْمِيَّات (S). Ampelidaceae  
(F). Ampelidaceae (E).  
فَصِيلَة نَبَاتِيَّة مِنْ ذُرَاتِ الْفَلَقَتَيْنِ عِدَّةُ الْفَعَالَاتِ مَسْلُفِيَّةِ  
(الاسديَّة) اجْناسُهَا وَأَنْوَاعُهَا عِدَّةُ أَشْهُرِهَا الْكُرْمَة .

٢٣٥٥٤ - كُرْمَات (F).  
أَصُولُ الْكُرْبِ الَّتِي تَبْقَى فِي جَذْعِ النَّخْلَةِ بَعْدَ قَطْعِ السَّعْفِ .  
الْوَاخِدة كُرْمَاتَة . ج . كُرْمَاتِيَّ .

٢٣٥٥٥ - كُرْمَب \* (S). Brassica caulorapa  
(F). Hungarian turnip, Kohl-rabi (E).  
Knollenkohl, Kaolikhoh (D). Cavolo rapa (I).  
نَوْعٌ مِنَ اللَّفْلُوفِ الزَّرْعِيَّ الْمَأْكُولِ . سَاقُهُ غُلِيظَةٌ مُسْتَدِيرَةٌ  
تَنْسُو عَلَى سُلْعِ الثَّرْبَةِ ۖ يَجُودُ فِي جَمِيعِ الْآرَبَةِ الْزَّرْعِيَّةِ .  
يُزِيلُ فِي الْأَكْوَادِ ثُمَّ يُنْقَلُ إِلَى مَسْتَوْرَةٍ حَيْثُ يُغْرَسُ عَلَى  
أَبْدَانٍ تَرَابُحٍ مِنْ ٤٠ إِلَى ٣٥ سَم . بَيْنَ السُّطْرِ وَالسُّطْرِ . وَهُوَ يَنْزِقُ وَدِيمَكُ .  
قِيَّتُهُ الْغَدَائِيَّةُ لَا يَأْسُ بِهَا لِمَا أَنَّهَا يَكُونُ اسْتِمْهَالُهَا كَمُفْلَعِ  
الْبَهَائِمِ أَنْصَحُوا الْبَيْتَرِ .

٢٣٥٥٦ - كُرْمَبُ الْجَمَلِ (F). Moricandie  
هُوَ الْحِمُّ ، اطْلُبَا .

٢٣٥٥٧ - كُرْمَبُ الْمَاءِ (F). Nénuphar bleu  
هُوَ التَّنِيلُفُ الْإَزْرَقُ ، اطْلُبَا .

٢٣٥٥٨ - كُرْمَبُ بَحْرِي \* (S). Crambe maritima  
(F). Crambe maritime, Crambè, Chou marin (F).  
Sea cabbage, Sea kale (E). Echter Meerkohli, Seekohl (D).  
Crambe maritima, Cavolo marino (I).  
بَقْلَةٌ مَعْمُورَةٌ مِنْ فَصِيلَةِ الصَّلْبِيَّاتِ تُثَبِّتُ بِرِيَّةٍ عَلَى الشَّرَاطِي  
الْبَحْرِيَّةِ وَتُزْرَعُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ أَنْصَحُوا أَكْثَرًا حَيْثُ  
يَأْكُلُونَهَا بِكَثْرَةٍ . طَعْمُهَا كَالْتَنْبِيطِ .

٢٣٥٥٩ - كُرْمَبُ عُلْكِيَّ (F). Rutabaga  
Swedish turnip, Swede (E).  
نَبَاتٌ عُلْفِيٌّ يَدْعَى رِبَاعَةً ، اطْلُبَا .

٢٣٥٦٠ - كُرْمِيَّيَّات (F). Pieridae (S).  
Pieridae, White butterflies, Sulphur butterflies (E).  
Weisslinge (D).  
فَصِيلَة حَشْرَاتٍ مِنْ حَشْرَفِيَّاتِ الْإِنْسَجَةِ . اجْناسُهَا وَأَنْوَاعُهَا  
عِدَّةٌ مِنْهَا مُتَوَسِّطُ الْحِمِّ وَبَعْضُهَا كَبِيرٌ وَبَعْضُهَا

زُرُورُ الثَّمَرَةِ . وَالنَّمْرَةُ عُنِيَّةٌ مُخْتَلِفَةُ الْأَشْكَالِ وَالْإِحْجَامِ  
وَالْأَلْوَانِ مَرَكَبَةٌ مِنْ قَشْرَةٍ خَامِيسَةٍ وَلِبَابٍ وَزُرُورٍ . لِبَابُهَا  
يُؤَلِّفُ مِنْ ٨٥ إِلَى ٩٠ ٪ مِنْ الثَّمَرَةِ وَمَا تَبَقِيَ فَيَمُودُ فِي  
القَشْرَةِ وَالزُرُورِ . وَهُوَ يَكُونُ عِنْدَ الْإِدْرَاكِ قَلِيلَ الْحُمُوسَةِ .  
كَثِيرُ الْمَادَّةِ السَّكَّرِيَّةِ ، لِذَلِكَ طَعْمُهَا ، مُسْتَحَبُّ النَّكْبَةِ  
وَالْعَرَفِ ، مُتَوَسِّطُ تَرْكِيبِهِ ؛

مَاءٌ مِنْ ٧٥٠٠ إِلَى ٨٠٠٠ ٪  
سُكَّرٌ قَابِلُ الْإِسْتِخَارَةِ مِنْ ١٨٥٠٠ إِلَى ٢٥٥٠٠ ٪  
حُومَاتٌ مُطْلَبِيَّةٌ تَزُرُّ بِمُتَوَسِّطِيَّةٍ مِنْ ٠,٣٥ إِلَى ٠,٤٥ ٪  
بَيْتَرَاتُ الْبُوتَانِ مِنْ ٠,٥٠٥ إِلَى ٠,٥٠٧ ٪  
مَوَادُّ أَزَوْتِيَّةٌ وَبِنْدِيَّةِيَّةٌ عَطْرِيَّةٌ مِنْ ٠,٠٠٣ إِلَى ٠,٠٠٢ ٪  
وَالْكُرْمِيَّةُ تُرْبِي فِي الْإِتَالِيَّاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي تَوَلَّى لَهَا الْحَرَارَةُ  
الْكَاثِبَةُ الْإِدْرَاكِ الْبَارِدَ . هَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ تَمِيزَ فِي الْإِقْلَامِ  
الْبَارِدَةِ نَهْمِيَّ تَمِيزَ الْفَتْرِ وَتَمِيزَ الْفَتْرِ الشَّدِيدِ شَرْطُ أَنْ تَوَلَّى لَهَا  
حَرَارَةُ الصَّيْفِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ السَّرْمَاتِ الْإِلَازِمَةِ لِإِدْرَاكِ  
الْبَارِدِ . وَهِيَ تَفْضَلُ السُّفُوحَ وَالْمُخْصَابَ وَالْمَوَاقِعَ الْمُنْتَصِدَّةَ  
عَلَى الْبُلْغَامِ الْمُنْبَسِطَةِ أَوْ الْمُنْمِرَةِ ۖ وَهِيَ تَجُودُ فِي جَمِيعِ الْآرَبَةِ  
يَسْتَحْبُّ مِثْلَ الرِّبْلَةِ الْمَرْفُوفَةِ وَالْكَلْسِيَّةِ الْيَمْسُ وَالطَّبِيعِيَّةِ  
الْمُنْدَجِجَةِ ۖ أَمَّا تَكَثُّرُهَا فَقَدْ يَمُودُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْكَالٍ : بِالزُّبُرِ  
وَالْتَمْعِيلِ وَالتَّرْبِيدِ وَالتَّطْعِيمِ ۖ أَمَّا فَالزُّبُرُ فَيَسْتَمْلِكُ عَصَادَةً  
مُحَصَّنَةً عَلَى أَسْرَامِ أَرْقَادٍ جَدِيدَةٍ . أَمَّا التَّمْعِيلُ فَهُوَ أَشْبَعُ  
الطَّرِيقِ وَأَسْهَلُهَا وَأَصْلَحُهَا ، قَرَابَةُ اسْتِطْعَانِ الْمُعْلَقَةِ مِنْ زُرْعَتَيْنِ  
بَلِغِ الْحُلِّ شَرْطُ أَنْ لَا تَقُلَّ عَقْدَتَانِ مِنَ الْإِثْنَتَيْنِ . أَمَّا التَّرْبِيدُ  
فَيُفَكِّرُ عَلَى لِيٍّ وَطَرَسُ بَعْضُ سُرُوعِ الْجَفْنَةِ إِلَى أَنْ تَشْرَبَ  
تَفْتَقِلُ . يَجْعَلُ التَّطْعِيمُ وَهُوَ أَشْهُرُ مِنْ أَنْ يَعْرِفَ وَقَدْ كَثُرَ  
اسْتِمْهَالُهُ فِي الْأَجْنَافِ الْأَمْرِيكِيَّةِ الَّتِي لَا تَخْشَى الْفِيلُوكْسَرَةَ .

٢٣٥٤٣ - كُرْمَة بَيْضَاء (F). Bryone blanche  
هِيَ الْفَانْدَارُ الْبَيْضَاءُ ، اطْلُبَا .

٢٣٥٤٤ - كُرْمَمْدَكَنْ ، هَشَّان (S).  
Narthecium, Abama (S).  
نَبَاتٌ حَشْبِيٌّ يَرِي طَبِيعِيٌّ مَعْرُوفٌ مِنْ فَصِيلَةِ الزُّنْبِيَّاتِ . أَنْوَاعُ  
الْمَعْرُوفَةِ أَرْبَعَةٌ . جَدِيدُهَا مُدَادَةٌ . أَوْرَاقُهَا خَضِيَّةٌ لِلشَّكْلِ  
مُسْتَعْرَمَةٌ التَّمْلُجُ الْجَامِدُ الْمُخْتَدُّ . شِمَارُهَا الزَّهْرِيَّةُ مُنْتَصِبَةٌ  
مُسْتَقْبَلَةٌ تَعْلَمُهَا أَوْرَاقٌ صَغِيرَةٌ ذُرْبَةٌ مُتَعَالِقَةٌ مُتَبَاعِدَةٌ .  
أَزْهَارُهَا عَقْدَوِيَّةٌ التَّجَمُّعُ ۖ أَنْوَاعُهَا صَغِيرَةٌ أَلْوَنُهَا سَدَاسِيَّةٌ  
بِالْبَلَوَاتِ . يَسْتَفْجِرُ مِنْ جَمِيعِ أَغْصَانِهَا مَادَّةٌ جَمَالِيَّةٌ قَالَةٌ  
شَدِيدَةُ التَّنَطُّلِ .

٢٣٥٤٥ - كُرْمَمْدَكَنْ مَسْقِيَّيَّ ، حَشْنَتِي كَدَّاب (S).  
Narthecium ossifragum (S). Nartécie des marais,  
Anthécie des marais (F). Bastard asphodel, Bog  
asphodel (E). Echter Beinbrech, Beinbrechgras (D).  
Asphodelo bastardo (I).  
نَوْعٌ مِنَ الْكُرْمَدَانِ وَهُوَ نَبَاتٌ حَشْبِيٌّ طَبِيعِيٌّ مَعْرُوفٌ بِزُرْعِ  
الْزُّنْبِيَّاتِ . يَتَكَثَّرُ بِالتَّمْلُجِ وَالزُّبُرِ . أَوْرَاقُهُ خَضِيَّةٌ مُتَوَسِّطَةٌ  
الْإِسْتِطْعَالَةِ . نَصْلُهَا جَامِدٌ الْمُنْصَفُ غَائِرُ التَّشْدِيدِ . أَنْوَاعُهَا  
صَغِيرَةٌ أَلْوَنُهَا إِلَى الصَّفْرِ يَمْلُوهَا مَرَاثُ الْخَضِرِ . يَسْتَفْجِرُ  
مِنْ جَمِيعِ أَغْصَانِهَا مَادَّةٌ جَمَالِيَّةٌ قَالَةٌ يُقَالُ أَنَّهَا مُنْطَبَةٌ  
وَمُغْفِيَّةٌ .

٢٣٥٤٦ - كُرْمِيْس (F). Kermès  
هِيَ الْقُرْمِيَّةُ ، اطْلُبَا .

٢٣٥٤٧ - كُرْمِيْسُ الثَّفَاحِ (F). Kermès virgule  
هِيَ قُرْمِيَّةُ الثَّفَاحِ ، اطْلُبَا .



كُرْب



كُرْمَبُ بَحْرِي

Cranchildae (S). **كَرْشَنِيَّات** \* ٢٣٥٦٦  
Cranchildés (F). Cranchildés (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الأرجل مزدوجات الخيشوم، اجناسها وانواعها الماصرة المرفقة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة شبه اسطوانية الشكل. تتميز برابطها الفضل الذي يجمع بين الرأس والجسم. زعانفها شرجية الاركاناز، خاصة الاصلع. جوفها كبيرة جاحضة || اشهر اجناسها الكرنشة.

Carnallite (F). **كَرْنَلَيْت** \* ٢٣٥٦٧  
Carnallite (E).  
ملح معدني يستخرج من الارض يستخلص منه البوتاس والمغنيزيوم.

Carnauba (F). **كَرْنُوبَة** \* ٢٣٥٦٨  
Carnauba palm (E).

كرنوبه هو الانم البرازيلي. شجرة من التخلجات تدهي البتقوس تكثر زراعتها الصناعية في البرازيل. راجع بتقوس.

Calebasse (F). **كَرْبَب** \* ٢٣٥٦٩  
هو القرع الطويل، احلبه.

Chernetidae (S). **كَرْنَيْسِيَّات** \* ٢٣٥٧٠  
Chernétiées (F). Chernetidae (E).

فصيلة دويبات من العقربيات الكاذبة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد، معظمها من دويبات المنطق الباردة || تتميز بصغر الجسم المغطى بالمطوق الطرف ويشامها المستطيلة المسلسلة بملاقط طرفية قريبة الشبه بملاقط المقارب || تعيش في المواعظ المظلمة وتحت قشور الاشجار وفي الليوت البهيمر الخشبية السفوف || جميعها من الدويبات الثاقفة تقضي على الحشرات الصغيرة المؤذية.

Numenius (S). **كَرْوَان** \* ٢٣٥٧١  
Courlis (F). Courlew (E).

جنس طير من الكروانيات القرواط. الانثى كروانة والجمع كراوين وكروان. انواعه ١٠ تتميز باستطالة دقة مناقيرها وسيفاتها. اجنحتها ذلقة. اذنانها مستديرة. ارساها جعجية الجهة الامامية، سرديفة الخلفية || تألف الماء وتعيش قرب الشاطئ والبيئات والانهار. قوتها الرخويات والديدان والحشرات والاسماك الصغيرة تتلقطها عند جزر البحر || اناثها تلتن في افخيس تنشد قموها بالخيش وهي تنس من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وسدا ٣ اسابيع. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

**كَرْوَانُ أُرُود** \* ٢٣٥٧٢  
Numenius arquata (S). Courlis cendré, Grand courlis (F). Common curlew (E).

نوع من الكروان، كبير الجثة طوله نحو ٦٥ سم. وبسطه ١٣٠ سم. ثوبه الى الريدة الرمادية المرفقة. بطنه الى البياض. عيانه صليتان، منقاره اسمر. ساقاه الى الرصاصي. يألف مختلف مناطق حوض البحر المتوسط يجوبها مرتان في السنة.

**كَرْوَانُ إِفْرِيقِي** \* ٢٣٥٧٣  
Numenius tenuirostris (S). Courlis à bec grêle (F).

نوع من الكروان، صغير الجثة طوله نحو ٤٠ سم. وبسطه

سوية اللونان بلعوا تجذيع وتقيج || يرقاتها شبه ملساء. روابط خادراتها يجم ارساها ويعنها من التبل.

٢٣٥٦١ - **كَرْبَنِيَّةُ الزُّعْرُور** \* ، **قَرَاشَةُ الزُّعْرُور**  
Aporia crataegi (S). Aporie de l'aubépine, le Gazé (F). Black-veined white (E). Baumweibling (D).  
حشرة من الكرنبيات وسيدة الجبل الحولي. بسطها تراوح من ٦٥ الى ٧٠ سم. رواشها الى البياض العاجي، حرقها سود. يرقها سمره اللون، غيره اللهب، تعيش على اوراق الزعرور وسائر الانجبار المشرية. يبيها الشتوي فضفيه داخل الاوراق التي تفتلها وتجمها الى بعضها بيطوط من الحرير حنطية اللون.

٢٣٥٦٢ - **كَرْبَنِيَّةُ الْكَرْبَب** \*  
Pteris rapae (S). Pteride de la rave (F). Small garden-white (E). Kleiner Kohlweibling (D).

حشرة من الكرنبيات، بسطها تراوح من ٤٠ الى ٥٠ سم. ذكرها يفس الراش، سمر الزوايا الامامية والبقع الثلاثية. اناثها عادمة الزوايا السمر، ثنائية البقع الصغيرة. لها في الحول من جيلين الى ثلاثة. يرقها تعيش منفردة على مختلف اوراق الصليبيات البرية والزراعية احصها الكرنب.

٢٣٥٦٣ - **كَرْبَنِيَّةُ الْفَلْت** \* ، **قَرَاشَةُ الْفَلْت**  
Pteris napi (S). Pteride du navet (F). Green-veined white (E). Rapsweibling (D).

حشرة من الكرنبيات، بسطها تراوح من ٣٥ الى ٤٠ سم. رواشها الى البياض الاثير يملو مراح اخضر. ذكرها سمر الزوايا الامامية. اناثها وذكورها ثنائية البقع السود المستطيلة الاشكال || يرقها خضراء اللون تركب الفلت وسائر الصليبيات، اذاها يستمر من سزيران الى ايلول.

٢٣٥٦٤ - **كَرْبَنِيَّةُ الْمَلْفُوف** \* ، **دُوْدَةُ الْكَرْبَب** ، **قَرَاشَةُ الْمَلْفُوف**

Pteris brassicae (S). Pteride du chou (F). Large garden-white (E). Grober Kohlweibling (D).

حشرة من الكرنبيات بسطها، تراوح من ٦٠ الى ٧٠ سم. رواشها الى البياض الاثير، زواياها الامامية سودا اطراف. اناثها ثلاثية البقع السود || لها جيلان في الحول تمتع مكها على الصغمة السفل من التصل. مكها محروفي الشكل، اصفر اللون، رني التجميع، رزته تده من ٣٠ الى ٥٠ مكة || يرقها حمة مؤذية تلهم اوراق الملفوف وسائر الصليبيات البرية والزراعية ولا تتركها سوى الصلوق والمروق. ثوبها الى الخضار الاكعب يملو تعيش اسود وثلاثة خطوط مستطيلة قاطية غيره اللون.

٢٣٥٦٥ - **كَرْشَنَة** \*  
Cranchia (S).  
Cranchie (F). Cranchia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الأرجل وفصيلة الكرنبيات. انواعها الماصرة المرفقة ثلاثة اعطائها بحار البلاد الحارة. ملجئها الحياتي جماعي. ارساها رافرة العدد. جميعها يجم لا تقرب الشطوط. سمرحها دوي || اجسامها اسطوانية الشكل، صغيرة القد. زعانفها صغيرة، خاصة الاصلع. شرجية الاركاناز. ملاسها منشفة معجمة الاطراف.



كرنبية الزعرور



كرنبية الكرنب



كرنبية الفلت



كرنبية الملفوف



كروان اريد



كروان افريقي

٢٣٥٨٢ - كروان مدسى Gobie sanglant (F).

هو القوبيون المدسى، سمكة بحرية، اطلبه.

٢٣٥٨٤ - كروان أمونياك، كروان الأمونياك، حريف الشكار

Crud ammoniac, Crude ammoniacque (F).

سماد كياري ازوتي يستعمل كحاشور ومضارب. وهو من مؤلفات صناعة غاز الامتزاز يحوى من ٢ الى ١٠ ٪ من الازوت البطيء الانفعال والنزجة الذي يستعمل لتحويله الى النترية من ٤ الى ٥ شهور ٥ اما غواصة للمعالجة ان على الحشرات والمبيدات ان حل الاصاب فبرية المفعول الجيد النتائج. وهو يستعمل في هذا السيليل يمدل يراوح من ١٠٠ الى ٣٠٠ كيلو للدم الواحد.

٢٣٥٨٥ - كروان البصل \*

Lillocoris mardigera, Lillocoris brunnea (S).

Criocère de l'oignon (F). Onion-beetle (E).

حشرة غاصلة مؤذية من النضاريات ورتبة مفصليات الاجنحة. تألف البراري والمزارع وحقول البصل. غناتها ويرقاتها تعيش على اوراق البصل والكرات والروم البري وزيتق الوادي ٥ جسمها صغير القذيل من ٦ الى ٧ م. فورها الملوي الى الحشرة القرمزية الصنافية الملاج. فورها السفل الى السرة السوداء. رأسها مستعرض الجرم. عيناها صغيرتان. زباناها غشيان. ظهرها مستدير الطرف اللاحق. غدها متباعدة التعزيز القاطب ٥ لها جيلان من الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل نيسان. تسرح في النهار. تساقط بعد ظهورها باربعة اسابيع وتمتد المكن على فصال الارواق ٥ البرقة عند ادراكها الكال الجسوري تقطن نحو ٨ م. فورها الى الخنطي الاصفر الملاج. رأسها ورواجها سيد.

٢٣٥٨٦ - كروان الزرع \*، أوليسا الزرع

Ulema melanopus (S). Criocère des céréales (F).

Cereal leaf beetle (E). Rothschild's Getreidehähnchen (D).

غشاء من فصيلة النضاريات طويلا يراوح من ٤ الى ٥ م. رأسها وغدها الى الزرق الالام. كرسها الى الحرة. تركب مع برقاتها نصف التجليات فتؤذي وتسي الى الثنيات.

٢٣٥٨٧ - كروان الزنبق \*

Crioceris lili, Lillocoris lili (S). Criocère du lis (F). Lily beetle (E). Lilienhähnchen (D).

غشاء من النضاريات طويلا يراوح من ٧ الى ٨ م. رأسها وقوائمها سيد. كرسها وشاها حر. مكها ناري اللون وشي الشكل تمنحه الاثني على اوراق الزنبق فينتفج من برقات تقطع الارواق وتقرضها.

٢٣٥٨٨ - كروان الهليون \*

Crioceris asparagi (S). Criocère de l'asperge (F). Asparagus beetle (E). Spargelhähnchen (D).

غشاء من فصيلة النضاريات طويلا يراوح من ٥ الى ٦ م. رأسها اسيد اللون، ازرق الملاج. كرسها الى الحرة يملو توشيع اسف. غدها الى الزرق الالامفة يحوقها اطار اصهب ويتخللها تبيج نفس متقابل لونه الى الصغار الاغبر الخنطي ٥ تركب المليون ويؤذي.



كروان الزيت



كروس البصل



كروس الزرع



كروس الزنبق



كروس الهليون

١٠٠ م. متفاره دقيق نحيل. فويه الى الرتبة النبرا، المرقطة. بطنه واثنيكه وشاها جناحه الدخالي الى البياض. شتاء افرقية الاستوائية. مصفبه يمتد من مراکش الى الصعيد ولة شوبه مرارا في صقلية.

٢٣٥٧٤ - كروان الجبل

Edicnème (F).

Stone curlew (E).

هو البرعند، طائر من دجاجيات الارض، اطلبه.

٢٣٥٧٥ - كروان الهنسن

Numenius hudsonicus (S). Courlis du Hudson (F).

نوع من الكروان متوسط الجثة. طوله نحو ٥٥ سم. وبسطه ١١٠ م. فويه الى الرتبة المرقطة بالابيض والاسود. بطنه تبي اللون وصدره واثنيكه كذلك ٥ يحوب امريكية الشمالية لكنه يكثر الامالة في مناطق المدن انحصها الخليلج.

٢٣٥٧٦ - كروانيات

Numenius (F).

عمارة من فصيلة دجاجيات الارض. اجناسها وانواعها عديدة تتميز بشكلها الرقيق الاهيف. مناقيرها مسطحة، دلالية الفتوس، مخدة الجرم. سيقانها دقيقة. اراسها سرديّة، اصحابها رباعية ٥ اشهر اجناسها الكروان.

٢٣٥٧٧ - كروان

جنس نباتات حرجية وريّة من فصيلة البترونيات. اناؤه كثيرة العدد منها الاشجار والشجيرات والجنابات والاصشاب. معظمها من نبات المناطق الاستوائية ٥ اورتها كاملة متعاقبة، مسقة، رعية. ازهارها حقويدي تاجي. ازهارها ويحده للسكن. ثمارها جراه كرووية او يغبية الشكل. يزورها نفعية منها هدنية طيبة وسها صنافية. قشور بعض انواعها طيبة ٥ اشهرها ما يتبع.

٢٣٥٧٨ - كروان الزيت \*، حبة السلطين

خزوع صيني

Croton tiglium (S). Croton cathartique (F). Croton-oil plant, Purging croton, Tiglium (E). Purgierkroton, Tiglibaum (D). Croton, Tiglio drastico (I).

نوع من الكروان، منته المناطق الاستوائية الاسوية والاخرقية. يستخرج من يزوره مادة زيتية غواصها خواص زيت الخروع وتستخدم استملاك.

٢٣٥٧٩ - كروان عنبيري، قشر عنبيري

Croton aluteria, Cascarilla aluta (S). Cascarille, Croton éleuthérie (F). Cascarilla-bark tree, Seaside balsam (E). Kaskarillenstrauch (D). Cascarilla, China aromatica (I).

نوع من الكروان، منته البلاد الامريكية 5 يستخرج من لحائه مادة صناعية مرة زكية اليرف المنبري المستصعب، تستعمل ضد الحيات.

٢٣٥٨٠ - كروان

Gobie (F).

جنس امماك بحرية مشهورة باسم قوبيون، اطلبه.

٢٣٥٨١ - كروان اسود

Gobie noir (F).

هو القوبيون الاسود، سمكة بحرية، اطلبه.

٢٣٥٨٢ - كروان اغبر

Gobie nébuleux (F).

هو القوبيون الغشيب، سمكة بحرية، اطلبه.

Sphérique (F). **كرويّة ، كرويّ**  
Spherical (E).  
ما كان شكله الكائرة أو ما كان له صلة بالكرة .

Carvt **كرويايّ** ٢٣٦٠٢  
هي الكروايا ، اطلبها .

Micrococceae (S). **كرويات** ٢٣٦٠٣  
Micrococccées (F). Micrococceae (E).  
فصيلة من البكتريات ، أجناسها وانواعها التي هم لزراعة قليلة العدد تتميز بأحجامها الذرية الكروية وبناتجها التكاثري الذي يحصل في اتجاهات مختلفة يمكن حصرها بالاتجاه الفردي والاتجاه الثنائي والاتجاه الثلاثي || أفرق أنواعها المضرة ما يتبع .

Micrococcus tritici (S). **كروية البرّ** ٢٣٦٠٤  
Microcoque du blé, Maladie du blé rose (F).  
مرض بكتيري من الكرويات ، نحازه شديد اللون والأثر على برّ الخنطة فيقبحه ويغده ويحبه ويشبهه بالخباب الوردي اللون .

Micrococcus imperatoris (S). **كروية إمبراطورية** ٢٣٦٠٥  
Microcoque impérial (F).  
مرض بكتيري من الكرويات ، نحازه شديد اللون على درنات البطاطا المحروسة والمحفوفة في أماكن رطبة عادمة البهوية لانه يربها ويسبب تلفها .

Micrococcus albidus (S). **كروية بيضاء** ٢٣٦٠٦  
Microcoque blanc (F).  
مرض بكتيري من الكرويات يمرض البطاطا والفلقاس والبصل فيعفنهما ويربها .

Micrococcus flavidus (S). **كروية ذهبية** ٢٣٦٠٧  
Microcoque doré (F).  
مرض بكتيري من الكرويات ، نحازه يمرض على عدة الخنثوية المحفوفة فيفسدها ويجب تلفها .

Micrococcus pelliculidus (S). **كروية قشرية** ٢٣٦٠٨  
Microcoque pellicule (F).  
مرض بكتيري من الكرويات ، نحازه يمرض على عدة نباتات بصلية ودقسية وقد يركب البطاطا ويجب لها الجرب الفردي .

Micrococcus phytophthorus (S). **كروية ينكورية** ٢٣٦٠٩  
Microcoque noir, Maladie de la jambe noire (F).  
مرض بكتيري من الكرويات ، نحازه شديد اللون على سوق البطاطا حيث يعمم بعض أقسامها فيفسد أسودها وتلفها ، وقد يصيب الدرن فيلو كبقع سود تحوها حالات سمر تجفف القشرة وتصلبها وتشتقق ثم تهري القلب .

Curage (F). Cleansing (E). **كرويّ** ٢٣٦١٠  
إخراج الوحل والحسا والأعشاب من الفترات والخساري المائية

Corpuscules du sang, Globules (F). **كرويات** ٢٣٦١١  
Blood corpuscles, Globules (E).  
الواحدة كرويّة . والكريات مجمعة من الأجسام السائبة في الدم منها الحمر والبياض ثم السلفية والمهادية أو الحبيدة .

Crossing-over **كروسيين أوفر** ٢٣٥٨٩  
هو الحاصل الناتج من تشابك والتفاف النشب .

**كرولا أرجواني الصدر** ٢٣٥٩٠  
Querula rubricollis (S). Plauhou de Cayenne (F).  
طائر من الجواثم سنيات المنابر وفصيلة القطنجيات ، أعطاه بعض مناطق امريكة الاستوائية || جسمه متوسط القد ، يطول نحو ٢٥ سم ، ثوبه ال السواد الاسفع . زوره وصدره أرجوانيا اللون حته الذكر || ملجته الحياتي جماعي الا في زين التساقط والحضانة . يالف الغابات والحراج . قوته البلور والثار البانئة وبعض الحشرات اغصها النمل .

Chrome (F). Chromium (E). **كروم** ٢٣٥٩١  
معدن اكهب اللون شديد الصلابة ثقله النزي يراوح من ٦ الى ٨,٥ كغم ينصهر في ١٥٢٠° سغ || درزه (كرو- Cr) وزنه الاتومي ٥٢,٠١ وهو لا يتأثر بالهواء الجوي ولا يتأكسه الا في درجات الحرارة العالية . يذوب في الحامض الكلوريدريكي والحامض الكبريتي || يوجد في الطبيعة مركبا مع بعض العناصر بنسب مختلفة . تحريره واستخلاصه من فقله يستوجب صوره في افراخ خاصة تستعمل الحرارة العالية || أشهر مركباته الطبيعية كرويات الرصاص . أما أشهر مركباته الصناعية فهي كرويات البوتاسيوم وكرويات الصوديوم التي تستعمل في ديق الجلود وصباغها .

Chromatide **كرومايد** ٢٣٥٩٢  
هو من النشبة نصف شرطها الطولي وذلك عندما تكون في طور الميوّنة .

Chromatique (F). **كرواتيكي ، صمغتي** ٢٣٥٩٣  
Chromatic (E).  
نمت تعريفي توصف به الاعضاء الصمغية في الاجسام الحيوانية والنباتية .

Chromacine (F). **كروستين ، كرومين** ٢٣٥٩٤  
Chromatin (E).  
مركب آسي - حامضي - سفوري تتكون منه مادة النشب وقسم من الجلبة الخلووية .

Chromoplaste (F). **كروستوبلاست** ٢٣٥٩٥  
Chromoplastid (E).  
مادة الأثلة الملونة .

Chromosome **كروموزوم** ٢٣٥٩٦  
هو النشبة ، اطلبها .

Chromoleucite **كرومولوسيت** ٢٣٥٩٧  
حبيبة المنضب في وثقة الخلايا النباتية .

Chromomère (F). **كروموسير** ٢٣٥٩٨  
اصفر جزئيات تشتل بالشكل والمركز في شعاع البتون الكرواتيكي .

Coronille (F). **كرونية** ٢٣٥٩٩  
هو الامروس نبات من القرنيات ، اطلبه .

Chronomètre (F). **كرونومتر** ٢٣٦٠٠  
Chronometer (E).  
آلة تستعمل في قياس الوقت لا يفرقها عن الساعة العادية سوى دقة الاداء والفضيل الفائق والتوقيف الحيازي .



كرولا أرجواني الصدر



كروية البر



كروية ينكورية

## ٢٣٦١٩ - كُرْبِيْتورِيَا

Cryptomélie (F).

شجرة من الطقوسيات تعرف بالسوي، أطباها .



كُرْبِيْتورِيَا

## ٢٣٦٢٠ - كُرْبِيْسِيْس

Coreopsis (S). Coréopsis (E). Schöngesicht, Wauzenblums (D). Coreopsis (D), Callopsis (F).

جنس نباتات عشبية من فصيلة المركبات . أنواعه عديدة، منها البرية والزرينية . أوراقها لاقطية الشكل والأزهار كالأزهار . أزهارها زرقاء ، ثمانية السنتات الملونة . بزورها مستطيلة مبطلة متعرجة بسنتين أو حكتين أو سرفشتين . أشهر أنواعه الزرينية ما يليج .

## ٢٣٦٢١ - كُرْبِيْسِيْس أُنِيْس

Coreopsis elegans, C. tinctoria (S). Coréopsis élégant (F).

نوع من الكريسييس ضرره عديدة، فأوراقها ألوانها، جميعها أصاب زُرَيْْنِيَة حليّة تملو من ٣٠ إلى ١٢٠ سم . أوراقها متعاقبة مفرشة . فروعها قدية الشكل، ثلاثية أو خماسية أو سباعية العدد . فصلها مائل البيرة حايق الخضر . رؤوسها الزهرية ملونة البلباب والبينات، قطرها نحو ٤ سم . أزهارها يستمر طول فصل الصيف .



كُرْبِيْتورِيَا الصَّفَاث

## ٢٣٦٢٢ - كُرْبِيْسِيْس بَحْرِي

Coreopsis maritima (S). Coréopsis côtière, C. maritime (F).

نوع من الكريسييس وهو بجلة زُرَيْْنِيَة معمرة تملو نحو ٣٠ سم . تألفت الشطوط البحرية للاندانة . ساقها غليظة قصيرة متعرجة . أوراقها متعاقبة قدية التفريش الضيق . رؤوسها الزهرية صفراء اللون كبيرة القذ سباعية الشكل، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٠ سم . أزهارها يستمر طول فصل الخريف .

## ٢٣٦٢٣ - كُرْبِيْسِيْس كَبِير الزَهْر

Coreopsis grandiflora (S). Coréopsis à grandes fleurs (F).

نوع من الكريسييس وهو عشبة زُرَيْْنِيَة معمرة تملو من ٣٠ إلى ١٢٠ سم . أوراقها متعاقبة مفرشة . فروعها قدية الشكل ثلاثية أو خماسية العدد . فصلها مائل الصفحة العليا . خلي السفلى . رؤوسها الزهرية مكعبة قطرها نحو ٥ سم . طبها إلى الصفرة ، لبساتها رباعية التفصيص ذهبية اللون . أزهارها يستمر من أيار إلى آب .



كُرْبِيْسِيْس أُنِيْس

## ٢٣٦٢٤ - كُرْبِيْسِيْس مَشْرَح

Coreopsis coronata (S). Coréopsis couronné (F).

نوع من الكريسييس وهو عشبة زُرَيْْنِيَة حليّة تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم . ساقها نحيلة مستقيمة . أوراقها متعاقبة كاملة . فصلها أحليجي الشكل . مقطوع القاعدة . دمل الصفحة الخالصة . رؤوسها الزهرية مسر البلباب . لبساتها برتقالية اللون متطية الحار . قنابها ستانية مبدية . أزهارها يستمر من تموز إلى تشرين .



كُرْبِيْسِيْس كَبِير الزَهْر

## ٢٣٦٢٥ - كُرْبِيْسِيْس نَجْمِي

Coreopsis stellata, C. major (S). Coréopsis étoilée (F).

نوع من الكريسييس وهو بجلة زُرَيْْنِيَة معمرة تملو من ٦٠ إلى ٩٠ سم . ساقها وعرورها مزينة القحاء . أوراقها خمسية الأوتكاز و ثلاثية التفريش الضيق . فصلها خلي البيرة . رؤوسها الزهرية صفراء اللون كبيرة القذ نجمة الشكل مستطيلة البينات الناشرة . أزهارها يستمر من تموز إلى آب .

## ٢٣٦١٢ - كُرْبَات يَفِي

Globules blancs, Leucocytes (F). Leucocytes (E).

حبيرات حيوانية متحركة وظفيتها الرئيسية للقضاء على الجيكروبات الساعية في الدم || المليمتر المكعب من الدم يحوي نحو ٧٠٠٠ كرية .

## ٢٣٦١٣ - كُرْبَات حَمَر

Globules rouges, Hématies, Erythrocytes (F). Erythrocytes (E).

حبيرات حيوانية من ذوات النواة . وظفيتها الرئيسية حل الأكسينين من الرقة إلى جميع أجزاء الجسم وهي تعيش بضعة أسابيع ثم تنقسم وتفتت . نسبها إلى الكريات البيض نسبة ٥٠٠ إلى ١ || المليمتر المكعب من الدم يحوي ما يراوح قدره من ٤ إلى ٥ ملايين من الكريات الحمر . أما ألبها الأحمر فيزني إلى المادة الملونة الحمراء المعروفة بالهيموغلوبين (Hémoglobine) .

## ٢٣٦١٤ - كُرْبَب

Rhizome de roseau (F).

Rhizome of reed (E).

الكعب من القصب أو القنا تعريف المائي «سلطون» .

## ٢٣٦١٥ - كُرْبِيْسِيْسُورِيَا

جنس فطور مجهرية رمية من فصيلة الزفنيات . أنواعه قليلة لاهل ولاضرار . تركيب حلاء الأعصان والأفناد اليابسة . وقيمتة عجيبة أو عسبة الشكل و تشقا محضوة ثم ترق . بريداته شائعة ، بسيطة ، قوسية الشكل .

## ٢٣٦١٦ - كُرْبِيْتورِيَا

جنس حشرات متعرجة القذ من فصيلة السويات . أنواعه للمعرفة سبعة . أطولها يراوح من ٦ إلى ١٠ سم . ألبها حليّة أو مبراة اللون تملوها تراويق وزرا كثر سود . تعيش حل الحوز والصمصاف والبتولا . يرقاتها تسردب الأجار القنية والجانب المظطوة اليابسة وقد تنحرفها حتى ألبها .

## ٢٣٦١٧ - كُرْبِيْتورِيَا الصَّفَاث

Cryptorrhynchus lapathi (S). Cryptorrhynque des suies (F). Cryptorrhynchus lapathi (E).

حشرة خاضعة غاشية مؤذية من فصيلة السويات ودية مبدعات الانسنة . تألفت المواق الرطبة والمناقع . خنافسها تعيش حل أوراق البث والحميس . يرقاتها عاشبة تركيب الحوز والصمصاف والحوز تسردب الأجار القنية والجانب المظطوة وقد تنحرفها حتى ألبها . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٨ سم . ثوبها بصر اللون تملو فلولس متراكبة وتراويق وزرا كثر فيها الأسود والخطي والكسني والاصهب والاشقق الصناعي . رأسها صغير الحجم . فيها صغيرتان زباناها صرغانيان ، مرقبان . فلولها مذهب المنقوش اللامع . غمداه متشابكة التحزير الخفيف القاطب لها جيل واحد في الحول . تخرج الحشرة الجملانة من بيئات الشتوي في أوائل نيسان ويبقى حتى أوائل أيلول . تسرح في النهار تروى المكان مبيحادي في تقرب تنحرفها بمتكها في حلاء الجلولج || البرقة عند بلوغها الإدراك تمام تطول نحو ١٢ سم . جسمها أحليجي الشكل ، مكور الرأس ، مذهب الطرف . حنطي اللون أسود الرأس والشرج .

## ٢٣٦١٨ - كُرْبِيْتولِيَا

Cryptolite

هو فسفات البيريد الطبيعي ، يكثر وجوده في الأبيت الاخضر .

المثوية. ازهارها خاسية او مداسية التركيب. ثمارها غلظلة الاشكال تكثر فيها الاستدارة. سؤذها لباي المادة المأكولة || اشهر انواعها ما يتبع .

### ٢٣٦٣٥ - كرزوفيلم إفريقي ٥

*Chrysophyllum africanum* (S). *Chrysophylla africana* (F).

نوع من الكرزوفيلم منته البلاد الافريقية الاستوائية. ثمرته تملو نحو ١٢ م. ثمارها مأكولة بفضية الشكل مقعوبة القاعدة تحوي من ٣ الى ٥ حبات .

### ٢٣٦٣٦ - كرزوفيلم كيميتو ٥ ، كيميت ٥

*Chrysophyllum calmito* (S). *Chrysophylla calmita*, *Calmitier* (F). *Common star apple* (E). *Echter Sumpfelbaum* (D). *Crisofillo calmito* (I).

اشهر انواع الكرزوفيلم واعمالها زراعة . ضروريه الثالثة خة . اشجارها تملو من ١٥ الى ١٥ م. سؤفا منتصبة، مثقفة اللحاء. اغصانها فارشة . قشها قرعاء قلنسوة الشكل. اوراقها متطابقة اهليلجية . نصلها جامد النسيج ، اخضر الصلعة اللها ، خلى السغل ، مذهب اللحم . ازهارها صغيرة اللد ، بيضاء اللون ، خماسية التركيب ، مستطيلة الاذن . ثمارها كروية الشكل حجمها حجم التفاح . قشورها مالسة ملونة ، لباها جامد المادة متوسط العصرة السكرية الزجة .

### ٢٣٦٣٧ - كرزوفيلم مكوكو ٥

*Chrysophyllum macoucou*, *Aubletia macoucou* (S). *Chrysophylla de Macoucou* (F).

نوع من الكرزوفيلم الزراعي . ثمرته تملو نحو ١٠ اثمار . ثمارها مأكولة اجاسية الشكل اللد ، برتقالية اللون مداسية المحبات .

### ٢٣٦٣٨ - كرزوفيلم وحيد العجمة ٥

*Chrysophyllum monopyranum*, *C. oliviforme* (S). *Chrysophylla monosperma* (F).

نوع من الكرزوفيلم الزراعي . ثمرته تملو نحو ٨ اثمار . ثماره وحيدة العجمة بيضية الشكل والحجم . لوها الى اليفسجي المايق . لباها لذيد الطعم عند الادراك التام .

### ٢٣٦٤٠ - كرزوفيلم ٥

*Chrysosoma* (F).

هو ذئب اللد ، اطله .

### ٢٣٦٤١ - كرزوفيلم ٥

*Chrysomyxa* (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الزمليات يتبع لسانحه الوادية وبمسائله الشفافة الرقيقة . طوره الانديي يتكون ويتفشي على اعداد الصنوبريات حيث يلو كالحوصلات المرصوفة بموازة الصل على جانبها الى انواعه الاقتصادية المرونة قليلة منها كرزوميكس الايسة كرزوميكس العسل .

### ٢٣٦٦٦ - كرزوميكس وردى ٥

*Coreopsis rosea* (S). *Coreopsis rosea* (F).

نوع من الكرزوميكس وهو عشبة ترينية معمرة تملو من ١٥ الى ٦٠ سم. اوراقها متطابقة لاطلة . نصلها مائل البشرة وسيد اللد يملو من ٣ الى ٧ سم. ويمرض من ١ الى ٣ م. وروشتها الزهرية صفراء الطيب ، بيض السينات قشرها نحو ٢ م. ازهارها يمتد من تموز الى آب .

### ٢٣٦٦٧ - كرزوميكس ٥

*Butyrospermum parkii* (S). *Karité*, *Si* (F).

شجرة مشرة من فصيلة الطلحات . منته البلاد الافريقية الاستوائية. تكثر في ساسب السودان ونيبيا والشاطئ الماي والدومبي والفرنزا والكيمون وتصاد والاورني || ساقها غليظة منتصبة نخبة اللحاء الرطبة . اوراقها خمسة طرفية . نصلها سناني الشكل ، مستطيل اللد ، بارز اللد . العروق المدببة. ازهارها خمسة التجميع ، طرفية الارتكاز ، عشوية . ثمارها برتقالية اللد مأكولة آلبا تخضع صحتين لوزيتين لباها يحوي من ٤٠ الى ٥٠ ٪ من المواد اللحية الجامدة المرونة باسم الكريمت وهي تستخرج من اللوز بد تحميمه ونفش .

### ٢٣٦٦٨ - كرزوميكس ٥

*Carriérre* (F).

هي اثمار العصي ، شجرة ترينية . اطله .

### ٢٣٦٦٩ - كرزوميكس ٥

*Conus* (S).

*Cône* (F). *Conus* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الاصل ونصيلة الكرزومات . انواعها المعروفة نحو ٥٥٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اصداها غروية حلزونة قرنية الشبه باكرار الصنوبر . مرادها سمنة . اسنانها نبال صفيرة ذرية لسها ذراي مؤذ .

### ٢٣٦٣٠ - كرزوميكس ٥

*Chrysanthème* (F).

هو القزقان ، اطله .

### ٢٣٦٣١ - كرزوميكس ٥

*Chrysanthème à carène* (F).

هو قزقان المروج ، اطله .

### ٢٣٦٣٢ - كرزوميكس ٥

*Chrysanthème des bles*

هو القزقان اللحي ، اطله .

### ٢٣٦٣٣ - كرزوميكس ٥ ، سيمييس ٥

*Chrysothrix* (S). *Salmirix* (F).

جنس قزود امريكية من فصيلة السيوسيات . انواعها ٣ موطنها امريكة الوسطى اصحابها البرازيل واليونان وكولومبيا وبوليفيا والبيرو || اجسامها صفيرة اللد . وشية القوام . قوامها دقيقة متوسطة الطول . اذنانها مستطيلة نخبة . اثارها متباعدة الاذن الزمائية . شمورها ناعمة ، لينة وثيرة . تألف الاجراج والفانبات . مرتها الانجار دون الحفيس . قوتها البرام والاوراق والحشرات والعصافير .

### ٢٣٦٣٤ - كرزوفيلم ٥

*Chrysophyllum* (S). *Chrysophylla* (F). *Star apple* (E). *Sernsappelbaum* (D). *Crisofillo* (I).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية مشرة من فصيلة الطلحات . انواعها عديدة . اصنافها البلاد الاستوائية سؤفا منتصبة . صماتها حلابية المادة . اوراقها اهليلجية مستطيلة . نصلها جامد الصلعة ، كثير اللد . العروق النخبة



كرينه (١)



كرينه (٢)

(الشرة والبردة والثرقة)



كريز



كريزور يفس



كريزوفيلم كيميوس



## ٢٣٦٤٢ - كريزوميكس الأيسية

*Chrysomya abietis* (S). Rouille des aiguilles de l'épicéa (F). Needle rust of the spruce (E). Fichtenadelrost (D).

فطر مجهرى يتطفل على اعداب الابنية فيلبها ويسبب سقوطها || مظهره الخارجى يقع منخفضة متتابعة متجانسة صفراء اللون تظهر في اواخر حزيران على ظهور ميازيب الاعداب ثم تتطور وترتفع وتصحب كل بقعة من البقع قاعدة خروصكين مستطيلتين لونها الى الصفرة الزاوية تقومان على جانبي نسيج الحب || وهو مركب الابنية في جميع المراتع انما يفضل الاشجار الفتية التي تراوح اعمارها من ١٠ من ٢٠ سنة.

## ٢٣٦٤٣ - كريزوميكس العنصل

*Chrysomya rhododendri*, *Uredo rhododendri*, *Aecidium abietinum* (S). Rouille vésiculaire du rhododendron (F).

فطر مجهرى يتطفل على العنصل في المناطق الجبلية التي تملو سطح البحر من ١٠٠٠ م. وما فوق || مظهره الخارجى يثور مستديرة او بيضاوية الشكل تركب النصل على صفحتي السفل يقابلها على البهفة العليا يقع بنفس الحجم لونها الى الجورة ثم تنحرف الى الخنفى وترتفع بشرة النسيج وتفجرها وتسبب جفاف النصل وسقوط الورقة.

## ٢٣٦٤٤ - كزونيئات

*Conidæ* (S). *Conidés* (F). *Conidæ* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مميزات الارجل اماميات الخياشيم وحيوانات الاجهزة. اجسامها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الطبقة الطليانية والبعض الآخر معاصر || اصداؤها حلزونة اسطوانية الشكل او مخروطية. قرونها مستطيلة مفردة اشكالها اسطوانية قزنية المادة || اعرف اجسامها واشهرها الكريز والزناطة.

## ٢٣٦٤٥ - كريزيل

*Cresyl* (F). *Cresyl* (E). سائل مظهر غزيرى اللون يستخرج من قطران الصم الجبرى.

## ٢٣٦٤٦ - كزيشة الحما

*Astragalus peregrinus* (S).

نبات يدهى اسطوخاوس رسال، اطلبه.

## ٢٣٦٤٧ - كريفلون

*Pomelo*, *Grape-fruit*. هو ليمون الجنة، اطلبه.

## ٢٣٦٤٨ - كزيبكة

*Carychium* (S). *Carychium* (F). *Carychium* (E).

جنس حيوانات برية من الرغويات مميزات الارجل وفضيلة الحفصليات. انواعها المعروفة عديدة، معظمها من متحجرات الاراضي الجوردية والطليانية. انواعها الماصرة منتشرة في جميع اصقاع العالم. تعيش في المراتع الرطبة وقرب مجاري الماء || اصداؤها شبه مردنية الشكل، حلزونة نصف الخلفى، مستدقة الاقناب.

## ٢٣٦٤٩ - كزيبكة

جنس نباتات شجرية مصرة من فصيلة الباطنيات. مهادها البلاد الحارة الاستوائية. سوقها اسطوانية منتصبة حراطة تحمل في زناها الاخير ومنه قتها بعض الاوراق المزدنة الكبيرة النصل وبعض الثمار الكبيرة القفد || ثمارها

ماكولة البلب نائمة تقييد اللعنة وتنشط الحشم، لشهر انزلها ما يتبع.

## ٢٣٦٥٠ - كزيبكة الالة

*Carica candamarcensis* (S). نوع من الكريكة، مهادها جبال الاند الامريكية اغصانها الالة قرب خط الاستواء، ثمرتها تملو من ٤ الى ٦ امتار. ساقها غليظة. اوراقها مستطيلة الزناد. نصلها سباعي التفصيص، متباعد التفريق، بحري اللون، ازرق المواج، خلى الصفحة السفلى || ثمارها اعطليجية الشكل، خاسية الفلوع، ناعمة الصرة الدنية، قشورها عند نضجها يرتقالية اللون لا تقل سماكتها من ١٠ سم. لبها رغو المادة، عادم اللون. بولها بيضاوية الشكل، سمراء اللون، حريفة الطعم، لاذعة. قشورها ولها ثقل طازية وسيطونة. تنكاث بالبلور، ترطب في الاربة الخفيفة المتوسطة الاندماج. تعيش على الساحل اللبناني.

## ٢٣٦٥١ - كزيبكة بيتايا

هي البياض الزراعي، اطلبه.

## ٢٣٦٥٢ - كزيبكة بنتاغون، كزيبكة خماسية

*Carica pentagona* (S).

نوع من الكريكة السبروتية الشائعة الزراعة. تجود وتثمر في معظم البلاد الحارة، لكها تحشى الصغيع ولا تحصل درجة الصغر اكثر من بقعة ايام. ساقها منتصبة نحلة حريالة تملو من ٣ الى ٤ امتار. اوراقها خاسية التفصيص، نصلها مالى البشرة على صفحتي، زانداها ثلاثي التفصيص. ثمارها مقطوعة القاعدة، مدبة الطرف، قشورها نحو ١٢ سم. طولها يراوح الى ٢٥ من ٣٠ سم. لبها حاشى اللذاق، ابيض اللون، مستحب العرف. ترب وتكول مطبوخة ومصورة.

## ٢٣٦٥٣ - كزيبكة صفراء البكتات

*Carica chrysopetala* (S).

نوع من الكريكة، مهادها البلاد الامريكية الجارة. ساقها اسطوانية منتصبة تملو من ٣ الى ٦ امتار. اوراقها مستطيلة الزناد الثلاثي الاضلع. نصلها خاسي التفصيص، متقارب التفريق، بحري اللون، مالى البشرة. ثمارها اعطليجية الشكل، مقطوعة القاعدة، ناعمة النعل، سباعية الفلوع تطول نحو ١٥ سم. لونها عند نضجها يراوح من الفسنى الى الاصفر المايق. لبها تالفة الطعم مستحب العرف يترك مطبوخاً.

## ٢٣٦٥٤ - كزيبكة متخاسية الزهرة،

## كزيبكة كزولوبا

*Carica cestriflora*, *Vasconcelia cestriflora* (S).

نوع من الكريكة، مهادها كزولوبا ورفانطة الجديدة. ساقها تملو من ٣ الى ٥ امتار. اوراقها سباعية التفصيص خلية الصفحة السفلى، غليظة الزناد. ثمارها صرية العرف، مستحبة اللذاق، تترك مع السكر. لبها اصفر اللون، بطيخي التركيب || تنكاث بالبلور. ترطب في الاربة الخفيفة العميقة الغور. تعيش وتثمر على الساحل اللبناني.

## ٢٣٦٥٥ - كزيم

*Dicholopus* (S). *Cariama* (F). جنس طير من طوار الساق، انواحه المعروفة قليلة الندم تجمع بين التفلق والرو. اخلاقها اخلاق القنق وبهي قربة اشبه منه. موطنها امريكا الجنوبية. اجسامها



كزيبكة

كزيبكة (١)  
(الورقة والزهرة)

كزيبكة (٢) (الورقة)

سفه مركب الخوص المتقابلة . كاقوره ايطي الارتكاز ، صغير القد ، يمشق من طلعة متدلية ، ثمار جوزية الشكل والقد ، يستخرج من جاراته لباب كالساغو متوسط الصنف .

٢٣٦٦٣ - **كربوتس**  
Créosote (F).  
Creasote, Creasotum, Creosote (E).

سائل معطر كاد عدم اللون فواح الرائحة يستخرج من قطران خشب الزان ، يستعمل في علاج مرض السل ولتسكين ألم الإنسان .

٢٣٦٦٤ - **كربوليلين**  
Caryophyllane (F).  
Caryophyllin (E).  
هيدروكربون سائل يستخلص من حطر القرقريل والدارسني والكنية . نقله النسبي عند ١٥° مع ٠,٩٠٨٥ ، ويقل عند ٢٦٠/٢٥٨ مع .

٢٣٦٦٥ - **كربوكار**  
Caryocar  
جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الكريوكاريات . انواعه المعروفة ثمانية منها البرية والزراعية والتربينية . سوقها منتصبة ، رفيعة ، فروعها . اوراقها متقابلة ، ثمارها جوزية الشكل ، بعضها مأكول والبعض الآخر دهنى الالبوب يستخرج منه دهن نباتي يستعمل استهلاك السن او الزبدة || اشهر انواعه الكريوكار السني والخسفي .

٢٣٦٦٦ - **كربوكار عسفي**  
Caryocar nucifera (F).

نوع من الكريوكار ، شجرة زراعية وتربينية منها امريكية الجنوبية وتعيش في المناطق المعتدلة الحارة . ساقها فروعها . اوراقها متقابلة . انوعها ارجوانية سوداء المواج يطبقها حنار احمر زاهي ، اسديتها عديدة مستطيلة ذغية اللون . ثمارها عسفية اي جوزية مأكولة الصلح .

٢٣٦٦٧ - **كربوكار سسفي**  
Caryocar butyracé (F).

نوع من الكريوكار ، شجرة زراعية يستخرج من البوب ثمارها الجوزية مادة دهنية دسمة شائعة الاستعمال كسمن نباتي .

٢٣٦٦٨ - **كربوكاريات**  
Caryocaraceae (S).  
Caryocaracées (F). Caryocaraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ، اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، منها معظم اصناف امريكية الحارة والاستوائية . نباتاتها اشجار وشجيرات مستنصبة القالب ، اوراقها متقابلة . ثمارها جوزية الشكل والقشور ، مأكولة الالبوب الوافر المادة الدهنية || اشهر اجناسها الكريوكار ،

٢٣٦٦٩ - **كربوليز**  
Caryolysae (F). Karyolysis (E).  
الكربوليز انحلال نواة الخلية او الخلية .

٢٣٦٧٠ - **كزاز ، كزاز ، ليتانوس ، تيتانوس شوهار ، تسلس**  
Tétanos (F). Tetanus (E).  
مرض خبيث خطر تقتضيه منه العضلات وتشنج . مبيه تسم المراكز النساغية بتأثير ميكروب خاص يدعى قسيمة نيكلولايف تدخل الجسم عن طريق الجرح .

٢٣٦٧١ - **كزب**  
Nothoscordon (S).  
Nothoscorde (F).  
جنس نباتات بصلية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعه

واعتاقها مستطيلة ، وروثها كثيرة متوجة الجباب بكثرة من الزئبق المنتصب الفروق . متابعها قوية مذبة الملائط الحدية الحادة . اجنتها مزيلة . سيقانها وارسانها رفيعة . غلافها غالب الجوارح || اعرف انواعها واشهرها الكرم المتوج .

٢٣٦٥٦ - **كربم متوج** \* ، **تلتلق الاناعي**  
Dicholopus cristatus (S). Carliama huppé, Cigogne des serpents (F).

طائر من الكرم ، كبير القد ، طوله نحو ٨٥ سم . ثوبه الى الكمية ، كل ريشة من جسمه ملوفا خطوط دقيقة متعرجة شهاد اللون زاهية . ريش رأسه وصقته الى الوردية السراة المراج . افيكه ابيض الاطراف . حلقه عينه كبريتية الصفار . زقده ازرق . منقاده ورسده حر || موطنه امريكية الجنوبية . يأنف الحصاب الذلفة والمواق الكثرة الحطب الرفيع . قوته الخمرات والنظام والاناعي ويختلف انواع اللأر والجفزان || يمشق في الاشجار القليلة الارتفاع . حشه مزيج من التفصيل والحشائش المنسوبة بالطن . انتاه تضع بيضتان تحضبا نحو ثلاثة اسابيع || يأنف حياة الاسر ويعيش بسهولة مع سائر الطيور الدواجن .

٢٣٦٥٧ - **كربمة**  
Cordmia (F).

٢٣٦٥٨ - **كربتس ، كربتس**  
Coryanthes (S).  
Coryanthe (F). Helmet orchid (E). Helmbilume (D). Coriantio (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة السحليات . انواعه عديدة منها البرية والزراعية والتربينية . اعطائها المناطق الاستوائية اصعبها الامريكية . اوراقها لحمية . ازهارها جميلة الشكل كرمة الرائحة .

٢٣٦٥٩ - **كربوة** \*  
Oosphère (F). Oosphere (E).  
البويضة النباتية الانثوية الى ان تمتد بالدكرة تصبح النواة . راجع خلية .

٢٣٦٦٠ - **كربوة** \* ، **تخللة الجوز**  
Caryota (S). Caryote (F).

جنس نخل منته يمتد من المند الى الكونفشن وجزر الزايج . انواعه المعروفة تسعة اشهرها الكريوتة المنقودة وكريوتة مسطلة والششاع . جلدها منتصبة السوق المسترسفة الجند . جريدها مستطيل القد ، غليظ الكرب . سمها ثنائي التركيب متقابل الخوص للانقياسي الشكل ، كاقورها مستطيل النتح صغير القد . ازهارها وحيدة المسكن في طلعة واحدة .

٢٣٦٦١ - **كربوة مسطلة**  
Caryota rumphiana, Saguaster major (S). Caryote des Célèbes (F).

نوع من نخل الكريوتة مهدد جزر الزايج . جلده منتصب الساق يعلو من ١٢ الى ١٥ م . سفه مركب الخوص يطل من ٥ الى ٦ امتار . ثماره جوزية الشكل ، صغيرة القد ، حاضرة اللحم ، حريفة . يزود لاستخراج جازه ولاستعمال جلده الصلب .

٢٣٦٦٢ - **كربوة عشقودية**  
Caryota sobollifera (S). Caryota sobollifera (F). Fish-tail palm, Sago palm (E). Nusspalme, Brannpalme (D). Palma cariota (I).

نوع من نخل الكريوتة . مهدد حصاب ويرتفعات ملقة ومليز به . جلده منتصب الساق يعلو من ٨ الى ١٢ م .



كربم متوج



كربوة

## ٢٣٦٧٨ - كزبرة مزروعة \* ، نقدك

*Coriandrum maculatum* (S), *Coriandre cultivée* (F), *Coriander* (E), *Echter Koriander* (D), *Coriandro*, *Erba cimicina* (I).

نوع من الكزبرة وهو نبات عشبي، يزرع لأتاره الطبية والمستعملة كأفاديه . ساقه دقيقة فراء ، أوراقه متعاقبة مركبة ، وريقاته مفردة ، غليظة النسيج . أزهاره خفية التجميع ، صغيرة القد ، وردية اللون ، حاجية الملاج . ثماره من كزبرة الرائحة المسببة ليل جفافها تصبح بعد الجفاف ذكية الرائحة المسببة المر .



كزبرة البير

Fruits du tamaris (F).

Fruits of the tamarisk (E).

هو ثمر الطوقاء . يقال أنه طيب نقيه يقي الصدر والأعماه .

## ٢٣٦٧٩ - كزمالك

*Cisticola* (S).

*Cisticola* (F), Fan-tailed-warbler (E).

نفسه هو الاسم للمصري . جنس طير من فصيلة الدفليات أنواعه المعروفة ٢٠ أصلها من العالم القديم . جميعها صغيرة القد ، أنوبها إلى الطحلة السمراء ، ظهورها وأجنحتها مجمعة بالأسود . قوائمها بيض الأطراف أو رادية . نحوها يبيض . جوارثها ونحوها إلى الشفرة . مناتيرها وسبقها إلى السرة || تألف المنافع والمرامي والحقول المزروعة . قوتها الحوام والذباب والاسراع الصغيرة . تدن في الأدغال وفي الأشجار التي تملو سطح التربة أو الماء من ١٠ إلى ١٢ سم . حشها جراب يرمي الشكل . تحفن من مرتين إلى ثلاث مرات في السنة . حشفتها تراوح من ٤ إلى ٦ بيضات لونها إلى الأبيض الأغبر تعلو ماجة وردية أو زرقاء اللون .



كزبرة البير الجبلية

## ٢٣٦٨١ - كزوان مبدل \* ، فسكة

*Cisticola schachalia* (S), *Cisticola ordinaria* (F).

فسكة هو الاسم اللبناني . طائر من الكزوان ، صغير القد ، طولها تراوح من ١٠ إلى ١١ سم . قويه يختلف عن ثوب جنسه بالتشبه الاسود الذي يملأ أوساد ريش الظهر فقط . أصانته حوض البحر المتوسط . يألف المنافع وصفاف الأثمار والمرامي والحقول المزروعة أخصها حقل القمح والذرة الصفراء || الآن تحفن ثلاث مرات في العام الواحد . حشفتها أربع بيضات .



كزبرة مزروعة

Pupe (F), Pupa (E).

حفرها الحشرات من ذوات الجنائين وهي كالفنادة للحرشيات والحورية للنفديات .

## ٢٣٦٨٢ - كزود

Casuar. (F).

هو الشبم \* من الرواكس ، اطله .

## ٢٣٦٨١ - كزورينة بيهية

*Casuarina torulosa* (S), *Casuarine torulose*, *Filao toruleux* (F).

نوع من الكزورينة ساقها تعلو من ٢٠ إلى ٢٥ م . تقشرها غليظة صلبة كقشور البش . غرابها دقيقة . فسكتها تجمع من ٣ إلى ٥ بانق أسطوانية المجرم . خلية البشرة . أكرانها خلية الجرامات الناشئة || تربى كزفاتها ، في الأثرية الخفيفة الرطبة الساحلية وقد لا تتأذى من القمل العابر .



كزوان مبدل

قليلة منبتها شريط وهضاب حوض البحر المتوسط . يصلها صخير القد مستطيل . أرواقها قرصية الانتساب ؛ تصلها مستطيل الصفحة الغضبية المستوية . غرابها الزهري يملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم . يلتقي بصيوان من الزهر الأبيض الموشع بالوردي || أزهاره ينسمر من نيسان إلى حزيران .

## ٢٣٦٧٢ - كزبرة \* ، كزبرة \* ، كسبرة

*Coriandrum* (S), *Coriandre* (F), *Coriander* (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة الخيميات . أنواعها ١٠ منبتها حوض البحر المتوسط . جميعها طيبة تستعمل في عدة تركيب وعلاجات . وهي هاضمة ، مقوية ، مضادة للصداع والتشنج تنفع من ضغط الدم وتصلب الشرايين ، تمنع الملش والنفقان وتحمس البخار من الرأس . ويقال أن قليها مع الساق يفيد الزطاري . صوفها دقيقة فراء . أرواقها مركبة متعاقبة ، أزهارها صغيرة القد ، خفية التجميع || أشهر أنواعها الكزبرة للمرونة المزروعة .

## ٢٣٦٧٣ - كزبرة البير \* ، شعر الحين \* ، شعر

القول ، شعر الأرض ، وصيف ، برشاوشان

*Adiantum capillus veneris* (S), *Adiante capillaire*, *Cheveux de Vénus*, *Capillaire* (F), *Maidenhair*, *Venus's hair*, *Capillaire* (E), *Capillarkraut*, *Frauenhaar*, *Venushaar* (D), *Adianto*, *Capel-veneris*, *Capoveneris* (I).

نبات عشبي بري جذموري معمر من الراسخ البسيبيات . يكثر في المواطن الرطبة الظليلة . يقال أن منافعها الطبية عديدة أما الحقن منها هو أنه مرقق قابض . يراود يقوي الشعر ويطلو || أرواقه تعلو من ٣٠ إلى ٤٥ سم . زنادها أسود اللون ثنائي الانتساب وكل شعبة منه تحمل أربعة فروع لأشاجير الطول ، مروحية الترتيب ، كلوية الأوراق المتشعبة الأطراف .

## ٢٣٦٧٤ - كزبرة البير الجبلية \*

*Polytrichum commune* (S), *Polytrichum commune*, *Capillaire doré* (F), *Bear moss*, *Golden maiden hair* (E), *Echter Widerton* (D), *Politricon* (I).

نبات عشبي بري معمر من الطحالب يكثر في الأماكن الرطبة الظليلة . ساقه أسطوانية دقيقة متعصبة . أرواقه هدية متراكبة جذعية الارتكاز . ثمرته جراب يبغي هالي يكمل الساق || وهو من النباتات الصحية يستعمل استعمال آشاي لكنه يثقل على النوم .

## ٢٣٦٧٥ - كزبرة البير المكسيكية

*Adiantum tenerum* (S), *Capillaire du Mexique* (F), *Brittle maiden hair* (E), *Capillär Kraut* (D), *Capel-veneris de Messico* (I).

نوع من كزبرة البير وهو نبات عشبي طيب بري معمر . ينبت في المواطن الرطبة في ظل الصخور والأشجار . يقال أنه ينفع الأمراض الصدرية وضيق النفس . يستنصر منه شراب يستعمل ضد السعال .

## ٢٣٦٧٦ - كزبرة التعلب

*Pimprenelle sanguisorbe* (F).

هي البلان الهجام ، اطله .

## ٢٣٦٧٧ - كزبرة الحيشة

*Pigamon jaune* (F).

هي التليب الاصفر ، اطله .

## ٢٣٦٨ - كزورينة كنيانية \*

*Casuarina equisetifolia* (S). *Casuarine à feuilles de préle, Filao à feuilles de préle* (F). *Beef-wood tree, She-oak, Swamp-oak* (E). *Kasuarbaum* (D). *Casuarina* (I).

نوع من الكزورينة ساقها منتصبه تملو من ٣٠ إلى ٤٥ م. بناتها دقيقة متدلية وباعية التضلع. غلف مقعده مالمه البثرة وباعية التسنين. منبها البلاد الحارة. تزرع لصد الرياح ولتجاس. ترغب في الأثرية الساحلية الرطبة وتيجور قرب الشطوط البحرية.

## ٢٣٦٩ - كزورينة منتصبه

*Casuarina stricta* (S). *Casuarine dressée, Filao dressé* (F).

نوع من الكزورينة. ساقها وأغصانها منتصبه تملو من ٩ إلى ١٥ أمتار. غراصيبها غليظة، صمها تجمس من ١٠ إلى ١٢ بليفة. بناتها منتصبه غمده. غلف مقعده سداسية التسنين والتخديد || تألف المناطق الساحلية الرطبة الدافئة.



كزورينة كنيانية

**٢٣٦٨٧ - كزورينيات**  
*Casuarinaceae* (S). *Casuarinacées* (F).

فصيلة نباتية وسيدة الجنس من ذوات الفلقين. أنواعها نحو ٢٠ جميعها أشجار منتصبه سريعة النمو عادمة الأوراق. ترغب في المواقف الرطبة انحصا الشطوط البحرية. غراصيبها وبناتها أسطوانية الشكل والترتيب والانتظام. ازهارها الأزكري قدي التجميع، تستطيل الحجم، أسطوانية الشكل، زهرته وسيدة السداة. ازهارها الانثوي قدي التجميع، قصير الحجم، كتيث الازهار، زهرته وسيدة المبيض والقلم القصير، ثنائية السمة الخيطية المستطيلة. ثمارها أكواز صغيرة رنية الشكل.

## ٢٣٦٨٨ - كزوريموس

*Xeromys* (S). *Xéromys* (F).  
جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة الفأريات. أنواعها قليلة موطنها بعض جزر المحيط الهادي. أجسامها مسطيلة. طرفها الكامل يراوح من ٣٠ إلى ٤٠ سم. رؤوسها ذلقة. أذنانها كبيرة. جرائرها قصيرة. أصابعها خالية. أطرافها حادة || تألف الادغال والمقول. قوتها المواد النباتية على اختلاف مصادرها والحشرات والديدان.

## ٢٣٦٨٩ - كستالي

*Pareseux* (F).  
هي البساتين، أطيبها.

**٢٣٦٩٠ - كُشب**  
*Tourteau* (F). *Cake, Oilcake* (E).  
ما يبقى من ثفل بعد عصر البزور البدينة كالقطن والسهم والفتق السوداني والكتان الخ... منظم يستعمل كغلف للثياب. راجع جدول الغلف.

## ٢٣٦٩١ - كُسترة

هي الكزيرة، أطيبها.

## ٢٣٦٩٢ - كستناء، كستناء، أبوقرورة، قسطلة

*Châtaigne* (F). *Chestnut* (E).  
ثمرة الكستنة أو القسطل أو الشاحيلوط وهي مأكولة مدنية، لهايا يحوي نحو ٣٠ ٪ من الفيتامين «ث» ونحو ٩٠ وسدة من الفيتامين «ب» ولعروة عناصرها الغذائية راجع كستنة مبدولة.

**٢٣٦٩٣ - كستناء**  
*Castanea* (S). *Châtaigner* (F). *Chestnut-tree* (E). *Kastanie* (D). *Castagno* (I).  
جنس أشجار حرجية وزراعية من فصيلة السمليات.



كستنة مبدولة

أنواعه المعروفة ١٥ أقلها البلاد المعتدلة الحارة. تنميز بفضاحتها سوقها وأمتطالة أعمارها التي تبلغ بفسمة قرون. أغصانها داحجة. أوراقها عابلة، متعالية، معتمة، بسيطة. نصلها نافرة العروق المتوازية، منشارية الحافة. أزهارها وحيدة المسكن. ازهارها قدي التجميع، شباره مستطيلة منتصبه، كثيرة الازهار الذكورية المتنامية، قليلة الانثوية السفلية الارتكاز، والفردية أو الثنائية أو الثلاثية التجميع التي تكنتها بعد التفتح والأصحاب قلاية كثيفة الشوك البقيق تخضن الثمرة أو الثآر || ثمارها مأكولة اللب الباب النشوي الماد.

## ٢٣٦٩٤ - كستناء أمريكية

*Castanea dentata* (S). *Châtaigner d'Amérique* (F).  
نوع من الكستنة الحرجية والزراعية البريوتية. مهدا لورسكة الثنائية. تملو من ٢٥ إلى ٣٠ م. ساقها غليظة. أوراقها تطول من ١٢ إلى ١٤ سم. وتعرض من ٤ إلى ٦ سم. نصلها منشاري الحافة، الملمط الصفعة العليا، أزغب النفل على غملها يعرضها || ثمارها صغيرة اللد مأكولة.

**٢٣٦٩٥ - كستناء حمرارة**  
*Pavie* (F).  
هي القسطل الهندي، أطيبه.

**٢٣٦٩٦ - كستناء صينية**  
*Castanea duclouxii* (S). *Châtaigner de Ducloux, C. de Chine* (F).

نوع من الكستنة الحرجية والزراعية مهدا الصين. تملو من ١٥ إلى ٢٠ م. ساقها غليظة متوسطة الضخامة. أغصانها فاشرة. أوراقها متباعدة التسنين المتشاري المهذب؛ نصلها شمع الصفعة، قليل العروق الناعرة، الملمط البشرة على صفحتيه || ثمارها صغيرة مسططة مأكولة.

## ٢٣٦٩٧ - كستناء مبدولة، قسطل، قسطل، شاحيلوط، أبوقرورة

*Castanea vulgaris, C. sativa* (S). *Châtaigner commun, Marronnier* (F). *Sweet chestnut* (E). *Echte Kastanie, Kastanienbaum* (D). *Castagno domestico* (I).

نوع من الكستنة الحرجية والزراعية المبدولة. ضرورها كثيرة العدد، منبها الشرق الاوسط وأروبة الجنوبية والغربية. شجرها تملو من ٢٥ إلى ٣٠ م. ساقها ضخمة عظيمة أغصانها غليظة قائمة. فروعها جاسلة، قتيها قارضة. أوراقها أطيحية مسنة الحافة تطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. وتعرض من ٧ إلى ٩ سم. نصلها قلبية القاعدة. ذرب الطرف. بارز العروق المتساوية الابداد، لونه أل الحصار الاصفر. أعصابها صناعية تفوق السنديان صنفًا وصلابة وطعنانًا. ثمارها مأكولة غذائية. قشورها كستنية اللون لامة الصفعة الخارجية خلية الداخلية لهايا أل البياض النبي. تحليلها الكيماوي يفيد أن ١٠٠ غرام من لباب الكستنة المسلوقة بالماء يحوي ٢٧,٧٦ ٪ من الوحدات الغذائية المبهضة، تميزها:

١,٥٦ ٪ مواد ازوتية

١,٧٢ ٪ مواد دهنية

٢٤,٤٨ ٪ مواد هيدروكربونية

وأن ١٠٠ غرام من لباب الكستنة المشوية يحوي ٥٦,٤٥ ٪ من الوحدات الغذائية، تميزها:

٣,٤٩ ٪ مواد ازوتية

٢,٢٥ ٪ مواد دهنية

٤٩,٦٦ ٪ مواد هيدروكربونية

وان ١٠٠ غرام من دقيق لباب الكستنة الخفيف المسحوق يحوي ٨٨,٩٩ ٪ من الرطوبات الغذائية، تتركبها :  
٧,٥١ ٪ مواد دهنية  
٥,٦١ ٪ مواد دهنية  
٧٥,٨٧ ٪ مواد هيدروكربونية

Fraction كسر الددد ج. كسور وكسورات .  
٢٣٧٠٦ - كَسِير

Pampille كَسْمَة  
الريش الأبيض المجمع تحت ذنب الطائر .  
٢٣٧٠٨ - كَسْمَرَة الحِمْدَوِي هي الشامترج ، الحلبه .

٢٣٧٠٩ - كَسِكَال \*  
Quisqualis (S). Quisqualis (F). Creeper (E). Sonderling (D). Quisqualis (I).  
جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة الإطليجيات .  
أنواعها أربعة أصنافها بعض المناطق الحارة الاسيوية  
والأفريقية . جميعها شجيرات عارية تطلو من مرتين إلى  
عشرة أمتار ، أوراقها متقنة متقابلة أطليجية . أزهارها  
مستديرة التجميع طرفي الارتكاز . أزهارها جميلة الشكل  
مستطيلة الأتانيب يكثر فيها الأبيض والأحمر والوردي .  
يزودها طليعة طاردة للدد .

Couscous (F). كَسْكُوس  
الكسكوس حيوان لين من الجرابيات الشاجرات يدعى  
كَسْتَنَجَر ، الحلبه .  
٢٣٧١١ - كَسْكُوك \* ، كَسْكُوك \*  
Cassidulus (S). Cassicle (F). Cassidulus (E).  
جنس طير من فصيلة الكاروبيات . أنواعه المعروفة عشرة  
جميعها من طيور اسريكة الوسطى والجنوبية . تألف  
الغابات ولا تقترب من الأماكن الأظنة . نظامها الغذائي  
جامعي . فوجها يد من ٢٥ إلى ٥٠ زوجاً || أجسامها  
محمقة تطلو من ٤٥ إلى ٥٥ سم . مناقبها مخروطية ذرية .  
رؤوسها متوسعة يقتنازع قنصب في الجاه وليس في قم  
مستديرة الأطراف . أنوفها تختلف مع الأنواع إما يكثر  
فيها الاسود الخلف الماجات || قوتها الحشرات على اختلاف  
فضائلها والثمار والحبوب || أعرف أنواعها واشهرها كسكول  
المكسيك .

٢٣٧١٢ - كَسْكُوك المكسيك \*  
Cassidulus melanictus (S).  
Cassicle du Mexique (F).  
نوع من الكسكول . يكثر بجموده في المكسيك . يألف  
الغابات . منطهه الحياتي جامعي . فوجه يد من ٢٥ إلى  
٣٥ زوجاً || جسمه أبيض الشكل يطول نحو ٤٥ سم .  
ثوبه إلى السواد اللامع يملو مزاج أخضر . تنوعته بحورية  
القرن . هامش جناحه إلى السرة . سقاده إلى السرة  
الزيتية . قائمته وغالبه إلى السرة القاعمة || قوته الحشرات  
على اختلاف فضائلها وأنواعها والثمار والحبوب والبلور ||  
يدفن عشه في الأشجار الكبيرة الدائجة لان الفوج يكمله  
يدفن في ذات الشجرة . الاثنى تحضن وسعدها من يبيضن  
إلى ثلاث يبيضات بينا الاثنى يئتن لها الغذاء .

٢٣٧١٣ - كَسِير \*  
Excaecaria (S). Excaecaria (F).  
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية تربينية من فصيلة

التي لها البلاد الجيلة المعتدلة الحرارة . وهي ترقب في  
الآرتية الخفيفة المبيقة الفور المشبعة بالعصر الربلي .  
وقد تنمو وتغضب في الآرتية الطليعية المتوسطة الاندماج  
لكنها لا تنمر كثيراً فيها . وهي تخشى الآرتية الكتلبي  
لان الكتلبي لا يوافق مزاجها الجسموري || تنكأثر  
بالبرد وقد تزور البذور اما في مستقرها مباشرة أو في  
الشتل إلى ان يبلغ ارتفاع النصب نحو ٢٠٠ سم . وقد  
يكون ذلك بعد البذر بستين فتفتل اذ ذلك إلى مستقرها .

٢٣٦٩٨ - كَسْتَنَة هِنْدِيَّة  
الكستنة الهندية وأبو قرقه الحصان وقسطل القرس ،  
ثلاثة أسماء لشجرة واحدة تعرف بالقندلي ، الحلبه .

٢٣٦٩٩ - كَسْتَنَة يَابَانِيَّة  
Castanea crenata (S). Châtaignier du Japon (F).  
نوع من الكستنة الحرجية والزراعية . مهدا اليابان . تملو  
من ١٥ إلى ١٥ م . ساقها غليظة متوسطة الضخامة .  
أغصانها قائمة . أوراقها صغيرة القند || نصلها مرتفع  
الجانب كثير الدروق الناشئة الأطراف ، لونه إلى الخضرة  
الصفرى تملوها لمة صفراء || ثمارها متوسطة القند مأكولة .

٢٣٧٠٠ - كَسْتُونَة \*  
Xestobium (S). Xestobie, Vrillette (F).  
جنس حشرات صغيرة من فصيلة الغفريات . أنواعه قليلة  
العدد . رقاتها مؤذية تنخر الخشب وتعلبه . أعرفها وأهمها  
كستونة الخشب .

٢٣٧٠١ - كَسْتُونَة الخشب \* ، غِفْرِية  
الخشب  
Xestobium rufovillosum, X. tessellatum (S). Xestobie brunâtre, Vrillette opiniâtre, Horloge de la mort, Vrillette damier (F). Death watch (E). Bunzwürflicher Nagekäfer (D).  
نوع من الكستونة طويلاً براوح من ٦ إلى ٩ م . فوجها  
سنتي . نمشة كسلها وظهورها صفراء اللون || رقاتها  
مؤذية تنخر معطر أنواع الخشب اليابس والمصنوع أن في  
الطبيعة أو ضمن المنازل والمخازن .

٢٣٧٠٢ - كَسْتُور  
Castor (F).  
هو الحارود ، الحلبه .

٢٣٧٠٣ - كَسْتُورَة  
Porte-musc (F).  
هي أبيل المسك ، الحلبه .

٢٣٧٠٤ - كَسْج \*  
Ravalement (F). Trimming (E).  
قطع فروع الشجرة بنية تجديد شياها .

٢٣٧٠٥ - كَسْدُولَة \*  
Cassidula (S). Cassidule (F). Cassidula (E).  
جنس حيوانات من الرخويات مديات الاربل وضفيلة  
الحضبيات . أنواعها المعاصرة المعروفة متوسطة العدد  
أعطائها الهند ، بعضها قازيب يعيش في المناطق التي تكثر  
فيها أحراج الثوري ، وبعضها بحري يعيش في رمال



كستونة الحلب



كسكول



كسكال



كسكول المكسيك

الزيتية الطبية النافعة، وريقاتها حشوية الشكل والتركيب، متتابعة الارتكاز، تبينة اللون. أزهارها هامة، سبيلية التجميع، قصيرة السبلة، يضاء اللون أو وردية || جميع أنواعها طفيلية، وحوالها جلود الصنوبر والسرو والمائل والسديان.

**٢٣٧٢٢ - كَسِيدِيَّات**  
**Monotropaceae (S).**  
**Monotropacées (F).**  
 فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القنابات، أجناسها ٤ وأنواعها ٢٠ منها البلاد المعتدلة المنشرة نحو الحارة، معظمها طفيلي يعيش على جلود الصنوبريات والسليوليات، جميعها عشية. سوقها فردية الالتشاب عادمة الفروع، وريقاتها حشوية النصل، أزهارها سبيلية هامة.

**٢٣٧٢٣ - كَسُوف**  
**Eclipse**  
 ظاهرة طبيعية تتميز باحتجاب ضوء الشمس عن الأرض وقد تحدث عندما يتوسط القمر بين الأرض وقمر الشمس. ولا يحدث الكسوف إلا إذا كان القمر في المحاق وقد يكون كلياً أو جزئياً، فالكل يَكُونُ عند احتجاب كامل قرص الشمس من البصر والجزئي يَكُونُ عند احتجاب بعض قرص الشمس.

**٢٣٧٢٤ - كَسِيَّة ٥ ، بَلْدُور ٥**  
**Polder (F)**  
**Polder (E).**  
 اسم يطلق على الأراضي المنخفضة الممتدة من سواحل بلجيكية إلى هولندية وبولندية وقد صار استعمالها بعد تخصيصها بالمواجز وعزلها عن مساوي مياه البحر.

**٢٣٧٢٥ - كَسِيدُ أَخْضَر ٥ ، كَسِيدُ الْحُرْشُف ٥**  
**Cassida deflorata, C. viridis (S).**  
**Casside de l'artichaut, C. vorte (F).**  
**Tortoise beetle (E).**  
**Artichokenschildkäfer, Grüner schildkäfer (D).**  
 حشرة صغيرة القد من فصيلة النشاريات، جسمها يضيء الشكل مقطع، طولها يراوح من ٧ إلى ٨ سم. ثوبها أخضر اللون أسف المزاج، مدنها أسود، لها جيلان في الحول. ريقاتها مستقيمة مستطيلة القرون الشرجية المنمكة على الظهر. تركيب هي وريقاتها أوراق الارضي شوكي وجميع أنواع الحُرشف تنتمتع بالبشرة وتمشي على خلايا النسيج.

**٢٣٧٢٦ - كَسِيدُ الشُّوْكَار ٥**  
**Cassida nebulosa (S).**  
**Casside nébuleuse, C. de la betterave (F).**  
**Clouded tortoise beetle (E).**  
**Nebiliger schildkäfer (D).**  
 حشرة صغيرة مبطن من فصيلة النشاريات طولها يراوح من ٥ إلى ٧ سم. ثوبها إلى الصفرة الخطية الباهتة، غمداتها متقاطن بالأسمر والأسود، لها جيلان في الحول وهي تركيب مع ريقاتها أوراق الشوندر فتتخرها وتمشي عليها.

**٢٣٧٢٧ - كَسِيدُ نَبِيل ٥ ، كَسِيدُ السَّرْمَقِيَّات**  
**Cassida nobilis (S).**  
**Casside noble, C. des saisoalocées (F).**  
**Cassida nobilis (E).**

نوع من الكسيد، حشرة خاضعة مؤذية، موطنها يمتد من الشرق الأوسط إلى أروية وأفريقية الشمالية. تألف المزارع التي تكثر فيها السرمقيات، تخافها وريقاتها تمشي على نصال الأوراق || جسمها صغير القد، يضيء اللون، غمدودب الصفحة العليا، يطلون من ٦ إلى ٧ سم. ثوبها الملوي إلى الأخضر الأصفر يملوه في منطقة درز الظهران

الفريزياتيات، أنواعها المعروفة نحو ١٢٠ منها المناطق الاستوائية الآسيوية والأمريكية || سوقها مالة بحرية اللون، أوراقها متعاقبة منعقة، نصالها يرمية الشوزن. أزهارها سنبل التجميع || يستخرج من لحائها بالخز عصارة لينة يختلف تركيبها ويغفلها مع اختلاف الأنواع، منها يبيع البشرة وتؤذي البين إن أصابها ومنها طرية تنقي الدم والإعلاط ومنها المضافة لدهاء السفلس ومنها الصناعية التي يستخرج من ثمارها مادة دهنية يضاء اللون شائعة الاستعمال المنزلي || أشهر أنواعها الخمسة التالية :

**كسيدر الدهن**  
**Ex. sebifera (S).**  
**كسيدر حرجي**  
**Ex. sylvatica (S).**  
**كسيدر شالك**  
**Ex. spinosa (S).**  
**كسيدر فتوي**  
**Ex. hibernica (S).**  
**كسيدر يغشي البصر**  
**Ex. agallocha (S).**

**٢٣٧٢٨ - كَسْطَان**  
**Bradype, Al, Paresseux (F).**  
 هو الداب، اطلبه.

**٢٣٧٢٥ - كَسَم**  
**Habitus (F).**  
 هو الامدود والطلالة، اطلبه.

**٢٣٧٢٦ - كَسْمُورِيَّة ٥**  
**Cosmologie (F).**  
**Cosmology (E).**  
 الكسولوجية علم قواميس العالم عامة أي فلسفة معقولات العالم المجردة.

**٢٣٧٢٧ - كَسْتُورِيَّا ٥ ، صَفَرَاءُ الْقُرُون**  
**Xanthorrhiza (F).**  
 جنس جنبات برية وزيينية من فصيلة الشقيقيات، أنواعها قليلة. سوقها فرماة تملو من ٧٠ إلى ٢٥٠ سم. أوراقها زنادية، متضامة، مركبة، ثلاثية أو خاسية الوويقات المفردة الصفراء المروق. أزهارها عنقودية التجميع، أبطى الارتكاز، صغيرة القد، تبينة اللون، خاسية البتلات الصغيرة السنائية الشكل || أزهارها يستمر طوال فصل الصيف.

**٢٣٧٢٨ - كَسْتُوسِيَّار ٥ ، صَفَرَاءُ الْقُرُون**  
**Xanthocera (S).**  
**Xanthocère (F).**  
 جنس اشجار وشجيرات برية وزيينية من فصيلة السبنديات، مدها الصين، تتميز بالذرة قرنية الشكل مفرعة الرحين تتوسط بتلات الزهر. أنواعها المعروفة قليلة العدد. سوقها تملو من ٢ إلى ٨ امتار. أوراقها عابلة متعاقبة ورية التركيب، أزهارها عنقودية التجميع. أزهارها متراكبة الألوان، كبيرة القد، نظامية، خاسية الفصص والبتلات، ثمانية الامدية. ثمارها تفاحية الشكل واللذد غير مأكولة.

**٢٣٧٢٩ - كَسْتَج**  
 جنس من الكماء ينبت في الرمال للذيد جداً (السان).

**٢٣٧٢٠ - كَسُو هو الشار، اطلبه.**  
**Cousso**

**٢٣٧٢١ - كَسُوب ٥**  
**Monotropia (S).**  
**Monotrope (F).**  
**Ice plant, Indian pipe (E).**  
**Fichtenspargel, Monotropa (D).**  
**Monotropia, Erba da cera (I).**  
 جنس نباتات عشبية برية طفيلية من فصيلة الكسوبيات، منها البلاد المعتدلة الحارة. أنواعها نحو ٨ سوقها فردية لينة، لها مداع، مصارتها عادمة اللون تجحف بعض المواد



كستوريزا



كسوب



كسيد اخضر



كسيد الشوندر



كسيد نبل

أنواع المعرفة صبة مؤهلها بعض مناطق استراليا. تألف  
المراجع والبراري. ملجها الحياتي جاي. فوجها ينف من  
١٠ ٢٠ زوسا. اجسامها متوسطة الحجم. قريبة  
للبه الصرد وريالزغ. تاتيها كيرة كبيرة. ائوها  
بالمرءة افاقمة تبقيها ائها. قوتها الحشرات  
الارزغ والنفاء والفران والصابير الصغيرة. طباعها شرمة  
كافسدة. تميز باليسارة والشرارة ونها مداتها انها تسند  
لنفسها في ائوها الايجار لتصد نها حيتا عليها ها  
اعرف انماهم واشهرها السكسان الحرب.

٢٣٧٢٢ - كَيْسِيكَانَ مُخَرَّبٌ ٥٠

Prætorius torquatus (S). Cassican destructeur (F).  
 نوع من الأراجيح. موطنه شمالي أستراليا. فوجيه يحد  
 جسمه عشرة أضعاف. يألّف الاندساس والحراج البمشرة  
 الأصغار. يعتبر ائمرس أنواع الكساجين وانهمها له  
 جسمه معتدل الحجم يطول نحو ٢٧ سم. رأسه مستطيف  
 الشكل. منقاده قوي وضعيف. ذنبه متوسط الطول ،  
 مقسم الطرف ، مستدير الزاوية. الفصيح ابيض اللون ،  
 عظمه وطوره وجناحاه وذنبه الى السواد الغني ،  
 وصدره وانبيكه الى البياض الاخر. قوائم له الى السرعة  
 القامة له. يدئث عنه في الاجبار بقوة. الاثنى  
 من الى و يضاهي بينا الذرة. له النذلة.



كسيك قنبراني

## ۲۳۷۲۳ - کیلوز

Xylose (F).      ۲۳۷۲۳ = كسيلوز  
هو الخشوز ، اطله .

۲۳۷۲۴ - کتب و کتب

٢٣٧٤ = كسيوية  
Cassiope (S). Cassiopeia (E).  
نبات معقد التعريف على اسم الملكة الخرافية كسيو.  
جنس نباتات شجيرة معمر من فصيلة الخليلجيات. أنواعها  
المعروفة قليلة العدد جميعها من ثبوت البلاد الحارة ||  
قصيرة فروع تحمل من ١٥ إلى ٢٥ سم. أوراقها أبدية،  
صغيرة، سنانية اتصال الجاندة الخلفية الزشراء. أزهارها  
قروية، ومتعددة، وحبليجة الشكل، بيضاء اللون وأزرق  
أو توتريها يستمر من نيسان إلى تموز.

٢٣٧٢٥ - كُتُوبَة ٥

الكبيرة مجموعة الاعضاء الثانوية كالزغب والشوك والمناعين التي تلتحف قشور النبات او جلود الحيوانات وذبالها.

## ۲۳۷۴۶ - کٹہر

Androcée (F). ٢٣٧٣٦ - كُش  
هو جهاز التذكير في النبات ، راجع جش.

٢٣٧٢٧ - كُتَاة

Défaut apparent (F).	كُشَاةٌ - ٢٣٧٣٧
Visible default (E).	هو العيب الظاهر .

۲۳۷۳۸ - کشاح

٢٣٧٢٨ - كِشاح  
Empreinte du fer rouge (F).  
سمة بالنار في موضع الكشاح وقد تطلق على كل سمة بالنار  
في أي موضع كان من الجسم .

۲۳۷۳۹ - کشت

Pueraria (S). Puérarie (F). **كثث** ۲۳۷۳۹  
 Pueraria (E). Knollengrische (D). Pueraria (I).  
 جنس نباتات ليفية عارضة معمرة من فصيلة الفربيقات  
 الفراشية. انواعه ۱۰ مهدها الشرق الاقصى من الهند الى  
 اليابان. جذورها غليظة درنية. سوتها تتناول من متر الى  
 اعمار. اوراقها عابطة، مركبة، ثلاثية الورديات الكبيرة



کشیگان محراب

جدة قابلة لثلاثة ألون تشاهدا ماجة ذهيبه ، ثوبها السفل  
وبندى الال حسرة // لها جيل وأجد في الحول ، تطهر  
الطيرة الجمالة في اواسط فيضان ، تسرع في التبار .  
تبشر الآتيه معك لكن بعد ظهورها بسرع . ويقت  
الكن بعد متحه ينسو مشرة أيام // البرقة عند بلوغها  
الكال الجسوري تطول نحو ١٥ سم . ثوبها الال الخضار  
الاسفر تملو بفسه في مقدم الصدر . رأسها  
سكور الدسمة ، أسود . سمكتها السطرية تحمل ثلاث  
زوائد منها اثنتان حلويات ممتكثتان بل الطيريه  
سفلية جاحة . سرعها حلوي الفتحة بلفي البراز على  
الزوائدتين // طور الاكمال ينسر من ال ١٢ الى ١٥ يوماً  
وينضي والانسب ينصل النبات المائل به ان تنقل فيه  
برقة والدسمة السفل

٢٣٧٢٨ - كُسَيْعَة

٢٣٧٢٨ - كُسْبَعَة  
Pelota (F), Pad (E).  
تتضخم جلدي يحصل في اطراف بعض الحيوانات . وتتضخم في الزوائد الخلية عند بعض الحشرات .

۲۲۷۲۹ - کتبک ۵

٢٣٧٢٩ — كـ كـ كـ  
Cassicus (F). Cassicus (E).  
Cassique (F). Cassicus (E).  
جنس طير من فصيلة الكاريجات ، أنواعه المألوفة ٢٣  
جميعها من طيور أمريكا الجنوبية والوسطى . تألفت القبابات  
وبعضها يقترن من الحادائق . نظامها الإنجابي جماعي .  
أرسلها صفاتوه المدن ما الأنواع التي لا يتجاوز عددها  
١٠٠ زوج ونها الأرباب الوافرة البلد || أجسامها بين  
البيضاء والبيزرية . أطرافها قزاح من ال٢٦ الى ٢٨  
منقادية غزيرة الشكل . مستقيمة القوام ، حادة  
الأطراف . رؤوسها متوجة بقنطرة مختلفة الأحجام ،  
احتشمتها متعديلة الطول . أنفها مستطيلة . مستديرة  
الأطراف . أصفر مختلف الألوان ، يكثر فيها الأسود .  
أنثاها أصفر فدا من ذكورها || قربها الثائر والحبوب  
والزبداء وأخراحتا المختلفة الأنواع والأحجام || أعرف  
والأزهر وأشهرها الكسليك القنطاري .

۲۲۷۳۰ - کتب فنی

**Cassicus cristatus** (S), **Cassique huppé** (F).

يعد من الكسليك ينكر وجوده في الجزائر والوادي حيث يوجد في «يايو» ... يرافقه الغراب ويترقب من الحافلات والجانان والحقول. سره يأتى بأحجام ٣٠٠ سم، ٥٠ سم ... جسمه كبير الكبد يطول نحو ٤٠ سم، فتحتة كبيرة تمتد من المنقش إلى القفص. ثوبه إلى السواد الاسم الاسف. افئتيه وذنبه إلى الخمر. ذاك ذنبه الجانية صفراء اللون. اما القزنان إلى السواد الاسم الاسف. متفاده اسفر اللون. حذقة فيه ذنبه. ساقه إلى السواد الاسم المالح ... من ميزاته انه يتقلد ويرود الاسوات التي يسهمها الحلي صياح البوك والتمص ويصلي الحلي زين الحمر ويصيح القير ... قوته الثبار والجوب والبور واغشرا ... يذئن منه في الاطجار الرئية الكبيرة الاضمان الفاتنة الالافية الالاف. منه جراب مستطيل يعلق في الفص ويحبك بالايات والنش اسما البائرة واليوكا. وقد يربد له حلبة الالاف من ٢٠ إلى ١٠٠ متى دخلها جانية عريية. الالاف ترضن الى ثلاث فضبات بينا الذكر يرضن من الفداء.

## Craticus (S), Cassican (F), ۰ کَسِکَان - ۲۳۷۳۱

Cracticus (S), Cassican (F), كَسِيكَاڻ - ٢٣٧٣١  
جنس طير، من الجواثم سنيات المناقر وفصيلة الثروايات،

**Reaumuria (S). Réaumurie (F).** ٢٢٧٥٢ - كَيْشَم  
جنس نباتات عجمية برية معمرة من فصيلة الأثلبيات .  
أنواعها المعروفة خمسة ، منهاها البلاد الحارة أخصها  
الصحراوية || صوبها شديدة القصر ، كثيرة الفروع الجالسة  
والمفرجة . أوراقها متعاقبة ، متقاربة ، ضيقانية النصال  
أو حليتها أزهارها لاقائية الانظام والارتكاز ، منها  
المتقوية والمليحة والباطي والطري والمستطيل الزناد القصيرة .  
اشهر أنواعها الثلاثة التالية :

- R. mucronata (S).** كَيْشَم حَوِيَّة  
**R. palaestina (S).** كَيْشَم فَلَسْطِينِيَّة  
**R. hirtella (S).** كَيْشَم مَهْدِيَّة

**Ribes (S).** ٢٢٧٥٣ - كَيْشِيَّش  
**Grossellier (F). Currant-bush (E).**  
جنس نباتات عجمية معمرة من فصيلة الأثلبيات . أنواعها  
نحو ٩٠ مظهرها بري وبعضها زراعي يزرع لها  
المأكولة . أوراقها متعاقبة ، معقنة ، كفية ، فلقية ،  
مسنة . أزهارها عقدوية أو فردية التجميع . ثماره عنبية  
سكرية وحامضة أو مرة . أشهر أنواعها ما يلي ،

**٢٢٧٥٤ - كَيْشِيَّش أَحْمَرٌ \* ، كَيْشِيَّش عَنُقُودِي**  
**Ribes rubrum (S). Grossellier rouge, G. à grappes,**  
**Castillier (F). Garnet-berry, Red-currant bush (E).**  
**Johannisbeere, Rote Johannisbeere (D). Ribes, R.**  
**vulgare, R. a grappoli (I).**

نوع من الكشيش ، ضروبه الزراعية كثيرة العدد جميعها  
جنبات فروعها تملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم . أوراقها ثلاثية  
أو خماسية الفلق المسننة . عناقيدها الزهرية تجمع نحو ٢٠  
زهرة لونها إلى الخضار الموشع بالاحمر . ثماره متصلة القدة ،  
كروية الشكل ، حراء اقرون ، اللذبة العلم ، مستحبة  
العرف || يبعد في جميع الاربية لا يثنى سوى المندجة  
الموطاب . يتكاثر بالتمليحة ويشر على الافناد الحولة .

**٢٢٧٥٥ - كَيْشِيَّش أَسْوَدٌ \* ، هَلْمُوش**  
**Ribes nigrum (S). Grossellier noir, Cassalier (F).**  
**Black currant bush, Quinsy-berry (E). Schwarze**  
**Ribisel (D). Grossularia nera (I).**

نوع من الكشيش البري والزراعي . ضروبه قليلة العدد  
تتميز باندماج النبتة الطرية الصفراء اللون المبرسة على  
الأوراق والافاناد والثمار . سوقه تملو من ٨٠ إلى ١٢٠ سم .  
أوراقها خماسية الخامة التفصيص لاقائية التبين المنشاري .  
أزهارها عقدوية . أزهارها حراء اللون خلية القنابات .  
ثماره كروية حطرية سوداء اللون .

**٢٢٧٥٦ - كَيْشِيَّش شَائِكٌ \***  
**Ribes grossularia (S). Grossellier à maqueriau, G.**  
**épineux (F). Gooseberry bush, Cat berries (E). Stachel**  
**beere, Stachelbeere-Ribisel, Stachelburen (D).**  
**Grossularia rosae, G. dei giardini (I).**

نوع من الكشيش البري والزراعي الشائك الميلول . تكثر  
زراعتة في انكلترا . أزهارها فردية الانتساب عسي التجميع ،  
عسته تجمع من زهرتين إلى خمسة أزهار . ثماره رقيقة الشكل  
الحقوية اقرون مجزعة بالأخضر . وهي تكثر من الموطاب  
الصعية الشائعة في ألمانيا وانكلترا وهولندا وبلجيكا .

**٢٢٧٥٧ - كَيْشِيَّش**  
**Grosselle (F). Currant (E).** ثمرة الكشيش .

أزهارها عقدوية التجميع ، حراء اللون أو زرقاء . ثمارها  
حنبلية . يزرعها كالقوياب || أشهر أنواعها ما يلي .

**٢٢٧٥٨ - كَيْشٌ دَرَنِي**  
**Pueraria tuberosa (S). Puérarie tubéreuse (F).**

نوع من الكشث الزراعي ساقه متعصبة تملو نحو ١٠٠  
سم . أوراقها مفصصة . أزهارها زرقاء اللون ، حنابلية  
عنبية الفرواقل تحسن بعض البلور . جلوره دنية  
لها ثمرى الماددة . بلوره وجلوره مأكولة تطبخ  
كالفاصوليا والبطاطا .

**٢٢٧٥٩ - كَيْشٌ يَابَانِي**  
**Pueraria hirsuta (S). Puérarie hirsute, Koudzou (F).**

نوع من الكشث الزراعي البروتي . ساقه تطول نحو حشرة  
امطار . فروعها خلية الماء ، وريقاتها معنوية الشكل  
تطول وتمرض من ١٠ إلى ١٥ سم . أزهارها إلى الزرقسة  
البفسجية الموشة بالأبيض . عقدوه الزهرية يطول نحو ٢٥  
سم . حنابلية مستطيلة ، زباد الغلاف || جلوره دنية  
مأكولة . سوقه صناعية نسجية . يزرع وأوراقها طافية  
بحوض من النباتات التي تزرع في المواقع المعرضة لحد  
لأنها تتشبه بالترية وتسن أجوافها .

**٢٢٧٦٠ - كُشَّة**  
**Huppe (F). Crest (E).** شكل من أشكال الفزعرة .

**٢٢٧٦١ - كُشَّة الْعَجُوز**  
**Lichen (F).** هي الحزاز ، اطليه .

**٢٢٧٦٢ - كُشُف**  
**Marquage au fer rouge (F).** الكشش : الكي بالثار .

**٢٢٧٦٣ - كُشُر**  
**Gaïtongamie (F). Gaïtongamie (E).**

هو في الحيوانات الاليفة والداجنة التصالب بين اقارب  
من اصل واحد .

**٢٢٧٦٤ - كُشُرِي**  
**Haricot mungo (F).** هو الخاش ، اطليه .

**٢٢٧٦٥ - كُشُط ، تَكْشِير**  
**Décorçage, Décorçation (F). Decortication,**  
**Stripping off bark (E).**

إزالة لحاء الاشجار أو سقرطها طبيعياً وانتزاع قشور بعض  
الثمار والحبوز كالجزر والوزر والارز .

**٢٢٧٦٦ - كُشُط الطُحْلُب**  
**Emoussage (F). Removal of moss from trees (E).**

نزع الطحلب من لحاء الاشجار .

**٢٢٧٦٧ - كُشُف**  
**Niquetage (F). Nicking (E).** الكشش في الخيل : اتواء في سبب الذنب .

**٢٢٧٦٨ - كُشُف ، مَعَاتِيَّة**  
**Constat (F).**

**٢٢٧٦٩ - كُشُف التَحَاوِيْب**  
**Désoperculation (F). Uncapping (E).**

هو رفع الغطاء الشعي من عين الشاهد عتد جني العمل .



كشش احمر



كشش اسود



كشش شائك





كشيشة سوداء



كشيشة سوداء



كشيشة سوداء



كشيشة سوداء

- Or. luteus (S). Orbe jaune (F). **كشيشة صفراء**  
Or. aureus (S). Orbe dorée (F). **كشيشة ذهبية**  
Or. roseus (S). **كشيشة وردية** ، **بجرة** ، **بجرا**  
Orbe rose (F).

**٢٣٧٦٧ - كشيشة**  
Vicia fulgens (S).  
Vesce brillante (F).  
نوع من الباقية وهو نبات عشبي حولي بري وريبي. ساقه  
فراء عارية تملو من ٦٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقه مستقيمة  
مشنبة. أوراقه مركبة، وريقاتها شعبة تعد من ١٦  
إلى ٢٤. أزهاره عقودية التجميع. سداسية التصفيف،  
حراء اللون، فضية الملوحة اللامع || أزهاره يستمر من  
أيار إلى تموز.

- ٢٣٧٦٨ - كشيشة، كشيشة، أكشوش، لكشوش**  
Cuscuta (S). Cuscuta (F). Dodder (E). Selde (D).  
Cuscuta, Carpaterra (I).

جاء من الكشوش في لسان العرب :  
« هو الكشوش فلا أصل ولا ورق  
ولا نسج ولا ظل ولا ثمر »

جنس نباتات طفيلية من فصيلة المحموديات. أنواعه المعروفة  
نحو ٨٠٠ معظمها أمريكي النبت. جميعها من النباتات  
المؤذية الماعدة الورق. سوقها مستقيمة، فروعها، كشيشة  
التجميع، غصية الشكل، صفراء اللون أو شقراء، تلتف  
حول حاضنها وتنشعب فيها مرافقها المماسية فتنتشرها نسجها  
وتحيها. أزهارها صغيرة الحجم بيضاء اللون أو وردية.  
أعرف أنواعه الشرقية والأوروبية ما يقع.

- كشوش السمر، كشيشة**  
C. epithymum, C. minor (S). Cuscuta du thym,  
Petite cuscuta, Epithym (F).

- كشوش الكتان**  
C. epilinum (S). Cuscuta du lin (F).  
**كشوش التفل**  
C. trifolli (S). Cuscuta du trèfle (F).

- كشوش زكي الرائحة**  
C. suaveolens (S).  
Cuscuta à odeur suave (F).

- كشوش عربي، شرين**  
C. arabica (S).  
Cuscuta d'Arabie (F).

- كشوش غليظ**  
C. racemosa (S). Cuscuta grosse (F).  
**كشوش فلسطيني**  
C. palaestina (S).  
Cuscuta de Palestine (F).

- كشوش كبير**  
C. major (S). Cuscuta grande (F).

**٢٣٧٦٩ - كشيشة** شجرة كلية القصب،

**٢٣٧٧٠ - كشيشة** صوت الحية مجلجدا.

**٢٣٧٧١ - كطري، كطري، كطري**

- Dendroctia (S). Dendroctite, Pie vagabonde (F).  
Dendroctia (E).

كطري هو الاسم الهندى. جنس طير من الجوارم وفصيلة  
الغرابيات. أنواعه المعروفة عشرة موطنها الهند. تألف  
الحراج المبهمة الاثمار. لونها الحيالي جامي. جماعها  
قليلة العدد. قوتها البلور والحبوب والثمار والخشائر ||  
اجسامها متوسطة القدر تطول من ٢٨ إلى ٤٦ سم. مما فيه  
الذهب الذي يطول من ٢٢ إلى ٢٧ سم. تنبت باذانها  
المستطيلة الشبه سهمية الشكل وبانوارها الخملية القائمة  
الميلنة بالاسود والاحمر والاشبه.

- Cassia (F). **كشيشة سوداء**  
Black-currant (E). **ثمرة الكشيش الاسود.**

- ٢٣٧٥٩ - كشيشيات**  
Ribésiées, Grossulacées, Grossulariées (F). Gros-  
sulacées (E).

سبط من فصيلة القليبات يشمل الكشيش والربياس  
وفيرها. اجناسه وانواعه كثيرة العدد منتشرة في جميع  
الاصقاع المعتدلة المنخفضة نحو الباردة من العالم القديم  
والجديد.

- ٢٣٧٦٠ - كشيشة**  
Androsace (F).  
هو الاندروساس، اطلبه.

- ٢٣٧٦١ - كشيشة**  
Guérise (F). Shelter (E).

- ٢٣٧٦٢ - كشيشة**  
Truffe noire (F).  
هو الكرم الاسود، اطلبه.

- ٢٣٧٦٣ - كشيشة سوداء**  
Kuehneola (S).

جنس ظهور مجهرية من فصيلة السحمايات، يتميز بمشاعله  
الزبدية التجميع التي تركب فصل الاوراق حل صفحاتها  
المليا. فنانحه صفراء اللون قلادية التجميع والشكل. فكانه  
عديدة مترافعة. مسامه الاساسية شعبة التركيب، ورياحية  
البريفات || انواعه المعروفة حتى الآن قليلة، منها كشيشة  
التي وكشيشة القطن.

- ٢٣٧٦٤ - كشيشة البين**

- Kuehneola fici, Physopella fici, Uredo fici (S). Rouille  
du figuier (F).

نظر مجهرى يتطفل على اوراق التين فيؤذيها ويهيء الى  
نمو الاثمار ونفج النار || مظهره الخارجي بقع مبهمة  
صفراء اللون تركب فصل الاوراق حل صفحاتها السفلى  
فقتيب جفاف التجميع ويؤذي ثم الاثمار الباكر الذي  
يؤذي نمو الشجرة ويؤخر نضج الثمار || يكافح باستعمال  
سائل بوردو المخلوط ١٪ عند ظهور أعراض المرض وبعد  
ذلك بأسبوعين.

- ٢٣٧٦٥ - كشيشة القطن**

- Kuehneola gossypii, Uredo gossypii (S). Rouille  
du cotonnier (F).

نظر مجهرى يتطفل على اوراق القطن فيؤذيها ويسبب  
سقوطها الباكر || مظهره الخارجي بقع صفراء اللون مبهمة  
أو متلاصقة تركب فصل الاوراق حل صفحاتها المبها  
تقابلها على الصفحات السفلى حالات بنية تمرقزل سير التلغ  
فقتيل الاوراق بعد ان تقتفي على نسجها التي تلوي وتموت.  
يكافح باستعمال اسد الفواطير التناسية الانتكاز الضعيفة  
التركيز.

- ٢٣٧٦٦ - كشيشة**

- Orobus (S).  
Orobe (F). Orobe, Bitter vetch (E). Bergerbse (D).  
Oroba (I).

جنس نباتات عشبية برية ممرنة من فصيلة القطانيات  
الغراسية. انواعها نحو ٤٠ سوقها فروعها مستقيمة. ازهارها  
مثنوية يجرسها النحل. ثمارها سنية. بزودها مستديرة.  
اشهر انواعها :

- كشيشة ربيعية**  
Or. vernus (S). Orobe printanière (F).

- كشيشة لطفاء**  
Or. variegatus (S). Orobe panachée (F).

- كشيشة سوداء**  
Or. niger (S). Orobe noire (F).

وعنقه وأصل صدره وذنبه إلى السواد اللامع . قفنه قفري  
الريش الأسود الأزرق الملوّج . ظهره وسنابه إلى الجوزة .  
توادمه وأباهره إلى السواد المطروق بالأحمر . سائر ريش  
جسمه إلى الحمرة النارية . أثناء أقل تلوناً ولُمة ॥ يألف  
القفص ويضاهي الحسون في التفرّده .

### ٢٣٧٨٥ - كُفْرٌ مَبْدُول \*

Chrysomitris spinus (S). Tarin commun (F). Common siskin (E).

نوع من الكُفْر ، موطنه يشمل الشرق وأروبة وبعض مناطق  
أفريقية الشمالية . يألف الجبال والبلاد الباردة في الصيف  
ويجوب غابات وحدائق المناطق المعتدلة في الشتاء . وهو  
صغير القد ، جميل الثوب يطول من ١١ إلى ١٢ سم .  
الذكر منه متوج الرأس بالسواد . ظهره إلى الخضار الأصفر  
يعملو بتجميع أعبر . جناحاه إلى السواد يمزجها غطان  
أصفرا . حشره وزوره وصدره إلى الصفار الأخضر .  
عنقه أسود . منقاره سنطلي الجسم أسود المنقط . حدة عينه  
كستينية اللون ، سناقه إلى الوردية . الأنثى أكثر بياضاً  
وأقل حمرة وأسوداً . أما رأسها فإلى الخضار الالكهف  
بدلاً من الأسود . أثناء تبويض وتحضن مرة واحدة في العام  
وقد يكون ذلك في الوتيرة الأولى من حزيران ॥ وهو يألف  
القفص بسرعة ويدب بسهولة .

### ٢٣٧٨٦ - كُفْرِيّ ٥

Botrytite (F).  
تعت تعريفه يطلق على ما كان شكله كزهر القزديط  
أو كالمعقود القصير المستدير .

### ٢٣٧٨٧ - كُفْدِيَّة

Toile d'araignée (F).  
هي الشب ، وأرجه .

### ٢٣٧٨٨ - كُفْدِيَّة ٥

Pézize (F). Peziza (E).  
جنس فطور مقعرة من الكدمات . أنواعه عديدة منها  
واحد يعم الاقتصاد الزراعي يدهي الكدمة الجراحية .

### ٢٣٧٨٩ - كُفْدِيَّة جِرَابِيَّة ٥ ، أَلُورِيَّة ٥

Peziza vesiculosa, Aleuria vesiculosa, Edocephalum  
fimetarium (S). Pézize vésiculeuse (F).  
فطر يعيش على المواد العضوية النباتية والحيوانية ॥ عسلاته  
كبير القد مركب من سدائ غليظة قدسية الشكل ملفوفة  
الحافة . قطر براوح من ٣ إلى ٩ سم . مواجه الخارجي أخير  
خلي . سطحه الناعم الملس البشرة داكن اللون الحنطلي  
أضراره قائمة على ما يتلف من شتلات يتغلغلها من التربة عند  
شق طريقه نحو النور .

### ٢٣٧٩٠ - كُفْدِيَّات ٥

Pezizaceae (S).  
Pézizacées (F). Pezizaceae (E).  
فصيلة فطور من رتبة الفريات . أجناسها وأزمارها عديدة  
جميعها مقعرة ، بعضها عديم النضج . معظم أجناسها يعيش  
على المواد النباتية والحيوانية المتحللة . منها أنواع كبيرة القد  
لحمية المسكونة ، ما كولة ॥ أشهر أجناسها الكدمة والأستبرله  
والسركوسينا والأوتيدا ، الخ .

### ٢٣٧٩١ - كُفْر

الكرم : « شوك ينسبط له ورق كبار امثال اللزاع كثيرة  
الشوك ثم تخرج له شمع وتظهر في رؤوس شعبه هنات  
امثال الزجاج يطيف بها شوك كثير طوال ، وفيها وردة  
حراء مشرفة تجرهمها التسبل وفيها حب امثال الصفر إلا  
انه شديد السواد » (السان) .

### ٢٣٧٩٢ - كِطَامَة

Canal souterrain (F).  
Underground duct (E).

القناة جبر الماء مملوءة ومقنية تحت الأرض .

### ٢٣٧٩٣ - كُفْر

Carène (F). Keel (E).  
كل أخدود يارز يملأ أحد أضواء الحشرة أو الزهرة .  
ومنهم من دماه قارب وزورق .

### ٢٣٧٩٤ - كُظْرَان

Capsules surrénales (F).  
Suprarenal capsules, S. bodles (E).

نقد فوق الكلا .  
٢٣٧٩٥ - كُغَب  
Nœud (F). Knot (E).  
المقدمة ما بين الأنيوبين من القفص والفتا . وقيل الكعب  
هو طرف الأنوب الناشئ . ج كعوب وكعاب .

### ٢٣٧٩٦ - كُغَب

Malléole, Talon (F).  
Malleolus, Heal (E).

هو عقب الرجل .

### ٢٣٧٩٧ - كُغَب الفَرْال

٢٣٧٩٨ - كُغْبَرِيَّة

Nœud (F). Knot (E).  
الكبيرة : حفدة أنبوب الزرع ونحوه . ج كمار .

### ٢٣٧٩٩ - كُغْبَرِيّ ، كُغْبَرِيّ

Radial

### ٢٣٨٠٠ - كُغْبُور

Capsule  
هو الجرو ، أطلبه .

### ٢٣٨٠١ - كُغْبُورِيّ

Capsulaire (F). Capsular (E).  
نعت تعريفه يوصف به ما كان شكله كالكبور .

### ٢٣٨٠٢ - كُغْبَة ٥

Pirula (S).  
Pirule (F). Pirula (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الأبريل  
وفصيلة الخنثنيات . أنواعها المماصرة المرفوعة عديدة منتشرة  
في المحيط الهندي والبحر الأحمر ॥ أمداها شبه أجاسية  
الشكل ، وريقة ، سريعة الطبع ، كبيرة القوفا المستطيلة  
القلبية ، صغرة الأعقاب المألزة اللدبية ، جملة الألوان  
المنتشرة ॥ أشهر أنواعها الكتمة التينية (Pirula fucus)  
التي يكثر وجودها في البحر الأحمر .

### ٢٣٨٠٣ - كُغْر

Chrysomitris (S).  
Tarin (F). Siskin (E).

جنس عصافير صغيرة القد نائمة من فصيلة الشرشويات .  
أنواعه المرفوعة A. ألوانها متداخلة الألوان المركبة المتباينة . تألف  
أذنانها مستعرضة فائقة ، منابتها مخروطية قصيرة . تألف  
الغنايات ومجاري الماء . تجوب البلاد في طلب الرزق والحصيف  
والشئ . قوتها بزور النباتات البرية ونولي الأوراق  
والخضراوات الصغيرة على اختلاف فصائلها وأنواعها .  
تتثن في الأشجار الكثيفة أخصها السرو والصنوبر .  
تضع من ٣ إلى ٥ بيضات مخضبة وسدما ١٢ بيوا .  
أشهر أنواعه المبلول والقنبري .

### ٢٣٨٠٤ - كُغْر قُشْبَرِيّ

Chrysomitris cucullata (S). Tarin rouge à tête  
noire (F).

نوع من الكفّر ، موطنه أمريكا الجنوبية يكثر في البرازيل  
وفنزويلا . طوله براوح من ١٣ إلى ١٤ سم . رأسه وزوره



كنة



كُفْر مَبْدُول



كدمة جبراية

٢٣٧٩٢ - كَفَرَة هي العقدة القدية الشكل .

٢٣٧٩٣ - كَفَس (F). Os des phalanges .

الكبس عظام السلاص في الاصابع . ج . كماس .

٢٣٧٩٤ - كَفَسَم (F). Ane sauvage .

هو الحمار الوحشي .

٢٣٧٩٥ - كَفَسُوم (F). Ane domestique .

هو الحمار الاكل .

٢٣٧٩٦ - كَفَل ٥ (F). Métamorphose .

Metamorphosis (E).

الكفل هو الاكمال ، اطلبه .

٢٣٧٩٧ - كَفْتَد (F). Germon .

هو الكند ، اطلبه .

٢٣٧٩٨ - كَفْب ٥ ، شَرَك الدِّمَن ، حَرَشَف بَرِي (F). Carduus Marianus, Silybum Marianum (S). Chardon-Marie, C. argenté, Lait de N.D., Archichaut sauvage (F). Milk thistle, St. Mary's thistle (E). Echte Mariendistel (D). Cardio di Maria (I).

نبات عشبي بري يحول من فصيلة المركبات . ساقه تملو من ٢٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه كبيرة مفردة حاشية . نصلها لاص الصفحة المنسجة بالابيض . حناره شائك الاغداد . رؤوسها الزهرية تكبر من ٤ الى ٨ سم . ازهارها ارجوانية ، قناباتها ملساء سنانية تنتهي بشوكة مبطلعة الجرم مستطيلة الحمة .

٢٣٧٩٩ - كَفَبَت (F). Pycnonote .

هو البلب ، اطلبه . ج . كتان .

٢٣٨٠٠ - كَفَبِيَّات ، بَلْبِيَّات

Pycnonotidae (S). Pycnonotidés (F).

Pycnonotidae (E).

فصيلة طير من الجوائم مشرومات المنقابر . اجناسها وانواعها عديدة . اعطائها معظم اقاليم البلاد الحارة والاستوائية || اجناسها صغيرة . مناقيرها خرزوية الشكل ، مستعرة القناعة ، منفضطة الجوارب ، مدبية الطراف . اجنسها مستعرة ، معتدلة الطول . اذانها متوسطة الحجم ، مستعرة الطراف . ارباشها ناعمة وفزيرة . ارسافها قصيرة ، سرديّة الفصالح الامامية . اصابعها قصيرة وقوية . قوتها الحشرات واثار المعنبة والبلور البرية وبعض نواصي النبات || اشهر اجناسها الكميّات اي البلب .

٢٣٨٠١ - كَفَبِص (F). Cri de la souris .

صوت الفأرة او صراخها .

٢٣٨٠٢ - كَفَبِظ ٥ (F). Brachysclen .

نمت وصفي يطلق حل ما كان ظله شديد القصر . ويطلق جغرافيا حل الشموب التي تسكن المناطق الاستوائية لان ظل افرادها عند الظهيرة يكون شديد القصر .

٢٣٨٠٣ - كَف آدم

« نبت نحو ذراع مستدير الورق خشن بين سواد وسفرة داخله احمر لحو زر كالفقرم لكنه اذق وفيه مرارة ييرة .

يمنع الحلقان شربا بالبن ويملل الرياح ويقوي الكبد (القدرة) .

٢٣٨٠٤ - كَف الدُّب (F). Saugé sclérée .

راجع قوية قاسية .

٢٣٨٠٥ - كَف السَّيْع (F). Renoncule asiatique .

راجع حوزان اسيري .

٢٣٨٠٦ - كَف الصَّبَاغ (F). Iris d'Allemagne .

راجع سون جرناني .

٢٣٨٠٧ - كَف العَدْرَا ٥ ، وَرْدَة اُرِيحَا

Anastatica hierochuntica (S). Rose de Jéricho, Jéruse, Anastatic (F). Rose of Jericho, St. Mary's flower (E). Jerichorose, Marienrose (D). Anastatic, Rosa di Gerico (I).

نبات عشبي يحول بري من فصيلة الصليبيات . منبسه الاصفاق القاحلة انحصها البراري الفلسطينية . ساقه قراء تملو من ١٠ الى ٢٠ سم . اوراقه اعليانية الشكل ، غليظة اللتين ، نصلها ازغب الصفحة زفيه نجعي التركيب . ازهاره ابطية الازتكاز ، فردية التجميع ، لاطنة الانتساب ، يشاء اللون || وهو من النباتات التي تعيش من جديد بعد يباسها ، فلما لو وضعت في الماء .

٢٣٨٠٨ - كَف النَّسْر ، عَفْرَبَان ، حَشْبَنَة دَوْرِيَّة ، فَلَس

Scolopendre officinale, Herbe à la rate (F). Official hart's tongue (E).

هو السرغس الحزني من النباتات الطبية المشكورة ، يستعمل في علاجات الطحال ويطرد الحمى ويبرد البول ويزيل اليرقان .

٢٣٨٠٩ - كَف المَهْر (F). Renoncule des champs .

هو الحوزان الحقل ، اطلبه .

٢٣٨١٠ - كَف اليَد (F). Dessaisissement .

Parting with, Abandonment (E).

هو منع الشخص من ادارة ماله . وقد يكون الانتاع ملوما واختيارا .

٢٣٨١١ - كَف جَدَمَاء

الكف الجلماء بضعة نجوم من كوكبة قيطس مركزها في الرأس .

٢٣٨١٢ - كَف مُخْصِب

الكف المخصب نجم ثير من كوكبة ذات الكرسي . ويدعى ايضا الكف المخصب .

٢٣٨١٣ - كَف سَرَوِيم

هو الارادة ، جنية طيبة معمرة . وهو كوكب البحر ، اطلبها .

٢٣٨١٤ - كَفَّاسَة ٥

Sparassus (S). Sparassus (F). Sparassus (E).

دوبية من العناكب الساعية القانصة ثنائية الروايا سداسية المشانق تنتمي الى فصيلة الاجابيات || جسمها صغير القد يطول نحو ٧ م . عند الذكر ونحو ١٢ م . عند الانثى . سداسها ثاق الملقم ، حنلي اللون ، كتيّف الخمل .



كيب



كف الغدارم



كفّاسة

الى الكسني الاحمر المواج . منها ورواجها الى السرة الحالكة || طور الاكمال يستمر نحو ١٦ يوماً وينقضي في الجفلة او في التربة حيث تنفس السرة ملتصقة بجلباب من الطين .

٢٣٨١٧ - كَفَّاشَة  
Cautionnement (F).  
Security (E).  
هو النقد الذي يلتزم به الكفيل نحو الدائن المكفول له . وهو أيضاً الرضوية المرتهنة سواء كانت اوراقاً مالية أم عقوداً تستودع تأمينا لدين احتمالي .

٢٣٨١٨ - كَفَّاشَة ، هِمَّان  
Garantie (F).  
Guaranty, Warranty (E).  
شهادة خطية من البائع يان ما يبيعه من بذار وامددة واودية وادوات وغيرها حائزة على التركيب المتفق عليه .

٢٣٨١٩ - كَفَّاشَة الشكري  
Ducroire  
هو ان يلتزم الوسيط دفع ثمن المشتري الى البائع اذا لم يفعل الشاري ذلك .

٢٣٨٢٠ - كَفَّاشَة القسم  
Caution juratoire (F).  
Juratory security (E).  
قسم قمتره الحكمة بمثابة كفالة .

٢٣٨٢١ - كَفَّاشَة قَانُونِيَّة  
Caution légale (F).  
Common bail (E).  
هي الكفالة التي تقدم تنفيذاً لنص القانون .

٢٣٨٢٢ - كَفَّاشَة قَضَائِيَّة  
Caution judiciaire (F).  
Judicial security (E).  
هي الكفالة التي يجب تقديمها تنفيذاً لحكم المحكمة .

٢٣٨٢٣ - كَفَّة  
Limite du feuillage (F).  
Limit of the foliage (E).  
كفة الشجرة : متبى حدود درجها حيث تنقطع اوراقها .

٢٣٨٢٤ - كَفَّة جَنُوبِيَّة  
الكفة الجنوبية كوكب .

٢٣٨٢٥ - كَفَّة شَالِيَّة  
الكفة الشالية كوكب .

٢٣٨٢٦ - كُفَّر  
Bitume  
هو الحمر الغروي ، راجع حر .

٢٣٨٢٧ - كُفَّرِيَّة  
Kaempferia (S).  
Kaempféria (F).  
جنس نباتات جذموية دوفسية معمرة من فصيلة الزنجبليات . انواحه نحو ٢٠ منبهاً المناطق الحارة . اوراقها كبيرة اللد ، قرصية الانقسام يتوسطها شراخ تملو زهرة كبيرة ، جميلة الشكل ، متباينة الالوان || جذاميرها طيبة يستخرج منها مواد ناعولية شديدة الفاعلية .

٢٣٨٢٨ - كُفَّان  
Selaginella (S).  
Sélaginelle (F). Resurrection plant (E). Auferstehungs-pflanze (D). Selaginella (I).  
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخلدريات . انواحه المعروفة نحو ٢٠ جميعها من نباتات البلاد الحارة والمتدلة . سوقها نخيلة مدادة فراء . فروصها منتسبة فناء تكسوها الاوراق الصغيرة المتركة الحرشية الشكل ،

عينها زيمتان . شمسافها صغيران ذويان . فكاهما كبيران مجهزان بفقا حادة . جرانها كبيرة مسطيلة . بطنها يضي الشكل ، حشلي اللون تملو نمشة سمراء وادع نقط سود || تألف البراري والمواقع الدفلة . قوتها الحشرات والذباب . تسرح في الليل . مارها سنة صغيرة قلنسوية الشكل تنسجها ضد سوق النبات . بيئاتها الشوي يستمر نحو خمسة اشهر تقضيها في مكنبة صلحية تنسجها بين الحجارة وتحتها || تعتبر من الوديات النافعة .

٢٣٨١٥ - كَفَّاشَة تَرَاوِيَّة \*

Calymnia trapezina, Cosmia trapezina (S).  
Calymnia trapézoidale, Cosmie trapézoidale (F).  
Calymnia trapezina (E).

فراشة من فصيلة الحشرقيات حرشقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اوروبية . فراستها جولة قوتها رحيق الازهار . سرفها خاضعة تركيب اوراق الاشجار الوريفة || جسمها يطول نحو ١٣ سم . بطنها قراوح من ٣٠ الى ٣٢ سم . رأسها مستد الجرم ، نالق الجبهة . عينها كبيرتان دائريتان . زباناها غيطيان . ملابسها نخيلة . مرشها مستد الطول . جوشها وبطنها الى الخشبي الاسمر المواج || ورشهاا الاماميان الى الخشبي الاكلفت تملو مشعة عنابة ونمطان مبرضان اسمران . ورشهاا الخلفيان الى الخشبي الاسمر المواج يطوق حنار تني ينتهي بالاسمر || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار ويبقى حتى تموز . تسرح في الليل وتبيت في النهار || الاثني قلتي المكن لطحاً لامتساوية الشكل تنلفها مادة غروية تثبها على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الادراك التام طول نحو ٢٨ سم . جسمها مالمس التشار ، مستد القمم ، مستطال المخوخر الذي يبدو كسرب اللقطة . ثوبها الى البني الاسمر تملو خطوط صفر مبرضة . رأسها كسني اللون . منها ورواجها الى السرة القاذرة || طور الاكمال الذي يستمر من ١٥ الى ١٧ يوماً وينقضي في التربة حيث تنفس السرة على عمق ٣ او ٤ سم . ملتصقة بجلباب خفيف من الطين ينقل عند انطلاق الفراشة في ايار .

٢٣٨١٦ - كَفَّاشَة مُرَوَّاطَة \*

Calymnia affinis, Cosmia affinis (S).  
Calymnia complice, Cosmie complice (F).  
Calymnia affinis, Cosmia affinis (E).

حشرة من النسيقيات حرشقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبية . فراستها جارية قوتها رحيق الازهار . سرفها خاضعة تميش على اوراق السديان || جسمها صغير اللد يطول نحو ١١ سم . بطنها نحو ٢٩ سم . رأسها الى الخشبي . منهاا كبيرتان . زباناها غيطيان . ملابسها دقيقة . مرشها مستد الجرم . جوشها وبطنها الى الخشبي الاسمر المواج || ورشها ، عند الشقين ، الى الخشبي الاكلفت تملو في الزوج الامامي ماجة صناعية وضطوط سم مبرضة ويقتدان الى الطلعة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران ويبقى حتى آب . تسرح في الليل . تماثل يمد ظهورها بنحو ٤٥ يوماً وتمتد نصال لطحاً مستطيلة الشكل على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال الجسدي تكس لطحاً الى الطلعة ينلوا مواج اخضر وضطوط سود مبرضة يظلها من الجانبين نقط غبراء اللون . رأسها



كَفَّاشَة تَرَاوِيَّة



كُفَّرِيَّة



كُفَّان



كفة مدادة



ككوة



ككبة الطيان



ككبة الهازن



ككبة مفلطحة

٢٣٨٣٨ - كُكْلُوبْ \* Cactus, Plectolophus (S). Cacatois, Cacatois (F). Cockatoo (E).

جنس طير من الببغاء. أنواعه قليلة المدد جميعها متسلقة أصنافها فسيحة الأرجاء تمتد من الحد إلى جزر الترابيس وأستراليا. أجسامها كبيرة القد. ألوانها إلى البياض الناصع. طرارها كبيرة فائقة لونها يختلف باختلاف النوع. يراوح من الأبيض إلى الوردي والأصفر. وهي هنية الخلق تعيش في القفص وتقتبس العلم والكلام.

٢٣٨٣٩ - كُكْلُوبْ الطَّيَّان \* Laemophloeus clematidis (S).

حشرة من الككجيات طولها يراوح من ٢ إلى ٣ سم. ثوبها إلى الخشنى تملو مابة بيضية. كوكها حاد التسنين. زيانها صولجانية مهدبة. تعيش على سوق الطيان بمد يهاها.

٢٣٨٤٠ - كُكْلُوبْ المَحَارِزَن \* ، كُكْلُوبْ سُوْرِيَنَام \* Oryzaephilus surinamensis (S). Silvaln (F). Saw-toothed grain beetle (E). Getreideschmalkäfer (D).

حشرة من الككجيات ثوبها إلى الخشنى القائم. جسمها مستطيل الشكل بطول نحو ٣ سم. كوكها مسن الحافة. زيانها صولجانية مهدبة. تركب مع ريقها جميع الحبوب الخزوة ولأثار الخفيفة والساكر والخبث. وقد تقمرس وتبيد ريقا الكلدرا (Calandra).

٢٣٨٤١ - كُكْلُوبْ مُسْطَاحَة \* Uleiota planata (S).

حشرة من الككجيات جسمها مستطيل مفلطح. طولها يراوح من ٤ إلى ٥ سم. ثوبها إلى الصهبة يملو مواج قائم. كوكها إلى السرة ثنائي التسنين الطرفي الأمامي. زيانها خيطية، مستطيلة مهدبة. تعيش تحت لحاء الأشجار الحرجية اختصها للتسندان.

٢٣٨٤٢ - كُكْلُوبْ \* Cuculidae (S). Cuculidae (F). Cuculidae, Flat bark beetles (E). Rindenkäfer (D).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة. أجسامها وألوانها عديدة أصنافها العالم. جميعها من أجناس الصغيرة المستطيلة الشكل. قرونها الاستمارة خيطية أو صولجانية مركبة من ١١ فاصلة. أرساغها خامية المقل. تعيش بين الاخشاب وتحت القشور وفي حازن الحبوب حيث تقترس ما تقوى عليه من المرام وأغرات الصغيرة.

٢٣٨٤٣ - كُكْلُوبْ \* Cuculidae (S). Cuculidae (F). Cuculidae, Flat bark beetles (E). Rindenkäfer (D).

هي الفئرية. هو أظلمها.

٢٣٨٤٤ - كُكْلُوبْ مَرْشُوف \* Cuculidae (S). Cuculidae (F). Cuculidae, Flat bark beetles (E). Rindenkäfer (D).

مرض فئاك يدهى غرزة الأنف، أظلمها

٢٣٨٤٥ - كُكْلُوبْ \* Cocoloba (S). Cocolobe (F).

جنس الجوارح وجيرات برية من فصيلة البيلجيات. أنزاعه الممرقة نحو ١٦ منها المناطق الاستوائية الأمريكية. تتميز بصلابة ومناعة أغطائها الصاعدة. أشهر أنزاعه ما يتبع.

٢٣٨٤٦ - كُكْلُوبْ أَزْغَبْ \* Cocoloba pubescens (S). Cocolobe pubescent, Bois de fer (F).

شجرة عظيمة دائمة تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م. خشبها أحمر

الزيتونية اللون. تروء للزبين يستعملها الزمارون في صناعة أرياش وباقات الزهر.

٢٣٨٤٩ - كُكْلُوبْ \* Croupe (F). هو الزوف، أظلمها.

٢٣٨٥٠ - كُكْلُوبْ \* Glechoma (S). Glécheme, Glécome (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الشفويات. أنواعها قليلة بعضها طبي. سوقها لاقية الشكل منها للمادة والمنتنية. أوارها متقابلة ممتعة، نصلها مستدير الصفة المشاربة الحافة. أنزاعها أبوية الارتكاز مختلفة الألوان منها الأبيض والأزرق والأرجواني والبنيجي. تعيش في المراع الرطبة وفي الأتية والسليجات.

٢٣٨٥١ - كُكْلُوبْ مَدَادَة \* ، تَبْلَابْ أَزْغَبْ \* Glechoma hederacea (S). Glécheme hédéracé, Herbe de St. Jean, Rondelotte, Tarette, Lierre terrestre (F). Ground ivy, Hedge maida (E). Echter Gundermann (D). Corona di terra, Erba di San Giovanni, Edora terrestre (I).

نوع من الكفة المبلولة وهو نبات عشبي طبي بري معمر. ساقه تطول نحو ٣٠ سم. أوارها جملة الخفسار الموضح أنزاعه ضمية التجميع، نحاسية، زرقاء اللون.

٢٣٨٥٢ - كُكْلُوبْ القُدَم \* Palmipèdes (F). Palmipeds (E).

رتبة من الطير تنتمي إلى قسم الجرجيات، فصائلها وأجناسها وأنواعها كثيرة العدد تجمع إلى أربع رتبيات: شابات الكعوف منها الجمع صفحيات المنابر منها ألوز والبط طريقات الريش منها القفوس حديدات الريش منها البطريق.

٢٣٨٥٣ - كُكْلُوبْ \* Kéfir, Káphir (F). Kefir, Kefyr (E).

مشروب كحول حاز العلم يستحضر من مضارة اللبن بمد تخثيرها بجار نظرية خاصة تحد من نشاط الأحماض اللبي.

٢٣٨٥٤ - كُكْلُوبْ \* Caution, Fidéjusseur (F). Caution, Surety (E).

هو الذي يلتزم للدائن مع المدين الأصلي بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين.

٢٣٨٥٥ - كُكْلُوبْ ، ضَامِن \* Garant (F). Garant, Warrant (E).

هو الملتزم بالكفالة أو الضامن.

٢٣٨٥٦ - كُكْلُوبْ التَقَاتِ التَقَاتِيَّة \* Caution judicatum solvi

هو الكفيل الذي يغض دفع التقات التقاتية.

٢٣٨٥٧ - كُكْلُوبْ مُتَضَامِن \* Caution solidaire (F). Binding on several caution (E).

هو الكفيل الذي تنال للدائن من حق المطالبة بتجريد المكفول فاصح موقفه من الدائن موقف الشريك المتضامن في الدين.

طوله نحو ١٠ سم. ويسته نحو ٣٠ سم. رأسه شبه مخروطي؛ عيناه صغيرتان، ماحتان. خنثاه مقلوبتان، مقوستان. سبالة متكاثف مستطيل. اذناه مستطيتان، كبيرتان. جناحاه عريضان، ذنبه مدرج في الغشاء الجلدی || يأنف البيوت والكهوف والمغاور القريبة من مجاري الماء. يعيش جماعات متوسطة العدد. الذكر لا يفرق إلا في زمن التكاثر، من في الحول || مسرعه يستمر من النقص إلى الفجر. قوته الحشرات على اختلاف انجاسها وانواعها.

٢٣٨٥٥ - **كلادوك** \*  
Chelodina (S).  
Chelodina (F). Chelodina (E).

نوع من السلاحف القاذبة المقترنة تنتمي إلى فصيلة الحسنيات. تعيش في المياه العذبة وصل ضفاف الأنهر. قوتها الاسماك والرخويات والقضادع والزروع والسحالي والحيات || جسمها يطول نحو ١٠٠ سم. منها ٤٢ سم. قراس والنتق وأنها مبطل الشكل، ذلق الخلع. صفها أسطواني مستطيل، ذنبها جذعة. ذيلها شبه بيضي الشكل، معتدل الإحديدياب، ويتركب من ٢٥ فترة لامتسارية الحجر، لونه إلى السمرة الصفراء الكدره || موطنها بعض مناطق امريكة الجنوبية || لها كاعن الصنف، ما كوك من بعض قبائل تلك البلاد.

٢٣٨٥٦ - **كلاديون** \*  
Cladium (S).  
Cladium (F). Marsh shear-grass (E). Schneidegras (D). Panicstellera di padule, Serrazo (I).

جنس نباتات برية عشبية معمرة من فصيلة السديلات. انواعه المعروفة نحو ٢٠ أعطانها العالم. تألف المنافع والمواعق الربطية. سوقها دقيقة قرصية التفرع، مستطيلة السليانيات، تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم || تستعمل في تغليف الخيم لأنها آمن وأبقى من قش الزروع.

٢٣٨٥٧ - **كلاركيا، إكلركية**  
Clarkia (S).  
Clarkia (F). Clarkia (E). Clarkia (D). Clarkia (I).  
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الاخنريات مهناها البلاد الامريكية. انواعها قليلة جميعها صغيرة القد تزرع للززين. اوراقها متعاقبة. ازهارها فردية التجميع، محورية الارتكاز، رباعية البتلات والسهات، ثمانية الاسبدة. احرف انواعها وانهمها ما يلي.

٢٣٨٥٨ - **كلاركيا رشيقة** \*

Clarkia elegans (S). Clarkia élégante (F).  
عشبة تربيينة سرورية حولية تملو من ٤٠ إلى ٨٠ سم. اوراقها اعطليجية ذلقة، نصلها مسن الحافة، مجري اللون. ازهارها كبيرة القد عادية أو مكسبة، بتلاتها مستديرة أو كلوية الشكل، مسنة الخمار التجميع. ألوانها تختلف مع الفروپ منها الوردي والبفسجي والأبيض. ازهارها يستمر طوال الصيف.

٢٣٨٥٩ - **كلاركيا تحيفية**

Clarkia pulchella (S). Clarkia délicate (F).  
عشبة تربيينة سرورية حولية تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. ضرورها عديدة. اوراقها سنانية ذرية، نصلها خلى البشرة. ازهارها كبيرة القد، منها البادية والمكسبة، بتلاتها لاقامية التخصيص، ألوانها تختلف باختلاف الفروپ منها الاحمر والالوانى والبفسجي والأبيض. ازهارها يستمر من سزيران إلى ايلول.

اللون شديد الصلابة ناعم الرقة يقاوم التبخ يبرف بنشب الحديد.

٢٣٨٤٧ - **كككلوب كينو** \*، **ودن الفيل**، **عشب الشقة**

Coccoloba uvifera (S). Coccolobe à baquette, Bois baguette, Raisinier des bords de la mer, R. à grappes (F). Sea-side grape, Kino tree (E). Gamaia Seet-rauba (D). Coccoloba uvifera, Uva di mare (I).  
نوع من الككلوب وهو نخيفة برية تألف الشطوط البحرية. ساقها تملو من ٤ إلى ٥ أمتار. اوراقها متعاقبة، معتقة، كيرة. نصلها مستدير الصلحة الجامدة اللامة. ازهارها مثل التجميع، ثنائي الارتكاز. ازهارها بلبلية الشكل، صغيرة القد، وردية اللون || يستخرج من ساقها باخر صاصرة لزجة، قابضة، مفرا اللون يطلق عليها اسم « كينو » (Kino).

٢٣٨٤٨ - **ككم** \*  
Ierax (S).  
Ierax, Faucon nain (F). Ierax (E).

جنس طير من عراة الصقور وفصيلة الصقريات. انواعه عديدة جميعها صغيرة القد، ربة القوام، طولها يراوح من ٢٠ إلى ٢٢ سم. ألوانها إلى الكلفة المرقطة يكثر فيها الاطحل والاسمر والأزرق الباق، ويش صدرها أفر. رؤسها مستديرة. حيونها جميلة وكيرة. مناسرها مسنة ومنمقة. غالبها حادة || موطنها البلاد الاسيوية من تركيا إلى اليابان. تألف الاجام ويهاجر الماء. قوتها اللوديات والخرشارت اخصها الجنادب والسرابعبوالفرشارت الكيرة.

٢٣٨٤٩ - **كك**  
Fourrage (F).  
Fodder, Provender (E).  
كل ما ترعاها الماشية من اعشاب خضر أو تخلفه من حشوش ووسائل مخزونة كالبطاطا والشولدر الخ.

٢٣٨٥٠ - **ككلا يابس**  
Foin (F). Hay (E).  
الككلا يابس وأثن والصائرة والقييب هو العشب المحشوش الخفيف المحفوظ ككلف للحيوان.

٢٣٨٥١ - **ككلاية**  
Pâturin des prés (F).  
هي ثف المروج، اعطليه.

٢٣٨٥٢ - **ككلاب**  
Canidae  
فصيلة حيوانية من المواسم تعرف بالكليات.

٢٣٨٥٣ - **ككلاية** \*  
Quillaja, Quillaya  
جنس اشجار برية من فصيلة الورديات. انواعها قليلة اعطانها البلاد الامريكية. سوقها وفروعها متنبهة. اوراقها متعاقبة معتقة يقيصة النصل. ازهارها نوري. ازهارها ثنائية المسكن، ابلية وتناجبة الارتكاز || اشهر انواعها الككلاية الصابونية التي تتميز بسكاكة قشور سوقها وانصافها القنية بمادة الصابونين.

٢٣٨٥٤ - **كككوح، خككاش أسبل**

Vespertilio mystacinus (S).  
Vespertilion mystacin, V. à moustaches (F).  
الكككوح والككلاية نوع من الخفاش، حيوان من فصيلة الخفشيات. موطنه فسح الارواء يمتد من الصين إلى اربوة مروراً بالشرق الاوسط والاند || ثوبه إلى الطلحة السمره تعبق في الرأس والظهر، وتغير في البطن.



ككلوب كينو



ككم



كلادية



كلادوك



كلاديون



كلاركيا رشيقة

## ٢٣٨٦٨ - كَلْبِيَّةُ الْجَبَّارِ

كلب الجبار كوكب .

## ٢٣٨٦٩ - كَلْبُ الرَّاعِي

كلب الراعي نجم نيز من كوكبة الجاني ، يسمى ايضا رأس الجاني ، اطلبه .

## ٢٣٨٧٠ - كَلْبُ الصَّيْدِ

Chien de chasse, C. courant (F). Pointer, Beagle (E). صرم من الكلاب النشطة الحاذقة الثمر تستعمل في الصيد . صروفها عديدة تتميز باختصاصها واشكالها واثرها .



(١) كلب

Ligne du dos (F). كَلْبُ الفَرَسِ  
Line of a back (E). هو الخط الذي يوصل ظهر الفرس .

## ٢٣٨٧٢ - كَلْبُ المَاءِ

Lutra (S).  
Loutre (F). Otter (E). هو القضاة والفتنس وتُلبس الماء . جنس حيوانات لبونة قازية من فصيلة السروحيات . انواعها ثمانية اطلاقا العالم . تألف البحيرات والانهر والاخوار . ثوبها الاسماك والقشريات . والشفاذع ويضئ البارد والاشباب || اجسامها مستطيلة . ورووسها مستعرجة مغلطحة . اعطالها معقوبة . احتانها غليظة . قوائمها قصيرة ، اسابها خاسية ملتصقة . اذنانها مستطيلة . جلودها فروية فاخرة الصنف || اجسامها دعاليز منحذرة الانفاق تبتدئ تحت سطح الماء ، تجتمعن او تستن من . وتنتهي على بعد ٢٠٠ سم . زدهات مستديرة تملو مستوى الماء بحد ١٠ سم . وتتصل مع الخارج بمراديب تزين الهواء والحرب عند الحاجة || اناها اصغر قدا من ذكورها وفي تضع من جرون الى اربعة جراء . رضعها ورضعها نحو ٤ شهور .

(٢) كلب

Courtilière (F). كَلْبُ المَيِّ  
هو الخالوش ، اطلبه .

## ٢٣٨٧٤ - كَلْبُ مُتَقَدِّم

الكلب المتقدم كوكب .

## ٢٣٨٧٥ - كَلْبَان

الكلبان « نجان صغيران كالمترقين بين الثريا والبدان » .

Chienne (F). She dog (E). كَلْبِيَّة  
انثى الكلب .

(٣) كلب

Canidae (S). Canidés (F). كَلْبِيَّات  
Canidae, Dogs (E). فصيلة الكلاب من القوارض تشمل الكلب والذئب والذئب وابن آوى .. قوائمها الاسامية خاسية البرائن اما الخلفية قربانية وبرائتها لا تنقبض كما في السنابير وفي لا تتلاق الاضراس ولا تنقبض على فريستها ببرائتها بل بانابها .Cynocéphales (F). كَلْبِيَّاتُ الرُّؤُوسِ  
Cynocephalus (E). هي القردايص جنس قرد من فصيلة المجرسيات . رايح قردوح .٢٣٨٧٩ - كَلْبُوم  
هو الذئب والذئبيل ، اطلبه .

## Colletie (F).

جنس نباتات برية معمرة من النقيات تدعى مياكة ، اطلها .

## ٢٣٨٦٠ - كَلْبِيَّة

## ٢٣٨٦١ - كَلْب ، سَعَار ، سَعَر

Rage, Hydrophobia, Lyssa (F). Hydrophobia (E). مرض خبيث يصيب الكلاب والذئاب والثعالب والسنابير ويسرى الى سائر الحيوانات كالخيل والبقر والعم والماز والارانب . عدوا بالجرح من الغاب .

Canis familiaris (S). كَلْب \*  
Chien (F). Canis, Dog (E). جنس حيوانات شاردة واعلية من فصيلة الكلبيات . سلاله كثيرة البلد تجتمع الى اربع فئات :Lupoïdes فئة الكلاب المسبورة  
Braccoides فئة الكلاب الشبيهة او المرجية  
Molossoides فئة الكلاب الدرواسية  
Gratoides فئة الكلاب السلوقية

انقله عشارية الابطاء تحمل من ٦٣ الى ٦٥ يوماً وتضع من ٦ الى ١٠ جراء بصبر النور بعد وضعها بشدة ايام . وتفقد انسان الخلب بسر ثلاثة اشهر ويكمل تسليها النهائي بسر ثمانية اشهر . ولكلب خمسة اصابع في قوائمها الاحامية واربعة في الخلفية . اسابه ميطة قوية البرائن || وهو حيوان متأنس اليف وفي يستخذه الانسان في الحراسة والصيد والرماية والطاره .

le Petit chien (F). كَلْبُ اصْغَر  
Canis minor, the Lesser Dog (E).

الكلب الاصفر كوكبة نجوم جنوبية الموضع مركزها بعد الكلب . الاكبر الى الشرق || نجومها قليلة العدد ، منها سبعة مزدوجة وكوكب انور من غيره تسميه العرب « الشعرى الشامية » لانه يئيب في شق الشام . وتسميه ايضا « الفمضاء » . وتسمى الكوكبين اللذين على الذراع « الذراع المختبوس » او « مزم الذراع » .

le Grand chien (F). كَلْبُ اكْبَر  
Canis major, the greater Dog (E).

الكلب الاكبر كوكبة نجوم جنوبية الموضع مركزها خلف كوكبة الجوزاء وذلك تدعى كلبا || عدد نجومها تسعة وعشرون . والعرب تسمى النير الاظم الذي على موضع الفم « الشعرى المبرور » . وكان قوم في الجالية يعبدهون لانه يقطع البلاء عرضاً دون غيره من الكواكب . وسمى جوداً لانه هرب الهرة الى سهيل . ويسى ايضا « الشعرى البانية » لان منبه في شق اليمن . اما الاربية التي منها على كتفه وعلى ذنبه وما بينها وعلى خلفه فتدعى « المذاري » والاربعة المصطفة على الاستقامة تدعى « القرد » .

٢٣٨٦٥ - كَلْبُ الأُرْكَار  
Chien-terrier, Fox-terrier (F). Terrier (E).

سلالة من الكلاب النشطة الرشقة تستعمل في صيد الجرذان والثعالب والارانب وغيرها .

Requin (F). كَلْبُ البَحْرِ  
هو القرش ، اطلبه .Emissile (F). كَلْبُ البَحْرِ  
سمكة بحرية ، كبيرة ، مفترسة تدعى سيتل ، اطلها .

## ٢٣٨٨٧ - كلزومة حرسة

*Calosoma rugosum* (S). *Calosoma rugueusa* (F).  
حشرة نافعة من فصيلة السكوتيات طولها نحو ٢٥ سم.  
ثوبها اسود اللون. هدها مخدات يملوها مروج أخضر.  
اسفح || تكثر في الصيف على الأشجار الحرجية وفي  
الحاقل والجنان حيث تقترس يرقات غيرها من الحشرات  
أخصها يرقات فصيلة النسيجات .

## ٢٣٨٨٨ - كلزومة مأكرة

*Calosoma sycophanta* (S). *Calosoma sycophante* (F).  
*European Calosoma beetle* (E). *Puppenräuber* (D).  
حشرة نافعة من فصيلة السكوتيات طولها براوح من ٢٥  
الى ٣٥ سم. رأسها وكسلاها الى الزرقه ، هدها مستعرضان  
الشكل ، لمونها الى الخضار المنهب الاسفح المواجه .  
تألف الغابات والحاقل حيث تقترس على تيسر لها من  
يرقات الحشرات أخصها اساربع للقرينات .

*Chaux* (F). ٢٣٨٨٩ - كلس ، جبر  
هو اكسيد الكلسيوم ، اطبه .

*Calospora* (S). ٢٣٨٩٠ - كلسبورة  
جنس فطور مجهرية من الرفغيات . تتميز ببوغها المستطيل  
القد ، الأغشاف الجسم ، الشفهي الانقسام والوثيري  
المترس || له نوع واحد يحم الاقتصاد الزراعي يدعى  
كلسبورة الويلة .

٢٣٨٩١ - كلسبورة الويكلة ، تصوف الويكلة  
شقران الويلة

*Calospora vanillae*, *Gloeosporium vanillae* (S). *Anthraco*  
*trachose de la vanille* (F).  
فطر مجهرى يركب اوراق وممار الويلة فيعطها ويلونها .  
مظهره الخارجى على الاوراق نقط سمر توشم صفحة النصل  
البلبا فطبطب النسيج وتمرقل ولد الجسموري . وهو على  
الثمار قروح صغيرة مستديرة قمحية اللون تصيب القرن  
في اسد طرفيه او في وسطه فتسبب ذبوله وسقوطه || يكافح  
فور ظهوره على الاوراق بملحول بورود المركز من ١  
الى ١٥ ٪

٢٣٨٩٢ - كلستوم  
Callistemon (S). Callistème (F). Callistemon (E).

جنس اشجار وجنيات معمرة من فصيلة الاريات . انواعها  
المعروفة عديدة ، منها فسيح الاجزاء ، يمتد من الشرق  
الاسوط والاقصى الى امريكا واورالها واستراليا || سقها تملو من  
مترين الى سبعة امتار . اوراقها ايده ، متعاقبة ، متقاربة ،  
منقطة . نصلها سناينة ، جامدة ، ازهارها سبلي التجميع .  
ازهارها غنقة الخضاب والعرف || اعرف انواعها واشهرها ،  
التالية :

## ٢٣٨٩٣ - كلستوم أئيق

*Callistemon speciosus* (S). *Callistème élégant* (F).  
نوع من الكلستوم . شجرته تملو نحو سبعة امتار .  
أصنافها وأندادها وأصنافها حراء اللون . اوراقها تطول نحو  
١٠ سم . نصلها فواحة العرف المطري ، خلية البشرة  
في اول عودها . سنباله الزهرية قرمزية اللون . مياس ازهاره  
الى الصفار المايق الجميل || تنويره يستمر من آذار الى  
حزيران

٢٣٨٨٠ - كلجم . *Géophyta* (F). *Geophyta* (E).  
كل نبات تكثر أعضاء تكاثره المائية مدفونة في التراب  
كالنباتات السفولية والنوصية والصلية .

## ٢٣٨٨١ - لسان المزمار

*Salpiglossis* (S). *Salpiglossa* (F). *Painted tongue*, *Valvet flower* (E). *Trompetenzunge* (D). *Salpiglossa* (I).  
جنس نباتات عشبية حولية ثريينة من فصيلة الياذنجانيات.  
انواعها المعروفة خمسة أما غروبها فكثيرة  
الأعضاء لزجة . سقها فراء منتصبه تملو من ٤٠ الى  
١٢٠ سم . اوراقها منقطة لاهليجية ذرية . ازهارها قمية  
الشكل ، كبيرة ، القد تطول من ٤ الى ٦ سم . اقلام ملقها  
مبطلة . لوانها عديدة تختلط مع الغروب منها الاصفر  
والاحمر والازرق والبنيجي والابيض والموشح والمنج  
والمرط || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

*Férule commun* (F). ٢٣٨٨٢ - كلج  
هي القنة المبذولة ، اطها .

*Cumuler* (F). *To accumulate* (E). ٢٣٨٨٣ - كلد  
كلد الشيء : جمعه وجمل بعضه على بعض .

*Terrain dur et compact* (F). ٢٣٨٨٤ - كلدة  
هي التربة الصلبة المنجدة .

## ٢٣٨٨٥ - كلدودة مبدولة

*Eupithecia vulgata* (S). *Eupithecia vulgare* (F).  
*Eupithecia vulgata* (E).  
حشرة مبذولة من الاريات حشرغيات الاجنحة . مطها  
معظم الاقصاع المعتدلة الحارة من الشرق الاقصى الى  
اروبه ، فراشها جارة قوتها رقيق الازهار . سقها  
خاضعة قوتها اوراق الصيرانيات والشغويات والمركبات  
جسمها صغير قصيف يطول نحو ٨ م . سقها نحو ٢١ م .  
رأسها حنطى اللون . عينها صغيرتان . زباناها مشطيان  
عند الذكر ، غيطيان عند الانثى . حوشها وبطنها الى  
الحنطى الاكلف المواجه || دراشها ، عند الشقين ، الى  
الحنطى الاكلف تملو في الزوج الامامي بقجتان ونقطة  
مستطيلة الى البني الاسمر المواجه وسبع نقط بنية في الحنا  
الخارجي . وتملو في الزوج الخلفي مشعة بنية وسبع نقط  
صغيرة تناعم الحنا || لها جيل واحد في الحول . تظهر  
الفراشة في نيسان وتبقى حتى اواخر حزيران . ترحس  
من العصر الى قسمة الليل . تماطل يده ظهورها بنحو ستة  
اسابيع وتفتح الملك ميماديا على الصفحات السفلى من  
نصال الاوراق || السرعة تملو نحو ١٩ م . جسمها شبه  
وشى الشكل . ثوبها الى الخضار الزبني تملو بقشة غبراء  
وسط بجي قالب اسمر وقسمة خطوط جانبية وردية . رأسها  
اسود . رواجها البطنية الوسطى مما يجعلها تقترس  
عند الانتقال || طولها الاكامل الذي يستمر نحو ١٦٥  
يوما ينقضي في الجلالة او بين فروع النبات التي تلاس  
التربة فسمن جراب مخروفي الشكل ينفلق عند انطلاق  
الفراشة .



كلجم



كلدودة مبدولة



كلزومة مأكرة

٢٣٨٨٦ - كلزومة . *Calosoma* (S). *Calosoma* (F).  
جنس غنطاس نافعة من فصيلة السكوتيات . انواعها  
عديدة تقتلك يبيض الحشرات الفارة .



كَلَفَةُ الْاِكِيدِنَا

والاستوائية || معظم انواعها اشجار حولية او معمرة ، بعضها بري والبعض الآخر تزييني . اكثر انواعها زياه البهاء خلية الوراق . ازهارها وريسية ، عديدة الالوان . تنويرها ربيعي وصيفي || اشهر اجناسها الكليسر والطاقاة والفاذاة .

Calcium

٢٣٩٠٦ - كَلَسْتُم

عنصر فلزي غير اللون ، لين الجسم ، ثنائي التكافؤ . رمزه (Ca) وزنه الذري ٤٠.٠٨ . ينصهر في ٨١٠°مغ وينتلي في ١٤٨٧°مغ . وهو من الاجسام الشرفة التي تمتص الماء والغازات || يوجد في الطبيعة مركبا من بعض العناصر اهمها اكسيد الكليسيوم او الكلس الحلي . ثم كبريتات الكليسيوم الموجد الكليسيوم وهو ملح ابيض يوجد في الطبيعة على هيئة رغام او طباشير او جص . ثم كبريتات الكليسيوم الموجد في الطبيعة على هيئة حمض رموس ، ثم صفات الكليسيوم الذي ينتج المادة الرئيسية في تكوين العظام وفي تكوين الانسجة النباتية .

٢٣٩٠٣ - كَلَسْتُم ، كَلَسْتُم ، سُونَجِين

Colchicine (F). Colchicin (E).

مادة قلوية بلورية متياصرة تستخرج من سونجان الحريف تقل عنه ١٤٥°مغ . تقوب في الماء البارد والكحول والكلوروفورم .

Crevasses (F). Chaps (E).

٢٣٩٠٤ - كَلَع

قشب صقن يحصل في جلد اسراع اللواب .

Macule du soleil (F).

Sun-spot, Macula (E).

٢٣٩٠٥ - كَلَف

Galvanomètre (F).

Galvanometer (E).

٢٣٩٠٦ - كَلَفْتُونِيَر

مقياس اقوة الكهربائية أي شدة التيار .

Phyllosticta (S).

٢٣٩٠٧ - كَلَفَة

جنس فطور مجهرية من الفصليات . بكتيدات غسية تتجمع تنشأ تحت ادمة النصل ثم ترق ال السطح . اشكالها متعددة ، الوانها عابقة . مقه واضح الارتكاز ، شعيرات بسيطة ، قصيرة وشغافة || تركيب الوراق فريزم نسيجهما ويؤديه || انواعه عديدة . اخرها ما يتبع .

٢٣٩٠٨ - كَلَفَة الْاِسْبَانِيَه

Phyllosticta spinacia (S).

نظر مجهرى . تركيب اوراق الاسبانج فيلورميا . مظهره الخارجي يقع كبيرة مستطيلة تملو فصل الوراق . تبدو حنطية اللون ثم فراء ، تسب ذبول النسيج ويابه . يكلفه باقتطاع الوراق المصابة عند ظهور الورم .

٢٣٩٠٩ - كَلَفَة الْاِكِيدِنَا \*

Phyllosticta fusiformis (S).

نظر مجهرى يصيب اوراق الاكيدنا . مظهره الخارجي بتور مستديرة قطرها نحو ٣ م . تركيب النصل حل صفحته العليا . تبدو حراء اللون ثم سمراء || بكتيدات حكاكزية : قياسها نحو ٣٠٠ × ٨٠ ميكرون . شعيرات ندية الجسم . بروفاته مستطيلة قياسها نحو ٤×٩ ميكرون || يمتري الاشجار الضعيفة دين سولها . لذلك يجدر الاحتيا بالتسميد .

٢٣٨٩٤ - كَلَسْتُم جَمَايدَ الْوَرَقِ °

Callistemon rigida (S). Callistème rigide (F).

نوع من الكليستوم . جنيته تملو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها غشبية ، جامدة ، ذببة ، تطلو من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٣ الى ٤ سم . || سنبالها الزهرية حراء اللون ، قمرزية المولج || تنويرها يستمر من ايار الى تموز

٢٣٨٩٥ - كَلَسْتُم سِنَائِي، الْوَرَقِ °

Callistemon lanceolata (S).

Callistème à feuilles lancéolées (F).

نوع من الكليستوم . جنيته تملو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقه سنائية ، غشبة ، تطلو نحو ٦ سم . وتعرض نحو ٨ سم . نصلها جلدية ، حراء اللون في اول عهدا ثم خضراء . سنبالها الزهرية الى الحمرة البودية || تنويره يستمر من حزيران الى آب .

٢٣٨٩٦ - كَلَسْتُم مَصْصَانِي الْوَرَقِ °

Callistemon saligna (S).

Callistème à feuilles de saule (F).

نوع من الكليستوم . جمرته تملو نحو ستة امتار . اوراقها سنائية تطلو نحو ٨ سم . وتعرض نحو ٢ سم . نصلها جامدة ، مبرئة اللند الدهنية العطرة . سنبالها الزهرية صفراء اللون . ازهارها شديدة الصفر || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٣٨٩٧ - كَلَسْتُم صَوْبَرِي الْوَرَقِ °

Callistemon pinifolia (S).

Callistème à feuilles de pin (F).

نوع من الكليستوم . جنيته صبرية اللد ، تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها ابرية كالوراق الصنوبر . سنبالها الزهرية كثيفة للتجميع ، لونها الى الخضار الاصفر المولج || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٣٨٩٨ - كَلَسِي، جَمِيرِي، جَصِي

Calcaire (F). Calcareous (E).

ما كان جصي التركيب او ما كانت تغطي على تركيبه مادة الجص .

٢٣٨٩٩ - كَلَسِيَت °

Calcite (F).

Calcite, Calco-spar (E).

كبريتات الكليسيوم الطبيعي للتبلور .

٢٣٩٠٠ - كَلَسِير

Calycera (S). Calycère (F).


جنس لبانات غشبية ، برية ، حولية او معمرة من فصيلة الكليسيديات . انواعه المعروفة قليلة البند ، منبها الطوعي بعض اصقاع البلاد الحارة ، اغصها الشيل والبيرد || سوفها عفاية وبرية متكافئة الزغب . اوراقها صفيرة ، سنائية النصال الغشبية او المرط . ازهارها وريسية متراكبة التلات يكثر فيها الاحمر ثم الوردى فالازرق || تنويرها ربيعي .

٢٣٩٠١ - كَلَسِيرِيَات °

Calyceraceae (S).

Calyceracées (F). Calycéracées (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القملات . تربتها بين المركبات والديسيديات . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة البند ، منبها بعض اصقاع البلاد الحارة



كَلَفَة الْاِكِيدِنَا

عديدة و متغيرة ، قصيرة ، سوداء اللون . بويضاته بيضيه شفافة ، قياسها ٢×٥ ميكرون .

### ٢٣٩١٦ - كَلْفَةُ عَابِقَةٍ \*

*Phyllosticta congesta* (S). Bloch du prunier (F). Plum blotch (E).

وصم يصيب الخوخ سببه فطر مجهري يركب الارواق والثمار || مظهره على الارواق بقع صغيرة تغطي النصل ، تبدو حطية ثم طحلاء واخيرا قضيّة اللون || وهو على الثمار بقع قرمزية مستديرة لونها الى السمره يكتنفها طار مهذب || يكافح مكافحة كلفة التفاح . ونهم من فصل الفواطر غير المرتكزة على النحاس .

٢٣٩١٧ - كَلْتَنَ - *Galvaniser* (F). To galvanize (E).

٢٣٩١٨ - كَلْفَتَا ، كَلْتَنَ - *Galvanisme* (F). *Galvanism* (E).

٢٣٩١٩ - كَلْتَنِي - *Galvanique* (F). *Galvanic* (E).

٢٣٩٢٠ - كَلْتَسَا - *Putois* (F). هي ابن عرس ، اطلبها .

٢٣٩٢١ - كَلْتَمَار - *Calmar* (F). *Calamary* (E).

جنس حيوانات بحرية مقرنة من الرخويات رأسيات الارجل . انواعه المعروفة عديدة . اعطائها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي والهادي والهندي || اجسامها شبه اسطوانية الشكل متباينة الاحجام التي تطول من ٥٠ الى ٣٠٠ سم . وبها نوع جبار يبلغ طوله نحو ٧٥٠ سم . جميعها عشارية الجرائم المستطيلة ، العادمة المفاصل المتنبية بكتل من الحاجم تمكثها من التقيص على صيدها || قوتها الاصحاق والتشريات

٢٣٩٢٢ - كَلْتَمِبُولِيَّات - *Collemboles* (F). هي الكهليليات ، اطلبها .

٢٣٩٢٣ - كَلْتَمَكْنِيَّةَا - *Ubiquité* (F). *Ubiquity* (E).

الكلمكانية الوجود في كل مكان وفي آن واحد .

٢٣٩٢٤ - كَلْتَمِيدَا - *Chlamydospora* (F).

اسم يطلق على بورغ بعض الفطور التي تتميز بارتكازها الطولي . والكليد يعتبر من البوغ المتخذ الذي لا ينش قبل انقضاء زمن بيته .

٢٣٩٢٥ - كَلْتَنِيَّاس - *Callanthias* (S). *Callanthias* (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة القرشيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها رشيقة تطول من ٢٢ الى ٢٨ سم . زعانفها الظهرية مستطيلة مقطوعة . زعانفها الذيلية فارقة دقيقة الاطراف . الثوابا تراوح من الشقة الصنانية الى الوردي . ظهورها ابيض لونا من بطونها || لحومها مأكولة جيدة الصنف .

٢٣٩٢٦ - كَلْتَدِين - *Calandrinia* (S).

*Calandrine*, *Calandrinie* (F). جنس نباتات عشبية حولية بعمره من فصيلة الربليات . انواعه قليلة جميعها تزيينية اعطائها البلاد الامريكية الشمالية

### ٢٣٩١٥ - كَلْفَةُ الثَّيَغ \* ، فِلُوسْتِيكَتَا نِيكُولِيَّانَا

*Phyllosticta nicotianae* (S).

فطر مجهري من الصنديات ، بكنيداته غشية التجميع تشا تحت ادمة النصل من رق الى السطح . مفع واضح الارتكاز شفراته بسيطة التركيب ، قصيرة القد ، شفافة || يركب اوراق الثيغ ليوشم وثن النصل بقع مستديرة لاقياسه براوح قطرها من ١ الى ١٠ م . تبدو صنانية اللون تستقر على الخنثلي الاسمر || امراض زهيدة لا تستوجب العناية .

### ٢٣٩١٦ - كَلْفَةُ الثَّفَّاح \*

*Phyllosticta solitaria* (S). Bloch du pommier (F). Apple blotch (E).

فطر مجهري يصيب التفاح في اوراقه واثفاده وثماره . مظهره الخارجي على الارواق بقع صغيرة عديدة مقرنة الزوايا ، غبراء او مفرقة اللون ، تركيب النصل فتقضي على نسجه الادمية || وهو على الاثمار قروح مستديرة او مستطيلة طولها نحو ٣ م . لونها الى الجوزة تركيب اللحم قشيب جفانه وانضداد بشرته || وهو على الثمار بقع لاقياسية الشكل والحجم ، لونها الى السمره يكتنفها طار اخر ، تتسع مع حجم الثمرة فيبلغ قطرها نحو ١٠ م . || يكافح باستعمال سائل يورده المحلول ١٠٪ حيث تنفخ الاثمار على ثلاث مرات ، الاول بعد سقوط التويجات الزهرية ياسوسين ، والثانية بعد الاول بثلاثة اسابيع ، والثالثة بعد الثانية بثلاثة اسابيع || ونهم من استعمل سائل يورده الحادي ٤٪ من ١٠٪ من سلفات النحاس مع ٨٪ من الكلس .

### ٢٣٩١٧ - كَلْفَةُ الخَوْخ \*

*Phyllosticta prunicola* (S).

وصم يصيب الخوخ والاياص سببه فطر مجهري يركب الارواق فيطبا ويقدها الى الاثمار الباكر || مظهره الخارجي يثور مستديرة او بيضية الشكل تملو النصل على صفحة العليا . تبدو حطية اللون ، وعاء المحور ، بتفسيه الاطار || يظهر في اوائل آب ويصل الارواق في اوائل تشرين .

٢٣٩١٣ - كَلْفَةُ الزَيْتُون \* - *Phyllosticta olea* (S).

فطر مجهري يمتري الزيتون بارواقه الفنية فيؤذيها بعض الشيء || مظهره الخارجي يثور مستديرة قطرها نحو ١ م . تركيب النصل على صفحته العليا . تبدو حطية اللون ثم غبراء ، يحمطها طار اسمر || بكنيداته حكاكية الشكل ، شفافة ، لاقياسه ٣×٣ م . ميكرون || لا يستوجب المكافحة نظرا لقله اذاه .

### ٢٣٩١٤ - كَلْفَةُ السَّيَم \*

*Phyllosticta antirrhini* (S).

فطر مجهري يصيب السيم في اوراقه وفروعه . مظهره الخارجي ، على الارواق ، يثور مستديرة قطرها من ١ الى ٢ م . لونها الى الصهبة يكتنفها طار اخر || وهو على القروح بقع قرمزية لونها الى الجوزة السمره || بكنيداته غليظة ، لاقياسية التجميع ، قياسها نحو ١٠٠ ميكرون ، بويضاته مستطيلة قياسها ٢×٥ ميكرون .

### ٢٣٩١٥ - كَلْفَةُ الصَّبِيَّيَّات \*

*Phyllosticta brassicae* (S).

فطر مجهري يصيب نباتات الفصيلة الصليبية . مظهره الخارجي بقع مستديرة قطرها نحو ٨ م . تركيب النصل الارواق ، تبدو فاقمة الخضار ثم غبراء اللون || بكنيداته



كَلْفَةُ الثَّيَغ



كَلْفَةُ الخَوْخ



كَلْفَةُ عَابِقَةٍ



كَلْتَنِيَّاس



كلنكو

٢٠ منها المناطق الاستوائية. مظهرها يري وبعضها  
زيتني. سوقها عشية أو ليفية. اوراقها متعاقبة،  
بيضية الشكل. نصلها جامد الصفحة المائلة البشرة.  
ازهارها ملثقي التجميع، تاجي الازتكاز. ازهارها رباعية  
التركيب بها البيض والصفير والحمر. ثمارها جراه رباعية  
العلق || اوراقها تنفخ القروح وتندمل الجروح.

Calanus (S).

Calane (F). Calanus (E).

دوبية بحرية من القشريات مجذافيات الارجل وفضيلة  
الكلنوسيات || جسمها صغير الحجم، شبه مخروطي الشكل  
مستعرض الصدر، وسيد العين، عديم الحواف ||  
تنفخ حل الطروح، جماعتها وافر البدد.

Calandidae (S).

Calandridae (F). Calandridae (E).

فضيلة دوبيات مائية من القشريات مجذافيات الارجل.  
اجناسها قليلة العدد اما انواعها كثيرة، مظهرها بحري  
يمش في مختلف بحار العالم وبعضها بحري يعيش في  
الانهر والبحيرات والمناطق.

٢٣٩٣٦ - كلورة، كلية، حثو

Rein (F). Kidney (E).

عضو في الجسم كلوي الشكل يفرز البول. هما كليتان  
او سقوان مركزهما من جانبي السلسلة الفقرية.

٢٣٩٣٧ - كلوة الماء، لاجم الضفدع

Hydrocharis morsus-ranae (S). Hydrocharis, Hydro-  
charidae, Morrène, Mors da grenouille (F). Frog-bit,  
Frogs-bit (E). Echter Froschbiss (D). Favagello di  
chiana, Morso di rana (I).

نبات عشبي يري مائي معمر وسيد الجنس والنوع من فصيلة  
كلويات الماء. يعيش في المياه الراكدة وتزين به الاحواض.  
سوقه سلبية متقاربة العقد. جلوهه ضمية التجميع تنشب  
من العقد. اوراقه مستطيلة الاضلاع كلوية الشكل تطول  
وتعرض من ٤ الى ٥ سم. نصلها سميك الصفحة احضر  
اللون. ازهاره ثلاثية الفصل والبتلات البيض || ازهاره  
يستمر من حزيران الى آب.

Chlore (F). Chlorine (E).

غاز سام اقل من الهواء لونه ال اخضر الزيتي. رائحته  
محزنة تشبه السعال. وزنه الاتومي ٣٥,٤٦ وزنه (كل  
جرام) || يوجد في الطبيعة مختلطاً بفيزه من العناصر  
اختلفة اغصها ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) وهو  
يتميز بميله الشديد الى الاتحاد بالفلزات والالانزات  
يكثر من المطهرات المشهورة ويستعمل في تطهير مياه  
الشرب. كما أنه يستخدم في اغراض في اهمها تبييض  
للنسوجات القطنية والكتانية وصناعة قنابل الغازات السامة.

Chlorops (S).

٢٣٩٣٩ - كلورويس

ذباب اسفر اللون يعرف بضمفراء العين، راجع خزياء.

Chloroplasta

٢٣٩٤٠ - كلوروبلاست

جسيمات الخلايا النباتية الملونة بالحمض والتي يتركز عليها

التصوير الضوئي.

٢٣٩٤١ - كلوروفرم

سائل عادم اللون اثره الرائحة ينتج عن الكلور مع الكحول

يستعمل في الطب كمنج يندمل الاصباح.

Chloroforme (F).

Chloroform (E).

والجنوبية. اوراقها متعاقبة. ازهارها جملة الشكل،  
زاهية الالوان، لانهاية التجميع والازتكاز || اعرف  
انواعه واشهرها ما يلي.

٢٣٩٢٧ - كلندين خيمية

Calandrinia umbellata (S). Calandrinia umbellata (F).

جملة زيتونية معمرة تملو نحو ٤٠ سم. ساقها ثناء جبوية  
اللون. فروعها فائقة. اوراقها صنية خيفة تطول نحو  
٢ سم. نصلها خلي البشرة حل صفحته. ازهارها خيمية  
التجميع، تاجية الازتكاز، كثيرة العدد، صنية  
القد، حراء اللون، بنفسجية الموالج || ازهارها يستمر  
من تموز الى ايلول.

٢٣٩٢٨ - كلندين رشيقه

Calandrinia discolor (S). Calandrinia discolor, C. elegante (F).

جملة زيتونية معمرة تملو نحو ٨٠ سم. ساقها منتصبه فراء.  
اوراقها ملثية مقطعية. نصلها بحري الصفحة العليا  
احمر السفلى. ازهارها عشوية التجميع، كبيرة القد، قطرها  
براوح من ٤ الى ٦ سم. لونها ال البنفسجي الازرق الموالج.  
ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

٢٣٩٢٩ - كلندين فاحخرة

Calandrinia spectabilis (S). Calandrinia remarquable (F).

عشبة زيتونية حولية تملو نحو ٩٠ سم. ساقها منتصبه  
فراء. اوراقها مبيضة الشكل تطول من ٣ الى ٤ سم.  
نصلها بحري اللون جامد الصفحة. ازهارها عشوية  
التجميع، كبيرة القد، قطرها براوح من ٥ الى ٧ سم.  
لونها ال الازرقوي للموش والمضلع بالاسود || ازهارها  
يستمر من تموز الى ايلول.

٢٣٩٣٠ - كلندين كبيرة الزهر

Calandrinia grandiflora (S). Calandrinia à grandes fleurs (F).

جملة زيتونية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها منتصبه  
فراء. اوراقها بيضية ذرية تطول من ١٢ الى ٢٠ سم.  
وتعرض نحو ٨ سم. نصلها اخضر اللون، سميك الصفحة.  
ازهارها كبيرة القد لورية التجميع، محورية الازتكاز،  
قطرها براوح من ٤ الى ٦ سم. لونها ال الوردى الموش  
بالاصفر والاسود || ازهارها يستمر من حزيران الى  
تشرين الاول.

٢٣٩٣١ - كلندين هشوي

Calandrinia menziesii (S). Calandrinia de Menzies (F).

عشبة زيتونية حولية منتبسة. ساقها تطول من ٢٠ الى  
٤٠ سم. اوراقها ملثية ملثية الشكل تطول نحو ٨ سم.  
اوراقها العليا سانية خيفة. جميعها مائلة النصل الاخضر.  
ازهارها عشوية التجميع، محورية الازتكاز وتاجية،  
صغيرة القد، ارجوانية اللون || ازهارها يستمر من  
حزيران الى تموز.

٢٣٩٣٢ - كلندينليات

Calandriniales (F).

Calandriniae (E).

سبط من فصيلة الرجليات يشمل بعض الاجناس والانواع  
نواهاه عشية أو مجلية وبيضية. معظمها امريكي المنبت.  
ازهارها عشوية. ثمارها جراه ثلاثية الفلق.

٢٣٩٣٣ - كلنكوره

Kalanchoe (F).

Kalanchoe (E).

جنس نباتات طيبة معمرة من فصيلة المخلدات. انواعه نحو



كلوة الماء.

كبرتان. زباناها صولجانيان. جرشها الى الطحلة الرصاصية الزرقاء المواج. بطنها اصغر القوب اسمر المواج || رواشتها ، هند الشقين ، الى الخططي الاسمر الاسفع المواج يملو في الزوج الخلفي حثار ضيق اخبر وتتواءم حطيفة تبدو كزوائد نودلية الشكل || لها جيلون في المحل . تظهر فراشة الجبل الاول في مطلع ليسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في تموز . تعاقل بعد ظهورها باربعة اسابيع وتمتص المكن ميحاديا على الصفحات السفلى من نصال المائل || السرة تطول نحو ١٤ سم . جسمها مستطيل البسط . مستنق القدم والمخبر ، كسني القون يملو خطان جانبيين اصفران وعشرة اطواق جزوية . اما الطرق الصدري الاول فأسود كالرأس . منها ورواجها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر في الجبل الاول نحو ١٥ يوما وينتفضي معلقا بانفان النبات ، يستمر في الجبل الثاني نحو ٣٠ اسبوعا .

Kaloula (S). ٢٣٩٥٠ - **كلولة** °

Kaloula (F). Kaloula (E). جنس صفاد قاذبة من فصيلة الرانانيات . انواعها المروفة خمسة . موطنها الهند والصين وبالايزية والفلبين || اجسادها مستدلة القد أو صغيرة . تتميز باصابعها الممددة المجهزة بمحاج طرفية . حطابها قليل الانبساط عند حتى اوائل الزام الثاني من الاصابع || انوثها السائلة الى السرة الزيتية يملو تبغيع اشهب اسمر ورقشة حطيفة تمتد من مؤخر الرؤوس الى اطراف القوائم .

Collomia (S). ٢٣٩٥١ - **كلومية** °  
Collomia (F). Collomia, Queen Ann's tymbia (E). Blumenschleimame (D). Collomia (I). جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة القبيقيات . انواعها قليلة ، سويقها واوراقها زباب لينة . ازهارها رؤسية كثيفة التجميع . يستخرج من بزورها غراء نباتي يدخل في حلة تراكيب || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

Collomia coccinea (S). ٢٣٩٥٢ - **كلومية أزجوانية** °  
Collomia coccinea (F). Collomie écarlate (F). عشبة ترينية سبروتية تملو نحو ٥٠ سم . ساقها قليلة الفروع ، زباب اللحاء . اوراقها بيضيه مستطيلة ، نصلها ثلاثي او رباعي للترشح القدي . رؤسيتها الزهرية مستوية القد . ازهارها حمر الابواق صفراء الاناثيب || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

Collomia grandiflora (S). ٢٣٩٥٣ - **كلومية كبيرة الزهر** °

Collomia grandiflora (S). Collomie à grandes fleurs (F). عشبة ترينية سبروتية تملو من ٢٠ الى ٧٠ سم . ساقها فراء . اوراقها سنانية عتيقة تطول من ٤ الى ٥ سم . وتعرض من ٥ الى ١٠ سم . نصلها خيل البشرة . رؤسيتها الزهرية كبيرة القد . ازهارها مستطيلة ، كزوسها سنلة الحافة ، توجيحاتها تظهر صفراء اللون ثم تتصرف ، مع الادراك ، الى الحمرة || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين .

Hydrocharidæ (S). ٢٣٩٥٤ - **كلوريات الماء** °  
Hydrocharidæ (F). Hydrocharidæ (E). فصيلة نباتات مائية من فصيلة الفلقة . اجناسها وانواعها عديدة . احرف اجناسها الاقطنان والطرقت وكلوة الماء ووش الماء .

٢٣٩٤٢ - **كلوريدات ، هيدروكلورات**  
Chlorhydrate (F). Hydrochlorate (E). هو ملح الحامض الكلوريديني .

٢٣٩٤٣ - **كلوريد** °  
Chlorides (S). Chloride (F). جنس سحرات ضارة من فصيلة الزمفقيات . انواعها ١٠ جميعها مستطلة القد خيشها الجسم . مستطيلة القرون الاستشارية الشارية الفواصل . الوانها زاهية . اتحادها عتدة يمتزجها بتجديد وتسليج . رفاقتها خاضلة أو نائمة تركب بعض النباتات من مختلف الفصائل .

٢٣٩٤٤ - **كلوريد البوتاسيوم ، كلوريد البوتاس**  
Chlorure de potassium (F). Chloride of potassium (E). سداد بوتاسي يحوي من ٤٦ الى ٥٠ ٪ من البوتاس الصريف وهو ملح ابيض اللون يتميز بسرعة ذوبانه في الماء ويهبط انفعاله وتركيبه في التربة .

٢٣٩٤٥ - **كلوريد الصوديوم ، كلوريد الصوديوم**  
Chlorure de sodium (F). Chloride of sodium (E). هو ملح الطعام المعروف .

٢٣٩٤٦ - **كلوريل** °  
Chlorelle (F). جنس نباتات مائية من الخفيات الخضر وحيدات الخلايا المجهريات . هيكلها كروي الشكل ، قشرها نحو ٨ ميكرون . تعيش في المياه العذبة جماعات واقر المبدد على المدارات والجذريات وغيرها || وهي زاهرة المواد الغذائية اغصها البروتينات والغلوسيد والاسم والفيتامينات والكثير من طفيف العناصر || تكاثرها الجنسي في المحيط الملائم يعطي ابيد النتائج . نتاجها الجاف واقر المواد الغذائية القيمة .

٢٣٩٤٧ - **كلوريات**  
Clusiaceae (S). Clusiaceae, Guttifères (F). Clusiaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة التعلات سفلية الاسمية . اجناسها وانواعها عديدة جميعها اشجار وشجيرات سوقها منتصبة أو عارشة . اوراقها ابدة جامدة النصل . ازهارها عتقودية التجميع ، محورية الايتكان أو تاجية . ثمارها لوية ، قشرها جلدية ، لبها غزير المصارة الراتنجية الصفراء اللون التي تصعب بلية بعد جفافها .

٢٣٩٤٨ - **كلورية**  
Clusia (S). Clusie, Clusier (F). Clusie (E). جنس نباتات عارشة مستقلة من فصيلة الكلوريات . انواعها قليلة ، سوقها تطول نحو ١٠ امتار تركب الاشجار الحرجية فتتضي عليها || يستخرج من سوقها حليب اصفر اللون ، دبق للمادة الراتنجية ، يستعمل في تطبيق جروح الحيوانات اغصها الخليل والبقر .

٢٣٩٤٩ - **كلوفريس الموسج** °  
Calliphrys rubi (S). Calliphrys des ronces (F). Calliphrys rubi (E). حشرة من فصيلة القنليات وربة حوشيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم . فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقها تعيش على الموسج واللوزاك والزان || جسمها صغير القد يطول نحو ١٠ سم . يسطحها نحو ٢٨ م . رأسها معتدل الحجم . عيناها



كلوريد



كلوفريس موسج

التجميع ، عذرية الاوتكار او تاجية . ثمارها عنبية لا مأكولة لأنها الى الحمرة البنفسجية || اشهر انواعها ما يلي .

#### ٢٣٩٦٥ - كَلِكْرَبَه اُرْجُونِيَه

جنية تَرْيِينِيَه رَفَهه مَهْدَا اليابان . تملو نحو ١٠٠ سم .  
اوراقها بيضيه الشكل طول نحو ٧ سم . نصلها اخضر الصفه العليا ، ازغب السفلى . عناقيدها الزهرية رمله ،  
ازهارها ارجوانية اللون زاحيه || ازهارها يستمر طوال  
شهر تموز .

#### ٢٣٩٦٦ - كَلِكْرَبَه اَمْرِيْكِيَه

جنية تَرْيِينِيَه رَفَهه مَهْدَا امريكة الشمالية . تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها فراء . اوراقها مستطيلة الاعناق ،  
نصلها خلى البشرة عل صفحتيه . ازهارها تاجية . بنفسجيه اللون رمله المتنايد || ازهارها يستمر من سزيان الى  
تموز .

#### ٢٣٩٦٧ - كَلِكْرَبَه صِينِيَه

جنية تَرْيِينِيَه جَادِسَه مَهْدَا الصين . تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها فراء . اوراقها طول من ٥ الى ١٠ سم . نصلها ازغب الصفحه السفلى زغبه نجى التركيب .  
ازهارها تاجية كثيفه التجميع ودية اللون || ازهارها  
يستمر طوال شهر تموز .

#### ٢٣٩٦٨ - كَلِكْرَبَه يَابَانِيَه

جنية تَرْيِينِيَه سِرْبُونِيَه مَهْدَا اليابان . تملو نحو ١٠٠ سم .  
اوراقها منقعه طول من ١٠ الى ١٥ سم . وتعرض من  
٦ الى ٩ سم . نصلها لاص الصفحه العليا ، ازغب السفلى ،  
متباعد التسنين المشاري . عناقيدها الزهرية صغيرة القد .  
ازهارها ودية اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى  
تموز .

#### ٢٣٩٦٩ - كَلِكْكَتْسُ

جنى جنات تَرْيِينِيَه عطرية من فصيلة الكليكتسيات .  
انواعه ست . سوقها منتصبه تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم .  
اوراقها كاملة متقابلة . ازهارها فردية ، عذرية او هامية  
الافكار ، حيلة الشكل ، عذرية اللون ، فواحة العرف  
الطري الشبيه بالفانح والشام .

#### ٢٣٩٧٠ - كَلِكْكَتْسِيَّات

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ، اجناسها وازواعها عديدة .  
نباتاتها اشجار وجنات . سوقها وفروها مطمعة . اوراقها  
متقابلة . ازهارها حيلة الشكل ، عطرية العرف .

#### ٢٣٩٧١ - كَلِكْمِينِيَه ، كَلِكْمِينِيَت

جنس حيوانات من الرخويات اُرسبات الابلج ربايعات  
الحياض وفصيلة الفلتياتيات . انواعها المعروفة نحو ٤٠  
جميعها من متحجرات الحقبة الليثونية || اصدها قرصية  
الشكل ، معتدلة القد . اخدها القرصي يستمر من القروعة  
الى العقب .

#### ٢٣٩٥٥ - كَلْتِي . Cosses, Grandes tectrices (F).

من ريش جناح الطائر ما يكو قواعد الابرار والكل  
قسان صغيرة وكبيرة . الصغيرة تلتفت الكبيرة والكبيرة  
يُكسو الابرار .

#### ٢٣٩٥٦ - كَلْتِيَه

هي الكلوة ، اطلها .

#### ٢٣٩٥٧ - كَلْتِيرِيَش \*

جنس قروء امريكية من فصيلة البوسيات . انواعه ١٥  
موطها حوض الامازون . اجسامها رشيقة . رورها  
مستديرة . قوائمها متوسطة الطول . اذناها كاسية مملقة لا  
اخافة . اثنائها قصيرة الشعر المتجان الا لارلن || تألف  
الاسراج والذنايت . رمتها الاشجار تنغل بينها بشفة الجبر .  
قوتها التبار والخراش والمصابير .

#### ٢٣٩٥٨ - كَلْيُس اُرْخَب

هو الصملول الازغب ، اطله .

#### ٢٣٩٥٩ - كَلْيُس اَهْمِيَت

هو الصملول الاहित ، اطله .

#### ٢٣٩٦٠ - كَلْيُوسِيَب

جنس فلور موزية من الفاريقيات مركب بحشيشه القدي  
الشكل اريومات واسع وجنور بعض النباتات الزهرية  
منها الموز وقائعه والكريمة والكنيا والكرزونية وقد يركب  
ايضا ، في ظروف خاصة ، التعلج والمشمش والفانح  
والجسورة والياسمين || مشيحه غزير المادة وافر القند  
المتشبه . يتركز بين الماء والسكر او بين الجردة  
والخشب فينبط الادرية والتنج حل اختلافا ثم يقضي حل  
البادئ التسنن || يكالنج بقتلح الاشجار الموصولة ويظهر  
التربة بالكلس الحارن .

#### ٢٣٩٦١ - كَلِيَجَه \*

جنس دوبيات بحرية من القشريات الدنيا وفصيلة  
الكليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد . اجسامها  
صغيرة ، وحيدة العين ، عادمة العاف . تتطفل على  
الاممك .

#### ٢٣٩٦٢ - كَلِيَجِيَّات \*

فصيلة دوبيات بحرية من القشريات الدنيا مجناتيات  
الابلج . اجسامها وازواعها عديدة . جميعها طليعية تعيش  
على مختلف انواع الاممك انحصا اُنقاديات .

#### ٢٣٩٦٣ - كَلِيَش

هو ملح التبل كما يستخرج من المناجم وهو يندى بعد  
استصلاحه بتركيزه يترات التبل او يترات الصودا الطبيعي

#### ٢٣٩٦٤ - كَلِكْرَبَه \*

جنس نباتات جنية معمرة من فصيلة الساجيات . انواعها  
قلية معظمها تَرْيِينِي . وراقها متقابلة احليجية ، مسطيلة ،  
ممنعة الحافة ، خدية الصفحه السفلى . ازهارها عذرية



كَلِكْرَبَه



كَلِيَجَه



كَلِكْرَبَه



كَلِكْمِينِيَت



كَلِيَسَه

٢٣٩٨١ - كَمْءُ أَسْوَدٌ \* كُنُشُج

Tuber melanosporum (S). Truffe noire, T. de Périgord (F). Black truffle, French truffle (E). Echte Trüffel, Schwarze Trüffel (D). Tartufo nero (I).  
نوع من الكمء المأكول الجيد الصنف . درنته كبيرة  
أثقل حجمها قدر البيضة الصغيرة . ثمومًا بارزة لونها إلى  
الصبغة . لهاها أمد اللون أسفع الملوخ عند الإدراك .  
تدرك في الخريف .

٢٣٩٨٢ - كَمْءُ شَتْوِي \* بَسَات الرَعْد

Tuber brumale, T. hiemale (S). Truffe d'hiver, T. hiemale (F). Winter truffle (E). Französische Trüffel (D). Tartufo brumale (I).  
نوع من الكمء المأكول المتوسط الصنف . درنته مستديرة  
حجمها حجم الجوزة . ثمومًا إلى السرة السوداء . لهاها  
احمر اللون يضل بكنهه خاصة . تدرك في الشتاء .

٢٣٩٨٣ - كَمَاء \* Rabassier (F).

جامع الكمء .

٢٣٩٨٤ - كَمَاء \* Truffe (F). Truffie (E).

واحدة الكمء .

٢٣٩٨٥ - كَمَاءُ الماء \* Macre (F).

هي المكر ، نبات من الاخدرات ، اطليه .

٢٣٩٨٦ - كَمُح \* Préfloraison (F).

نشور أجزاء وأعضاء الزهرة داخل الزرعة أي البرعمة الزهرية .

٢٣٩٨٧ - كَمُحَاء \* Frein (F).

هي الكباشه ، راجعها .

٢٣٩٨٨ - كَمُحَاخ \* Pampination (F).

الكحخ ثومة براعم الكرمه وانتشارها .

٢٣٩٨٩ - كَمُحَاخَة \* Protéranché (F).

كلخ م كاخة . تمت ترميمي يطلق على كل نبات يزهر  
قبل ان يورق .

٢٣٩٩٠ - كَمُحَادُ زَيْتُون \* Germandrée officinale (F).

هو الطورقون الحزري ويدهي أيضاً حامادريوس .

٢٣٩٩١ - كِمَاس \* Kemas (S).

Céma (F). Kemas (E).  
جنس حيوانات لبونة عاشية بجرة من فصيلة الابلات .  
انواعه المعروفة اربعة موطنها يمتد من الهند إلى الصين  
وبشورية . تألف الحصاب والجبال من ارتفاع ١٠٠٠ م .  
حتى ٢٧٠٠ م . من سطح البحر . ملجئها احيائي جماعي  
إجمالها قليلة العدد الذي يراوح من ٥ إلى ٩ انفار ||  
اجسامها قريبة الشبه باجسام الظباء كما وانها تشبه الحزري .  
قرونها صغيرة متتابعة الحيد ، مستديرة الاطراف المنحرفة  
إلى الوراء . رؤوسها صغيرة ذلقة الاضلاع . اعتاقها  
مستديرة . قوائمها شديدة النشط . ألوانها تختلف مع الانواع  
تكثر فيها السرة للنباتية للماجات . خروج انثا ثنائية  
الاخلاط . هبل الاثنى يدمم نحو ستة اشهر تقص في  
تمامه يصفورا واحداً || اعرف انواعه واشهرها كاس فورال .

٢٣٩٩٢ - كَلْبُوب \* Calliopes (S).

Calliopo (F). Calliopo (E).  
طائر من الجاليم وفصيلة الشجوريات . موطنه بعض  
المناطق الشرقية من القارة الاسيوية . ملجئه احيائي زبني  
بامتياز زين الطعاج حيث يتجمع إلى اسراب وافرة العدد .  
يألف الهادي والخرج . قوته الحشرات الصغرى والبالور  
البرية || جسمه صغير القد ، قريب الشبه بالنج ،  
طوله نحو ١٦ سم . ثوبه إلى السرة الزنية المتفاوتة  
الماجات . رأسه وجناحه أعين من رذله . زوره احمر .  
منقاده مخروطي الشكل . ذنبه مستدل الجرم ، مقطوم  
الطرف || يذئن حشه على ارتفاع ٢٥٠ أو ٣٠٠ سم .  
من سطح الارض . الاثنى تحضن بمناوبة الذكر من ٤  
إلى ٥ بيضات .

٢٣٩٩٣ - كَلْبُوبَة \* Cléome (F).

هي الفرة ، اطلبها .

٢٣٩٩٤ - كَلْبُوبِيم \* Cléome (F).

هي السبكة الصيداء ، اطلبها .

٢٣٩٩٥ - كَم \* Buttage (F). Ralsing, Mounding (E).

الكم ويدعى التخيخ هو جمع التراب عند سوق الثبات .  
الغاية منه دم الساق وسحبها على انتاش الجذيرات وإيماد الماء  
فيها وزيادة تعريض التربة إلى اشعة الشمس ، إلخ .

٢٣٩٩٦ - كَم \* Périanthe (F). Perianth (E).

هو غلاف الزهرة أي جماع الكأس والتويج . وقد سمي كما  
لانه يستر ما ينشق عنه . ج . اكام وكام وَاكَة .

٢٣٩٩٧ - كَم \* Tuber (S). Truffe (F). Truffie (E).

الواحدة كَمَاءُ والثنى كَمَاتَانِ والجمع كَمءُ وأكوءه وكأت .  
جنس فلور ذرية من الرقيات وفصيلة الكشيات . تنبت  
وتتكاثر تحت الارض فتتفصها . غلافها جلدي اللصق  
قوولي التركيب يحضن العلة التناسلية البرنية . لهاها  
سردى التركيب جامد المادة || انواعه عديدة مختلفة  
الاشكال والاحجام والالوان اشهرها ما يتبع .

٢٣٩٩٨ - كَمْءُ أَيْتَش \* Tuber hiemalbum, T. album (S). Truffe blanche (F).

White truffle, False truffle (E). Weisse Trüffel (D).  
Tartufo bianco, T. del Piemonte (I).  
نوع من الكمء المأكول المادي الصنف . درنته متوسطة  
القد منخفضة الثعل . لهاها ابيض اللون مسكي العرف .  
تدرك في الخريف .

٢٣٩٩٩ - كَمْءُ أَحْمَر \* Tuber rufum (S). Truffe rouge (F). Red truffle (E).

Rote Trüffel (D). Tartufo rosso (I).  
نوع من الكمء المأكول الفاخر الصنف . درنته مستديرة  
مقطوعة القامة . ثمومًا ناشرة لونها إلى الجوى الاسمر .  
لهاها احمر اللون مستحب الطعم ، تدرك في اواخر الخريف .

٢٣٩٨٠ - كَمْءُ أَرْمَد \* Tuber magnatum (S). Truffe magnate, T. grise (F).

Gray truffle (E). Lauch Trüffel (D). Tartufo bigio (I).  
نوع من الكمء المأكول المادي الصنف . درنته بيضية  
الشكل مفلطحة ، ثمومًا مستديرة مبطلعة رمادية اللون .  
لهاها اغبر . تدرك في الخريف .



كَلْبُوب



كَمْءُ اسود



كَمْءُ ايتش



كَمْءُ اسود



كَمْءُ شتوي

## ٢٣٩٩٢ - كِيماس غُورال \* Kemas gorai (S).

Céma gorai (F).

نوع من الكيماس . موطنه يمتد من كمشير الى برمانية وأسام . يأتلف الزهر للمواقع الكثيرة الصنوبر . يسرح من الجحر الى نحو الساعة الثامنة ومن العصر الى قفصة الليل || جسمه ريمية بطول نحو ١٣٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٥ سم . ارتفاعه نحو ٨٠ سم . وزنه نحو ٧٥ كيلو . قوته بطول نحو ١٨ سم . عند الذكر ونحو ١٤ سم . عند الانثى . رأسه صغير الحجم . ذلق الخطم . عيناه كيرتان مكملتان ومبطقتان بخمار اصفر . اذناه صغيرتان مستطيلتان الشكل . قوائمه شفيدة النضف . ثوبه الى النسرة الحمراء المزاج يمتد في الرأس والظهر ويتحول تدريجياً الى الشفحة في الصدر والبطن || ابله يمد تمة انفار . ذكر مائع واربع اناث واربعة شواذن .

## ٢٣٩٩٣ - كَمَاسِيَا Camassia (F).

هي الكشم من الزنايق ، اطلية .

## ٢٣٩٩٤ - كَمَاسَا Polycarpa (S).

Polycarpée (F).

جنس نباتات عشبية حولية وبسرة من فصيلة النمرانيات . انواعه المعروفة عديدة منهاها معظم الاصناف الحارة من العالم القديم || سوقها مستقلة متعابدة الفروع . اوراقها متقابلة ريمية النضف . ازهارها خالية البتلات والسيال الضيقة الحادة الاطراف . لونها الى البياض الاعصر المزاج .

## ٢٣٩٩٥ - كَمَاسَانِير Athamanta macedonica (S).

Athamante, Ache des rochers, Persil de Macédoine (F). Macedonian parsley (E). Macedonische Petersilie (D). Prezemolo di Macedonia (I). نبات عشبي بري معمر ميلول من فصيلة الحيات . اوراقه مفرضة وبسرة نضفها على البسرة على صبغيتي . ازهارها صيدوانية وردية اللون . يقال انه طيب يستعمل في معالجة الموارض المعوية .

## ٢٣٩٩٦ - كَمَاسِيَانِير كَمَاسِيَانِير

قال الانطاكي « هو الحامايض يعني صنوبر الارض ثبت كيمي » العالم الصغير في تغتيل اوراقه وامتلاها بالارطوية وازارها له زهر اصفر يختلف حسب اصفر من زهر الكرسي ابيض الاصفر مر العلم يفتح السد ويدور ويزيل الرياح ويواجه الظهر والمفاصل . »

## ٢٣٩٩٧ - كَمَاسَا \* Echinus Phillipensis (S).

Kamala (F).

جنية زراعية معمرة من فصيلة البتوسيات . مهدها الهند . ساقها فراء . اوراقها معتقة ، متعاقبة ، بيضية النضف المذهب الطرف . ازهارها عنقودي التجميع تاجي الازرناك . ثمارها بلوطية الشكل تنلفها ثمرل دقيقة تتحول الى غبار يرتقلى اللون خطي المزاج يستعمل في صباغ الالفة الخيرية ويستعمل ايضاً لطرد البؤدة الوحيدة . النضف منه ترواح من فراين الى ١٢ غراماً وذلك بالنسبة الى عمر الزهر .

## ٢٣٩٩٨ - كَمَاسِيَا Alchemilla (S).

Alchemilla, Aichmilla (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الورديات . انواعه قليلة منها الحولية والمعمرة تكثر في المراعي والارواح الجبلية . يحزن اليها بعض الخواص الطبية ويقولون انها شايقة وتؤثر اغشية البكرة فغيب البراني فعدن كيمي .

## ٢٣٩٩٩ - كَمَاسِيَا البَر \* Alchemilla arvensis (S).

Alchemille des champs, Perce-pierre des champs (F). Break-stone, Colic-wort, Parsley plant (E). Feldsinau, Steinbrach (D). Spack pider, Petricolo (I).

نوع من الكالاية تكثر في المراعي الجبلية .

## ٢٤٠٠٠ - كَمَاسِيَا المَرُوج \* Alchemilla vulgaris (S).

Alchemilla communis, Mantelet de dame, Pied de lion, Porte rosée (F). Great sanicle, Lady's mantle, Lion's foot (E). Löwenfuss, Mantelsinau, Sinau (D). Alchemilla comune, Ventaglina (I).

نوع من الكالاية تكثر في المروج . اوراقها طيبة شايقة وموارة .

## ٢٤٠٠١ - كَمَاسِيَا فِصِيَا \* Alchemilla argentea (S).

Alchemilla argentée, Sainée (F). Alpine lady's mantle (E). Alpensinau, Alpenfrauenmantel (D). Alchemilla alpina (I).

نوع من الكالاية المعمرة تكثر في اسراج الجبال العالية ، اوراقها خلية البشرة فضية المزاج .

## ٢٤٠٠٢ - كَمَاسَا Caveçon (F).

Headstall, Curb (E).

ما يكس به في الحيوان .

## ٢٤٠٠٣ - كَمَاسَا مِفِطْمِيَا Muffière, Muselière (F).

Muzzle (E). اداة تغلف فم الحيوان تحميه من الرضاعة والااكل والعص .

## ٢٤٠٠٤ - كَمَبَرِي Cambrien (F).

Cambrian (E). اسم يطلق على الحفوة الاوئل من الابايح القديم . يقال الصخر الكمبري والحفوة الكمبرية ، وهي تتميز باحترائها على اقدم صخر الكرة الارضية .

## ٢٤٠٠٥ - كَمَبُودَا Campodea (S).

Campode (F). Campodea (E).

جنس حشرات دامتة من فصيلة الكمبوديات ورتبة لاختات المتك . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، معتدلة التسطيع ، مبشرة الحلب الفتيق الناعم ، تطول من ٦ الى ١٠ سم . اقلها الى البياض البتني . رؤوسها شبه مكورة . متاكها لاطقة . قربها الاستشارية غيبية . عيونها شفيدة الصفر . صدورها ثلاثية الحلقات . بطونها عشارية السكم ، قصية ، اي سرعامة السكب . قوائمه نخيلة . ارساها ثنائية العقل . اسراكها دقيقة مستطيلة || يكثر وجودها تحت الحجارة وفي المواقع الرطبة . قوتها المواد النباتية المتحللة .

## ٢٤٠٠٦ - كَمَبُودِيَا Campodeidae (S).

Campodeidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة لاختات المتك . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، قصية ، بيضاء اللون . عيونها شفيدة الصفر . حلقاها الصدرية الاوئل اصفر من الثانية والثالثة . بطونها عشارية السكم . قوتها الاوئل مجهزة بزرلك حوصلية تنفض . سكبها الثانية والسابعة مجهزة بمرارد صغيرة . اطرافها الشرجية ثنائية الاسراك || اصراف اجناسها الكمبود .



كالشير



كالا



كالاية البر



كالاية فضبة

كالاية المروج



كمبود

بعض الاصناف الامريكية اعصابها كليفورني والمكسيك ||  
جسمه كبير القد . طوله نحو ٧٠ سم . وبسطه نحو  
١٠٠ سم . ثوبه الى السواد اللامع . جناحاه مبلقان  
بالابيض . حدة عينه الى الصفار الذهبي . مقادده وساقاه  
واصابعه الى الزرقة الطحلاء || اخلاطه لزجة لكنه يتجنب  
الانسان ويتخذ من الصمراخ . يتسلق جنوح الاشجار  
قفزاً . طيرانه طويل الشوط كثير التجمعات والسيف ||  
قوته الحشرات على اختلاف فصائلها واجناسها ثم الاثمار  
البرية والبلوط || يعيش ذكراً وانثى لا يفرقها سوى الموت .  
يذئن عنه في تجاويف الاشجار الرقيقة . الانثى تبيض  
من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها دون الذكر الذي  
يؤن لها الغذاء .

#### ٢٤٠١٩ - كمكامل اميري \*

*Campephilus principalis* (S).  
*Campephilus princier* (F).

نوع من الكمكامل موطنه بعض مناطق امريكا الشمالية من  
فلوريدا الى كاليفورنيا والتكساس || جسمه كبير القد  
طوله نحو ٥٨ سم . وبسطه نحو ٨٢ سم . ثوبه الى السواد  
اللامع . جناحاه وعلاخاه متعة مبلقة بالابيض . حدة  
عينه الى الصفار الذهبي . مقادده عاجي اللون . ساقاه  
واصابعه الى الزرقة || اخلاطه لزجة لكنه كثير الرجل .  
قوته الحشرات والاساريع والنمل والثمار البرية والبلوط  
والبلوط || يتسلق الاشجار قفزاً . طيرانه معتدل الشوط  
كثير التجمعات || يعيش ذكراً وانثى لا يفرقها سوى  
الموت . يذئن عنه في تجاويف الاشجار على ارتفاع بعض  
الامتار . الانثى تبيض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها  
وحدها دون الذكر الذي يؤن لها الغذاء .

#### ٢٤٠٢٠ - كمكاتك \* Kumquat

هي ليمون ككات . شجرة زراعية مشرقة من الحمضيات .  
ها ضربان مشهوران هما :

#### ٢٤٠٢١ - كمكاتك مُستديرة \* Citrus japonica madurensis, Limonellus madurensis

(S). Kumquat à fruits ronds, «Marumi» (F).  
ضرب من الكمكات . اسمه الياباني «مارومي» . ثمرته  
مسرعة متوسطة القد تملو نحو ٤ اثمار . اوراقها متعقة  
متعاقبة سنائية . نصلها جامد الصفحة الخضراء اللامعة .  
ثمارها كروية صفراء اللون مائلة البشرة . قشرها يراوح  
من ٢٠ الى ٣٠ م .

#### ٢٤٠٢٢ - كمكاتك مُستطيلة \* Citrus japonica margarita, C. margarita

(S). Kumquat à fruits oblongs, «Nagami» (F).  
ضرب من الكمكات اسمه الياباني «ناغامي» . ثمرته مسرعة  
متوسطة القد تملو نحو خمسة اثمار . اوراقها متعاقبة ،  
متعقة ، سنائية ؛ نصلها جامد الصفحة المائلة ؛ شديد  
الخضار اللامع . ثمارها مستطيلة اجسامية الشكل صفراء  
اللون طويلاً نحو ٤٠ م . ورضها ٢٥ م .

#### ٢٤٠٢٣ - كمككام Essence de la marjolaine (F). Oil of the sweet marjoram (E).

هو دهن الرو يستعمل في العطارة . يستخرج بتقطير  
الازهار والاوراق بعد تقمها بالماء . وهو اصفر اللون  
يغمى ويصير مع مرور الزمن . عرفه ذكي الرائحة ، حامز  
الطعم ، يغل عند ١٦٤° مسج . ويلوب بالتكاثف في  
الكمول حيار ٨٥° .

#### Cambium

#### ٢٤٠٠٧ - كمكسيوم

هو القُلب الطبقة المولدة في النبات .

#### ٢٤٠٠٨ - كمك \* هي الاروسة ، المظها .

#### ٢٤٠٠٩ - كمكشورة Poire (F).

هي الاجاصة ، ثمرة الاجاص .

#### ٢٤٠١٠ - كمكشوي Poirier (F).

هي ثمرة الاجاص .

#### ٢٤٠١١ - كمكج Bourgeonner (F). To bud (E).

كبح الكرم اذا تحرك الليراق . واكمت الزمة اذا ما  
ابيضت وظهر عليها خمل كالظن .

#### ٢٤٠١٢ - كمكمر Solive (F). Gilder (E).

#### ٢٤٠١٣ - كمكمر

الكمر من البسر : ما لم يربط على نخله ولكنه سقط فارطب  
في الارض . اما النخلة كجار .

#### ٢٤٠١٤ - كمكش \* ، كمكاسيا

*Camassia* (S). *Camassie*, *Camash*, *Cyanotride* (F).  
*Camass*, *Quamash* (E). *Quamassie* (D). *Camassia* (I).  
من الاسم الهندي « كاش » . جنس نباتات بصلية من  
فصيلة الزنبقيات . ازهارها المعروفة نحو ٨ منها البرية  
والزراعية . اوراقها قرصية الانتصاب خيفة مستطيلة .  
ثمارها اسطوانية جوفاء . ازهارها عذوقية التجميع  
يكلل الشاربخ . ازهارها نجمة الشكل فارشة || اعرف  
ازهارها وانهرها ما يلي .

#### ٢٤٠١٥ - كمكش جوتي \* Camassia hyacinthina, C. fraseri

(S). *Camassie-jacinto*, *Camash-jacinto* (F).  
نوع من الكمكش السبروتي الزنبقي . ثمارها يملو نحو ١٢ م .  
بيلات ازهاره لالاية العروق تطلو من ٦ الى ١٢ م .  
لونها الى الودي يملو مواج ليكلي || ازهاره يستمر  
من نيسان الى ايار .

#### ٢٤٠١٦ - كمكش ليشتين \* Camassia leichdini

(S). *Camassie de Leichdlin*, *Camash de Leichdlin* (F).  
نوع من الكمكش السبروتي الزنبقي . ثمارها يملو نحو  
٩٠ م . بيلات ازهاره خاسية او سباعية العروق  
تطلو من ١٥ الى ٢٥ م . هروبه المشهورة اربعة تختلف  
بالوانها منها الابيض والاصفر والازرق والبنفسجي .  
ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

#### ٢٤٠١٧ - كمكش مأكول \* Camassie esculenta

(S). *Camassie comestible*, *Camash comestible* (F).  
نوع من الكمكش السبروتي الزنبقي لماكول البصل . ثمارها  
يملو من ٤٠ الى ٨٠ م . ازهاره الى الزرقة النيرة المواج ،  
بيلاتا خاسية او سباعية او قساعية العروق تطلو من ٢٠  
الى ٣٠ م . مما يميل قطر الزهرة يراوح من ٥ الى ٧ م .  
ازهاره يستمر من ايار الى سزيان .

#### ٢٤٠١٨ - كمكيل اميراطوري \* Campephilus imperialis

(S). *Campephilus imperial* (F).

طائر من فصيلة التفاريات ودية المتسلقات . موطنه



كش



كمكيل اميراطوري



كمكيل اميري



مستديرة مستطيلة ككات





كلول



كهة مبدولة



كوكليت ارجواني



كون



كون حيشي



كيشي

## ٢٤٠٣٣ - كَمِين \* ، سَتَوْت و سَتَوْت

Cuminum cyminum (S). Cumin (F). Cumin (E). Echter Römerkümmel (D). Cumino, C. domestico, Cimino dolce (I).

نبات حشبي حولي زراعي من فصيلة الحبيبات . يزود من الاناوية وقد تستعمل في تطهير الخبز والخبز . ويستخرج منها عشرويات صحية نافعة || ولكن من ماله للعدو ، يصل الى الرياح والارام ويبلغ سوء الهضم ويضر النفس والمعدة . كان يستعمل في الطب القديم مقويا جليا بمزجه مع السمل والفلفل .

## ٢٤٠٣٤ - كَمُون اُرَمِي Cumin des prés (F).

هو الكراويا ، اطبا .

## ٢٤٠٣٥ - كَمُون حَبِيصِي \* ، يَانِسُون بَرِي

Carum (S). Ammi, Sison (F). Ammi, Bishop's weed (E). Herrenkümmel (D). Ammi, Sison (I).

جنس نباتات حشبية رية طيبة حولية من فصيلة الحبيبات . انزاعه المرفوعة حصة اطباها حوش وجزر البحر المتوسط ونبتا نوع حشبي المنبت . اوراقها تشبه اوراق الجزر . نافعها الطيبة كنافع الكون .

## ٢٤٠٣٦ - كَمُون حُلُو Anis (F).

هو الانيسون ، اطبا .

## ٢٤٠٣٧ - كَمِينَات Tuberaceae (S).

Tubéracées (F). Tuberaceae (E).

فصيلة الاك من الفطور الزقية اجناسها وانواعها عديدة اكثرها مستحب العلم مأكول . فلزاقها الشكل والحجم والون والرائحة .

## ٢٤٠٣٨ - كَمِينت Bai (F). Bay (E).

من الزان اثواب الخيل للذكر والاثنى . ج ك ت . وللرس الكمينت اشد حدة من الاشقر ويكون عرقه وذنبه اسودين وقوائمه كذلك . والكمينت قد يكثر :

## ٢٤٠٣٩ - كَمِينت الحام Bal foncé (F). Chestnut (E).

وهو الذي يملو حوته سودا

## ٢٤٠٣٩ - كَمِينت مملسي Bal cerise (F). Dapple-bay (E).

وهو الذي تشبه حوته

## ٢٤٠٣٩ - كَمِينت مذهب Bal clair (F). Light-bay (E).

وهو الذي تملوه صفرة

## ٢٤٠٣٩ - كَمِينت شامرويس Chamaerops (F).

هو الزول ، اطبا .

## ٢٤٠٤٠ - كَمِينتِي \* Palamedea (S). Kamichi (F).

طائر من طوال الساق وسيد الجلس والزرع مهده البلاد الامريكية . وهو كبير الجثة طوله نحو ٨٠ سم . وبسطه ٣٠٠ سم . ثوبه الى البسة الخضراء المواج . يطنه ابيض . منقه مطروق بالاسود . رأسه قهري الجبهة مجازي القنف . يألف النافع ويجاري الماء . قوته الحشرات والافسريات والاعشاب . يشن في الفصوص يغني بين الادخال القريبة من الماء . انثاه تحفن من ٤ الى ٦ بيضات .

## ٢٤٠٤١ - كَمِين Callicula (F). Calice, Calculus (E).

كأس انسانية تحيط بكأس الزهرة الاصلية كما في زهر القرنفل والشيلك .

## ٢٤٠٤٢ - كَمُول \* Cyathes (S). Cyathée (F).

جنس نباتات مرغسة من فصيلة الكوليات . انواعه عديدة جميعها كثيرة اللد تلوح نحو ١٠ امتار . جليها زباد اللحاء . اوراقها منصبة ، مركبة ، ثنائية او ثلاثية الانقسام تطول من ٣ الى ٦ امتار . فصوصها اهليلجية الشكل ، مفشاة التسنين ، فصلها جامد النسيج ، اخصر الصفة العليا ، نفسي السفل || وهو يربط في الاثر المقيمة للهور المتوسطة الاندماج الكائنة في المعارض الجنوبية الدافئة .

## ٢٤٠٤٣ - كَمُولِيَّات Cyathaceae (S).

Cyathacées (F). Cyathaceae (E).

فصيلة من البرانس الوصائية المستورات الزهر . انواعها نحو ٩٠ جميعها اجناس . اطباها البلاد الحارة . تصلح للزينة انما ترطب في المواقع الرطبة .

## ٢٤٠٤٦ - كَمِينة و كَمِينَة Aveugle de naissance

هو ذو الكه أي المي يولد به الانسان او الحيوان .

## ٢٤٠٤٧ - كَمِينة و تَنْقُص Tanche (F). Tench (E).

الواحدة كمة . ولكنه جنس اسماك ثورية من فصيلة الشربليات مفتوحات الفم . انواعه قليلة تتميز باجسامها الاهليلجية الشكل ويبدئها الفكيتين البتيتين . اعرف انواعه واشهرها الكمة المبدولة .

## ٢٤٠٤٨ - كَمِينَة مَبْدُولَة Tinca vulgaris (S).

Tanche commune (F). Common tench (E).

نوع من الكمة وهي سمكة ثورية ترطب في المياه الراكدة اغصها مياه القنار حيث تعيش في اسماها . طولها عند ادراكها التام يراوح من ٣٤ الى ٣٧ سم . وزنها من ٥ الى ٦ كيلو . فلوها صغيرة القد لينة . زمانها النظيرة والصدرة والبطينة والدرجينة مستطيلة ومستدرة الاطراف . ذنبها مستعرض مقطوم . فوها الى انفسار الاسفح المواج .

## ٢٤٠٤٩ - كَمُوليت Quamoclit

جنس نباتات حشبية حولية عارشة من فصيلة البليديات . انزاعه قليلة جميعها زينة . سورها صفرة . اوراقها متعاقبة . ازهارها لاقامية الجميع والارتكاز || تتكاثر بالبرز وتجدد في جميع التربة الزراعية || اشهر انزاعه التريينية ما يلي .

## ٢٤٠٣٠ - كَمُوليت اُرْجَوَانِي \* ، ياسمين اُحْمَر

Quamoclit coccinea, Ipomaea coccinea (S). Quamoclit écarlate, jasmin rouge des Indes (F).

نوع من الكموليت الترييني السبروتي . ساه تطول من ٣ الى ٥ امتار . اوراقه قلبية الشكل جميلة انفسار الزاهي . ازهاره مقنودة الجميع كبيرة القد . بتلاتها خمسة الزوايا ، ارجوانية اللون || ازهاره يستمر من تموز الى تشرين .

## ٢٤٠٣١ - كَمُوليت رِيْشِي \* Quamoclit pinnata, Ipomaea quamoclit (S).

Quamoclit penné, Q. cardinal, Lisaron à feuilles laciniées (F).

نوع من الكموليت الترييني السبروتي . ساه تطول نحو ٣٥٠ سم . اوراقه كبيرة مفردة متنازية التشرج المشطي الذي يبدو كالريش . ازهاره فردية الجميع ، كبيرة القد ، وردية اللون ، ارجوانية المواج || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

## ٢٤٠٣٢ - كَمُون Latence (F). Latency (E).

الكَمُون حالة الشيء الكامن .

**٢٤٠٤٨ - كنتاريوم \* Canarium (S).**  
Canarion, Canari, Canarium (F). Almond, Elemi tree (E). Kanarlenbaum (D). Canario (I).  
جنس شجيرات برية من سبط البفوريات وفصيلة البطيحات. أنواعه المعروفة نحو ٦٠ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية، تفرز حصارا وراتنجية يبيضه اللون بطنية الاشتعال قوية اللمع فواحة العرف المستحب. اعشابها صلبة يبيضه اللون لكنها لا تصلح للاستعمال الصناعي.

**٢٤٠٤٩ - كنتاس Gîte (F). Lair (E).**  
ماوى الطير في الثأب بين الشجر يستر فيه. ج كنوس واكناس.

**٢٤٠٥٠ - كنتاشك ٥، كنتسح Lignée (F).**  
Issue, Progeny (E).  
ج. كنتاشات وكنتسح. هي الاصول الموصفة المشتخة كأمهات لسلالات نباتية معينة.

**٢٤٠٥١ - كنتاهة Tectonique (F). Tectonic (E).**  
علم يبحث في تكوين الأرض وتوغلها.

**٢٤٠٥٢ - كنتب Cal (F). Callus (E).**  
نسيج دامل يغطي الفراغ الذي احدهه الجرح في الشجرة.

**٢٤٠٥٣ - كنتب Callose, Callosus**  
اندام في الجلد مظهره نقط رافعة متصلبة او نتوءات جامدة.

**٢٤٠٥٤ - كنتبات الحقل Equisette (F).**  
هو الأسوخ، اطلبه.

**٢٤٠٥٥ - كنتبات الشتاء Prêle d'hiver (F).**  
هو الأسوخ الشتوي، اطلبه.

**٢٤٠٥٦ - كنتباتيات Equisetaceae (S).**  
Equisetacées (F). Equisetaceae (E).  
هي الأسوسيات، فصيلة نباتية من مستورات الزهر البرصائية.

**٢٤٠٥٧ - كنتبار Chamaedorea (S).**  
Chamaedorée (F).  
جنس اشجار ليفية من فصيلة النخلات. أنواعه المعروفة ١٠ اعطائها الاقاليم الحارة معظمها امريكي المنبت وبعضها افريقي. تزرع قنزين، جلدها تملو من مر الى تسعة امدار، صفها يطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. كواثيرها حديدية، قنواها لينة، ثمارها كرزوية الشكل والقد، نافعة المادة للاستعملة في اشهر انواعه التريينية :  
كتاب البق \*

**Ch. elegans (S).**  
Chamaedorée élégante (F).  
كنتبار شامع  
**Ch. elatior (S).**  
Chamaedorée élevée (F).  
كنتبار ظريف  
**Ch. gracilis (S).**  
Chamaedorée gracieuse (F).

**٢٤٠٥٨ - كنتبث ٥ Chenopus (S).**  
Chénopée (F). Chenopus (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدييات الاربل وفصيلة الكنبشيات. أنواعه المعروفة كثيرة العدد، المعاصر

**٢٤٠٤٢ - كميكة Caecum (S).**  
Caecum (F). Caecum (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدييات الاربل وفصيلة الكميقيات في انواعها المعاصرة المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والاستوائية في اصدانها صغيرة، انبوبية الشكل، حلزونة الغنة المقوسة. افواها دائرية. اسقاطها مدملكة، قزينة الغشاء. لواسها عادمة البيرون.

**٢٤٠٤٣ - كميقيات ٥ Caecidae (S).**  
Caecidés (F). Caecidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مدييات الاربل اماسيات الخياشيم ومدييات الاجهزة في اجناسها وانواعها المعروفة مديية، معظمها من متحجرات الاياج الثالث. اما الانواع المعاصرة فنحو ١٠٠ تنتمي الى جنس واحد يدعى كميكة.

**٢٤٠٤٤ - كميكة \* Lepadogaster gouanil (S).**  
Barbier, Porte-écuelle (F). Sucker (E).  
سمكة من فصيلة الرخويات يكثر وجودها في المتوسط. تتميز بكبر رأسها وامتطالة زعانفها الصدرية والظهرية. جسمها متوسط القد، ثوبا جميل الالوان الزاهية يغلب فيها الوردي المنعبد المواجه. بطنها فضي اللون. يحسرها ويثج ظهرها ممتزعة التجاليع الاسمر. لحمها متوسط الصنف.

**٢٤٠٤٥ - كتاب Callosité (F).**  
هو الجبسة، اطلها.

**٢٤٠٤٦ - كنتار \*، كنتاري، حنكر Serinus canaria (S). Serin des Canaries, Canari (F). Canary (E).**  
نوع من النقر وهو صغفور غريد اصفر اللون، انخسر الموج يرق في الانقاص. ضره وسلالته الحالية حديثة تختلف باختلاف الثوب والحجم في موطنه الاصيل جزر كنتاريه وهو يابن الاماكن القربية من الماء لانه يقتل كل يوم. قوته البزور البرية الصغيرة ونواحي النبات وبعض الانعام السكرية انخسر اثنين التانجس السامع. وهو في القفص يعيش نحو ٢٠ سنة هل بزر المكس والبسبيبية والقتن والشليم المنقوش والنس والثار السكرية والخبز المنقوش بالحليب اللذي وصفار البيض في الانثى تحضن ثلاث مرات في الحول. حصفها تراوح من ٣ الى ٥ يبيضات صغيرة الحجم فراء القشور المرقوشة بالجلوي رصيحها يستقيم ١٣ يوما في كساد النقر والحسن والكسر والخفيري والتضبيحي والثشور والوروي... نتاجها نعل قري الشكبة متراكب الالوان المتداخلة المرتكزة على الاصفر.

**٢٤٠٤٧ - كنتارين ٥ Canarina (S). Canarine (F).**  
جنس نباتات جنبية ممرمة من فصيلة الجريسيات. انواعها قليلة اعطائها جزر كنتارية. جلدها غليظة وشية. سوطها تملو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. حصارها حليابية دقيقة. اوراقها متقابلة، معتقة، رعيمة. تصلها مالن البشرة، مسن الحافة، بحري اللون. انهارها قمية الشكل، كبيرة القد، مستطيلة المانيق متدلية. لونها الى الصفرة الذهبية فوقها الى الحمرة. ثمارها جنبية مأكولة.



كبيكة



كنار



كنار يوم



كنتبار انيق

يشار الى ذلك باضافة « ١ » فيصح التعريف ان ذلك كُنا او كُنا الخ .

### ٢٤٠٦٦ - كُنْتَبُوس ، كُنْتَبُوس (S). Cajanus

(F). جنس نباتات ليفية خشبية معمرة من فصيلة القرنيات القراشية . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها زراعي . اصنافها البلاد الحارة والامراتية . سوطها متعصب . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، ثلاثية . ازهارها نورية التجميع . ثمارها قرون مبطلة مخضرة الفواصل الحبية في اعرف انواعها واشهرها الكنجوس الهندي .



كبت

### ٢٤٠٦٧ - كُنْتَبُوس هندي \* ، قُرَيْشَاء ، سِيلَه هِنْدِيَه ، لَوِيَهَاء سَوْدَانِيَه

Cajanus indicus (S). Ambrevade, Pois d'Angola, Pois d'Angola (F). Doll, Pigeon-pea, Cajan-pea, Congop (E). Catjang, Angolische Erbsen (D). Cajano dell'Indie, Citio del India, Pisello d'Angola (I).

نوع من الكنجوس ازراعي ، فروعه عذبة شائعة استعمال . ساقه ليفية و خشبية ، فروعها ، زياه ، تملو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها مركبة ثلاثية ، ورقاتها اهلجية النصل ، خلية البشرة حل فسحتها . ازهارها نورية التجميع ، صفراء اللون ، موزعة بالاخر . ثماره قرون مبطلة تملو من ٤ الى ٧ سم . تغلف من ٣ الى ٥ حبات مستديرة مفلطحة تقريبا قدرها قطر الحبة ، لونها يتغلف مع القرب منها الابيض والحلطي والاسمر والاخر والمرقش في قرونه الخضر تطيح كالقوياء . حبه التانسج الجاف صلب الماددة يستعمل بعد سحقه وهو غزير العناصر الغذائية يحري ما قدره :

من ١٩ الى ٢٠ ٪ من المواد الازوتية  
من ٦٢ الى ٦٤ ٪ من المواد الهيدروكربونية  
من ١٠ الى ١٢ ٪ من المواد المعدنية



كثور الشوك



كنجوس هندي

### ٢٤٠٦٨ - كُنْتَبُوس (S). Anaphalis

(F). Anaphale, Anaphalide (F). Pearly everlasting (E). Weisses Perikörbchen (D). Sempreviva blanca (I). جنس نباتات خشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة قليلة . اوراقها متعاقبة مغزيرة قطعية . وريقاتها الزهرية مقلية التجميع . ازهارها حاجية لولبية . ثنائياتها ضيقة . يزورها مستنقعة في اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

### ٢٤٠٦٩ - كُنْتَبُوس الثَمَمِي

Anaphalis nubigena (S). Anaphalide du Tibet (F). نوع من الكنجب التريبي يملو من ١٠ الى ٢٠ سم . واوراقه مغزيرة قطعية . اوراقه سنانية النصل وسيدة العرق . وريقاته الزهرية وسيدة ، ازهارها صغيرة مبهمة حاجية اللون . ازهارها يستمر طوال شهر تموز .



كنجب ثممي

### ٢٤٠٧٠ - كُنْتَبُوس ثَمَمِي \*

Anaphalis margaritacea, Antennaria margaritacea (S). Ammalide nacre, Immortelle blanche (F).

نوع من الكنجب التريبي يملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . واوراقه ضيقة طول من ١٢ الى ١٤ سم . وتعرض نحو ٥ سم . نصلها اخضر الصفحة العليا زاهرا زاهرا كالمثل البياض الكرم . وريقاته الزهرية كبيرة القدة ثمانية اللون والعملة في ازهارها يستمر طوال الصيف .

منها وقد يتجاوز ٤٥ يمتد في بحار شمال المحيط الاطلسي في اصنافها صغيرة القدة وشمية عذبة مثقلة اللينة . فوهاها معتدلة الانفراج ، رباعية الفلق للاسماوية التي تبدو كارجيل التم شكلا وحطبا .

### ٢٤٠٦٩ - كُنْتَبُوس (S). Chenopodiidae (F). Chenopodiidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاحتجاب الجورية والناشورية وبعضها معاصر منتشر في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة في اعرف اجناسها واشهرها الكنجب والدريفة والمريقدو والفصمية .

### ٢٤٠٦٩ - كُنْتَبُوس

Auvent (F). Pent-roof, Porch roof (E). سقفية مسطحة لاقياس الطول والعرض والاعتدال ترتكز على حائط او بناء .

### ٢٤٠٦٦ - كُنْتَبُوس

Enveloppe, Revêtement (F). Covering, Facing, Revêtement (E). كل مادة حاجزة توضع لوقاء الشيء وسره .

### ٢٤٠٦٢ - كُنْتَبُوس

Bibelos (F). Curio (E). ج . كتاب . هي الاشياء الصغيرة الفاعرة الصنع من تماثيل وغيرها توضع لزين .

### ٢٤٠٦٣ - كُنْتَبُوس

Cantharide (F). هو الزناح ، اطلبه .

### ٢٤٠٦٤ - كُنْتَبُوس الشوك \*

Agapanthia cardui (S). Agapanthie des chardons (F). Agapanthia cardui (E).

حشرة وائمة غاضلة من فصيلة القرنيبات وربة مخدات الاجنحة . موطنها يشل معظم اقالم حوض البحر الابيض المتوسط . تألف جميع انواع الشوك والقيهاء . خنافسها تموش على الازهار . يرقاتها تسردب اربوات النباتات المائلة ولا تمت من مرقها في جسمها صدر القدة ، اهيف الشكل ، يملو من ٧ الى ١٢ سم . ثوبا الى الزقة المايقة يملوها موج سبزي وثلاثة خطوط حاجية تغلف الكوسل ، وشطان اصفران يكتنف الدرز القندي . رأسها مستدل الجرم بقور يملطه تحت الكوسل . عينها صفيرتان . زبادنا غسطين ، مهدبان . ازهارها مهدب الحار . ثمداما معتدلة الصلابة و متباينة التميز القاطب . ارسافها خاصة العقل في الاثام امير قدا من الذكر وابنت ثوبا منه والصر زبانا في لها جبل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملدة في ازالل ايار وتبقى حتى اواست آب . تسرح في النهار وتوتيت في الليل في البرقة منه ادراكها الكال الجسوري الذي يحصل بعد التقف بنحو ٣٨ اسبوعا ، تطول من ١٨ الى ٢٢ سم . جسمها دقيق الجرم ، مستطال الصدر ، صدق الكسمة الشريفة ، سداسي الراجاب . ثوبا الى السمرة الخطيئة النبراء المولاج يكتنفها تقطيط اسود يملو بعض الهلب .

### ٢٤٠٦٥ - كُنْتَبُوس

هو حاصل التيجين اشبل كان ام الشيب . يعرف عنه عداقة بحرف هـ . اما السلالة الاولى فتمربها كـ ٣ والسلالة الثانية كـ ٣ ، والثالثة كـ ٣ ، واذا هجن الكنجب من جديد مع احد طرفيه ، وهو ما يدعى التاسيل او الدجلة ،

**Gypsophila elegans (S). كُنْدُس أُنُق ٢٤٠٨٠**  
**Gypsophila élégante (F).**  
 عشبة حولية تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. جذورها دقيقة ساقها قوية متضخمة. أوراقها سنانية ذلقة. نصلها وحيد العرق. أزهارها مستطيلة المالحق، بيضاء اللون أو وردية. أزهارها يستمر من تموز إلى أيلول.

**٢٤٠٨١ - كُنْدُس دَبْحِي الرُّق**  
**Gypsophila scorzonifolia (S). Gypsophila à feuilles de scorzonère (F).**  
 عشبة سبروتية معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها كثيرة الفروع المستطقة. أوراقها سنانية، نصلها قلبي القاعدة خاسي البروق. أزهارها إلى الحمرة الجنبيلة. كلها أخضر اللون صغير القند يطول نحو ٢ سم. || أزهارها يستمر من تموز إلى أيلول.

**٢٤٠٨٢ - كُنْدُس دُرْب**  
**Gypsophila acutifolia (S). Gypsophila à feuilles aiguës (F).**  
 عشبة معمرة زباد تملو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها فروع. أوراقها بحرية اللون خلية البشرة حل صفحتها. أزهارها وردية، كرونها إلى البياض الأبرج تملو خمسة خطوط حر || أزهارها يستمر من تموز إلى أيلول.

**٢٤٠٨٣ - كُنْدُس كَثِير الزُّهْر**  
**Gypsophila floribunda (S). Gypsophila multiflora (F).**  
 عشبة حولية سبروتية تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم. ساقها دقيقة الفروع. أوراقها صغيرة ذرية. أزهارها كثيرة العدد، صغيرة القند، وردية اللون، كأشدا خاسي الفلق للسنة المفضولة يظلمن إبيضين يتوصلها خط أخضر. أزهارها يستمر من تموز إلى تشرين.

**٢٤٠٨٤ - كُنْدُس لَرَج**  
**Gypsophila viscosa (S). Gypsophila visqueuse (F).**  
 عشبة حولية لزجة تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. ساقها فروع. أوراقها سنانية؛ نصلها خلي البشرة الزرقية، ثلاثي أو خاسي العروق. أزهارها وردية اللون قصيرة المالحق || أزهارها يستمر من تموز إلى أيلول.

**٢٤٠٨٥ - كُنْدُس مَدَاد \***  
**Gypsophila repens (S). Gypsophila rampante (F). Chalk plant, Cloud plant (E). Kriechendes Gipskraut (D). Gesso filo (I).**  
 عشبة سبروتية ميلولة معمرة تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. ساقها ليفية مدادة. أوراقها سنانية مستطيلة. نصلها بحري اللون وحيد العرق. أزهارها كثيرة العدد، صغيرة القند، وردية اللون أو بيضاء || أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول.

**٢٤٠٨٦ - كُنْدُس مِصْرِي \***  
**Gypsophila struthium (S). Gypsophila fruticosa, Saponaire d'Egypte (F). Egyptian soap root, Struthium gypsophila (E). Spanisches Gipskraut (D). Saponaria vera, Struzio (I).**  
 عشبة برية ميلولة معمرة تكثر في البلاد المصرية حيث تستعمل في النسل. ساقها مدادة. جذورها متوسطة الخشونة. أوراقها شقيقة؛ نصلها خلي البشرة، بحري اللون. أزهارها صغيرة القند وردية اللون أو بيضاء.

**٢٤٠٨٧ - كُنْدُس**  
**Pie (F).**  
 هو الملقق، اطليه.

**٢٤٠٧١ - كُنْدُس \***  
**Pterygode (F).**  
 الكندسة جناح زائد صغير القند، قلبي الشكل، ويلتحز الرشن عند قاعدته في رية حشفتيات الاجنحة. وهما كندستان، يعني ويسرى، تستعملها الفراشة لكسج وطفها الاماسين.

**٢٤٠٧٢ - كُنْدَاَرَة \***  
**Cantharus (S). Canthère (F). Bream (E).**  
 جنس اسمك بحرية من الاسبروديات الشالكتات الزمانف الكيشيات القلوس. انواعها ثلاثة. اجسامها بيضيه الشكل، طولها يراوح من ٤٠ إلى ٥٠ سم. زعانها الظهريه تشبه السنام. تألف القور البهيد ولا تقرب من الشواطي الا في بعض الاثمة.

**٢٤٠٧٣ - كُنْدَاَرَة مَبْدُولَة \***  
**Cantharus cantharus (S). Canthère commun, Griset (F). Common sea-bream (E).**

نوع من الكندارة. سمكة بحرية يبيض من فصيلة الاسبروديات ودية شالكتات الزعانف. مسرعا المهاجم تألف الشطوط والاعوار وتدخل المواني. اعطائها البحر الابيض المتوسط || جسمها اعليجي الشكل، معتدل الطيط، يطول من ٤٠ إلى ٥٠ سم. ثوبا الى الشبهة القضيعة المراج تشدد مبرتها في الظهر. جانبها مشيزان يغطى قاعها صفراء اللون. رأسها كبير الجرم، قصير أنف. فكها متعادلان. شفتها مستبدل الانفراج. اسنابها رباعية الصفوف في الفكين. ميناها صغيرتان، تالذرتان. زعنفتها الظهريه واحدة سنانية الشكل. زعنفتها الليلية فاقرة || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

**٢٤٠٧٤ - كُنْدَاَرَة** هو كركند الست، اطليه.  
**٢٤٠٧٥ - كُنْدُر** هو البان الذكر، اطليه.

**٢٤٠٧٦ - كُنْدُرُورُوم، مِيْتُوكُنْدُرِي**  
**Chondriosomes, Mitochondries (F). Chondriosomes, Mitochondria (E).**  
 هي مجموعة الكناسج التي تتألف منها الطهيرة الحيوانية او الخلية النباتية.

**٢٤٠٧٧ - كُنْدُرِيُوم**  
**Chondriome (F).**  
 هي الهية، اطليه.

**٢٤٠٧٨ - كُنْدُس**  
**Gypsophila (S). Gypsophila (F).**  
 جنس نباتات عشبية من فصيلة القرنفليات. انواعها زهاء ٤٠ منها الحولية والمعمرة والبرية والزارعية. سوقها فروع. أوراقها صغيرة القند متعاقبة. أزهارها ضخمة التجميع، تاجية الارزكان؛ صغيرة الحجم. جذور يفسها صنعية يستخرج منها مادة الصابونين وتستعمل في غسل الانسجة الصولية والكناكية والطنينية تنظفها من الاقذار وتكسها بعض الزهراء والرقن || أمرب انواعها واشهرها ما يلي.

**٢٤٠٧٩ - كُنْدُس الصُّخُور \***  
**Gypsophila petraea (S). Gypsophila des rochers (F).**  
 عشبة سبروتية معمرة برية تعيش في الاربية والصخور الكلسية. تملو من ١٠ إلى ١٥ سم. جذورها غليظة. ساقها ليفية مدادة. أوراقها صغيرة القند، بحرية اللون، بنفسجية القاعدة والمقن. أزهارها متقاربة لونها إلى البياض المالح. قنابها بيضيه الشكل ثنائية التركيب || أزهارها يستمر من حزيران إلى آب.



كندارة



كندارة ميلولة



كندس الصخور



كندس مداد



كندس مصري



كندور



كندية

٢٤٠٩٥ - كُنْدَ Astéroïde (F). Asteroid (E).  
نعت تعريفى يطلق على جميع السيارات الصغرى الدائرة حول الشمس بين المشتري والمريخ. ج. كُنْش وتسمى أيضاً الجوارى الكُنْش.

٢٤٠٩٦ - كُنْش Organite  
كل عنصر من العناصر التي تتألف منها الخلية كاجلية والسنتر وروم ... ج. كُنْش.

٢٤٠٩٧ - كُنْش Lignée (F).  
هو الكنفئة، الخلبا.

٢٤٠٩٨ - كُنْشَ Conroude (F).  
هي السفولن، جلس اشباب برية طيبة.

٢٤٠٩٩ - كَنْكَلِيَّات Tringiens (F).  
عارة من فصيلة دجاجيات الارض. اجناسها قليلة. اعرفها الجهل. جميعها من القواطع الصغريات اللند. مناتيرها دقيقة خالية من التخذيد. ارساغها نحيلة. الزوايا مرشقة وهي صيفية وشتوية تختلف عن بعضها برون الاوان واقترب الرقعة او تباعدها.

٢٤١٠٠ - كَنْكَلِيَّات Conchite (F).  
مادة متجمدة في داخل صفة.

٢٤١٠١ - كَنْكَدَ، كَنْكَتَ Germon (F).  
هو كتون الابيض اى الجرون، سمكة بحرية من فصيلة الاسقمريات. قال جرير:

« قوم اذا جلتوا في صبرهم بصلا  
ثم اشتروا كنداً من مالح جندوا »

٢٤١٠٢ - كَنْك Holacanthus (F).  
هو الطبق من الاسماك البحرية، اطلبه.

٢٤١٠٣ - كَنْك Biotope  
هو المكان الموصوف المحدود بطبيعته ونباته.

٢٤١٠٤ - كَنْك هو اليان الذكر، اطلبه.

٢٤١٠٥ - كَنْكَلِي Terricole (F). Terricolous (E).  
نعت تعريفى يطلق على الديدان والحشرات الدنيا التي تعيش داخل التربة.

٢٤١٠٦ - كَنْكُ Topinambour (F).  
هو عباد الشمس السقولي، اطلبه.

٢٤١٠٧ - كَنْكَلِيَّة، عَمَر زَلِج Combretum altum, C. micranthum (S).  
Combret elevé, Kinkiliba, Chigomier altier (F).  
Vegetable-glace plant (E). Langaden (D).

نوع من السم وكنكالية هو الاسم الافريقى. نبات حرجي طبي معمر من فصيلة الاطليجيات. منته يمد من جمهورية مالي الى سيراليون وشاطئ الغابج وبي بحيرة قراء تعلق نحو اربعة امتار. ساقها شديدة الصلابة. فروعها متراكبة، مستطيلة، جلدية اللون ثم ملحد. اورقانها متعاقبة، معتقة، اعطيلية، تطول من ٥ الى ٩ سم. وتقرض من ٢ الى ٥ سم. تساقها مائة البشرة عاقبة انخفاض الجوزي الملاج. ازهارها سبيل التجمد،

٢٤٠٨٨ - كُنْدُش جَوَال Plor vagabonde (F).  
طائر من الجوارى يدعى كطري، اطلبه.

٢٤٠٨٩ - كَنْدَلاء، كَنْدَلِي كَنْدَلِي  
نبت ينبت بماء البحر ويؤلف بالشورة. قشره يمسى الايدع يدبغ به (اللسان).

٢٤٠٩٠ - كَنْدَم، جَوَر كَنْدَم Mangouste (F). Mangosteen (E).  
ويدعى الجندم، هو ثمرة جندم منغستان.

٢٤٠٩١ - كَنْدُورُج Silo  
شبه مخزن يشاد في الارض يشمره التراب مخزن فيه الحبوب.

٢٤٠٩٢ - كَنْدُورُ، كَنْدُورُج، كَنْدُورُج  
فصاح

Sarcorampus condor, S. gryphus (S). Condor des Andes (F). Condor (E).  
طائر من النسور ينتمي الى فصيلة النرباجيات. جلته كبيرة اللند تطول نحو ١٦٠ سم. اما بسلة سقلية فنحو ٣٥٠ سم. رأسه مستطيل الشكل يحمل على جبهته حرف احر. منمره كبير اللند، مريض الانتشاب، احسين لليرة الحادة. صفة اغفر الريش كالرأس، مطوق بالابيض الاصفر المراج. رصفه الملط، مخالفه كبيرة. ثوبه الى الطلبة الموجه بالاسود. قوامه يبيض. األف اطلانه جبال الالند في امريكا الجنوبية. يألف المناطق المالحة من ارتفاع ٣٠٠٠ الى ٥٠٠٠ م. من سطح البحر. نظامه الحياتي خاص. سره يعد من ١٠ الى ٢٠ ذبياً. يلتصق قوته في رأفة النبار، ورغب في الجيف وان تضر عليه ويوجدوا اصطاد الايايل والماز وكل ما استطاع اليه سبيلاً. يمشى وكنه على الحضيض في اوتاب الصخور للزفة او في ثنوه الجبال الرقعة. اثناء تصف وقتين كبيرتين تحضنها وسدها نحو ٤٠ يوماً.

٢٤٠٩٣ - كَنْدِيَّة، زَهْرَةُ المَرْجَان Kennedy (S). Kennédie, Kennédie (F). Coral creeper (E). Kennedie (D). Kennedia (I).

جنس نباتات ليلية عارضة برية وتربيتين من فصيلة القرنيات القرشاية. انواعها ١٦ معظمها ترابي، سورها زباء تطول من متر الى عشرة امتار. اورقانها متعاقبة معتقة ثلاثية الفصوص. ازهارها كبيرة اللند فردية او عقدية التجميع، محورية الارتكاز او طرفية لونها الى الحمره وسها الوردي والابرواني والقرنزي والياقوتي ... ا أشهر انواعها التر ينية:

كندية هبية K. splendens (S).  
Kennédie splendide (F).  
كندية هراء، كندية بالقوتية K. rubicunda (S).  
Kennédie rouge, K. à grandes fleurs (F).  
كندية سوداء K. nigricans (S). Kennédie noire (F).  
كندية لشقارية K. coccinea (S). Kennédie écarlate (F).  
كندية مرداء K. glabrata (S). Kennédie glabre (F).  
كندية مستطيلة K. prostrata (S).  
Kennédie couchée (F).

٢٤٠٩٤ - كَنْس هو الشنقب، اطلبه.

٢٤١١٦ - كُنْيَالَه ، كُونِيَاك  
Cognac (F).  
Cognac brandy (E).  
مشروب قنديدي شائع الاستعمال يصنع من كحول العنب .  
وقد اشتهرت بصناعته بلاد الكونزاك في فرنسا .

٢٤١١٧ - كُنْيَب  
Arbres desséchés (F).  
Dried trees (E).  
الكُنْب : اليبس من الشجر .

٢٤١١٨ - كُنْيِدَكَه ، كُنْيِدِيَا  
Conidia (F).  
Conidium (E).  
كل بويضة فطرية نشأت على كائنا لا في زق تدعى كنيده .

٢٤١١٩ - كُنْيَه  
Locule (F). Loculus (E).  
الكُنْيَة ، في علم التاريخ الطبيعى ، هي الحفرة الشديدة  
الصفراء .

٢٤١٢٠ - كُنْيُولِسِيُوم  
Coniothecium (S).  
جنس تطور مجهرية من حمارة الزسمايات وفصيلة الفطحيات .  
يتبين بخلوه من الجرب الكنديية . كائنا مكرية مستطيلة .  
بويضاته كروية جيرية التجميع || انواعه عديدة جميعها  
ريمية تركب لحاء بعض الاججار دون ان تؤذيها ، منها البتق  
والخوخ والوخوخ والمغصاف .

٢٤١٢١ - كُنْيُورَاف ، كُونِيُورَاف  
Goniographe (F).  
ويسمى مرمية الزوايا . آلة المسح تقاس بها زوايا الارض  
تقسم سترها على القوس .

٢٤١٢٢ - كُهَب  
Buffle âgé (F). Aged buffalo (E).  
هو الجاموس المسن لا يزال كائز الحيم .

٢٤١٢٣ - كُهَبَل  
Detarium (S).  
Détar, Détare, Détarium, Ditah (F). Tallow-tree (E).  
Detaripalm (D). Detaria, Mell (I).  
جنس اشجار افريقية المنبت من فصيلة القرنيات . له  
نوعان نوع ثماره مرة العلم ، سحالية المادة ، مؤذية .  
ونوع ثماره مأكولة مستحبة العلم يعرف بكهبل السنغال .

٢٤١٢٤ - كُهَبَل السنغال  
Detarium senegalense (S). Détare du Sénégal (F).  
Senegal tallow tree (E).

نوع من الكهبل شجرته تملو نحو ١٢ م . ساقها متعنية  
اوراقها متعالية مكرية ، وريقاتها شبيهة بالانتظام . بضية  
الشكل ، نصلها جامد الصفحة . عايق الخضار . ازهارها  
عنقودي التجميع ، محوري الاذنكاز ، ثمارها مششبة  
الشكل والقد ، لباب سؤذتها ناشف المادة ، سكري العلم ،  
اخضر القرون .

٢٤١٢٥ - كُهَدَبُ الْإِجَاصِ ، اَكَارُوس  
Eriophyes pyri (S).  
Phytopte du poirier, Eriophyes des poiriers (F). Pear  
leaf blister mite (E). Birnblatt-Pockenmilbe (D).

حشرة من الكهديات المجهرية تركب برام الاجاص  
تقتبب الاوراق الباكرك ثم تغني على الاوراق تنفخ النصال  
بالبثور السمر او الحطية بعد ان تغني على خلايا النسج  
الذي يصيح كالاسفنج بين بشرته العليا والسفلى .  
يكافح مكافحة العناكب باستهلاك الحواشير والمواكرك .

محوري الاذنكاز . ازهارها صغيرة ، ودية اللون ،  
تملوها رشفة نحاسية . ثمارها يزور بحرمية مجننة صغيرة  
تبدو في اول صيدها غصافه اللون ثم يتحول اللون ، عند  
النضج ، الى الوردية القضية الوردية .

٢٤١٠٨ - كُنْيُلِيُوجِيَة  
Conchyliologie (F).  
Conchology (E).  
هي علم الاصداف .

٢٤١٠٩ - كُنْيَتَا ، كُنْيَتَا سِيكُونَة  
Cinchona (S). Quinquina (F). Cinchona, Quinin bark (E).  
Chinsbaum, Fiebarindenbaum (D). China (I).  
جنس اشجار ونجيرات برية وزراعية صناعية من فصيلة  
الفويات . انواعه المعروفة ٢٠ اصلها المناطق الحارة  
الرطبة . مغطها بري وبعضها زراعي صناعي طبي .  
سوقها متعنية تملو من ٤ الى ٣٠ م . اوراقها متعالية  
معقنة ، نصلها بضية او امليلية الشكل . ازهارها  
عنقودي او عثوكري التجميع . ازهارها غشوية زياء  
البشرة . ثمارها جراه مخروطية الشكل تحضن البذرة من  
البزور الصغيرة الغشائية الجناح || يستخرج من قشورها  
مادة قلوية بضية اللون شديدة المرارة تعتبر من أهم القلويات  
المستخلصة من لحاء النبات وتعرف بالكينا .

٢٤١١٠ - كُنْيَلِيَاَت  
Cinchonées (F).  
سبط من الفويات يشمل نحو ٩٥٠ نوعاً من النبات  
تنتمي الى ١٠٠ جنس اشهرها الكنكيتا .

٢٤١١١ - كُنْيَهَان ، كُنْيَهْد  
Alkana orientalis (S). Alkana, Alcanne, Alkan, Grémil à fleurs jaunes (F). Yellow bogloss, Yellow gromwell (E). Orientalische Perithra (D). Alkana (I).

جنس نبات حشوي بري من فصيلة الحسنيات . اوراقه  
ضيقة مستطيلة ، نصلها خلى البشرة . ازهارها صغيرة القد  
بيضاء اللون . يزود مستدرة ، حنطية ، قاسية كالجرب  
تدر البزل وتفيد الحضم وتنشط الايلاع وتذيب البلم .  
انواعه عديدة اصلها الجرد والبقاع الداخلية .

٢٤١١٢ - كُنْيَهَان صِيَاغِي ، شَنْجَارَ الْبَرِّ ،  
عَسَّ الْخَمَارِ ، رَجُلُ الْخَمَامِ  
Alkana tinctoria (S). Alkana tinctoriale (F). Alkanet (E). Alkanne (D). Alkana spuria (I).

نبات حشوي بري من فصيلة الحسنيات ينتج منه  
صياغ آخر اللون شائع الاستعمال .

٢٤١١٣ - كُنْيَهَل  
الكُنْيَهَلُ : غير عظام . قال امرو القيس :  
فاضى يمح الماء من كل بقعة  
يكب على الاذنكاز دوح الكُنْيَهَل .

٢٤١١٤ - كُنْيَهَوْر  
Fractocumulus

ضرب من الغيوم الغزيرة المطر ويدعى الجلب ، اطلبه .

٢٤١١٥ - كُنْيُوْد  
Terra improductiva (F).  
Unproductive soil (E).

ارض لا تنبت شيئاً . يقال هذه ارض كنود .



كنكيتا



كهان صياغي



كهبل السنغال



كهذب الاجاص

٢٤١٣٤ - كُهْدَبُ المَنْجَا ، أكَارُوسُ المَنْجَا  
Eriophyes mangiferae(S). Eriophye du mangar(F).  
حشرة من الكهديات المجهرية تركيب برام المنجا تؤذيها  
وقد تقضي عليها .



كهذب البنقوة

٢٤١٣٥ - كُهْدَبِيَّاتٌ  
Eriophyidae(S). Eriophyidae(F). Eriophyidae, Blister mites, Gall mites(E). Gallmilben, Gallenmilben(D).  
فصيلة حشرات صغيرة القد من رتبة القراذيات . اجناسها  
وانواعها عديدة جميعها مجهرية . اجسامها اسطوانية .  
تطوي من غطيل الى اربعة خطوط من للميتير . جرابها  
رباعية طرفية تحيط باجزاء المنك || جميع حشراتنا ضارة  
تركيب برام واوراق النبات تؤذيها اشد الاذى وقد تسبب  
تلها .



كهذب الزيتون

٢٤١٣٦ - كُهْدَلُ القُطْنِ ، قَارِظَةُ القُطْنِ  
Lepidocyrtus incertus(S).  
حشرة صغيرة من الكهديات . ذباب الجسم ، سرها ابيض  
مستطيلة الذنب ، تعيش على نباتات الاراضي الرطبة  
انصها القطن والبرسيم والقمح .

٢٤١٣٧ - كُهْدَلُ المَرْزِ ، قَارِظَةُ المَرْزِ  
Drepanura muscatis, Entomobrya muscatis(S).  
Drépanure du bananier(F).  
حشرة صغيرة من الكهديات قوفا الى الصفرة ، تركيب  
الموز وقصب السكر . اضرارها زعدي لا تستوجب  
المكانسة .



كهذب الكرمة

٢٤١٣٨ - كُهْدَلِيَّاتٌ ، كَلْبَسَلِيَّاتٌ  
Collembolae(F). Collembola(E).  
ونهم من دعما . قارظت الذنب . رتبة حشرات عديمة  
الاجنحة قارضة التطور الانساني العربي . حشرات  
قارضة قارضة مستطيلة الاذنان تحمل في حقلها البطنية  
الاول جراب صغير القد يفرز مادة لزجة تاصمعا على  
تسلق السطح الناعمة المائلة .

٢٤١٣٩ - كُهْرَابِي  
Electrogène(F). Electrogin(E).  
نمت تعريتي يطلق على كل جهاز يولد الكهرباء .



كهذب القطن

٢٤١٤٠ - كُهْرَبَاءُ  
Electricité(F). Electricity(E).  
الكهرباء طاقة موكدة ، داسها تتبع على الطبيعية .  
وهي تقسم الى فرمين الكهرباء الاحتكاكية والكهرباء  
الديناميكية فالاحتكاكية هي التي تستعمل في توليد  
الكهرباء . اما الديناميكية فهي لفظة بالتيار الكهربائي  
والاجهزة التابعة له .

٢٤١٤١ - كُهْرَبُ ، كُهْرَبُ  
Electrisation(F). Electrification(E).  
٢٤١٤٢ - كُهْرَبِي ، كُهْرَبِي  
Electrique(F). Electrie(E).



كهذب الموز

٢٤١٤٣ - كُهْرَبِيَّةُ عِلْمِيَّةُ  
Electrogalvanisme(F). Electro-galvanism(E).  
درس القوى الصادرة عن الصفائح الكهربائية .

٢٤١٤٤ - كُهْرْمَانُ أَصْفَرُ  
Succin  
هو المنبر الاصفر مادة راتنجية بحجرة ، صلبة ، شبه  
شفافة . لونها يراوح من الاصفر الى الاحمر . لا تنوب  
في الماء وتفسد في ٢٨٧ م . استعملها يولد الحامض  
النبري وزيوت طيار مستحب الرائحة العطرية .

٢٤١٣٦ - كُهْدَبُ البُنْدُقِ ، أكَارُوسُ  
Eriophyes avellanae(S).  
Phytopte du noisetier, Eriophye du noisetier(F).  
Hazelnut gall mite(E). Haselnussgallmilbe(D).  
حشرة من الكهديات المجهرية تركيب سرائف برام  
البندق تسبب قتلها واعلاص الازهار .

٢٤١٣٧ - كُهْدَبُ البَنَدُورَةِ ، أكَارُوسُ  
Eriophyes cladophthirus(S).  
Eriophyes des tomates(F).  
حشرة من الكهديات المجهرية تركيب سوق ولوراء  
البندورة فتقتلها ويحتملها وعمتها عن الاثمار .

٢٤١٣٨ - كُهْدَبُ التَّيْنِ ، أكَارُوسُ التَّيْنِ  
Eriophyes ficus(S). Eriophye du figulier(F).  
حشرة من الكهديات المجهرية تركيب اوراق التين الطرية  
النامية تؤذيها بعض التي .

٢٤١٣٩ - كُهْدَبُ الرُّمَّانِ ، أكَارُوسُ الرُّمَّانِ  
Eriophyes granat(S). Eriophye du grenadier(F).  
حشرة من الكهديات المجهرية تركيب اوراق الرمان  
تقتبب اصفرارها وصلها الباكر .

٢٤١٣٠ - كُهْدَبُ الزَّيْتُونِ ، أكَارُوسُ  
الزَّيْتُونِ ، فِيلُوكُوتِي  
Phyllocoptes(S). Phyllocopte(F). Rust mite(E).  
Kräuselmilbe(D).  
حشرة من الكهديات تركيب اوراق الزيتون اخضها  
وريفات الانان النابتة فتصنها من القاذو جميعها الطيبي  
وترقها ببثور صفر تنسج تلويجيا الى ان تم الفصل  
تقتفي عليه .

٢٤١٣١ - كُهْدَبُ الزَّيْتُونِ ، أكَارُوسُ  
الزَّيْتُونِ  
Eriophyes tilliae(S).  
Eriophye du tilleul, Phyllopte du tilleul(F).  
حشرة من الكهديات المجهرية تركيب اوراق الزيتون  
قتضوها بالانابيب الشبروية التي تقيمها على صفحات  
التصل عليها .

٢٤١٣٢ - كُهْدَبُ الكَرْمَةِ ، أكَارُوسُ  
الكَرْمَةِ  
Eriophyes vitis, Phylloptes vitis(S). Eriophye de la  
vigne, Erinoze de la vigne, Phyllopte de la vigne(F).  
Grape bud mite, Grape erineum mite(E). Reben-  
blattgallmilbe, Rebenpockenmilbe(D).  
حشرة من الكهديات المجهرية تركيب اوراق الكرمة  
فترتها بالبربر بمد القفاه على خلايا النسيج فيص  
النسيج بين البشرين كانه محروق لا ريباه منه .

٢٤١٣٣ - كُهْدَبُ الكَشْمِشِ ، أكَارُوسُ  
الكَشْمِشِ  
Eriophyes ribis(S).  
Eriophyes du grossillier, Phyllopte du grossillier(F).  
Black-currant gall mite(E). Knospengallmilbe(D).  
حشرة من الكهديات المجهرية تركيب برام واوراق  
الكشمش تؤذيها وقد تسبب اعلاص البرام والازهار .

الزئاف ، أنواعه المعروفة اريمة تتميز برؤوسها المستفخمة وبأشداها الكبيرة الفاغرة وبأسنانها الحادة المنقطة كإنياب الاناعي || أجسامها عريضة ، عادمة السهف ، مبعثرة المناخس ، حيوتها حلوية الارتكاز تحت قلة الرأس حيث يوجد ثلاثة أسلاك أو ملاس غضروفية تبدو كخيوط مستطيلة تنتهي ببعض الأسماك المختلفة الاشكال يستعملها الكواكب لاجتذاب الاسماك الصغيرة ، ذلك لانه كسول قليل الحركة يقضي معظم أوقاته مستلقياً على بطنه فاعماً شدة بانتظار الفريسة || أشهر أنواعه كواكب المحيط المتوسط .

### ٢٤١٥٤ - كَوَاكِبْ المحيط الأطلسي \*

*Lophius budgassa* (S).  
*Baudroie de l'Atlantique* (F).  
سمكة من الكواكب . أعطانها مجاذع وأغواط وشطوط المحيط الأطلسي . يكثر وجودها في الخلجان المراكشية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية || جسمها شبه مخروطي الشكل بطول من ٧٥ الى ٩٥ سم . ثوبها يمتد الموقع الذي تعيش فيه لانها قليلة الحركة || لحمها جيد الصنف ابيض اللون مرغوب فيه .

### ٢٤١٥٥ - كَوَاكِبْ مَبْدُولَة \* ، كَوَاكِبْ المتوسط \* ، لُطْ بَحْرِي مَبْدُول \*

*Lophius piscatorius* (S). *Lophie baudroie*, *Baudroie commune*, *Diable de mer*, *Crapaud pêcheur*, *C. de mer* (F). *Toad-fish*, *Sea-devil*, *Fishing-frog* (E).  
نوع من الكواكب . سمكة بحرية ييوس . أعطانها البحر الأبيض المتوسط وبعض أقاليم المحيط الأطلسي . مسرحها اضرواح الهامح والشطوط . تألف المواع المأدبة التي يراوح بعضها من ١٥ الى ٢٥ مترًا || جسمها صفي الشكل ، يطر من ١٦٠ الى ٢٠٠ سم . سمكها عادم الصف . ثوبها الى الخنطي الاسمر يبق في الصفة العليا ويغير ويبيض في السفلى . رأسها ضخم غليظ . شدةها رجب الانفراج . عينها كبيرتان سطحيتان . ويلبوا في قة الرأس ثلاثة أسلاك غضروفية دقيقة مستطيلة ، الاول منها ينتهي بقرص صغيرة كالاسمال || زعنفتها الظهريّة الامامية مستطيلة المناخس الشائكة || تتميز باستطالة فواعده الزعانف الصدرية الرقيقة الارتكاز . وتتميز أيضاً بالشذولة اي أنها تمانن البيئة التي تعيش فيها || لحمها ابيض اللون ، متوسط الصنف ، مأكول .

### ٢٤١٥٦ - كَوَاكِبِيَّات \* Lophilidae (F). Lophidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من رتبة شائكات الزعانف . أجسامها وأنواعها المعروفة قليلة العدد . أعطانها المحيط والبحر الأبيض المتوسط . تألف الهامح والشطوط . مسرحها الاغواط التي يراوح بعضها من ١٥ الى ٢٥ مترًا . تتميز بالكسل والشذولة اي أنها تمانن المواع التي تعيش فيها || أجسامها صغية الشكل كالشرغ ، ضفحة الرؤوس ، مألثة القشار الرجب ، مبعثرة المناخس الحادة . أعطانها فطس . أشداها كبيرة وعريضة . أسنانها حادة متعققة || عيونها رقيقة الارتكاز تشرف عليها بعض الاسماك الغضروفية المنوصة بالاسمال || أشهر أجناسها الكواكب .

### ٢٤١٥٧ - كَوَاكِبْ \*

*Bulla* (S).  
*Bulle* (F). *Bulla* (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مبديات الاربل

٢٤١٥٥ - كَهْرَمَانِي  
Hydro-électrique (F).  
ما يختص بانتاج الطاقة الكهربائية المولدة من دفع الماء .

٢٤١٥٦ - كَهْفَان \*  
Spéleologue, Spéleologiste (F). *Speleologist* (E).  
من كان اختصاصه الكهفنة .

٢٤١٥٧ - كَهْفَنَة \*  
Spéleologie (F).  
Spelatology (E).  
علم يبحث في تقيب الكهوف وفي سبر الاغوار ومجاري المياه الجوفية .

٢٤١٥٨ - كَهْكَب \* كَهْكَم  
Aubergine (F).  
هو الباذنجان ، اطلبه .

٢٤١٥٩ - كَهْكَبَة \*  
Chicoca angulifuga, C. brachista (S).  
Cahinga, Cainga (F). *Chicoce tree* (E). *Traubenförmige, Kainzawurzel* (D).  
شجرة حرجية طيبة معمرة من فصيلة الفويات . مهدا بعض مناطق أمريكا الاستوائية || ساقها عارضة متسلقة فراء . اوراقها معتقة ، متغلبة ، اعليجية الشكل . نصلها جامد الصفة ، يحمل الخضار المائت اللامع . ازهارها عتقدي التصميم . ازهارها صغيرة وردية اللون ، عادمة الريف . ثمارها خمية ، مبطلة ، عاصلة للملأق ، لا تؤكل || عصارة الاوراق ولثاير مقوية وقايضة .

٢٤١٦٠ - كَهْل \*  
Liobunum rotundum (S).  
Phalangide, Fauheur (F). *Harvester, Harvest-spider* (E).  
حشرة قاذفة دابة من فصيلة الكهوليات ورتبة الهرديات . موطنها معظم المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط وأوروبا || جسمه صغير لثد ، اعليجي الشكل ، ملحوم الصدر والبطن ، عادم المشن ، خيشوي التنفس . ثمانى البرامز المستطيلة العتيقة . ثوبه اصهب اللون عند الانثى وينصرف الى السرة الخنطية يملؤها قتيق اسود عند الذكر . الذكر اصغر قدماً من الانثى التي يبلغ طولها نحو ٤ سم . || يألف جميع المواع والمساكن الآهلة . يصرح في الليل . قوته الحشرات الصغيرة واساريمها ويرقاتها والذباب والهام || يعثر من الدويبات النافعة لانه يقضي على المؤذية .

٢٤١٦١ - كَهْلِيَّات \*  
Phalangidae (S).  
Phalangidae (F). *Phalangidae* (E).

فصيلة حشرات دابة من رتبة الهرديات وصف العناكب . أجسامها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحارة || اعرف أنواعها واشهرها الكهول .

٢٤١٦٢ - كَهْلِيَّات \*  
Electron  
جزء . عادم الجرم الملموس يشحن للكهرباء السلبية .

٢٤١٦٣ - كَوَاكِب \* ، عُلْجُوم البَحْر ، لُطْ بَحْرِي \*  
Lophius (S).  
Baudroie, Lorte de mer (F). *Angler-fish, Frog-fish* (E).

٢٤١٦٤ - كَهْلِيَّات \*  
Lophius (S).  
Baudroie, Lorte de mer (F). *Angler-fish, Frog-fish* (E).

٢٤١٦٥ - كَوَاكِب \*  
Lophius (S).  
Baudroie, Lorte de mer (F). *Angler-fish, Frog-fish* (E).

٢٤١٦٦ - كَوَاكِب \*  
Lophius (S).  
Baudroie, Lorte de mer (F). *Angler-fish, Frog-fish* (E).



كهول



كوكبة مبدولة



الجنوبية . تسرح في الصباح الباكر وقرب الغروب . قوتها الاخشاب والجذور والحبوب . اجبرتها اتفاق مستطيلة عديدة التماريج والعايزل المتفرعة اشهر انواعه مايلي .



كُوَاة

٢٤١٦٦ - كُوَيَايَ الْبَرْكَايِل Cavia porcellus (S).  
Cobaya aperea (F).  
موطنه البرازيل والنيوان وبوليفيا والأوروغواي . طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الصبغة الصنائية . بطنه ابيض اللون . يعيش جماعات عدد أفرادها نحو ١٥ . يألف الاماكن الرطبة ويجاري الماء والطراف الادغال والنايات اثناء تقصع من الدرسين الى الثلاثة مرة واحدة في العام .

٢٤١٧٠ - كُوَيَايَ الْجَنْتُوب Cavia australis (S).  
Cobaya austral (F).  
موطنه امريكة الجنوبية حتى مضيق مجلان . طوله نحو ٢٨ سم . ثوبه سوي اللون اطمل الظهر اشقر البطن . وبره غثن مستطيل اا يألف الغضاب والادغال . اثناء تقصع مرتين في العام .



كُوَايَا

٢٤١٧١ - كُوَيَايَ الْهَشْدَه غَمْبَرُ الْهَشْدَه Cavia cobays (S). Cobaya, Cochon d'Inde, Lapin d'Amérique, Rat d'Amérique (F).  
هو الكوباي الداجن . منه امريكة الرطبي . ثلاثه الرئيسية خمس تختلف من بعضها باختلاف وبرها بين الطول والقصر والخشونة والنعومة والقلة والكثالة اا طوله يراوح من ٣٠ الى ٣٥ سم . ثوبه عديد الالوان المتراكمة لشيائية اا طباعه طباع الارنب ويرى مثله . اثناء تلد عدة مرات في العام الواحد .

٢٤١٧٢ - كُوَيَا Cobra (F).  
Cobra, Hooded-snake (E).  
الكوبرا والتيجا والصل اسماء مختلفة لاسم من الحيات الهيبطة الاماينات الاخاذيد . اغلب نجا .



كُوَايَا

٢٤١٧٣ - كُوَيْلَت Cobalt  
معدن ابيض اللون شديد الصلابة صعب الانصهار ثنائى التكاثر يزرع (كو-Co) وزنه الاتوي ٨٩.٩٤ غم ثقله الاتوي ٨٩.٦ يذوب في الحامض النيتريكي اا لا يذوب في الطبيعة حرأ بل مركبا مع بعض العناصر . اوسع استعماله عديدة اصعها تلون القزاز والخرف .



كُوَيْن

٢٤١٧٤ - كُوَيْن \* Galeopithecus (S).  
Galeopithecus (F). Galeopithecus (E).  
كوين هو الاسم الماليزي . اما الاسم العلمي فيني (هر-قرد) . جنس حيوان لبين حاشر رابل متسلق من فصيلة الكوينيات . له نوعان كوين ماليز وكوين الفيلين . الفارق بين الاثنين حجم وئوب . الماليزي يطول نحو ٦٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٢٢ سم . يسلطه نحو ٦٧ سم . ثوبه العلوي الى الطحلة السوداء لشيائية الماجات . ثوبه السفلي الى الصبغة السوداء . اطراف قوامه الى السواد المشب بالابيض . الفيليني يطول نحو ٥٥ سم . وبسطه نحو ٥٧ سم . ثوبه العلوي الى السرة السوداء تملوها رقعة يضاء لامتناوية التوزيع ثوب السفلي اطراف قوامه الى الطحلة التبراد يملوها مواج اسمر اا سلجته الحياتي جماعي . يسرح في الليل ويبيت في النهار متعلقا بقائمتي الخلفيتين كالرملوط . قوته اغشرات والثار ووراق النبات اا

وفصيلة الطايات . انواعها الماصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الممتدة الحارة اا اصداها اهليلجية الشكل ، ربة الطلع المصراعي القاطب رقيقة الصفة الملونة ، صادة الحلزلة والاريفة . اجسامها اهليلجية مقطعية الرأس والعقب . رؤسها قليلة الوضوح عادمة اللواس .

٢٤١٥٨ - كُوَاة ، كُوَاة ، كُوَاة Rucha (F).  
Hive (E).  
هي ماوى النحل اى خليته حيثك شباكها بالقصب او بالقش .

٢٤١٥٩ - كُوَاَصِي Rapaces (F). Rapacious (E).  
نعت تعريفى توصف به جوارح الطير .

٢٤١٦١ - كُوَاَصِر Oiseaux de proie, Rapaces (F).  
Birds of prey (E).  
رتبة من الطير تعرف بالجوارح . فصائلها واجنسها عديدة تقسم الى فئتين كواس النهار وكواس الليل .

٢٤١٦١ - كُوَاَصِر الْفَيْل Rapaces nocturnes (F).  
Nocturnal birds of prey (E).  
هي جوارح الليل تشمل اليوم وسائر اجناس الطير اللكواس التي تسرح في الليل .

٢٤١٦٢ - كُوَاَصِر الْهَشَار Rapaces diurnes (F).  
Diurnal birds of prey (E).  
هي جوارح النهار وتدى سباع الطير تشمل المغان والصقور والنسور البع ...

٢٤١٦٣ - كُوَاَكِب الْبَحْر Astériadæ (S).  
Astériadæ (F). Astériadæ (E).  
فصيلة من شوكيات البحر . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار العالم .

٢٤١٦٤ - كُوَيْل Copal (F). Copal-resin (E).  
صنع راتنجي يستخرج من شجرة الكتنة يستعمل في صناعة الطلاء .

٢٤١٦٥ - كُوَيْلِيَّة في الكتنة ، اطبا .

٢٤١٦٦ - كُوَيْسَان Caparsaon (F).  
Caparsaon, Housings (E).  
سرة فضفاضة توضع على ظهور الخيل لوقايتها .

٢٤١٦٧ - كُوَيْلِيَّة \* Cupania (S). Cupania (F).  
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة السابديات انواعها المعروفة نحو ٤٠ منتشرة في جميع المناطق الاستوائية اا جميعا اشجار وشجيرات قراء . اوراقها متعاقبة مركبة ، شقية التنجيم ، سنانيسة النصال . ازهارها محوري الاكثاز ، شقوي التنجيم . ازهارها ضرية متباعدة الالوان ، يكثر فيها الابيض ثم الوردي . بزورها مأكلة طعمها شبيه بطعم الكتستانة .

٢٤١٦٨ - كُوَيْيَا \* Cavia (S).  
Cobaya (F). Guinea-pig (E).  
جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الشردفيات . انواعه ثمانية . جميعا ربة الجافة ، صغيرة ائدة متائلة الشكل . رؤسها غليظة . اراطها لا مفلوكة . اذناها قصيرة قارئة . قوائمها متساوية الطول . اذناها بدلاج اا موطنها امريكة

٢٤١٨٢ - **كوتنل** ، **أطماط** (S).  
Arec (F). Arec (E).  
جنس أشجار مشرة من النخلات ، أنوعه عديدة منها البلاد الحارة . جذورها رقيقة مستقيمة . جريدتها ريشي الصف . ثمارها بيضيه صناعية ، لبها شائع الاستعمال الطبي لا سيما الطب البيري . أشهر أنواعه كوتنل الكاشو .

٢٤١٨٣ - **كوتنل الكاشو** ، **أطماط الكاشو** (S).  
Arec catechu (S). Arec catéchu, Aréquier, Noiset de l'Inde (F). Arec-palm, Betel-nut palm (E). Pinangpalm, Arekapalm (D). Arec, Palma arec (I).  
نوع من الكوتنل جذعه مستقيم ريش . ثماره بيضيه الشكل والحجم ، يستخرج من لبها مادة الكاشو .

٢٤١٨٤ - **كوتنل الحبشة** ، **كوتنل إفريقي** (S).  
Brucea antidyenterica, B. salutaris, B. ferruginea (S). Brucée d'Éthiopie, Ko-sam d'Afrique (F).  
نوع من الكوتنل . شجيرة برية من فصيلة السموريات . مهدها الحبيشة وبعض مناطق أفريقية الوسطى والشمالية . ساقها تحلة فراء تملو من ١٥٠ إلى ٢٢٠ سم . أوراقها معتقة متعاقبة ، سنانية ، أبيضه . تكثر من النباتات الطبية . لحاء ساقها وجذورها تحوي بعض المواد الدهنية والمواد القسوية ومادة الكوتنل . تستعمل في معالجة الزحار ودود الاسماء .

٢٤١٨٥ - **كوتنل نحيل** (S).  
Brucea amarissima, B. gracilis, B. sumatrana (S). Brucée grêle, Ko-sam (F). Ko-sam seeds (E).  
نوع من الكوتنل . شجيرة برية من فصيلة السموريات . منها الطوي يمتد من جنوب الصين إلى الملايو والفلبين وإسترايلا . ساقها تحلة فراء تملو من مترين إلى ثلاثة أمتار . أوراقها معتقة متعاقبة أهليلجية ، أبيضه . تكثر من النباتات الطبية . لحاء الساق والجذور مرة الحاذق تحوي بعض المواد الدهنية والحواض القسوية ومادة غلوكونية تدعى كوتنل . ثمارها كروية سوداء اللون مغلفة بصبات لوزية الشكل دهنية المادة خواصها خراش اللحاء . تستعمل كسادة للميكروبات وفي معالجة الصفراء والزحار ودود الاسماء .

٢٤١٨٦ - **كوتنل** (S).  
Psathyrella (F).  
جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفطارقيات . أنواعه المعروفة قليلة العدد أعطتها بعض المناطق الجبلية المستنة من الشرق الأدنى إلى أروبة . يعيش على التبال وعل أروبات الأشجار العرّة أعصها السندبان وسنه اللك واللك والمثلل . ساقه دقيقة حملهه اللون . نكهته مظلمة الشكل ، قطرها نحو ٧ سم . لوئها إلى المغرة القائمة أو الكمية الاسمر . اطراسها إلى الكسني الآخر الموجب . لحته كاعنة الصف ، غير مرغوب فيها .

٢٤١٨٧ - **كوتنل أمغر** (S).  
Psathyrella spadicea (S). Psathyrella bai brun (F).  
نوع من الكوتنل . يعيش مجموعات وأزرة العدد على أروبات اللك والمثلل . ساقه دقيقة حملهه اللون . نكهته مظلمة الشكل ، قطرها نحو ٧ سم . لوئها إلى المغرة القائمة أو الكمية الاسمر . اطراسها إلى الكسني الآخر الموجب . لحته كاعنة الصف ، غير مرغوب فيها .

يصلق الأشجار جفّة وينقل بين أعصائها برشاقة ويقفز من شجرة إلى شجرة حلقاً من الفضاء كالفلل ، من أجل إلى أسفل ، مسافة ٦٠ أو ٧٠ متراً .

٢٤١٧٥ - **كوتنليات** (S).  
Galeopithecidae (F). Galeopithecidae (E).  
فصيلة حيوانات لبونة ، حاشرة ، وأبلة ، مفصلة ، مركزها في هرم البوات بين البوريات والوطوطيات . أجسامها مكفوة بشفا أشمر ، يمتد من قاعدة العنق إلى أطراف القوائم والذليل ، يقوم مقام المظلة فيمكنها الانتقال جواً بين الأشجار على مسافات تراوح من ٦٠ إلى ٧٠ متراً . أصابع قوائمها مشطية الأوتكاز ، لا متعاقبة . أظفارها حادة عجة الأطراف . أنثاها ثنائية الاغلاف الصديرة ، تضع جرواً واحداً يتعلق بصورها حتى النظام . لها جنس واحد يدعى كوتنل وله نوعان .

٢٤١٧٦ - **كوتنلية** هي الأيدانجية ، راجعها .  
٢٤١٧٧ - **كوتنة** ، **مقل** (F).  
ناقلة في جدار البناء لدخول الهواء والنور . فهو قانوني إذا كان يشرف منه على الطريق العام ما دام مطابقاً للأنظمة الإدارية ولكنه معطور إذا كان يشرف منه على ملك الغير ولم ترع المسافة القانونية في بدهه مع أنه ان يكون مرتفعاً أو مثلاً مباحاً .

٢٤١٧٨ - **كوتنل منقط البطن** ، **كوتنل** (S).  
Cleonus  
punctiventris, Temnorhinus punctiventris (S). Cléone piqueté (F).  
حشرة مؤذية من فصيلة السوسيات . موطنها بعض أقاليم حوض البحر الأبيض المتوسط ومعظم أقاليم حوض البحر الأسود . تأكل الموائع التي توجد فيها السميتيات . خنافسها تقضم الأوراق . يرقاتها تركب الجذور فتقنها وتشفوها . جسمها معتدل الحجم ، أهليلجي اللون ، بطول من ١٦ إلى ١٨ مم . ثوبها العلوي إلى الكهية يملوها موج اشجع . ثوبها السفلي إلى الكهية السمراء يملوها تنقيط اغبر . رأسها يرمي الشكل ينهي غنط غرولي ناشر الكظر . زباناها مرفقيان ، وشيا الأطراف . الأثنى أبرز قدماً من الذكر وأطول غنطاً منه . لها جيل واحد في الجيل . تخرج الحشرة الجملانة من أسكناتها الشتوي في أواخر نيسان . تسرح في النهار . تباهر منع المكان يمد ظهورها بنحو عشرة أيام . تفرّقه في التربة قرب استاخ النباتات المائلة . البرية مرقاة ، بطيئة النمو ، تبلغ الكمال الجسموي بعد الثفت بنحو عشرة أسابيع . جسمها يطول نحو ٢٠ مم . وهو اسطواني الجسم ، مقوس الشكل ، أبيض اللون ، تنهي الموج . رأسها مستطيل ، مكور ، اسمر . طور الكمال يستمر نحو عشرة أيام وينتهي في التربة .

٢٤١٧٩ - **كوتنلوك** (F).  
Caoutchouc (F).  
هو المطاط ، أظله .  
٢٤١٨٠ - **كوتنل** هي البشري ، أظله .  
٢٤١٨١ - **كوتن**  
كوتن الزرع وكل نبات حولي : فاق الأدياس وصار على أديم وقات أو حلاً .



كوتن منقط البطن



كوتنل الكاشو



كوتنل أمغر



كُون كندول



كُون غنبل




كوب



كودانة جاما



كودانة رولفي



كودانة سولاني

متنقطة تلوح بالحاء فيبتقت ويسقط || وهو حل الحفصيات يقع حشوية لانياسية مستطيلة تركب الحاء تنسب جنافيا وتصلها والتصالها بالنبس ، وبعد ذلك بحسة او ثمانية اسابيع تنقل الحاء باستطاعتها تنظر حل الشقوق ثمانية فطرية رمية قطرها نحو المليمتر لونها يراوح من الالبيض الى الوردي || يكافح بالاستعمال وبلاذ الجروح بعد تظهيرها .

#### ٢٤١١٥ - كُوْدَانَة رولفي \*

*Corticium Rolfii, Sclerotium Rolfii* (S).

فطر مجهرى يكثر ويبدو في المناطق الحارة رطوف حل العديد من النباتات كالارز والياضبان والياض والبنفسج والتامول والحفصيات والحفنة والحظفل والحجروج والحلبي والنجبر والبوسر والذرة والبق والشم والعاتق والفاسوليا والفلفل والفليفلة والفول السني والقرع والبقول والفلقاس والمفوف والتبجيل والطنش والتيلج والمخسر ويصاد الشس وفستق العبد وقصب السكر || يصيب النبات في عهد غيب ونشوة السريخ فيؤثم البوق ينطق حشوية الخبز ، يفسد الحور ، كثيفة التجميع ، تبدو كالبقعة الواحدة ، تعزل التبادل التنسي وتسبب اصفرار الاوراق ويذبل || وقد شوه حل التبع في زراعات الهند البريطانية كما انه يركب احماد ورق الموز دون ان يقع بها شديد الاذى || يكافح باحباب كثرة الرطوبة وبالأكار من الاسماء الاثرية انحصا نيزات الجير وصفات الامويك .

#### ٢٤١١٦ - كُوْدَانَة سُولَانِي \* ، رِيْزُوْكَوْن اُسُوْدَه

*Corticium solani, C. vagum, Hypochinus solani, Rhizoctonia solani, R. rapae, R. betae, R. napi* (S). *Rhizoctonia noir, Maladie des colerettes, M. des manchettes, Varicelle des tubercules, Chancres du pied* (F). *Black speck, Collar rot* (E). *Wurzelknoten-Krankheit* (D).

فطر مجهرى يتطفل حل البطاطا وعلى أكثر من ٢٥٠ نوع من النباتات تنتمي الى ٦٦ فصيلة . يكثر في المساقط المعتدلة الحارة . يصيب الشتول في الاكواد فيلدها ويركها في الحقل فيعطل انحصا القطن والبنجورة والياضبان . مظهره حل البطاطا المزروعة وشاح متكرري اغبر اللون يكثف اللون والجذور والسوق حتى سطح التربة فيجثها ثم يقضي حل صلابتها فترقي وتسود وتذبل اوراقها وتيس . وهو حل دون البطاطا المقولعة وشاح مشيبي ابيض اللون متكرري النواص تنضله قروح لانياسية بشكل الحلم لونها الى البصرة تنطس التسبيج البشري || يكافح باستعمال مركبات سلفات النحاس او املاح الزئبق .

#### ٢٤١١٧ - كُوْدَانِيَات \*

*Corticaceae* (S). *Corticaceae* (F). *Corticaceae* (E). فصيلة فطور مجهرية من رتبة الهاميات تتميز بتحتها الفارش ، نكتتها لماء السطح او زياد ، دقيقة الحلب اغشيتها فوية التركيب او شمعية . بورفاتها شفافة . اجناسها وانواعها قليلة المدد اعرفها الكودانة .

#### ٢٤١١٨ - كُوْدَانِيْن ، كُوْدِيْن

*Codéine* (F). *Codéine* (E). مادة قلووية بلورية متبصرة عادمة اللون تستخرج في الافيون . تغلي حته ١٥٥ °مخ . وهي قليلة الذوبان في الماء . تلوب في الكحول والكلوروفورم والبنزين وسلفور الكربون .

#### ٢٤١١٨ - كُوْن كَنْدُول \*

*Psathyrella candolleana* (S). *Psathyrella de Candolle* (F).

نوع من الكون . يكثر ويبدو في بعض غابات اوروبية وتركية . يعيش على الدبال في المراعي الجبلية . ساقه دقيقة ، رفيعة ، غبراء اللون . نكتته مظلمة الشكل ، غبراء اللون يطلوا موانج اصفر تشبه صفرتة وتسمر حته القفرص ، قطرها نحو ٧ سم . اطرافها وردية اللون || لحيمته بيضاء الصنف ، مأكولة .

#### ٢٤١١٩ - كُوْن مُحَمَكِي \*

*Psathyrella velutina* (S). *Psathyrella veloutée* (F).

نوع من الكون . يعيش على الدبال في المراعي الظليلة . ساقه دقيقة ، عريضة ، سمراء اللون ، حلقة الزغب حتى اواسط الزام الرابع . نكتته مظلمة الشكل ، لامتناهية السطح اشعل الزغب ، قطرها نحو ٥ سم . لونها الى الكسني الاصفر الموانج || لحيمته بيضاء الصنف ، مأكولة .

#### ٢٤١٢٠ - كُوْجَر \* ، بُوْمَاء ، اُسَاء امريكي

*Felis concolor* (S). *Puma, Puma concolor, Cougar, concolor, Lion argenté, Lion d'Amérique* (F). *Puma, Cougar, American lion* (E).

حيوان مفترس وسيد الجلسي والنوع من فصيلة السنوريات . اصطلح البلاد الامريكية . شكله يشبه البقرة . طوله الكابل نحو ٢٠٠ سم . جسمه ١٤٠ وبنه ٦٥ لبا ارتفاعه تنمو ٦٥ سم . ثوبه الى العسله السوية المتأخرة يمتد مع اقترابه من الظهر وينير حته البطن . زوره ابيض اللون وشفته العليا كذلك || يأنف الاجراح الكثيفة المائية . يساق الاجراح بشفقة وقد يقضي وقت استراحتة عليها || قوته ما استطاع اقترامه من الحيوان الطير . يصرح حته الغروب وفي اوائل الليل ويعد الفجر || انشاء تقص من جبر واحد الى حسة جراء تبعر النور بعد وضعها بشعة ايام وتراق أمها بعد ثلثة اشهر .

#### ٢٤١٢١ - كُوْد ، كُوْدَانَة

*Planche à semis* (F). كود ، كودانة مسطح ترابها ودفعت حروفها وحضرت لاقبال البزور . ج اكود .

#### ٢٤١٢٢ - كُوْد

*Entasser* (F). *To hoard up* (E). جمه وجمله كبة مسطحة .

#### ٢٤١٢٣ - كُوْدَانَة

*Corticium* جنس فطور مجهرية من فصيلة الكودانات . انواعه عديدة تنطغل حل غثفل اعضاء النبات وعلى الاشباب الجافة المصنوعة || مظهره الخارجي لباد مشيبي كيتي التجميع يسلط الاضاء الموصومة ثم يرضها بقرصه الحشوية اللون الغليظة النشاء || اشهر انواعها ما يتبع .

#### ٢٤١٢٤ - كُوْدَانَة جَاوَا \*

*Corticium salmonicolor, C. javanicum, Necator decretus* (S).

فطر مجهرى يعيش في المناطق الحارة . يتطفل حل عدة نباتات انحصا الحفينة والين والكاكار والحفصيات والسند والكتيا والمنشا... || يركب الانداد حته انتشارها حل الاغصان والافصان حته انتشارها حل الجلود حل الجهة السفلى المعرضة لاشعة الشمس || مظهره الخارجي بطور مستمرة كثيفة التجميع تتحول الى قروح جافة ملبة

الرأس الى قاعدة الذنب . ويعلو من الحاروك الى الكفل تسمة خطوط متعرجة ، يضاء اللون ، لامشوية الطول . عناء لوزيتان ، بارزتان . اذناه كبيرتان . ويحذل في اعل قصبة الانف هلال ابيض ينتهي عند المآقي ، قوائمه ضلعية . شديدة النشط || اجله يتألف من ذكرين مانين واربع اناث واربعة شواذن .

٢٤٢٠٧ - كُورُ الْعَيْدِي هو الشيط الحيشي ، اطلبه .

٢٤٢٠٨ - كُورَب Uranoscopus (S).  
Uranoscopus (F). Uranoscopus (E).

جنس اسماك بحرية بيضة من فصيلة الترغونيات ورتبة شائكات الزعانف || انواعها المعروفة قليلة المدد اعطائها بآثار البلاد الحارة والمتعددة الحرارة || اجسامها صغيرة القند عار متوسطة . تتميز بروسها المنحنية للاشداق ، وبزوايا الحامية الارتكاز الانقي وبزواياها الشائكة المنحاس الحادة || تعيش مدفورة في الرمال والاسمال لا يظهر منها سوى طرف الزعنفة الظهرية الاولى وفي شائكة المنحاس المسمة || احرف انواعها واشهرها الكورب الاخشن .

٢٤٢٠٩ - كُورَبِ اخْشَن ، اشْتُرَبْ اَبَيْص ،

رَسْكَاس Uranoscopus scaber (S).  
Uranoscope raboteux, Rascasse blanche, Rat (F).  
Uranoscopus scaber (E).

نوع من الكورب . سمكة بحرية بيض من فصيلة الترغونيات . اعطائها البحر الابيض المتوسط || جسمها اعليجي الشكل يطول نحو ٣٠ سم . رأسها غليظ ، كبير ، مضغ ، منتصب الفك ، مستعرض الشق ، ومراكب الزوايا العظمية . عيناها اقنيتا الارتكاز تحتلان قنة الرأس . زعانفها كبيرة شائكة . زعنفتها الظهرية الاولى ناشرة المنحاس الصلبة اللدية المسمة . منحاس اسفله مسمة ايضا || توجب العلوي الى الرتبة السفراء تملوها رقة حنطية زاهرة . جانبها الى الرتبة الفضية الموج . بطنها الى البياض الاغبر || لها كامن الصنف ، قل من يرب فيه .

٢٤٢١٠ - كُورَبِيل Courbaril (F).  
هو الككو ، اطلبه .

٢٤٢١١ - كُورَة Crò, Cru (F).  
Growth, Country (E).  
منطقة معينة تميزت بمجودة بعض صفات محاصيلها الزراعية . كور .

٢٤٢١٢ - كُورَلْ Patrnia (S). Patrnia (F).  
جنس نباتات عشبية من فصيلة النارديةيات انواعها المعروفة ١٢ منها البري والزيتي والحوول والممر . سوقها فراج تمل من ٣٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها مركبة متعاقبة . انهارها نفاطية خشوية شكلوية التجميع . ثمارها يفسية الشكل ، مستديرة الفنايات . اشهر انواعها .

كورل الصفوف. P. rupestris (S). P. des rocaillies (F).  
كورل سبريه P. siberica (S). P. de Sibirie (F).  
كورل كعب الفزال P. scabosofolia (S).  
P. à feuilles de scabieuse (F).

٢٤٢١٣ - كُورُس زَوَرِّي Coreus scapha (S).  
Coreus esquif (F).  
حشرة خاضلة من فصيلة الكورسيات . جسمها متوسط

٢٤١٩٩ - كُورَر \* ، كُوسَان \*

Pachyrhizus (S). Pachyrhize, Pachyrhizze (F).  
كودو هو الاسم الهندي وكوسان الاسم الشائع في ملقة . جنس نباتات جنينة عارضة وسمرة من فصيلة القرنيات الفرائية . انواعها المعروفة قليلة المدد مهدا الهند الصينية وملكة . تزرع نبات حولي بلناء جلورها || سوقها عارضة كالويداء . اوراقها معتقة مركبة من ثلاث وريقات قليلة الشكل . انهارها عشوية التجميع ، ابطي الارتكاز . انهارها صيرة بنفسجية اللون ، مستديرة العرف . سفاتها مستطيلة ، متعدلة التبطيط || حويها توكل خضرها ومطبوخة . جلورها شبيهة بالكرب وتوكل طازجة ومطبوخة .



كودو

٢٤٢٠٠ - كُودَس Codex  
مجموعة المقاتير الرسمية وهي تحوي وصف الادوية وتركيبها .

٢٤٢٠١ - كُودَن Bardos (F). Hinny (E).  
هو البزل المتولد من الحصان والاناث ومنهم من سماه النخل .

٢٤٢٠٢ - كُودَن \* Croiser (F). To cross

٢٤٢٠٣ - كُودَكَة Croisement (F).  
Cross-breeding (E).

٢٤٢٠٤ - كُودُو Strepsiceros (S).  
Strepsicère, Coudou (F). Kudu (E).

جنس حيوانات لبونة عارضة مجرة من فصيلة الايليات . له نوعان موطنها يتد من الصومال الى الحيشة والزيبيز وبعض اصقاع افريقية الجنوبية || ملجئها الحياتي جاعي . اجسامها كبيرة القند تتميز . بقرنها القرنية المستطيلة . اناتها جاع . ضررها ثنائية الاخلاف . عجلها يستمر نحو ستة اشهر تقص في تمامه ينفورا واحدا .

٢٤٢٠٥ - كُودُو الْحَيْشَة \*

Strepsiceros imberbis (S).  
Strepsicère imberbe, Coudou de l'Abysinie (F).  
نوع من الكودو . موطنه الحيشة والصومال . يألف الاجام والغابات التي تمتازها مجاري الماء . يسرح في النهار ويبيت في الليل في مواقع معينة قلما يغيرها || جسمه كبير القند يطول نحو ٢٦٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٤٠ سم . ارتفاعه نحو ١٢٠ سم . قرنه لولبي الشكل يرتفع نحو ٦٥ سم . ثوبه الى الشفعة السمراء المتفاوتة الموج بين الرأس والظهر والسدر والبطن . وهو عادم المفرة والحلال الابيض في الجهة اما يملو من الحاروك الى الكفل خطوط متعرجة يضاء مددا ١٥ عند الذكر و١١ عند الانثى . قوائمه شديدة النشط وسرعة عدوه تترك سرعة كودو الرأس || اجله يتألف من اربعة ذكور مائة وثمان اناث وثمانية شواذن .



كودو الحيشة

٢٤٢٠٦ - كُودُو الرَّاس \* Strepsiceros capensis (S).  
Strepsicère du Cap, Coudou du Cap (F).

نوع من الكودو . موطنه يتد من رأس الرجاء الصالح الى الحيشة والصومال . يألف الغابات والاحراج . يسرح في النهار ويبيت في الليل || جسمه كبير القند يطول نحو ٣٣٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٥٠ سم . ارتفاعه نحو ١٣٥ سم . قرنه لولبي الشكل || ارتفاعه السموي نحو ١١٥ سم . والمسافة بين طرفي القرنين نحو ١١٠ سم . ثوبه الى الشفعة السمراء . عفرته شديدة السمرة تمتد من قة

Coryza (F).

٢٤٢٢٦ - كُورِيُوزَا

هي التهاب غشاء الأنف .

Chorizema (S).

٢٤٢٢٧ - كُورِيُوزِمَة

Chorizème (F). Tango plant (E). Kirsienpflanze (D). Corizema (F).

جنس نباتات حشوية وجنية من البذرليات وفصيلة القرنيات ، أنواحه قليلة مننبأ أستراليا ، بعضها زراعي تزييني اشتهر :

Ch. dicksonii (S).

كُورِيُوزِمَة ديكسونيه

Ch. de Dickson (F).

كُورِيُوزِمَة قلبية

Ch. cordatum (S).

Ch. en cœur (F).

كُورِيُوزِمَة موشحة

Ch. varium (S). Ch. varié (F).

٢٤٢٢٣ - كُورِيُوزِيَة Chorisia (S). Chorisia (F).

جنس اشجار حرجية من فصيلة الزيفيات ، أنواحه المهرقة قليلة المدد ، مننبأ بعض المناطق الاستوائية اخصها امريكا الوسطى والجنوبية || اشجارها كبيرة ، ذاتية ، تملو من ٢٠ الى ٣٠ م . اوراقها زنادية ، مركبة ، خاسية الوريقات البيضاء الشكل ، الجالدة الصال . ازهارها خشوية ، خاسية البتلات ، عديدة الاسدية . ثمارها حثية ، مستطيلة ، تحوى حدة يزور يشها رغب نام ، قصير الثيلة ، قلما يصلح لتناول ، يزودها مأكولة بعد التحسيس .

٢٤٢٢٤ - كُورِيُوسِيُورَة هي الصليب ، اطلبه .

Courique (F).

٢٤٢٢٥ - كُورِيُوك

جنس طير من البذرليات مشهور باسم مأزونة ، اطلبه .

٢٤٢٢٦ - كُورِيُوسِيُوس ، جُلُوزِيَة

Corylopsis (S). Corylopsis (F).

جنس جنبات معمرة من فصيلة المشركات ، أنواحه عديدة . اطلها الصين واليابان ، دعوا جُلُوزِيَة لانها قريبة الشبه من الجُلُوز . سوتها فراء ، اوراقها حاملة ، ازهارها سنبل التجميع يسبق الازراق . ازهارها صغيرة ملونة مرقحة الرائحة . اشتهر أنواحه ما يلي .

٢٤٢٢٧ - كُورِيُوسِيُوس سُنْبُلِي

Corylopsis spicata (S). Corylopsis en épis (F).

جنية سبروتية تزيينية مننبأ اليابان تملو نحو ١٢٠ سم . سالتها ورديها زباد الحاد ، اوراقها بيضيه النصل ، خلية الصفحة السفلى تطول من ٥ الى ٨ سم . سالتها سباحية أو تساعية الازهار تطول نحو ٥ سم . || ازهارها يستمر طولك شهر اذار .

٢٤٢٢٨ - كُورِيُوسِيُوس صِينِي

Corylopsis sinensis (S). Corylopsis de Chine (F).

شجيرة سبروتية تزيينية مهدا الصين تملو من ٣ الى ٦ متر . سالتها فراء خن . اوراقها املبلجية الشكل ، نصلها يطول من ٨ الى ١٠ سم . سالتها سباحية أو تساعية الازهار تطول نحو ٨ سم . || ازهارها يستمر طولك الربيع .

٢٤٢٢٩ - كُورِيُوسِيُوس قَلِيل الزَّهْر

Corylopsis pauciflora (S). Corylopsis pauciflora (F).

جنية سبروتية تزيينية مننبأ اليابان تملو نحو ١٠٠ سم . سالتها فراء ، اوراقها تطول من ٣ الى ٦ م . وتعرض من

القد والتعطيط ، شبه مربع البطن ، مزواني الكوسل ، يطول نحو ١٣ م . رأسها محرم . خطمها مستدل الطول . ازهارها نازلة . عيناها صغرتان ، بارزتان . زبانا مستطيلتان . كوسلها مزواني الجانبين || قوتها الى الحظي الاسم الجُلُوزي المراج . بطنها ملوح بالاسفر ، الصفحة السفلى من صدرها وبطنها الى الحظي لتبري المراج || مسرعا الجراي حيث تكثر الاشباب والازهار .

Coraidas (S).

٢٤٢٢١ - كُورِيُوسَات

Coraidés (F). Coraidés (E).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وأنواعها عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء المناطق القطبية || اجناسها متباينة الحجم والاشكال . رؤوسها محرمة أو مربعة . قرونها الاستشعازية رباعية الفصل . صفحات صدرها السفلى لاقبسية التخفيف المد لاستيعاب الاخطام || جميعها من الحشرات الخاضعة القليلة الاذى .

٢٤٢١٥ - كُورِيُوك Eurypyga (S). Caurale (F).

جنس طير من فصيلة الكورليات . أنواحه المهرقة قليلة المدد . سولها يشمل كامل امريكا الجنوبية . اجناسها رفيعة . مناقبها جالسة مستقاة الاطراف . اجنحتها مستعرضة ذرية . اذنانها مستطيلة القد مرفوعة الراف . ارساغها رفيعة رديقة . ارياشها رمل . اقولها متراكبة الألوان الزاهية || اعرف أنواحه واشهرها كُورِيُوك الشمس .

٢٤٢١٦ - كُورِيُوك الشمس \* ، بَلَشَرُون الشمس

Eurypyga helias (S). Caurale soleil, Héron soleil (F).

طائر من الكوروك طوله نحو ٤٤ سم . قويه مزركشي الألوان يجمع بين الالطل والاسفر والاخضر والاسود والابيض والاسمر واخضبي . زوره ويحمره مع خطمها الى البياض العاصي . منقه مؤزر بالاسر والاسود . ظهره وسفاه مجلدة بالاصفر والابيض . اننيكه وذنبه وقوادحه واباهره وسناكه مغلطة بالابيض والاسود . صدره وبلته الى البياض الحظي . حدة حراء اللون ، متفاده وساقه صفر || موته امريكة الجنونية ، يأتان الاغوار ويغاري المياه . قوته الحشرات على اختلاف أنواعها || يدفن في الاشجار المنصورة لقتله . يحبك منه بالخشيش ويطنه بالسمل والطين . انشاء تحفن من يهتئين الى ثلاث يهسات نحو ٣ اسابيع .

٢٤٢١٧ - كُورِيُوسَات Eurypygidae

فصيلة طير تجمع بين الخنق وطول الساق . رؤوسها واضاحتها واجنحتها بلسنوية الشكل ، مناقبها وسفاتها ثقلية . سولها امريكا الجنوبية . تألف الاغوار ويجاري الماء . قوتها الحشرات على اختلاف أنواعها .

٢٤٢١٨ - كُورِيُوس ، كُورِيُوسَة

Tige souterraine bulbeuse (F). Corm (E).

نعت تعريبي توصف به الساق الدفوسية الديماسية .

Corydale (F).

٢٤٢١٩ - كُورِيُوسِدَال

هي التبرية ، نبات من الخشخاشيات ، اطلبه .

Corydaline (F).

٢٤٢٢٠ - كُورِيُوسَالِين

مادة قلوية عادمة اللون مشورية البلورات تستخرج من جذور الكورديال وانزارواند . تملو حدة ١٣٤ سمغ . وهي قليلة اللذبان في اللد . تلذب في الكحول الساخنة وفي الكلوروفورم والايتر .



كُورِل أَلَس



كُورِيُوسَة



كُورِيُوس سُنْبُلِي

٢٤٢٣٨ - **كُوسَج** هو القرش ، اطليه .

٢٤٢٣٩ - **كُوسَجِيَّات** Scyllorhinidae (S).

الكوسجيات فصيلة أسماك بحرية تدمي أيضاً غرائيات ، اطليها .

٢٤٢٤٠ - **كُوسَل** Corselet, Pronotum  
هو في الحشرات الحلقة العليا من مقدم الجوشن .

٢٤٢٤١ - **كُوسَى** Cucurbita pepo ovifera (S).  
Courgette (F). Vegetable marrow (E). Eierkürbis, Kürbis (D). Zucca, Z. da mangiare (I).

نبات زراعي من فصيلة القرعيات ، فروبه وأصراره عديدة ، زراعتها مرمية . ثمارها مستطيلة تؤكل مطبوخة . وتُمار الكوسى تحوي نحو :

٩٥,٠٠ ٪ من الماء  
٨,٠ ٪ من المواد البروتينية  
٣,٠ ٪ من المواد الدهنية  
١٠,٢ ٪ من المواد السكرية  
٢,٧ ٪ من المواد النشوية  
٥,٠ ٪ من الألياف

وهي تحوي أيضاً بعض الأملاح المعدنية اعصها الكليسيوم والحديد مع القليل من الفيتامين ١ و القليل القليل من الفيتامين ٨ .

٢٤٢٤٢ - **كُوسَى إفرنجي** Chayote (F).  
هو السكوب ، نبات زراعي من القرعيات ، اطليه .

٢٤٢٤٣ - **كُوش** Appari (F). To couple (E).  
كوش الطائر أثناء سفدها ولكوش سداد الطائر .

٢٤٢٤٤ - **كُوش** Conyza dioscoroides (S).  
Conyza, Conise, Conisa (F). Ploughman's spike-nard (E). Dörrkraut (D). Coniza (I).

نبات عشبي بري طبي مسم من فصيلة المركبات . يجله تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم . ساقها مخشوشة فراء . اوراقها معتقة اهليلجية ، نصلها ازغب البشرة على صفحته . ازهارها الى اليباض الأخير . يستخرج منه بعض المواد الطبية الصحية وهو يحوي بعض العناصر الجسالية القمالة التي تفكك بالخشرات اعصها البزايث .

٢٤٢٤٥ - **كُوشَاد ، جَنْبِيَّات ، جَنْبِيَّاتَا**

Gentiana (S). Gentiane (F). Gentian (E).  
جنس نباتات جنينية وضيئة من فصيلة الكوشاديات . انواعه نحو ١٢٤ مظهرها بري وبعضها زراعي وزيتني وبعضها طبي . يستخرج من جذور اكثر الانواع مر الكوشاد وساحل الكوشاد وسياخ الكوشاد . ويؤثر بعضها تحوي نحو ١٥ ٪ من السكر الذي يستخرج منه بعد التصهير نوع من القنديد الجليد الصنف . اعرف انواعه واشهرها مايتيغ .

٢٤٢٤٦ - **كُوشَاد أُرْجَوَالِي**

Gentiana purpurea (S). Gentiane pourpre (F).  
نوع من الكوشاد وهو بجلة جبلية مبدولة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقها لائقة متعاقبة سنائية ، نصلها بطول نحو ٢٠ سم . ويعرض نحو ٥ . ازهارها طريقة الارتكاز ، قصيرة الممايك ، أرجوانية اللون ، سفاه الملاج . توجيها جرمي الشكل سداسي التفصيص المستعرض . ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٢ الى ٤ . سنايلها ثنائية او ثلاثية الازهار . ازهارها يستمر طوال شهر آذار .

٢٤٢٣٠ - **كُورِيلُوسِ مُسْتَعْرِضِ الْبَتَلَات**

Corylopsis platypetala (S). Corylopse à pétales élargis (F).

جنينة زيتينة مهدا الصين تملو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم . سنايلها مبدولة التروع ، خلية البعد . اوراقها بيضوية الشكل ، نصلها خلية الصلصة السفلى بطول نحو ١٠ سم . سنايلها خاسية او سباعية الازهار بطول من ٣ الى ٥ سم . بتلات ازهارها فأسية الشكل مستعرضة . ازهاره يستمر طوال فصل الربيع .

٢٤٢٣١ - **كُورِيلُوسِ** Lorculus (S). Coryllis (F).

جنس طير من التسلقات وفصيلة البقاريات . انواعه المعروفة قليلة البعد موطنها ماليزية وبجزر الزانج . ملجتها الحياتي جامعي الا في زمن التسلق واغصانة . تألف الثفبات . قوتها الثار على اختلاف اجناسها وانواعها . اجسامها مشيرة القدة . اثوابها جميلة الالوان الزاهرة . تتميز بقصر اذنانها المستديرة الاطراف . ومن ميزاتها أيضاً انها تملد كالثفانيش عند النوم .

٢٤٢٣٢ - **كُوز** Strobila (F).

Strobile, Pine-cone (E).  
نمت تعريفي يطلق على الثار الكرزية المخروطية الشكل ، الورقية او اللغية القشور .

٢٤٢٣٣ - **كُوز كَشَم** Mangoustani (F).

هو جوز جنم ، اطليه .

٢٤٢٣٤ - **كُوزَن** Daine (F). Doe (E).

هي انثى الايل الاسمر او الاريل .

٢٤٢٣٥ - **كُوزُ** Trichosurus (S).

Trichosure, Kousou (F). Kousu (E).

جنس حيوانات لبونة من الجرابيات الفشارجات وفصيلة الفلنجريات . موطنه امترالية . تألف الاجراع اعصها اجراع الاراكاليوس . قوته الاوراق والازهار وبيض الصائير والمصائير والخشرات . يسرح في الليل ويرقد في النهار . جسمه يحيم جسم السور البري . رأسه مخروطي الشكل . اذناه ناشرتان . فوائمه خاسية الاصابع متدلة الارتقام . اثناء وباعية الاختلاف . له نوعان الثعلبي والكلبي .

٢٤٢٣٦ - **كُوزُ تَعْلِي**

Trichosurus vulpecula (S).

Trichosure renard, Kousou renard (F).

نوع من الكوزو شكله شكل الثعلب ، حركاته حركات السنجاب . اذناه كيرتان قائمتان . ذنبه جمل الصفوف المستطيل . ثوبه الى الصهوة الشهاب يملوها مواج صناعي يمتد في الظهر ويغير في الاطليل والبلن .

٢٤٢٣٧ - **كُوزُ كَتِي**

Trichosurus caninus (S).

Trichosure canin, Kousou canin (F).

نوع من الكوزو لا يختلف من التعلي الا باذنيه المدونين ويشكل الرأس الذي يشبه رأس الكلب وبذنيه القصير الصفوف . ثوبه خال من المواج الصناعي تملو مشعة سمراء .



كوسى



كوش



كوشاد ارجواني

## ٢٤٢١٧ - كُوشَاد أَصْفَر \* ، جَنْتِيَانَا صَفْرَاءُ ،

## جَنْتِيَانَا صَفْرَاءُ ، دَوَاءُ الْحَمِيَّةِ

*Gentiana lutea* (S). *Gentiane jaune*, Grande *gentiane* (F). Yellow flowered *gentian* (E). Gelber *Enzian* (D). *Gentiana glabra*, G. *maggiore* (I).

نوع من الكوشاد وهو جنبة ممررة جصامة طيبة وصناعية تملو من ٥٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقها لائقة متقابلة تطول نحو ٣٠ سم. وتعرض ١٥، نصلها طسي الصفحة جميل المضمار. أزهارها خضية التجميع، أبطية وتاجية الارتكاز، مستطيلة المالحق، خماسية أبتلات التجميع الشكل والانتشاح، لونها إلى الصفرة || جلدورها وأفره المواد الطبية والصباغية والسكرية. أزهارها يستمر من حزيران إلى آب.

## ٢٤٢١٨ - كُوشَاد رَيْسِي \* ،

*Gentiana verna* (S). *Gentiane printanière* (F).

نوع من الكوشاد وهو عشية برية مبلولة تملو نحو ١٥ سم. أوراقها صغيرة القند تطول نحو ٣ سم. وتعرض نحو ١ سم. أزهارها طرفية فردية مستنجية اللون، تويجها خماسي التفصيص يطول نحو ٣ سم. || أزهارها يستمر من آذار إلى تموز.

## ٢٤٢١٩ - كُوشَاد صَلْبِيْسِي الْوَرْدُ

*Gentiana cruciata* (S). *Gentiane croisetia* (F).

نوع من الكوشاد وهو عشية مبلولة ممررة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها خضية رباعية متقابلة تبسو كالصلب. نصلها يطول نحو ١٠ سم. ويعرض نحو ٢ سم. أزهارها أبطية الارتكاز خضية التجميع كثيرة المدد زرقاء اللون. تويجها رباعي التفصيص || أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول.

## ٢٤٢٢٠ - كُوشَاد لَنْبِي \* ، جَنْتِيَانَا لَنْبِيَّةُ ،

## جَنْتِيَانَا لَنْبِيَّةُ

*Gentiana asclepiadea* (S). *Gentiane-asclepiade* (F). Milkweed *gentian*, Willow *gentian* (E). Würger-*enzian* (D). *Gentiana asclepiade* (I).

نوع من الكوشاد وهو بجلة ممررة طيبة وصناعية تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. أوراقها لائقة متقابلة سنانية الشكل؛ نصلها يطول من ٥ إلى ٨ سم. ويعرض من ٣ إلى ٥ سم. عروقه بارزة ثلاثية أو خماسية العدد. أزهارها مستنجية اللون مرتقلة بالنسجي. جلدورها وسطها غزيرة الصبارة القلبية الصناعية || أزهارها يستمر من آب إلى أيلول.

## ٢٤٢٢١ - كُوشَاد مَقِير

*Gentiana scutella* (S). *Gentiane scaule* (F).

نوع من الكوشاد وهو نجمة تربينية مقرّة. فرونها تملو نحو ١٠ سم. أوراقها لائقة متقابلة تطول من ١٠ إلى ١٢ سم. أزهارها كبيرة القند، فردية التجميع، تطول من ٥ إلى ٦ سم. لونها إلى الزرقة المستنجية || أزهارها يستمر من تموز إلى آب.

## ٢٤٢٢٢ - كُوشَاد مَهْدَب \* ،

*Gentiana ciliata* (S). *Gentiane ciliée* (F).

نوع من الكوشاد وهو عشية سبروتية تملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. ساقها فرعاء رباعية التفصيص. أوراقها لائقة متقابلة، نصلها شيق الصفحة وسيد العرق. أزهارها زرقاء اللون، طرفية الارتكاز، فردية التجميع، تطول من ٤ إلى ٥ سم. تويجها رباعي التفصيص، مهدب المختار والمخلّة. أزهارها يستمر من آب إلى تشرين.

## ٢٤٢٢٣ - كُوشَاد يَات ، جَنْتِيَانَا يَاتُ ،

*Gentianacées* (S). *Gentianacées* (F). *Gentianacées* (F). *Gentianacées* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدات اللقمة. أنوعها نحو ٥٠٠ تنتمي إلى ٦٠ جنسًا. جميعها أشباه ونباتات صغيرة القند. أوراقها لائقة الشكل والانتظام. أزهارها عشوية لائقة التجميع يكثر في ألوانها الأزرق والارزواني.

## ٢٤٢٢٤ - كُوشُفَر \*

*Pluchea* (S). *Pluchée* (F). *Ovre-bla* (E). *Ovbrakorn* (D). *Pluchea* (I).

جنس نباتات برية ممررة من فصيلة المركبات. أنوعها نحو ٢٠ أصنافها المناطق الحارة في جميع أصقاع العالم. نباتاته عشية أو بجلية. أوراقها متعاقبة. أزهارها طفيفة التجميع.

## ٢٤٢٢٥ - كُوشُشَة ٥

*Dendrométrie* (F). *Forest mensuration* (E).

تقدير أشجار الحرج مع أبعادها وأشكالها وأعمارها وسائلها الحاضرة والمستقبلية.

## ٢٤٢٢٦ - كُوشِيلُ

*Cochenille* (F).

هي القرمزية، أطلبا.

## ٢٤٢٢٧ - كُوشِيلُ أَسْتَرَالِيَّةُ

*Cochenille australienne* (F).

هي القرمزية الأسترالية، أطلبا.

## ٢٤٢٢٨ - كُوشِيلُ الْبُرْتَقَالِ الْبَيْضَاءُ

*Cochenille blanche des orangers* (F).

هي قرمزية البرتقال البيضاء، أطلبا.

## ٢٤٢٢٩ - كُوشِيلُ الْبُرْتَقَالِ السَّوَدَاءُ

*Cochenille noire de l'oranger* (F).

هي قرمزية البرتقال السوداء، أطلبا.

## ٢٤٢٣٠ - كُوشِيلُ النَّفَاح

*Cochenille du pommier* (F).

هي قرمزية النفاح، أطلبا.

## ٢٤٢٣١ - كُوشِيلُ الْتِينِ

*Cochenille du figuier* (F).

هي قمية التين، أطلبا.

## ٢٤٢٣٢ - كُوشِيلُ الصَّبَارِ

*Cochenille du nopai* (F).

هي قرمزية الصبار، أطلبا.

## ٢٤٢٣٣ - كُوشِيلُ الْكَلْ

*Cochenille de la laque* (F).

هي قرمزية الك، أطلبا.

## ٢٤٢٣٤ - كُوشِيلُ الْوَرْدِ

*Cochenille de l'amandier* (F).

هي قرمزية الورود، أطلبا.

## ٢٤٢٣٥ - كُوشِيلُ النَّخِيلِ

*Cochenille du dattier* (F).

هي قرمزية النخيل، أطلبا.

## ٢٤٢٣٦ - كُوشِيلُ الْوَرْدِ

*Cochenille du roser* (F).

هي قرمزية الورود، أطلبا.



كُوشَاد أَصْفَر



كُوشَاد رَيْسِي



كُوشَاد لَنْبِي



كُوشَاد مَقِير



كُوشَر

٢٤٢٧٧ - كوشنيل سان جوزيه

Sabulicola (F).  
نمت تعريفى يطلق على كل دويبة أو شجرة أو نبات يعيش في كوشنيل الرمل وكتبانها .

٢٤٢٧٨ - كوشنيل طوطية

Cuphaea (S).  
Cuphæa, Cuphée (F). Cigar flower (E). Hückerkelch (D). Cufæa (I).  
جنس نباتات عشبية خشبية من فصيلة الحثائيات .  
انواعه نحو ٨٠ أصلها البلاد الحارة الأمريكية . أوراقها صفراء متعاقبة . أزهارها عمودية الارتكاز ملونة تتميز باحديداب ككوسيا وبكبر بتلاتها العليا || احرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٤٢٧٩ - كوشنيل بفسفجية

Cuphaea cyanea (S). Cuphæa violet (F).  
نوع من الكوشة الأزرقية المعمرة تملو نحو ٢٠٠ سم . ساقها زيا . أوراقها متعاقبة بيضية ، نصلها ذات الزام الاخير . ككوس أزهارها خلية البشرة . ارجوانية الانتساب صفر الجسم . بتلاتها ثنائية ، كبيرة القند بنفسجية اللون .  
ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٤٢٨٠ - كوشنيل سلفونية

Cuphaea miniata (S). Cuphæa à pétales vermillon (F).  
نوع من الكوشة الأزرقية المعمرة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم . نصلها زيا فراء . أوراقها متعاقبة قصيرة الاضلاع .  
ضيق الصفحة ، خلي البشرة . ككوسها الزهرية عشارية التستين طول نحو ٣ م . بتلاتها سلفونية اللون || ازهارها يستمر طول الصيف والخريف .

٢٤٢٨١ - كوشنيل سنانية

Cuphaea lanceolata (S). Cuphæa à feuilles lancéolées (F).  
نوع من الكوشة الأزرقية المحلية تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ساقها وفروعها منتصب . أوراقها سنانية ، متعاقبة .  
تطول نحو ٥ م . وتعرض نحو ٢ م . نصلها خلي البشرة ناشز المروق . ككوسها الزهرية كثيرة الاحديداب ، بتلاتها مستديرة متضخمة وريدة أو ارجوانية اللون || ازهارها يستمر طول الصيف .

٢٤٢٨٢ - كوشنيل ناروية

Cuphaea ignea (S). Cuphæa rouge-feu (F).  
نوع من الكوشة الأزرقية المعمرة تملو نحو ٣ م . ساقها وفروعها مضخمة للزوايا . أوراقها متعاقبة ، اهليلجية ، مدببة . ككوس ازهارها ناروية اللون ، سداسية التستين ، مستطيلة المالحين || ازهارها يستمر طول الصيف .

٢٤٢٨٣ - كوشنيل كوكا

Erythroxylon coca (S). Cocaier, Coca (F). Coca, Spadic busch (E). Cocastrauch (D). Coes (I).  
نبات بري وزراعي من الزوايا . مهد البلاد الحارة الاسيوية اخصها الهند وبرلنديب . فروعها عديدة ، جيمها جنبايا معمرة تعيش من ٤٠ الى ٦٠ سنة وتعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ م . ساقها يباهي اللحم . أوراقها متعاقبة متعقة اهليلجية مدببة . نصلها بارز الضلع والمروق واضح الشرايين . اخضر الصفحة العليا ، زيتي السفلي . ازهارها عمودية الارتكاز ، صفيرة القند صفراء اللون . ثمارها ثروية مستطيلة الشكل حايفة الامرار || يستخرج من أوراقها بدم قلعها ويحفظها مادة قلووية غندرة طيبة تدعى « كوكاين » .

٢٤٢٧٧ - كوشنيل سان جوزيه

Cochenille de San José (F).  
هي القرمزية النفاكة ، اطلبها .

٢٤٢٧٨ - كوشنيل طوطية

Cochenille floconneuse de la vigne (F).  
هي قرمزية للكرم الحمار ، اطلبها .  
٢٤٢٧٩ - كوشنيل غبراه  
Cochenille farineuse de la vigne (F).  
هي القرمزية النفاكة ، اطلبها .

٢٤٢٧٠ - كوشنيل هيم

Kochia (S). Kochia, Beivédère (F).  
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة السرمقيات .  
نوع ٣٠ معظما بري وبعضها زرعوي هري الشكل .  
سوقها فراء فناء متضخمة تملو من ٤٠ الى ٢٠٠ سم .  
أوراقها متعاقبة مشتركة غطية يكثر فيها الالبد ، تبلو غصراء اللون صفراء الملوخ ثم تحمر مع الخريف .  
ازهارها عمودية الارتكاز ، صفيرة القند ، قليلة العدد || وهي تستعمل في صناعة الكائنات ولندود القز كالشحج .

٢٤٢٧١ - كوشنيل هريمية

Kochia-cyprès (F).  
هي الجشم الحري ، اطلبها .

٢٤٢٧٢ - كوشنيل

Cochylis (F).  
هو الذنوق ، اطلبها .

٢٤٢٧٣ - كوشنيل الكرمية

Cochylis de la vigne (F).  
هو فائلة الدنب ، اطلبها .

٢٤٢٧٤ - كوك

Radius  
هو السلك الاسمر من الزند الاكمل .

٢٤٢٧٥ - كوكو

Colon (S). Colon (F). Colon (E).  
جنس حشرات من فصيلة الكوريات وثوية غدييات الاجنحة .  
انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم || اجسامها صفيرة تطلو من ٣ الى ٤ م . رؤوسها مستديرة . عيونها صفيرة بارزة . تأثيرها وكوكها وبلاسها نظامية .  
قرونها الاستشعارية تضخمة ، دبسية الشكل .  
كوكاسها عريضة .  
اجسادها لاسفة .  
اوتارها واغادها كثيفة الحبل الناعم .  
قواها من الصفراء .  
اثوابها تسول من السرة الى القدام ||  
تألف الحقل والفايات . تسرح في الليل .  
طيرانها خفيف الحركة . تعيش تحت الحجارة والجائلة .  
بعضها قانص والبعض الآخر دامن .

٢٤٢٧٦ - كوكهيات

Colonidae (S). Colonidae (F). Colonidae (E).  
فصيلة حشرات من غدييات الاجنحة .  
اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، نحو ٥٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صفيرة ، اهليلجية الشكل ، تطلو من ٢ الى ٥ م . رؤوسها مستديرة . عيونها بارزة . تأثيرها نظامية .  
قرونها الاستشعارية صفيرة ، رباعية الفصل ، دبسية الشكل .  
كوكاسها عريضة ، اجسادها لاسفة ، خلية انتشار ||  
جيمها مفترسة وداسة . تعيش تحت الحجارة والجائلة . تسرح في الليل .  
طيرانها خفيف الحركة || اشهر اجناسها الكوكور .







كوكال السباح



كوكاليس



كوكب البحر



كوكبة كبيرة



كوكبة



كوكلة الشبحان

صنبرة. سوطها كثيرة الفروع. عراجيدها متشعبة. اوراقها غليظة شبه متصالية يملؤها عجيب متتابع مستنقل الوسط الاجوف، مستنق الاطراف، يبدو كجمجمة من الكوكاب.

#### ٢٤٢٩٢ - كوكبية

*Astrantia* (S). *Astrance* (F). *Astrantia* (E). جنس نباتات برية وزراعية مصرية من السنكروية ونسيلة الخبيثات. انواعها قليلة جميعها بحلية وجنية. اوراقها مقصصة. ازهارها صوبانية التنصيص، تلو كالتجموع يبيضاء اللون او وردية. جلورها طيبة مسهلة. احرف انواعها وازهارها ما يلي.

#### ٢٤٢٩٣ - كوكبية عرقلية الورق

*Astrantia helioborifolia*, *A. heterophylla*, *A. pontica*, *A. trifida* (S). *Astrance à feuilles d'Elébore* (F). نوع من الكوكبية وهي بحلة برية وورقية ممتعة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اروتها مدادة. ساقها منتصبه. اوراقها ثلاثية الفصوص السنانية المسفة المهذبة. قذقة صلبها الزهري مؤلفة من ١٢ او ١٣ فقرة مهدبة الاطراف. ازهارها وردية اللون. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

#### ٢٤٢٩٤ - كوكبية صبرية

*Astrantia minor* (S). *Petite astrance* (F). نوع من الكوكبية البرية المبلولة وهي بحلة صغيرة اللد تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اروتها مدادة. ساقها مستنقة. اوراقها خماسية او سباعية او تساعية الفصوص الضيقة التي تطلو من ٢ الى ٤ سم. وتعرض من ٤ الى ٨ سم. اصورتها الزهرية صنبرة اللد قظرها نحو ١ سم. ازهارها الى الياض الاخير. ازهارها يستمر من تموز الى آب.

#### ٢٤٢٩٥ - كوكبية كبيرة

*Astrantia major* (S). *Astrance majeure*, *Grande astrance*, *Sancie de montagne*, *S. femelle* (F). *Larger astrantia*, *Master wort* (E). *Grosse Sternoldoie*, *Meisterwurz* (D). *Astrantia maggiore*, *Sanicola femina* (I). نوع من الكوكبية الطيبة والورقية وهي جنبة صنبرة اللد تملو من ٧٠ الى ١٥٠ سم. جلورها طيبة مسهلة. ساقها قوية منتصبه. اوراقها كثيرة مستعرضة خماسية او سباعية او تساعية الفصوص الاهليجية الشكل المسفة الخشن. اصورتها الزهرية كبيرة اللد، ازهارها يبيضاء اللون، قناتها وردية. ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

٢٤٢٩٦ - كوكبية \* *Siliquearia* (S). *Siliquearia*, *Ténagode* (F). *Siliquearia* (E). جنس حيوانات بحرية من الرغويات مهدبات الاربل ونسيلة المحبليات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة. اصلها انبوية مستطيلة ملوكة. قطر الانبوب ودوره القرصية واسطها تختلف مع الانواع.

#### ٢٤٢٩٧ - كوكلة الشبحان

*Cucullia abanthii* (S). *Cucullia des armoies* (F). *Cucullia abanthii* (E). حشرة من السفقيات ورثة حرشيات الاجنحة. موطنها يتعد من الشرق الاوسط الى اطراف اروبة. فراستها جارية قوتها رقيق الانوار. مرثتها غاصلة واشعة تموش على

#### ٢٤٢٩٨ - كوكال

*Centropus* (S). *Coucal* (F). جنس طير من فصيلة البقريات. انواعها المعروفة نحو ٣٠ اصنافها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية والاسرائيلية. اجسامها متوسطة القد او كبيرة. اطوالها تراوح من ٤٠ الى ١٠٠ سم. جميعها من الطيور المستقلة القليلة الطيران تتميز باصطالة اذنانها وبالطواربا المسفة المواج. اجنتها قصيرة. مناقيده قوية، صندية الاذناك العليا. قوتها يشمل كل ما دب على الارض من اخبث الاناعي الى انغاث والعناكب والمقارب والديدان. ذكورها واناثها تتناوب على سحن البيض الذي يستمر نحو ١٥ يوما. اشهر انواعه. كوكال السنغال وكوكال السباحات.

#### ٢٤٢٩٩ - كوكال السنغال

*Centropus senegalensis* (S). *Coucal du Sénégal* (F). نوع من الكوكال. اصطنه تمتد من السنغال الى السودان. يأنث الاذغال والاجام والغياض. ينساب بين الاحشاب ويتسلق الاشجار بشفة. جسمه يطلو من ٤٠ الى ٥٠ سم. راسه وعينه والنم الاسامي من ظهره الى السواد النحاس يملو مراح ازرق اسفع. جناحاها والقسم الخلفي من ظهره الى الصخرة الشفراء المواج. انفيكه وذنبه الى السواد المنش بالاصهب. يبله الى التياض الاخير. قوته اخشرات والجنادب والمقارب والافاعي الصغيرة.

#### ٢٤٢٩٩ - كوكال السباحات

*Centropus rufipennis* (S). *Coucal des haies* (F). نوع من الكوكال. اصطنه تمتد من شط العرب الى الهند والهند الصينية. يأنث للتلانق الرطبة والاجام والقنات. يقترب من المزارع ويحم على السباحات. يملو بسرعة ويتسلق بشفة ويعبر بشفة. جسمه يطلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. قوته الى السواد الازرق المواج. يبله الى الصخرة الخلفية. انفيكه احر. ذنبه الى الجوزة. قوته الافاعي والغطاء والورق والمقارب والجراد. يذئ عشه بالحشيش الاخضر في الاشجار القليلة الارتفاع.

#### ٢٤٢٩٧ - كوكاليس

*Caucalis* (S). *Caucalide*, *Caucalier*, *Caucaline* (F). *Caucalis*, *Beer parsley*, *Hedge parsley* (E). *Hafodole* (D). *Caucalis*, *Lappolina*, *Sacra* (I). جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الخبيثات. انواعها المعروفة ١٨ منها البراري والاحراج.

#### ٢٤٢٩٨ - كوكالين

*Cocaina* (F). *Cocaine* (E). شبه قلوي نباتي يستخرج من اوراق الكوكال يستعمل في الطب لتخدير اللزومي.

#### ٢٤٢٩٩ - كوكب افريقية

*Aster d'Afrique* (F). كوكب افريقية، نبات زينة، اطلبه.

#### ٢٤٢٩٠ - كوكب البحر

*Asterias* (S). *Asterias*, *Etoile de mer* (F). *Asterias*, *Starfish* (E). جنس حيوانات مائية من فصيلة كوكاب البحر. انواعه كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم.

#### ٢٤٢٩١ - كوكبية، لومنتاريا

*Lomentaria* (S). *Lomentaria* (F). جنس نباتات بحرية من الخبيثات احر. انواعها المعروفة ١٢ اصنافها بحار البلاد المعتدلة الحارة. كلالها

يتيميز بقصر منقاره الاعقف الثلاثي التفرّض . اجنحته متوسطة القد منفرجة . ذيله مستدير قصير || انواعه مديدة نحو ٢٥ موطنها البلاد الامريكية . ثالث البطائح والسهول . قوتها الحبوب والثمار والخشرات || انثاه تبيض من ١٤ الى ٢٠ بيضة تحضنها وحدها في افصوص تدثنه بالخشيش بين الادغال والاشجاب || اشهر انواعه ما يلي .

### ٢٤٣٠٤ - كُولَانَة حَمِيرَل

Colin de Gambel, Caille à casque (F).  
طائر من الكولان يتيميز ببقعته المولقة من ٦ ارياش . ثوبه متراكب الالوان فيه الابيض والاصفر والاحمر والاحمر والازرق والاسود || يأنف المناطق الريرة قرب مجاري الماء .

### ٢٤٣٠٥ - كُولَانَة فِيرَجِينِيَّة

Colin de Virginie (F).  
طائر من الكولان . ثوبه متراكب الالوان ، طهره الى الجوزة الموزرة بالاسود والاصفر . رأسه حاد المقعزة . يأنف المراعي والغقول المزدهرة وجوانب الرياض .

### ٢٤٣٠٦ - كُولَانَة كَلِيفُورْنِيَّة

Colin de Californie (F).  
طائر من الكولان . ثوبه متراكب الالوان . رأسه متوج ببقعزة مستطيلة الريش الاحمر القمعة || يأنف الحشاب والادغال والحقول المزدهرة .

### ٢٤٣٠٧ - كُولَانَة حَمِيرَل

Colin Masséna (F).  
طائر من الكولان . ثوبه اسود اللون يعلوه قوسم ابيض . يأنف الرياض ومجاري الماء .

### ٢٤٣٠٨ - كَوَلَب

Cholæpus (S).  
Cholæpe (F).  
جنس حيوان من فصيلة الدبابات المتسلقة البطيئة الحركة . طوله يراوح من ٤٠ الى ٥٠ سم . قوامه ثنائي الاطراف المتسلقة للمنعقة . ثوبه كثيف الزر لون الى الصبغة العاقبة . يعيش على الاجنار . قوته البرام والتوازي والثار . اثناء تقصع جروا واحداً يرضعه وتحمله حتى النظام || له نوعان كولب الامازون وكولب كولوبيو .

### ٢٤٣٠٩ - كَوَلَبَة

Calappa (S).  
Calappe (F).  
Calappa (E).  
جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل وفصيلة الكولبيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اصطناعها بجار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة قلنسوية الشوزن محبة التدور حمرسة الانفواه . ارجلها دقيقة . ملاقطها كبيرة مسطحة متائلة || لحومها كاعنة الصنف لا تؤكل || اشهر انواعها الكولبة المهبعية .

### ٢٤٣١٠ - كَوَلَبَة مَحَبَبَة

Calappa granulata (S). Calappa granulé (F).  
يكثر ربهدها في البحر الابيض المتوسط . تعيش على رمال الشواطئ المسمورة بالماء .

### ٢٤٣١١ - كَوَلَبِيَّات

Calappidae (S).  
Calappidés (F). Calappidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل المخرمات . اجنتها وانواعها المعروفة

اوراق المركبات وازهارها واصعبها الشجيرات || جسمها متوسط القد يعلو نحو ١٦ م . يستطها ٤٢ م . رأسها حطلي الثوب . عينها كيرتان . زباناها خيطيان . جوشها حطلي اللون اصفر المراج . يطنها الى الخيطي الاثفيع المراج يملوه حط ثجبي اسود يعطى كامل البطن عند الذكر ويغطب نحو ثلثه عند الانثى || وراثتها عند الشقين الى الخيطي الاصفر تملو في الزوج الاناسي زركشة وشفقة وتزاييف تراوح من الصنابي الى الاسود || لها جبل واحد في الحول . تظهر القراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتتمتع المكن لطعاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة تطول نحو ٢٢ م . جسمها اسطواني الشكل . ثوبها الى الخضار الباهت يملو تمشيع اريد ويجذيع منعرض اسود يمتد من السكة الثالثة الى التاسعة . رأسها اسود . مدنها الى الرتبة الاخفراء . ورواجها الى السمرة || طور الاكامل الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة حيث تنفخ السرعة ملتصقة بجلباب من الطين .

### ٢٤٢٩٨ - كَوَكُو مُدَّهَب

Coucou doré (F).  
طائر مشهور باسم هروء . اطلبه .

### ٢٤٢٩٩ - كَوَكُوْس

Cocculus, Cebatha (S).  
Coquecule, Cébathe (F).  
جنس نباتات عارشة برية ممررة من فصيلة القمريات . انواعه نحو ٢٠ جميعها طيبة مهداة المناطق الاستوائية . سوقها متسلقة . اوراقها متعاقبة لاقامية الشكل . ازهارها معقودية التجميع ثنائية المسكن . ثمارها نووية لا قيمة لها .

### ٢٤٣٠٠ - كَوَكَبِيَّات

Erythroxylaceae (S).  
Erythroxylacées (F). Erythroxylaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين حديثة القعالات . اجنتها وانواعها قليلة العدد اشهرها الكوكا .

### ٢٤٣٠١ - كُولَا \* كُولَة

Sterculia acuminata (S). Colatier, Kolatier (F). Colanut, Kola-nut tree (E). Kolabaurm, Stinkbaum (D). Cola, Noci del Sudan (I).  
جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة البرازيات . انواعه قليلة اصطناعها للمناطق الاستوائية الافريقية . اشجارها تملو من ١٥ الى ٢٠ م . سوقها خيزاء اللون مشققة القشور . اجنتها متبسة متسلقة . اوراقها معتقة متعاقبة اميليجية ؛ فصلها جامه الصلبة . يازر العروق ، مستطيل المتش . مدبب الطرف . ازهارها ذكورية او عنقوية ، الخشوية معقودية التجميع ، محورية الارتكاز ، تتكون على الافئدة التي بلغ عمرها ثلاث سنوات او اكثر . ثمارها قرن نووية مبطننة تلتف من لورئين الى حشر نوزات كلوية الشكل جامدة المادة القابية التي يراوح لونها من الاحمر الى الابيض الاصفر . وهي مأكلة منفذة تنشط القلب وتنبه رتبه الاحصاب وتدفق التنب والهر .

### ٢٤٣٠٢ - كُولَان

Kaolin, Argile blanche (F).  
Kaolin, Porcelain clay (E).  
هو الاسم الصيني والسلمي للصصال الحر الاخير اللون الذي يستعمل في صناعة الخزف وغيرها .

### ٢٤٣٠٣ - كُولَان

Collins (F).  
American partridges (E).  
جنس طير من عمارة الحجلبات وفصيلة الطيوريات .



كوكولس



كولا



كولانة كليفورنية



كولب



كولبة



كوكب أزمك

الطول ٤٠ سم، الخطم الاصل، اصفر الاسفل. ساقه مستقلة الطول سواد اللون. حلقه حينه الى اسفلة القيثارة || يأكل الاوراق الكثيفة ويقرب من الاماكن الاكلة لكنه كثير الرجل والذئب || قوته الحشرات واسارهم والجراد والبراغ والنمل والذئب والارباعية ومنها الكرز والتين || الاثني ثلثين حشها في الانجار الزينة الاربعة الظل وتبين من ٢ الى ٥ ويضاهي تحضها بمناوبة الذكر نحو ٤٠ يوما.

٢٤٣١٨ - كومييت (F). Salille, Colt, Monte (F).

زو ذكر الحيوان حل انشاء وقد شاع استعمالها في الحيوان والدويبات.

٢٤٣١٩ - كومييت (F). كومييت (F).

Coumarouna odorata, Dipteryx odorata (S). Fève Tonka, Sarrapia (F). Tonka-bean tree (E).

شجرة برية وزراعية من فصيلة الفريزيات. مهدا البلاد الامريكية الحارة تكثر في فنزويلا والنويان. يستخلص من بذورها الجافة، يمد نفعها بالروم، مادة الكوبورين الشائعة الاستعمال العطري والتبني في وهي كبيرة لثقة فائضة الاضغان اوراقها متعاقبة مركبة. وورقاتها وزرية التجميع اذنيها؛ فصلها جامد الصفعة يضي الشكل. ازهارها محورية الاوتكار. ثمارها شامية الشكل لينة السودج تحوي حبة مطقة طول من ٣ الى ٤ سم. وتعرض نحو ١ سم. ثمرتها قليلة الشائعة، سمية الشائعة، لوها الى السمية البنية الالامه، لياها جامد المكسر، اصفر اللون.

٢٤٣٢٠ - كومييت (F). Coumarine (F).

Coumarin (E).

هي لكتون الحامض الكوبوريكي؛ مادة عطرية يضاء اللون مستحبة العرف العطري تنوب في الماء والكحول. تستخرج من الكوبورونه والحنترق ... وهي شائعة الاستعمال العطري تدخل في صناعة عطور وتجميل التبوغ الاخرية.

٢٤٣٢١ - كومييت (F). Cumul, Pluralism (F). كومييت (F).

الكوملة هي الجمع من كويل جمع وكلك كلك.

٢٤٣٢٢ - كومييت (F). Cumingia (S). Cumingia (F). Cumingia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات فضيحات الجانم فضيلة المتغيرات. انواعها المعاصرة المعروفة قليلة المدد اعطائها بحار امريكية الجنوبية اعطائها الشيل والبيرد || اصداها شبه يريمية الشوزن، متساوية المقارح لاختصارية الاضلع، مالة السطوح البيضاء اللون الموحشة بالجلوي.

٢٤٣٢٣ - كومييت (F). Coumia guianensis (S). Couma, Coumier (F).

شجرة برية ورائحة دماغة من فصيلة الغليان. منبها حراج النويان || ساقها مستقلة الارتفاع فراء. فرومها متصبية محجمة اوراقها متعاقبة، مثلة، جامدة النصال المرطاه. ازهارها محورية الاوتكار طرفية || يستخرج من ساقها بالخز عصاره ورائحة لها استعمالها الصناعي.

٢٤٣٢٤ - كومييت (F). Cometes (S). Comèces (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة النويان. انواعها المعروفة قليلة المدد جميعها من ثوب فياني الشرق الاوسط واغريقية الشرقية || سوطها فراء، شكلها متقوي

متوسطة المدد. اعطائها بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة القد، لانياسية الشكل تتميز بافراها المحرمة وبدرومها المحبة السطوح العلوية، وبملقطها الضليلة || اشهر اجناسها الكوملة والذبابا والمثوة.

٢٤٣٢٢ - كومييت (F). Phascalarctus cendré (S). Phascalarctus cendré, Koala cendré (F). Native bear (E).

حيوان لبون وحيد الجنس والنوع من الجرابيات الشجرات وفصيلة الفلنجيرات، موطنه بعض مناطق استرالية اعطاه الشرقية. يأكل النابتات. يسرح في الليل ويبيت في النهار. قوته اوراق الانجار وزيماتها وانجارها وثمارها || جسمه يطول نحو ٥٠ سم. ويرتفع نحو ٣٣ سم. رأسه اقل من القدم قريب الشبه من رأس الذئب. قوامه قصيرة، غاسية الاصابع، كبيرة الاظفار المحبة الحادة الاطراف || ثوبه الى الازرق، يمتد في الظهر ويغير في البطن. الاثني رباعية الاضلاع || لحمه مأكول وفطره مرغوب فيها.

٢٤٣٢٣ - كومييت (F). Coulomb (F). كومييت (F).

هو ما يصرفه بالثانية المجرى الكهربائي التي تبلغ قدرته ١ أمبير.

٢٤٣٢٤ - كومييت (F). Collybia (S).

جنس فطور من الفاريتويات. انولاه عديدة تركيب مرضا جلدور بعض النباتات الحرجية دون ان تتركها.

٢٤٣٢٥ - كومييت (F). Collybia (S). Collybia (F). Collybia (E).

كوليبي هو الاسم الهندي البنغالي. جنس امثلة نيرة من شاكات الزعانف وفصيلة الطيورويات. انواعها المعروفة عشرة اعطائها انهر الهند وميجرته ومنقاه || اجسامها شبه اهليلجية، صغيرة، لا تتجاوز ٢٠ سم. رؤوسها مستقلة الاعظام الصغيرة الاشدق. زعانفها الظهرية والبطنية مستطيلة، متائلة، زعانفها الخلفية شبه غليظة. الذيلية كبيرة مقعوبة، اوتوا الى الحشار الباهت يملو تجديع متعرض اربع اللون، نحاسي الموج. بطونها الى البيضاء الاشر || ذكورها تحضن السره في حشاش شبه جرابية الشكل تحبها بين النباتات المائية || عوهمها مأكونة متوسطة الصف.

٢٤٣٢٦ - كومييت (F). Colisa (S). Colisa (F). Colisa (E).

كوليبي هو الاسم الهندي البنغالي. جنس امثلة نيرة من شاكات الزعانف وفصيلة الطيورويات. انواعها المعروفة عشرة اعطائها انهر الهند وميجرته ومنقاه || اجسامها شبه اهليلجية، صغيرة، لا تتجاوز ٢٠ سم. رؤوسها مستقلة الاعظام الصغيرة الاشدق. زعانفها الظهرية والبطنية مستطيلة، متائلة، زعانفها الخلفية شبه غليظة. الذيلية كبيرة مقعوبة، اوتوا الى الحشار الباهت يملو تجديع متعرض اربع اللون، نحاسي الموج. بطونها الى البيضاء الاشر || ذكورها تحضن السره في حشاش شبه جرابية الشكل تحبها بين النباتات المائية || عوهمها مأكونة متوسطة الصف.

٢٤٣٢٧ - كوليبي (F). Coccyz americanus (S). Coulicou américain, Coucou à bec jaune (F). Yellow-billed cuckoo (E).

طائر من القواطع من فصيلة القيثويات. موطنه امريكية الشمالية وكندا. يرسل في اواسط الخريف الى جزر الايتل ويعد في اوائل الربيع || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٠ سم. بسطه نحو ١٤ سم. ثوبه العلوي الى الكمية الزرءاء تعلوها حاجات تراوح من الشبهة الى الخضرة والزرق. صدره وبعث الى البيضاء الاشر. لوأفح الاجنحة الى الشبهة. نيكاه بلون الزرد اما ظاه انيكه مع الزلاين فال السواد الفاتح باستثناء الاطراف البيض. قدنه زجاجي التركيب مستطيل وعريض. منقاده معتدل



كومييت



كوليبي امريكي



كوبورونه (حبة)



كومييت

العقريات. موطنه يمتد من افريقية الشرقية الى الشرق الاوسط. ظهره اواخيه الى الشهية السماء. بطنه وخوافيه الى البياض الاخير. حنثه كالباقوت. متقاربه اسود. ساقه الى الصفرة الخضراء. قوته القواصم والحشرات يصيدها عند الشروق وقرب الغروب || يثن في الانجار الرقيقة. انشاء تقصع من ريشين الى اربع تحضنها اربعة اسابيع.

Cautérification (F).

٢٤٣٣٤ - كُونِي

Cauterization (E).

هو احراق الجلد بمجدة ونحوها.

Pélican (F).

٢٤٣٣٥ - كُونِي

هو البجع، اعطيه.

Accommodat

٢٤٣٣٦ - كَيْسَالَة

حالة حيوان أو نبات كَيْسَالَة حيوان البيقة المفروضة دون ان تجعلها وراثية.

٢٤٣٣٧ - كَيْسَالَة \* حَارْدُ الْمَتَالَع Myopotamus (S). Myopotame coypou, Coypou, Castor des marais (F). Myopotamus, Coypu (E).

حيوان لبون قاصم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الدافيات. موطنه بعض اصقاع امريكا الجنوبية اغصها الاقاليم المعتدلة الحرارة. يألف الماشق وضفاف البحيرات ويجاري الماء. ملجته الحياتي زوجي || جسمه يطول نحو ١٠٠ سم. بما في الذنب الذي يبلغ نحو ٤٥ سم. رأسه شبه محكور الشكل، مقطوع الخلف. عيناها واذاها صغيرتان، ستديرتان، سباله معتدل الكثافة مستطيل. قوامه قصيرة خاسية الاصابع. ذنبه مدني الشكل غليظ القاعدة. مستدق الطرف، هليبي الوبر في الزمان الاول والثاني، حريشي الخلفات في الزمان الاخيرين. وبره ليد، قصير، ناعم. ثوبه في الرأس والظهر الى السرة الكستانية. وفي البطن الى السرة الخنثية. خاصراته الى الشقعة || قوته المواد النباتية والاسماك والرخويات || حبره وجار يتجفف بالتربة. الاثني تقصع من ٨ الى ٩ ادراس كاسية باصرة تسرح وتقص في الماء بعد اسبوع || فروته جيدة الصنف مرغوب فيها ولحمه كذلك.

Chitonellus (S).

٢٤٣٣٨ - كَيْسُون \*

Chitonelle (F). Chitonellus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الادرل اماميات الخياشيم مصصحات القشار فصيلة الكيتونات. انواحه الممارسة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المحيط الهادي، من ماليزيا الى الاكيتل واستراليا || اصداها مستطيلة ثمانية الصفيحات المتراكبة، اجسامها قرنية الشبه باجسام البازق. اطولها تراوح من ٣ الى ١٢ سم. رؤوسها وعيونها صغيرة. لولاسها رباعية، زوج مستطيل وزوج قصير. اوبنها قليلة الانفراج. تتكود عند الحرف قبيد كالأكرة الصغيرة.

Chitonidae (S).

٢٤٣٣٩ - كَيْسُونِيَات

Chitonides (F). Chitonidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الادرل، اماميات الخياشيم مصصحات القشار. اجسامها وانواعها المعاصرة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداها مؤلفة من ثمان صفيحات كلسية المادة، متراكبة، مفصلية، تغلف الظهر ويمكن اللوية من التكوير كالمدرع، عند الحاجة || اشهر اجناسها الكيتون والحيدبة.

الشوزن. اورلقها متعاقبة وريحية النصال الصبغة المستعدة الاطراف || انبارها خاسية البتلات والاسدية، وودية اللون دقيقة الزناد المستطيل. تنويرها وديهي.

Hobereau, Falquet (F).

٢٤٣٣٥ - كُونَج

Hobby (E).

جنس طير من عماره الصقور وفصيلة العقريات. انواحه اربعة جميعها خفيفة الجناح ودية الجسم طولها تراوح من ٣٥ الى ٤٥ سم. انوارها نيرة ظهورها وسراقلها الى السرة. بطنها الى الذرة || اما انواعها فهي الكونج النبهي والكونج الشائع والزمدم والبيز.

٢٤٣٣٦ - كُونَج الدَيْسِي

Falco columbarius, Hypotriorchis columbarius (S).

Faucon-pigeon (F).

طائر من الكونج صغير القد طوله نحو ٣٢ سم. خفيف الجناح، فرس الخلق، حاد المزاج، شديد البطش يصيد الياهم والصانير والقواصم الصغيرة والجرذان والحشرات. وهو من القواطع التي تجوب البلاد في طلب الصيد والمشي. سريه في رحله يمد بضم مئذ. يثن في الانجار المالية وفي ارتباب المسعود. انشاء تقصع من ٣ الى ٤ وفنات تحضنها وسدا اربعة اسابيع

٢٤٣٣٧ - كُونَج شَائِع

Falco subbuteo, Hypotriorchis subbuteo (S). Ho-

bereau commun (F). Common hobby (E).

طائر من الكونج حاد المزاج، خفيف الجناح، صغير القد، طوله نحو ٣٥ سم. الاثني اكبر حجماً من الذكر. وهو من القواطع محبوب البلاد الاسيوية والافريقية والاوربية. يألف الثنايات والاحراج الميمنة الاشجار. قوته الصانير والحشرات. يثن في الانجار الرقيقة انشاء تقصع من ٣ الى ٤ وفنات تحضنها وسدا نحو اربعة اسابيع

Cosmique (F). Cosmic (E).

٢٤٣٣٨ - كُونِي

نعت ترمي يطلق على بعض الاشياء المختصة بالكون كالأسمة الكونية.

Cognac (F).

٢٤٣٣٩ - كُونِيَاك

هو الكياك، اعطيه.

Cosmogonie (F).

٢٤٣٣٥ - كُونِيَة

Cosmogony (E).

الكونية نظرية في تكون العالم، والنظريات في التكون أو التكوين عديدة ومنها المقدودة النهاية واللامقدودة.

Conidia (F).

٢٤٣٣١ - كُونِيدِيَا

هي الكنيد، اعطيه.

Cunila (S). Cunile (F).

٢٤٣٣٢ - كُونِيلَة

Dittang, Stone-mint (E). Kunel (D). Cunilis (I).

جنس نباتات برية نجية معمرة من فصيلة الشفويات. انوارها نحو ٢٠ اعطائها البلاد الامريكية. معظنها طبي. اورلقها معققة متعاقبة اعطيلية الشكل. نصلها صغير القد غلي البثرة سطوي العرف يشبه النعنع. انوارها حلقى التجميع طرفي الاركان. نقيع اورلقها وانوارها يفيد الاساء ويقوي المعدة.

Elanus caeruleus (S).

٢٤٣٣٣ - كُونِي

Elanion blanc (F). Black-winged kite (E).

طائر من الزورانيق ينتمي الى عماره الحناء وفصيلة



كونج



كونيلة



كومي



كيدر



كيتون

بين الصنوبر. لها مستحب الطعم فاخر الصنف.  
اشهر أنواعه الثلاثة التالية :

### ٢٤٣٦ - كَيْبَلَة الْأَطْلَس

*Labrus bergylta* (S). *Labre neustrien*, *Crahotte*, *Vras* (F). *Cockwing wrasse* (E).  
نوع من الكيمل. تكثر في المحيط الأطلسي من شواطئ بلجيكا إلى جبل طارق. طولها نحو ٥٠ سم. ثوبها مآكب الألوان الزاهية المتباينة.



كَيْبَلَة

٢٤٣٧ - كَيْبَلَة حَمْرَاء  
*Labrus viridis* (S). *Labre vert* (F). *Cuckoo wrasse* (E).

نوع من الكيمل. تكثر في المتوسط. طولها نحو ٣٥ سم. ثوبها ألوان الخضار. ظهرها اسفنج المراح. بها ودي اللون سطحي الماجنة. الاثنى ثلاثية البقع السود الجانبية وهي اكبر بقعة من الذكر.



كَيْبَل ثنائي الشفيط

٢٤٣٨ - كَيْبَلَة زُرْقَاء  
*Labrus merula* (S). *Labre marie*, *Merle* (F). *Labrus merula* (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الكيبيات وربة شائكات الزعانف. أصلها منظم أقاليم البحر الأبيض المتوسط. تعتبر من اسماك المحار والحدائق. ملجأ الحيائي شرجي. جسمها احليجي الشكل. معتدل التشطيط. يطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. ثوبها متباين الخضاب بين الشقين. اللون السائد هو الأزرق يطوي في القسم الاقل من الجانبين والظهر موطج جزوي وأسد عند الذكر وموطج ودي عند الاثنى. ويطوي في القسم الاقل من الجانبين وفي البطن موطج بنفسجي عند الذكر ويليكي عند الاثنى. رأسها مخروطي الشكل. متشعب الشعاع. فكاه متماثلان. شفها متوسط الانفرج. اسنانها كبيرة. متعقبة. عيناها مستديرتان. جاسطتان. زعنفتها الظهرية واحدة. مستطيلة. زعنفتها الذيلية مقنونة الطرف. لها جبه الصنف. مرغوب فيه.



كَيْبَل

٢٤٣٩ - كَيْبَلَة مَلُونَة  
*Labrus mixtus* (S). *Labre varié*, *Coquette*, *Conniet*, *Tenca* (F). *Sea-partridge* (E).

نوع من الكيمل. تكثر في شمال المتوسط طولها نحو ٤٥ سم. ثوبها متباين الألوان الزاهية فيها الودي والحلي والبي والاحمر والاصفر والاسمر الباق.



كَيْبَل زُرْقَاء

٢٤٣٥ - كَيْبَل مِيَّات  
*Labridae* (S). *Labridae* (F). *Labridae* (E).

فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف تشمل زهاء ٤٠٠ نوع منتشرة في جميع بحار العالم.

٢٤٣١ - كَيْبَلَج  
*Terre de bruyère* (F). *Heath-soil* (E).

هو التراب الحرجي الخشن، تركيبة الحكي يختلف باختلاف مناصره الاسمية او دلية او طينية او جسية لكنه يتميز بوفرة المادة البدالية المنحلة التي تبعله من الجرد الاثرية الساحلة للراعات التريينية والبيجة.



كَيْبَل

٢٤٣٢ - كَيْش  
*Kirsch* (F). *Kirschwasser* (E).  
هو خر الكرز، شراب مسكر يصنع من قنديل الكرز.

٢٤٣٣ - كَيْرُوب  
*Choeropus* (S). *Chérope* (F). *Choeropus* (E).

حيوان جاس لأم وحيد الجنس والنوع من فصيلة

### ٢٤٤٠ - كَيْبَلَة \* مَشْطُورَة

*Kigelia* (S). *Kigélio*, *Arbre à concombres* (F). *Cucumber tree*, *Sacred tree of Nubia* (E). *Kigeliabaum* (D). *Kigelia*, *Albero di castriolo* (I).

جنس اشجار برية وزينية من فصيلة البتونيات. مهدا البلاد الحارة. انواعها اربعة. اوراثها متعاقبة مركبة. ازهارها صفوي التجميع. اعزاهما كبيرة القد بجلة الشكل، مفرنة. ثمارها تشبه الخيار لكنها حاملة الطعم لا تؤكل.

٢٤٤١ - كَيْبَحَاء  
*Rhynchonella* (S).

*Rhynchonella* (F).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفديات الاربل وفصيلة الكيبيات. انواعها المعروفة عديدة، معظمها من متحجرات العصر السيلوري المائدة الى الاياح الاول، اما المعاصرة منها منتشرة في بحار الشمال والجنوب. اصداها مصغرة، متساوية، مربعة الشكل، غندة الصفحات الخارجية وثلثية الداخلية. تعيش شبه لاصقة بالصخور رابطها سلك ليفي المادة طولها من ١٥ إلى ٣٥ سم.

٢٤٤٢ - كَيْبَحَالِيَّات  
*Rhynchonellidae* (S). *Rhynchonellidae* (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفديات الاربل. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الاياح الاول. اشهر اجناسها الكيحاء.

٢٤٤٣ - كَيْبَحَن  
*Pipit rousseline* (F). *Tawny Pipit* (E).

طائر من فصيلة الذعريات يدعى جبهة الخقل وطروم، اطلب جبهة الخقل.

### ٢٤٤٤ - كَيْبَل ثنائي التشطيط \*

*Adalia bipunctata* (S). *Adalie à 2 points*, *Coccinella à 2 points* (F). *Adalia bipunctata* (E).  
حشرة خاتلة نائمة من فصيلة البصريات وربة مفصدة الاجنحة. موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الاقصى وروية. تألف البراري والحدائق والجائن والبساتين والزراعات الصيفية. خنافسها ويزقاتها تعيش على الارق والقرقرز والقرع والورق... جسمها صغير القد، يضيء الشكل، يطول من ٥ إلى ٦ سم. ثوبها الذي يتميز بدمم الاستقرار يكون غالباً ألوان السود تملو في كل هذه من غدية نقطة حمراء. رأسها صغير الحجم، ذقن الحظ، ينور بمجمله تحت الكوسل. عيناها صغيرتان مصحتان، زباناها صقيان. فكاه ذريان. تأثيرها وملاسها صغيرة. الاثنى اميز قدماً من الذكر واكد ثوباً منه واكثر زبانا. ايجالها الحولية ثلاثة. تسرح في النهار وتبيت في الليل. خنفساء الجيل الثالث تخفي فصل الشتاء غنيقة تحت الحجارة الى ان تدب الحرارة فتخرج من مكبتها في اوائل فصل الربيع.

٢٤٤٥ - كَيْبَلَم \*  
*Labrus* (S).

*Labre* (F). *Wrasse* (E).  
جنس اسماك بحرية من فصيلة الكيبيات انواعها المعروفة ١٠ تتميز بالزوايا المآكية الألوان الزاهية وبامتداده زعانفها الظهرية والشرية. رووسها صغيرة. اعطائها مخروطية الشكل مشقوفة الغلك. مرتهما قرب الشواطئ

على القلب. ورفائعه عديدة اخصها تأمين جريان الماء وادخار المواد الغذائية والمقاومة الميكانيكية.

### ٢٤٣٦١ - كَيْش \* ، أَبُو مَالِك

*Spatula clypeata* (S). Canard souchet, Souchet commun, Rouget de rivière (F). Shoveller duck (E).  
نوع من البط الرشحي. طائر من التقاطع مشتهر البلاد الأفريقية الحارة ومصبه البلاد الباردة الأوروبية والاسيرية || جسمه كبير اللد يطول نحو ٥٠ سم. رأسه وعتقه الى الخصار الالاس الاسفع. صدره الى البياض الناصع. بطنه واطلاؤه الى الشقعة الصنابية المواج. ظهره اسود اللون تملوه رقعة حنطية. جناحاه مزرقان بالابيض والازرق والاحضر والكسني. عينه صغيرتان صليتان متفاده صفيحي الشكل، ملطي الطرف، اسمر اللون، اخضر المواج. جناحاه مستطيلان، لاسفان، ذنبه مخروطي الشكل، صغير اللد، ابيض اللون، يتوسطه الاسود. ساقاه قصيرتان لونهما الى الصفرة البرتقالية || قوته الحشرات اغصها المائية ودخل الضفادع وبعض النباتات المائية || يدفن اضخمه بين الاسل على ضفاف البحيرات والمناقع والاهوار في المواقع الصمبة الخال. الاثنى تحضن من ١٦ الى ٢٠ بيضة. انترخم يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الاثنى دوت الذكر الذي يؤمن لها الحاية والغذاء || تعتبر من الطرائد المزيرة. لحمها فاخر الصنف.

الزريزيات. موطنه بعض احراج بلاد استرالية. قوته الديدان والحشرات || جسمه صغير اللد يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. وذنبه من ١٢ الى ١٤ سم. رأسه مخروطي الشكل، مسنق القطر. قوائمه كقوائم الزريز. جراب الاثنى ثنائي الاطباء. فحشته من الورد.

**٢٤٣٥٤ - كَبْرُون**  
Mouche de l'olive (F).  
هو غرسة الزيتون، اطلبها.

**٢٤٣٥٥ - كَبْرِيَّة \***  
*Cairina moschata* (S).  
*Cairine, Canard de Barbarie* (F). Barbary duck (E).  
طائر داجن من كنيات القدام صفيحيات المناقير ينتمي الى فصيلة البطيات. موطنه امريكا الجنوبية || جسمها كبير اللد. عنتها اطول من عتق البط الاعلى جناحها كبير الحجم، ذلق الطرف، يكاد يلصق اللدب. ذنبها صغير الجرم، مقطوم الطرف. ثوبها الى الخصار الالاس الاسفع يطول تيجاج ابيض || اغلقها شرسة تمتد على غيرها من الطير الداجنة. لحمها متوسط الصنف لا يخلو من رائحة المسك.

**٢٤٣٥٦ - كَيْش البَوْغ ، كَيْش الغَبِيرَات**  
*Sporange* (F). *Sporangium* (E).  
هو الكيس الشري الذي يحضن بوغ مستورات الزهر.

**٢٤٣٥٧ - كَيْش الراعي \* ، قَرَمَكَة**  
*Capsella Bursa-pastoris* (S). *Capselle, Bourse à pasteur, B. de Capucin, Boursette* (F). *Mother's heart, Shepherd's burse* (E). *Hirtentäschel* (D). *Borse di pastore* (I).  
نبات عشبي بري. حولي مبدول من فصيلة الصليبيات.

**٢٤٣٦٢ - كَيْشَة \***  
*Embryon d'animal* (F).  
*Embryo of animal* (E).

هي التمرة، ملقحة الحياة التناسلية الكاشنة في الحيوان.

**٢٤٣٦٣ - كَيْفُور \***  
*Caïophora* (S).  
*Caïophore* (F). *Caïophora* (E).

جنس نباتات عنية برية وتزيينية من فصيلة الموزيات. منها بعض مناطق امريكا الجنوبية. هليها حارق كالقراس سقها مدادة، عارشة. اوراقها لاقبسية الشكل. انماها كبيرة اللد، حراء اللون || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.

### ٢٤٣٦٤ - كَيْفُور اعْوَج الحِق \*

*Caïophora contorta* (S).  
*Caïophore à capsule cordue* (F).  
نوع من الكيفور. عشبة حولية تزيينية. ساقها عارشة تطول نحو ثلاثة امتار. اوراقها بيضبة مستطيلة الزام الاخير. نصلها منشارية الحار، باهتة الخصار يطلوها بعض الزغب والغلب. انماها حراء اللون يطلوها بعض مواج يرتفالي || تنويرها يستمر طوال فصلي الصيف والخريف.

### ٢٤٣٦٥ - كَيْفُور قُرَيْزِي \*

*Caïophora coccinea* (S). *Caïophore écarlate* (F).  
نوع من الكيفور. عشبة تزيينية معمرة. ساقها عارشة تطول نحو اربعة امتار. اوراقها معتقة، السفلى لها ورشية غمرية اما العليا فاعليجية. طولها يراوح من ١٥ الى ٢٥ سم. انماها قرمزية اللون. غدة الرحيق فيها مستطيلة الخيطوط المحببة الاطراف || تنويرها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

**٢٤٣٥٨ - كَيْسْت**  
*Kysta* (F). *Cyst* (E).  
دملة لاقبسية الشكل والحجم تتكون تحت الجلد او في بعض الننج.

**٢٤٣٥٩ - كَيْسِكَال \***  
*Quiscalus major* (S).  
*Quiscale majeur* (F).

طائر من فصيلة الكاروجيات. موطنه بعض مقاطعات جنوب امريكا الشمالية. يالئ المناطق الجبلية وضفاف الانهار. سره وافر العدد || جسمه كبير اللد يطول نحو ٤٠ سم. متفاده اطول من رأسه وهو مخدب الخطم العلوي البين التقويص. جناحه معتدل الطول. ذنبه مستدير الطرف. حدة عينه بؤرية اللون. ثوب الذكر اسود اسم يطلو مواج جزوي في الرأس والذال ومواج اخضر في الذنب. ثوب الاثنى الى الكهية السراء الباقية في الرأس والرداء والجناسين والذنب والى الكسكة الحمراء المراج في الصدر والبطن || اغلقه رضية آتة. قوته الحشرات من الجراد الى القراش والاساريم والضفادع والرخويات ولا يفت عن الحبوب والثار النباتية || يدفن عته في الانجار الرائجة اغصها الصنوبر. الاثنى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمثابة الذكر نحو ١٥ يوما || عته جرابي الشكل، بالغ الطول، ليد الحبك يملقه بفند الشجرة. طولها يراوح من ٨٠ الى ١٠٠ سم. وقطر قمره من ٢٥ الى ٣٠ سم.

**٢٤٣٦٠ - كَيْسَم \***  
*Xylem*  
هو في النباتات اغشية نسيج الساق والجذور الذي يرتكز



كَبْرِيَّة



كَيْش الراعي



كَيْسِكَال



كَيْش

صغيرة. اشتدائها قليلة الانقراض. زمانها الظهيرة مستطيلة، الجزء الأول منها شفاف شائك، الجزء الثاني مغني مروح، الذيلية منفرجة، شبه فاقرة. اثوابها الى الريدة القسية تعلوها زخارف وتجاويز متباينة الرسابة مبراة اللون غصراء المراج || طوعها مأكولة متوسطة الصنف .



كبكه

٢٤٣٧٣ = كيلوغرام Kilogramme (F).  
هو الف غرام يعرف منه عادة بكتلة كيل. وهو من المقاييس للثروة الفرنسية التي شاع استعمالها، نظراً لسهولة كسورها، في معظم بلدان العالم.

٢٤٣٧٤ = كيلومتر Kilomètre (F). Kilometer (E).  
من المقاييس السطحية قدره الف متر.

٢٤٣٧٥ = كيلوات Kilowatt  
من المقاييس الكهربائية قدره الف وات. وهو يمثل وحدة كهربائية طاقاتها ألف جول بآبائية.

٢٤٣٧٦ = كيمافيل Chimaphila (S).  
Chimaphile (F). Chimaphila (E).  
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى «حبيب الشتاء». جنس نباتات معمرة مدادة من فصيلة الاغروسيات. منبتها بعض اقاليق حوض البحر الابيض المتوسط || سورها مستطيلة مدادة قليلة الفروع. اوراقها متعاقبة، سنانية اتصال، صغيرة الحجم. ازهارها بيضاء اللون او وردية || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.



كبلع امس

٢٤٣٧٧ = كيمافيل صيواني Chimaphila umbellata (S).  
Chimaphile en ombelle (F).  
نوع من الكيمافيل. ساقه تغلغل من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقه حيلة اخضر تغلغل نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٢ سم. ازهاره صيوانية التجميع، صغيرة القند، وردية اللون || ثمره يستمر من حزيران الى تموز.

٢٤٣٧٨ = كيمافيل مطنخ Chimaphila maculata (S). Chimaphile maculé (F).  
نوع من الكيمافيل. ساقه تغلغل من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقه تغلغل نحو ١٥ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا الملطخة بالابيض، احر الصفحة السفلى. ازهاره كبيرة القند بيضاء اللون، فواحة العرف العطري || ثمره يستمر طوال شهر حزيران.



كيلس

٢٤٣٧٩ = كيميكاري Chimique (F). Chemical (E).

٢٤٣٨٠ = كيميكالي Chimista (F). Chemist (E).

٢٤٣٨١ = كيمووح Terre arable (F).  
Arable soil (E).  
هو التراب الزراعي. ويتميز آخر هو طبقة التراب السطحية التي يتمكن منها المحراث او التي تسد غورها بطور النباتات الزراعية.



كيلودكتيل

٢٤٣٨٢ = كيموس Chyme  
مجموعه المواد الغذائية المائعة في المعدة بعد اعدادها الاولي.

٢٤٣٨٣ = كيمووح Géophage (F).  
هو القنارب، امطيه.

٢٤٣٦٦ = كيمفي Empirique (F).  
Empiric, Empirical (E).  
هو ما ارتكز على المادة او التجربة الشخصية وليس على القواعد العلمية للملة.

٢٤٣٦٧ = كيمكة Calca (S).  
Calca (F). Calca (E).

جنس طير من المتسلقات وفصيلة البفاروت. اثوابها المعروفة ستة تنتمي الى حارة الدر. موطنها معظم مناطق امريكا الجنوبية. ملينها الحيائي جماعي باستثناء زين التساند والحفن || اجسامها ربيبة تغلغل من ٢٠ الى ٣٦ سم. اثوابها تختلف مع الانواع. الوانها العلوية الى الخضار المتفاوت المجات. الوانها السفلية ترواح من الزيدية الى الصفنتية والسمراء، اجنحتها ذلقة الاطراف، شبه رتاجية التركيب، لا تغلف كامل الذنب. اذنانها معقوفة الاطراف. ارسافها قصيرة. اصابعها كبيرة، شديدة السرعة || تألف اقباضات القرية من الممران. قوتها اثار البرية والزراعية والحويرو.

٢٤٣٦٨ = كيتل، مقياس جauge (F).  
Gauging (E).  
طريقة الوصول الى تحديد المقدار او الحجم وما اشبه. كقياس المياه الجارية ورسيم الدن وقطر الشجرة الخ.

٢٤٣٦٩ = كيتل المساحة Levé superficiaire (F).

٢٤٣٧٠ = كيتل امس Obisium lubricum (S).  
Obisium lisse (F). Obisium lubricum (E).  
دوية نافعة من فصيلة الكريسيات ودية المقرقيات الكاذبة. جسمها صغير القند يغلغل نحو ٣ سم. صدرها جويوي اللون، محيط الصفحة المائلة. مقبها كيران يتبينان بملقطين كلافات المقربان يملوها حلب دقيق اطحل. بطنها محيط عادم الذنب اكهب اللون اسم المراج. عينها مركبتان، صغيرتان. جرابها معتدلة الطول، حنطية اللون || تألف الاجراج وتعيش تحت الجحالة والحجارة الصغيرة. مسرحها دجوي. قوتها الحشرات الصغيرة ويكناها ومازن النمل ودياه والديدان ... || تضر نحو خمس سنوات بياتها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر. تبض الاثني من ١٠ الى ١٢ مكنة تغلفها كالمشوة يصلحها سحرية التوالس مبراة اللون. يتم التفت وتغفل الصلجة في اوائل تموز وتسمى الصغار طلباً للرزق بعد التفت بنحو ٤٨ ساعة.

٢٤٣٧١ = كيتلس Chellinus (S). Chéline (F).  
جنس اسماك بحرية من فصيلة الكيدييات الشائكات الزعانف. انواعها المعروفة نحو ٢٥ اصنافها المحيط الهندي وجوارها. تتميز باستتالة زمانها الظهيرة والشرجية ويتبدس لونها المختابة وباعفراق ميلها العظمي || جميع انواعها مأكولة اشهرها كيلس يشيل وهي سمكة كبيرة القند تغلغل نحو ٦٠ سم. نوها الى السمرة يملوها موج اخضر.

٢٤٣٧٢ = كيلود كيتيل Cheliodactylus (S).  
Cheliodactyle (F).

جنس اسماك بحرية من شلائكات الزعانف وفصيلة البهاريات. انواعها المعروفة عديدة. اصنافها بحار الجنوب || اجسامها شبه ايليبيجية الشوزن تغلغل من ٢٥ الى ٣١ سم. ولسوها

التجميع . ثمارها حبوب صغيرة مستطيلة مأكولة || زراعتها رابحة وجريه شائعة الاستعمال الغنائي .

Phylogénèse (F).

Phylogeny (E).

٢٤٣٩٥ - كَيْتُونَة ٥

Kainite

٢٤٣٩٦ - كَيْتِين

ملح بوتاسي طبيعي الحامضية تركيبه مزيج من كلوريد البوتاسيوم مع سلفات المغنيزيوم وبعض التي من كلوريد الصوديوم والمغنيزيوم . وهو من الاسمدة البوتاسية المحدودة الاستعمال بحوي من ١٤ الى ١٥ ٪ من البوتاس لكن يسمح ذرات التربة السطحية وينشط انكشافه لذلك يحسن استعماله في الأثرية الرليلة الخفيفة دون سواها .

Quinine

٢٤٣٩٧ - كَيْشِين

الكيتين اصل فداك يستخرج من لحاء شجر الكينينا ويستعمل في معالجة معظم الحشرات .

Prioscelus (S). Prioscèle (F). ٢٤٣٩٨ - كَيْهَب ٥

جنس حشرات من غديات الاجنحة مختلفات الاجزاء وفضيلة النشبات . انواعها المروقة عديدة جميعها من علم افريقية الاستوائية والاقليم المحارة || اجسامها كبيرة ، مستطيلة ، معتدلة التبطيط . رؤوسها معتدلة الجرم . قرونها الاستعمارية صولجانية . تأثيرها عجيبة . كراتلها مقلقة الشكل . اعماها لاحقة مخزنة . جراثيمها قصيرة ، نقوسة . نشطة . انوبها لامة قليلة الالوان يكثر فيها الاسود والبي الاسمر .

٢٤٣٩٩ - كَيْهَنَ الثِين ٥ ، سَكْرُولِث الثِين

Hypoborus fuscus (S). Hypobore du figuier,

Scolyte du figuier (F). Hypoborus fuscus (E).

Feigenborkenkäfer (D).

حشرة خاضعة غشائية مؤذية من فصيلة الكراشيات ورتبة مندقات الاجنحة . اعطائها اللبانية تمتد امتداد اقليم الثين ، من السواحل الى ارتفاع ألف متر من سطح البحر . تركب الافراد المستضفة ولا تقرب من الريانة أو البايضة || جسمها صغير القد يطول نحو ٢ سم . لونها الى السمر الكستنية يملوها في ظهرها موج اريد . رأسها معتدل الجرم . عينها صغيرتان . جزامها صولجانيات فكهاا صليمانية ذريان . ظهرهاا ذاق المؤخر اللاصت . غدها متابعات التميزير القاطب || احيائها الحولية تراوح من ٢ الى ٤ ، اربعة اجيال في المناطق الساحلية وجبلان في اعالي الوسط || يوجد الحشرة الجملدة واليرقة لا ينقطع في مناطق الساحل والوسط ، طوال مدار السنة || والحشرة من اي شق كانت تعمل في سبيل التكاثر وتأخذ حل عاتقها عالج السرداب الرئيسي وحجرة التواصل ثم الانفاق الثانوية من البين واليسار . وقد يراوح عدد الانفاق الثانوية من ٣٠ الى ٤٠ .

Apteryx (S).

٢٤٤٠٠ - كَيْتُونِي ٥

Apteryx, Kiwi (F). Apteryx, Kiwi (E).

طائر رأس حداء وحيد الجنس والنوع من فصيلة الكويبات . موطنه نيوزيلندا . جسمه متوسط القد ، جسمه سمح الهجاجة ، قويه الى السمر السفاه المزاج . وهو اجدع الجناح ، حاد الذنب . خطي الريش اللينق النام اندي يشبه الشعر . منقاره مستطيل عذب . يصرح في الليل ، قوته

٢٤٣٩٤ - كَيْمُونْتَس ٥ ، زَهْرَة الشِيَاء

Chimonanthus (S). Chimonanthe, Calycut du Japon (F). Winter flower, Japan allspice (E). Japonische Kelchblume (D). Chimonanto (I).

جنس شجيرات برية ورتبية من فصيلة الكليكتسيات . انواعها قليلة البد . سوقها تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها هائلة ، متعاقبة ، بسيطة ، نصلها سناني الشكل ، مائل البشرة ، زاهي الخضار || ازهارها متدلية انبوية جريونية العرف . الوانها تختلف مع انوعها منها الابيض والاحمر والاصفر والموشع || ازهارها يستمر من كانون الاول الى آذار .

Chimie (F).

Chemistry (E).

علم يبحث في تكوين المادة والتغيرات التي تلحق بها من جراء عوامل مختلفة تفقد الجسم مظهره الخاص وصفاته التي يتميز بها .

Zoachimie (F). ٢٤٣٨٦ - كَيْمِيَاء حَيَوَانِيَّة

Zoochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء يبحث في تفاعلات الانسجة الحيوانية .

٢٤٣٨٧ - كَيْمِيَاء كَهْرَبَالِيَّة

Electro-chimie (F). Électro-chemistry (E).

قسم من علم الكيمياء يبحث في المانشع الكيائية التي تسيرها الكهرواله .

Biochimie (F).

Biochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء يبحث في تفاعلات المادة الحية .

Phytochimie (F). ٢٤٣٨٩ - كَيْمِيَا تَبَائِيَّة

Phytochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء خاص بالنبات .

٢٤٣٩٠ - كَيْمِيَت رَاجِع كَرِزْ فِيلِم كَيْتُو .

٢٤٣٩١ - كَيْنَا هي الكينينا ، اطلها .

Clitorts

هي مقر الانساح المرفع من الفرج وهي جزام مثل الزردان أو حجابيه ، مركزها تحت الزرنية من داخلها .

٢٤٣٩٣ - كَيْنَا جُو ٥

Cercoleptes (S).

Kinkajou (F).

حوربان من الراترنابات وحيد الجنس والنوع . موطنه أمريكا الوسطى يعيش في غابات مناطقها الاستوائية . جسسه طويل نحو ٤٠ سم . بذيله ٥٠ سم اما ارتفاعه من ١٦ الى ١٨ سم . وهو يستعمل ذنبه كالفرد للارتقال من ضمن الى ضمن ومن فجرة الى اخرى . قوته البأر واللويبات الصغيرة والمصائير والبيض والحشرات والمسل الذي يفتش عنه ويلتهمه بشراهة .

٢٤٣٩٤ - كَيْنُو ٥ ، أَلِيْنَة كَيْنُو ٥

Chenopodium quinoa (S). Quinoa, Petit riz (F).

نوع من الاينية وهو نبات عشبي يحلى حولي زراعي مهدد بلاد الشيلي والبيرو . ساقه متصببة قليلة الفروع . اوراقه معققة متعاقبة سنانية النصل المفردس . ازهارها سنيلي ليد



كيمونتس



كينجاو



كينجاو



كيب



كين ثين





كَبِي

Œuf très petit (F).

Little egg (E).

هي البيضة اي البيضة الشديدة الصغر .

٢٤٤٠٢ - كَبِيكَة

الحشرات والديدان والجرب . يعيش ذكراً واثقاً . انثاه  
تحضن في الحول من مرتين الى ثلاث مرات . حفتها بيضة  
واحدة ترخها نحو ٢٤ يوماً .

Micro-organisme.

Microorganisme (F). Micro-organism (E).

تعريف يطلق على كل كائن حي شديد الصغر لا يشاهد  
بالعين المجردة بل تحت المجهر كالكروبات والبكتريات  
والغائرات والاصفان والاولاي .


٢٤٤٠٢ - كَبِين

Apterygidae (S).

Aptérygidae (F). Apterygidae (E).

نصيقة طير من المرادي تتمثل حالياً بنوع واحد ينحى  
كَبِي موطنه نيوزيلندا .

٢٤٤٠١ - كَبُوتَات



لاحسة السكر

Electrode

٢٤٤١٢ - لاجب

هو القطب الكهربائي أو المغنط الكهربائي .

Lepismidae

٢٤٤١٣ - لاجسات

فصيلة حشرات تعرف بالشحبيات ، اطباها .

Lépsma (S).

٢٤٤١٤ - لاجية

Lépsma (F). Lepisma (E).

جنس حشرات من فصيلة اللاحسات . انواعها عديدة تعيش على المواد العضوية والنشوية . راجع شحمة .

٢٤٤١٥ - لاجية السكر \*

Lépsma saccharina (S). Lépsma du sucre, Petit poisson d'argent (F). Silverfish (E). Silberfischchen (D).

حشرة صغيرة الفد اطيحية الشكل فضية اللون من فصيلة اللاحسات مبنولة في البيوت تلمس السكر وتقرض القراميس والكذب .

Cosentérás (F).

٢٤٤١٦ - لاجسويات

Cosentérata (E).

هي الحشرات ويدعونها في مصر « جوفمويات » . شعبة من الحيوانات الدنيا تتميز بمخلوها من الاحشاء والاستعاضة عنها او الاكتفاء بتجويف وحيد الفتحة ويقوم مقام الدم واللاست .

Zoophage (F).

٢٤٤١٧ - لاجيم ، واليج

Zoophagous (E).

ما كان قوته اللحم حيواناً كان ام دويبة ام حشرة .

Carnassiers

٢٤٤١٨ - لاجيمات

هي آكلات اللحوم ، اطباها .

Apétale (F). Apetalous (E).

٢٤٤١٩ - لايتكلي

هو نباتات التي لا قفالة في زهرته . وهي الزهرة العادة البتلات .

Lactifère (F). Lactiferous (E).

٢٤٤٢٥ - لاين

نمت تمريني يطلق على الاوعية المقوية التي تنقل اللبن او العصارات اللبنية في الحيوان والنبات .

٢٤٤٢٦ - لايتكافي بالوكالة

Nul ne plaide par procureur (F).

مبدأ قانوني فرنسي سري مسرى الامثال لقوله انه اذا وكل عمرو زيدا عقاضة بكر وجب ان يذكر في صحيفة الدعوى وفي الحكم اسم الوكيل والاصليل .

Grémillet (F).

٢٤٤٢٧ - لاكتسني

نبات تريني يدعى اذآن الثأر المنقي ، اطليه .

Lathyrine (F).

٢٤٤٢٨ - لايتيون

هي الجلبانين ، راجعها .

Calcifuge (F).

٢٤٤٢٩ - لاجتي

نمت تمريني يطلق على النباتات التي لا تنمو في الارربة الكليسية او انها تنحشا .

Frénateur (F). Brakesman (E).

٢٤٤٣٠ - لاجيم

نمت تمريني يطلق على الاصحاب والمضلات التي تستطع قمع حركات بعض الاعضاء او اعمالها .

٢٤٤٣١ - لاجيم الضفدع

نبات يدعى كلوة الماء ، اطباها .

## ٢٤٤٢٧ - لاذن كريتني \* قستوس إريتني،

Cistus creticus (S).

Ciste de Crète (F). Cretan rockrose (E). Kretische Cistrose (D). Cisto di Creta (I).

نوع من اللاذن الممر المبلل. جنبته تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها فرعاء. أوراقها قصيرة الأضلاع، صغيرة القد ذرية. فصلها يتقاطع المروق والأعصاب، غشن الملس، أزغب البشرة على سطحه. ازهارها قمرية اللون، كبيرة القد، قطرها يراوح من ٨ سم. || أوراقها وفروعها وساقها لزجة يستلقت منها أجود أصناف اللاذن || ازهارها يستمر من أيار الى حزيران.



لاذن أزغب

## ٢٤٤٢٨ - لاذن طوطي \* برعون

Cistus villosus (S). Ciste cotonneux (F).

نوع من اللاذن الممر. جنبته تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. ساقها وفروعها مزغبة. أوراقها معتقة ييشية. فصلها أخشن الصفعة المتشعبة الزباد. زغبها لبد مستطيل يبدو كتيل القطن. ازهارها فردية حراء اللون، قطرها نحو ٥ سم. || ساقها وفروعها وأوراقها لزجة يستلقت منها اللاذن || ازهارها يستمر من أيار الى حزيران.

## ٢٤٤٢٩ - لاذن غاري الورق

Cistus laurifolius (S). Ciste à feuilles de laurier (F).

نوع من اللاذن الممر وهو جنبه سبروتية تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. ساقها فرعاء. أوراقها معتقة غارية الشكل. فصلها ثلاثي المروق، ملس الصفعة العليا أزغب السفلى. ازهارها بيضاء اللون، كبيرة القد، قطرها يراوح من ٥ الى ١٠ سم. || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.



لاذن اسباني

## ٢٤٤٣٠ - لاذن قويسسي الورق

Cistus salvicifolius (S). Ciste à feuilles de sauge (F).

نوع من اللاذن الممر وهو جنبه ميلولة ترغب في الازربة الربطية. تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. أوراقها معتقة قويسية الشكل حادمة المروق. فصلها أزغب البشرة على سطحه، ابيض الصفعة السفلى المشبهة الخمل والأزغب. ازهارها الى البياض الاصفر. قطرها نحو ٥ سم. || ازهارها يستمر من أيار الى حزيران.

## ٢٤٤٣١ - لاذن كيات

Cistaceae (S).

Cistacées (F). Cistaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة الفصائل، اجناسها اربعة، أما انواعها فكثيرة العدد. اشهر اجناسها اللاذن والملايين.

Lar

## ٢٤٤٣٢ - لار

هو جبون لار، اعلمه.

## ٢٤٤٣٣ - لاويس، مَلَز

Larix (S).

Larix, Mélèze (F). Common larch (E). Lärche, Lärchenbaum (D). Larice, Abeto larice (I).

جنس اشجار حرجية من التنويات وفصيلة الصنوبريات. انواعه المعروفة نحو ١٢ اشجارا كبيرة الحجم، هريبة الشكل، اقية الاغصان وألغروع. غراخها صغيرة، بناتها جانبية الانتشاب، قصيرة القد. أوراقها خطية، غنية التجميع، عابلة. ازهارها وسيدة المسكن، الاثنية قدية الشكل. ثمارها اكواز صغيرة. اغصانها جلوية اللون صلبة. قشورها تستعمل في الدهانة ويستخرج من سوطها بالخز مادة واثنية شائعة الاستعمال الصناعي || اصرف انواعها وازهارها ما على.



لاذن كريتني

## ٢٤٤١٩ - لاحيوي \* Abiotique (F). Abiotic (E)

نقيض الحيوي.

## ٢٤٤٢٠ - لاجيب \* Intensif (F). Intensive (E).

نمت تعريفه يطلق على كل ما يتميز بطابع الانتاج الوافر.

## ٢٤٤٢١ - لاجيشوسى \* Abbranché (F).

Abbranchiste (S).

نمت تعريفه يطلق على الحليقات المعاديات الخياشيم.

## ٢٤٤٢٢ - لاذن، لاذن \* Ladanum

مادة صمغية واثنية طيبة قفرها سوق وأوراق بعض النباتات اخصها نبات اللادن. لوها يراوح من الاشهب الصناعي الى الجوزي الاسمر المالح، وهي ذكية العرف طيبة الرائحة || كان لا يزال يستعمل في الطب وبهم من استعمله للفتح وهو شائع الاستعمال المعطري.

## ٢٤٤٢٣ - لاذن، قستوس، قستوس، قيسوس

Cistus (S). Ciste (F). Cistus (E).

جنس نباتات طيبة بوية وتربتية من فصيلة اللاذنيات. انواعه المروفة ٢٠ منها الجنبات والجبيلات والاعشاب اعطائها حوض البحر المتوسط. سوطها قصيرة متصبة فرعاء. ازهارها ابيدة كاملة متقابلة صغيرة النصل. ازهارها لاقياسية التجميع، جبلة الشكل، خالصة البلات. ثمارها حقبة خالصة او عشارية الاخشية || اشهر انواعها ما يتبع.

## ٢٤٤٢٤ - لاذن أجعد \* Cistus crispus (S).

Ciste crépu (F).

نوع من اللاذن الممر وهو بجملة سبروتية تملو نحو ٥٠ سم. ازرقها لاطئة سنانية الشكل. فصلها أجعد الصفعة الخشنة الزباد القفاسة العرف المعطري. ازهارها ارجوانية اللون صغيرة الحجم قطرها نحو ٣ سم. || ازهارها يستمر من أيار الى حزيران.

## ٢٤٤٢٥ - لاذن أرخب \* Cistus hirsutus (S).

Ciste hérissé (F).

نوع من اللاذن الممر وهو جنبه سبروتية تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم. ساقها وفروعها كثيفة للأزغب. أوراقها رهلة. فصلها لبد الخمل على سطحه. ازهارها متكونية التجميع، متوسطة القد، لوها الى الابيض المبيح بالأصفر || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

## ٢٤٤٢٦ - لاذن إسباني \* قستوس لاذني،

شقرامس، قستوس

Cistus ladaniferus (S). Ciste ladanifère, C. lédon, C. d'Espagne, Ladanum d'Espagne (F). Gum-cistus, Ladanum-resin tree (E). Spanische Cistrose (D). Cisto ladanifero, C. di Spagna (I).

نوع من اللاذن الممر، يكثر في خضاب اسبانيه وبيجاها وهو جنبه ميلولة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها فرعاء. ازرقها لاطئة ثلاثية المروق. فصلها أخضر الصفعة العليا غير السفلى الكثيفة الخمل والأزغب. ازهارها كبيرة القد قطرها يراوح من ١٠ سم. لوها الى الابيض بلون ترشيح وتبيح احمر || أوراقها وفروعها لزجة يستعطف منها اللاذن المشهور. ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران.

صفحة العليا خضراء اللون غنّدة، صفحته السفلى خفيفة البشرة، غبراء اللون. وأوراقها حله تشقر عند اقترابها من الخريف فتبدو بلون الذهب. أكوازها مخروطية الشكل تطول من ٦ إلى ٧ سم. وتعرض من ٤ إلى ٥. جرهاتها جوئية اللون، هريمة الشكل، ناشرة.

#### ٢٤٤٤٠ - لارورد، لارورد

Lapis, Lapis-lazuli, Lazulite

حجر كريم مشهور، أجوده الصافي الشفاف الأزرق الشارب إلى حمرة وخضرة.

٢٤٤٤١ - لارورد  
Cynanthus (S).  
Cynanthe (F). Cynanthus (E).

عشبة معمرة، برية وتربينية من فصيلة الجريسيات. منبتها الهند وقد انتشرت زراعتها الحلاطية والمركنية في أكثر من قطر. ساقها قصيرة تملو نحو ٢٠ سم. جلورها دريما مستطيلة. أوراقها متعاقبة، بيضية النصال، صغيرة الحجم. أزهارها فردية، محورية الاكواز، لأزوردية اللون. قطرها نحو ٣ سم. انتويرها يستمر من أواسط آب إلى أواسط أيلول.

٢٤٤٤٢ - لاشيتي  
Agame, Asexuel (F).

كل ما هو عادم الشق أي عادم الأعضاء التناسلية في الحيوان وفي النبات.

٢٤٤٤٣ - لاشيتالي  
Lachenalia (F).

هي زنبق البر، أطليه.

٢٤٤٤٤ - لاصع  
Dessev (F).

نمت تمرغني يطلق عل النسخ النباتية الحالية من المواد الصائنة.

٢٤٤٤٥ - لاصب  
Plantain (F).

جنس نباتات عشبية كثيرة الأنواع اشتهرت باسم لسان الحمل، أطليه.

٢٤٤٤٦ - لأطس، قشتر  
Lates (S).

جنس اسماك نهري من شالكات الزعانف وفصيلة الفرغيات.

أنواعه قليلة العدد اصطناعا نهر البلاد الاسيوية والافريقية الحارة كالنيل والتيجر والكنج والفرات ... جميعها كبيرة القد مستطيلة الجسم محدودة الظهر. أنواها إلى السمرة الفصية يملوها موج مختلف باختلاف النوع. لحوبها مأكولة لكنها دون الوسط. أشهر أنواعه ما يلي.

٢٤٤٤٧ - لأطس النيل، حيمار البحر، قرغ  
Lates nilotica (S).

نوع من الأاطس وهي سمكة كبيرة القد، طولها نحو ١٠٠ سم. تكثر في مياه النيل من منبه إلى مصبه. وهي من الأسماك المأكولة المتوسطة الصنف. وكان المصريون من عهد الفرعنة إلى عهد الرومان يقدمونها وبها سميت مدينة لاطبولس أي اسنا في الصعيد.

٢٤٤٤٨ - لأطس الهند  
Lates maxima (S).

نوع من الأاطس وهي سمكة كبيرة القد ضخمة، طولها نحو

#### ٢٤٤٣٤ - لاريس أروبة، مكلر أروبة

Larix europaea, L. decidua (S). Larix d'Europe, Mélèze d'Europe (F).

نوع من اللاريس منته جبال أروبة. شجرته تملو من ٣٠ إلى ٣٥ م. غراحيها صفراء اللون. أوراقها تطول من ١٥ إلى ٣٥ م. وتعرض نحو ٥. وهي رجلة، كثافية الشكل، ثلاثية الصفحات، حيلة الخضار الزاهي. أكوازها الانثوية ارجوانية اللون. أكوازها تملو من ٣ إلى ٤ م. وتعرض نحو ٢. جرهاتها سكية الشكل كثيرة العدد.

٢٤٤٣٥ - لاريس الصين، مكلر الصين  
Larix chinensis (S). Larix de Chine, Mélèze de Chine (F).

نوع من اللاريس منته جبال الصين. شجرته سبروتية، تملو من ١٥ إلى ٢٥ م. غراحيها زياء سطحية اللون. بناتقها خلية. أوراقها ثلاثية الصفحات تطول من ٢ إلى ٣ م. لوها إلى الخضار المائت يملو موج أزرق. أكوازها مخروطية تطول من ٣ إلى ٥ سم. جرهاتها بارزة مشننة الأصغر.

٢٤٤٣٦ - لاريس اليابان، مكلر اليابان  
Larix leptolepis (S). Larix du Japon, Mélèze du Japon (F).

نوع من اللاريس منته جبال اليابان. شجرته سبروتية سريعة النمو تملو من ٢٥ إلى ٣٠ م. غراحيها جوئية اللون لامة. بناتقها خلية البشرة، بحرية اللون. أوراقها ثلاثية الصفحات تطول من ١٥ إلى ٣٠ م. لوها إلى الخضار الصافي الموج، أكوازها مخروطية صفراء اللون تطول نحو ٤ سم. جرهاتها قنصوية الشكل غائرة الحار.

٢٤٤٣٧ - لاريس أمريكة، مكلر أمريكة  
Larix americana, L. pendula (S). Larix d'Amérique, Mélèze d'Amérique (F).

نوع من اللاريس منته أمريكة الشمالية. شجرته سبروتية بطيئة النمو تملو من ٢٥ إلى ٣٠ م. غراحيها إلى الحمرة البنفسجية. بناتقها بحرية اللون، ودية الطيبيل. أوراقها ثلاثية الصفحات، حيلة الخضار الزاهي تطول من ١٥ إلى ٣٠ م. أكوازها جوئية اللون تطول نحو ٣ سم. وتعرض نحو ٢.

٢٤٤٣٨ - لاريس سيبورية، مكلر سيبورية  
Larix sibirica (S). Larix de Sibérie, Mélèze de Sibérie (F).

نوع من اللاريس منته سيبيره. شجرته سبروتية تملو من ٢٥ إلى ٤٠ م. غراحيها سود الحار. أوراقها ثلاثية الصفحات تطول من ٤ إلى ٥ سم. وتعرض نحو ١ م. أزهارها الانثوية إلى الخضار الباهت. أكوازها مخروطية تطول من ٤ إلى ٥ سم. جرهاتها بارزة، مسنة الزوايا، قليلة العدد.

٢٤٤٣٩ - لاريس كاذب، مكلر كاذب  
Pseudolarix (S). Faux-larix, Faux-mélèze, Sapin doré, Arbre d'or (F). Golden larch, G. pine (E). Echte Goldlärche (D). Abeto d'oro (I).

شجرة حرجية سبروتية، سريعة النمو، هريمة الشكل، وسيدة الجلس والنوع من التنويات. مهدا جبال الصين التبتية. تملو من ٣٠ إلى ٤٠ م. اغصانها انقية الانتشاب فارشة. أوراقها عابلة، ضمة التجميع. نصلها خطي الشكل يملو من ٥ إلى ٨ سم. ويعرض من ٢ إلى ٣ م.



لاريس أروبة



لاريس اليابان



لأطس النيل

تطول من ٨ إلى ١٠ م. تحله نصل أوراق النبق الاخضر وتورده بين بشرتيه فيبدو شفافاً خالياً من المردة البنية الحمرية . راجع حنجلو البطاطا .



لاعية

٢٤٤٥٨ - لاغيمية التين ° *Mineuse du figuier (F).*  
هي قورمة التين ، اطلبها .

٢٤٤٥٩ - لاغيمية الزرع ° *Agromyza ambigua (S).* *Mineuse des céréales (F).*  
حشرة صغيرة من اللافحات . طولها يراوح من ٣ إلى ٤ م. رأسها وبطنها الى الجوزة البنفسجية . كسلها الى السواد الازرق الملوغ . تكثر في اراثل نيسان . تمتع مكها حل حلف الزرع فينتف عن رقات تلغم النسيج وتسبب ذبوله .



لاغمة الارضي شوكي

٢٤٤٦٠ - لاغيمية الكرزيتم ° *Phytomyza atricornis (S).* *Mouche des chrysanthèmes (F).*  
حشرة صغيرة من اللافحات . طولها يراوح من ٢ إلى ٣ م. لونها الى الوردية السمره تملغا بقع صفر . رقاتها تركب اوراق الكرزيتم فتلغها وتؤذيها اشد اذى .



لاغمة التينغ

٢٤٤٦١ - لاغيمية اللوبيا ° *Agromyza phaseoli (S).* *التاصولييا °*  
حشرة صغيرة من اللافحات . طولها نحو ٣ م. ثوبا اسود لاح . تمتع مكها في اوراق اللوبيا قرب اقلع فينتف عن رقات تعيش بين بشرتي الورقة ثم تنجع نحو اقلع وبها الى الملاق فالساق فالمرقة حيث تبقى الى ان يتم انسلاخها وتتحول الى كزود .



لاغمة الزرع

٢٤٤٦٢ - لاغيمية اوراق الأشجار المثمرة *Mineuse des feuilles des arbres fruitiers (F).*  
حشرة مؤذية من حورثقيات الاجنحة تدعى رعاة ملوثة ، اطلبها .

٢٤٤٦٣ - لاغيمية *Euphorbe officinale (F).*  
هي الغريون الخزني ، اطلبها .

٢٤٤٦٤ - لاقتاري *Invertébrés (F).* *Invertebrata (E).*



لاغمة الكرزيتم

الانقاريات قسم من الحيوونات لا ففاز لها . فالارالي والاسفنجيات والمجريات والشوكيات والديدان والرخويات جميعها من الحيوونات الانقارية .

٢٤٤٦٥ - لاقتلي *Acotylédone (F).* *Acotyledon (E).*

نمت تمرني يطلق حل النبات الدميم الغلقة .

٢٤٤٦٦ - لاغية بوعيمية *Zygospore*

٢٤٤٦٧ - لاقتصيات ° *Atracheates (F).* *Atracheates (E).*

قة من الحلييات تشمل الانواع العادمة الرضاي ، الجلدية التنفس . جميعها من الحيوونات الدنيا تتغفل حل الحروان او تعيش حل المواد العضوية السائلة نحو الانعلاط .



لاغمة الوبيا

٢٤٤٦٨ - لاقيات التمل ° *Fourmiliers (F).* *Ant-thrush.* *Ant-catcher (E).*

مرتبة من الطير تنسج الى رتبة الجرام . فصائلها واجناسها

١٣٠ م. تكثر في مياه الكنج من منبه الى مصبه . ثوبا الى السرة الفحمية يملغا موج جزوي يميل حه الطهر ويغف وزغو حنه البطن .

٢٤٤٤٩ - لاططات العيون *Edriophthalmes*  
شعبة من الحيوونات انقريات اللينات الصف .

٢٤٤٥٠ - لاططات المتك *Diploures.* *Eutotrophes*  
رتبة حشرات مادية من هديات الازناب . اجناسها وانواعها نحو ١٥٠ اصلها جميع المناطق الحارة والمعتلة . تتميز بصغر متكا واحتجابها . باستطاعة قروها الاستشعارية البديدة الفواصل وبارسها الوحيدة المغاسل .

٢٤٤٥١ - لاططي *Sessile (F).*  
نمت تمرني يطلق حل الاعضاء النباتية التي لا تقوم حل دعائم حل تركز مباشرة حل الهور كقوك ورقة لاطنة .

٢٤٤٥٢ - لاعضوي *Inorganique (E).* *Inorganic (E).*

٢٤٤٥٣ - لاغية ° *Lophospermum (S).* *Lophasperme (F).*

جنس نباتات حارشة حلبة ازجعة من فصيلة الخنازريات . انواعها قليلة ، سورها فراء تطول من ٢٠٠ الى ٤٠٠ م. اوراقها متفكة قليلة خاسية التفتيس . نصلها حل البشرة مسن الحافة . ازارها فردية ، محورية الارتكاز ، كبيرة القد ، طويلة الزناد ، ودية اللون موحجة بالابيض والاصفر وهي مغيرة التريج يمرسها النحل .

٢٤٤٥٤ - لاغيمات ° *Agromyzidae (S).* *Agromyzidae.* *Leaf miners (E).* *Minierfliegen (D).*

فصيلة حشرات من رتبة ذرات الجناسين . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٥٠٠ . جميعها صغيرة القد ، رمادية اللون او بنية ، ملونة الجناح . تطفر في الربيع . تمتع مكها حل اوراق النبات وصاليجه الفضة فينتف عن رقات دقيقة خبيطة تدخل النصل فتلغها وتتمسك حلها ، بين البشريين ، ثم تتحول بعد انسلاخها الاخير الى كزود تحكث في مكانها او تقيم في التربة كامل فترة بيئاتها العلوي .

٢٤٤٥٥ - لاغيمية الارضي شوكي ° *أغروميذا اندلسية °*

*Agromyza andalusica (S).* *Mineuse de l'arctichaut (F).*  
حشرة صغيرة من اللافحات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م. جسمها ازغب الكساء . ثوبا الى السرة العابقة . اجناسها الحولية ثلاثة ، رقاتها تلغم هروق اوراق الارضي شوكي فتلغها .

٢٤٤٥٦ - لاغيمية البهيمية ° *ليتمويذا*

*Phytomyza ficis (S).* *لاقتصيات °* *Mouche du houx (F).*  
حشرة صغيرة من اللافحات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م. ثوبا اسود اللون . رأسها وجرامها مجلدة بالاصفر . رقاتها تركب اوراق البهيمات فتلغها وتؤذيها .

٢٤٤٥٧ - لاغيمية التبع ° *Phtorimæa operculella (S).* *Mineuse des feuilles de tabac (F).*

فراشة من فصيلة المتجوليات تدعى حنجلو البطاطا . حديقها تحيلة فراء اللون حنطية الرأس حلبة الغط الترجية الجانية .

## ٢٤٤٧٨ - لَامَة \* ، جَسَل أَمْرِيكِيَّة

Auchenia, Lama (S). Lama

جنس حيوانات لبونة عاشبة من فصيلة الجمليات . أنواعها اربعة ، موطنها هضاب وجبال امريكة الجنوبية . اجسامها رشيقة القوام ، طولها يراوح من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم . وارتفاعها من ٨٠ الى ١٢٥ سم . اعناقها مسطيلة ، اوبارها صناعية جيدة الصنف تحمي القدر . قوتها الاعشاب . بعض انواعها داجن يستعمل لدر الحليب ونقل الاثقال .

## ٢٤٤٧٩ - لَامَسَاوِي الْأَوْرَاقِ

راجع غير متساوي الاوراق .

## ٢٤٤٨٠ - لَامَسَاوِي الْبَتَلَات

راجع غير متساوي البتلات .

## ٢٤٤٨١ - لَامَسَاوِيهِ الْاَجْزَاء

راجع غير متشابه الاجزاء .

## ٢٤٤٨٢ - لَامِيَاثِي

Atypique (F). Atypic (E).

Lamarkia (S). **لَا مَرْكَبِيَّة** ، **قَدَّيُون** .

Lamarkia, Codion (F). Lamarkia (E).

جنس نباتات عشبية معقودة التعريف على اسم العلامة «لامارك» . وهي برية ، معروية ، حولية او معمرة من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، منها جروش البحر الابيض المتوسط || سوقها شطئية فرما تملو من ٢٠ الى ٥٥ سم . صفها مستدل الطول ، قليل القروش . ازهارها سنبلية التجميع ، شبه غروطي الشكل ، سنبلاتها متدلية .

## ٢٤٤٨٤ - لَامِسَة

Tentacle (F). Tentacle, Feeler (E).

ج. لوامس . زوائد لا مفصليّة قابلة الانعطاف والانكماش توجد عند بعض الحيوانات تمكّنها من التقبض على فريستها او التماس طريقها ...

## ٢٤٤٨٥ - لَامَسِيَّيَات

Aplacentales (F). Aplacentalia (E).

شعبة من صف الفرعيات . فصائلها واجناسها عديدة تجتمع الى رقتين : الجرابيات ووحيديات المسالك .

## ٢٤٤٨٦ - لَامِعَات

Ganoïdes (F). Ganoïdes (E).

رتبة اسماك غضروفية تشمل بعض الفصائل اخصها الحفشيات .

## ٢٤٤٨٧ - لَامِعَة

هي الفتوتية ، نبات من الورديات ، اطبا .

## ٢٤٤٨٨ - لَامَقْصِيَّي

Inarticulé (F). Inarticulate (E).

نمت وصفي يطلق على الاعضاء العادة المفصائل .

## ٢٤٤٨٩ - لَامِي

هو الامريد ، اطبا .

## ٢٤٤٩٠ - لَامِي الْبَتْسَم

Amyride gomifère (F). هو الامريد البتسي ، اطبا .

## ٢٤٤٩١ - لَامِي الْمَكْسِيَّة (Amyride élémiphère)

هو امريد المكسيك ، اطبا .

وانواعها كثيرة العدد معظمها من طيور افريقية وامريكة . تألفت المناطق الحارة والامتوائية || اما فصائلها فهي الجمليات والذناجيات والفرناريات والمأنوريات والعتريات والروصيات .

## ٢٤٤٩٦ - لَأَثُون مُنْقَط

Lacon punctué (F).

هو السائل المنقط ، اطبا .

## ٢٤٤٩٧ - لَأَيَّاسِي ، لَأَنَتَّاسِي

Asymétrique (F). Asymmetrical (E).

نمت تعريفي توصف به الاشياء الشاذة من نظم القياسات المألوفة .

## ٢٤٤٩٨ - لَأَلَا

Renoncule d'Orient (F).

هي الحوذان الاسيوي ، اطبا .

## ٢٤٤٩٩ - لَالَة

Trillium (S). Trillie (F).

جنس نباتات عشبية سبروتية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعها المعروفة عديدة . افعالها اقلية ، معظمها امريكي المهد . ترطب في الموامع الغطالية ، اروبها مادة ، سوقها قصيرة تنتمي بصفة للألوية الاوراق تملوها زهرة ملونة ثلاثية البتلات . اعراف انواعها واشهرها ما يلي .

## ٢٤٤٩٩ - لَالَة الْبَلَج

Trillium nivale (S). Trillie des neiges (F).

نوع من الالة . ساقها تملو من ٦٠ الى ٩٠ سم . اوراقها مستطقة ، بيضيه ، صغيرة القد . تصلها ثلاث المروق يطول نحو ٥ سم . ازهارها بيض ، قطرها نحو ٤ سم . ازهارها يستمر من اذار الى نيسان .

## ٢٤٤٧٤ - لَالَة حَافِيَّة

Trillium sessile (S). Trillie sessile (F).

نوع من الالة . ساقها تملو من ١٥ الى ٣٠ سم . اوراقها حافضة ، تصلها ثلاث المروق اعليجي الشكل مذيب الزام الاخير يطول من ٧ الى ١٥ سم . ازهارها قرنزية اللون ، قطرها يراوح من ٥ الى ٦ سم . ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

## ٢٤٤٧٥ - لَالَة كَبِيرَة الزَّهَر \*

Trillium grandiflorum (S). Trillie à grande fleur (F).

نوع من الالة . ساقها تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها حافضة . تصلها خنثي المروق اعليجي الشكل ذلق الزام الاخير يطول من ١٠ الى ١٤ سم . ازهارها عادية العرف ، كبيرة القد ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى الالبيش او الوردي . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

## ٢٤٤٧٦ - لَالَة مُنْتَصِبَة

Trillium erectum (S). Trillie dressée (F).

نوع من الالة . ساقها تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقها حافضة . تصلها خنثي المروق ، سنائي الشكل ، مستطق الزام الاخير يطول نحو ١٢ سم . ازهارها جفر ، كبيرة القد ، منتصبة الانكناز . يتلاها الى الخضار الاصفر يطولها حنار اخر وتغطيها ثلاثة خطوط جزوية . ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

## ٢٤٤٧٧ - لَامَاثِي ، هَيْبِر

Anhydre (F). Anhydrous (E).

نمت تعريفي توصف به الاجسام الخالية من الماء او العادة الماء .



لَالَة كَبِيرَة الزَّهَر



لَامَة

٢٤٥٠٠ - **لاهولائية** ، **أُنِيرُوبِيَّة** (F). Anasérobie (F).

صفة الكائنات الحية المجهرية التي تستطيع العيش منقطعة عن الهواء .

٢٤٥٠١ - **لاؤدته**

هي الحواشي ، اطليا . ونسبا الاصلية والذكر واخرصة والحسنة .

٢٤٥٠٢ - **لايتحلل** ، **لايتدوب** (F). Indissoluble (F). Undissolved (E).

٢٤٥٠٣ - **لب** (F). Pulp (E). هو ما في جوف الحبة واللوزة وغيرها من مادة جامدة مأكولة أو غير مأكولة .

٢٤٥٠٤ - **لبا الشمرة** ، **هيزوكرب**

(F). Mesocarp (E). هو السوط ، الجزء المتوسط من الثمرة ، وهو الجزء اللحمي في الثمار المأكولة .

٢٤٥٠٥ - **لبا الكارجيل** ، **كُبره**

(F). Coprah, Copra (F). Coco-nut (E). لب ثمر البارجيل الذي يستخرج منه بالصر دهن نباتي يدعى « سمن نباتي » .

٢٤٥٠٦ - **لبا يئس** (F). Brunissement Interne (F). Internal browning (E).

عارض يصيب ثمار التفاح المغزونة في البراد ، قوامه عروق مستطيلة مستقيمة ومتعرجة تغش من وسط الثمرة الى سطحها فتقطع الخلايا التي تغطيها وتسبب اختار عصيرها . يقال ان اسبابه تعود الى انخفاض درجة الحرارة قرب زمن ادراك الثمار وإلى هبوطها في البراد حتى درجة الصفر واستمرارها على هذه الدرجة بعض الوقت .

٢٤٥٠٧ - **لبا** (F). Arroser (F). To water, To sprinkle (E). لباً الثمرة : مقلحا عند فرشها ، اذا غرست نيلة يجب ان تلبأها .

٢٤٥٠٨ - **لبا** (F). Amouille, Colostrom (F). Beestings, Colostrom (E). اول حليب عقب الفرس تدره البقرة والشاة والذرة . وهو غني بالمواد الآحية فقير بالزبد والسكر والماء .

٢٤٥٠٩ - **لباب** (F). Pulp (E). هو بوجه عام جاع المادة الدفريفة النباتية الطبيعية . وهو بوجه خاص ما تبقى من الثريد بعد استخراج السكر ومن البطاطا بعد استخراج النشا .

٢٤٥١٠ - **لبابي** ، **لبوبي** ، **ألبوبي** ، **لحيم** (F). Pulpeux (F). Pulpous, Pulpy (E).

٢٤٥١١ - **لبادى** ، **لبادى** قال الجاحظ : « طائر على شكل البنان اذا اسفح على الارض لبه فلم يكد يطير حتى يطار » .

٢٤٥١٢ - **لبان** ، **بنتج** (F). Boswellia (S). Boswellie (F). جنس اشجار حرجية من سبط البخوريات وفصيلة البطيبيات انواعه المعروفة قليلة اصطلحها جبال المناطق الاستوائية الهندية

٢٤٤٩٢ - **لاهيبة الصفصاف** (F). Lamie des saules (F).

هي قرئبي الصفصاف ، اطليا .

٢٤٤٩٣ - **لاهيون** (S). Lamium (S). Lamier (F). Dead-nettle (E).

جنس نباتات برية معمرة من فصيلة الشقريات . انواعه نحو ٤٠ جميعها احشاش تعملون من ٣٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها متعاقبة ، منقطة ، مخززة . ازهارها قلبية التجميع ، ابطية الاذنكار . تكثر في الاماكن الظليلة وفي السياجات وبجاري الماء . وهي من النباتات المرمومة التي تشبهها الماشية . اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٤٩٤ - **لاهيون أبيض** \* ، **قرص كذاب**

(S). Lamium album (S). Lamier blanc, Ortie blanche, O. morte, Fausse ortie (F). White dead-nettle (E). نوع من اللاهيون الطبي . عشبته تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم . اوراقه الى الحشاش الاصفر المالح ، يملوها زغب مبهر نحل . ازهاره كبيرة القذ يضاه اللون || ازهاره رديهي يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٤٤٩٥ - **لاهيون أرجواني** \* ، **قرص أحمر**

(S). Lamium purpureum (S). Lamier pourpre, Ortie rouge, O. féide (F). Red dead-nettle (E). Rota Taubnessel (D). Lamio purpureo, Ortica fétide (I). نوع من اللاهيون الطبي . عشبته كرجية الرائحة تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه خلية الصفحة السفلى . ازهاره أرجوانية اللون ، كبيرة القذ ، تظل نحو ٤ سم . ازهاره رديهي .

٢٤٤٩٦ - **لاهيون أرقط** \* ، **لوقاس** ، **حرف**

(S). Lamium maculatum (S). Lamier maculé, L. tacheté (F). Spotted dead-nettle (E). Gefeckta Taubnessel (D). Lamio scritto, Dolcimele, Milzadella (I). نوع من اللاهيون الطبي . عشبته تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم . اوراقه خلية الصفحة السفلى . ازهاره كبيرة القذ تظل نحو ٥ سم . لونها الى البياض المرقط بالاحمر || ازهاره رديهي .

٢٤٤٩٧ - **لاهيون أصفر** \*

(S). Lamium luteum, L. galeobdolon (S). Lamier gaubdolon, Ortie jaune (F). Yellow archangel, Yellow dead-nettle (E). Gelbe Goldnessel, Goldtaubnessel (D). Lamio giallo, Ortica gialla (I). نوع من اللاهيون ، عشبته تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه مائلة البشرة على صفحتها ، ازهاره متوسطة القذ تظل نحو ٣ سم . لونها الى الصفرة الكبريتية . ازهاره رديهي .

٢٤٤٩٨ - **لاهيبة** ، **ملهباب** \*

(F). Lance-flammes (F). Flame thrower (E). جهاز آلي يرسل اللهب ويسده . يستعمل في القضاء على بعض الحشرات وفي تطهير التربة من بعض الاوسام والجراثيم

٢٤٤٩٩ - **لاهولائي** ، **أُنِيرُوبِي**

(F). Anaérobique (F). Anaerobic (E). نعت تعريفي يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي تستطيع الحياة بعيدا عن الهواء .



لايون ابيض



لايون أرجواني



لايون أرقط



لاهيون أصفر

سوقها عصارة صمغية رائحة تستعمل استعمال البخور ، عرفها اليوناني الزانحة مستحب .

٢٤٥٢٢ - لَبَنِيَّ

لب حب : جرى فيه اللدق وصار له لب يؤكل .

٢٤٥٢٣ - لَبَنِيَّ ٥\*

Tilapia (S).

Tilapia (F). Tilapia (E).

جنس اسماك نهريه من فصيلة المشقيات ، انواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطائها بعض انهر الشرق الادنى وافريقية الشرقية || اجسامها صغيرة ، شبيهة اهلبيجية الشكل ، معتدلة التعليط ، وذينة المقدم ، تعلو من ١٦ الى ٢٠ سم . رؤوسها معتدلة الجرم ، قصيرة الاعظام ، صغيرة الاسنان كبيرة العين . زعانفها الظهرية كبيرة ، قليلة المرض . الصدرية والخصوية والشرجية معتدلة الجرم . الذليلية كبيرة ، مقطوعة الطرف . اثنائها تراوح من الريدة السراة الى الريدة النغسية يطولها ستة او ثمانية او عشرة اطواق متعرجة شديدة السرة || من ميزات هذا الجنس ان اللجنس ان اللذكور تحضن سره الاناث في تجاويف اعطامها حتى التفك اي نحو سبعة ايام || اعرف انواعه :

٢٤٥٢٤ - لَبَنِيَّ العاصي

Tilapia orontes (S).

Tilapia de l'Oronte (F).

يكثر وجوده في نهري العاصي والاردن .

٢٤٥٢٥ - لَبَنِيَّ النيل

Tilapia nilotica (S).

Tilapia du Nil (F).

يكثر وجوده في النيل حيث يسمونه عرغشلي وشط في حين ان المشط اي العرغشلي يقتني الى غير هذا الجنس .

٢٤٥٢٦ - لَبَنِيَّ ٥\*

Trombidium holosericeum (S). Lepte automal, Aoutat, Mite rouge, Vendangze (F).

حشرة من الغاشيات ، طولها نحو ٣ سم . ثوبها الى الحرة تكثر في المراعي والحقول المزروعة وعلى التلويبا . رقبها نغيلة دقيقة طولها يراوح من ١ الى ٢ سم . تركب الاناث اذا جلس فوق المشب وتدخل تحت بشرة الجلد فتحدث حكاكا مؤلما . يمينها البزبن .

٢٤٥٢٧ - لَبَنِيَّ ليريوم ٥\*

Leptothyrium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الهديكات . انواعه قليلة ، تتميز ببيكياتها المحجنية الشكل ، السطحية الارتكاز ، السوداء اللون . بويضاته اهلبيجية او وشمية || اعرف انواعه ما يلي .

٢٤٥٢٨ - لَبَنِيَّ ليريوم التفاح ٥\*

Leptothyrium pomi (S). Maladie en crotte de mouche (F). Sooty blotch (E).

نظر مجهرية يمتري ثمار عدة لباتات برية وزراعية اعصها التفاح في بعض انواعه المتخارة || مظهره الخارجى رقة وشمية تشبه ونم الذباب يبلغ متوسط عددها نحو ٤٠ ونم . تركب بشرة الثمرة قرب ادراكها . تبهر سطعية اللون ثم تنصرف الى السرة الفحمية || يعيش الثار فينبس قشيتها التجارية دون ان يعطها || يكافئ بساتمال سائل بوردو الخفف قبل ادراك الثار باسبوسين .

٢٤٥٢٩ - لَبَنِيَّ ليريوم كاروفيلوم ٥\*

Leptothyrium carpophilum (S). Fly speck (E).

نظر مجهرية يمتري بعض انواع الاحاص المتخارة . مظهره

والايرانية . يستخرج من سوقها بالخز عصارة رائحة سمية الجفان فاعرة المسك تدعى بخور اللبان || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٤٥١٣ - لَبَنَان حَبْشِي ٥\* ، بَسْتَج حَبْشِي ، طُونس

Boswellia papyrifera (S).

Boswellia d'Abyssinie, Arbre à l'encens (F). Incense tree (E). Weihrauchbaum (D). Albero Incenso (I).

نوع من اللبان ، ثمرته صغيرة القد ، موطنها بلاد الحبشة . يستخرج منها بالخز اخضر بخور واعمته .

٢٤٥١٤ - لَبَنَان شامي ، صَمْع البَطْم

Pois-résine (F). Shoemakers' wax (E).

مادة راتنجية صمغية تستخرج من سوق البطم .

٢٤٥١٥ - لَبَنَان هندي ، لَبَنَان ذَكَر ، بَسْتَج هندي ، كَنْدَر

Boswellia serrata (S). Boswellia des Indes, Oliban (F). Frankincense, Olibanum tree (E). Echter Weihrauchbaum (D). Olibano incenso (I).

نوع من اللبان ، ثمرته معتدلة القد ، موطنها بعض مناطق الهند . يستخرج منها بالخز بخور اللبان المشهور .

٢٤٥١٦ - لَبَنَان

Laitier (F). Milkwoman (E).

من تامل يبيع الحليب واللبن .

٢٤٥١٧ - لَبَنَانَة

Andrachnes (S). Andrachné (F). False orpine (E). Echter Burgel (D). Porcellana (I).

جنس نباتات برية من فصيلة اليتويات ، انواعه عديدة منها الاشباب والجنات والشجيرات . جميعها معمرة ، اعطائها المناطق الحارة والمعتدلة في سائر اقطار العالم . سوقها متصلة او معرجة ، فروصها دقيقة ملتوية . اوراتها صغيرة القد معتقة متعاقبة متقاربة . ازهارها ابطية فردية . ثمارها جراء تغلف نحو ٦ بزور آسية المادة || اشهر انواعها الطيبة ما يلي .

٢٤٥١٨ - لَبَنَانَة المَسْط ٥\*

Andrachnes telephioides (S). Andrachné téléphioide (F).

نوع من اللبان الطيبة ، مهدا تمام شرقي المتوسط من فلسطين الى اذرب . ساقها نغيلة ، فروصها دقيقة وملتوية . اوراتها صغيرة ، بيضية النصل ، نقيعها ينقي الدم ويدبر البول .

٢٤٥١٩ - لَبَنَانَة الهند

Andrachnes cadishawii (S).

Andrachné cadishaw (F).

نوع من اللبان الطيبة ، مهدا الهند . اوراتها مسطحة ناجية تقمل الجروح وتشفى القروح الخبيثة .

٢٤٥٢٠ - لَبَنَانَة مغربية

Euphorbe résinifère

هي المتجدد اطلبه .

٢٤٥٢١ - لَبَنَانَة ٥\* ، اَمْطِي

Icica icariba, Protium icariba (S). Iciquier (F). Elemi gum tree (E). Elemibaum (D). Elemi (I).

جنس اشجار حرجية من فصيلة البخوريات . انواعها عديدة ، اعطائها المناطق الاستوائية والحارة بعضها يعيش في رمال الشواطئ الحرجية والبهريه . اوراتها مركبة متعاقبة . ازهارها صغيرة القد يبيض اللون . ازهارها حثوكلي او صفودي التجميع ، محوري الارتكاز || يستخرج من



ليان حبشي



لبانة المستط



لبانة



كت



لبن



ليتوثريوم التفاح



النبات || البرقة عند الاذواء الثام تطول نحو ١٦ م .  
جسمها شبه اسطواني الشكل اسمر اللون اطحل الملمح ،  
اسود الرأس ، ميمر الهلب الثام الاجتر اللون .



ليثورة دسابة  
التجديع



ليثورة مدانية  
ليثورة فسقية



ليثورة مدسبة



ليثورة ملطحة



ليثورة ملطحة  
ليثورة مؤذرة



ليثونة

### ٢٤٥٣٦ - ليثورة منقطة \* (S).

*Leptura maculata* (S).  
نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٥ الى ١٧ م .  
جسمها ضيق مستطيل ، رأسها وكوسلها الى السواد اللغني .  
معداها الى الصفار التبيي يملوها مخطوط وتنبش  
اسود . تميش على مختلف ازهار الورديات والخبليات .  
يكثرو وجودها من ايار الى ايلول . رقاتها همة مؤذية .

### ٢٤٥٣٧ - ليثورة منقطة \* (S).

*Leptura cerambyciformis* (S).  
نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ٧ الى ١١ م .  
رأسها وكوسلها الى السواد اللغني . معداها الى الصفرة  
المعدرة تملوها نقط سود طرية || تميش في الاغصان والحدائق  
الجبلية ، يكثرو وجودها من حزيران الى آب .

### ٢٤٥٣٨ - ليثورة مؤذرة \* (S).

*Leptura aurulenta* (S).  
نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٤ الى ١٨ م .  
رأسها وكوسلها الى السواد العايق ، معداها الى الصفرة  
المتانية تملونها ثلاثة خطوط سمر يملوها خل مشب اللون .  
تميش على مختلف الاشجار الحرجية اغصانها السنينيات ،  
يكثرو وجودها من حزيران الى آب . رقاتها مؤذية تسردب  
الشجير .

### ٢٤٥٣٩ - ليثوسيرات \* (S).

*Leptocercus* (S).  
فصيلة حشرات من رتبة جملويات الاجنحة . اجناسها  
وانواعها المعروفة متوسطة البدن منتشرة في بعض اساقع  
البلاد المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها  
متوسطة القد ، غبراء . اجنسها غبراء اللون مهدبة الاطراف  
الخلفية ، تملوها بعض الزخارف ، ترتيبها واضح الترتيب ،  
قليل الاعصاب المنتشرة || ملجها الحياقي جامي . اقواسها  
كثيرة العدد . تعلق فوق مجاري الماء خاصة بعد الطهر ||  
اساريها تميش في المياه الجارية ملصوقة بجلياب مخروطية  
منعقة كمنه الحسام || اشهر اجناسها :

### ٢٤٥٤٠ - ليثون \* (S).

*Lepton* (S).  
البات نطشة تحية تظهر في الجبلية عتسا تكون في ازل  
طور المبرزة .

### ٢٤٥٤١ - ليثونة \* (S).

*Lepton* (S).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات سفنجيات الحاشيم  
وفصيلة اليرسويات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في  
مسطح بحار العالم || جميعها صغير القد طول من ١ الى  
٢ م . اصداؤها شبه بيضية الشوزن ، وريقة الصفعة  
قليلة الاحدياب . يملوها ريس في الشكل || تميش  
لاصقة بالصخور . ليفها غزير المادة .

الخارجي رقة حنطية تركب البار فصلب البشرة المنحارة  
وتشيب البار دون ان تنطبا || يكافح باستمال سائل  
يوردو الخفف او السائل السفلوكليسي .

### ٢٤٥٣٠ - ليثورة \* (F).

*Leptura* (S).  
جنس حشرات من فصيلة القرنيبات . انواعها عديدة ،  
جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الجراميز والازباني ، زاهية  
الالوان السوية او المزركشة . تركب ازهارا مختلف  
النباتات اغصانها المشبية || رقاتها همة تميش تحت لحاء  
المذود والاعصان الصلقة وقد تسردب الشجير || اشهر  
انواعها ما يتبع .

### ٢٤٥٣١ - ليثورة ذهنية \* (S).

*Leptura fulva* (S).  
نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٥ الى ١٤ م .  
رأسها ويوشها وجسمها سود . معداها الى الصفرة الذهبية .  
تميش على ازهار المركبات والخبليات . تكثرو في المروج  
الخارجي من حزيران الى ايلول .

### ٢٤٥٣٢ - ليثورة سداسية التجديع \* (S).

*Leptura sexguttata* (S).  
نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ٩ الى ١٥ م .  
نوبها اسود اللون . معداها سداسية التجديع الاصفر .  
تميش على ازهار الخبليات . يكثرو وجودها في حزيران .

### ٢٤٥٣٣ - ليثورة سيدانية \* (S).

*Leptura cordigera* (S).  
نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٤ الى ١٦ م .  
رأسها ويقدم جوشها وحجفتها بسد الزام الاول من  
الكرزية يملوها عتد ملتقما بسد الزام الاول من  
القاعدة بقعة سوداء مستطيلة سدانية الشكل تمتد حتى  
طرف التمدين || تميش على ازهار الشوك والارض شيوك .  
يكثرو وجودها من حزيران الى ايلول .

### ٢٤٥٣٤ - ليثورة فسقية \* (S).

*Leptura virens* (S).  
نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٥ الى ٢٠ م .  
نوبها الى السرة يملوها خل دقيق كثيف اصفر اللون  
اغصن المروج . تكثرو في احراج الصنوبر . رقاتها همة  
تسردب قشور وشجير الاغصان اليابسة والمطلوعة .

### ٢٤٥٣٥ - ليثورة مضسبة \* (S).

*Leptura bifasciata* (S).  
حشرة واظمة خاضعة من فصيلة القرنيبات ورثة سمعات  
الاجنحة . تألف الهضاب والبراري . غناصها تميش على  
بتلوات الازهار . رقاتها خاضعة ناهمة تركب لحاء الاشجار  
الغنية وسوق النباتات الحرجية خلفها وتسردبها وتعلبها ||  
جسمها صغير القد يطول من ٧ الى ١٠ م . نوبها ثنائي  
اللون ، رأسها وكوسلها وزبانها وبرامها الى السواد  
العايق اللامع ، بطنا وظهورها الى البني الاسمر الملمح  
يملوه في التمدين تمصيب اسود . رأسها صغير الجرم .  
عينها كيرتان حشرتان . زبانا دقيقان ، مستطيلان .  
ظهورها فارغ المظهر لا يلحف السمكة الشرجية . معداها  
متتابعة التسريز القاطب . اسياها رباعية المقل الظاهرة ||  
لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملولة في اوائل  
حزيران وتمش حتى اخر ايلول . تسرح في النبار .  
تسافد بعد ظهورها باربعة اسابيع . ترو المكان في لحاء



لبيد



لبيد



لبيد الجبل



لبرة الحمص



لبرة الزيتون



لبرة الكرز

٢٤٥٤٢ - لبيد (S). *Leptodes brevipennis* (S).  
Leptide (F).

حشرة نصفية الخمد من فصيلة القترنيات. اصطناع اليلد المحتلة الحرارة من العالم القديم || طولها يراوح من ٤ الى ٦ سم. ثوبها الى السرة الحطية الشبهاء. زباني ذكورها مستطيلة تلحف كامل الجسم. زباني انثاهما قصيرة تبلغ طرف الاغداد || قوتها جميع المواد العضوية واعضاها الاغشاب الية التي تنخرها وتغريها وتغني عليها.

٢٤٥٤٣ - لبيد (S). *Leptinus* (S).  
Leptine (F). *Leptinus* (S).

جنس حشرات من فصيلة البتيتيات وربة غديات الاجنحة انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صفراء ، بيضيه اللون ، طولها من ٢ الى ٣ سم. رؤوسها قصيرة ، مستعرضة. حشرتها طامسة. تأثيرها وتكونها وملاصها صفيرة. قوتها الاستشعارية غيطة ، مستطيلة. كولاسها مستعرضة و خلية القشار. اغدادها لاحفة يملوها خل قصير. قوتها نشطة. انثاهما الى السرة المختلفة المناجات، يكثر فيها الاصفر || تتغلف على مختلف انواع القوام. تعيش على التوفعات التي يفرزها الجلد.

٢٤٥٤٤ - لبيد (S). *Leptinidae* (S).  
Leptinidae (F). *Leptinidae* (E).

فصيلة حشرات جلدية من غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صفيرة ، مبطلة ، شبه بيضية اللون ، طولها من ٢ الى ٤ سم. رؤوسها قصيرة ، مستعرضة. حشرتها طامسة. تأثيرها وتكونها قياسية. قوتها الاستشعارية صولطانية. كولاسها واغدادها خلية القشار. اغدادها متباينة الشكل ، وبعضها يملف كامل البطن والبيض الاخر نصفه. اوساها وراية العقل. انثاهما عادمة الشقاق || تعيش على فراء القوام الحية. قوتها التوفعات التي يفرزها الجلد || اشهر اجناسها البتيت.

٢٤٥٤٥ - لبيد (S). *Leptinus aquaticus* (F).  
Water dock, Water sorrel (E). *Wasseramper* (D).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة البطاطيات. يكثر في المناطق وعل بجاري الماء. جذوره درية ، ساقه فراءه تلون من ٤٥ الى ١٠٠ سم. اوراقه منقطة اعليانية مستطيلة ؛ نسلها ياهت الخفسار البحري ، متمتع الصفة.

٢٤٥٤٦ - لبيد (F). *Lebbek* (F).

جاء وصفه في البيز يا اللينج ، واجمعها.

٢٤٥٤٧ - لبيد (S). *Cocculus lebeba* (S).  
Coqueule glabre (F).

نوع من الكوكوس من فصيلة القترنيات. وهو نبات عشبي طوي بري معمر. ساقه فراءه. فروعوه ردة متدلية. اوراقه منقطة متعاقبة بيضيه صفيرة القد. نسلها مالم البيرة على صفحتيه || وهو يستعمل في عدة مستحضرات طبية منها علاجات الحيات والبرقان والزئفة والكد ...

٢٤٥٤٨ - لبيد (S). *Cataplasme, Charge* (F). *Cataplasme, Poultice* (E).

مستحضر قالح يوضع على مكان الألم من الجسم.

٢٤٥٤٩ - لبيد (S). *Aborigène* (F). *Aboriginal* (E).

هو الاصلي من ثوبت البلاد او عظمها اي حيواناتها.

٢٤٥٥١ - لبيد (S). *Lepidurus* (S).

دوبية من القشريات خيشويات الاطراف تعيش في المياه القلدية اينما تكاثرت الاغشاب || جسمها صغير القد ، مبسط الشكل ، يملوه خاف بجني يلفظ الظهر. زباناها شديدا القصر. قوتها الصدرية كثيرة العدد.

٢٤٥٥٣ - لبيد (F). *Tomenteux* (F).  
Tomenteux, Downy (E).

نمت تمرني يوصف به كل عضو نباتي خله مستطيل وكثيف كالوبر.

٢٤٥٥٤ - لبيد (S). *Cylindrosporium* (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفريجات. انواعها قليلة العدد والذى || كئناها غروبية الشكل تشأ منفردة ثم تتجمع. بويناته مستطيلة وقد تكون غيطة منقطة ، مولدة الاطراف || اشهر انواعها ما يتبع.

٢٤٥٥٥ - لبيد (S). *Cylindrosporium pisal* (S).

فطر مجهرى يصيب الحبوب وسوقه واوراقه ونباتيه. مظهره الخارجي يقع صفر او رمادية اللون، مقرنة الزوايا، تركب السوق ثم الاوراق والحنايل قسب الجفاف واليباس.

٢٤٥٥٦ - لبيد (S). *Cylindrosporium platanoideis* (S).

فطر مجهرى تركب اوراق الدلب والقيقب. مظهره الخارجي ينور صفيرة كثيفة شقراء اللون ، تركب النصل بكامله قسب الذبول والاعبال.

٢٤٥٥٧ - لبيد (S). *Cylindrosporium olivae* (S). *Cylindrosporiose des olives, Lebbra des olives* (F).

فطر مجهرى يصيب النار يقيعي عليها بعد ان يحسها ويحطها. مظهره الخارجي يقع فسيحة مستديرة او بيضية الشكل ، تبو في ثشرين ، تركب الاذن ثم تمتد الى النار ، تظهر بنفسية اللون ثم تتصرف الى السرة الباهتة قسب يباس اللب بعد تمجيحه وتشقيقه || تقلبات الحرارة الجدية وارتفاعها بعض الايام ينشط هذا الوص. يكلف باستهلاك الاملاح الحساسة الخفيفة.

٢٤٥٥٨ - لبيد (S). *Cylindrosporium padi* (S).

فطر مجهرى يصيب ويصلب اوراق الكرز || مظهره الخارجي يقع صفيرة مستديرة او مقرنة الزوايا ، قشرها من ٢ الى ٣ سم. لونها الى الصفية الزاوية ، وتوسلها نقطة يضاء ، تركب النصل قسب يباس واخحات النسيج المتحارة || يكلف باستهلاك السوائل السلفوكسية بعد تخفيفها نحو ٥٠٪ وعملها ٠,٩٪ من سلفات الحديد.

ظهورها مستدير المؤخر القارعة اللاحظ . عندئذ متتابعات التنقيط الخفيف . أوساغها رباعية المقل الظاهرة || لها جبل واحد في الخيل . تظهر الحشرة الجلجلة في أواخر نيسان وتعيش حتى أواخر حزيران . تخرج في الليل وتضاف بعد ظهورها بنحو ثلاثة أسابيع . تمتع المكن وزناً تلتفها مادة خروية على نصال الأوراق ولها اللون والتفصيص || البرقة عند بلوغها الإدراك تظل نحو ٧ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، قليل التقويس ، سداسي الزواجب ، سحلي اللون ، اسمر المولج ، أسود الرأس . ويدلو الجسم ثلاثة خطوط قاعية حاجية وعلب دقيق اشهب اللون || طول الاكمال الذي يستمر نحو أربعة أسابيع ينتهي في البرقة تحت الجلجلة والبلبل .



لَبَرَسُ الْوَزَل

Labeobarbus (S).

٢٤٥٦٦ - لَبَرَس

Labeobarbe (F).

جنس اسمك نهرية من مفتوحات الخانة وفصيلة البليوطيات . أنواعه المعروفة ثلاثة ، اثنان يعيشان في أنهر الهند واثنان وواحد يعيش في النيل || اجسامها شبه اهليلجية ، قليلة التبطيط ، تطول من ١٠ الى ٧٥ سم . رؤوسها مستدلة الجرم . صيها جاحظة . اشداقها كبيرة ، خمسية المذبات الصغيرة . زعانفها الظهرية فردية ، شراعية الشكل . زعانفها الذيلية قارعة . اوتابها الى الخصار البحري . زعانفها الى الخصار الاصفر || لحويها متوسطة الصنف ، مأكولة || اما انواعها الثلاثة فهي :

Labeobarbus nagdia (S).

لَبَرَسُ النِيل \*

Labeobarbus Jungha (S).

لَبَرَسُ اصَام

Labeobarbus macrolepis (S).

لَبَرَسُ كَشِير

Labrelia (S).

٢٤٥٦٧ - لَبَرِيلَا

جنس نباتات مجهرية من فصيلة المذكيات ، انواعه قليلة لا موزية . بكتباته مستديرة ، سواد اللون ، فريسية الانفلاق . بوياثها مستطيلة او وشية او كروية الشكل ، شفافة .

Sanve (F).

٢٤٥٦٨ - لَبَسَان

هو الخردل البري او خردل الحقل ويدعى الحرشاء . وقد يصير من الاغشاب الضارة نياً لو كثر في الزرع . ابادته تتر بامتثال احد الموشيب القاتلة الكثيرة الوجود في هذا البحر .

Lampsane commune (F).

٢٤٥٦٩ - لَبَسَانَة

هي الخفج ، اطلية .

Prallnag (F).

٢٤٥٧٠ - لَبَسَة

علية زراعية تتقدم فريس الصوب . قوامها تنقيص جنود الاغراس بروة مألومة من الماء والين ويضيق القبر وذلك لتفطية الجذور وجرحها بنشأ نائم واك لا يتخلل من التناء يساعد على مقاومة عوامل البيئة الجديدة ويحفزها ويحميها على اثنائ الجذرات الخيطية وما يتبعها من عدة اختصاص التناء ، اود الحياة والنشوء .

Lobostemon (S).

٢٤٥٧١ - لَبَسْتَمُون

Lobostemone (F). Lobostemon (E).

جنس جنبات برية وتزيينية معمرة من فصيلة الخمسيات . سويها منتصبه فراء تعلق من ٧٠ الى ١٥٠ سم . اوراثها

٢٤٥٦٩ - لَبَرَةُ المِيوزُويس \*

Cylindrosporium myosotidis (S).

فطر مجهرى يركب نصل اوراق الميزوتيس || مظهره الخارجي يقع نسبة مستطيلة ، طولها نحو ١٠ م . لونها الى السرة ، اطرافها اصفر الخصب ، اشقر المولج . تسب اللبلول واللاجاب .

Lapeyrousia (S).

٢٤٥٦٩ - لَبَرُوزِيَّة

Lapeyrousie (F).

جنس نباتات دوفسية من فصيلة السوسنيات . انواصها كثيرة العدد معظمها بري وبعضها تزييني . مهدا البلاد الافريقية . جميعها صيطرة اللد وصيدة السال الشراعية . اوراثها مردوبة التصيف . ازهارها سنبلية التجميع . اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٤٥٦٩ - لَبَرُوزِيَّةُ اَسَلِيَّةُ الْوَزَل

Lapeyrousia Juncea (S). Lapeyrousie à feuilles Jonciformes (F).

نوع من اللبروزيه . اوراثها اسلية الشكل ، مستطيلة النصل المهدب الخشار . شراخها الزهري يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها متوسطة القد ، كثيرة العدد ، وردية اللون || تنورها يستمر طوال شهر ايار .

٢٤٥٦٢ - لَبَرُوزِيَّةُ عَذِيَّة

Lapeyrousia corymbosa (S). Lapeyrousie en corymbe (F).

نوع من اللبروزيه ، شراخها يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . ازهارها مغلي الشكل وهو بذلك يشد عن سائر انواع الجنس . ازهارها الى البرقة الزاوية تنصتها نجمة بيشاء اللون بنفسجية الخشار . تنورها يستمر نحو ٣ اشهر ايتداء من شهر ايار .

٢٤٥٦٣ - لَبَرُوزِيَّةُ كَبِيرَةُ الزَهَر

Lapeyrousia grandiflora (S). Lapeyrousie à grandes fleurs (F).

نوع من اللبروزيه ، اوراثها غنية الازتكاز . شراخها يعلو نحو ٣٠ سم . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها ارجوانية ، زاهية ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم . تنورها يستمر طوال شهر تشرين الاول .

٢٤٥٦٤ - لَبَرُوزِيَّةُ مَبْطَّطَةُ السَّاقِ

Lapeyrousia anceps (S). Lapeyrousie à tige aplatie (F).

نوع من اللبروزيه ، شراخها مسطو الجسم ، ثنائي الزوايا ، يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها بنفسجية اللون . تنورها يستمر طوال شهر ايلول .

٢٤٥٦٥ - لَبَرُوسُ الْوَزَل \*

Luperus circumfusus (S). Lupère des genêts (F). Luperus circumfusus (E).

حشرة شاحسة من فصيلة التنصاريات ورتبة مغذات الاجنحة . تألف البرير والبراري والاحراج . شخافها ويرقاتها تعيش على نباتات القرنيات الفرائشة واعصها النوزال || جسمها صغير اللد يطول من ٣ الى ٤ م . ثوبها الى الصفرة الصفاء المولج يطوقها في الكويل والنفدين حشار اسود . رأسها مستدل الجرم . عينها صغيرتان . زباناها خيطيان . غطها مخروطي . فكها ذريان .



لَبَرَسُ النِيل

Elops congicus (S). - **لَبْسُ حَنْطِي\*** ٢٤٥٧٩

Elops brun (F).

نوع من اللبس. أعطانه تمتد من مصب النيل الى الجزائر والمغرب. جسمه متوسط القد النسبي، يطول نحو ٧٠ سم. ثوبه الى الريدة الخفيفة المواجه يعقب في الظهر ويبيض في البطن || لحمه متوسط الصنف، مأكول.

Elopidas (S).

**لَبْسِيَات** ٢٤٥٨٠

Elopidas (F).

فصيلة اسماك بحرية من العظمايات مفصولة السمات. اجناسها وانواعها المرفوعة قليلة العدد. اعطائها بحار البلاد الحارة. مسرحها الاغواط والتفاف والمجادح وبعض انواعها تدخل الاعوار والانهار || اجسامها اهليجية الشكل تطول، بالنسبة الى الانواع من ٣٠ الى ٢٠٠ سم. رؤوسها مخروطية كبيرة الاشدق تتميز بيسود نصل عظمي المادة يتوسط الفك السفلي ويرتكز على جانبيه. ظهورها شبه مسطحة. بطونها محدبة. زعانفها الظهرية مقترنة. زعانفها الذيلية غارقة || اشهر اجناسها واعرفها اللبس والسجاس.

Leptosomus (S).

**لَبْسُوس\*** ٢٤٥٨١

Courol, C. bicolora (F).

طائر وسيد الجنس والنوع من فصيلة القيقويات. اعطانه فصحة تمتد من تمام البحر الاحمر الى الحيشة وبمغسكر وبعض مناطق افريقية الجنوبية || الذكر اصفر قدماً من الانثى، طوله نحو ٥٠ سم. ثوبه متباين الالوان. ظهره مع جناحيه وذنبه الى الخضر النعاسي المواجه. يعلو الى الصبغة البهراء. رأسه الى الصبغة الخفيفة تملوها قننوسه سمراء. زنده كمرف الذيك ثنائي الاكتساب || الانثى تطول نحو ٥٥ سم. ثوبها الى الريدة الخفيفة تملوها نمشة صناعية النعم سمراء الخضر. وثوبها هذا يعقب في الرأس والظهر والذنب ويعقب في المق والصدر والبطن والافنك || يألف الغابات والادغال. قوته التار والحشرات اعصها الجراد والجنادب والزيزان || يدق عشه في الاجحار المتراكبة الاغصان والاقتان. الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحفظها بمناوبة الذكر نحو ٢٤ يوماً.

Convolvulus (S).

**كِلَاب** ٢٤٥٨٢

Lisaron (F). Convolvulus (E).

جنس قياتات برية وزراعية من فصيلة اللبلايات. انواعها ١٥٠ اعطائها المناطق الحارة والمتعدلة معتدلة برية وبمضا طيب وزيني || احرف انواعها واشهرها مايلي.

٢٤٥٨٣ - **كِلَابِ اُرُضِي** هو الكفة الماددة، اطلبها.

٢٤٥٨٤ - **كِلَابِ اُخْقُول\*** ، كِلَابِ صَغِير ، طَرِيُوشُ الْغُرَابِ

Convolvulus arvensis (S). Lisaron des champs, Petit Lisaron, Liset, Vrillet (F). Corn bind, Corn lily, Lesser bindweed, Bearbine (E). Ackerwinde, Winde (D). Convolvolo arvensis, Erba leprina, Vitechio (I). نوع من اللبلايات المبذول، يكثر في الحقول وبين الزروع فيصبح من النباتات الضارة. ساقه مفصولة مزخرفة تطول من ٢٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه رقيقة مجتمعة. ازهاره وردية اللون او بيضاء، قطرها يراوح من ٣ الى ٣ سم. || ازهاره يستمر من ايار الى تشرين.

لاطنة، متعاقبة، كاملة. ازهارها مختلفة الالوان منها الازرق والوردي والبنفسجي والاحمر || انواعها المرفوعة قليلة العدد، اشهرها التالية.

٢٤٥٧٢ - **لَبْسَمُونْ أُنَيْق\***

Lobostemon formosus (S).

Lobostémone élégant (F).

نوع من اللبسمون. ساقها تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. افتادها مزخرفة الجماء. اوراقها سنانية الشكل. نصلها خلية الصفحات العليا، مسنة الحار. ازهارها وردية اللون متدلية. قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٤٥٧٣ - **لَبْسَمُونْ بِحَرِّي الْوَرَق\***

Lobostemon glaucophyllum (S).

Lobostémone à feuilles glauques (F).

نوع من اللبسمون. ساقها قزما تملو نحو ٧٠ سم. اوراقها بحرية الخضار، خشنة الحار. ازهارها معتدلة الحجم، بنفسجية اللون، فاشرة الاسدية || تنويرها يستمر من ايار الى تموز.

٢٤٥٧٤ - **لَبْسَمُونْ فِيْ\***

Lobostemon argenteum (S).

Lobostémone argenté (F).

نوع من اللبسمون. ساقها تملو نحو ١٠٠ سم. افتادها زباد الجماء. اوراقها كاملة سنانية الشكل، نصلها مزخرفة على الصفحتين، زغبيا نقي اللون. ازهارها معتدلة القد، قطرها نحو ٣ سم. لونها الى الزرقعة الجميلة || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز.

Radier en béton (F).

**لَبْسَة** ٢٤٥٧٥

Concrete bed (E).

ناعم لاسف، شائع الاستعمال في البناء الباطوني.

Elops (S).

**لَبْسُ** ٢٤٥٧٦

Elops (F). Elops (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة البسميات. انواعها المرفوعة خمسة. اعطائها مطر بحار البلاد الحارة والمتعدلة الحرارة || جميعها اهليجية الشكل، شفاء الطلع، مسطحة الظهر، محدبة البطن. جامدة الحراشف الخبائية الاحجام. اثنائها متراكبة الالوان تكثر فيها الريدة الرصاصية التي تدق في الظهر وتعبير او تبيض في البطن || احرف انواعها واشهرها، الثلاثة التالية:

Elops saurus (S).

**لَبْسُ اصْغَم\*** ٢٤٥٧٧

Elops saurien (F).

نوع من اللبس. اعطانه البحر الاحمر والخليج العربي. جسمه كبير القد يطول نحو ١٢٠ سم. ثوبه الى الصبغة || لحمه متوسط الصنف، مأكول.

Elops lacerta (S).

**لَبْسُ حِرْدَوْتِي\*** ٢٤٥٧٨

Elops lézard (F).

نوع من اللبس. اعطانه الشواطئ الافريقية المعتدلة من المغرب الى الانكلا. جسمه كبير القد يطول نحو ١٥٠ سم. ثوبه الى الريدة الرصاصية || لحمه متوسط الصنف، مأكول.



لبس حنطي



لبسوس



لبلاب الحقول

رطة خلية البشرة القلبية الموج. ازهاره ثلاثية التجميع، زرق اختار، حر القاطعة، صفر الاسدية || ازهاره يستمر من تموز الى تشرين.

#### ٢٤٥٩٣ - تيلاب ياباني، تيلاب اژغاب

*Convolvulus japonicus, Calystegia pubescens (S). Liseron pubescent (F).*

نوع من اليلاب الممر. ساقه: باه عارضة تطول من مترين الى اربعة امتار. اوراته خلية النصل، صغيرة القد، قصيرة الاختاق. ازهاره كبيرة الحجم، مستطيلة المالحق، بيضيه التفاهات || حراء اللون || ازهاره يستمر من ايار الى ايلول.



ليلاب السجالات

#### ٢٤٥٩٤ - تيلابي

*Hédérac (F). Hederaceae (E).* تمت تسميته وصي يطلق على السوك المنطقة التي تشبه اليلاب.

#### ٢٤٥٩٥ - تيلابيات، عجمديات، سقمونيات

*Convolvulaceae (S). Convolvulacées (F). Convolvulaceae (E).*

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدات القناعة. اجناسها وانواعها عديدة. جميع نباتاتها مفاداة او مستطيلة. سورها غزيرة المعصرة اللينة. اوراتها متناوبة مفرغة. ازهارها كبيرة القد لا قياسية التجميع والارتكاز. ثمارها حقبة تنفلق عن مصرامين او اربعة مصاربع. مصاربعها لا قياسية الاخوية التي يراوح صدها من ١ الى ٤ وكل غيباء يحسن حية او حيتان قشارها جاهد المادة || اشهر نباتاتها السقمونيا والبطاطا الحلوة والجلاب والتريد.

#### ٢٤٥٩٦ - تيلابية

*Cissolde (F).* اسم يطلق على منمن خاص من المعادلة الثلاثية.

#### ٢٤٥٩٧ - لابين، لابين، لابين

*Torchis (F). Cob, Loam (E).* المضروب من اللبن لبناء مبرداً كان او مستطيل. واحدته لينة او لينة.

#### ٢٤٥٩٨ - لبن

*Lait (F).* هو الحليب، الحليب. واللبن بالعرف اللبناني هو الحليب الرائب.

#### ٢٤٥٩٩ - لبن زالب، لبن مروب

*Lait caillé, Yoghurt, Yahourt (F). Curdled milk, Yaourt (E).*

هو الحليب غثر بالروبة فراب واستبانة سواضه.

#### ٢٤٦٠٠ - لبنات، لبنات، لبنات

*Lactate* هي ملح الحامض اللبن.

#### ٢٤٦٠١ - لبنكار، لبنكار

*Lactase* خيرة تحول اللبنز الى غلوكوز وفلاكتوز.

#### ٢٤٦٠٢ - لبنك

هي اللبن الرائب المقطوع الذي نضج صله.

#### ٢٤٦٠٣ - لبنكوز، لبنكوز

*Lactose* هو سكر اللبن. يشبه السكر البادي لكنه اقل حلابة، يذوب في اللبن والماء ولا يذوب في الكحول.

#### ٢٤٦٠٤ - لبنسني

هي الاصطرك، الحليب.



ليلاب نفسي

#### ٢٤٥٨٥ - تيلاب السجالات

*Convolvulus sepium, Calystegia sepium (S). Liseron des haies, Grand liseron (F). Hooded bindweed (E).*

نوع من اليلاب الممر المائل ساقه تطول نحو ٥ امتار. اوراته كبيرة القد مثلبة الزوايا مستطيلة الاختاق. ازهاره كبيرة الحجم، بيضاء اللون، وردية المالحق || ازهاره يستمر من سبتمبر الى تشرين.

#### ٢٤٥٨٦ - تيلاب التجوس

هو الفريونيكاف اخضرية، الحليب.

#### ٢٤٥٨٧ - تيلاب زيتوني الورق

*Convolvulus oleaceifolius (S). Liseron à feuilles d'olivier (F).*

نوع من اليلاب الممر. ساقه غشوشة منتصبه تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراته زيتونية الشكل، ازهاره نورية التجميع، صغيرة الحجم، وردية اللون || ازهاره يستمر طوال الصيف.

#### ٢٤٥٨٨ - تيلاب فصي، تيلاب خبيزي

#### الورق، حشيشة مهبولة

*Convolvulus altheoides (S). Liseron à feuilles de guimauve, Volubilis (F). Mallow bindweed (E). Kleine Kornwinde (D). Convolvolo argentino (I).*

نوع من اليلاب البري المائل. ساقه فرعاء زياء تطول نحو ١٠٠ سم. اوراته خبيزية الشكل مفصصة، نصلها خلي البشرة على صفحتيه. ازهاره كبيرة القد، ليلكية اللون، بيضيه الفص، جذوره درنية طيبة عديدة المنافع || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران.

#### ٢٤٥٨٩ - تيلاب مثلث الاثونان

هو شب النبار، الحليب.

#### ٢٤٥٩٠ - تيلاب مصري، لوبياء تيلابية

*Dolichos lablab, Lablab vulgaris (S). Dolique d'Egypte, Dolique lablab (F). Egyptian kidney bean, Hyacinth bean, Lablab (E). Agyptische Fasel, Gemeine Lablab (D). Dolico Egiziano, Fagiololo d'Egitto (I).*

نبات زراعي حولي من فصيلة القرنيات. ساقه صفراء عارضة. اوراته مركبة ثلاثية الوريقات البيضية القزبة. ازهاره عطرية الرائحة، صندوقية التجميع، بنسجية اللون ومنها الابرجولية والمونجة بالابيض. ثماره قرون مفطحة، سينية، مقومة. بزورها بيضيه مبطة بنسجية اللون او جلوية ناز ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

#### ٢٤٥٩١ - تيلاب مفضف

*Convolvulus cneorum (S). Liseron-camélée, Liseron argenté (F). Silvered bindweed (E).*

نوع من اليلاب الممر. ساقه غشوشة منتصبه تملو من ٧٠ الى ١٢٠ سم. اوراته ابيدة نصلها سنائي الشكل، ملحق الطرف، خلي البشرة على صفحتيه، بحري اللون، فصي المالحق. ازهاره مفككية التجميع، صغيرة القد، بيضاء اللون، وردية التوشيح || ازهاره يستمر طوال فصل الصيف.

#### ٢٤٥٩٢ - تيلاب موريتانية

*Convolvulus mauritanicus (S). Liseron de Mauritanie (F).*

نوع من اليلاب الممر وهو جنية ليفية غشوشة. ساقها قصيرة، فروصها دقيقة مفاداة، تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراتها بيضيه الشكل قصيرة الاختاق. نصلها

بمد متحه بضمة اباهم من رقات ذرية تنوجه فوراً نحو الصفحات العليا من الاوراق وتقيم في اخاديد العروق حيث يتوفر لها امتصاص الغذاء . ثم تتحول تدريجياً الى لبوة تسرح على التماسك والافغان والغصان والسوق .

### ٢٤٦١٤ - لبوة فلوريده

*Ceroplastes floridensis* (S). *Céroplaste de Floride* (F). حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها الاصل فلوريده وقد انتشرت في جميع الاقصاع الحارة . موطنها عديدة اصغها النار والكافور . طولها يراوح من ٣ الى ٤ مم . وعرضها من ٢ الى ٣ . ظهرها مخدوب الشكل مقمل التنوء . فوها الى الليافس الاخير ، جيلها الحولي واحد . نقت مكنها فيم في اواخر حزيران . تركيب الاوراق على صفحتها العليا وقد تركيب الافغان والسوق . تكاثرها بالزيت الشفوي .

٢٤٦١٥ - لبون ، لبنة ، لبنكة ، لبنك (F). *Laitière* (F). *Milch* (E). صفة الانثى الحلوب .

٢٤٦١٦ - لبونات (F). *Mammifères* (F). *Mammiferous*, *Mammalia* (E). هي الحيوانات اللبونة المعروفة باللدنيات . واحدها لبون .

٢٤٦١٧ - لبنيان (F). *Lapiaz* هو السري دبار طبيعي لا يقاسي العمق والاتساع يخند سطح النشور الجصي .

٢٤٦١٨ - لبنة (F). *Lebia* (S). *Lebie* (F). *Lebia* (E). جنس حشرات قانصة من فصيلة الليبيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة كثيرة البدن منتشرة في معظم اقطار واقالم العالم || اجسامها صغيرة ، مبطلة ، تطول من ٥ الى ٨ مم . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية خيطية . قشورها وتكونها ولباسها نفاثة . كاسلها صغيرة ، منحصرة . بطونها مفلطحة ، مستعرضة . اعادها قساعية الاخاديد النفاطة . قوائمها خيطية . ألوانها متباينة الالوان الزاهرة ، تكثر . فيها الزفرعة || الحشرة الجلدة قانصة والبرقة ايضاً .

٢٤٦١٩ - لبنة (F). *Lippia* (F). هي اللوزة ، نبات من فصيلة وهي الحام ، اطليا .

٢٤٦٢٠ - لبنة الميس (F). *Libythea celeis* (S). *Libythée du micocoutier* (F). *Libythea calcis* (E). حشرة من فصيلة النشائيات ورتبة حرشليات الاجنحة . موطنها معظم الاقاليم الحارة المنعزعة نحو المعتدلة . فرائها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها تميش على اوراق الانجيريوات ونسبا الميس || جسمها مردني الشكل يطول نحو ١٧ مم . بسطها نحو ٤٦ مم . رأسها صغير الجرم . عيناها كيرتان . زبابانا صولجانيان . جوشها ولبها الى الجوزي الاضخم المراج || درواشها عنه الشقين اوراق الجوزي الخنطي المراج يملو في الزوج الامامي تجذيع الكلف وبقتان عاجيتان وخس نقط بيض وسط حشاري افر . ويعلو في الزوج الخلفي جده قاطبة حاجية وسط حطبي بين الجدة والظرف || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في اواخر تموز . تسرح في النهار . تعامل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع ويمنح المكان مهادياً على الصفحات

٢٤٦٢٠ - لبنة (F). *Lactée* (F). *Lacteous* (E). ما كان يشبه الحليب او كان تركيبه كالحليب .

٢٤٦٢١ - لبنة (F). *Libitina* (S). *Libitine* (F). *Libitina* (E). اطلب لكثاريوس .

٢٤٦٢٢ - لبون (F). *Fécule* (F). *Faecula* (E). هو نشا البطاطا خاصة والنشا المستخرج من سائر المسائل النشوية المادة .

٢٤٦٢٣ - لبون (F). *Libitina* (S). *Libitine* (F). *Libitina* (E). جنس حيوانات بحرية من فصيلة الطيريات ورتبة الرغويات صفحيات الهياض والاريل . انواعها المعروفة عديدة اصطناعها بحار البلاد الحارة من العالم القديم . يكثر وجودها في البحر الاحمر والمحيط الهندي || اصنافها شبه كلوية الشكل ، معتدلة الجسم ، متساوية الصاري . مباحها صغيرة ، طليقة ، ثنائية || تعيش لاصقة بالصخور المشعرة الثقيلة المم . لحيها مأكولة متوسطة الصنف .

٢٤٦٢٤ - لبنة ، لبنة ، لبنة (F). *Lionne* (F). *She lion* (E). انثى الاسد ، ويقال لها العرس ايضاً .

٢٤٦٢٥ - لبنة التين ، شمعية التين (F). *Ceroplastes rusci*, *C. nerii* (S). *Céroplaste du figuier* (F). حشرة من القرمزيات ، موطنها حوض البحر المتوسط . تركيب التين والاس . جسمها كروي الشكل ، اسمر اللون ، قطرها يراوح من ٣ الى ٤ مم . قرنها الشمعي جامد التند الخشن الشكل ، ثنائي الصعائف الطويلة . سمها اربد اللون ينسحب المراج . ذكورها بمنحة تطول نحو ٢ مم . ثوبها الى الجوزة . رواشها حاجية اللون مهدية الخمار .

٢٤٦٢٦ - لبنة الحشيشات (F). *Coccus hesperidum*, *Lecanium hesperidum*, *Lecanium tessellatum* (S). *Pou des hespérides*, *Cochenille plate de l'oranger* (F). حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها جميع مناطق الحشيشات . طولها يراوح من ٢ الى ٣ مم . وعرضها من ٢ الى ٣ . وهي بيضية الشكل مفلطحة . طليها الخماري عادم الصلابة . قرونها الاستشعارية ثمانية المواصل . ثوبها يختلف باختلاف عمرها يلبس في البني والاسمر || تركيب جميع الحشيشات وقد تنفصل الاوراق ومن الاوراق اخاديد العروق لا فارق بين الصفحة العليا والسفل || تكاثرها باستمال الزيت البياض او الزيت النباتية المركزة من ١ الى ٢ ٪ .

٢٤٦٢٧ - لبنة الزيتون (F). *Libythea celeis* (S). *Libythée du micocoutier* (F). *Libythea calcis* (E). حشرة من فصيلة النشائيات ورتبة حرشليات الاجنحة . موطنها معظم الاقاليم الحارة المنعزعة نحو المعتدلة . فرائها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها تميش على اوراق الانجيريوات ونسبا الميس || جسمها مردني الشكل يطول نحو ١٧ مم . بسطها نحو ٤٦ مم . رأسها صغير الجرم . عيناها كيرتان . زبابانا صولجانيان . جوشها ولبها الى الجوزي الاضخم المراج || درواشها عنه الشقين اوراق الجوزي الخنطي المراج يملو في الزوج الامامي تجذيع الكلف وبقتان عاجيتان وخس نقط بيض وسط حشاري افر . ويعلو في الزوج الخلفي جده قاطبة حاجية وسط حطبي بين الجدة والظرف || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في اواخر تموز . تسرح في النهار . تعامل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع ويمنح المكان مهادياً على الصفحات

٢٤٦٢٨ - لبنة (F). *Lippia* (F). هي اللوزة ، نبات من فصيلة وهي الحام ، اطليا .

٢٤٦٢٩ - لبنة (F). *Lippia* (F). هي اللوزة ، نبات من فصيلة وهي الحام ، اطليا .

٢٤٦٣٠ - لبنة (F). *Lippia* (F). هي اللوزة ، نبات من فصيلة وهي الحام ، اطليا .

٢٤٦٣١ - لبنة (F). *Lippia* (F). هي اللوزة ، نبات من فصيلة وهي الحام ، اطليا .



لبوة التين



لبوة الحشيشات



لبوة صينية



لبنة



ليس النيل



لين المروج لين الهضاب



لين مستعرض الورق



ليوت ربيع

ليوت ريث



ليوت ريث

تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. اوراقه خضراء ثلاثية أو خاسية التجميع. نصلها رعي الشكل ثلاثي المرقع، ازهاره كبيرة القذ، كثيرة العدد، لونها الى الزرقة الزاهية. ازهاره يستمر من ايار الى ايلول.

#### ٢٤٦٣١ - **لَبِيْنُ حَرِيْف** (*Anagallis tenella* (S).

Mouron mignon (F).

نوع من اللبين البري المعمر، يكثر في المناطق، ساقه منتبسة تطول نحو ١٠ سم. اوراقه متعقبة متقابلة، نصلها مستدير الشكل صغير القذ. ازهاره ودية اللون، مستطيلة الممايق النسيطة. ازهاره يستمر من ايار الى ايلول.

#### ٢٤٦٣٢ - **لَبِيْنُ مُسْتَعْرِضِ الْوَرَقِ** \*

*Anagallis latifolia* (S). Mouron à larges feuilles (F).

نوع من اللبين المعمر يزرع كمحلي. ساقه منتبسة تملو نحو ٣٠ سم. اوراقه متعقبة متقابلة بيضيه. نصلها يطول نحو ١٠ سم. ازهاره الى الزرقة اللازوردية. ازهاره يستمر من نحو الى آب.

#### ٢٤٦٣٣ - **لَبِيْنَةُ** \* في الفرنج، اطبله.

#### ٢٤٦٣٤ - **لَبِيْوْت** \*

*Lepiota* (S). *Lépiote* (F). *Lépiote* (E).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاناريقيات. انواعه المعروفة نحو ١٢. اصنامها بعض اقاليم مناطق البلاد المعتدلة الحارة. تعيش حل المواد النباتية المتسلة في الغابات وفي المواقع الرطبة. تتميز بيوغها الابيض اللون وباطراسها الحادة الاطراف الطليقة، ويطوق يكتنف اعالي الساق، تحت الاوسية. يكثر وجودها في فصل الخريف. بعض انواعها للذ الطعم مأكول ولتقتد الآخر كامن الصفات غير مرغوب فيه ونها نوع جحالي المادة يؤذي وقد يميت.

#### ٢٤٦٣٥ - **لَبِيْوْت رَكِيْت** \*

*Lepiota rhacodes* (S). *Lepiota déguenillée* (F).

نوع من اللبيوت المأكول. يكثر وجوده في حراج الصنوبريات. ساقه معتدلة الارتفاع، منتبسة القاعدة. اوسيته مظلية الشكل، قطرها نحو ١٠ سم. لونها الى البني الاحمر يملو مواج اصفر عند النضج.

#### ٢٤٦٣٦ - **لَبِيْوْت رَفِيْع** \*

*Lepiota procera* (S). *Lépiote élevée* (F).

نوع من اللبيوت المأكول. يكثر وجوده في حراج الصنوبريات. ساقه رفيعة، مستقيمة القاعدة، اوسيته مظلية الشكل، كبيرة القذ، قطرها يراوح من ١٠ الى ٢٠ سم. لونها الى البني الباهت العادم الاحرار.

#### ٢٤٦٣٧ - **لَبِيْوْت رَقِي الْبَرَق** \*

*Lepiota metulaespora* (S).

*Lépiote à spore en outre* (F).

نوع من اللبيوت الكامن الصنف. يوجد في المواقع الرطبة. ساقه رفيعة، معتدلة التضائة، حنطية اللون. اوسيته شبه مظلية الشكل، قطرها نحو ٦ سم. لونها الى الغلغلة، وشامها اصفر الباتش. يوغها ذاتي الشكل.

#### ٢٤٦٣٨ - **لَبِيْوْت عَادِمُ النَّعْف** \*

*Lepiota naucina* (S). *Lépiote sans valeur* (F).

نوع من اللبيوت الكامن الصنف. يكثر وجوده في المراعي.

البهل من نصال النبات المائل الى السرة تطول نحو ٢٥ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل، حلي القشار، كسني التوب، عشاري الاطواق الحمر. راسها الى الجؤرة. رواجها الى السرة السوداء. طول الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في التربة.

#### ٢٤٦٣١ - **لَبِيْنَةُ** \* هو الكنبان، اطبله.

#### ٢٤٦٣٢ - **لَبِيْنَةُ** \* *Cierge de Notre-Dame* (F).

نبات يدهي بوصير ليد، اطبله.

#### ٢٤٦٣٣ - **لَبِيْنَةُ سَوْدَاة** \* *Molène noire* (F).

في البوصير الاسود، اطبله.

#### ٢٤٦٣٤ - **لَبِيْنُ** \* *Labeo* (S). *Lébéon* (F). *Labeo* (E).

جنس اسماء ثورية من فصيلة الشبقيات. انواعه نحو ٢٠ اصنامها انهر وبجيرات البلاد الحارة من العالم القديم. اجسامها تطول من ٢٠ الى ٦٠ سم. انواها سوية الالوان. يكثر فيها الاسمر والجلوي البني. جميعها كبيرة الزمانف. اشهرها ليس النيل.

#### ٢٤٦٣٥ - **لَبِيْسُ النَيْلِ** \* *Labeo niloticus* (S).

*Lébéon du Nil* (F).

نوع من اللبيس وهو سمكة ثورية تكثر في النيل. جسمها كبير القذ يطول نحو ٦٠ سم. نواها الى الخضار الاسمر. زمانفها كبيرة حراء اللون. لحمها مأكول متوسط الصنف.

#### ٢٤٦٣٦ - **لَبِيْنُ** \* *Anagallis* (S). *Mouron* (F).

ويدهي وانغالي. جنس نباتات برية وتريزية، من فصيلة الربيعيات. انواعه قليلة منها المشوية والخشوية والحرولية والمعصرة. اوراقها متعقبة أو خسية. ازهارها جوسية الشكل. اعرف انواعه ما يتبع.

#### ٢٤٦٣٧ - **لَبِيْنُ الْمَاءِ** \* *Samola* (F).

هو السوسلس، اطبله.

#### ٢٤٦٣٨ - **لَبِيْنُ الْمَرْوَجِ** \*، **خُغْلِيْبَةُ**، **حَافِيْة**

**الْحَلْمَةُ**، **عُشْبَةُ الْعَلَقِ**

*Anagallis arvensis* (S). *Mouron des champs*, *M. rouge*, *Morgeline* (F). *Red pimpernel*, *Poorman's weather-glass* (E). *Roter Gauchheil*, *Rote Müsedarm* (D). *Anagallide*, *Anagalli* (I).

نوع من اللبين الحرولي البري المبدول. ساقه جالسة منتبسة تملو نحو ١٥ سم. اوراقه لائنة متعقبة، نصلها بيضي الشكل صغير القذ. ازهاره حراء اللون زرقاء المواج. وهو يتبع من الاحشاب الضاربة للواجب تلفها ان في الزروع ام في الحدايق والمبايل. ازهاره يستمر من ايار الى تشرين.

#### ٢٤٦٣٩ - **لَبِيْنُ الْهَضَابِ** \* *Anagallis collina* (S).

*Mouron des collines* (F).

نوع من اللبين التريزية المعمر. ساقه خشوية منتبسة تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقه السفلى متعقبة، اعلى لائنة متصلة. اوراقها خضراء ثلاثية التجميع، سنانية النصل الضيق. ازهاره كبيرة القذ ارجوانية اللون. ازهاره يستمر من ايار الى ايلول.

#### ٢٤٦٣١ - **لَبِيْنُ صُمَى الْوَرَقِ** \*

*Anagallis verticillata* (S). *Mouron verticillé* (F).

نوع من اللبين التريزية المعمر. ساقه خشوية منتبسة

٢٤٦٤٥ - **لَتَانِيَّة \* لَاتَانِيَا** Latania (S).  
Latanier (F). Fan-palm (E). Lantanie, Fächer palme (D). Latania (J).

جنس اشجار زراعية من النخليات القاليات. أنواعه ٦ منها المأكولة الجار والصناعية والزينة. جلدها منتصبه سلبية. أوراقها حالية مروحية. أزهارها ثنائي المسكن. ملونها مهلي الشكل. جنباها مريسة. أزهارها للذكورة منفردة. كؤوس وتوتجات أزهارها الانثوية ثلاثية الفصل، متناكها مهيمة، اسديتها عيطية تمد من ١٥ الى ٣٢. جميعها من نباتات المناطق الحارة ترطب في الاثربة الخفيفة المسقية النور التي لا تتنصها الرطوبة || احرف اولوها ما يلي .

٢٤٦٤٦ - **لَتَانِيَّة اميريكية** Latania americana (S). Latanier d'Amérique (F).  
نوع من اللتانية، منبها افريقية الوسطى. زرع لثريين ويستخرج من اوراقها الياف نسجية صناعية لا بأس بها شائعة الاستعمال المحلي .

٢٤٦٤٧ - **لَتَانِيَّة بوربونيه** Latania borbonica (S). Latanier de Bourbon (F).  
نوع من اللتانية الزينية. زرع في المراكن والحدائق التي لا تخشى البرد. اوراقها مروحية جميلة انضمار الزاهي، طولها وتعرض من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. جريدها متباعد الحشف الاخضر اللون || ترطب في الاثربة الدبالية الحوارة الممكن دجا .

٢٤٦٤٨ - **لَتَانِيَّة حمراء** Latania rubra (S).  
Latanier rouge (F).  
نوع من اللتانية الزراعية الصناعية، منبها البلاد الاستوائية. اوراقها كبيرة اللد تطول وتعرض نحو ٢٠٠ سم. جريدها حطلي اللون بجوي الموج. خوصها احمر الضلع، اخضر الصلصة || يستخرج من اوراقها الياف صناعية شائعة الاستعمال .

٢٤٦٤٩ - **لَتَانِيَّة صينية** Latania sinensis (S).  
Latanier de Chine (F).  
نوع من اللتانية الزراعية، منبها الصين تتميز بكثر كباشتها وكثرة عددها الذي يراوح من ٦ الى ١٠، أما متوسط وزن الكباشة فنحو ٥٠ كيلو. ثمارها مأكولة وهي صيفية الشكه صفراء اللون قدرها قدر البسر البصري. اوراقها متوسطة اللد تستعمل في صناعة الحبال وفي بعض الانسجة الوطنية .

٢٤٦٥٠ - **لِيُوس** Lethrus (S).  
Lêthre (F). Lethrus (E).

جنس حشرات من غديات الانسجة صفيحات القرون وفضيلة الجمليات. انواعه المرفقة نحو ٣٠ اعطينا تمتد من الشرق الاسرط الى اربوة الشرقية والجنوبية، جميعها خالصة راسمة تسرح في الليل || اجسامها شبه يفسية اللون، تطول من ١٨ الى ٢٢ سم. اثوابها الى السواد الاصفر او الجوزة السمراء. رؤوسها كبيرة، تاشبهها فضلية. عينها صغيرة بارزة. قرونها الاستعمارية صفيحات الاطراف. كاسلها عريضة مقعرة المماس الراسي جالسة المماس الفعدي، اعمادها مستندة الاطراف الاسفة. قوائمها شديدة النشط، متكثفة الهلب .

ساقه معتدلة الارتفاع لونها الى الطلحة. ارسوت قلنسوية الشكل، قطرها نحو ١٠ سم. لونها الى الطلحة السمراء.

٢٤٦٣٩ - **لِيُيُوت مُجَعَّد** Lepiota cristata (S). Lépiote crêpe (F).

نوع من الليوت الجمالي المذي. يوجد في الغابات كربة الرائحة عند السس. ساقه معتدلة الارتفاع، سمراء اللون، طوقها ابيض اللون، اسمر الحافة. ارسوت مجعدة الصلصة، مقعرة الاسرط، قطرها نحو ٣ سم. لونها الى السرة يملوها تنمير اسمر .

٢٤٦٤٠ - **لِيُيُوت هُيُتَر** Lepiota hystrix (S). Lépiote hérissée (F).

نوع من الليوت المأكول. يكثر في المواقع الطليلة. ساقه مستقيمة، قصيرة، عادية الطوق. ارسوت شبه غروبية الشكل، مشطلة الصلصة، صفرة الجرم، قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصفرة الكستانية الموج .

٢٤٦٤١ - **لِيُيُوت مُسَج** Lepiota excoriata (S). Lépiote excoriée (F).

نوع من الليوت المأكول. يوجد في بعض المواقع الرطبة. ساقه مستقيمة القاعدة، مستطقة النك، غبراء اللون. ارسوت شبه مظلية الشكل، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى البيرة يملوها تسنج اسمر .

٢٤٦٤٢ - **لِيُيُوتَات** Leblidae (S). Leblidés (F). Leblidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صفرة، مبطلة تطول من ٤ الى ١٢ سم. رؤوسها صغيرة. عينها بارزة. تاشبهها ولذكوتها قياسية، عادية الهلب. قرونها الاستعمارية عيطية، مركبة من ١١ فصلة، مهدبة ابتداء من الفصلة الرابعة. كاسلها صفرة، مخسورة، يكثر فيها الشكل الخلدوني. اعمادها تساجية الاغاديدي النعيلة، جميلة الالوان الزاهرة، ارساغ القوائم الاسامية، عند الذكور، مجهزة بصلفين من الهامج || جميعها مقعرة، تطير بصفة وتتغفل حل الارض برشاقة. تألف الموائل التي يكثر فيها الارق لاته من فراشها المغصلة || اشهر اجناسها اللُجُبَّة والسيسنديس .

٢٤٦٤٣ - **لُتَات** ما فت من قشور الشجر .

٢٤٦٤٤ - **لَتَاسَة** Latastia (S). Latastie (F). Latastia (E).

جنس حيوانات زحافة يبيوت من المظاليات وفصيلة الضبابيات. انواعها المعروفة اربعة موطنها الجزيرة العربية وبعض المناطق الافريقية. تألف القيساني والباري والواحات، قوتها الحشرات والدوبيات والديدان ... || اجسامها مستطيلة. اطوالها تراوح من ٢٧ الى ٣٢ سم. رؤوسها مستقيمة الشكل. قوائمها خاسية الاصابع . اذنانها اغشيتية، دقيقة الاطراف. اثوابها الى السمرة الخنطية او الصهبة الصفراء || ذكورها اصغر قدًا من اناثها وألم ثوبًا منها. الاناث تتمدن شلقها في الرمل على عبق ٤ الى ٥ سم. عيقت يمد خسة اصابع عن دوبيات نخلة دقيقة تسمى الى القوت يمد النكف يبيوت .







لثوس



لثين مداد



لثاء

**٢٤٦٦٠ - ثَلَاثَة مَشْتَبِهَة الْوَرَقِ** (S). *Clethra alnifolia* (S).  
**Clèthre à feuilles d'aune** (F).

نوع من الثلثة وهي جنبة سرطوية تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها مثنية الشكل طولها من ٨ الى ١٢ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ سم. تصلها بمشتر الزئبق كثير المروق المتتابة المتوازية. ازهارها وردية اللون سطرية المرف صغودية التجميع || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

**٢٤٦٦١ - ثَلَاثَة مَشْتَبِهَة**

*Clethra canescens*, *C. barbinervis* (S). *Clèthra barbu* (F).

نوع من الثلثة وهي شجيرة سرطوية تملو من مترين الى ٦ امتار. اوراقها بيضبة مدببة ملتحية كثيرة المروق المتتابة الاشارة و تصلها خلي الصفحة السفلى، بحري اللون. عتاقها ازهارها ملشمية وعلة، ازهارها كبيرة القف يفساه اللون || ازهارها يستمر من آب الى ايلول.

**٢٤٦٦٢ - ثَلَاثَات** (S).  
*Clèthracées* (F). *Clèthracées* (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين، كانوا يعتبرونها في التصنيف السابق جنساً من فصيلة الخنجات || انواعها كثيرة العدد، معظمها بري وبعضها تزئني. جميعها شجيرات ونباتات. اوراقها متعاقبة، بسيطة، مسنة الحافة. ازهارها صغودية التجميع او سنبل، طرفي الارزكاز. ازهارها خماسية الفصل والريقات، عشارية الاسدية، مغلوقة المآبر، مثلفة السات || اشهر انواعها الثلثة الزباء ولدبية والشجرة والفلقية الورق والشمعية.

**٢٤٦٦٣ - ثَلَاثَة** (S).

*Macroglossus* (S).  
*Macroglosse, Roussette kiodote* (F).  
جنس حيوان من فصيلة الوطاطيات. ازهاره المعروفة خسة جيمها يترآه صغيرة القف، طولها من ٦ الى ٧ سم. يسطها من ٢٠ الى ٢٢ سم. الازباء الى الربعة السوداء. فراطيقها ضيقة، ذلقة، مدنية، السنتها قابلة الانعطاف عارقة الطول || موطنها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية. تعيش بجاعات قليلة العدد. تألف مجاري الماء والادوية والكهوف والبيوت الخربة. قوتها الثبار على اختلاف انواعها.

**٢٤٦٦٤ - ثَلَاثَة زَعْفَاء** (S). *Macroglossus minimus* (S).  
*Macroglosse minime, Roussette kiodote minime* (F).  
*Small Reed-bunting* (E).

نوع من الثلث. حيوان ليون ثامر من فصيلة الوطاطيات || جسمها صغير القف، عادم الذنب، يطول نحو ٦ سم. وتبلغ يسطه نحو ٢٠ سم. قوتها الى الربعة السوداء السوداء المواج. رأسها مستعرض التقق، غرولبي الشكل. قرطوسها خفيفة، ذلقة، اذانها صغيرات، مستصبتان، مدببتا الطرف. عيناها مستديرتان كبيرتان، قمها كبير الشفق يحوي ٣٤ سنًا. لسانها غارقة الطول يعمل في طرفه بعض الحاجاج الماصة || تألف جلود الاثجار والكهوف والمخاوير والبيوت المهجورة. تعيش بجاعات قليلة العدد من الذكور والاناث || مسرهما دجوي يستمر من الدفوش الى الفجر. يباتا الشوي يستمر نحو ١٢ اسبوعا. يحبل الاثنى يدوم نحو ٣٨ يوما تقف في تمامه جروا واحدا يكتمن ويسمع ويهر بعد الوضع باسبوع ويتلقى بصد امه حتى النظام، اي نحو سبعة اسابيع || قوتها الثبار الالانة واخصها السكرية. تعتبر من الطواييد المؤذية للفاضة.

**٢٤٦٥١ - لَثِيْس** (F).  
سكة من السحليات مشهورة باسم قرلاس، اطلها.

**٢٤٦٥٢ - لَثِيْس** (S). *Ononis*, *Bugrane* (F). *Arrebauf* (F). *Rest-harrow* (E). *Kriechende Hauhechel* (D). *Bullmacola del campi, Serpeggiante* (I).  
جنس نباتات عشبية سحلية ومعمرة من فصيلة القرقيات. ازهاره عديدة معظمها بري وبعضها طبي وزراعي || اشهر انواعه ما يلي.

**٢٤٦٥٣ - لَثِيْس الْقَدَمَاء** (F). *Ononis antique* (F).  
هو الشبارق، اطله.

**٢٤٦٥٤ - لَثِيْس مَدَاد** (S).  
*Ononis des champs, Bugrane rampante, Arrebauf* (F). *Rest-harrow* (E). *Kriechende Hauhechel* (D). *Bullmacola del campi, Serpeggiante* (I).  
نوع من اللثين البري الممر المخلول. سوكه منسطة مدادة مستطيلة السلاحيات، كثيرة الجذور المقعدة المشرقة التي تحمل النبات كالثشكة المطروحة الناضجة في التربة || يعتبر من النباتات الفارة التي تؤذي النبات وتثيق الاعمال الزراعية.

**٢٤٦٥٥ - ثَلَاثَة** (F). *Suc végétal* (F).  
*Vegetable juice* (E).  
ما يسيل من الشجر من عصارة مما كان نوعها.

**٢٤٦٥٦ - ثَلَاثَة \* لَثَة** (F). *Clethra* (S). *Clèthre* (F).  
جنس نباتات برية وريسية من فصيلة الخنجات. انواعه عديدة جميعها شجيرات ونباتات. اوراقها متعاقبة، بسيطة، مسنة الحافة. ازهارها صغودية او سنبل التجميع طرفي الارزكاز. ازهارها خماسية الفصل والريقات، عشارية الاسدية، مغلوقة المآبر، مثلفة السات || اعرف انواعها وانهرها ما يلي.

**٢٤٦٥٧ - ثَلَاثَة زَبَاء** (S). *Clethra tomentosa* (S).  
*Clèthre tomenteux* (F).

نوع من الثلثة وهي جنبة سرطوية تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. قروصها زباء اللحاء. اوراقها اهليلجية ضيقة طولها نحو ١٠ سم. وتعرض ٤، تصلها خلي الصفحة السفلى الطحلاء اللون. ازهارها صطرة كبيرة القف متنبلية التجميع || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

**٢٤٦٥٨ - ثَلَاثَة مُدَبَّبَة** (S). *Clethra acuminata* (S).  
*Clèthre acuminé* (F).

نوع من الثلثة وهي شجيرة سرطوية تملو من مترين الى ٦ امتار. اوراقها اهليلجية مدببة تطول نحو ٢٠ سم. وتعرض نحو ٩، تصلها مسن الحافة، اخضر الصفحة العليا، بحري السفل الحولية البشرة. ازهارها كبيرة القف، سلبية التجميع، يفساه اللون || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين.

**٢٤٦٥٩ - ثَلَاثَة مُشْتَبِهَة** (S). *Clethra arborea* (S).  
*Clèthre arborescent* (F).

نوع من الثلثة وهي شجيرة تملو من ٤ الى ٦ امتار. اوراقها ابيدة تطول نحو ١٦ سم. وتعرض نحو ٦ سم. تصلها جامد الصفحة، خلي البشرة السفل الصفراء اللون. ازهارها عاجية، متعاقبة صغرية القف لثة || ازهارها يستمر من آب الى تشرين.

٢٤٦٧٢ - لآءة Chelonia (S).  
Chélone (F). Chelone, Sea-tortoise (E).  
سفن سلاصق بحرية من فصيلة اللآءات . انواعها  
عديدة ، جميعها كبيرة القد تقول نحو ٢٠٠ سم . ورن نحو  
٥٠٠ كيلو . ذيلها قليل الاحديداب . قشرها قرني المادة  
قايي الترتيب . فرائها زغنية الشكل ثنائية القالب .  
قشرها الاعشاب البرية . تبيض على الشطوط الرملية ، لحها  
ماكول ويبيها ايضا .

٢٤٦٧٣ - لآءة خضراء\* Chelonia viridis, C. midas (S). Chélone franche,  
Tortue verte (F). Green tortoise (E).  
نوع من اللآءة المأكولة اللحم . تكثر في المحيط الهندي  
وفي بحر العرب ، طولها نحو المترين ، ذيلها الى الخصار  
الزيتوني .

٢٤٦٧٤ - لآءة سهلية\* Chelonia imbricata (S).  
Chélone imbriquée, Carec (F).  
نوع من اللآءة المأكولة اللحم المنتشرة في جميع البحار .  
ذيلها اسمر اللون ، قشرها سهي التركيب لزوي المابة .

٢٤٦٧٥ - لآءة  
النسبة التي قل لها . وقد يكون ذلك بعد تاجها باربعة  
الشهر . ج . لآء .

٢٤٦٧٦ - لآءة Abyss (F). Abyss (E).  
السمي البعيد الغور في البحر ، يبتدئ من حدود المنطقة  
البحرية الى عمق ٥٠٠ م . من سطح الماء وما دون ذلك  
حتى القعر .

٢٤٦٧٧ - لآءة ملقوسة\*  
Ligdia adustata (S). Ligdie adusta (F).  
Ligdia adustata (E).

حشرة من اللافيات حشرغيات الاجسنة . موطنها يمتد من  
الشرق الاوسط الى اوروبا المعتدلة الحارة . فراشها جارية  
قشرها رقيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق الخصاص  
والقائمات ... جسمها صغير قضيب يطول نحو ٩ سم .  
سقطها نحو ٢٨ مم . رأسها الى الكسني . عيناها اثنا عشر  
زبانها مشطيان عند الذكر ، شعيطان عند الانثى .  
جوشها الى الكسني الاسود المواج . بطنها الى الطلعة  
السمر المواج || رواشها عند الشقين الى الشبهة الرورية  
المواج تملوها في الزوج الاسامي بقبة قاعدية بلون الجرشن  
وبقعة بيضاء ورقشة الى الطلعة . وتملوها في الزوج الخلفي  
رقشة تراوح من الحنطي الى الاسمر . اعدائها ثنية اللون ||  
لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان  
وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح من مصر الى  
قصة النيل . تماثل بعد ظهورها بنحو ثلاثة اسابيع وتفتح  
المكن ميحاديا على الصفحات السفلى من نصال النبات  
المائل || السرفة تطول نحو ٢٠ مم . جسمها اسطواني  
الشكل ، مائل القشار . لونها الى الطلعة الكدرار تملوها  
رقشة زرقاء قائمة . رأسها الى الزرق السوداء . مدنها الى  
الحنطي الاخر . وراجها البطنية الوسطى ماصحة ما يحملها  
تنقص عن الانتقال || طول الاكمال الذي يستمر نحو  
١٥ يوما ينقص ضمن صلجة تحميها السرفة في كل مكان .

٢٤٦٦٥ - لآءة Synanthérie, Syngénésie (F).  
Syngenesia, Syngenesia (E).  
الثآءة حالة الاسدية الملشوة اي الملشمة المأبر .

٢٤٦٦٦ - لآءة الآفاني\* Astica cracca, Toxocampa cracca (S).  
Toxocampe de la vesce craque (F).  
Astica cracca (E).

حشرة من النسيقيات حشرغيات الاجسنة . موطنها بعض  
مناطق الشرق الادنى واروبة الجنوبية والفرية . فراشها  
جارية قشرها رقيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق  
الفريجات الفرائية واعصها الآفاني والقصاد || جسمها  
متوسط القد يطول نحو ١٥ مم . سقطها نحو ٢٨ مم .  
رأسها كسني اللون جزوي المواج . عيناها كبيرتان .  
زبانها شعيطان . جوشها وبطنها الى الحنطي الاكلس  
المواج || رواشها الاماميان الى الحنطي الاكلس تملو  
جدة كسنية وبقعة حلالية سوداء ثم جدة اخرى خضراء  
ورواشها الخلفيان الى الحنطي الاكلس في الزاين الاول  
والثاني والى الكسني الاخر في الزاين الثالث والاربع ||  
لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى  
حتى ايلول . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو  
سنة اسابيع وتفتح المكن ميحاديا على نصال اوراق النبات  
المائل || السرفة تطول نحو ٢٣ مم . جسمها شبه اسطواني  
الشكل ، مائل القشار ، اخضر اللون ، اطول المواج  
تملوه خمسة خطوط نارية قاطبة منها خط ثنجي ينتهي عند  
السكة التاسعة . رأسها الى المرفة القائمة . مدنها ورواجها  
الى السمر || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما  
ينقص ضمن صلجة تحميها السرفة على مالحق الاوراق  
الدالة القريبة من التربة .

٢٤٦٦٧ - لآءة Rosée du matin (S).  
Morning dew (E).  
هو الندى وبهم من يقول ما سقط آخر الليل ، وما الذي  
يسقط اوله فهو الندى . ويقال يوم لآءة اذا كان  
ساكن الريح كثير الندى .

٢٤٦٦٨ - لآءة Recueillir un suc (F).  
To gather a juice (E).  
لآءة والى والى : استقطر عصارة الاجزاء من حلاب  
وصنع وما اشبه .

٢٤٦٦٩ - لآءة ، صامع Gommeux (F).  
Gummeux (E).  
ما كان معني المادة او كانت تملوه مادة صمغية .

٢٤٦٧٠ - لآءة ، مكنود Synanthérique (F).  
Syngénétique (E).  
الآءة من النبات ما كانت مأبر ازهاره ملشمة . ومن  
الازهار ما كانت مأبرا ملشمة .

٢٤٦٧١ - لآءة لآءة Synanthérées (S).  
Synanthérées (F). Synanthérées (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدة القاطلة سفلية  
الاسدية الملشمة المأبر . كائنا ، فيا مضى ، يمتزونها  
صارة من فصيلة المركبات .



لآءة الآفاني



لآءة خضراء



لآءة سهلية



لآءة ملقوسة



لَجَفَةُ الحور



لَجَفَةُ السندباد



لَجَفَةُ السط



لَجَفَةُ الصنوبر



لَجَفَةُ العليق



لَجَفَةُ المثلل



لَجَفَةُ التيجيل



لَجَفَةُ خُطَطَة

« Feuille morte du chêne » (F). Common lappet moth (E). Kupferglucke (D).

حشرة من اللبغيات متوسطة القد، ثوبها إلى البني المائى، وراشها منشارية الحافة ثلاثية الخطوط السود. يرقاتها تركب المثلل والزعزور والخوخ.

٢٤٦٨٧ - **لَجَفَةُ التَّجِيل** \* و **أَشْفَهَةُ التَّجِيل** Cosmotriche, B. à bagues, B. neustrian (F). Cosmotriche, Bueuse (F).

حشرة من اللبغيات متوسطة القد صفراء اللون. يرقاتها تركب مختلف النباتات النجيلية. من خصائصها أنها ترشف نطف التلى المتجمعة على زغب الاوراق قبل ان تقرض النصل.

٢٤٦٨٨ - **لَجَفَةُ مَخْطَطَة** \*

Malacosoma neustria (S). Bombyx à livrée, B. à bagues, B. neustrian (F). Common lackey moth (E). Ringelspinner (D).

حشرة من اللبغيات صغيرة القد مستطبة اللون حمر المالح تمتع مكها بالتتابع على الاغصان فيس كالمطوق أو كالحمام. يرقاتها تركب اوراق الاشجار الخضراء والحرجية من ايار الى حزيران.

٢٤٦٨٩ - **لَجَفَتَات** \* Lasioampidae (S). Lasioampidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة. اجناسها وانواعها زهاء ١٢٠٠ جميعها متوسطة القد، كثيفة الحراشف، ضعيفة الراش، عادمة الطعم، مشطية الزناني، انثاها اكبر حجماً والذخ لونا من ذكورها. يرقاتها تحمل على جانبها خصل من الهب النقي. خادراتها تتلحف بشرائق حريرية المحيط بثقوة التسج.

٢٤٦٩٠ - **لَجَم**

و **الْجَم** دويبة اصفر من اللطاية. وقيل اكبر من شمة الارض ودون الحريه.

٢٤٦٩١ - **لَجَن** و **لَجِين** Mash كل خيليط من دقيق او نخالة او قث او غيرها مع الورق او اللبن موش بالماء لتتلفه للماشية.

٢٤٦٩٢ - **لَجَنِيَّات** و **لَجَنِيَّات**

Chelonidae (S). Chelonidae (F). Chelonidae (E). فصيلة حيوانات بحرية بيوضة من رتبة السلاف، اجناسها وانواعها عديدة معظمها كبير الجف. ذلها صدى التركيب قليل الاحداد. زلفها فضوفي اللادة، قوامها مبطلة زعنفة الشكل || اشهر اجناسها اللجاء والحفاه والقبض.

٢٤٦٩٣ - **لَجِي** Abyssal, Abyssique (F). Abyssal (E).

نمت تعريفي يطلق على الكائنات البحرية المزودة في الهبة اي في المنطقة البحرية التي يراوح عمقها من ٥٠٠ م. تحت سطح الماء حتى القعر.

٢٤٦٩٤ - **لَجِيدِيَوْم** \* Lagidium, Lagotis (S). Lagidium (F).

جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة الششليات. موطنها بوليفيا والبرو والتيل. اجسامها مستطبة القد، قدرها قدر الارانب. ساهلها كثيفة الاسود اللؤلؤ. اذناها كبيرة منتصبة. اذناها مستطيلة جثة طولها يماثل طول

٢٤٦٩٥ - **لَجَفَةُ الرَّبْسِم** \*

Lasioampa trifolia (S). Bombyx du tréfile, Lasioampa du tréfile (F).

حشرة من اللبغيات متوسطة القد ثوبها الى الجوزة الوردية المراج. يرقاتها تركب الربسم وجميع انواع النفل وبعض الغنايات.

٢٤٦٩٦ - **لَجَفَةُ الحور** \*

Gastropacha populifolia (S). Gastropacha du peuplier (F).

حشرة من اللبغيات، متوسطة القد. يسطها نحو ٩٠ م. ثوبها الى البني الزاهي. وراشها منشارية الحافة، خلسية الخطوط السود. يرقاتها تركب الحور وتعيش على اوراقه.

٢٤٦٩٧ - **لَجَفَةُ السَّنَدِيَّان** \*

Lasioampa quercus (S). Bombyx des chênes, Lasioampa des chênes (F). Oak moth (E). Eichen-spinner (D).

حشرة من اللبغيات متوسطة القد كبيرة الراش المتناخلة الالوان. ثوبها الى البني الاصفر المراج. يرقاتها همة تركب جميع انواع السندباد.

٢٤٦٩٨ - **لَجَفَةُ السَّط** \*

Nadisa obsoleta (S). Bombyx du gommier (F).

حشرة من اللبغيات، متوسطة القد، يسطها نحو ٥٠ م. يرقاتها تحمل في بعض طيات حلقها البنية جيوباً مشبهه بالغلب الدقيق الناعم اللهب ثقفه عند الحاجة قناعاً عن الحياة. وهي تركب السط تعمره من الورق.

٢٤٦٩٩ - **لَجَفَةُ السَّط المُرَّ كَشَفَة** \*

Taragama acaciae (S). الميمورزا

Bombyx du mimosa (F).

حشرة من اللبغيات تحمل بذات خصائص يرقاتها السابقة الا انها اكبر قدً واغلظ جثة وابق ثوباً. وراشها مزركشة بالاسود والاعطل. يرقها تركب السط دون سواء.

٢٤٦٩٠ - **لَجَفَةُ الصَّنَوْبَر** \*

Dendrolimus pini (S). Dendrolime du pin, Bombyx du pin (F). Pine lappet, Pine moth (E). Kiefern-spinner (D).

حشرة من اللبغيات متوسطة القد يسطها نحو ٥٠ م. ثوبها بني اللون اخضر المراج. وراشها مزركشة ومغطاة. تسرح من تموز الى آب. تمتع مكها على جنود واغصان واغصان الصنوبر فينثف من يرقات دقيقة تبارك بالهلم الاحداد منذ انسلخها الاول. ومن قائل ان البرقة تاكل في اثناء دورتها الحياتية زهاء ١٠٠٠ هدية. وانها تلهم الهدبة بظرف خس دقائق.

٢٤٦٩١ - **لَجَفَةُ العَرَّعَر**

Pachyossa lineaire (F). فراشة مشهورة باسم بكلمة العرعر، اطلبها.

٢٤٦٩٢ - **لَجَفَةُ العَلِيْق** \*

Macrothylaea rubi (S). Bombyx de la ronce (F).

حشرة من اللبغيات متوسطة القد بنية الثوب يسطها نحو ٥٠ م. تسرح من ايار الى حزيران. يرقاتها همة تركب العليق وبعض النباتات البرية والزراعية احصها الوردية.

٢٤٦٩٣ - **لَجَفَةُ المثلل** \*

Gastropacha quercifolia (S). Gastropacha du chêne,



لجديوم



لحانة دجوة



لحاح



لحاح أحمر

الجسم . جواميزها الامامية قصيرة والخلفية طويلة جيمها رباعية الاصابع . وبر فراها كثيف التجميع نام الملمس ابيض القلادة اسهب الجسم صتاني الطرف ١ قوتها الاحشاب والجذور واللحالب . اناتها تقص من ٤ الى ٦ ادراس عل ثلاث مرات في السنة ١ انواعها اثنان :

Lajidum pallipes (S).  
Lajidum à pieds pâles (F).  
Lajidum peruanum (S).  
Lajidum du Pérou (F).

لجديوم البرو

Ecorce (F). Bark, Strip (E).  
لحاء بره عام هو قشر العود واللصن والساق. واللحاء من الوجهة النباتية هو احد النسيج الثلاثة التي تتكون منها الخزم الوضائية . وهو يتكون من انسجة غريالية تمر بها المواد الغذائية ومن جيوب خلوية تخزن بعض المواد . واللحاء جسموريا يأتي بين القشرة والشكير وهو ينفذ الصنع القلبية التي تلصق الشكير .

### ٢٤٦٩٦ - لحنانة دجوية \*

Nomophila noctuella (S). Nomophila nocturna.  
Teigne nocturne (F). Nomophila noctuella (E).  
حشرة من فصيلة اناريات حشرقيات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة اطرافية في جميع اقطار العالم . فراشتها رحالة قوتها رديم الازمار . سرقتها خاضعة تعيش ضمن غمد حريمي التسبيج عل الارواك التي تلتاس التربة من التيجليات والمركبات والقرنيات ١ جسمها يطول من ١١ الى ١٢ سم . يمتها تزاوج من ٢٢ الى ٣٤ سم . رأسها شبه مكور الشكل . صنتها صفيرتان ، ناضرتان . زيانها غيطان . ملاسها صفيرة . مرفشها معتدل الطول . جوشها ويطنها الى الكسني ١ رواشتها الى الصتاني تملوها ، في الزوج الامامي ، رشفة وزرا كش كسنيية تمتد من القلادة الى احنار الحاربي ١ لها جيل واحد في الحول . تظهر الفرشة في نيسان ويقي حتى تشرين الاول . قرح وتجنول في الليل ١ طولها القرائي يستمر نحو سبعة اشهر تماثل في علاله نحو ست مرات . والاثنى تلقى المكن بعد كل طرة زينا شعية العدد تغلفها مادة غروية تنبها حل الصفحات السفلى من تصال الارواك التي تلتاس التربة ١ الطور الاسري يستمر من ثمانية اسابيع الى عشرين اسبوعا لانه مغرب بموئل البيئة والحرارة والاعتناء . السرعة عند الادراك تمام تطول نحو ١٤ سم . جسمها اسطواني الشكل ، حنطي القون ، اسمر المزاج . رأسها كسني القون . مدنها وروافجها الى الحنطي ١ طول الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن حلجة تنسجها للسرقة تحت الاجنالة او بين اريوات لنباتات .

٢٤٦٩٧ - لحاظ  
لحاط الرشفة : اسفلها الابيض .

٢٤٦٩٨ - لحناب  
الحب هو ادراكه اعضاء التماسل الانثوية في الزمرة قبل ادراكه الاعضاء الذكورية .

٢٤٦٩٩ - لحناب  
لحناب الغصبي : قشره .

٢٤٧٠٠ - لحنكاه  
Chalcide (F). لحنكاه  
هي الحلكة ، دودية تقوص في البرل ، اطلبها .

### ٢٤٧٠١ - لحناب \*

Cnicus acarus, Plicomon scarra (S). Chardon acanthin (F). Cnicus, Thistle, Welteid thistle (E). Schöne Distel, Sperrdistel, Stacheldistel (D). Cardo acanthino, Scardaccone (I).

نبات حشبي بري حولي شائك من فصيلة المركبات يكثر في الاراضي البرو وصل جوانب الطرقات ويصعب من النباتات الضارة اذا كثر في الزروع .

٢٤٧٠٢ - لحناب

Apogon (S).  
Apogon (F). Apogon (E).  
جنس اسمك بحرية من فصيلة القرشيات شائكات الزعانف . انواعه المعروفة ثلاثة اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة ١ اجسامها احليلجية الشكل تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ألوانها مختلفة الالوان . رؤوسها معتدلة الجسم ، قصيرة الخلف . اشداقها واسعة منفردة . عيونها معتدلة القد ، مستديرة ، ماصحة . زعانفها الظهرية اثنان . زعانفها الذيلية غارقة ١ اشهر انواعه الصلح الاحمر .

### ٢٤٧٠٣ - لحناب آخر \*

Apogon ruber, بوزباشي  
Ap. imbarbis (S). Apogon rouge, Ap. commun, Ap. des rougets (F). Apogon ruber (E).  
نوع من الصلح . سمكة بحرية بيزوس من فصيلة القرشيات . اعطائها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط . مسرحها انقاف الصخرية والاشفاف ١ جسمها احليلجي الشكل يطول نحو ١٥ سم . حراشفها كبيرة . ثوبها الى الحمرة يطولها تنقيب اسود . زعانفها حمراء القون . رأسها معتدل الجسم ، رفيع القدم ، قصير الخلف . شدتها واسع الانفرج اسناتها صفيرة ، متراصة ، ذرية . زعانفها الظهرية اثنان . زعانفها الذيلية غارقة ١ لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

### ٢٤٧٠٤ - لحم ، لحم

Vlande (F). Meat (E).  
هو التسبيج المضلي في الحيران والطير وهو من الاطعمة الهامة المفيدة لاستهلاكه حل نسبة كبيرة من المواد الغذائية تلخص متوصلها في الجدول التالي :

نوع اللحم	مساه	مواد اذوية	مواد دهنية	مواد معدنية
ايقار عادية	٧٦,٣٧	٢٠,٧١	١,٧٤	١,١٨
ايقار مسمة	٥٣,٠٥	١٦,٧٥	٢٩,٢٨	٠,٩٢
صبول عادية	٧٨,٨٤	١٩,٨٦	٠,٨٢	٠,٥٠
صبول مسمة	٧٢,٣١	١٨,٨٨	٧,٤١	١,٣٣
غم حادي	٧٥,٦٨	٢٠,٨٢	٢,٣٥	١,١٥
غم مسمن	٥٣,٣١	١٦,٦٢	٢٨,٦١	٠,٩٢
خنابر مسمة	٤٧,٤٠	١٤,٥٤	٣٧,٦٣	٠,٧٢

أما بيان المواد المعدنية المذكورة في الخانة الاخيرة من هذا الجدول فهو التالي :

حماض فسفوري	٠,٥٠ %
كلور	٠,١٠ %
بوتاس	٠,٥٠ %
صودا	٠,١٠ %

اسمر ، يطفئ الى الصفار الاخير . جذباته صغيرة دقيقة  
اربع منها تحللي الفك الاعلى ولثنتان في الفك الاسفل .  
لحمه لذيذ الطعم مرغوب فيه .

كلس ٠٠١ %  
مغنيزيا ٠٠٤ %  
اكسيد الحديد ٠٠٥ %



نُحْم الغدران

٢٤٧١٩ - نُحْم شائك  
*Cobitis taenia* (S).  
*Loche épineuse*, L. de rivière (F). Groundling (E).  
نوع من النُحْم ، يعيش في المياه النهرية الراكدة . جسمه  
يطول من ١٥ الى ١٢ سم . وهو مبط الشكل متراكب  
الاولان القائفة والماعقة . جذباته ست تحللي الفك الاعلى  
دون سواه . لحمه متوسط الصنف مأكول .

٢٤٧١٥ - نُحْمُوم  
*Omophage* (F). *Omophagous* (E).  
أكل اللحم النيء .

٢٤٧١٦ - نُحْمِي  
*Ganache* (F). Lower jaw (E).  
رما حيوان أي شيتا فك القفوس والبلبل والحمار ...

٢٤٧٠٧ - نُحْمِيَّة التَّيْس  
*Salsifs des prés* (F).  
هو سلسليل المروج ، اطلبه . قال الانطاكي : « هو  
الموسطيداس نبت كوروك الكركاش لكن لا يرتفع حفص  
حاد الرائحة يقطع الاسهال والنزف وقروح الرئة والعسدر .

٢٤٧٠٨ - نُحْمِيَّة الحِمَار  
هي كزيرة الير ، اطلها .

٢٤٧٠٩ - نُحْمِيَّة اَحْمِيَّة  
هي ذقن احية ، اطلها .

٢٤٧١٠ - نُحْمِيَّة العُتْر  
هي للشنداب البحري ، اطلها .

٢٤٧١١ - نُحْمِيَّة المَبَل  
هي اللوليا ، اطلها .

٢٤٧١٢ - نُحْمِيَّة  
*Volva*, *Volve* (F). Skin (E).  
هي غشاء الفطر ، غشاء شفاف ناعم لا قياسي لؤلؤ .

٢٤٧١٣ - نُحْمِيَّات الأَلْسِنَة  
*Crassilingues* (F).  
زيتية من المظاتيئات تشمل بعض الفصائل . تتميز بألسنها  
الحمية السميكة القصيرة وغير الاسنادة .

٢٤٧١٤ - نُحْمِيَّش  
قال الانطاكي : « اللبليس نبت بري وجبل يرتفع نحو  
ذراع له حب اسود مر الطعم في حجم اللبس يتلف من  
السموم خصوصاً المقرب ويحلل الرياح الغليظة وينفع  
السدد ويؤيد الترقاق والبرقان وشربته مثقال » .

٢٤٧١٥ - نُحْم  
*Loch* (F). *Log* (E).  
مقياس سرعة السفن .

٢٤٧١٦ - نُحْم ، كَبِيَّت  
*Cobitis* (S).  
*Loche* (F). *Loach* (E).  
جنس اسماك نهرية من الشبوطيات اللينات الرخايف . انواعه  
المعروفة قليلة . اصطلحوا مياه البلاد الممتدة . اجسامها  
ضيقة مستطيلة . تتميز بكثرة جذباتها واسنانها الجلموية ،  
بصفير فلوسها وضيق خياشيمها مما يجعلها تارود سطح الماء  
كثيراً || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٧١٧ - نُحْمُ الغُدران  
*Cobitis fossilis*, *Misgurnus fossilis* (S). *Loche d'é-*  
*tang*, *Misgurne* (F).  
نوع من اللُحْم ، يعيش في سمل البجيرات والغدران . جسمه  
يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . ثوبه الى الكعبة النبراء يجعل  
حل جانبيه خطان اسودان قاطبان . جذباته ١٥ ، ست  
منها في الفك الاعلى واربعة في الفك الاسفل ، لحمه متوسط  
الصنف مأكول .

٢٤٧١٨ - نُحْمُ حُر  
*Cobitis barbatula* (S).  
*Loche franche*, *Dormille*, *Moutaille*, *Motelle* (F).  
*Rock-ling* (E).  
نوع من اللُحْم ، يعيش في الانهر والبجيرات والغدران . جسمه  
يطول من ١٥ الى ١٠ سم . ثوبه الى الكعبة يطولوا تروشح

٢٤٧٢٠ - نُحْمِي  
*Livistona* (S).  
*Livistone*, *Rondier* (F). *Fan-palm* (E). *Echte Schirm-*  
*palm* (D). *Palma di cappelli* (I).  
جنس اشجار ليفية صناعية وزيتية من فصيلة النخلات .  
مهددا المناطق الحارة والاستوائية . انواعها عديدة جميعها  
رقيقة الجذع الجالس في اقاليمها الطبيعية ، قصيرته في  
الاقلام المعتدلة ، اوراقها تتصلب في عدة صناعات اخصها  
صناعة القبعات والسائر . الواحدة نلبة || اشهر انواعها  
الزيتية ما يلي .

٢٤٧٢١ - نُحْمِي  
*Intensifier* (F).  
*To intensify* (E).  
استعمل اسمن الطرق لاكثر الانتاج .

٢٤٧٢٢ - نُحْمِي أندوليزية \*  
*Livistona hoogendorpii* (S). *Livistone de Hoogen-*  
*dorp* (F).  
نوع من اللُحْم الزيتي يزرع في المراكن والحداث . اوراقه  
مستديرة ، جرائدها شائكة تطول من ٨٥ الى ١٢٠ سم .  
غوصها مخروطي الشكل ، خلسي او سامي الانساب وهو  
جامد الصفحة اخضر اللون اصفر المروج .

٢٤٧٢٣ - نُحْمِي زَيْتُونِيَّة الحَمَر \*  
*Livistona olivaeformis* (S). *Livistone à fruits en*  
*olive* (F).  
نوع من اللُحْم الزيتي يزرع في المراكن والحداث .  
اوراقه كلوية الشكل تطول من ٦٥ الى ١٠٥ سم . جرائدها  
شائكة جسمها احمر اللون ، متباد الاوتكار . غوصها حاق  
الانضمار محجن الاطراف . ثمارها زيتونية الشكل ولحمه

٢٤٧٢٤ - نُحْمِي مُخَشَّصَة  
*Livistona humilis* (S). *Livistone bas* (F).  
نوع من اللُحْم الزيتي يزرع في المراكن والحداث .  
اوراقه قليلة الشكل تطول نحو ٩٥ سم . جرائدها مرسة .  
غوصها ضيق الصفحة جميل الحصار الزاهي وهو ذرب الزام  
الاخير ، حاد الحمة .

٢٤٧٢٥ - نُحْمِي مُشَدِيكة الورق \*  
*Livistona rotundifolia* (S). *Livistone Biroo* (F).  
نوع من اللُحْم الزيتي والصناعي . اوراقه كبيرة القاد  
مستديرة الشكل قطرها يراوح من ١٠٥ الى ١٥٥ سم .  
جرائدها مرسة تطول نحو ٢٥٠ سم . غوصها شديد الحصار  
المابق يطول من ٥٥ الى ٧٥ سم .

٢٤٧٢٦ - نُحْم ، نُحْم  
*Requin* (F). *Shark* (E).  
هو القرش ، حيوان بحري جصور ، اطلبه .



نُحْمِي أندوليزية



نُحْمِي زَيْتُونِيَّة الحَمَر



نُحْمِي مستديرة الورق

## ٢٤٧٢٧ - لَحْنٌ أَيْضُ

*Caracharodon carcharias* (S). Requin blanc (F).  
White shark (E).

سمكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة الحشيات. أعطانها معظم بحار المناطق المعتدلة الحرارة أعصها المحيط الأطلسي. مسرحها العامي لا يتجاوز الأعواط وتمتد سطح الماء وتواكب السفن || جسمها كبير القد، وشي الشكل، يطول نحو ١٢ متراً. ثوبها إلى الزرقاء البهيرة البيضاء الموج. بطنها أبيض من ظهرها. رأسها غروطي الشكل. عظمها شارب. لها لاطم مستعرض الشدق الكبير. أسنانها مثثة الرؤوس الحادة. زعنفتها الظهرية الامامية كبيرة الحجم مقعرة الشكل. زعنفتها الذيلية حلالية الشكل مستطيلة || تتميز بأنثى وبشدة البطن. قرباً كل ما استطاعت من الأسماك والجلب || أنثى معدة للتزاوج تضع في كل مرة ٤ بين أوائل حزيران وأواخر تموز نحو ٤ مجراً.



لَحْنُ الْأَشْجَارِ الْمُسَوِّدَةِ

## ٢٤٧٢٨ - لَحْنٌ لَحْنِي

*Alopias vulpes* (S).  
*Requin renard*, Renard (F). Fox shark, Thresher (E).

سمكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة الحشيات. أعطانها معظم بحار العالم أعصها المحيط الأطلسي || مسرحها عمي ولا تخفى صيود المياه الاقليمية والاقتراب من الجاهل عند ملازمتها اسراب الرنكة والسرين والاسفري || جسمها وشي الشكل، كبير القد يطول من ٤ إلى ٦ أمتار. ثوبها إلى العسل الزرقاء الموج يمتد في الظهر ويبيض في البطن. رأسها غروطي. عظمها شارب. قها لاطم مستعرض الشدق. أسنانها مثثة الرؤوس الحادة. تتميز بزعنفتها الذيلية الكبيرة الفضفاضة التي يبلغ طولها طول الجسم والرأس معاً || أنثى مستعدة للتزاوج تضع في كل مرة ٤ بين أوائل أيار وأواخر حزيران نحو ٣٠ مجراً.

## ٢٤٧٢٩ - لَحْنِيَّاتٌ

*Lamnidae* (S).  
*Lamnidae* (F). *Lamnidae* (E).

فصيلة أسماك بحرية ولودة مفترسة من السفنقيات ورتبة الاشلال. اجناسها وانواعها المعروفة نحو عشرة. أعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || مسرحها عمي، غروطي وطسلي || جميعها كبيرة الاجسام الوشيية الشكل. تتميز بشدة بطنها وزعنفتها وبأسنانها المثثة الرؤوس الحادة وبالفتحات الجسمي الكبير بين زعنفتها الظهرية || أشهر انواعها اللحم الأبيض والقلم الصليبي والحدال والقلم.

## ٢٤٧٣٠ - لَحْنٌ

جلس فلور مجهرية من الزعفران وفصيلة النشويات. تكتاه تتميز بهدائه اللطيفة الكبيرة القمية الشكل. تكتاه غروطية متشعبة متشابهة الشدة، بوه ثنائي أو شمالي التركيب. مركب غثت الاجناس النباتية || أشهر انواعها وأرضها الثانية عشر التالية.



لَحْنُ الْأَكِيدِيَا

## ٢٤٧٣١ - لَحْنُ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ \* ، لَحْنٌ

لَحْنٌ \* مُونِيلِيُوزُ \* مَلِيُورِيَا لَحْنٌ

*Sclerotinia laxa*, *S. cinerea*, *S. oregonensis*, *Monilia Laxa*, *M. cinerea* (S). Rot-brun des arbres fruitiers, Moniliase (F). Blossom blight (E). *Monilia-spitzendürre* (D).

فطر مجهرى مركب التفاح والاجاص والسفرجل والكرز والخوخ والدراق واللوز والمشمش فيسب اعلاص الازهار

وذبل النولي وانتشار لحاء الافناد والافناد وعفن الثآر واحتيجلها || مظهره الخارجي: يبدو على التفاح والاجاص والسفرجل ذبول طارئ يسبب الموت أو بعض اضرارها فيصلها ثم يركب الازراق القلبية شبة وينتقل إلى الفئز والفند فينوي الاول بعد ان يؤتم الثاني يقع عنية تقضي على التسج العصاية وتسبب انتشار لحائها || ويكون على الفوخ والدراق واللوز والمشمش ذبول فجائي يعل بأوراق النولي فيذبلها ويصيب اقرب الازراق من الازراق فيقضي عليها ثم ينتقل إلى الافناد فيقهرها ويسبب انتشار لحائها. أما الثآر فانه يفتحها على دفتين الاول عند الاتمقاد، على اثر سقوط البتلات، فيذوبها. والثانية قرب الادراك فيوشها بحمراته الحولية الحطية التي تعطب القشرة وتحميها بعد ان تسبب عفاها وعفن لها || وهو على الكرز ورم يصيب النور قبل البلاج الزهر فيقضي على البتلات والحيجان والأمن والاوراق والافناد، والنسوة تلو الآخر. كما وانه يصيب الثآر عند ادراكها فيعطبها ويصل لها فله يثار الفوخ والمشمش والدراق || يكافح ارباً في فصل الشتاء، من كانون إلى شباط، بقطع جميع الاعضاء الموصية وسرقها وبنفيخ الاشجار بملح ملح الصودا المحلول ١ ٪ والمضاد اليه ١ ٪ من الصابون الخالي من البوتاس. ثم تضغ الاشجار مرة ثانية خلال شذر اذار الى قبل الاكاح يسائل بورود المحلول من ٨. الى ٢ ٪ بالنسبة إلى نوع الاشجار وإلى ظروفها الخاصة، ومن الواجب ايضاً قفسنها مرة ثالثة توماً بعد المقد.

## \* ٢٤٧٣٢ - لَحْنُ الْأَكِيدِيَا

*Sclerotinia mespili* (S). Maladie du dessèchement des pousses de néflier (F).

فطر مجهرى يصيب الاكيدنيا في ثولها وإضرارها وارتاقها وثارها الفتية || مظهره الخارجي عفن أصهب اللون كثيف العرصات يركب النولي فيذبلها ويؤخر نموها ويتركب الازهار فيسبب سقوطها ويصيب الازراق تنيف وتسر ابتداء من صفتها بعد ان تكتسب رائحة عطرية مستحبة. وإذا سطا على الثآر يقودها إلى اليباس بعد حفاف قشورها || يكافح باستعمال سائل بورود المحلول ١ ٪ بعد قطع الاعضاء الموبدة وسرقها.

## ٢٤٧٣٣ - لَحْنُ الْبَرَقُوقِ

*Sclerotinia pruni-spinosae* (S). Rot-brun des prunelliers (F).

فطر مجهرى يصيب الثآر والافناد فيسقطها بدهن النتي اللون الذي يسبب اضرارها بكاملها أو جزء منها. وهو على الافناد عفن اخضر ثم اصفر يعطب اللحاء ويسبب اليباس || يكافح كثيره من اللحن.

## ٢٤٧٣٤ - لَحْنُ الْبُقُولِ

فطر مجهرى ينشط ويتكاثر في البيئة الرطبة الباردة التي تراوح حرارتها من ٢ الى ١٠ درجات. يصيب عدة بقول أعصها المليون والجذر والكرس واللوبيا والحمس والبنندرة والطرطوف ... || مظهره الخارجي يقع عنية ليدة صغيرة مستديرة تركب مختلف أعضاء النبات فتصطقلها بشور سود بعد ان تشل فيها الحركة للسلبية التي تسبب الذبول الذي يقبه اليباس || لم يكافح حتى الآن. ننصح باحتجاب زراعة البقول الممرضة لهذا الفطر في المواقع الرطبة الباردة.

حقن المحلول خلي يعلو الثَّارَ عند ابتداء الاوراق فينبثقها برصاتها ثم يركب الثلامي والاوراق الغنية والاثنان فيؤذيها بعد ان يحول دون نموها || يكافح مكافئة لحن الثَّار .

#### ٢٤٧٤٢ - لَحْنُ السُّوسَنِ

*Sclerotinia convulata*, *Botrytis convulata* (S).  
فطر مجهري يصيب فتيك مجذاري السوسن . مظهره الخارجي يقع غنية حنطية اللون زغبية ، تركب الجذاري المحفوظة وفي الثَّارة تنطعها وتلفها || يكافح بتطهير الجذاري المحفوظة بالفرمول وباملاح الزئبق .

#### ٢٤٧٤٣ - لَحْنُ الشَّيْثَمِ

*Sclerotinia temulenta*, *S. secalicola*, *Sclerotinia temulenta*, *Phiala temulenta*, *Endoconidium temulenta* (S). *Maladie du seigle enivrant* (F).  
فطر مجهري يصيب حب الشيلم وحب بعض التنبليات العلفية والثَّارة || مظهره الخارجي اسطعالة في الحب وتخدده يمشيها اغلول وتآكل المادة النشوية || اكل الحب الموبوء وديقه يسيب في الانسان والحيوان مسا يسيب الزوران من عوارض استرخاء وسكر || يكافح بانتقاء البذار السليم او بغمر الحب مدة ٣٠ دقيقة بماء الساخن البالغة حرارته ٥٥ درجة ستيفراد .

#### ٢٤٧٤٤ - لَحْنُ العَقْرِ \* ، عَقْنُ أَشْهَبَ ، عَقْنُ عَنَكَبُوتِي

*Sclerotinia fuckeliana*, *Botrytis cinerea*, *B. vera*, *Polycystis cinerea*, *P. vera*, *Sclerotium durum*, *S. echinatum* (S). *Pourriture grise*, *Pourriture noble*, *Maladie de la toile* (F). *Grey mould* (E). *Botrytis-faule*, *Graufäule* (D).

فطر مجهري يركب جميع الاعضاء الهوائية النباتية من الساق الى الثَّار كما وانه يركب المواد المغذية على سطح الثَّارة فينشها برصاتها واصعانه التي تشبه نواس العنكبوت . مظهره الخارجي يختلف مع النبات المصاب . يبدو غالباً بشكل وريمة حامدة طلاء اللون او حنطية تكثف النباتات . هو في الكثرة يقع غنية زغبية طلاء اللون تركب السروع القريبة من الثَّارة و تركب حب التناقية فتنطع وتذبل . وهو في الاجاص يقع غنية متناية قدية الشكل تركب الافاد فتؤذيها وتحميها || ويركب التين في اغصانه فيسبب يهاسا وذبول الثَّار وجفافها || ويصيب النبات في المشاكل نقصي في حل الشتل الغنية من اي نوع كانت || يكافح بتطهير الثَّارة وباستعمال اسعد العلاجات الاقتصادية الرهيدة الثمن .

#### ٢٤٧٤٥ - لَحْنُ القَرَشِيَّاتِ

*Sclerotinia ciborioides*, *S. triflorum* (S). *Maladie à sclérotis des légumineuses* (F). *Stem rot*, *Wilt of clover and alfalfa* (E). *Kleekrebs* (D).  
فطر مجهري يركب بعض النباتات القروية الهولية اخصها القزل والبالقية والبرسيم || مظهره الخارجي يقع غنية مبترنة تركب نصل الاوراق ثم تنتشر تنطع كابل النصل والمخاط وتقتل الى السوق فتذبلها وتلوها بعد ان تنطعها ويؤذي من المعن الابيض الذي ينشئ النبات والثَّارة || يحسن تحفيض الثَّارة الكونم لصراف الماء الصار واجتناب الزرعة في الارربة الرطبة القوية الانفجاس .

#### ٢٤٧٤٦ - لَحْنُ الكَسْنَةِ \* ، ثَرُوم

*Sclerotinia pseudo-tuberosa*, *Rhacodiallya castanea*, *Harziella castanea* (S). *Pourriture noire des chéneignes* (F).  
فطر مجهري يصيب ثمار الكسنة فغيتها ويغضي عليها . مظهره الخارجي لطفة طلاء او سمرار اللون تملو الثَّارة

#### ٢٤٧٤٥ - لَحْنُ الثِّيَغ \*

*Sclerotinia nicotianae* (S). *Maladie à sclérotis du tabac* (F).

فطر مجهري يصيب الثيغ في سوقه واوراته . يبدو حل السوق لطف سمر طويلاً نحو ١٠ سم . مرضها ٦ . وهو حل الاوراق يقع صغيرة لا قياسية الشكل والحجم تبدو كالشوبر الحنطية اللون الى ان تركبها عرصات العفن المحلل الاخير || اصرار زغبية لا تستريب النابتة لان انتشاره منوط بكثرة الرطوبة المحيطة وبشدة البرد .

#### ٢٤٧٤٦ - لَحْنُ الثَّمَار \* ، مَوَلِيَّيَه \*

*Sclerotinia fructigena*, *S. coryli*, *Monilia fructigena*, *Monilia fructigena* (S). *Rot-brun des arbres fruitiers à pépins* (F). *Brown rot* (E). *Monilia-fruchtfäule*, *Polsterschimmel* (D).

فطر مجهري يصيب اشجار وثمار التفاح والاجاص والسفرجل والا كدينا وقد شوهد في ظروف خاصة حل ثمار الكرز واللوح والمشمش والدراق || يصيب في بادئ امره بتلات الازهار وتيجانها وانها ثم يمتد الى الاثنان فيعطب اللحاء والارضية ويشل الحركة النسبية بعد ان يمتد الى الاعضاء المسابة ويؤذي من عوصات العفن المحلل الاصلح || وقد يصيب الثَّار في مختلف ادوارها الحياتية فيعطبها بعد ان يكتنف كامل برشها || يكافح اولاً بقطع وحرق الاعضاء الملوثة والثَّار الجافة المخلعة . ثم باستعمال سائل بورديو المحلول ١٪ الى اثر سقوط بتلات الزهر . وينتفع الاشجار مرة ثانية بذات السائل وذات المعدل عندما تصبح الثَّار في نصف سببها او في ثلثيه .

#### ٢٤٧٤٧ - لَحْنُ الثُّوم \*

*Sclerotinia porri* (S).  
فطر مجهري يركب اوراق الثوم فيؤذيها ويؤخر نموها . مظهره الخارجي يقع يبيض ثم سمر صغار مستديرة تركب النصل فتشل نشاطه وتؤخر نموه .

#### ٢٤٧٤٨ - لَحْنُ الجُتُونِ \* ، عُرْطُوط الجُتُونِ \*

*Sclerotinia bulborum* (S). *Morve de la jacinthe* (F).  
فطر مجهري يركب بصل الجون والاشقل والزعفران . مظهره الخارجي اصفرار وذبول يجلان بالاوراق فور سطوع الشراخ الزهري . ثم يثور لبد لا قياسية الحجم والشكل سمر الغلاف يبيض الداخل تركب اسفاد البصل فتضنها وتؤريها || يكافح بانتلاج البصل الموبوء منه ظهور الوصم وتطهير الثَّارة بالفرمول .

#### ٢٤٧٤٩ - لَحْنُ الدُّبُوسِ \*

*Sclerotinia draytoni* (S).  
فطر مجهري يصيب البصل المحفوظ وينتقل معه الى الثَّارة . مظهره الخارجي يقع غنية حنطية زغبية صرامة تركب اسفاد البصل والارصاء تنطعها وتؤريها || يكافح بتطهير البصل عند حله وقتل زهره بالفرمول وباملاح الزئبق .

#### ٢٤٧٤٠ - لَحْنُ الزُّعْثُرُ \*

*Sclerotinia crataegi*, *Monilia crataegi* (S).  
فطر مجهري يركب الاوراق فيؤذيها ويصيب الثَّار فيؤذيها او يحول دون نموها || يكافح كغيره من اللحن .

#### ٢٤٧٤١ - لَحْنُ السَّرَّجَلِ \*

*Sclerotinia linhartiana*, *S. cydoniae*, *Monilia linhartiana*, *Monilia neans* (S). *Maladie du dessèchement des jeunes coings* (F).

فطر مجهري يركب الثَّار في اول عهدا فيسبب اتلافها ويركب الاوراق والاثنان فيؤذيها || مظهره الخارجي



لحن الثَّار



لحن العفن

لحمه يحوي بعض المواد السامة المؤذية . وقد يكون السبب مرضي المرجان .

Lychnis (S).

### ٢٤٧٥٢ - لُخْنِسُ

Lychnis, Lychnide (F). Campion, Lampflower, Maltese cross (E). Lichtnelke, Marienkreuz, Pechnelke (D). Licnide, Croce di Malta (It).

جنس نباتات عشبية من فصيلة القرنفلية ، أنواعه نحو ٣٠ ، منها الحولية والمعمرة . أوراقها متعاقبة ، بيضية أو سنائية النصل . أزهارها كبيرة القند جميلة الشكل لا قياسية التجميع والارتكاز يكثر لها الأحمر والأبيض والوشح . أعرف أنواعه وأشهرها ما يلي .

### ٢٤٧٥٣ - لُخْنِسُ أَرْجَوَانِي ، لُخْنِسُ سَاطِع

Lychnis fulgens (S). Lychnide éclatante (F). نوع من اللخنيس وهو عشبة معمرة وريضة الساق تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . أوراقها لائحة سنائية ، نصلها مسن الحافة أزغب البشرة . أزهارها حثكولية التجميع ، هامة الارتكاز ، بتلاتها أرجوانية اللون ، رباعية التخصيص . أزهاره يستمر من حزيران إلى آب .

### ٢٤٧٥٤ - لُخْنِسُ الْحَدَلِيق ، لُخْنِسُ مَنُورِي

Lychnis coronaria (S). Lychnide coronaire, Agrostemma coronaria, Coquelourde des jardins, Coillet de Dieu, Passe-fleur (F). نوع من اللخنيس البري . وهو عشبة معمرة زباه تملو من ٤٠ إلى ٩٠ سم . أوراقها بيضية لسنة . نصلها خلي البشرة حل صفحية . أزهارها مستطيلة الاذن كثرية العدد . بتلاتها قليلة التشرع عديدة الألوان التي تختلف باختلاف القرب . أزهاره يستمر من ايار إلى تموز .

### ٢٤٧٥٥ - لُخْنِسُ الشَّرْقِ الْأَدْنَى ، لُخْنِسُ

Lychnis chalcodonica (S). عُلُقْدُ وَلِيَّة Lychnide de Chalcédoine, Croix de Jérusalem, Croix de Calé (F). نوع من اللخنيس وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم . خرونها الزراعية عديدة . سوقها وأوراقها مزيجية . أوراقها لائحة بيضية ، نصلها مسن الحافة اصفر الخضار . أزهارها مختلفة الألوان ، ضمية التجميع ، هامة الارتكاز ، منها المكبنة والمعادية ؛ بتلاتها مقعرة تباد كالصليب مما جعلهم يدعونها صليب القدس أو صليب مالهه . أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز .

### ٢٤٧٥٦ - لُخْنِسُ الشَّخْرِي

Lychnis flos-jovis (S). Lychnide fleur de jupiter, Coquelourde fleur de Jupiter, Ciel de Dieu, Fleur de Jupiter (F). نوع من اللخنيس الشَّخْرِي وهو عشبة زباه معمرة وريضة الساق تملو من ٣٠ إلى ٤٠ سم . أوراقها لسنة ، نصلها خلي البشرة . أزهارها كبيرة القند ، بتلاتها ثنائية التخصيص قرمزية اللون . أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز .

### ٢٤٧٥٧ - لُخْنِسُ بَرِّي

Lychnis silvestris (S). Lychnide sylvestre, Compagnon rouge (F). نوع من اللخنيس وهو عشبة برية معمرة تكثر في المراعي والمروج زرعها الماشية بشية .

### ٢٤٧٥٨ - لُخْنِسُ كَبِيرُ الزَّهْرِ

Lychnis grandiflora, L. coronata (S). Lychnide à grande fleur (F). نوع من اللخنيس وهو عشبة معمرة تملو من ٢٠ إلى

الخارجية قطعها . ثم يمتد إلى لباب الثمرة فيسبب اختلاله وتحويله إلى بؤرة من السفن الناشئ الاسود تتخلله عروق صفري يسطع منها عند انفلاقها غبار كالحباب . تقزم الأبار المطوية من السلبية بعد نحرها بالماء لان المطوية تغفر والسلبية تنور .

### ٢٤٧٥٩ - لَحْنُ النَّجَسِ

Sclerotinia narcissicola, Botrytis narcissicola (S). نظر مجهرى يركب الأوراق عند ظهورها فيؤذيها ويسبب ال تمويها وأزهارها . مظهرها الخارجي عرسات مجعنة طحلاء اللون تركب نصل الأوراق منه ظهورها ثم تتحول إلى وشم سود تشوه الأوراق وتبقى عموماً زرعاً أزهارها وأزهارها .

### ٢٤٧٥٨ - لَحْنُ تَاهِم

Sclerotinia sclerotium, S. libertiana, Sclerotium compactum, S. varium, S. brassicae (S). Pourriture des racines (F). Collar rot (E). Rapskrabs (D). فطر مجهرى مهم يركب معظم الأنواع النباتية في غثلت أعضائها التربة وأهلواتها . مظهره عرسات كالشور صفيرة لينة تبدو بيشاء اللون ثم تحيل إلى الزرقعة وتستقر على السرة تؤثم سطح الأعضاء المويضة أو تصيب السوق في منطقتها المكأكية كما يحل في البطاطا والبننور والتبغ . رهو حل كل حال لا يقرب الأعضاء السلبية بل يركب القشور المخدوش ويصيب النبات في الحقل ولا يفت من الآبار والدرنات المخزونة . يكالغ بتطهير التربة بواسطة الفرميد أو الحامض الخلي أو الأملاح الزئبقية .

### ٢٤٧٤٩ - لَحْنَةُ

Chou (F). هي المنفوف ، اطلب .

### ٢٤٧٥٠ - لَحْنَةُ

Lachnea (S). Lachnée (F). Lachnea (E). جنس فطور من فصيلة الخشاريات ودية الزيات . أنواعه المعروفة قليلة العدد . تعيش مجموعات في المواطن الظليلة على المواد النباتية المتحللة . مجموعتها تمد من زوج إلى ثلاثة أزواج . سوقها صمجة . لكاعها قصية الشكل أو ترسية ، قطرها من ١ إلى ٣ سم . قوائها الخارجية مهدبة القشار لونها إلى الصفار الاسمر الباهت أو إلى الحمرة البرتقالية . صفحتها الداخلية بيشاء اللون . وأعتها كريمة مستحبة . أعرف أنواعها وأشهرها :

### لَحْنَةُ تَرَسِيَّة

Lachnea scutellata (S).

Lachnée en écusson (F).

### لَحْنَةُ نَصَفِ دَائِرِيَّة

Lachnea hemisphaerica (S). Lachnée hémisphérique (F).

### ٢٤٧٥١ - لَحْنُومٌ \* لَحْنُومِيَّة

Lachnolaimus (S). Lachnolème (F). جنس أسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الكنيديات . أنواعه المعروفة خمسة جميعها من أسماك حمار جزر الانتيل . أجسامها شبه أهليلجية الشكل ، كبيرة القند ، تطول من ٧٠ إلى ١١٠ سم . رؤوسها مخروطية . أشداقها متدلة الرحابة . زعانفها الظهرية والشرجية والذيلية مجعزة بمناعس غسرية مستطيلة . أفرانها متباينة الألوان منها الأحمر والجواري والأخضر والاسم والأخضر البحري . ظهورها أعين لوناً من بطونها . لحمها متوسطة الصنف مأكولة (Lachnolaimus) استثناء نوع واحد يدعى لحنوم كليتي (caninus) ثوبه إلى الخضار الزيتي . طوله نحو ١٠٠ سم .



لحن تاهم



لحنة ترسية



لحنة نصف دائرية



لخنم



لخنيس الشرق الأدنى



لخنيس الشخري



صغيرة ، محرمة . ظهرانها كامل المحنجة ، شارب ، كسني الشباك ، ووشاما غشائيان . بطنها صغير الحجم . قوائمها نقيطة || مسرهما حراج السديان . قوتها نفع الارواق .



لحنيس نرج

٢٤٧١٧ - لَدَوِيَّات (S). *Ledridae, Scaridae* (S).

*Lédridés, Scaridés* (F). *Ledridae, Scaridae* (E). فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد أو صغيرة . رؤوسها ضخمة . اعطالها صغيرة . عينوها جانبية صغيرة . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل اللاتساقوية . كوسلها عريضة ، مزودة باطناف متباينة الاشكال . اجنتها كبيرة ، شاذلة . ووشانها غشائية ، شفافة . بطنها صغيرة مبعدة . قوائمها نقيطة ، والخلفية منها مستعرضة الاكثار المستنة كالنمل .

٢٤٧١٨ - لَدَعَكَة ، لَسَمَكَة (F). *Piqure* (F). *Prick* (E).

هي المرة من اللدغ بالنم ومن اللسع بالحمة .

٢٤٧١٩ - لَدِيد (F). *Côté* (F). *Side* (E).

جانب المتق وجانب الوادي . اللديان : جانبها الوادي وصفحتا المتق دون الاذنين . ولدنيما الشيء : ناحيته ج الة .

٢٤٧٢٠ - لَدَابَة سَوْدَاة (S). *Empis nigricans* (S).

*Empis noifre* (F). حشرة قانصة من فصيلة اللدائيات . جسمها خلي القشار ، كثيف الملب ، متوسط القد ، يطول من ٩ الى ١٢ م . ثوبها الى السرة السوداء يطولها في صدرها خسة غطوط سود . مكرور . خطمها مستدل الطول . عينها كيرتان ، متلاحتان عند الذكر ، مفترقتان عند الانثى . زباناها صغيران ، اسودان . قوائمها الى السرة السوداء || تسرح حيث تكثر الاعشاب . قصصها الذباب والهام .

٢٤٧٢١ - لَدَابَة هِدَيَايَسَة (F). *Empis muscaris* (S).

*Empis gobe-mouches* (F). حشرة قانصة من فصيلة اللدائيات . جسمها خلي القشار ، وشي الشكل ، صغير القد ، يطول من ٤ الى ٩ م . ثوبها الى السرة الخطية . رأسها كبير الحجم ، شبه مكرور الشكل . عينها كيرتان ، متلاحتان عند الذكر ، فارتقتان عند الانثى ، لونها الى الحمرة المرجانية . خطمها مستدل الطول ، شديد اللش . زباناها مفرقتان ، اشقران . صدرها اسطواني الشكل ، كثيف الحمل . بطنها خاسي السكم ، مردني الشكل . قوائمها حطية || قوتها الذباب والهام تقتصها طائفة .

٢٤٧٢٢ - لَدَائِيَّات (S). *Empididae* (S).

*Empidés, Empididés* (F). *Empididae* (E). فصيلة حشرات خاتلة من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، منتشرة في جميع اصقاع العالم || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، خلية القشار أو محرقة ، مبعة الملب . رؤوسها شبه مكرورة . عينها كبيرة . فارقة عند الاناث ، متلاحة عند الذكور . اعطالها دقيقة متباينة الاحجام والصلابة . انخاضها

٥٠ سم . اوراقها لاطئة يضيئة الشكل . فصلها متبادل التنتين جميل المنظر . ازهارها ضخمة التجميع محورية وعامية الانكازان كبيرة القند قطرها يراوح من ٤ الى ٧ سم . لونها الى الحمرة القرميدية ومنها عاجية || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٤٧٢٣ - لُحْنَيْسُ نَرَج \* (S). *Lychnis viscaria* (S).

*Lychnide visqueuse, Trape-mouches* (F). نوع من اللحنيس البري وهو عشبة معمرة تكثر في المراعي . اوراقها لوزية . ازهارها ابيضانية اللون .

٢٤٧٢٤ - لُحْنَيْسُ زَوْد السَاء (S). *Lychnis coeliosa* (S).

*Lychnide rose du ciel, L. faciniosa, Coquelourde rose du ciel, Rose du ciel, Lamprette* (F).

نوع من اللحنيس البري وهو عشبة حولية تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم . ساقها وفروعها حامدة الزغب . اوراقها ضيقة جامدة النصل . ازهارها حمراء اللون مهدبة البتلات الكاملة . ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٤٧٢٥ - لُحْنَيْسُ زَوْدِي \* (S). *Lychnis flos-cuculi* (S).

*Lychnide fleur de coucou, Fleur de coucou, Œillet des prés, Véronique des jardins* (F).

نوع من اللحنيس وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقها لاطئة ، سنانية النصل ، بحرية اللون . ازهارها مكسية عديدة البتلات الارباعية التشرع للوردية اللون || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٧٢٦ - لُحْنَيْسِيَّات (F). *Lychnidees* (F).

سبط من القرنفلينات ، اشهر اجناسه اللحنيس .

٢٤٧٢٧ - لُحْنَيْات (S). *Cobitidae* (S).

*Cobitidés* (F). *Cobitidae* (E). فصيلة اسماك نهريه من رتبة مفتوحات المثانة لكانت الزعانف . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، كانت تتبع في التصنيف الماضي ، فصيلة الشبوطيات . اعطالها معظم انحر وبجيرات البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها ضيقة ، مستطيلة ، متباينة الالوان . قلوبها صغيرة ونحيلة . زعانفها الظهرية وسيدة توسط الظهر تقابلها الزعانف الخرسية من الجهة السفلى . وتتميز بكثرة عذباتها التي يراوح عددها من ١٠ الى ١٥ وبأسنانها البوموية ويضيق خياشيمها ما يحصلها تراود سطح الماء بكثرة لاستنشاق الهواء الطلق || اشهر اجناسها الخب .

٢٤٧٢٨ - لَدَكَة (F). *Rhodopaxilla* (F).

هو البندك ، ظهر من فصيلة الفاروقيونات ، اطلبه .

٢٤٧٢٩ - لَدَاكَة (F). *Malleabilité, Plabilité* (F).

*Malleability, Plability* (E). القابلية الى الاتواء . وهي ايضا القابلية الى التصفيح في بعض المادان .

٢٤٧٣٠ - لَدَكَة يَطْلَقَة (S). *Ledra aurita* (S).

*Ledre attentive* (F). حشرة من فصيلة اللدريات . جسمها يطول من ١٤ الى ١٨ م . قوتها الى الخطي المنمش بالكسني والاسمر . رأسها مستعرض ضخم . عينها صغيرتان . زباناها صغيران ، ثلاثيا الفصل . كوسلها مزود باطناف شاذلة . صمغتها



لحنيس وردى

من ٢٠ الى ٢٥ م. يستخرج من جذعها بالخز عصرة صنية ولاتنجية تعرف بالخزور. المادي. اوراقها عادية العرف المستحسن. لونها اخضر الازرق العايق. ثمارها كروية الشكل جلوية اللون، طويلا يراوح من ١٢ الى ١٥ سم. وعرصها من ٨ الى ١٠، احشاشها صناعية جيدة الصنف.

### ٢٤٧٧٩ - لَزَان ، لَزَان ، سِيَسُوس

Cytisus (S), Cytisus (F), Broom (E), Kleestrauch (D), Citiso, Avnello (I).

جنس جنبات برية وتربيتية من فصيلة القرنيات الفراضية. انواعه نحو ٣٥ معظمها من نباتات حوض البحر المتوسط. اوراقها مركبة ثلاثية الوريقات. ازهارها عقدية جالسة او متدلية يعلب فيها اللون الاصفر. ثمارها صنية. يزورها عسبة الشكل تحوي بعض المواد المتصهرة الجعالية، ذيفانها شديد الفعالية. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

### ٢٤٧٨٠ - لَزَان اَبْيَض

Cytisus albidus (S).

Cytisus blanche (F).

نوع من اللزان البري والتربتي. بجمته تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. فروصها واقفا شاككة الاطراف. اوراقها مركبة صغرة الوريقات المنقطة. ازهارها بياض اللون. ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

### ٢٤٧٨١ - لَزَان اُرْجَوَانِي \*

Cytisus purpureus (S).

Cytisus à fleurs pourpres (F).

نوع من اللزان البري والتربتي. جنيته تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها معتقة. وريقاتها اهليلجية الشكل مائلة البشرة. ازهارها ارجوانية اللون فردية التجميع المحوري والطرفي. ازهاره يستمر من ايار الى كيب.

### ٢٤٧٨٢ - لَزَان عَطِيطِي الرَّقِي

Cytisus linifolius (S), Cytisus à feuilles linéaires (F).

نوع من اللزان البري الميزول. بجمته تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. وريقاتها لاطنة خيطية خالية البشرة طول نحو ٣ سم. وتعرض من ٢ الى ٣ م. ازهارها كثيفة التجميع طرفية الارتكاز صغرة القند صفراء اللون. ازهاره يستمر من اذار الى ايار.

### ٢٤٧٨٣ - لَزَان سَبِيلِي \*

Cytisus nigricans (S).

Cytisus en épis (F).

نوع من اللزان البري والتربتي. جنيته تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. ساقها قرعاء زياء، زيفها اسفر اللون. اوراقها معتقة. وريقاتها سنانية الشكل طول نحو ٢٠ سم. وتعرض نحو ٨. ازهارها سبيلية متدلية تملو من ١٥ الى ٢٠ سم. لونها الى الصفرة الزاهية. ازهاره يستمر طوال شهر حزيران.

### ٢٤٧٨٤ - لَزَان كَسَاوِيَة

Cytisus canariensis (S).

Cytisus des Canaries (F).

نوع من اللزان البري والتربتي. بجمته صغرة القند متدنية. ساقها قرعاء فناء. وريقاتها بيضية الشكل طول نحو ٧ م. ازهارها طرفية صفراء اللون مستحبة العرف. ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

### ٢٤٧٨٥ - لَزَان مَدِينِي \*

Cytisus maderensis (S).

Cytisus de Madère (F).

نوع من اللزان البري والتربتي. جنيته تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها معتقة. وريقاتها اهليلجية الشكل طول من ٢ الى ٣٥ م. وتعرض من ١٠ الى ١٥ م.

وظايفها منخسية حادة بمجزة الخلف. الجهاز التناسلي عند الذكور خارجي الارتكاز. اناثها اكبر قدماً من ذكورها. تجمع مكثا في التربة وفي جلوع الاشجار النخرة. يرقاها دودية، شبه اسطوانية، خالية السمك، شاككة الجلد. وروصها صغرة قاصحة. تكثرها ذرية. جميعها دامت او واتجة تعيش في التربة او في جلوع الانجرار النخرة، وبعضها قازب يسرح في احوال واصلح المنطق ويجاري الماء.

### ٢٤٧٧٢ - لَدَاج \*

Hématophage (F).

Hematophagous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان يقتل بالدم او قوته الدم.

### ٢٤٧٧٤ - لَرْدِزَبَال

Lardizabal  
جنس نباتات زراعية ليفية عارشة معمرة من فصيلة اللوزيات. مهدا امريكة الجنوبية. لها قومان لردزبال الشيلي ولردزبال البري. اوراقها متماثلة. ازهارها بتفسيجية مابقة. ثمارها لحمية غرضية تستقيق اللون مأكولة يصورها في بلاد الشيلي (كوفيل).

### ٢٤٧٧٥ - لَرْدِزَبَالِيَّات \*

Lardizabaleae (S).

Lardizabaleae (F).

فصيلة نباتات ثنائية الفلقة مستقلة القناعة مرتفعة المبيض، قريبة الشبه من البر بريسات والقمريات. تتميز جنينها الوسيد المسكن والبوروشة. اجتمها وانواعها عديدة معظمها من نباتات البلاد الامريكية. اشهرها اللردزبال واللابي.

### ٢٤٧٧٦ - لَرْمُوس \* ، لَرْمُوس \*

Larimus (S).

Larime (F).

جنس اسمك بحجرة من شاككات الزمانف وفصيلة البهاريات. انواعه المحرونة ثلاثة اصنافها جمار البلاد الحارة. اجسامها اهليلجية الشكل معتدلة التيطيط طول من ٢٥ الى ٣٥ سم. وروصها كبيرة، قصيرة الاعظام، رسية الاشدق. حيونها كبيرة جاحظة. زعانفها الظهرية مستطيلة. ثنائية التركيب. زعانفها الذيلية مزوانية. اثنائها الى الربة الفضية تقيم في الظهور ويملوها تسليج اسد يمتد الى ما يقارب ثلثي الاطال. يطونها الى الشبهة الفضية الشديدة القمان. لها حوبا جيدة الصنف. مرقوب ب.

### ٢٤٧٧٧ - لَرْمُوس \*

Larimus (S).

Larin (F).

جنس حشرات خاضعة من مخديات الاجنحة وفصيلة السويات. انواعه المعروفة عديدة اصنافها المناطق الحارة والمتدلة الحارة من العالم القديم. تألف البراري التي تكثر فيها المهرشات احصاها الاقوس. اجسامها شبه بيضية الشكل. صغرة القند، مستندة المقدم والمخز. قروها الاستعمارية مرفقية، ديبسية الاطراف. كوسلها واغادها ملحقة بقشام من الطيلس الاصعب اللون. ازهارها متباينة الالوان والاشكال الهندسية تكثر فيها السرة والطلحة.

### ٢٤٧٧٨ - لَزَاب \* ، عَرْمَر رُفِيع

Juniperus excelsa (S).

Génévrier de Tauride, G. en arbre (F).

Greek juniper (E).

Moher Wacholder (D).

Ginepro di Crimea (I).

نوع من المرمر اصطناعه تمتد من البلقان الى حلايا. يكثر وجوده في بعض جرد لبنان. ثمرته كبيرة القند تملو



لرموس



لزاب



لزان ارجواني



لزان سنيلي

Neritidae (S).

Nérítidae (F). Neritidae (E).

فصيلة حلازين من الرغويات المدييات . اجناسها وانواعها عديدة معظمها بحري وبعضها بحري ونبوي .

Homophylle (F).

Homophyllous (E).

نمت تعريفي يطلق كل كل نبات مثائل الأوراق المتساوية.

Lasoderme (F).

٢٤٧٩٨ - لَزِيدُورَمَة  
هي النشرة ، اطليها .

Lasiostroma (S).

٢٤٧٩٩ - لَزِيدُورَمَة  
جنس طيور بحيرية من فصيلة الصغيات . وبنيت نصف كروية تنشأ من النسيج المتحار ثم ترتقي الى سطحها . بكتينها كروية الشكل ، تحيط اللق . يوفاته يفضية او مردية || له نوع واحد يهي لزيسترويه الاجاص (Lasiostroma pisorum) . يركب ثمار الاجاص المحفوظة ، عند ارتفاع الحرارة ، فيقرحها ويفنأ .

Déprimage (F).

٢٤٨٠٠ - لَسْ  
رعي المثالية اولاً نبات المرج .

٢٤٨٠١ - لَسَّاس

العشب ما دام صغيراً لا تستمكن منه الرامية .

٢٤٨٠٢ - لَسَّاس

الساس شبة عشقة كلسان الثور وليست به ، (المخيط) .

Lange (F). Tongue (E).

٢٤٨٠٣ - لِسَان  
عضو فضلي متحرك الجسم ، ثابت القاعلة ، مركزه اللحم . وظيفته المصغ والمص والبلع وتكييف الصوت .

٢٤٨٠٤ - لِسَان

سمكة تدعى اللنب ، اطليها .

٢٤٨٠٥ - لِسَان

شبة من الجنية لها ورق متفرش اعشن كأنه المساحي يسو من وسطها قضيب كالذراع طولا في رأسه فورة كحلاء ، (اللسان) .

Potamot (F).

٢٤٨٠٦ - لِسَانُ الْبَحْرِ  
نبات يهي جدار النهر ، اطليها .

٢٤٨٠٧ - لِسَانُ الثَعْل

نبات كثير الفروع مربع طويل الاوراق فيه عشونة ، (ابو حنيفة) .

٢٤٨٠٨ - لِسَانُ الثَّوْرِ الْحَمَلِيِّ

Buglossae officinale (F).

هو الانشودة الحزنفة ، اطليها .

٢٤٨٠٩ - لِسَانُ الْحَمَلِ

Plantago (S). Plantain (F).  
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الحلييات . انواعها نحو ٥٠ منها الحولية والمعمرة جميعها مقرة . اوراقها قرصية الانتشاب متعفة الا لاطة . ازهارها سبلبة التجميع يحملها شراخ مصمت دقيق || اكثر انواعه من الاغشاب الطبية تنفع من السعال والربو وثقت اللحم وقروح اللحم واللثة



لزدة



لزنق



لزيفة

ازهارها طرفية التجميع صفراء اللون || ازهاره يستمر طوال فصل الشتاء .

٢٤٧٩٦ - لَزَانٌ مُسْهِلٌ

Cytisus purgans (S).

Cytis purgatif (F).

نوع من اللزان الطبي البري المشبول . يمتلئ نلوم ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها لاطة بسيطة ، نصلها لسن الصفحة الحرة للثوب . ازهارها الى الصفرة . يزورها وبنورها مسلة || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٢٤٧٩٧ - لَزِيدَة

هي الذبابة القانصة ، اطليها .

٢٤٧٩٨ - لَزَج

Visqueux (F). Viscous (E).

ما به لزوج اي تعلق وتندد وودك يعلق باليد ونحوها .

٢٤٧٩٩ - لَزُوجَة ، لَصُوق

Viscosité (F).

Viscosity (E).

٢٤٧٩٠ - لَزُوق

Empiâtre (F). Plaster (E).

دواء يلزم الجرح او الصدد حتى يبرأ .

٢٤٧٩١ - لَزُوكَة \*

Luzula (S).

Luzule (F). Wood-rush, Cuckoo grass (E). Hasen-

brotmarbel, Marbel (D). Luzula, Luziola, Giunco

peloso, G. secco (I).

جنس نباتات عشبية برية مرعوية علفية معمرة من فصيلة

الاسمايات . انواعها المعروفة ٣٥ ، اصنافها البلاد الممتدة

الحرارة من المابين القديم والجديد . جذورها مذادة . سوقها

فردية منتصبة . اوراقها متعاقبة صفصية ، نصلها خلي البثرة ،

مهدب الحافة ، اغبر المواج . ازهارها حثولية التجميع ،

طرفية الارتكاز . ثمارها حثية . تستعمل لتثبيت الأراضي

الجبلية المنحدرة التي يخشى عليها من انجراف التربة .

٢٤٧٩٢ - لَزُونٌ \*

Falco erythropus (S).

Kobez (F). Red-legged falcon (E).

جنس طير من عمارة الصقور وفصيلة الصقريات . انواعه

قليلة جميعها من القواطع التي تجوب البلاد في طلب الصيد

واللشئ . عدد افراد سرها براوح من ٥٠ الى ١٠٠ وهي

صغيرة القند وبمدة القامة طويلاً براوح من ٣٠ الى ٣٢ سم .

انوائها نمر . مناسرها وبنفون صيرتها وسيفانها الى الحمرة .

ذكورها سمير الرووس والاحتناق والصدور . انائها حور

الرووس والصدور || قوتها الحشرات حل اختلاف انواعها

والشكاها . تدثن في الانجار العالمية . انائها تضع من ٤

الى ٩ فئات تحضنها اربعة اسابيع || اعرف انواعها ما يلي .

٢٤٧٩٣ - لَزُونٌ الْفَرَقِي

Falco erythropus amurantus (S). Kobez oriental (F).

نوع من اللزوين يحوب الشرق حتى روسيا ويستمر حدة

شهور في الحظيرة او مصر والسودان حيث يدثن وكنه

ويبيض .

٢٤٧٩٤ - لَزُونٌ الْغَرَبِي

Falco erythropus vespertinus (S). Kobez vespéral (F).

نوع من اللزوين يحوب آسيه الصغرى واروبه ويستمر

نحو حدة شهور بين جبال الاطلس والستال حيث يدثن

وكنه ويبيض .

٢٤٧٩٥ - لَزُونَة \*

Nerita (S).

Nérica (F). Nerica (E).

جنس حلازين بحيرية من اللزيفيات . انواعها المعروفة

نحو ٢٠٠ جميعها قبيعية الشكل موطنها بحار وشواطئ البلاد

الحمارة .

## ٢٤٨١٧ - لِسَانُ الْعُصْفُورِ الْحَبَلِيّ

Cérinthe retournée (F). هو السرته المغلوبة ، اطبله .

## ٢٤٨١٨ - لِسَانُ الْعُصْفُورِ الصَّغِيرِ

Cérinthe petite (F). هو السرته الصغيرة ، اطبله .

## ٢٤٨١٩ - لِسَانُ الْعُصْفُورِ الْمُرِّ

يعرف باسم حلق ، اطبله .

## ٢٤٨٢٠ - لِسَانُ الْفَرْزَالِ \*

Botrychium (S). Botryche, Botrychie, Botrychion (F). Moon-fern, Moonwort (E). Echte Mondraute (D). Lunaria del grappolo, Sferia cavallo (I).

جنس نباتات عشبية من السراخس . أنواعه نحو ٢٠ أعطائها البلاد الباردة والمعتدلة . تعيش في المواقف الرطبة . تتميز بأكياس يوفها السبيلية لتجميع الباعدة الفتوح .

## ٢٤٨٢١ - لِسَانُ الْقَرَسِ

هو السقندر اللين ، اطبله .

## ٢٤٨٢٢ - لِسَانُ الْكَلْبِ \* ، آذَانُ الْأُرْتَبِ ،

آذَانُ الْفَرْزَالِ

Cynoglossum (S). Cynoglossa, Langue de chien (F). Gipsy flower, Hound's tongue (E). Echte Hundszunge (D). Cynoglossa, Lingua di cane, Erba vellutina (I).

بجلة برية معمرة من فصيلة الحمحميات . ساقها زباه تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها معتقة لسنة . تصلها زباد الزمان الاخير ، حلي البشرة على صفحته . ازهارها عذوقية التجميع ، متجنوية اللون ، بيض الختان . يقال ان جميع اجزائها طيبة قابضة تنفع الالهاك والمفص . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

## ٢٤٨٢٣ - لِسَانُ الْمُرْمَرِ

هو الكلم ، اطبله .

## ٢٤٨٢٤ - لِسَانُ الْوَحْلِ

هو السرخس الخزني من نباتات الطبيعة ، اطبله .

## ٢٤٨٢٥ - لَيْسْتُوسُ أَزْرَقُ \*

Leistus caeruleus (S). Léiste bleu (F). Leistus caeruleus (E).

حشرة قافضة من فصيلة التيريديات ورتبة عذبات الاجنحة تأتف الاخراج الغظلية والمواقع الرطبة والجائتان والحدائق . تخافها ويرقاتها تعيش على ما تقتنصه من حشرات وعلف . جسمها صغير اللد يطول نحو ١٠ سم . ثوبها الى الزرقة الجميلة رأسها صغير الجرم . فكاه ذربان . زباناها عظيميان مستطيلان . عيناه صغيرتان بارزتان . ظهورها متوسط الاحديداب . مستدير الطرف اللامع ، ثماني التحزيز الفمدي . ارسافها خماسية المقل || الاثنى عشر قدماً من الذكر وابنت ثوباً منه واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواسط الخريف . تسرح في النهار . تساف الى ايلول . تتجمع المكن تحت الجلالة والطحالب والعلف || البرقة عند تمام ادراكها تطول نحو ١٦ سم . جسمها اسطواني الشكل . مداسي درواجب . ثوبها الى السمرة . رأسها وشرجها ودرواجها الى السواد الفصحي || طول الاكمال الذي يستمر نحو ٥٥ يوماً ينقضي في بيض عمودي الغور تحفر البرقة على عمق ٥ او ٦ سم .

والطحال والكل وسرعة البول والنزف شرباً والاورام علاه والقروح غداً ، وتمنع العرع وذاه القيل || اشهر انواعه ما يلي .

## ٢٤٨١٠ - لِسَانُ الْحَمَلِ السِّنَانِي \* ، آذَانُ الْكَبْشِ

Plantago lanceolata (S). Plantain lanceolé, Oreille de lièvre (F). Great hen plant, Rib-grass, Ribwort (E). Sotzweigerich (D). Plantagine lanceolata, Lingue à botta (I).

نوع من لسان الحمل الطبي المبدول . أوراقه سنانية لسنة . ازهاره الى الياض التي . مناته الطيبة عديدة كمنافع رفاة .

## ٢٤٨١١ - لِسَانُ الْحَمَلِ الْقَرْيِ ، قَرْنُ الْأَيْلِ

Plantago coronopus (S). Plantain corné de cerf, Coronope (F). Buck's-horn plantain, Star of the earth (E). Hirschwergerich (D). Plantagine cornu di cervo, Minutina (I).

نوع من لسان الحمل الطبي المبدول . أوراقه سنانية مستطيلة ملتفة الختان او مضغفة . ازهاره الى الصفرة الياض . مناته الطيبة منافع رفاة الا ان مادته المنصرية اقل فعالية .

## ٢٤٨١٢ - لِسَانُ الْحَمَلِ الْكَبِيرِ \* ، لِسَانُ كَلْبِ مَصَّاصَةٍ

Plantago major (S). Plantain majeur, P. des oiseaux, Grand plantain (F). Greater plantain, Waybread (E). Grosser Wegerich (D). Plantagine maggiore, Arnoglossa, Pentinervi (I).

نوع من لسان الحمل وهو مبدول في المواقف الرطبة . أوراقه بيضية النصل ، مغشوبة للناضج ، مستطيلة النضج ، بحرية الخصار . ازهاره الى الصفار الاخير . يزوره دقيقة ترغ فيها المسافير . وهو من النباتات الطيبة ، اوراقه الخضرة تقيد في التزييف والحروق والكدمات والحمر . تقطير قمع الزهرية ينفع العين . وعصيره يخافس الحرارة ملطف للحموضة مفاد الدغ الحولم والخشرات .

## ٢٤٨١٣ - لِسَانُ الْحَمَلِ الْمَتَوَسِّطِ \* ، مَصَّاصَةٍ صَغِيرَةٍ

Plantago media (S). Plantain moyen, P. bärd (F). Lamb's tongue, Hoary plantain (E). Mittlerer Wegerich (D). Plantagine mezzana (I).

نوع من لسان الحمل الطبي المبدول ، ازهاره ودية اللون . أوراقه قابضة مجففة تضمد بها الجراح المزمنة والحية . واذا أكلت مطبوخة مع زيلع أنادت في قرصة الاسماء والالهاك المزمن . والمضغفة يملئ اوراقه تشني قروح الدم واللثة القدامية . وحاصل عصيره في صوته يشي قروح الرسم والبروبات التي تسيل منه ( الاطلاقي ) .

## ٢٤٨١٤ - لِسَانُ الْحَبِيبَةِ \* ، لَحْفَةِ

Ophoglossum (S). Ophoglossa, Herbe sans couture, Langue de serpent (F). Adder's tongue, Adder's spear fern (E). Echte Natterzunge (D). Lingua serpentina, Luccia, Erba senza nervi (I).

نبات عشبي طبي بري معم من السراخس ، صغير اللد يطول نحو ٣٥ سم . اوراقه حادة العروق ، يتكر في المئات والمواقع الرطبة . جذوره طيبة تلم الجروح وتفيد الكسح .

## ٢٤٨١٥ - لِسَانُ الْفَسْبِ

هو شوك فرياس ، اطبله .

## ٢٤٨١٦ - لِسَانُ الْعُصْفُورِ

أسم شائع لا يجوز اعكاده لانه يطلق على عدة نباتات مختلفة انصها الدردار والمران والماتق والسرته .



لسان الحمل السنانى



لسان الحمل الكبير



لسان اللززال

لسان الحية



لسان الكلب



لستوس أزرق

الاستوائية || نباتاتها اشجار ومجمرات . اوراقها ابيدة ، متعاقبة متعقة ، قلبية النصال ، أزهارها سليل الجميع . أزهارها خماسية البتلات ، عديدة الابداع ، جميلة الألوان الزاهية ، ثمارها ثنوية || أشهر اجناسها السيتيم .

٢٤٨٣٤ - **لُسَيْتِيَّة** هي الملوك الفرنسي ، اطلبه .

٢٤٨٣٥ - **لُسْتِين** Ligule (F). Ligula (E).  
هنة في ورق التيجليات بين نعل الصفة ونحوها .



لُسوس

٢٤٨٣٦ - **لُسْتِين** Actinella (S). Actinella (F).  
جنس نباتات عشبية طيبة من فصيلة المركبات . انواعه عديدة جميعها هريفة الرائحة مرة الطعم . اوراقها لا قياسية الترتيب والتجميع منها المتعاقبة والقصية والجلمية . أزهارها صفراء اللون وريشتها الزهرية عديدة اللبسات ، تحترق حريانة . بذورها مدهية الشذور || احرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٤٨٣٧ - **لُسَيْتِيَّة** Lingula (S). Lingule (F). Lingula (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات هضديات الارجل وفصيلة السيتينات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد تعيش لاصقة بالصخور المغمورة وبالنبتات البحرية || اصنافها متساوية المصارع ، يفيضة الشوزن ، مستطيلة مبططة ، مقطوعة الرأس ، مدية القعب . مفصلاتها عمادة التنسين . لوانها كثيفة الملب التام اللقبق .

٢٤٨٣٨ - **لُسَيْتِيَّة حَطْبِيَّةُ الْوَرَق** Actinella lineariloba (S). Actinella à feuilles linéaires (F).  
نوع من السنين المحول . ساقها منتصبة فراء تملو من ١٥ الى ٤٠ سم . اوراقها بسيطة غشبية النصل . وريشتها الزهرية صغيرة القد تحمل عشر لبسات اطيلاجية الشكل . تنورها يستمر من ايار الى ايلول .

٢٤٨٣٩ - **لُسَيْتِيَّة كَبِيرَةُ الزَّهَر** Actinella grandiflora (S). Actinella à grandes fleurs (F).  
نوع من السنين المحمر . ساقها مزغبة اللحاء منتصبة تملو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقها وريشة مشرفة . وريشتها الزهرية كبيرة القد ، يراوح قطرها من ٩ الى ٨ سم || تنورها يستمر طوال فصل الصيف .



لِينِي

٢٤٨٤٠ - **لُسَيْتِيَّة تَجْمِيمِيَّة** Actinella scaposa (S). Actinella aculea (F).  
نوع من السنين للممر البادم اللسان . اوراقها جذعية الاوتكار ، ضية الجميع ، مساوية النصل . وريشتها الزهرية مستطيلة اللبسات المنعقة الى الخارج || تنورها يستمر من ايار الى تشرين .

٢٤٨٤١ - **لُسَيْتِيَّات** Linguleae (F). Lingulés (F). Linguleae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات هضديات الارجل اللامفصلية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، معظمها من متحجرات الاحقاب القديمة ، جميعها مبططة كالسان ملتحة باصدانها يسوقات طنية مستطيلة قابلة الانعطاط || أشهر اجناسها واعرقتها السيتنة .

٢٤٨٢٩ - **لُسَيْتِيَّة** Lasthenia (S). Lasthénie (F).  
جنس نباتات عشبية من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة قليلة . سوقها فراء تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها متعاقبة متناوبة النصل . أزهارها وريشية الجميع . قنابات قناباتها ملتحة تشكل اقلاماً احفناً مؤلفة من ١٥ سن . أزهارها مختلفة الألوان يكثر فيها الاصفر . تنورها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٤٨٢٧ - **لُسَد** Téter (F). To suck (E).  
رضع . يقال لسد الفل انه ولد لها : رضع جميع ما في فمها .

٢٤٨٢٨ - **لُسَعَّة** راجع لدغة .

٢٤٨٢٩ - **لُسْتُونِس** Licina (S). Licine (F). Licinus (E).  
جنس خنافس جاسة مفترسة من غديات الاجنحة وفصيلة السنوبيات . انواعها المعروفة ١٢ موطنها حوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها تطول من ١٢ الى ١٨ سم . يكثر فيها الشكل الاهليلجي . اتحادها لافعة ، عمدة وعجيبة . افراسها الى السواد الفضي او الكسني الاسمر الاسفع || تعيش تحت الحجارة او في افاق تخلفها قرب جنوح النبت . تسرح من اواسط الربيع الى اواسط الخريف . قوتها كل ما تستطيع قتله من دويبات ويرقات وديدان .

٢٤٨٢٠ - **لُسْتُونِيَّات** Licinidae (S). Licinidés (F). Licinidae (E).  
فصيلة خنافس جاسة مفترسة من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة اعطائها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة او متوسطة القد ، شبه اهليلجية الشكل . رؤوسها بحرية . قرنها الاستشعارية مركبة من ١١ فصلة . اتحادها لافعة . قوتها نشطة . من ميزاتها ان ازهارا لامتدالة وغالباً مشروية . جوارسها ثنائية الفلق المحيطة . تأثيرها قصيرة وشقيقة . ملاسها الشفوية جزلة || أشهر اجناسها السنوس .

٢٤٨٢١ - **لُسُونِيَّات** Phaneroglosses (S). Phanéroglosses (F). Phaneroglossa (E).  
مرتبة حيوانات من رتبة البتر ، هدمات الذنب ، تشتمل على اثنين وعشر فصائل || جميع حيواناتها من مختلف الفصائل والاجناس تشتمل بوجود اللسان || لها اعضاء حسية والوقائية .

٢٤٨٢٢ - **لُسَيْتِيْم** Lacistema (S). Lacistème (F).  
جنس نباتات مرجعية من فصيلة اللسيتيمات . انواعها المعروفة ١٥ اعطائها امريكة الاستوائية . جميعها اشجار ومجمرات . سوقها منتصبة لفرها . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، متعقة ، جامدة النصال القلبية الشكل . أزهارها منبيل التجميع ، طرفي الاوتكار وعجوري . أزهارها صغيرة ، يكثر فيها اللون الاصفر . ثمارها ثنوية لا تؤكل انما يستخرج منها صباغ احمر شائع الاستعمال الهلي .

٢٤٨٢٣ - **لُسَيْتِيْمِيَّات** Lacistamaceae (S). Lacistamécées (F).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها بعض مناطق امريكة

انيلابها فتبدو زاهية اللون شغافة ثم خضراء زيتونية وتنتهي بالون الاسمر . أما الثآليل المصابة فتبدو كأنها موشة يبدو لا قياسية الشكل والحجم تخفصها الزوان مختلفة قبل ان تستقر على الاسمر الذي يحتمى الغلاف مع الادراك .

#### ٢٤٨٥٣ - لَصَفُ الْعَلَقِ ٥ ، لَصَفُ الْعَوَسَجِ ٥

*Elaeone veneta*, *Plectodiscella veneta*, *Gloeosporium venenum*, *G. necator*, *Phyllosticta rosarum* (S). *Anthracothea du framboisier*, *A. des ronces* (F).  
وصم يصيب الموج والعليق في الفروع والاوراق والثآليل فيؤذيها ويوقع بها الاضرار . سببه فطر مجهري من الفطريات . مظهره الخارجي يقع حواء اللون او بنفسجية ، فطرها من ٣ الى ٥ سم . تركيب الاوراق فتتطيرها وتركيب الفروع تنظفها ، أما الثآليل فتمصرها ٥ يكافح باستعمال سائل يورده المخلول ١٪ في اوائل الربيع .

#### ٢٤٨٥٤ - لَصَفَةٌ

*Cataplasmata* هي البهجة توضع على مكان الألم من الجسم .

#### ٢٤٨٥٥ - لَصُوفٌ

*Gloeosporium* (S). جنس فطور مجهرية من فصيلة الرغيفيات . انواعه عديدة معظمها ملون ٥ مشبه ينمو تحت الطبقة الادمية حيث ينتشر في اللون ثم يتوسع ويحول الى ريشة تقوم عليها الكائنات . قصباته قرصية او سرغولية . يورقاته وسيدة الخلية ، شغافة ، مستطيلة ، مستقيمة او منقطة ٥ وصية متفاوت الاضرار والاذى يمتري الاوراق والثآليل والانتفاخ ٥ احرف انواعه ما يتبع .

#### ٢٤٨٥٦ - لَصُوفُ الْإِسْبَاحِ ٥

*Gloeosporium spinaciae* (S). فطر مجهري تركيب اوراق الاسباح فيؤذيها ببعض البقع المستديرة المتلاصقة السوداء اللون التي تفرعها وتقدم من قيصها التجارية ٥ يكافح باستعمال احد مركبات النحاس .

#### ٢٤٨٥٧ - لَصُوفُ الْيَنْ ٥

*Gloeosporium coffeanum* (S). فطر مجهري تركيب اوراق البن فيؤذيها ويصيب الاذنان فيفرعها ٥ مظهره على الاوراق قطع حطية اللون مستطيلة تركيب حافة النصل فتتفشي على خلايا النسيج الادمية . وهو على الاذنان قروح مستطيلة سمراء اللون تعطب اللحاء وتحيها ٥ يكافح بالقطع الانصاف الموصية وينضخ الاشجار عدة مرات ببض الوسائل المركزة على املاح النحاس .

#### ٢٤٨٥٨ - لَصُوفُ الْبَنْدُورَةِ ٥

*Gloeosporium phomoides* (S). فطر مجهري تركيب ثمار البندورة عند اقترابها من الادراك . يبدو كالبقع الحطية او السمراء اللون يسببها شجج الفطر الذي ينتشر في الطبقة الادمية وتتسع معه البقع السطحية حتى انصداعها الذي يعقبه شيء من الحريان ٥ يكافح باستعمال احد الفطريات المركزة على الكبريت والنحاس .

#### ٢٤٨٥٩ - لَصُوفُ الْجَزَرِ ٥

*Gloeosporium epicarpil* (S). فطر مجهري يصيب لباب الجزر فيطعمه . مظهره الخارجي يقع مستديرة او يضيبة الشكل طلعاء اللون سمراء الهائلة تركيب لباب الثمرة . فان حصلت الاصابة في اثناء النمو اطاحت بالثمرة وان وقمت قرب الادراك سبت حفن اللباب ٥ اضراره غالبا محدودة لا تستوجب المكافحة لانها لا تفوق ٣ او ٥٪ .

#### ٢٤٨٤٢ - لَسْبِيلِيَّةُ الزَّرْعَر

*Liguliflores* (F). نفة من فصيلة المركبات .

#### ٢٤٨٤٣ - لَسْ ٥

اللس هو السباق او موه .

#### ٢٤٨٤٤ - لَسَكٌ ٥

*Echenels* (S). *Echénélde*, *Rémora* (F). Sucking fish, Remora (E). جنس اسماك بحرية من شالكات الزعانف وفصيلة الاشكيات . انواعه نحو ١٥ اجسامها مستدقة ، طولها يراوح من ٢٩ الى ٣٢ سم . تصير بروسها المكلفة سمكات يضيبة الشكل بخدة شائعة تمكثها من الالتصاق بالاسماك والاشياء التي تريد اكلها . وهي تلتصق بالحوث والبال والدلفين والبلابة والبراسم .

#### ٢٤٨٤٥ - لَسَرٌ ٥ ، لِنْخَاصِبٌ ٥

*Homochromie* (F). *Procrapsis* (E).

خاصة تتميز بها بعض الكائنات الحية من حيوان ونبات ، تمكثها من الاختصاص بلون الاشياء التي تحيط بها .

#### ٢٤٨٤٦ - لَشِيشٌ ٥

*Oxyria* (S). *Oxyria* (E).

جنس نباتات عشبية برية ممررة من فصيلة البطباطيات . منها جبال حوض البحر الابيض المتوسط .

#### ٢٤٨٤٧ - لَشَيْبَالِيَّةٌ

*Lachenalia* (F). هي الزجيج من الزيايق ، اطبله .

#### ٢٤٨٤٨ - لَصَافَةٌ ٥

*Zygocène* (F). *Zygoten* (E). دور التطور الميراثي الذي يتميز بتلاصق النشب المتشابهة .

#### ٢٤٨٤٩ - لَصَفٌ

خاصة تمكث بعض الاجسام من تحويل الاشعة الضوئية التي تنقلها الى اشعة ضوئية اطول موجة .

#### ٢٤٨٥٠ - لَصَفٌ

*Clâprier commun* (F). هو الكبر الشائك وهو ثمرة الكبر .

#### ٢٤٨٥١ - لَصَفُ الثَّفَاحِ وَالْإِجَاصِ ٥

*Elaeone piri*, *Plectodiscella piri*, *Spheceloma*, *Phyllosticta rosarum* (S). *Anthracothea du pommier et du poirier* (F).

وصم يصيب الثفاح والاجاص والسفرجل في الانثان والاوراق والثآليل . سببه فطر مجهري من الفطريات ٥ مظهره الخارجي يقع صغيرة كثيرة العدد مشورة بدون ترتيب على نصل الاوراق وطلاء الاذنان وبشرة الثآليل . وعده البقع التي تغلف قطر الواحدة منها نحو المليمتر الواحد تبدو كاسطوانة متنتفة حواء اللون توضعها نقطة يضاء ٥ يكافح باستعمال احد الفطريات المناسبة .

#### ٢٤٨٥٢ - لَصَفُ الْحُمْصِيَّاتِ ٥ ، لُغْلُ

الْحُمْصِيَّاتِ ٥

*Elkinoe fawcetti*, *Spheceloma fawcetti*, *Sporotrichum citri*, *Cladosporium citri*, *Spheceloma citri* (S). *Scab des agrumes*, *Maladie des verrues* (F).

وصم يصيب اكثر انواع الحمصيات في اثنائها واوراقها وثمارها . سببه فطر مجهري يعيش ويتكاثر على التروابي الفنية عندما يكون معدل الحرارة نحو ٣٠ درجة ستينراد . لذلك فهو نادر الزمير في اقليم حوض البحر المتوسط . مظهره الخارجي يقع صغيرة تغلف نصل الاوراق الفنية عند



لسك



لصف الثفاح والاجاص



لصف الحمصيات



لصف البندورة

## ٢٤٨٦٠ - نُصُوفُ الزَّيْتُون \* ٥

*Gloeosporium olivarum* (S). Lèpre des olives, Galla (F).

فطر مجهرى يظهر في آب ويبلغ أوج انتشاره في أواخر أيلول، يركب الثآليل فيوشها ويغطيها || مظهره الخارجي بقع مستديرة تركب غالباً الثمرة فتسبب انقراض السطح ثم انصدام البشرة وغمرها بمادة لزجة يرتقالية تنحرف إلى السرة مع الرطوبة || يكافح باستعمال أحد الموائيل النحاسية.

## ٢٤٨٦١ - نُصُوفُ القُرَيْيَات \* ٥

*Gloeosporium caulivorum* (S). Anthracnose des légumineuses (F).

فطر مجهرى واسع الانتشار يصيب بعض نباتات الفصيلة القرنية، أخصها النفل والبرسيم والفسه والبرن || يركب السوق ومعايق الأوراق فيوشها بقع مستديرة ثم سمراء اللون تصعد البشرة بمد ارتفاع النسيج وانفلاته || يكافح بتطهير البذار بمحلول سلفات النحاس المركز ١ ٪ بمد تغيير موقع الزراعة.

## ٢٤٨٦٢ - نُصُوفُ الكَرَمَةِ \* ٥ ، سُودِيدُ الكَرَمِ

*Gloeosporium ampelophagum* (S). Anthracnose de la vigne (F).

فطر مجهرى يتغلغل على الأوراق والسروع ويتساقط فيوشها ويضع بها أثنه الأذى || مظهره الخارجي بقع صغيرة، مستديرة، لا قياسية التجميع، تركب نصل الأوراق. تبدو حطية، قطرها من ٤ إلى ٤ م. ثم تتسع فينحرف لونها إلى البياض الأفرح تحرق حالة فمية السرة بنفسجية الموانج، تقضي على النسيج المتناثر فتلونها وغتها || وهو على السروع يقع مستطيلة مبيضة تركب اللحاء فتحرقها وتغور فيها حتى الشكوى والمكالك || وهو في المناقيد يقع مستديرة منخفصة تركب الحب فتبدو حطية اللون مبيضة تكثر في المنطقة الخلفية ثم تتسع فينحرف لونها إلى السرة يحيطها أطوار ضيق اسود || يكافح باستعمال سائل بورديو أخضر من ٢ إلى ٣ ٪ أو السائل البورفيرى المخلو ٢ ٪. ومن الضروري اقتطاع وحرق السروع الموصومة.

## ٢٤٨٦٣ - نُصُوفُ اللُّوز \* ٥

*Gloeosporium amygdalinum* (S). Anthracnose de l'amandier (F).

فطر مجهرى يصيب اللوز في أثنائه وأوراقه وتجاره. يبدو على الثآليل فروج لثولية صغيرة، حطية اللون تلوح بالزغب ثم تنخفض وتغور إلى الداخل || وهو يصل الإنسان مشيح يمرض بحرق اللحاء ثم يحف على حين فرة قبل اكتمال نمو الأوراق || وهو على الأوراق يثور مبيضة سمراء اللون تجف وتتمت سمره || يكافح باستعمال سائل بورديو أو أحد الموائيل السلفوكسية.

## ٢٤٨٦٤ - نُصُوفُ اللَّيْمُون \* ٥

*Gloeosporium limeticolum* (S). Anthracnose du citronnier (F).

فطر مجهرى يركب بعض أنواع الليمون أخصها الليمون الحار والدارنج || يبدو على ثوبى الافنان بقع حطية مستطيلة يتألفها على نصل الأوراق بقع شديدة الغضار الاسمر تغلف النصل وتقوده الى الذبول فييبس مع الانثان || يركب الانثان يطوح بها. ويصيب الثآليل فيوشها ويؤقت ثوبها يدان يوشها ينقط حطية اللون تكلم القشرة وتغور فيها || يكافح باستعمال سائل بورديو المركب ٥/٣ ٪ يضاف اليه ١ ٪ من الزيت قبل الانثان وبمد الانتعاش.

## ٢٤٨٦٥ - نُصُوفُ الطَّطَا \* ٥

*Gloeosporium aliborum* (S). Anthracnose de l'hévéa (F).

فطر مجهرى يصيب المطاط في أوراقه وجذوعه فيؤذيه أثنه الأذى || مظهره على الأوراق افراقية بقع كبيرة لاقياسية الشكل، لونها إلى الكهية يملوها موانج زيتي. وهو على الأوراق البالية يقع فمسية سمراء اللون ثم حطية تنصطها نقط سود تقضي على الأوراق فتعطلها || وهو على الجذوع يلطخ مستطيلة حطية يقع غبراه اللون، قطرها نحو ٣ م. تسبب تنفيس اللحاء واسودادها ثم انصدام البشرة ووثل النسيج مع العصارة || يكافح عند ظهوره باستعمال الاملاح النحاسية كما وأنه يحسن استعمال الاسمدة المعدنية التي تنشط النسج الخضرى فتحدون انتشار المرض.

## ٢٤٨٦٦ - نُصُوفُ المُرِّ \* ٥

*Gloeosporium musurum* (S). Anthracnose de la banane (F).

فطر مجهرى يصيب الموز في ثماره الثابتة وللدركة فيعطلها مظهره الخارجي بقع مستديرة أو مستطيلة سمراء اللون تركب القشرة ثم تغور فيها فتصطب الب || يكثر في الموانج الرطبة الحارة. || يكافح عند ظهوره باستعمال الفوطاير المركزة على الاملاح النحاسية.

## ٢٤٨٦٧ - نُصُوفُ بَحْثَرِ مَرِّمِ \* ٥

*Gloeosporium cyclaminis* (S).

فطر مجهرى يركب الاثمار في اول نمجا فيوشها أو يلونها || مظهره الخارجي بقع حطية تركب اتسج فتقبله وتركب زناد الزهرة فتقرحه وتجعه. وهو على الأوراق يقع حطية لا قياسية الشكل والحجم تركب النصل تنصعجه ووثل فيه حركة التبادل التنسي || يكافح باستعمال اوكسيكلورور النحاس المركز ١ ٪.

## ٢٤٨٦٨ - نُصُوفُ \* ٥

هو الفالونين الايضى، اسليه.

## ٢٤٨٦٩ - نُصَاة \* ٥

Indehiscence (F).

Indehiscence (E).

صفة الثآليل والبلور التي لا تنطلق تلقائياً عند الادراك.

أثام.

## ٢٤٨٧٠ - نُصِيف \* ٥

Indéhiscént (F). Indéhiscént (E).

نمت تعريفي يطلق على كل ثمرة أو بذرة لا تنطلق تلقائياً أي طوعياً عند الادراك أثام.

## ٢٤٨٧١ - لُطْ \* ٥

*Lecythis* (S).

*Lécythis*, *Marmite de singe*, *Quacalé* (F). *Monkey*

*tree*, *Sapuaia-nut tree* (E). *Topfbaum* (D).

*Maudorio* della Colombia (I).

جنس اشجار وشجيرات من اللبليات وفصيلة الآسبات. أنواعه نحو ٥٥ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية الافريقية والامريكية. اولها متعاقبة مغطاة امليلية. ازهارها تاجية. ثمارها جراء عليها مستطيلة صميكة الجوانب. سدادتها قلسوية تنفتح من فوق تحوى حدة بذرة مرة الطعم تأكلها القردة وتستهمل في بعض العلاجات الصدرية.

## ٢٤٨٧٢ - لُطْ \* ٥

*Lota* (S).

*Lotte* (F). *Lote*, *Eel-pout* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الباسديات. أنواعه قليلات تألف البسميرات وبياض الانهر الزاكية. اجسامها تطول من ٢٥ إلى ٧٥ سم. حاشتها صغيرة دقيقة لزجة. انثابها



نُصُوفُ الزَّيْتُون



نُصُوفُ الكَرَمَةِ



نُصُوفُ اللَّيْمُون



لُطْ



لُطْ

متماقية معتقة كاملة أليلجية تصغر عند تجفيفها ويستخرج منها ومن لحاء السوق مادة خشبية صفراء اللون . أزهارها خاسية والفصل والبيلات ، عديدة الاسدية ، شمارها خنسية ، صغيرة القدة ، ملونة || اعرف أنواعه وأشهرها ما يلي .

**٢٤٨٨٠ - لُطَّر الصَّيَّاعِينَ (S). Symlocos tinctoria**  
**Symplocos des teinturiers, Lotur des teinturiers (F).**  
 نوع من اللطر البوروي . مهد البلاد الامريكية . ثمرته تملو من مَرَيْن الى سبعة أمتار . افنانها وافنانها الى الصهبة . اوراقها عابلة ، نصلها سيمك الصفحة سكري الطعم . ازهارها خنسية التجميع ، صفراء اللون ، فواحة العرف العطري . ازهراره يستمر طوال شهر نيسان .

**٢٤٨٨١ - لُطَّر اليابان (S). Symlocos japonica**  
**Symplocos du Japon, Lotur du Japon (F).**  
 نوع من اللطر الزبني مهد اليابان . ثمرته تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها ابيدة ماسلة . ازهارها عقودية التجميع ، لونها الى الصفرة الباهية . شمارها حراء اللون . ازهراره يستمر طوال شهر حزيران .

**٢٤٨٨٢ - لُطَّر عَشَقُودِي (S). Symlocos paniculata, S. crataegoides (S). Symlocos paniculé, Lotur paniculé (F).**

نوع من اللطر البوروي . مهد الشرق . ثمرته تملو من ٤ الى ١٢ م . ساقها فراء . افنانها زباء . اوراقها عابلة ؛ نصلها مسن الحافة ، خلي البشرية على صفحته السفلى . ازهارها عشكولية التجميع ، محورية الارتكاز وتاجية . لونها الى الالبيص او الاصفر . شمارها كروية ، قطرها نحو ٨ سم . لونها الى الزرقه || ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .

**٢٤٨٨٣ - لُطَّر عَشَقُودِي (S). Symlocos en grappes**  
 هو الابلاك يستخرج منه مادة قلبية تدعى لطرين .

**٢٤٨٨٤ - لُطَّرِيَّات (S). Symlocaceae (F). Symlocaceae (E).**  
 فصيلة ثنائية كانت في التصنيف الماضي سبطا مسن الاصطركيات . اشهر اجناسها اللطر .

**٢٤٨٨٥ - لَطَّيَّات (F). Lécythidées (F).**  
 سبط من فصيلة الآسيات ، نباتاته لا قياسية الانتظام الوردي تتميز بملوحها من الجيوب الانفرازية .

**٢٤٨٨٦ - لَطَّيَّسَة (S). Lepas (S).**  
**Lépas, Anafie (F). Lepas (E).**

جنس دوبيات بحرية وبهرية من القشريات الدنيا هدايات الارجل وفصيلة اللطيسيات . انواعها المحروقة عديدة منتشرة في معظم بحار وانهر العالم || اجسامها صغيرة . عيونها مزودة . الخلفها خماسية القطر . ارجلها الصدرية هداية || جميعها تتصلق بانابيب كلسية المادة تشبه التنازل تشيدها على الصخور المغمورة وعلى وحاف المرجان وعلى الاعشاب المائية والمراكب .

**٢٤٨٨٧ - لَطَّيَّيَّات (S). Lepadidae (F). Lepadidae (E).**

فصيلة حيوانات بحرية من القشريات هدايات الارجل . اجناسها قليلة العدد اما انواعها فكثيرة منتشرة في جميع بحار العالم || تتميز بمعاليفها التي تنشب في كل شيء مدور من الصخور الى الاصمك .

الى الصفرة تملوا زراكلش مخلفة . سماء اللون . تسرا في الشتاء من كانون الاول الى شباط || لحمها جيد الصنف مستحب الطعم مرغوب فيه .

**٢٤٨٧٢ - لُطَّ بِحَرِّي مِيدُول (F). Lotte de mer vulgaire (F).**

سمكة بحرية تدعى كواحة مبدولة ، اطلبها .

**٢٤٨٧٤ - لَطَّاس (S). Molothrus (F).**  
 جنس طير من فصيلة الكاروجيات . انواعه المعروفة نحو ١٢ جميعها من طيور القارة الامريكية . ثالث السباب والمراعي وصفات مجاري الماء . نظامها الحياتي جماعي . تجميعاتها لاقياسية العدد منها الفوج ومنها السرب || اجسامها تطول من ١٧ الى ٢١ سم . مناقبها مخروطية ، صغيرة وقوية . اجنتها معتدلة الطول . افنانها مستديرة الاطراف . اوراقها معتدلة الارتفاع . اثوابها متباينة التخصيب . انابها اصفر قدما من ذكورها وابنت خشابا . وهي لا تحضن البيض بل تقصه في اعشاش غيرها من الطير ولا تضع في العش الواحد اكثر من بيضتين . يرجع انها تبيض في موسمها الحولي من ١٢ الى ١٤ بيضة || قربها الحشرات المختلفة وبعض البذور البرية || اعرف انواعه واشهرها لطاس الماشية .

**٢٤٨٧٥ - لَطَّاس الماشية (S). Molothrus pecoris (S). Molothrus des troupeaux (F). Cowbird (E).**

ماثر من اللطاس . موطنه بعض مقاطعات امريكا الشمالية . يألث المراعي وصفات مجاري الماء . فوجه يمد من ٢٠ الى ٤٠ زوجا || جسمه رشيق القوام يطول نحو ١٨ سم . ثوبه اسود اللون يملو موج ازرق في الظهر والصدر . حلقه عينه سوداء . مناقده ورساخه الى السرة السوداء . الاثني عادية الموج الازرق || اخلافة مرسة ، خنسية . قوته الحشرات ويمض البلور البرية . يرافق قطعان البقر والبسين فيجمع على ظهورها ويقضي على الاساريع والكزود التي تكثف جلودها || الاثني تضع البيض في اعشاش غيرها من الطير .

**٢٤٨٧٦ - لَطَّحَاتِيَّات (F). Dénatiens (F).**  
 عمارة لطور مجهرية من فصيلة الكتكيات . تتميز ببوها الملون الشديد السمة || اجناسها ثلاثة : الحشف والزرمية والشاطية .

**٢٤٨٧٧ - لَطَّحِيَّات (S). Dematiaceae (F). Dematiaceae (E).**

فصيلة لطور مجهرية من مرتبة الحفانيات ورثة الزرويات . تتميز بجها وكثافتها السوداء اللون ، بويغاتها ثنائية الخلية ، شبيها فرعي الزؤل || اجناسها عديدة تجميعها اربع حارات : البغيات ، الريدانيات ، الزحاميات والزناخيات .

**٢٤٨٧٨ - لَطَّحَة (F). Macule (F).**  
 Macule, Stain, Spot (E).

**٢٤٨٧٩ - لُطَّر (S). Symlocos (S).**  
**Symplocos, Symploque, Lotur (F). Lohd tree (E). Lotbaum (D). Simploco (I).**

جنس اشجار وجيريات برية وزيينية من اللطريات . انواعه نحو ١٦٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة . اوراقها



لطاس الماشية



لطر



لينة



الطول . عينها صغيرتان ، ناشرتان . زباناها دقيقان كسولها قبي الشكل . حقيقتها صغيرة . حنجرتها ظهورها مشعشع بالاحمر والاسمر . ظهرها زبادي اللون ، اصفر العروق . ريشها شفافان . بطنها الى الخلفي الاسمر . يطوق حنجر مصدف . قوائمها نسيطة ، حنطية ، وسمراء المراج || تألف المروج والحفول والبساتين . قوتها ثلاث الاثمار والاوراق الفتية .



لستوم

٢٤٩٠٢ - لُعِيد  
Lagopède (F).  
هو اللغد ، اطبله .

٢٤٩٠٣ - لُغْرِيس الرُّقُوق  
Lyris du prunellier (F).  
فراشة مزودة مشهورة باسم ارقية الخوخ . اطبلها .

٢٤٩٠٤ - لُغُسْتُوم  
Lagostomus (S).  
Lagostoma (F).

حيوان ليون قاضم سجد الجنس والنوع من فصيلة الشفطيات . موطنه فيالي امريكة الجنوبية . جسمه ربع القامة يطول من ٥ الى ٦ سم . وذنبه نحو ١٨ . ظهره مقوس الشكل . رأسه عريض القامة . مقصده تصير مقطوم . سباله كثيفة الغلب الجامد . اذنانا محدلتان بارزتان . جرانوه الامامية قصيرة ثلاثية الاصابع والخلفية طويلة رباعية الاصابع . اطافوه قوية حادة || جمره قسح الارباه يتألف من اربع رداء متراكبة فوق بعضها . مدخله ومخارجه انفاق عديدة تَمُرُّها دهايز متصالية ، تتجمع فيها الاناث من ١ الى ٢٠ يحافظ عليها ويحميها ذكر واحد . قوته الاشباب والجذور وجميع المواد النباتية يغلها الى مدخل جمره || يعيش بجماعات كبيرة العدد . تبلغ مساحة قريته في بنس مناطق الاروفاي نحو ٤ كيلومترات مربعة .



لغوريش

٢٤٩٠٥ - لُغُلُغ  
هو اللغلق الاسود ، اطبله .

٢٤٩٠٦ - لُغُو  
هو نباح الكلاب .

٢٤٩٠٧ - لُغُورِيش  
Lagothrix (S).  
Lagothriche (F).

جنس قرد امريكية من فصيلة السيميات موطنها البرازيل والبنين وكولومبيا والبيرو || اجسامها تطول نحو ٧٥ سم . واذنانها كذلك . التواها الى الكفة السوداء المروج . شارها ناعمة لينة ووثيرة || له فوكان يالافان الثبات والاسراع الجيلية . قوتها النار .

٢٤٩٠٨ - لُغُورِيا  
Lagoecia (S). Lagoecia (F).  
نبات عشبي بري طلي من السكيات . يملو نحو ذراع . اوراقه مركبة ، مشطية ، بحرية اللون : ازهاره خضمية النسيج لونها الى الزرقة . يزور طية وهي دقيقة مستطيلة حنطية اللون مرة اللطم سريفة تغيد الصعد وقتي اللبلم وتقضي على الريح والمضغ .



لغوريا

٢٤٩٠٩ - لُفَاح  
Mandragera (F). Mandragora (E).  
هو اليربوع ، اطبله . ويدي السابريك . قيل ويسى المقد . قال الانطاكي : « وهو يسكن غيان الدم والصفراء وسرقة البول والخفقان ويقطع الاسهال والدم شرابا ويسكن الضربان مطلقا وكذا الصداع لانه ويسبب فيمنع السهر والقلق » .

٢٤٨٨٨ - لُغَاب ، لُغَم ، لُغَام  
Saliva (F).  
Saliva, Spittle (E).  
اللغاب واللغم غليظ حاصل من افراز الفم اللسانية والغاطية للفم . وهو نوعان : اللغاب التكني او المضغي واللغاب البليسي . أما اللغاب اللسانية فهي على ثلاثة انواع : الكفكية والفككية واللسانية || أما اللغام فهو زبد الجبل ينقله من فيه .

٢٤٨٨٩ - لُغَابَات  
Racines de mandragore (F).  
Roots of the mandrake (E).  
جذور اللغاح غراسها كثيرة النقع تستعمل في الصيدلة .

٢٤٨٩٠ - لُغَادَة  
Ethologie (F). Ethology (E).  
درس حياة احيوان ونشاطه الجسموي والنفسي في محيطه الطبيعي .

٢٤٨٩١ - لُغَامَة  
Légume tendre (F).  
New green (E).  
كل نبات لين من احرار البقول . واللغامة ايضا ج لغام . وفي القول المأثور « اما الدنيا سامة وبناتها لغامة » اي قليل البقاء كالنبت اللين .

٢٤٨٩٢ - لُغَل ، يَلُغُوْت اَحْمَر  
Rubs (F). Ruby (E).  
حجر كريم من الالوين المبلور الشفاف لونه الى الحمرة الصنائية الزاهية . اجوده ما جاء من التبت واخند .

٢٤٨٩٣ - لُغَل  
هو الهاليزيه ، اطبلها .

٢٤٨٩٤ - لُغُلَاع  
Réfringent (F).  
Refringent, Refracting (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل ما تحل بخاصية كسر الائمة الضوئية اي تغير اتجاهها .

٢٤٨٩٥ - لُغُلَاعَة  
Réfringence (F).  
Refringency (E).  
العلمة خاصة تميز بها الاجسام الشفافة بكسرها للاشعة الضوئية .

٢٤٨٩٦ - لُغَم  
Saliva des reptiles apodes (F).  
Saliva of apodous reptile (E).  
القم لغاب الزخافات المرقاة الى المادة الدارجل كالحيات .

٢٤٨٩٧ - لُغَمَوَة  
Chienna (F). She dog (E).  
هي الكلبة وبهم من غصها بالكلية الحائل . قالت العرب : اجبر من لومة واغبر من لومة .

٢٤٨٩٨ - لُغُوس  
هو الذئب ، اطبله .

٢٤٨٩٩ - لُغِيْث  
Labli (F). Labiate, Lipped (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل زهرة مغلفة التويج كالشبتين .

٢٤٩٠٠ - لُغَارِيْمَة ، لُغَارِيْمَتَه  
Logarithme (F).  
Logarithm (E).  
علم انساب الاعداد .

٢٤٩٠١ - لُغَاس المُرُوج  
Lygus pratensis (S).  
Lygus des prés (F).  
حشرة غاضلة من فصيلة القسيميات . جسمها صغير انقد يطول نحو ٧ م . ثوبها متراكب الشفحة والصفرة وتتمشج ابيض واسمر واخمر . رأسها صغير محرم . ضفنها مشد

وهو على الدرنات وشاح اسمر اللون يلحف البشرة بكاملها او يمزج منها فيعطها ويتلفها || يكافح باستعمال اسد الفواطير الحديثة او لحول بورود المركز على الشكل التالي :

سلفات النحاس ٣ كيلو  
كلس حراق ٣ كيلو  
ماء ١٠٠ لتر

وبهم من فصل محلول « بورينيون » المركز على الشكل التالي :

سلفات النحاس ٣ كيلو  
كربونات الصودا ٣ كيلو  
ماء ١٠٠ لتر

### ٢٤٩١٨ - لُفَّاشَةُ الْبَيْضِ \*

*Phytophthora nicotianae* (S). Black shank (E).

وصم يسببه فطر مجهري يركب التيج في المشل وفي الحقل. مظهره الخارجي على شتول المشل يبدأ باسوداد وسط السنخ والجذور ثم ينتهي بالمريان والاضمحلال || وهو على شتول الحقل، في اول عهده ، يقع تظهر على الاوراق بيضيه الشكل ، لا قياسية الحجم ، لونها اشد اخضراراً من النسيج الذي يحويها ثم يتحول تدريجياً الى الشقيرة الفاصهة بالسرعة ضمن اطارات خيطة فاصلة قليلة الوضوح . وفي دوره النهائي يذبل الاوراق ويصب السوق ويسبب اسودادها من السنخ وصاعداً على ارتفاع ٢٠ او ٣٠ سم. وعند شق او فلق الشتول المسابة يبدو مكهاجا جافاً متفصلاً متقطعاً اسود اللون || يكافح في المشال باستعمال الفواطير المركزة على النحاس او الزنك ويكافح في الحقل باجتذاب الزراعة في المواعيد الربيعية .

### ٢٤٩١٩ - لُفَّاشَةُ الشَّمْسِ

*Coup de soleil* (F). *Sun scald* (E). عارض يصيب لحاء الاجنار في خلايا نسيجها البشرية والحياتية سببه اشعة الشمس المحرقة التي ترشفها وتستهويها قسراً لحاء السوق الممرضة الى الجنوب ثم يدركها البرد القارس فجأة فيعطها ويسبب يباسها || يكافح ببطلي السوق بالكلس لان اللون الابيض يمنع تخزين الحرارة .

### ٢٤٩٢٠ - لُفَّاشَةُ الصَّبَّارِ ، لُفَّاشَةُ النَّفَمِ

*Phytophthora cactorum*, Ph. *omnivora* (S). *Pourriture du collet*, *Maladie des semis du hêtre* (F). *Crown-rot*, *Omnivorous phytophthora disease* (E). *Kragenfäule*, *Keimlingsfäule* (D).

وصم مؤق يسببه فطر مجهري يركب مختلف النباتات اللحمية وشاتل النباتات الحرجية ويترى النجم بعينه فيضيمه . مظهره الخارجي يقع شقر ثم سمر ، لا قياسية الشكل والحجم تقلب فيها الاضطالة ، تلعب بالنسج فتشبهها || يكافح كثيره من فطور اللغفة بمركبات النحاس او الزنك .

### ٢٤٩٢١ - لُفَّاشُ ، لُفَّاشُ \*

*Distichodus* (S). جنس اسماك ثورية من مقتوحات المثانة وفضيلة السلونيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اجسامها مستطيلة ، ملاحظها عذبة ، اعطائها مقلقة . سهنها صغير اللد مبراشي الطرف ، انموذ انواعه لنش التيل الذي يطول نحو ٦٠ سم. ثوبه الى الحصار القضي الموج .

### ٢٤٩٢٢ - لُفَّالُون

*Cuscuta* (F). هو الكشوث ، الحلبه .

### ٢٤٩١٠ - لُفَّاشَةُ ٥ \*

*Salmo salvelinus* (S). *Ombie*, *O. chevalier*, *Salvain* (F). *Char* (E).

سمكة ثورية يروض من السلونيات ، اعطائها منظم بحيرات اوروبية وتركيا || جسمها كبير اللد ، يطول نحو ٨٠ سم. ثوبها ، عند اكثال ثوبها ، ثنائي اللون ، ظهرها والقمم الاكبر من جانبيها الى الربعة الخضراء . بطنها وما تبقى من جانبيها الى الصغار البرتقالي يطلع موج ردي يمين عند حافة البطن . اما ثوبها في طور النمو فكثير النقط البيض || لحها فاخر الصنف يعتبر من اجود لحوم اسماك المياه العذبة .

### ٢٤٩١١ - لُفَّاشَةُ الْوَرْدِ \*

*Blennocampa pusilla* (S). *Roulease des feuilles*, *Tenthrède des feuilles du rosier* (F). *Rose leaf sawfly* (E). *Kleinste Rosenblattwespe* (D).

حشرة من الظفرنيات ، جسمها صغير اللد اسمر الثوب ، رفاقها مستعدة فبراء اللون تميش على-ورق الوردة فتفخه وتلتحف به ثم تدورده وتضي عليه .

### ٢٤٩١٢ - لُفَّالِيَّةُ

*Diplolène* (F). جنس ثنائيات جنبيه من السدايات تدعى عيته ، اطلبها .

### ٢٤٩١٣ - لُفَّتْ \*

*Brassica rapa* (S). *Rava*, *Navet* (F). *Rape*, *Turnip* (E). *Wasserrübe*, *Welsche-Rübe* (D). *Rapa* (I).

بقلة زواحية من فصيلة الصليبيات . جذرها مستدير الشكل مقطوع ، يؤكل طرياً ومطبوخاً وخلاً ، ومنه ضرب علفية كبيرة تأكلها الابقار والخنازير || جذره زيتية طيبة تحوي بعض الصغور والمواد الحريفة المهيجة . وقد شاع استعمالها للانماط منذ زمن القراصة الذين اطلقوا عليها اسم (دمج) اي جز اللفت او زيت جز اللفت.

### ٢٤٩١٤ - لُفَّتْ بَرِّي

*Raponce naine* (F). هو التيتويه الرضية ، اطلبها .

### ٢٤٩١٥ - لُفَّتِيَّةُ

*Napiforme* (F). *Napiform* (E). تمت تعريفه وصي يعلق على الجذور القصيرة المستطيلة التي تشبه اللفت .

### ٢٤٩١٦ - لُفَّاشَةُ

*Phytophthora* (S). جنس فطور مجهريه من مارة الرصنيات وفضيلة الصنائيات تتميز بظهورها البولية الناجية الارتكاز والتشمب || انواعها عديدة . اشهرها واغبرها للاقتصاد الزراعي لفشة البطاطا ولفشة التيج ولفشة النقم .

### ٢٤٩١٧ - لُفَّاشَةُ الْبَطَّاطِ \*

*Phytophthora infestans*, *Botrytis infestans*, *B. devastatrix* (S). *Mildiu de la pomme de terre* (F). *Potato blight* (E). *Kraut-und knollenfäule der kartoffel* (D).

وصم وريح العاتية يسببه فطر مجهري يترى منظم لكتات الفضيلة الباذنجانية واعصها البطاطا والبندورة || يركب الورق والسوق والجذور والدرنات . مظهره الخارجي على الاوراق يقع لا قياسية الشكل والحجم تبدو خشية اللون ثم تتحول الى السرة يقابلها على صفحة النصل السفلي غبار ابيض فسجاني ، يطو حمار البقع فيحدها ويستقر بعض الرقت الى ان يشمل الذبول كامل النصل فيطرح به .



لُفَّاشَةُ



لُفَّاشَةُ الْوَرْدِ



لُفَّتْ (١)



لُفَّتْ (٢)



لُفَّةُ الْبَطَّاطِ



لُفَّةُ الْبَطَّاطِ



لُفَّاشَةُ



لقوت المنوسط

Pompilus (S). **لق-٥\* ، لِقْه٥**  
 Pompile, Centrolophe (F).  
 جنس حشرات من فصيلة اللقيبات . أنواعه عديدة منتشرة في معظم البلاد المتدلة الحارة . جميعها متوسطة القد هيفاء الجسم تطول نحو ٣ سم. ألوانها إلى السواد اللامع يملو جميع متفرس احمر اللون أو اصفر. تتميز بخصائصها وتغيرها الناكب التي تدخرها في مكانها كذا لبنها الحديث النصف .

Inoculum (F). Inoculum (E). **لِقَاح** - ٢٤٩٣٥  
 الجرثومة النقية الصالحة للتلقيح .



لقية

Vaccin (F). **لِقَاح ، طْعَم** - ٢٤٩٣٦  
 لقوة محدودة الفاعلية النسبية تحقن في جسم الحيوان لروايته بعد حدوث اللقطة المقصودة .  
 Eteules, Glanure (F). **لِقَاط ، لَقَاعَة** - ٢٤٩٣٧  
 ما يخطئه الحاصد من السبليل فتلخظه الناس .  
 Gleanings (E).



لقير

Colaptes (S). **لِقَاط - ٢٤٩٣٨**  
 Colaptes (F). Flicker (E).  
 جنس طير من فصيلة القواريات ورتبة المتسلقات. أنواعه المعروفة ستة جميعها أمريكية المله إلى أجسامها معتدلة القد تطول من ٢٧ إلى ٣٥ سم. يسطها فراجح من ٤٥ إلى ٥٥ سم. ألوانها إلى السمر الداكن واللغة والقرقرة بالأصفر والاحمر والأشهب. تتميز بمتابعتها المستمرة الفجوة وبإرسالها المستطيلة « قوتها » الأسرار والنبذات والنمل والحشرات وتآثر البرية والبلور والبول. وهي من الطيور الخازنة التي تجمع البلوط في تجاويف الأشجار ويحويها قوتن بذلك مونة فصل الشتاء « أناتها تملأ في تجاويف الأشجار وفي صلبها وتبيض من ٦ إلى ٧ بيضات على مرتين في الحول . الصغار تسرح في طلب القوت بعد التفك بأسبوعين « أشهر أنواعه المعروفة :

Colaptes chilensis (S).  
 Colaptes du Chili (F).

لقاط الفيل

Colaptes mexicanus (S).  
 Colaptes du Mexique (F).

لقاط المكسيك

Colaptes auratus (S).  
 Colaptes doré, Pic doré (F).

لقاط ملعب



لقاط

**لَقَاعَةُ الْعُلْجُومِ - ٢٤٩٣٩**  
 Hypoderma bovis (S). Hypoderme du bœuf, Varron (F). Ox warble fly, Cattle grubs (E). Dasselfliege (D).  
 حشرة من الصيديات ، طولها يراوح من ١٢ إلى ١٥ سم. وهي كبيرة الرأس ، قصيرة الطم ، مستطيلة المز. تمتص مكبا على ظهور البقر فينتج عن رقات عريضة خبيثة تغلفها البقرة بلسانها من جلدها إلى حلقها فليتها حيث تنسل وترقى حتى التسج الجلدية فتنتج الجلمع عن انتهاء دورها البري وتنتقل على الأرض فتضخ في التراب فتتمول إلى كزود ثم إلى حشرة تليد سيرتها الازل .

**لَقَاعَةُ الْعُلْجُومِ - ٢٤٩٤٥**  
 Lucilla bufonivora (S). Lucille du crapaud (F).  
 حشرة من الصيديات ، طولها يراوح من ٨ إلى ٨ سم. ألوانها إلى الخضار الفاتح تكثر في الأماكن الرطبة . رقاتها طفيلية تركب جمع الصفادح أعصها العُلجوم .



لقاعة البقر

Lophoceros (S). Lophote (F). **لَقُوت** - ٢٤٩٣٢  
 جنس أسماك بحرية من فصيلة التلمبيات. أنواعه المعروفة قليلة العدد أصلها بحار البلاد الحارة والمتدلة . أشهرها لقوت المتوسط .

**لَقُوتُ الْمَتَوَسِّطِ - ٢٤٩٣١**

Lophotes cepedianus (S). Lophote de la Méditerranée (F).

نوع من اللقوت وهو سمكة بحرية مأكولة لحمها متوسط الصنف . جسمها مبسط الشكل يطول نحو ١٥٠ سم. زعنفتها الظهرية تمتد من قبة الرأس إلى طرف الذنب وتنتهي عند الرأس بقرن عذب غروطي الجسم عظمي المادة . ثوبها إلى الخضار الرصاصي تملو رقعة بيضاء .

Laphygma exigua (S). **لَقِيْعَمَة - ٢٤٩٣٥**

فراشة من فصيلة الليليات موطنها البلاد الحارة . طولها يراوح من ١٢ إلى ١٤ سم. يسطها نحو ٢٥ سم. جسمها وروشتها الأبيضان إلى الرمادي الباق . ورشتهاا الخلفيان إلى الأبيض الأفر ، أطرافها وأعصابها سحر « الاثنى أكبر قدأ من الذكر تمتع مكبا الذي يد نحو ٥٠٠ كتأ متفرقة لا قياسية الشكل والعدد هل صفحات أوراق القطن المغل فبنتف به متته بثلاثة أو أربعة أيام من رقات تسليح خمس مرات . طولها البري يدم من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وقد يطول أكثر من هذا في الشتاء . ثم تتمول في التربة إلى طرداء « أجسامها الحولية عديدة « النسي يدم نحو ٣ أسابيع وللشوي من ٤ إلى ٦ أسابيع « رقاتها تدعى دودة القطن الخضراء « الملهبا .

Lévulose (F). **لَقَبُولُوز ، لَقِيلُوز** - ٢٤٩٣٦

Levulose (E).  
 سكر من السكر ينتهي إلى فة التلوكوز يورته في معظم ثمار الفاكهة وفي الحسان والصل .

**لَقِيمُوم ، هَوَيْسَة ، أَم هَوَس** - ٢٤٩٣٧

Lophiomyia imhausii (S). Lophiomyia d'imhaus (F).  
 حيوان لبون قاصم من فصيلة اللقيبيات . موطنه تمتد من حوض البحر الأحمر إلى الحبشة . يألف الزرع والأدغال والخراج المتباعدة الأشجار . ملجنه الحيائي جامي . جماعته قليلة العدد إلى جسمه مستطيل الشكل ، يطول نحو ٤٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٥ سم. يتميز بكثرة من الورب المستطيل الخشن تمتد من قعر الرأس إلى أواخر الزام الثالث من الذنب . رأسه صغير القد ، غروطي الشكل ، مبسط الجرم . سباله كثيف مستطيل . ميناء وأذناه صغيرة . قوائمها قصيرة ، خاصة الأصابع . ثوبه إلى الكلسة السوداء مملوفا متعشع أفر في الرأس والظهر والبطن . طرف ذيله أمرط عادم الورب « مسرحة دجوي . يتسلق الأشجار بقوة السنباب . قوته الجلود والأوراق والحبوب والبلور .

**لَقِيمُومِيَات - ٢٤٩٣٨**

Lophiomyiidae (S). Lophiomyiidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة من رتبة القوارص . اجتماعها وأنواعها قليلة العدد . أصلها تمتد من حوض البحر الأحمر إلى أفريقيا الشرقية والحبشة والسودان وأفريقية الوسطى إلى اجتماعها صغرة القد ، مستطيلة الشكل ، كثيفة الورب ، مستطيلة السبال والأذنان الكاسية . قوائمها قصيرة ، خاصة الأصابع . حادة البرائن القليلة التجمين « جميعها شاجرة . قوتها الجلود والأوراق والحبوب والأمار وبعض البثور .

**Glasse (F). Gleaning (E).** ٢٤٩٤٦ **لَقَط**  
اللقط واللقاط هو جمع السبال التي يخطنها الحامد تفتيق في الحقل بعد الريجاد .

٢٤٩٤٧ **لَقَطَلَة**  
« بقلة طيبة تبغها الدواب » ج . لقط .

**Défaut apparent (F).** ٢٤٩٤٨ **لَقَع**  
**Visible default (E).** العيب الظاهر .

**Happer (F). To snatch (E).** ٢٤٩٤٩ **لَقَفَ**  
**Parol (F). Coast (E).** ٢٤٩٥٠ **لَقَفَ**  
اللقف جانب البئر والحوض . ج القاف .

**Ciconia (S).** ٢٤٩٥١ **لَقَلَقَ** و **لَقَلَقَ**  
**Cigogne (F). Ciconia, Stork (E).** اللقلاق . جنس طير من فصيلة اللقلاقيات ورتبة طوال الساق . صوته لقلقة . انواعه خمسة جميعها من القواطع طويلة السيقان والاعناق والمناظر . قوتها الاناعي والبرذآن والحشرات والجيف والتفانيات || اشهر انواعه .

٢٤٩٥٢ **لَقَلَقَ اَبْيَضَ \*** و **بَلَارَجَ** ، **اَبُو حُدَيْج**  
**Ciconia alba (S). Cigogne blanche, C. commune (F). White stork (E).** نوع من اللقلاق ابيض الثوب ، اسود القوائم ، احر الساقين والمناظر . طوله نحو ١١٠ سم . وبسطه نحو ٢٣٠ سم . مسرعه يمتد من ايران الى العراق وآسية الصغرى وأروبة وأفريقية الشمالية والجنوبية والشرقية حيث يعطي فصل الشتاء ثم يعبر البحر الى ايران والعراق .

٢٤٩٥٣ **لَقَلَقَ اَسْوَدَ** ، **لَقَلَقَ** و **عَنْزَر** ، **اَبُو سَعِيد**  
**Ciconia nigra (S). Cigogne noire (F). Black stork (E).** نوع من اللقلاق طوله نحو ١٠٠ سم . وبسطه نحو ٢١٠ سم وهو اسود الثوب ، ابيض الكفنين والذنين والصدر والبطن والافخيك ، احر الساقين والمناظر . مسرعه يشغل الهند ومنشورية وآسية الصغرى وأروبة وأفريقية .

٢٤٩٥٤ **لَقَلَقَ الْاَقَاعِي**  
هو الكريم المتوج ، اطليه .

٢٤٩٥٥ **لَقَلَقَ حَمَلِيَّ \*** ، **عُنَاز**  
**Ciconia abdimii (S). Cigogne d'Ethiopia (F). Ethiopian stork (E).**

نوع من اللقلاق ، طوله نحو ١٠٠ سم . وبسطه نحو ٢٠٠ سم . ثوبه الى السواد الابنوازي . المراج . بطنه ابيض . رأسه وقوامه سود . حقه وبقاها وساقاه حر . يكثر في الجبفة ويحجب معظم الاقطار الافريقية .

٢٤٩٥٦ **لَقَلَقَ مَسْرُوجَ المِشَار**  
هو الكثير الانربي ، اطليه .

٢٤٩٥٧ **لَقَلَقِي** من الطير ، اطليه .

**Ciconiidae (S).** ٢٤٩٥٨ **لَقَلَقِيَّات**  
**Ciconiidae (F). Ciconiidae (E).** فصيلة طير من طوال الساق ورتبة باشلويئات الشكل . انواعها المروفة ١٧ بعضها ابد اعطانه البلاد الاستوائية والحارة والبعض الآخر قاطع يحجب البلاد في طلب المصيف والمشي || ملجئها الحيواني زويجي وجاعي . قوتها الصفادع

**Lucilia sericata (S).** ٢٤٩٣٦ **لَقَاعَةُ حَمَلِيَّة \***  
**Lucille soyeuse (F).** حشرة من الصيديات ، طولها براوح من ٧ الى ١٥ سم . جسمها خمل البشرة يكثر ويبدوها من اذار الى تشرين الثاني . رقاتها هواكة وثائلة وقد تكون وانجة وطفيلية .

٢٤٩٣٧ **لَقَاعَةُ قِصْرِيَّة \*** ، **لَقَاعَةُ خَضْرَاك \***  
**Lucilia caesar (S). Lucille impératrice (F).** حشرة من الصيديات ، طولها براوح من ٧ الى ١٢ سم . تظهر من نيسان الى تشرين تكثر على الازهار والاقطار المعرضة لاشعة الشمس ، رقاتها وانجة وهواكة . تركيب الحيوانات القفارية .

٢٤٩٣٨ **لَقَاعِيَّات \***  
**Calliphoridae (F).** هي الصيديات فصيلة حشرات ذبابية من ذوات الجناحين .

٢٤٩٣٩ **لَقَاعِيَّة \***  
**Freluche (F). Butterfly-net (E).** جيب ، مخروطي الشكل ، من النسيج الناعم المتين ، يستعمل لاقتناس الحشرات والقرشات .

٢٤٩٤٠ **لَقَاعِيَّة \***  
**Phagocytose (F). Phagocytosis (E).** عمل ارتشاف المهتامات والجراثيم التي تقوم به بعض الحبيريات الحيوانية .

٢٤٩٤١ **لَقَاعِيَّة \***  
**Phagocyte (F). Phagocyte (E).** اللقاعة حبيرة في الجسم الحيواني وظيفتها اللقاعة . وتسمى راعية وفانغوسيت وعضامة .

٢٤٩٤٢ **لَقَاعِيَّ**  
**Phagocytaire (F). Phagocytic (E).** نمت تعريفي يطلق على كل ما هو خاص باللقاعة .

٢٤٩٤٣ **لَقَاعَةُ سَوْدَاء \***  
**Centrolophus nigrus (F).** سمكة بحرية تدعى رطلية ، اطلها .

٢٤٩٤٤ **لَقَس**  
**Epinephelus (S). Epinéphèle (F).**

جنس اسماك بحرية من فصيلة الصرانيات ورتبة شائكات الزعانف . انواعه المروفة عديدة منتشرة في معظم مجار انهار اجسامها اهليلية الشوزن ، متوسطة الحجم ، مستطيلة الرؤوس ، مقطوعة الاضطام ، مسنة الزعانف الاسامية في الظهر والذنين . الوابها كستنية اللون تملوها رقشة ملونة وبعض الماجات الزاهية والمابقة || اشهر انواعه اللقاس الجبار والصغري والرملي .

٢٤٩٤٥ **لَقَسُ جَبَّار \*** ، **صُرَّان جَبَّار**  
**Epinephelus gigas (S). Epinéphèle géant, Serran géant, Marou (F). Epinephelus gigas (E).**

سمكة بحرية يمرض من اللقاس . اعطائها البحر الايطسي المتوسط . جسمها كبير القد اهليلي الشكل ، يطول نحو ١٠٠ سم . ثوبها الى الجلالة الخنطية السمراء المواجه تملوها رقشة لبراه منسوبة التوزيع تكتنفها من الرأس الى الذنب || فاكها مقطوم الخطر الاطلس . فكاسها كيران . شدلها راسب . حينها كيرقان ، معدنات النشوز . زعانفها الظهرية والذرية مستطيلة يملوها في اقسامها الاول مناعس حادة وزعنفها الذيلية متفرجة الطرف المستدير || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .



لقاعة قيصرية



لقس جبّار



لقلق ابيض



لقلق حشبي

حافقة . تحمل في مؤخر اجنتها الخلفية زوائد دقيقة . مكبا مستدير الشكل . ذري القد . رقابها قصيرة غليظة تستطيع اخفاء رؤوسها تحت حلقها الصدرية الايل . غادرتها عاريات . يأتها لا يقاسي النمط والشكل يختلف مع الاجناس ، فيه المتدب المائلة بؤخرها والمطوقة المائلة بطنها والمنسقة والسليمة . الخ .



لقمة الحمل الحيفة

٢٤٩٦٧ - **لِقْمِيَّةُ الْبَازِيلَا** \* *Lycaena baetica* (S).  
*Licène des pois* (F).  
حشرة من القنليات كثيرة الانتشار وسيدة الجبل الحولى . اقليمها حوض البحر المتوسط . يستطاع نحو ٣٠ م . ثوبا الى الزرقاء الجسدية يملو موج خلي وأطراف اغبر في الذكور ، اسمر في الاناث . قرونها الاستشعارية دقيقة ، قوسية الشكل ، صقبة الطرف || رقابها عند اكبال تطورها تطلو نحو ٢٠ م . ثوبا الى الخضار المائى يملو موج بني لا يخلو من الاحمر وسط اسمر قاطب وضطوط جانبية متعززة غيراه المون || تركيب البالا والباقية واكثر القنليات . تعيش داخل السقات تلثم الحب وتقضي عليه .

٢٤٩٦٨ - **لِقْمِيَّةُ الصَّعْتَر** \* *Lycaena arion* (S).  
*Licène arion* (F).  
حشرة من القنليات صغيرة القد ، زرقاء القوب ، مزركشة الرواشن . اناتها اكبر تمأ من ذكورها واحب لونا ولق زواكش || رونغها دقيقة الجسم ممرار اللين وودية المراج . تركيب الصمتر حتى اسنلنها الرابع ثم تقسم فرى السل فتلثم الرصع .



لقمة النجمة

٢٤٩٦٩ - **لِقْمَةُ** \* *Aigle femelle* (F). She eagle (E).  
الغراب الانثى .

٢٤٩٧٠ - **لِقْمِيَّات** \* *Leucosiidae* (S).  
*Leucosidés* (F). *Leucosidés* (E).  
فصيلة دوبيات بحرية من القنريات عشاريات الارجل محرمحات الاقواء || اجناسها وانواعها قليلة العدد ، نحو ٥٠ ، منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها صغيرة بيضيه الشوزن او مكورة . محدودة الطهر و مقرزة المقدم والمؤخر . ملاطها دقيقة و مسطيلة ، سنية الشفائر الداخلية .



لقمة البازيلا

٢٤٩٧١ - **لِقْمُوتُ** \* *Leucothoe* (S).  
*Leucothoë* (F). *Leucothoe* (E).  
الاسم العلمي من الميثورلوبياء الافريقية . جنس جنبات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الخنليات . منها بعض الاصناف الامريكية . سوقها متصبية تعلو من متر الى ثلاثة أمتار . اوراقها متعاقبة ، مسنة الختار . ازهارها خاسية النصل ، اسطوانية التويجات ، عشارية الابدية ، يكثر فيها اللون الابيض || انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية .



لقمة الصمتر

٢٤٩٧٢ - **لِقْمُوتُ حَسَفَة** \* *Leucothoe catesbaei* (S). *Leucothoë spinulose* (F).  
نوع من القموتة التزيينية . ساقها فروع تعلو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها مسنة . اعتانها الى احمر . نصلها احليجية ذرية مسنة الختار و مسطيلة الانسان الحسفة الشاذة . ازهارها غصي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها بيضاء اللون ، ناشطة العرف انتف || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

والغطاء والشعابين والاسماك والقنريات والقنوام الصغيرة والحشرات . بعض انواعها ، احصها الكثير ، يعيش على الجرف وقد يمتد الى النور التي تحشاء عندا تصيب جيفة || اجسامها عصبليية متباينة الحجموم ، منها الوسطى والكبيرة . تتميز باستطالة القوام والمناظيد الكبيرة ، المستقيمة ، الذرية ، الوشيبة الشكل . جميعها بيكية ، عادمة الجهاز الصوت || تدثن احشائها في المواقع الرطبة وفي اعالي الانجار الباسقة . اناتها تنفع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور من ٣ الى ٥ يوماً .  
اشهر انواعها القلق الابيض ، والاسود ، والحبيشي ، ولغلق الافاعي المعروف بالكرم المتوج ، والمكبر ، والسطام ، والارطل المعروف بابي سن .

٢٤٩٥٩ - **لِقْمَةُ** *Condyle* (F).  
نوع المفالصل او حيد مستدير في العظام .

٢٤٩٦٠ - **لِقْمَةُ الحَمَلِ ، لُوتِيّ ، حَمُول** \* *Alternanthera* (S). *Alternanthera* (F). *Chaff-flower* (E). *Weckelskölbchen* (D). *Alternanthera* (I).  
جنس نباتات برية وزراعية بقلية من فصيلة القنليات . انواعها نحو ١٠ جميعها احشاش حولية او معمرة . اوراقها كثيرة العدد لا قياسية الشكل والحجم . ازهارها مزورة عادمة الطلادة يكثر فيها اللون الابيض . اوراقها صحية تنفع للمدة .

٢٤٩٦١ - **لِقْمَةُ الحَمَلِ العَفِيَّة** \* **لِقْمَةُ الغَزَالِ ، حَمُول لَاطِي** \* *Alternanthera sessilis* (S). *Alternanthera sessile*, *Brède-chevratte* (F). *Sessile flowered globe amaranth* (E). *Garneleukraut* (D). *Alternanthera di molucca* (I).  
نوع من لقمة الحمل اوراقها كبيرة القد لاطة . تترك ملطية . تنفع المدة وتفيد النص .

٢٤٩٦٢ - **لِقْمَةُ القَاضِي** \* *Ottelia* (F).  
هي اذن الشيطان ، اطلبها .

٢٤٩٦٣ - **لِقْمَةُ النَجْمَةِ** \* **كَبَاش ، مِخْبِطَة** \* *Plantago ovata* (S). *Plantain triomphe* (F). *Spogel plantain* (E). *Spogel Wegerich* (D). *Lingua d'agnello* (I).  
نوع من لسان الحمل وهو نبات عشبي ، مقري ، بري ، طبي ، معم ، يكثر في المواقع الرطبة .

٢٤٩٦٤ - **لِقْن** \* *Lutsje* (F). *Luting* (E).

٢٤٩٦٥ - **لِقْنَة** \* *Lagune* (F). *Lagoon* (E).  
اللقنة كل بحر قريب القاع وقد تكثر فيه الحشاش والحورم . ج ليقنا .

٢٤٩٦٦ - **لِقْنِيَّات** \* **هَرَضِيَّات** \* *Lycenidae* (S). *Lycenidae*, *Lycénidés* (F). *Lycanidae*, *Hainstreake*, *Gossamer wings* (E). *Blau-linge* (D).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اجسامها متوسطة القد ، قوامها الانامية ناقصة التركيب . اسراع ذكورها حيدة القلة . قرونها الاستشعارية تفلظ مع ابتعادها عن الرأس . اناؤها

Chêne chevreul (F).

٢٤٩٨٢ - لُكَاع

هو السنديان الأشعر ، اطلبه .

٢٤٩٨٣ - لُكَاث ، لُكَاثَة

داه يأخذ الثمن في اشدها ولفها وهو مثل القرع .

٢٤٩٨٤ - لُكَاث

اللُكَاث : الحجر البراق الالسل يرببه في الجص .

Lachesis (S).

٢٤٩٨٥ - لُكَاذَة

Lachésis (F). Lachésis (E).

جنس حيات سرلودة سامة من أنبويات الاحادية وفصيلة الافقيات . أنواعها المروفة نحو ٤٠ موطنها بعض مناطق امريكا الجنوبية والوسطى اغصها المناطق الاستوائية || اجسامها كبيرة تفول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . رؤوسها غليظة شبيه بؤروس ذوات الاجراس وتحتل مثلها بقر واضحة بين العين والانوف . اعناقها دقيقة واذنابها كذلك . اذنانها تحمل من ١٠ الى ١٢ صف من الحراشف الشاذكة المنقطة كالكلاليب . انوبها تختلف مع الانواع معظمها مرقط بالاصفر والاحمر والاشفق والاشهب || اشهر انواعها الكَاذَة الصاعدة والكَاذَة السانبة .

٢٤٩٨٦ - لُكَاذَة سَيَّالِيَّة \* ، سَنَان الرُومِ \*

Lachesis botrops (S).

Lachésis lancolé, Fer de lance (F).

نوع من الكَاذَة . موطنها جزر الفيليبين . تألف الغابات والمواقع الرطبة . يكثر وجودها في زراعات المصان والموز . قوتها القفران والجردان والصفاد والمظاء والتانير الصغيرة والطيور || جسمها يطول نحو ٢٠٠ سم . ثوبها الی الصفرة التحاسية الموج . سمها نافع . لدغتها تقضي على الانسان باقل من ثلاث ساعات .

٢٤٩٨٧ - لُكَاذَة صَامِيَّة \*

Lachesis mutus (S).

Lachésis muet (F).

نوع من الكَاذَة . موطنها بعض مناطق امريكا الاستوائية . تألف الغابات الرطبة ولا تقترب من الاماكن الآمنة . قوتها كل ما استطاعت اليه من حيوان وطيور || جسمها يطول نحو ثلاثة امتار . ثوبها يراوح بين البرتقالي والالوانى ملون بترابون سود ورقيقة شهباء . سمها زافع . لدغتها تقضي على الانسان باقل من ساعة .

Odynerus (S).

٢٤٩٨٨ - لُكَاع \*

Odyneré (F). Odynerus (E).

الواحدة لكاعة . جنس حشرات قانصة وثامة ناعمة من الحمويات فشاقيات الاجنحة المحصورة وفصيلة الدغاسيات . انواعها المروفة نحو ٣٠٠ منتشرة في جميع اقطار العالم .|| اجسامها متوسطة القد ورحاتها كذلك . انوبها ملونة يكثر فيها الاسود المجلع بالاصفر او الالوانى او البرتقالي وبعضها جلوي مجذع بالاصفر الذهبي وشبه الاخر القرميدي المجلع بالاصفر الكبريتي والاسود || تصفن في التربة والحيطان والاشجار النخرة وفي ملايات القصب . اصنافها رداء راحة مخروطية المداخل المستطيلة || قوتها الاساريع والاعاصيص تقتنصها فتفخدها وتنقلها الى اصنافها زادة لها وليرقاتها .

٢٤٩٨٩ - لُكَاع \* ، رِيَّس \*

الواحدة لكاعة . جنس نباتات ترينية من فصيلة النخلات .

٢٤٩٧٣ - لَقُوطَة حَوْرِيَّة الورق \*

Leucothoe populifolia (S).

Leucothoë à feuilles de peuplier (F).

نوع من اللقطة الترينية . ساقها فروع تملو من مترين الى اربعة امتار . اغصانها عادة الحبل والزغب . اوراقها نازرة المروة على الصفحات السفلى ، طولها يراوح من ٨ الى ١٢ سم . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها مستطيلة المالحق ، متدلية ، لونها الى البياض المالحق || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٤٩٧٤ - لَقُوطَة سَلْبِيَّة \*

Leucothoe racemosa (S). Leucothoë à épis (F).

فروع من اللقطة الترينية . ساقها تملو من متر الى ثلاثة امتار . اوراقها عريضة ، بيضية النصل ، ذلقة الزام الاخير ، تطول نحو ٧ سم . وتعرض نحو ٣ سم . ازهارها سفلى التجميع . ازهارها صغيرة القد ، بيضاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٩٧٥ - لَقُوطَة لُوبِي \*

Leucothoe Lobbi (S).

Leucothoë de Lobbi (F).

نوع من اللقطة الترينية . ساقها تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها ابيدة ، جلدية النصل ، مسنة الحمار ، تطول نحو ٧ سم . ازهارها عنقودي التجميع ، طرفي الازدكار . ازهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

Pompilidae (S).

٢٤٩٧٦ - لَقِيَّات (F). Pompilidae (E).

فصيلة حشرات من غشاقيات الاجنحة . اجسامها وانواعها عديدة منتشرة في جميع الاسواق الحارة والمعتدلة . قوتها ما تقتصره من الحشرات والحوام . تحفر مكاهي في التربة على اصقاع تراوح من ١٠ الى ١٥ سم . تنشب عنها عدة سراديب تقهي رداء مستطيلة مسدة الاضلاع تقع في كل ردة منها ٤ الى ٨ مكات تنقب بمد ٩٦ ساعة . اشهر اجناسها القى اطلبه .

٢٤٩٧٧ - لَقِيَّس

هو ما طال زمن نموه . راجع قصيح .

٢٤٩٧٨ - لَقِيَّط \*

Dracunculus muscivorus, Heliocidicus muscivorus (S). Serpenteaire attrape-mouches (F).

نبات عشبي اردوي بري وتربي من فصيلة القلقاسيات . ازوته صفريه مقلطحة . اوراقه برتلية مستطيلة الزناد ، وريقاتها ودية التجميع نصلها ثنائي الصفحة الزركشة والميحية بالاجر والاصفر . شراخه يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . شراخه خلى الصفحة الداخلية جلوي اللون تتوسطه ضبة حجة تكسوها لياث شجرة الشكل .

٢٤٩٧٩ - لَقِيَّعَة ، لَقِيَّعَة

Ophioglosse (F).

عشبة طيبة ترف بلسان احية . اطلبها .

٢٤٩٨٠ - لَقِيَّسِيَّات

Ophioglossaceae (S). Ophioglossacées (F).

فصيلة من البراسي تنسل بعض الاجناس والانواع اشهرها اللقيةة ولسان النزال .

٢٤٩٨١ - لُكَّ

Laque, Gomme-laque (F).

Lac, Gum-lac (E).

حصارة راتنجية صمغية قفرزها بعض الاجناس

لقلانيا بمد حرها او بواسطة الحشرات .



لَقِيَّط



لُكَاذَة سَيَّالِيَّة



لُكَاع



لُكَاع

## ٢٤٩٩٧ - لِكْتَارِيُوسُ حَرِيفٌ \*

*Lactarius acris*, *L. sanguifluus* (S). *Lactaire acro*, *L. à lait rouge* (F).  
من الفطور الجحالية المؤذية يكثر في الإحراج والنباتات الظليلة في الصيف والخريف. عصارته حمراء اللون حريفة المذاق. ساقه تملو من ٤ الى ٥ سم. حشيتة يعلوها توضيح طولي أحمر المويج. قطرها يراوح من ٥ الى ٦ سم.



لكتاريوس اشع

## ٢٤٩٩٨ - لِكْتَارِيُوسُ سَامٌ \*

*Lactarius torminosus* (S). *Lactaire vénéneux*, *L. aux tranchées*, *L. à toison* (F).  
من الفطور الجحالية المؤذية يكثر في الإحراج والراعي. عصارته بيضاء اللون حريفة المذاق. نكتة أفقية الصفحة الهضبة، طولية التضيق، زياء الحمار والحانة، لوناً الى الوردي يملو موج أصفر وتوضيح حائب.



لكتاريوس رتقال

## ٢٤٩٩٩ - لِكْتَارِيُوسُ لَدِيدٌ \*

*Lactarius deliciosus* (S). *Lactaire délicieux* (F).  
من الفطور المأكولة اللذيذة العلم. يكثر في ظل الأشجار الصنوبر والسرور. عصارته حمراء اللون سكرية المذاق. ساقه تملو من ٤ الى ٧ سم. نكتة تجلو مبدية ثم مستوية أفقية وتنتهي مقعرة. قطرها يراوح من ٥ الى ١٥ سم. لوناً الى الحمرة البرتقالية تملوها رقشة خضراء وأطواق مابطة.



لكتاريوس حريف

## ٢٥٠٠٠ - لِكْتَارُزُ

*Lactase* (F).

هي البنزات، اطلها.

## ٢٥٠٠١ - لِكْتَارُزُ

*Lactose* (F).

هي البنوز، اطلها.

## ٢٥٠٠٢ - لِكْتُسُ \*

*Lycet* (S).

*Lycet* (F). *Lycet* (F).

جنس حشرات مؤذية من غديات الاجنحة وفصيلة الكوتوسيات. أنواعه المعروفة نحو ٢٥ منتشرة في معظم أقطار العالم || اجسامها صغيرة القدد، مستطيلة الشكل، وحيدة اللون السوي || يرقاتها غاشية لونها لا تقرب من احشاش الفصيلة الصنوبرية || اعرف أنواعه واشهرها الكتوس الاسمر والخيطي والهند.



لكتاريوس سام

## ٢٥٠٠٣ - لِكْتُسُ اسْمَرُ \*

*Lycet brunneus*, *Xylotrogus brunneus* (S). *Lycet brun* (F).

حشرة غاشية من الكتوس. طولها نحو ٣ م. قوفا الى السمرة الحظيئة المابطة || يرقاتها تبنية اللون، سمراء الرأس، مستطيلة المقدم. تركيب الكتوس من الاخشاب وينتج النبتة فتنتفخها وتطشها. وعندما تصمم من المرقوس. فانها تفصله كل كل فذاء.



لكتاريوس لاذ

## ٢٥٠٠٤ - لِكْتُسُ عِطِيٌّ \*

*Lycet linearis* (S). *Lycet lindaire* (F).

حشرة غاشية من الكتوس. تألف الحراج والمنازل المسقوفة بالخشب. طولها نحو ٤ م. قوفا الى السمرة الكستنية || لها جيل واحد في الحول. يرقاتها مقوطة، مستطيلة المقدم، مستعدة المخزخ، مائلة القشاش. سداسية الرواجب، تبنية اللون، سوداء الرأس. تسردب مع خنافسها الشكير تحت الحاء وتنشر الاعمدة والاخشاب المنصوعة لكتها لا تقرب اخشاب الصنوبريات.

انزاعه قليلة العدد اعطائها المناطق الحارة. جلوسها عنه وجودها دلتية مستقيمة كثيرة اللمد ضمية التجميع تكسوها غشيرة من الليف الاسمر. اوراقها مستديرة الشكل، غوصها جبل الغفار الراعي، كرها مستطيل الجرم سرح الصفحة أو شالك الجوانب || والككاع يمش في اقل الحفصيات حيث يزوع في المراكن في الخدائق الخاصة التي لا تخشى القر. يتكاثر بالفسل. اشهر انواعه التزينية ما يلي.

## ٢٤٩٩٠ - لُكَاةٌ قَرْمَةٌ

*Rhaphis humilis*, *R. strotalis* (S). *Rhaphis nain* (F).  
نوع من اللكاع. ساقها جدعة. تتكاثر بالفسل. تنبش في المراكن. اوراقها رفيعة الشكل. كرها منصف الشوك الاسمر المتباعد الاركتاني.

## ٢٤٩٩١ - لُكَاةٌ مَرُوحِيَّةٌ

*Rhaphis flabelliformis* (S). *Rhaphis en éventail* (F).  
نوع من اللكاع. ساقها تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها مروحية الشكل. غوصها جبل الغفار الراعي. كرها قليل الشوك الحظي المتباعد. تزوع في المراكن والحدائق. ترطب في الارربة الدبالية المتوسطة الرطوبة.

## ٢٤٩٩٢ - لُكَاةٌ نَاشِطَةٌ

*Rhaphis major* (S). *Rhaphis major* (F).  
نوع من اللكاع. ساقها مستندة تملو نحو ١٢٠ سم. اوراقها مستديرة. غوصها فسق اللون. كرها سرح الصفحة. تزوع في المراكن والحدائق. ترطب في الارربة الدبالية الخصبية.

## ٢٤٩٩٣ - لُكَاةٌ

« شويكة تحطب لها سويقة قدر شبر لينة كائنا سير ولما فروع ملوطة شوكاً وفي خلال الشوك وريقة لا بل بها تنقبش ثم يبقى الشوك فاذا جفت ايشت (السان).

## ٢٤٩٩٤ - لِكْتَارِيُوسُ ، لَبِيَّةٌ \*

*Lactarius* (S). *Lactaire* (F).  
جنس فطور من الفاريقونيات انواعه عديدة منها المأكولة والجحالية جميعها دماعة اذا جرحت. عصارته لبلية لزبة حلوة الطعم او حريفة المذاق. لوناً غشلف باخضلاف الانواع، منها الابيض والاصفر والاحمر والاربد والبنيجي || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

## ٢٤٩٩٥ - لِكْتَارِيُوسُ اشْعٌ \*

*Lactarius rufus* (S). *Lactaire roux* (F).  
من الفطور المؤذية يكثر في الصيف والخريف يمش في ظل الصنوبر والسرور. عصارته بيضاء اللون حريفة. ساقه تملو من ٥ الى ٦ سم. نكتة أفقية الصفحة الملوية قطرها يراوح من ٦ الى ٩ سم. لوناً الى الشفعة.

## ٢٤٩٩٦ - لِكْتَارِيُوسُ بُرْتَقَالِيٌّ \*

*Lactarius volemus*, *L. lactifluus* (S). *Lactaire orangé*, *L. à lait abondant* (F).  
من الفطور المأكولة اللذيذة العلم. عصارته كالحليب لوناً ولزوية وتديفقا. ساقه تملو من ٦ الى ٨ سم. نكتة تبنو قلندسية في اول مهدا ثم افقية وتنتهي مقعرة يتوسطها ثملول غليظ. قطرها يراوح من ٨ الى ٢٠ سم. لوناً يستمر حل الصفرة البرتقالية حتى تتغير فينحرف اذ ذلك الى الجروي وهو يوبد في الغابات الظليلة الرطبة من حموز الى آب.

غيره اللون يملؤها مزاج ذهبي، قطرها نحو ٤ سم. اطراسها مستدلة الكثافة بنفسجية اللون || لحيتها جيدة الصنف، مأكولة.

٢٥٠١١ - **لُكْتُةٌ شَحِيحَةٌ** \*  
*Laccaria laccata* (S).  
*Laccare laqué* (F).

نوع من اللكة. توجد في المواقع الرطبة. ساقها رفيعة، شفره اللون، اروسيتها شبه صاجية الشكل، قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الشفحة الصفراء اللمعة. اطراسها بلون الساق || لحيتها جيدة الصنف، مأكولة.

٢٥٠١٢ - **لُكُوٌ بَلَسْتِيدٌ**  
*Leucopaste* (F).  
*Leucoplast* (E).

هي البوصية الماددة اللون اي مواد الحلية الماددة اللون.

٢٥٠١٣ - **لُكَيَاتٌ**  
*Phytolaccaceae* (S).  
*Phytolaccaceae* (F). *Phytolaccaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها ١٧ وانوعها ٦٠ اعطائها المناطق الاستوائية والحسرة. معظم انواعها اشجار وشجيرات وبعضها جنبات ليفية السوق واغشاب حولية وممرة. اوراقها بسيطة. ازهارها خشوية او ثنائية المسكن. لا تقياسية التجميع والارتكاز. ثمارها غنية يستخرج منها صبغات ارسوانية. عصاره جلوهها حلابة دقة لكية صناعية.

٢٥٠١٤ - **لُكِيَّةٌ** \*

*Phytolacca* (S).  
*Phytolaque* (F). *Dyer's grapes, Poke* (E). *Gewohnliche kermesbeere* (D). *Fitolacca, Amaranto* (I).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة اللكيات. انواعها قليلة منها الاشجار والجنبات والاعشاب. اوراقها كاملة متعاقبة يبيضة النصل او اهليلجية. ازهارها عقودي التجميع صغيرة القد، ملونة. ثمارها نورية غزيرة العصاره الحمراء تستعمل في سبائك الحمر. جلوهها طيبة || اشهر انواعها ما يتبع.

٢٥٠١٥ - **لُكِيَّةٌ ثُنَائِيَّةٌ الْمَسْكَن**

*Phytolacca dioica* (S). *Phytolaque dioique, Belombrs* (F).

نوع من اللكية الشائعة. شجرتها تملو من ٦ الى ١٥ م. ساقها قرناء فناء قفلسوية الفتحة وارة الطل. اوراقها بيضية داكنة قرناء طرية ١٢ سم. ويعرض نحو ٧ سم. نصلها اخضر الصفحة الجامدة ينقش في كاثون. ازهارها ثنائية المسكن، مستطيلة المناقيل الذكورية والانثوية || تنويرها يستمر من ايار الى تشرين.

٢٥٠١٦ - **لُكِيَّةٌ عَفَارِيَّةٌ الْأَسْدِيَّة**

*Phytolacca decandra* (S). *Phytolaque à 10 étamines* (F).

نوع من اللكية الزينية. ساقها منتصبه قرناء تملو من ١٠ الى ٣٥٠ سم. اوراقها اهليلجية سنانية، نصلها يطول من ١٠ الى ٤٠ سم. ويعرض من ٣ الى ١٠ سم. وهو رطل النسيج اجر الصفحة: ازهارها عقودي التجميع مستطيل الشكل. ازهارها عشارية الاسدية تبدو بيضاء اللون ثم تتحول الى الارجواني. ثمارها بنفسجية عشارية الاصغر || تنويرها يستمر من حزيران الى اواسط الخريف.

٢٥٠١٧ - **لُكَيْسٌ** \*

*Donovania* (S). *Lachésis* (F).

جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات مديات الارجل وفصيلة المرفيات. انواعها المعاصرة المعروفة قليلة

٢٥٠٠٥ - **لُكْتُوسٌ مُتَحَدِّدٌ** \*

*Lycet unipunctatus* (S). *Lycte canaliculá* (F).

حشرة خاشية من اللكتوس. طولها نحو ٤ م. ثوبها الى الشبهة الخطية السمراء المزاج، تتبع في الرأس واللكتوس وتزهر في غمدها المزددين || يرتها غيره اللون، جزوية الرأس. غليظة الصدر، مستدلة المؤخر، تركيب معظم الاغشاب الصلبة ومنها المصنوعة، باستثناء الصنوبريات.

٢٥٠٠٦ - **لُكْتُوسِيَّاتٌ**

*Lycetidae* (S).  
*Lycetidae, True powder-post beetles* (E).  
*Splintkäfer, Holzmehlkäfer* (D).

فصيلة حشرات من رتبة خفيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد. اعطائها جميع مناطق بلاد العالم || حشراتها صغيرة القد، مستطيلة الشكل، ضيقة الانحدار الخطية، صقية الزباني، خاشية الغسل الريفية || يرتها خاشية تنخر وتوردب جميع انواع الاغشاب اغصها الصلبة.

٢٥٠٠٧ - **لُكْتُوسٌ مُسْتَطِيلٌ** \*

*Lixus elongatus* (S).  
*Lixe elongé* (F). *Lixus elongatus* (E).

حشرة خاضلة مذيبة من فصيلة السوسيات ورتبة مفدمات الاجنحة. تألف زراعات الثوندر والمواقع التي يكثر فيها السرمق. خنافسها تعيش على ما تقتضيه وتتخصص من عصاره نصال الارراق. يرتها تخلع الاسناخ وتوردبها قنططها || جسمها متوسط القد يطول من ١٠ الى ١٥ م. ثوبها الى اللكية السمراء يملؤها طيليل جزوي. رأسها صغير الجرم ينتهي بمكة قاعر ثابت راقت. عينها صغيرتان. زباناها مرتقتان صولجائيان ظهرها مستطيل الشكل، مستدير المؤخر الاصح. غدها ثابتتا التحزيز الدقيق القاطب. اراسها رباعية المعقل الطاهرة || الاثنى اكبر قدًا من الذكر واهت ثوبًا منه والطول سرًا وكتًا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع. تسرح في الثبار. تتساق بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وترز المنك ميحاديا في اسناخ الثوندر وفي سوق السرمق || والبرقة عند بلوغها الكمال تطول من ١٤ الى ٢٢ م. جسمها شبه اسطواني الشكل، مستدق المؤخر، عادم الراجوب، مبهر الحلب، حنطي اللون، اسمر الرأس والشرج والمذاب || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في التربة قرب النبات العائل.

٢٥٠٠٨ - **لُكَعٌ**

*Piquer* (F). *To prick* (E).

لكع ولدغ ولسب ولسع ونخس ونس.

٢٥٠٠٩ - **لُكْتُةٌ**

*Laccaria* (S).  
*Laccare* (F). *Laccaria* (E).

جنس فطور من فصيلة الفارغيتونيات. انواعها المعروفة قليلة البد. اعطائها بعض غابات وحراج مناطق البلاد المعتدلة الحارة. جميعها مأكولة لذينة الطعم، مستحبة المذاق.

٢٥٠١٠ - **لُكْتُةٌ بَسَقَسَجِيَّةٌ** \*

*Laccaria amethystina* (S). *Laccare amethyste* (F).

نوع من اللكة توجد في حراج السديان. ساقها رفيعة، عوصاء، ليلكية اللون. اروسيتها شبه صاجية الشكل،



لكتوس عتد



لكتوس مستطيل



لكمة بنفسجية



لكمة شفحة



لكية



لكيس



۲۵۰۲۳ - **لَمَاجَة تَائِيَة \*** (S). *Clubiona erratica* (S).  
 Clubione erratique (F). Erratic clubiona (E).

هربية من العناكب الساعية القانصة ثنائية الروايا ، سداسية الماشاق تتنص الى فضيلة الهابيات . موطنها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم || جسمها صغير القد بطول نحو ٨ م. عند النكب ونحو ١٢ م. عند النكبة . صدراسها مستطيل الشكل ، اسر اللون ، احمر المروج . صبتها زيمتان . شيفهاا ضليمان . فكهاا دقيقان . جزامها مستطيلة ، نجيل ، كثيفة الحب . بطها اسر اللون ، احمر المروج ، عابك التزيم || تألف البراري والمواقع الدفلة . تسرح في التبار . مخدعا سعة بندقية الشكل والقد تسجها حيث تبث لانها جولة لا تستقر في مكان معين || قوتها الحشرات الصغيرة والاساريع والديدان . يباتها الشتوي يستمر من ١٨ الى ٢٠ اسبوعا تقصيا في مكعبة جزوية الشكل ، فضاء اللون ، جامدة الحليك تسجها تحت الحجارة وفي كل مكان امين || ملجئها الحيائي لا يختلف من ملجئ سائر العناكب || تعتبر من اللويبات الناعمة .



نم

### ۲۵۰۲۴ - **لَمَاجَة رَيبِيَة \***

Clubiona nutrix, Chiracanthum punctator (S).  
 Clubione nourrice (F). Nutrix clubiona (E).

نوع من العناكب الساعية القانصة ثنائية الروايا ، سداسية الماشاق تتنص الى فضيلة الهابيات . موطنها المناطق الحارة من حوض البحر الابيض المتوسط || جسمها متوسط القد بطول نحو ٢٠ م. عند النكب ونحو ٢٤ م. عند النكبة . صدراسها انبوي الشكل ، اسر اللون احمر الملاج . صبتها زيمتان . شيفهاا شطبا المقفاف القدرة . فكهاا ضليمان . جزامها مستطيلة مهدبة . بطها وفي الشكل ، حنلي اللون ، جزوي المراج تملو رشة سودا || تألف الادغال والسباحات حيث تكثر النباتات الشائكة . تسرح في التبار . قوتها الحشرات واساربعها || يباتها الشتوي يستمر من ١٨ الى ٢٠ اسبوعا . مأوها مكعبة صلبة الشكل لا عنقوقة الوسط ، ومتينة الحليك ، مدغلها من الجهة السفلى || تعيش نحو ثلاث سنوات . الانثى تموت بعد تقف المكان وضن الصغار ، اما الذكر فيعد الكوم اذ تقضي عليه الانثى || نشتها مؤلة . سمها شديد الفاعلية يؤذي الانسان .



لماجة تائية

### ۲۵۰۲۵ - **لَمَاجَة مَرَكْسَة \***

Clubiona compta (S). Clubione parée (F).

نوع من الهابة الساعية القانصة . موطنها بعض المناطق الحارة من العالم القديم || جسمها صغير القد بطول نحو ٥ م. عند الذكر ونحو ٨ م. عند الانثى . صدراسها مستطيل الشكل ، اسر اللون ، اخضر المروج . صبتها زيمتان . شيفهاا مجهزان بقات عجة نحو الداخل . فكهاا صغيران . جزامها نجيل مستطيلة ، كثيفة الحب . بطها اهليجي الشكل ، اسر اللون . احمر الزواش . ينتهي برزالتين صغيرتين || تألف المروج والمراعي والراش تسرح في التبار . قوتها الحشرات الصغيرة . مخدعا مكعبة بلوطية الشكل ، حريرية الزواش ، بيضاء اللون ، تحيكمها تحت قشور الاشجار || تعتبر من اللويبات الناعمة .



لماجة مراكسة

۲۵۰۲٦ - **لَمَاجِيَات \*** (S). *Clubionidae* (S).  
 Clubionidés (F). Clubionides (E).

فصيلة عناكب من رتبة الريتولات . اجناسها وانواعها

الندد ، اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحارة || اصلهاا غرملية عازلة يملوها تخنيد قاطب وتميز نحو مترس بمد من الفرة الى القب . قوتها اهليجية الانفراج ، جالسة الاريفة العادمة التضفين .

۲۵۰١٨ - **لَم \*** (S). Lumme, Guillemot (F).  
 Guillemot (E).

جنس طير من عارة الليات وفضيلة البطريقيات . انواعه المعروفة ثلاثة اعطائها المناطق الباردة القطبية ، تزح عبا في فصل الشتاء والجلد الى المناطق المعتدلة الحارة . ملجئها الحيائي جامعي الب . جاعاتها اسراب لا يحصى لما حد . قوتها الاسماك والقشريات والدعايس || اجناسها كبيرة متابدها مستطيلة جالسة مدبة الاطراف المفروسة . مناقشها كاسية ، ضيقة ، نافذة من جانب الى جانب . اجنحتها معتدلة الجسم ، ذلقة ، اذناها قصيرة ، مستديرة الاطراف الضيقة . اسرارها قصيرة ، سرية التشبيك . احطيتها تحيط بكامل الاسباع || وكناتها نقر في القواض القضاة المشرفة عل البحر . الاناث تحضن بمنوبة لا تذكور . بيضها اجامبي الشكل والحجم بطول من ٨ الى ١٠ م . الحنة بيضة واحدة والترغيم يستمر من ٣٠ الى ٣٥ يوما .

### ۲۵۰١٩ - **لَم اَدَجِل \***

Uria troile (S).  
 Lumme à capuchon, Guillemot à capuchon (F).  
 Common foolish, Common guillemot (E).

نوع من المرموطه بمد من التاروج الى جزر القطب . ينزح في الشتاء الى بعض المناطق المعتدلة الحارة اصحها الجزر البريطانية والخطوط الفرنسية والاسبانية والايطالية في المتوسط || جسمه بطول نحو ٢٢ م. ثوبه اسود الرأس والعنق والرداء والجناحين والذنب ، ابيض الصدر والبطن والركبي . منقاده الى الرعدة السوداء المراج . حلقه عينه الى الشفحة الحمراء . رساه الى السمرة الخفيفة .

### ۲۵۰۲۰ - **لَم اَعَمَس \***

Uria grylle (S).  
 Lumme grylle, Guillemot grylle (F).  
 Black-throated diver (E).

نوع من المرموطه بعض المناطق القطبية . ينزح في الشتاء نحو مجادح البلييك . جسمه بطول نحو ٥٠ م. ثوبه اسود الرأس والعنق والرداء والجناحين والذنب ، ابيض الصدر ، ابيض البطن ويعلمو في مناكب الجناح والاباير والكلل تجنيد متفرس ابيض . حلقه عينه حنطة اللون . منقاده اسود . رساه الى الدهشة .

### ۲۵۰۲١ - **لَم عَرَلَنَدَة \***

Uria Manditi (S).  
 Lumme de Mandt, Guillemot de Mandt. (F).  
 Bridled Guillemot (E).

نوع من المرموطه لراهن غرلندة ومجادها . ينزح في الشتاء نحو جنوب كندا . جسمه بطول نحو ٤٥ م. ثوبه الى البياض الناصع تملو في الظهر رشة جزوية ويعلمو في الرأس تبيج اسود احمر المراج وخطان جزويان امين وايسر يمتدان من الشق الى الظهر . حلقه عينه عناية اللون . منقاده ادهس ورساه كذلك .

### ۲۵۰۲۲ - **لَمَا \***

Raja limma (S).  
 سمكة من شفتين البحر اعطائها جنوب المتوسط تكثر في المناطق الرملية القاع .

٢٥٠٣٧ - **لَمْعَا ، لَتَف ، لِيمْعَا**

Lympe (F). Lymph (E).

أخلاط صفراء اللون أو عادية تنقلل مصحوبة بالكريات البيض في الاوعية اللمفاوية .

٢٥٠٣٨ - **لَمْعَسِيَّات**

Lymexyliidae (S). Lymexyliidae (F). Lymexyliidae (E).

فصيلة حشرات غاشية من رتبة لمعديات الانجسة || اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل تتميز بقلعة صلابة القشور وباستعراض الرأس وبكبر العينين الجاحضة وباستطالة الزنابي المركبة من ١١ فصلة . انحدارها قصيرة لا تلحف كامل البطن . ارباغها خاصة التركيب || يرقاتها تعيش على الانجاس اليابسة او السائرة نحو اليابس وعلى الاعشاب المصنوعة || اشهر اجناسها المكيل .

٢٥٠٣٩ - **لَمِنَارِيَّات**

Laminariaceae (S). Laminariaceae (F). Laminariaceae (E).

فصيلة نباتات بحرية من الخفيات السقم .

٢٥٠٤٠ - **لَمِنَارِيَّة**

Laminaria (S). Laminaria (F). Laminaria (E).  
جنس نباتات غشية من فصيلة المناريات تعيش على الصخور البحرية المغمورة بالماء . اوراقها قدية محززة تطول عدة امتار ، فصلها اصفر اللون اسمر المزاج . منها انواع مأكولة واخرى علفية وصناعية يستخرج منها اليود والصودا . جميعها صمادة تقيد التربة والنبات .

٢٥٠٤١ - **لَمِنَارِيَّة سُكْرِيَّة**

Laminaria saccharina (S). Laminaria saccharina, Baudrier (F). Devil's-apron, Sweet-tangle (E). Zuckerrentang, Zuckertang (D). Cinture di Nettuno (I).  
نوع من المنارية المأكولة والمالية . اوراقها سكرية اللحم تأكلها شعوب البلاد الشالية .

٢٥٠٤٢ - **لِمْنَة**

Limnæa (S). Limnée (F). Limnæa (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة اللمنيات . انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم ومنها انواع تعيش في المياه العذبة كالبحيرات والمخاض || اصداؤها غشوية المادة ، شبه غلروفية الشكل ، محلزنة ، معدية الانقباض ، شداة القلب . اجسامها مستطيلة . لولبية ، مستعرضة الرؤوس ، مبطلة اللواس السانانية الشكل . ميزنها قاعدية الاركان . ارجلها فردية ، مبططة ، مستديرة الطرف الامامي ، مستدقة الخلفي .

٢٥٠٤٣ - **لِمْنُورِيَّة**

Limnoria (S). Limnoria (F). Limnoria (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات العليا متساويات الارجل وفصيلة الدوبريات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، مبططة ، بيغية اللون ، نحيلة القوائم المعتدلة الطول || اعرف انواعها واشهرها لمنورية ثاقبة الخشب Limnoria terebrans (S). Limnoria perce-bois (F). مشهورة بالاضرار التي توهمها في اغتصاب الاحواض والسفن غير المعالجة فد هذه الافات .

عديدة تناهز المئة ، منتشرة في معظم البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || جميعها مقترسة ، صغيرة القد ، ثائية الروايا ، سداسية المشاقن ، شياستها مجرزة بنقاف حبيطة نحو الداخل || اثوابها تراوح بين الصلبة والشفقة . تعيش في صكاديب بلوفية الشكل ، حريرية النراس ، بيضاء اللون ، تحبها تحت قشور الانجاس او تحت الحجارة وبينها || اشهر اجناسها الاقاجة والكفكاسة .

٢٥٠٣٧ - **لَمَّاس**

Tactile صفة التي الذي يتحسس باللمس .

٢٥٠٣٨ - **لَمَّاسَات**

Palpigrades (F). Palpigrades (E).

فئة من المنكرويات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، فية جميعها كهام ، عادمة الجهاز التنفسي ، تطول نحو ١ سم . اجسامها لتتني هيدية حقيقة ، قصيرة || تعيش تحت الحجارة وفي المغاور الرطبة .

٢٥٠٣٩ - **لَمَّاعَة**

في المقاب الذهبية ، اطلها .

٢٥٠٣٠ - **لَمَّام**

Lemme (F). Lemme (E).

عرض تمهدي لآليات قضية .

٢٥٠٣١ - **لَمَّام**

هو النتج الاخضر ، اطلبه .

٢٥٠٣٢ - **لَمْبَرْتِيَا ، لَمْبَرْتِيَا**

Lambertia (S). Lambertia (F).

نبات مقدود التعريف على اسم العالم الانكليزي ا.ب.لمبرت (١٧١١ - ١٨١٢) وهو جنبة معمرة برية وتريتيية من فصيلة القصبيات مهدا استرالية . ساقها قرعاء تملو نحو ١٢٠ سم . اوراقها سانية تطول نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٥ سم . فصلها ملتف الحافية ، شائك المقصة لامع الصفحة العليا خلي السفل . ازهاره مستديرة التجميع صغيرة القد ابريوانية اللون . ثماره جزائية الشكل مسلحة بقترين مستطيلين . تنوره يشمر عن حموز الى آب .

٢٥٠٣٣ - **لَمْبَرُوش**

هي كرة لبروش ، اطلها .

٢٥٠٣٤ - **لَمْبِيد السَتَف**

Lampides boeticus (S).

فراشة من فصيلة القنقيات . اطلها فصيلة الارباء تشل البلاد الاسبرية والافريقية . جسمها اطلل الزوب ازرق المزاج . ذكرها يطول نحو ٣٤ سم . وراشها الى الزرة البنفسجية يعطها ممشيح سنق حاق ويطوقها اطار اسمر || انتاعها تطول نحو ٣٨ سم . وراشها ازرق الانتشاب خضيلة اللون يعطها ممشيح اسمر || يرقاتها تركب سنق نباتات الفصيلة القرنية وتقرض البلور قبل ادراكها .

٢٥٠٣٥ - **لَمَّة**

مجموعة افراد نباتية من صرم واحد تميزت بصفات خاصة ثابتة . والفة لا تأتي الا عن طريق التمثيل والتفصيل . واذا تكاثرت بالبرز فقدت صفاتها المميزت ولم تعد له .

٢٥٠٣٦ - **لِمَدُّور**

Limodorum (S). Limodore (F).

جنس نباتات طفيلية من السملبيات . انواعها المعروفة قليلة . اوراقها متراكبة سرغفية الشكل والدة ، رزاق النصل . ازهارها سنبلية التجميع . ازهارها صغيرة بنفسجية اللون || منبها الادوية والمواقع الظليلة الرطبة .



ليد السنف



لمنارية سكرية



لن

الناذة . تتميز برؤوسها الجزلة وبقولها الامامية الشديدة  
النشط الجبهة لما الخلف كما في البعوضة أو القبيص كما  
في المغرب بواسطة اطرافها المقطعية الشكل || جمع اجناسها  
غائلة تعيش من قصها . اشهرها البعوضة .

### ٢٥٥٥ - لَبَنِيَّة

Gnathopode (F).  
Gnathopodite (E).  
زائدة متحركة أو عضوية تكون عند بعض القشريات .

### ٢٥٥٦ - لَبَنِيَّة

Limulus (S).  
Limule (F). Limulus (E).

جنس حيوانات بحرية من المفصليات وفصيلة البليديات .  
انواعها قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة ||  
اجسامها شبه مستديرة الشكل ، ملحومة الظهر بدروع  
مجنية وتحمل في مؤخرتها سرابيد مستطيلة حادة الاطراف .  
واجسامها هذه تتكون من جزئين ، جزء امامي ملحوف يحجب  
نصف دائري يملأ الصدر والبرص والبرص والبرص وسنة  
ازواج من القواس التي تحرق اللحم . زوائد الصدرية  
تستعمل كجهاز للتنقل والذئب . اما الجزء الثاني فلانه  
شبه محرم الشكل ينتهي بمردود حاد الطرف . وهو عند  
قاعته يلفس حمة ازواج من الجرايز المعلقة للسانة ||  
بعض انواعها مأكول . انحصار لينة اندونيسية وهناك  
نوع آخر كبير القد يطول نحو ٢٥٥ سم . يكثر وجوده  
في بحار شمال الولايات المتحدة .

### ٢٥٥٧ - لَبَنِيَّة

Limulus moluccanus (S). Limule des Molouques (F).  
نوع من البليطة يكثر وجودها في مياه اندونيسية . جسمها  
كبير القد ، يطول من ٩٥ الى ١١٥ سم . بما فيه المردود ||  
لحما مأكول ، مرقوب فيه .

### ٢٥٥٨ - لَبَنِيَّات

Limulidae (S).  
Limulids (F). Limulidae (E).  
فصيلة من المفصليات الشبيهة بالمرسويات . اجناسها  
وانواعها القليلة كانت عديدة وقد انقرضت ولم يبق منها  
سوى بعض الانواع تنتمي الى جنس واحد يدعى لينة .

### ٢٥٥٩ - لَبَنِيَّة

Lemmus (S). Lemming  
جنس حيوانات لينة قاضية من المكربيات وفصيلة  
التقريات . انواعه عديدة بعضها صغيرة القد بعضها البلاد  
الباردة تجوزها من الجنوب الى الشمال || اجسامها ربعة ،  
طولها يراوح من ١٥ الى ١٨ سم . واذنانها من ٢ الى ٣ سم .  
مقاسها مقنونة . اذنانها صغيرة . جرائرها خالية الاصاب .  
انظرها حادة جامة . اذواها الى الفردة الصفراء يعلوها  
تبيج اسمر . يطونها الى الصفار الرلي . جرائرها واذنانها  
صفر || قوتها الاغصان والجذور والحزاز .

### ٢٥٥٩ - لَبَنِيَّة

Lanaria (S).  
Lanaira (F). Lanaria (E). Lanarie (D). Lanaria (I).  
جنس نباتات عشبية جسمية مدادة معمرة من فصيلة  
الترجسيات . انواعها قليلة منها نبات افريقية الجنوبية . زرع  
لترين .

### ٢٥٥٩ - لَبَنِيَّة

Semnopitheque (F).  
نوع من القردة المقزمة يدعى هبار ، اعظم .

### ٢٥٥٧ - لَبَنِيَّات

Lonchitis (F).  
هو القسم ، من النباتات الطبية والثرينية .



لينة



لينة



لينة



لينة

### ٢٥٥٩ - لَبَنِيَّات

Limnidae (S).  
Limnidae (F). Limnidae (E).

فصيلة حيوانات مائية من الرخويات معديات الاويل  
وربية التبولات المائية ، اجناسها وانواعها المعروفة عديدة  
منتشرة في معظم بحار وبحيرات العالم . قوتها التبول المائية  
والفريع || اصداؤها لاحقة ، شبه خلوية الشكل .  
معلقة الاطراف ، سدفا الولب || اعرف اجناسها واشهرها  
الجنة واليام والولب والاصليل .

### ٢٥٥٩ - لَبَنِيَّة

Lemonia (S).  
Lemonia (F). Lemonia (E).

جنس حشرات من فصيلة الموليات وربية حشرقيات  
الاجنحة . انواعها المعروفة ٢٥ بعضها يألف الاقاليم  
الباردة والبعض الآخر يعيش في المناطق المعتدلة الحارة  
والخارج || اجسامها كبيرة ، عضلية ، يفهمها العمل .  
بسطها تراوح من ٤٥ الى ٥٥ سم . رؤوسها مزوانية  
الشكل . عيونها صغيرة ، بارزة . اعطاطها ولباسها  
قصيرة . قرونها الاستشعارية مشطية . اجنتها كبيرة ،  
ملونة ، مجنحة ومتقطعة . اذواها قليلة الزخرفة || اسارهم  
مثاقلة يعلوها حلب دقيق . تألف البراري جميعها عاكسة  
تعيش على معظم ثبوت فصيلة المركبات واعصها الخلد .

### ٢٥٥٩ - لَبَنِيَّات

Lemoniidae (S).  
Lemoniids (F). Lemoniidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة . اجناسها  
وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، معظمها شبيهة بالاصطن  
وبعضها يألف المناطق الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها  
كبيرة ، عضلية ، يفتلها خل مستطيل . بسطها تراوح  
من ٤٥ الى ٥٥ سم . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها  
صغيرة . اعطاطها شديدة القصير . ملامسها صغيرة .  
قرونها الاستشعارية مشطية مزدوجة . اجنتها كبيرة  
عامة الزخرف . اذواها زخرفة || اسارهم مثاقلة الفشار  
يعلوها بعض الحلب || اشهر اجناسها المونة .

### ٢٥٥٩ - لَبَنِيَّات

Urions (F).

عمارة طير من فصيلة البطريات . اجناسها وانواعها  
قليلة العدد جميعها من طيور المناطق القطبية والباردة ||  
تتميز باجسامها الكبيرة ، بريشها البلس ، بارسانها  
البردية ، ويمتدتها اللثة الاثنية المتعددة الاحدياد ،  
القليلة الانضغاط والارتفاع || اما اجناسها فهي الم والمفرق  
والرخيلان .

### ٢٥٥٩ - لَبَنِيَّة

Phymata (S).  
Phymate (F). Phymata (E).

جنس حشرات قاضية من فصيلة البليديات ، انواعها  
المعروفة عديدة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة  
الحارة والحارة || اجسامها صغيرة تطول من ٦ الى ١٥ سم .  
اشكالها مستديرة لاساوية ، رؤوسها جزلة شاذكة . اعطاطها  
قصيرة شديدة النشط . قوائمها الامامية مجنحة للخطف ||  
اذاها مبيانية الالوان تكثر فيها الشقعة والسرمة || جمع  
انواعها ناعمة لانها تنقي على الحشرات الضارة .

### ٢٥٥٩ - لَبَنِيَّة

Phymatidae (S).  
Phymatids (F). Phymatidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطيفة تصفيات  
الجنح . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد معظمها  
من علم المناطق الحارة || اجسامها صغيرة غريبة الاشكال

Lennoa

٢٥٠٦٣ - تشوا

جنس نباتات عشبية طفيلية من فصيلة النورات . انواعها المروقة ثلاثة منبتها بلاد المكسيك .

Lennoaceae (S).

٢٥٠٦٤ - تنويات

Lennoaceae (F). Lennoaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متعددة المصالات ، اجناسها وانواعها المروقة قليلة العدد . اعطائها بعض مناطق المكسيك || جميع نباتاتها عشبية طفيلية . اوراقها سهقية . ازهارها صغيرة ، سنوية الازدياد || اشهر اجناسها التوا .

Lignodes (S). Lignode (F). ٢٥٠٦٥ - لينود

جنس حشرات خاضعة من مخدبات الاجنحة ورضيلة السويبات . انواعها المروقة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المحتلة الحارة . يمكن وجودها على المران والليلك والياسم ، خاصة في زعن الازهار || اجسامها صغيرة ، شبه بيضبة الشوزن ، تطول من ٤ الى ٦ سم . اثنائها الى الشقعة السفلى ويلوحها ، في بعض الانواع ، تبيض اسود مخافتات الرضابة يكتنفب الامداد .

Lanio (S).

٢٥٠٦٦ - لينون

Lanio (F). Lanio (E).

جنس طير من الجوامح غروريات المنابر وفصيلة التنفريات انواعها المروقة خسة موطنها المناطق الاستوائية من البلاد الامريكية . تألف الاجراج . ملجئها الحياتي جماعي باستثناء وزن التسانف والحضانة والتصيل ، جماعها قليلة العدد . قوتها الحشرات والبلود والثار النباتية البرية والزرارعية || اجسامها رمية تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . رؤوسها معتدلة القد . مناقيدها غرورية . اجنتسها مستطيلة ، ذلقة . اذنانها مقمرة شبه مفروقة . اثنائها تختلف مع الانواع فيها الاسفر والاخر والاخضر والانس ، جميعها مبلقة او مبيضة بالاسود || تدث اعشاشها في الادغال القريبة من سطح الارض . الاناث تحضن وضعها من ٥ الى ٧ بيضات بينا الذكور تكون لها الحاية والغذاء .

Epiglottae (F). ٢٥٠٦٧ - لهاسة ، ليسان المزمار

Epiglottis (E).

الهامة او لسان المزمار مفاط بلقي - غسرفي يقع في الجزء العلوي من الحنجرة .

٢٥٠٦٨ - لهاسة الجرود

Xanthorhoe montanata (S). Xanthorhoe des montagnes (S). Xanthorhoe montanata (E).

فراشة من فصيلة الارليات ورنية حرشفات الاجنحة . موطنها بعض جبال حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية الناحية . قوتها رقيق الازهار . سرتبها خاضعة تمشي على اوراق النبات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ سم . يسلط نحو ٣٧ سم . رأسها سطلي اللون . عينها صغيرتان . زباناها شطبان عند الذكر ، عيطيان عند الانثى . جوشها ويطنها الى الحنطة الاشبع المالح || وراشها عند الفتن الى الحنطة الاكثف يملو في الزوج الامامي تحشج ابيض واخر وبقجة وسطى شديدة السمره تنتهي بشتين يتوسطها نقطة سمره . ويملو في الزوج الخلفي تحشج اسمر وعطان من الزراکش . اهدائها الى الشقعة || لها جيل واحد في الحول . تظهر في فرنسا في

Landolphia (S).

٢٥٠٥٨ - لندالفية

Landolphie, Vahé (F). African rubber tree (E). Kantschukiane (D). Landolphia (I).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة البفليات . منبتها افريقية الجنوبية وبغسفر . سوقها جاسية ، سالبة سمره اللون . اوراقها متعاقبة ، نصلها لامع الصفعة الجلمدة . ازهارها تاجية || يستخرج من جلوسها بالخر صسارة مطاطة صناعية تشتمل استعمال المطاط .

Lenzites

٢٥٠٥٩ - لنزيت

فطر من السيات يركب الاعشاب المقطوعة من فصيلة الصنوبريات . مظهره الخارجى فطر صغبر القد لونه الى الجردة ، نكتة مفلطحة ، قطرها نحو ٣ سم . سطحها الداخل مستدير ، تعلو اعاديده حراشيف ورر هيفية متناسبة البعد شياء اللون . لبابه قليل البسكة ، فلبي التركيب ، سطلي اللون . بوفياته اسطوانية الشكل قبابها نحو ٣٨٨ ميكرون || مشبيه بمرى الاعشاب المقطوعة فيسب عنها واغلاها بمد ان ينطقها يوشل كندف القطن لونه الى الصفرة البرتقالية ثم ينحرف الى الحنطى || يكاتب بحرر الاعشاب المصابة ويصطبر السلطة بأحد المركبات الفعالة كالفيتول والكرولين .

Linsang (S).

٢٥٠٦٠ - لينسان

Linsang (F). Linsang (E).

جنس حيوانات لاجمة مفترسة من فصيلة الزباديات ، انواعها المروقة ثلاثة موطنها الهند الصينية وجزر الزايج . تألف الثنايات والرياض . ملجئها الحياتي شري الذكر يكوم عدة اناث والاثني تخاطط عدة ذكور || اجسامها مستطيلة الشكل هيفاء تطول من ٦٥ الى ٨٥ سم . بما فيه الذنب . رؤوسها صغيرة ، شبه غرورية الشكل . آذانها صغيرة ، كاسية ، موزنها ماحمة ، حادة البصر . اذنانها مستطيلة ، سداسية او ثمانية الاطواق ، بالنسبة الى النوع . فرائها قصيرة اللور اليد النام . اثنائها مبيضة ، مرقشة وبندرة || اناثها ثنائية الاثداء والجارء ، تضع على مرتين في الحول . المرة الاولى في اواخر شباط والثانية في اواسط آب || سرعها دجوي . قوتها الطير والحيران الصغير || اما انواعها الثلاثة فهي :

Linsang pardicolor (S).

لنسان احم

Linsang pardicolora (F).

Linsang gracilis (S).

لنسان اذيل

Linsang gracieux (E).

Linsang maculosa (S).

لنسان ملطح

Linsang maculé (F).

Ammodytes lanceolatus (S). ٢٥٠٦١ - لنشرون

Langon (F).

سكة بحرية من فصيلة الرديالات . اعطائها معطر شطوط بحار البلاد المحتلة الحارة || جسمها شبه اسطواني الشكل قليل التبطيط يطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . رأسها صغبر الجسم مستطيل المنط . فكها السفلي يتقدم العلوي . زعنفتها الظهرية قاطبة يتقدمها منفس حاد . زعنفتها الشريعية تمتد من اواسط البطن الى الذيل . زعنفتها الذيلية فارقة ، توجبها الى الرتبة الفقية يسر ويميق في النصف العلوي || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .

٢٥٠٦٢ - لنش

في اللغا ، اطلبها .



لندالفية



لنسان



لنسون



لنود



لنود

٢٥٠٧٨ - **لَهْوِيَّةُ لَاطِئَةٌ** (S). *Uvularia sessilifolia* (F).  
نوع من الالهوية تملو نحو ٣٠ سم. أوراقها لاطئة أخيلجية  
نصلها بطول من ٤ إلى ٨ سم. صفته السفل إلى الخصار  
الازرق الملاج. أزهارها ثوآمية الانتشاب صغيرة القد  
تطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. لونها إلى الصفرة الباهتة .  
أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .



لهوة

٢٥٠٧٩ - **لَهْوِيَّةٌ مُتَقَوِّبَةٌ** (S). *Uvularia perfoliata* (F).  
نوع من الالهوية تملو من ١٥ إلى ٥٠ سم. أوراقها متقوية  
تحترقها السق وهي متعاقبة سنائية الشكل، نصلها بطول  
من ٤ إلى ٨ سم. وهو مائل الصفحة، أخضر العليا،  
باهت السفلى. أزهارها تطول من ٢ إلى ٣ سم. يتلأها  
مدبة الأطراف لونها إلى الصفرة الجليسة || أزهارها  
يستمر من أيار إلى حزيران .



لهوة

٢٥٠٨٠ - **لَهْوِيَّةٌ مُهْدَبَةٌ** (S). *Uvularia puberula* (F).  
نوع من الالهوية السروية تملو نحو ٤٠ سم. أوراقها  
متعاقبة سنائية، نصلها جامد صفحة، أخضر اللون،  
مهذب الحافة، يطول نحو ٥ سم. أزهارها مقوية الثلاث  
تطول نحو ٢٥ سم. لونها إلى الصفرة الكبريتي || أزهارها  
يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٥٠٨١ - **لَهَيْبٌ ، حَمِيرَاءُ**  
*Ruticilla, Phoenicurus* (S). *Rouge-queue* (F). *Redstart* (E).  
جنس طير من فصيلة الشروريات. أنزاه كثيرة العدد  
أصلها العالم القديم تكثر في البلاد الاسيوية || جميعا  
صغيرة القد، ورشقة القولم، قصيرة المتقار، مستطيلة  
الجنح، ذنيبة الراس، رطله الرش، جميلة النوب،  
أثواب أناتها أقل زركشة زدها من أثواب ذكرها.  
قوتها الحشرات على اختلاف أنواعها. تتن في شجائف  
الصخور وتجاويف الأشجار || أشهر أنواعها ما يلي .



لهيب أسود الرأس

٢٥٠٨٢ - **لَهَيْبُ أَسْوَدُ الرَّأْسِ**  
*Ruticilla tithys, Phoenicurus ochurus* (S). *Rouge-queue tithys, Rouge-queue noir* (F). *Black redstart* (E).  
طائر من الالهيب طوله نحو ١٦ سم. ثوبه ثوب الالهيب  
الاسود الأزور باستثناء الرأس الذي يمه السواد والألأهر  
المبقعة بالأبيض. تغريده شبي الإخا. حصفته تراوح  
من ٥ إلى ٦ بيضات تقوم بها الأنثى دون الذكر.

٢٥٠٨٣ - **لَهَيْبُ أَسْوَدُ الزُّورِ**  
*Ruticilla phoenicurus, Phoenicurus phoenicurus* (S). *Rouge-queue à gorge noire, Rouge-queue à front blanc, Rouge-queue de muraille* (F). *Common redstart* (E).  
طائر من الالهيب طوله نحو ١٥ سم. ثوبه جميل الألوان  
المترابكة، رأسه إلى الكهية الزرقاء تتوسطه بقعة بضاء  
تمتد إلى الجبهة. زوره اسود، ظهره إلى الكهية الرادية  
يطلوا موج أزرق، جوت وأيللاه وزكاه وذنبه إلى  
الصهبة الصنابية الزاوية. ريشته عزالانه وقوام جسده إلى  
السرة الخفيفة، أباهره إلى الصهبة، حدقة عينه سنائية  
اللون، منقاره ويولاه إلى السرة السوداء || أثناء تحضن  
مرتين في العام، الأولى في أواسط نيسان والثانية في أوائل  
حزيران. حصفتها تراوح من ٥ إلى ٨ بيضات .



لهيب اسود الزور

أوائل حزيران ويبقى حتى أواخر تموز. تشرح من البصر  
إلى قسمة الليل. تماثل بيد ظهورها بنحو ستة أسابيع  
وتتبع المكن ميحاديها على الصفحات السفلى من نصل  
الارراق || السرة تطول نحو ٢٨ سم. جسمها اسطواني  
الشكل، كثيف الملب القصير، ثوبها يمتاز البيئة التي  
تميل لها وهو يبراج من الخصار البحري إلى الريدة  
والصهبة الصفراء يملوه ثلاثة خطوط قاطبة إلى الجفوة.  
رؤاسها البطينية الوسطى ماسحة مما يجعلها تتقوس عند  
الانتقال || طول الكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما  
ينقضي في الجافة.

٢٥٠٦٩ - **لَهَائِقُ** (F). *Taureau blanc* (F). *White bull* (E).  
الهاق: الثور الأبيض، وكل أبيض هاق وفاق، بقرة  
هاق وفقة. شئ، ملحق اللون: أبيضه .

٢٥٠٧٠ - **شَجِيحَةٌ ، نَحْطَلَةٌ**  
*Emphysème pulmonaire* (F). *Pulmonary emphysema* (E).

تعريف أيضا بانتفاخ الرئة، داء يصيب الهائم في صدورها  
لا تكاد تسلم منه، وهو في الخليل من السيوب المبطة  
للبح .

٢٥٠٧١ - **لَهَيْمٌ**  
الهم هو الحسن من الحيوان وأخصها حيوان القنصاية  
كالبقر والغنم والماعز. ج. لوم .

٢٥٠٧٢ - **لَهْمٌ**  
عن الأمير مصطفى الشهابي. تربة مكنية في غرين وبل  
ورصلها بنسب متعادلة لا يسد فيها عنصر حل آخر.

٢٥٠٧٣ - **لَهْوِبٌ**  
قابل للالتهاب أو سريع الاشتعال أو الاحتراق.

٢٥٠٧٤ - **لَهْوِيَّةٌ**  
هي قابلية للالتهاب أو الاشتعال .

٢٥٠٧٥ - **لَهْوَرَةٌ**  
*Isothecium* (S). *Isothécium* (F).

جنس طحالب من جانبيات انباه. أنزاه المعروفة نحو  
٣٠ مبتها المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم. تعيش  
على الصخور في المواقع الرطبة || سوقها دقيقة، نخيلة،  
مدادة، أوراقها مترابكة شديدة الصغر. ضباطها جرابية  
مستطيلة المالحق المنصبة .

٢٥٠٧٦ - **لَهْوِيَّةٌ**  
*Uvularia* (S). *Uvulaire* (F).  
جنس نباتات جذورية عشبية ثريبتية معمرة من فصيلة  
الزنبقيات. أنزاهها المعروفة ستة. سوقها دقيقة، نخيلة  
فراها. أوراقها لا قياسية الشكل والانتظام. أزهارها  
لفدية أو ثوآمية الانتشاب || أطيلة الانتكاز، سدنية  
البتلات المستطيلة المتدلدة، لونها إلى الصفرة || أعرف  
أنواعها ما يتبع .

٢٥٠٧٧ - **لَهْوِيَّةٌ كَثِيرَةُ الزَّهْرِ**  
*Uvularia grandiflora* (S). *Uvulaire à grande fleur* (F).  
نوع من الالهوية السروية. تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم.  
أوراقها متعاقبة سنائية، نصلها بطول من ٦ إلى ١٠ سم.  
وهو مائل الصفحة العليا الخصاره، خلى السفلى الطلحاه.  
أزهارها كبيرة القد تطول من ٣ إلى ٤ سم. لونها إلى الصفرة  
الجميلة || أزهارها يستمر من نيسان إلى حزيران .

## ٢٥٠٨٤ - لهيمه \*

Crenilabrus (S).

Crénilabre (F). Crenilabrus (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الكيديات شائكات الزعانف. انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها شبه اهلبيجية الشكل تعلو من ١٥ الى ٣٥ سم. رؤوسها اسطوانية. زعانفها الظهرية مستطيلة. زعانفها الذيلية مقطوعة. سرائفها مائلة. الزواجا جيلة الالوان المراكبة الزاهية تتركز حل الرتبة الفضية تملأها خطوط ومجاذيب ومجاذيب ترواج من الاحمر الى الاصفر والاحمر || اسماك هذا الجنس تسرا في وكناث من الحث وتتفقد السر وتحافظ عليه حتى التقف || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .



لهيمه طاروسية

## ٢٥٠٨٥ - لهيمه طاروسية \*

Crenilabrus pavo (S). Crénilabre pason (F).

Crenilabrus pavo (E).

نوع من لهيمه . سمكة بحرية بيضاء . اصطناعها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك المباح وحشاش || جسمها اهليجي الشكل ، معتدل التخطيط يطول نحو ٣٥ سم. ثوبها متراكب الالوان القسطانية الجميلة . الذكر اكبر قدما من الانثى واكثر تزويجا وبلغ غصبا . رؤسها مخروطي الشكل . فكها قويان ، متماثلان شفتها معتدل الانفرج . حينها كيرتان ، جاسطتان ، ياقوتيتان . زعنفتها الظهرية مستطيلة ، لامتناهية الارتفاع . زعنفتها الذيلية مستديرة الطرف والزوايا || لحمها جيد الصنف ، مغروب فيه .



لهيمه مذولة

## ٢٥٠٨٦ - لهيمه مذولة \*

Crenilabrus melops (S). Crénilabre commun,

C. mélops (F). Crenilabrus melops (E).

نوع من لهيمه . سمكة بحرية بيضاء . اصطناعها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من اسماك المباح وحشاش || جسمها اهليجي الشكل معتدل التخطيط ، يطول نحو ١٨ سم. ثوبها متباين الخصب بين الذكر والانثى . اللون الجوزي يمد عند الذكر والاحمر الخفيف عند الانثى . ويملأ عند الشقين هلال اسود وراه كل حين بقعته سوداء قرب قاعدة الزعنفة الذيلية . رؤسها مخروطي الشكل ، ذات الحلق ، معتدل الشف . حينها كيرتان ، جاسطتان . زعانفها ملونة . الظهرية مستطيلة والذيلية مقطوعة الطرف || لحمها جيد الصنف مغروب فيه .



لواب المتوسط

## ٢٥٠٨٧ - لواب

Torcou (F).

طائر من التقاربات يعرف بابي لوي ، اطلبه .



لوابة

## ٢٥٠٨٨ - لواب \*

Lupa (S). Lupa (F). Lupa (E).

جنس منوع من النباتات عشائيات الارجل قصيرات اللبل وفصيلة الخيليات . انواعه المعروفة قليلة العدد اصطناعها بحار البلاد الحارة اغصها المحيط الهندي || اجسامها متفاوتة القد ، شديدة التباين الجسمي . تتميز بدهونها المسطحة وبامتداداتها الجانبية التي تأسط شكل الاسنة او الحراب . حمار دروعها الامامية منشاري الشكل . ارجلها الخلفية عمداية الفصل الطرفية . ملاقطها مسنة شليحة || اشهر انواعها لواب الهند ولواب المتوسط .



لوبياء

## ٢٥٠٨٩ - لواب المتوسط \* ، لواب مستلح \*

Lupa hastata (S). Lupa armée (F).

نوع من اللواب . اصطناعها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط جسمه صغير القد يطول نحو ٣ سم. ويرفص نحو ٦ سم. ثوبه متداخل الالوان فيه الاصفر والاديس والاصفر والاشفق والاسمر ويملأ في القسم الخلفي من درعه ثلاث نقط مستديرة جوية اللون .

## ٢٥٠٩٠ - لواب الهند \*

Lupa tranquebarica (S). Lupa des Indes (F).

نوع من اللواب . اصطناعها شواط الهند الجنوبية . جسمه كبير القد يطول نحو ١٥ سم. ويرفص نحو ٣٠ سم. ثوبه متداخل الالوان الجميلة فيه الازرق والاحمر والبرتقالي والاصفر والاشفق والفساني .

## ٢٥٠٩١ - لواب

Carnassiers, Carnivores, Fauves (F). Carnivorous, Fallow-deer (E).

رتبة من الحيوانات اللبونة آكلات اللحوم . فصائلها عديدة اشهرها السنوريات والكلبيات والديبات والضببات والسموريات والزباديات ...

## ٢٥٠٩٢ - لواب \*

Loasa (S). Loasa, Loase (F).

Loasa (E). Loasa, Nesselmalie (D). Loasa (I).

جنس نباتات شبيهة حولية برية وتربيتين من فصيلة اللوزيات . انواعها قليلة جميعها زباء ، زغب حارق كالفراس . اوراقها متنامية ، مقروضة . ازهارها فردية محورية الارتكاز ، تقابل الاوراق وهي خماسية التركيب ، جيلة الشكل ، نارية اللون تصطبغ بعض الوقت . ازهارها يستمر طوال الصيف .

## ٢٥٠٩٣ - لوابات \*

Loasaceae (S). Loasacées (F). Loasaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة العائلات اجناسها . وانواعها قليلة ، معظمها اشباب حولية ومحولة . اصطناعها امريكية الاستوائية .

## ٢٥٠٩٤ - لواب

Abellés (F).

اللوب هو التعل والالوب ايضا .

## ٢٥٠٩٥ - لوبياء \*

Dolichos unguiculatus (S). Dolique, D. asperge (F). Black eyed dolichos, Asparagus bean (E). Riesen Spargelbohne (D). Dolico asparago, Fagiolo dall'occhio (I).

نبات عشبي زراعي حولي من فصيلة القرنيات الفرفاشية . شروبه كثيرة العدد تزرع لقرنوها الخضراء البقلية او لبرورها الجافة || وهي تجود في جميع التربة الثقيلة الانساج الممكن دها . يزورها وافر المادة الغذائية تحوي مسا قدره :

٢٣,٢٤ ٪	من المواد الازوتية
١٣,٠ ٪	من المواد الدهنية
٥٦,٨٠ ٪	من المواد الهيدروكربونية

## ٢٥٠٩٦ - لوبياء بلدية \*

Dolce de Chine (F).

هي الدجر الصيني ، اطلبه .

## ٢٥٠٩٧ - لوبياء سودانية \*

Ambrevade (F).

هي البيلة الهندية ، اطلبه .

## ٢٥١٠٧ - لُوبِيَّة زَوْقَاء ، لُوبِيَّة السُّفْلِس

*Lobelia syphillica* (S). Lobélie syphilitique, Cardinale bleue (F).

بجلة طبية وزينية معمرة تملو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها فرعاء. أوراقها سنانية ذلقة تطول نحو ١٥ سم. تصلها مائل الصفحة المسنة الحافة. أزهارها سنانية التجميع تاجية الأركانز تطول نحو ٣ سم. لوئها إلى الزرقاء البنفسجية الموحج || أزهارها يستمر من تموز إلى تشرين. كانوا ولا يزالون يستعملون أزهارها وزهورها وجذورها في معالجة السفلس.

٢٥٠٩٨ - لُوبِيَّة عُسْفُورِيَّة (F). *Dolique bulbeux*

هي النامر ، الخلبه .

٢٥٠٩٩ - لُوبِيَّة سَبْلَابِيَّة (F). *Dolic lablab*

هي السبلاب المصري ، الخلبه .

٢٥١٠٠ - لُوبِيَّة سِيكَلَت (F). *Dolique à cell noir*

هي الدجر ، الخلبه .

٢٥١٠١ - لُوبِيَّة (S). *Lopezia*

*Lopézia* (F). *Lopezia* (E).

جنس نباتات عشبية برية وزينية من فصيلة الأحمديات. مهدها بعض مناطق أمريكا الجنوبية والمكسيك || ساقها ترتفع من ٣٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقها متعاقبة ، مختلفة الشكل . يكثر فيها السناني . أزهارها عقودي التجميع . أزهارها لانظامية ، متباينة الألوان ، رباعية الفصل والبتلات اللانسواوية ، ثنائية الإسدبة المستعرضة الاطراف || أنواعها المعروفة قليلة العدد ، أشهرها التالية :

٢٥١٠٢ - لُوبِيَّة زُرْجَنْجَرِيَّة (F). *Lopezia miniata*

*Lopézia miniata* (S). *Lopézia cinabra* (F).

نوع من الوبيزة . جنية سبروتية معمرة . مهدها المكسيك. ساقها خشوشية تملو نحو ٥٠ سم. أوراقها متعاقبة أحليجية مسنة التصل. أزهارها عقودي طرفي . أزهارها إلى الحمرة الزنجفريه اللامعة || تنويرها يستمر من تموز إلى تشرين الثاني .

٢٥١٠٣ - لُوبِيَّة كَثِيرَةُ الزَّهَر (F). *Lopezia grandiflora*

*Lopézia grandiflora* (S). *Lopézia à grandes fleurs* (F).

نوع من الوبيزة . جنية سبروتية معمرة . مهدها غواتيمالا . ساقها منتصبه فرعاء تملو من ١٠٠ إلى ١٦٠ سم. أوراقها متعاقبة أحليجية التصل تطول من ٥ إلى ٩ سم. تصلها خلية مهدية الاطراف . أزهارها فردية ، محورية ، قطرها من ٢ إلى ٣ سم. لوئها إلى الحمرة السفاه الموحج || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف وأخره .

٢٥١٠٤ - لُوبِيَّة مُتَوَجَّحَة (F). *Lopezia coronata*

*Lopézia coronata* (S). *Lopézia couronnée* (F).

نوع من الوبيزة . عشبية سبروتية زينية حولية . مهدها المكسيك . ساقها مضطعة مزوانية تملو من ٤٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها متعاقبة ، بيضيه التصل المسن الحار . أزهارها عقودي طرفي . أزهارها إلى الوردي الارجواني الموحج || تنويرها يستمر من تموز إلى ايلول .

٢٥١٠٥ - لُوبِيَّات (S). *Lobeliaceae*

*Lobeliacées* (F). *Lobeliaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متعددة الفعالات . أجناسها وأنواعها كثيرة العدد ، أشهرها اللوبلية .

٢٥١٠٦ - لُوبِيَّة (S). *Lobelia*

*Lobelia* (S). *Lobélie* (F).

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة اللوبليات. أنواعها نحو ٢٠٠ منها بري وبعضها طبي وزيني . أزوارها متعاقبة لا قياسية الشكل . أزهارها لا نظامية التجميع والأركانز ، جملة الشكل مختلفة الألوان || احرف أنواعها وأشهرها ما يتبع :

٢٥١٠٨ - لُوبِيَّة سَاطِعَة (S). *Lobelia fulgens*

*Lobélie éclatante* (F).

بجلة زينية معمرة تملو من ٦٠ إلى ٩٠ سم. ساقها قليلة الفروع . أوراقها لاطنة لسنة ؛ فصلها مسن الحافة ، اغسر جوي اللون خلي البشرة ، أزهارها كبيرة القد ، خلية القنابات الفردية ، برتقالية اللون || أزهارها يستمر من ايار إلى ايلول .

٢٥١٠٩ - لُوبِيَّة فَائِخِرَة (S). *Lobelia splendens*

*Lobélie splendide* (F).

بجلة زينية معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها فرعاء . أوراقها لاطنة لسنة ؛ فصلها مسن الحافة ، اغسر الصفحة ، جوي الحار . أزهارها كبيرة القد ، ارجوانية اللون ، برتقالية الموحج || أزهارها يستمر من تموز إلى تشرين الثاني .

٢٥١١٠ - لُوبِيَّة قُرْعَاء (S). *Lobelia ramosa*

*Lobélie ramifiée* (F).

بجلة زينية معمرة تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ساقها أسطوانية زباه . أوراقها السفلى ريشية خمره . أوراقها العليا سنانية مدببة الزام الاعير . تصلها خلي البشرة أحليج اللون . أزهارها كبيرة القد لوئها إلى الزرقاء || أزهارها يستمر من حزيران إلى آب .

٢٥١١١ - لُوبِيَّة قُرْمِيَّة (S). *Lobelia cardinalis*

*Lobélie cardinale* (F).

بجلة زينية معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. ساقها قليلة الفروع ، أوراقها لسنة مسنة . تصلها مائل الصفحة يطول من ٥ إلى ١٥ سم. أزهارها قرمزية اللون لا متشاربة القنابات || أزهارها يستمر من ايار إلى ايلول .

٢٥١١٢ - لُوبِيَّة كَرْمِيَّة (S). *Lobelia amoena*

*Lobélie de la Caroline* (F).

بجلة زينية معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٤٠ سم. ساقها فرعاء . أوراقها أحليجية سنانية تطول من ١٠ إلى ١٥ سم. تصلها مائل الصفحة المسنة الحافة . أزهارها سلبية التجميع ، تاجية الأركانز ، لوئها إلى الزرقاء الباهية . أزهارها يستمر من تموز إلى ايلول .

٢٥١١٣ - لُوبِيَّة مَحْرُورَة (S). *Lobelia urens*

*Lobélie brûlée* (F).

بجلة برية طبية معمرة تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. تدبش في المناطق والأراضي الرطبة ، مهدها الحد . يقال أنها جمالية المادة قلتها تغيد للمدة ، كثرها مؤذية . ساقها زباه اللحاء . أوراقها مزغبرة ، زغبها محرق قارس . أزهارها وردية اللون .



لوبلية

٢٠١٢٣ - **لَوْتُ** (E). Polluer (F). To pollute (E).

وسخ الشيء باغثة الاقذار عليه كتلوث مياه الانهر ببعض المواد الكيماوية .

٢٠١٢٤ - **لَوْدِيَّات** (F). Eupaléodictyoptères (F). Eupaleodictyoptera (E).

رَبَّة حشرات منقرضة من طبقة المفكيات . احافيرها تعود الى الحقبة الرابعة من الاياج الاولي المعروفة ايضا بالحقبة الكربونية || جمع حشرات كبيرة القوة خاضعة او دامة .

٢٠١٢٥ - **لَوْدِيَّة** (F). Lucina (E). Lucina (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة القرونيات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ بعضها من صمغيات الحقبة السيلورية والبعض الآخر منتشر في معظم بحار العالم || اصداؤها متباينة الاشكال والاحجام منها القصية والبغية والمالسة والمخددة والمضلفة . جميعها ثنائية المتابع الطليقة المستطيلة || تعيش في الرمال المغسورة بالماء قرب الشواطئ والجبالح .

٢٠١٢٦ - **لَوْدِيَّات** (S). Lucinidae (S). Lucinidae (F). Lucinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة من غابرة ومعاصرة . عديدة . الغابرة يميز العصر السيلوري اما المعاصرة فتنتشر في معظم بحار العالم || اصداؤها لاتباينة الشكل والحجم يكثر فيها البيضوي المنحرف . اطراف مصاريها مسننة الحفار او مائلة || اعرف اجناسها واشهرها اللودينية والكربيس .

٢٠١٢٧ - **لَوْدِيَّة** (F). Planché à dessin (F). Drawing-board (E).٢٠١٢٨ - **لَوْدِيَّة كَبْرِيَّة** (F). Cosmia fulvago (S). Cosmie jaune soufre, Calymnie jaune (F). Cosmia fulvago (E).

حشرة من فصيلة الفسيقات حشرقيات الاجنحة . موطنها بعض الاقاليم المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط والبلاد اوروبية . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقها تدبش حل اوراق النباتات والاشجار الخرجية || جسمها مرصفي الشكل يطول نحو ١٢ سم . بسطها نحو ٣١ سم . رأسها كبريتي اللون . عينها كبريتان . زباناها خيطيان . جوشها وبطنها الى الصفار الكبريتي || روشنها الاماميان الى الصفار الكبريتي طوله يتبعج عنابي وتشبيك بني . روشنها الخلفيان الى الشبهة الصفراء || لها جويل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتمتد المكن لطحا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تطول نحو ١٨ سم . جسمها اسطواني الشكل . مائل للتقشار . اسفر اللون . اسود الملاتي . رأسها اسود . مدنها ودراجها الى السرفة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي في التربة حيث تنفخ السرفة ملتصقة بجلباب من الطين .

٢٠١١٤ - **لَوْبِيلِيَّة هَانِكَة**

*Lobelia heterophylla* (S). *Lobelia heterophylla* (F). عشبة حولية تزيينية تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . ساقها مفصلة سرسة قليلة الفروع . اوراقها السفلى ريشية مفردة ، اوراقها العليا املجية او سنانية النصل . ازهارها عقنودية التجميع . كبيرة القند . خلية البشرة . لونها الى الزرقة يملوها موج وردى او ابيض || ازهارها يستمر طول فصل الصيف .

٢٠١١٥ - **لَوْتُ** (S). Sciaena (S). Sciaena (F). Sciaena (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الجاريات . انواعها نحو ٢٥ جميعها مفترية . قوتها الزنكة والسردين . معظمها من اسماك المحيط الاطلسي . تتميز بكبر اجسامها وزعانفها الظهرية . لونها الى الكهية السراء يطولها موج اصفر || الشهر انواعه كوت المتوسط .

٢٠١١٦ - **لَوْتُ الْمُتَوَسِّط** - **لَيْسْطَرَاك**

*Sciaena aquila* (S). *Sciaène aigle, Megre, Perseque* (F). *Megre* (E). نوع من اللوت الميول في المتوسط . مسرعه غن المياه الاقليمية . جسده كبيرة القند تطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . ثوبه الى الريدة الطلاء الصفراء الموج . لحمه لذيق الطعم جيدة الصنف .

٢٠١١٧ - **لَوْتُس** (F). Lotus (F). Lotus (E). هو اللوتس ، الملب .٢٠١١٨ - **لَوْتُيَا لَحْيَةِ الْهَيْسَل**

*Anthyllis barba Jovis* (S). *Antyllide barbe de Jupiter, Barbe de Jupiter* (F). *Jove's beard, Jupiter's beard* (E). *Jupitersbart, Silberbart* (D). *Antillide, Barba Giova* (I).

عشبة برية مرعوية من القرنيات الفراشية تكثر في الاراضي الخشابة ، ساقها فروع مستقلة . اوراقها مركبة متعاقبة . وريقاتها ريشية متقاربة . ازهارها ابطية وطريقة الارتكاز مستحبة العرف ، مفترية .

٢٠١١٩ - **لَوْتُيَا نَافِلَة** - **حَشِيَّة الْجِرَاح****حَشِيَّة الْدَّب**

*Anthyllis vulneraria* (S). *Antyllide vulnéraria, Trefle jaune* (F). *Kidney-vetch, Layd's fingers* (E). *Echter Wundklee, Gelber Hasenklee* (D). *Vulneraria, Trifoglio giallo delle sabbie* (I).

عشبة برية طيبة ومرعوية من فصيلة القرنيات الفراشية ، تكثر في الاربة الرملية القاحلة . ساقها مستقلة . اوراقها مركبة متعاقبة ، وريقاتها ريشية متعاقبة الارتكاز . ازهارها مستطيلة المالحق صفراء اللون وريدة الموج . اوراقها طيبة تلهم الجرح بعد ان تقضي على الالتهاب .

٢٠١٢٠ - **لَوْتُسِيَوْم****لَوْتُين**٢٠١٢١ - **لَوْتُ**٢٠١٢٢ - **لَوْتُ**

هو ثول النحل من الهجرة الثانية والثالثة . اما الثول من الهجرة الاولى فيدعى ديسماً .



لوت



لوتيا حية الجبل



لوتيا نامة



لوتية



لوحس كبريتي



## ٢٠١٢٩ - لَوْحَسْ مُذَهَّب \*

Cosmia aurago (S). Cosmie dorée, Calymnia dorée (F). Cosmia aurago (E).

حشرة من الفصيلة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض الاقاليم المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط والافد واروية . فراشها جارية قوتها وحيق الازهار . سرتها تمش على اوراق وشبارة الزان والمائل || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ م . بسطها نحو ٢٣ م . رأسها الى الخلفي المذهب المراج . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . جرشها ويطها الى الصفار المذهب المراج || ورشها الاسمان الى الصفار الكبريتي يملو تنقيط وبضحي هنائي . ورشها الخفيفات الى الشهية الثراء تملوها شمة تبارج بين الخلفي والامفر || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آب وتبقى حتى اواخر المول . تروح في الليل . تماثل يمد ظهورها بنحو خمسة اسابيع . وتتمتع المكان لطفاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الازراق || السرعة تطول نحو ٢٠ م . جسمها اسطواني الشكل . مالم القشار غروفي اللون . زنتي المراج . رأسها الى الجؤرة . منها الى السرة . وراجهما الى السرة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٥ يوم ويتقفي في التربة حيث تنفخ السرعة لمتلعة بجلاب من الطين .

## ٢٠١٣٢ - لَوْرَسِيَّات \*

Clavigeridae (S).

Clavigeridae (F). Clavigeridae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم انظار العالم لانها تعيش في قرى النمل مع اكثر اجناسه || اجناسها صغيرة تطول من ٢ الى ٤ م . رؤوسها صغيرة . ضيقة . مستطيلة الشكل . عيونها طامسة . قرونها الاستشعارية صولجانية . سداسية الفصل . تأثيرها وفكوكها صغيرة . كواسلها بضية الشكل . صغيرة الحجم . بطونها اجاصية الشكل . اغامداها صغيرة تلتصق ثلث البطن || تعيش مع النمل الذي يطنها بالفلس والذي يلحس ما تنفضه مسام بطونها من مواد مائة || شهر اجناسها اللوص .



لوص مذهب



لوص

## ٢٠١٣٤ - لَوْر \*

Coregonus lavaretus (S).

Lavaret (F). Gwyniad (E).

سكة نهريه وبحيرية من فصيلة السلوسيات . جسمها اهلبيلي الشكل يطول نحو ٤٥ سم . لوربا الى الريدة الزرقاء يملوها موج فضي وتكت سود تكتنف الظهر من جانبيه . ترطب في المياه العذبة . تسرا في تشرير الثاني . لحما لذية اللحم جيد الصنف .



لورج

## ٢٠١٣٥ - لَوْرَاسِيَا \*

Laurasia (F). Laurasia (E).

اسم يطلقه علماء الجيولوجية والجغرافية على المنطقة القارية التي كانت . قبل تجزئتها . تتألف من آسيا واروية وامريكة الشمالية .

## ٢٠١٣٦ - لَوْرَس \*

Mouetta (F).

هو زج الماء . اعطيه .



لورس

## ٢٠١٣٧ - لَوْرَس \*

Loricera (S).

Loricera (F). Loricera (E).

جنس حشرات قانصة من فصيلة اللورسيات وربة غديات الاجنحة . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجناسها حفاة تطول من ٧ الى ١٠ م . رؤوسها كبيرة . عيونها كبيرة . نافرة . قرونها الاستشعارية مقدية الفصل المجزأة ببعض الهلب المستطيل . تأثيرها ضلبيية . كواسلها محدودة . مخسورة . اغامداها لاحقة . نحلة التخديد القاطب . قواطمها قشبية . مبيطة الهلب . انزلها الى السرة السوداء المتفاوتة المجات || الحشرة الجبلانة قانصة . تألف المواقع الرطبة اخصها غشاف المنائع . البقرة وانجة .



لور

## ٢٠١٣٨ - لَوْرَسِيَّات \*

Loroceridae (S).

Loroceridae (F). Loroceridae (E).

فصيلة حشرات من ربة غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجناسها مستطيلة الشكل . رؤوسها كبيرة . عيونها كبيرة . نافرة . قرونها الاستشعارية وفكوكها الهلب الشالك . تأثيرها بارزة الاطراف الخارجية المسلكة . برانجدا حادة الزناد . اغامداها نحلة التخديد القاطب الذي يمد ١٢ اشعور . قواطمها معتدلة الطول . مبيطة الهلب || مكها بي اسطواني الشكل . عين الطرف النقيق . تنمته الاثنى افراديا في التربة . يرقاتها سداسية التفرام والمقل . حورياتها تنحور في التربة داخل اوراقه انبوبية الشكل سطوية الرأس والمقل ||



لورس

## ٢٠١٣٠ - لَوْحَف \*

Parnophorus (S).

Parnophorus (F). Parnophorus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل وحيدات الاجزاء وفصيلة التقيويات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها البحر الاحمر وبعض البحار الاسيوية . تعيش على المذيق قرب الشواطئ . جميعها سرقة وتحتي التور تنفخ في الحصىا وتحت الرمال || اصداها شبه اعطليجية الشكل . مقطرة المقدم . مستديرة المؤخر . نافرة التبع . قليلة الارتفاع . تلتف كامل الظهر . رؤوسها تنتهي باخظام اسطوانية . لوامسها شبه مخروطية اشكل . عيونها جاسطة قاعدية . خياشيمها ظهريه الارتكاز تقوم في تجويد خاص يلامس المتق || شهر انواعها لوفقة البحر الاحمر .

## ٢٠١٣١ - لَوْح \*

Cluytia (S). Clutia; Cluytie (F).

Cluytia (E). Clutia (D). Clutia (I).

ليات حشري لبي زنتي من فصيلة السوسيات مبهه البلاد الاستوائية . ساقه كدة . اوراقه خلية بحلة الخضار الاصل . ازهاره زائمية الالوان البية || يزود في المراكن والنصارى .

## ٢٠١٣٢ - لَوْحَس \*

Claviger (S).

Clavigère (F). Claviger (E).

جنس حشرات من فصيلة اللورسيات وربة غديات الاجنحة . انواعها المعروفة سمة اعطائها تمتد من الهند وايران الى اربية . تعيش مع بعض انواع النمل اخصها الكبار || اجناسها صغيرة تطول نحو ٣ م . رؤوسها ضيقة . مستطيلة الشكل . عيونها طامسة . قرونها الاستشعارية صولجانية . تأثيرها وفكوكها صغيرة . ملامسها نحلة . كواسلها صغيرة . بضية الشكل . بطونها اجاصية . اغامداها قصيرة تلتصق ثلث البطن . انزلها الى السرة السوداء المتفاوتة المجات || تعيش مع النمل في قرارة خفيها ويلحس ما تنفضه مسام بطونها .

Olivier du Maroc (F). ٢٥١٤٤ - لَوْرُ الْجَبَر  
هو الأركان ، اطلبه .

Amandier des Indes (F). ٢٥١٤٥ - لَوْرُ الْهِنْد  
هو الامليلج اللوزي ، اطلبه .

٢٥١٤٦ - لَوْرُ حُلُو  
Prunus amygdalus communis, Amygdalus communis, A. dulcis (S). Amandier commun (F). Common almond tree (E). Echte Mandel (D). Mandorlo comune (I).

هو اللوز المشهور المأكول الثمار غشوية كثيرة العدد تقسم الى فئتين : فئة الغشوب ذات النواة الصلبة ، وفئة الغشوب ذات النواة الطرية الممكن فقشها بالاصابع .  
انحاء غليظة السرق تملو من ١٢ الى ١٢ م . ثمارها مأكولة اللوب تحوي ما يراوح قدره :

من ٥٠ الى ٥٥ ٪ من المواد الزيتية

من ٢٢ الى ٢٥ ٪ من المواد الاخرى

وهي شائعة الاستعمال في صناعات السكاكر ويستخرج منها زيت اللوز .

٢٥١٤٧ - لَوْرُ مَر ، مَرْج  
Prunus amygdalus amara, Amygdalus amara. (S). Amandier amer (F). Bitter almond tree (E). Bittere Mandeln (D). Mandorlo amaro (I).

نوع من اللوز ثمرته سبروتية نشطة تملو من ٦ الى ١٥ م .  
زرعها حية لانها تستعمل كطعم لغشوب اللوز الحلو .  
ثمارها صلبة . لوبها مر الطعم يحوي بعض المواد الحولية  
اخصها الاينيدالين (Amygdaline) التي ينشأ عنها  
الحامض السينيدريكي او الحامض البروسي الشديد الفعالية  
السامة . ثمارها تستعمل في الصناعة فيستخرج منها زيت  
اللوز المشهور وهو طيب ، عادم الاذى ، خصال من  
الناصر السامة . اما الكسب لانهم عن عصره فهو سام  
يمت .

Amande (F). Almond (E). ٢٥١٤٨ - لَوْرُ  
هي ثمرة اللوز منها الحلوة والمرة .

٢٥١٤٩ - لَوْرُ الْوُضَاب  
هي اللعة اللامبية ، اطلبه .

٢٥١٥٠ - لَوْرُ لَيْسَة  
Loeselia (S). Loesélie (F). Loesélie (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية وتزينية من فصيلة  
القيسيات معقودة التعريف على اسم العلامة «لوزل» .  
هدها بعض مناطق المكسيك . سوقها منتشرة تملو من  
٥٥ الى ١٠٠ سم . اوراقها بيضيه النعل او سناية .  
ازهارها زرقاء اللون او قرمزية . قناباتها مسنة الى انواعها  
المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .

Loeselia coerules (S). ٢٥١٥١ - لَوْرُ لَيْسَة زَوَكَه  
Loesélie bleue (F).

نوع من الورلية . عشبة حولية تزينية . ساقيها تملو من  
٥٥ الى ٧٠ سم . فروعه نخيلة صلبة ، حولية اللحاء .  
اوراقها بيضيه الشكل ، نصلها مسنة اختار . ابروها  
زرقاء اللون . قناباتها صامدة وسردية في تنويرها صيفي .

تميش حل غشاف الابر واليسيرات والمناقع . معظم  
انواعها قاصص وبعضها غاسل || اشهر اجناسها القزرس .

٢٥١٣٩ - لَوْرُ كَنْس  
Loranthé d'Europe (F). هي البتوبه ، اطلبه .

٢٥١٤٠ - لَوْرُ كَيْسَة  
Laurencia (S). Laurencia (F). Laurencia (E).

جنس نباتات بحرية من الخفيات الحمر . انواعها المعروفة  
تحو ٢٥ اعطائها معظم بحار العالم || بعضها غشوي  
المادة والبعض الآخر حاديا . الثوب تراوح من الاصفر  
الى الاحمر || بعض انواعها الغشوية حريفة الطم  
تستعمل استعمال التوابل في بعض مناطق اوروبا الشمالية .

٢٥١٤١ - لَوْرِي  
Domicella (S). Lori (F).

جنس طير من التسلفات وفصيلة الببغاوات . انواعه  
المعروفة ٢٢ موطنها يمتد من الهند الصينية الى ماليزيه  
والفيليبين . ملجتها الحياتي جماعي الا في زمن التساند  
والهضنة . تألف الثبات والمروج وغشاف مجاري الماء .  
قوتها حبوب التبيليات والثار || اجسامها معتدلة القد  
قرينة الشبه بالهام . ثوبها متباينة الالوان القراكية يكثر  
فيها الاحمر الابيضوي ثم الاصفر فالاصفر فالازرق  
فالبنائي . اجنتها ذلقة ، اذناها متوسطة الحجم ،  
مستديرة الاطراف .

٢٥١٤٢ - لَوْر  
Prunus amygdalus (S). Amandier (F). Almond tree (E). Mandel (D). Mandorlo (I).

جنس اشجار مشمرة برية وزراعية من فصيلة الورديات .  
انواعه اثنتان : لوز حلو ولوز مر ، فالخلو هو الزراعي  
وهو كثير الغشوب ولز هو البري . وبجربة للوز من  
اي نوع كانت تستعمل بذات الشؤنة الجسنة . جذورها  
وتدعي تنور في التربة على اعماق بعيدة . ساقيها مستقيمة  
غشنة . اغصانها متفرجة كثيرة الاتناد . اغنادها فناء .  
قنتها معتدلة الشموخ ، قصيرة الذروة . اوراقها عابله ،  
معنقة ، رعية ، ذلقة . نصلها يغير اخضر اللون في اول  
عهد ثم ينحرف الى الحلقة ويستقر عليها حتى الذبول  
والايصال . ازهارها لوزية التجميع ، يضاء اللون ، ودية  
المراج . تتكون على الاتناد الحولية والحولية . وهي تنور في  
اراسد الشتاء فيليلج زهرها ، في لبنان ، خلال التربة  
الثانية من شباط وذلك قبل ابراق بعض البت . ثمارها

لوزية مستطيلة مدببة المقصعة تتكون من غلاف لحمي اخضر  
اللون احمل البشرة الكثيفة الخلل يحف مع الادراك وهو  
يغض عجمة غشبية النشاء تغلف نواة لوبها ابيض اللون  
جامد المكسر وافر المادة الزيتية || واللوز يتكاثر  
بالبلد ومن المستحسن وضع البذور في مستقراها مباشرة  
دون اللجوء الى المشائل وذلك لان نقل الفرس من المشتل  
الى مستقراها يوجب قطع الجذور الرتدية العمل الذي  
ينشأ مع سبوات هذه الشجرة || وهو يعيش ويؤدم  
في جميع الاقاليم الحارة والمعتدلة لا يؤذي سوى الصقيع لانه  
يسبب اغلاص الزهر او العقد || وهو يحدو في جميع  
الآثريه انما يرجع المنتسبة الانساج التي لا تفترق الى  
الكس كما وانه لا يصر كثيرا في الآثريه الفينية المنديجة .

٢٥١٤٣ - لَوْرُ الْكَيْسَة  
Cacaoyer (F). هو الكاكو ، اطلبه .



لورنية



لوري



لوز حلو



لوب

نحو ١٠٠ مظهر ثياب عشبي وبمضغ جنبي. اورلقتها مركبة، ثلاثية، اذينية، انزعاجا لا قياسية التجميع والارتكاز جميعها مشربة || أكثر انزعاجا علفية زماما ثمانية بينها الطليعة العديدة القوائد، اشهرها.

### ٢٥١٦١ - لُوطُس أُرْجُولِي \* ، لُوطُس زُرَاعِي حَمَض سَكْرِي

*Lotus tetragonolobus, Tetragonolobus purpureus* (S). *Lotier cultivé, L. pourpre, L. rouge, Pois café.* (F). *Garden winged pea* (E). *Rote Spargelerbsa* (D). *Loto cultivato, L. rosso, Vaccia pisella* (I).

نوع من اللوطس البري والزراعي، وهو عشبة سرولية حولية تملأ من ١٥ إلى ٤٠ سم. ساقها مستقيمة فراء. ورقاتها واذيتاتها بيضيه الشكل. ازهارها فردية أو ثنائية التجميع، ابعية الارتكاز، حراء اللون، سفلتها رباعية الانسل. ازهارها يستمر من آذار الى ايار.

### ٢٥١٦٢ - لُوطُس أَصْفَر \* *Nelumbo lutea* (S). *Nélimbo jaune, Lotus jaune* (F).

نبات عشبي مائي جنموري من فصيلة النيلوفرينات. جذاميره صفولية نشوية المسادة المأكلة. اورلقتها زنادية كبيرة مستدرة قطرها يراوح من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ازهاره صفراء اللون عادمة البرف قطرها يراوح من ١٥ إلى ٢٥ سم. تركز على شمرايح تطول من ١٠٠ إلى ٢٥٠ سم. || ازهاره يستمر من تموز الى آب.



لوطس ارجواني

### ٢٥١٦٣ - لُوطُس النِيل ، لُوطُس مِصْرِي ، عُرُوس النِيل ، وَدَّة النِيل

*Nelumbium speciosum, Nelumbo nucifera* (S). *Lotus sacré, L. du Nil, Fève d'Egypte, Rose du Nil* (F). *East Indian lotus, Pythagorean bean, Sacred bean* (E). *Lotus blume, Agyptische bohne, Nillilie* (D). *Loto sacro, Fava del Nilo* (I).

نبات عشبي مائي جنموري ملاد من فصيلة النيلوفرينات. اعطائه مياه البلاد الحارة الهندية والافريقية. اورلقتها زنادية كبيرة مستدرة، تصلها يوم على سطح الماء قطرها يراوح من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. أما زنادها فيطول من ١٥٠ إلى ٢٥٠ سم. ازهاره كبيرة القند وردية اللون قطرها يراوح من ٢٠ إلى ٣٥ سم. وهي ذكية البرف المعري. ثماره كروية الشكل نشوية المادة المأكلة || ازهاره يستمر طوال الصيف.



لوطس اصفر

### ٢٥١٦٤ - لُوطُس فَلِسْتِيشِي \* ، عَظْمِيَّة

*Lotus palaestinus* (S). *Lotier de Palestine* (F). *Four winged pea* (E). *Garten Spargelerbsa* (D). *Loto di giardino* (I).

نوع من اللوطس البري المرموي المسمر. اعطائه تهلل يلاذ شرق البحر المتوسط. ساقه متضبة فراء. ازهاره ابعية ومزجية الارتكاز صفراء اللون. زوره ماكلة تنبهر من المقويات الماددة الفعول الرجوي.



لوتس فلسطيني



لوطس قرني

### ٢٥١٦٢ - لُوزِيَّة قِرْمِزِيَّة \*

*Loeselia coccinea* (S). *Loeselia écarlate* (F).

نوع من اللوزية. عشبة حولية تزدينية. ساقها تملأ من ١٠ إلى ١٠٠ سم. اورلقتها سنانية الشكل. نصلها مسندة الخمار، بجلة الخضار اللامع. ازهارها قرمزية اللون تطول نحو ٢ سم. ثنائياتها صاملة || تنورها يستمر طوال شهر حزيران.

### ٢٥١٦٣ - لُوزِيَّات

*Arbres à noyaux* (F).

*Stone-plants* (E).

هي الاشجار اللوزية البزور، اغلب حميميات.

### ٢٥١٦٤ - لُوزِيَّين \*

الوزيين غلوكوزيد يوجد في لب عصيات الغرز المر والدراق والكرز... الوزيين تموي في الماء وتتحول الى غلوكوز سامض سيانيدريك والهديد يزدوك. وهي، في مدة الانسان، تتحول كما في الماء فتسب عارض تسم قد يكون مميتا.

### ٢٥١٥٥ - لُوسِيَّت

*Leucite*

جسم يتكون في ودة الخلايا النباتية. ج. لوسيات.

### ٢٥١٦٦ - لُوتُوب \*

*Otocyon* (S).

*Otocyon, Chien oreillard* (F). *Otocyon* (E).

حيوان لاحم مفترس وسيد الجنس والنوع من فصيلة الكليات. موطنه بعض مناطق افريقية الشرقية والجنوبية. يأنف الادلان والاحراج للبشرة الاشجار. ملجئه الحياتي زوجي || جسمه قريب الشبه بجم اين أوى، طوله نحو ١٠٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٣٨ سم. رأسه مستد الجرم، ذلق الخضر. عيناه صغيرتان حادتا البصر. اذناه حريفستان كيرتان. ذنبه كذنب الثعلب. ثوبه الى الكهبة الموشحة بالخطلي. قوامه الى الكهبة السوداء وهي خاصة الاصابع في القاعين الاماسيتين، ورباعيتها في الخلفيتين || يسرح في الليل ويبيت في النهار. قوته كل ما استطاع اليه سبيلا من الحيوان والشرار اعصها الجراد.

### ٢٥١٦٧ - لُوتُوبَة \*

*Paralepis* (S). *Paralépis* (F).

جنس اسماك بحرية من مفتوحات المثانة وفصيلة البوسيات. انزعاجها المرفوعة ثلاثة، اثنتان تيمشان في البحر الابيض المتوسط واحدة في بحار الشمال || اجسامها وشعبة الشكل، مستطيلة، رؤوسها مخروطية، ذلقة، عادمة السهت. عيونها كبيرة صاطئة. اسطمانها ربيبة الاشراق. زمانها الظهريه صغيرة القند، خلفية الارتكاز. زمانها الذيلية فائقة || الترابها الى الشبهة القفصية تقيم في الظهر ويملأها مزلج يراوح من الرودي الى اليلكي في البطن || لحوبها جيدة الصنف، مغروبو ليا.

### ٢٥١٦٨ - لُوتُوس \*

*Proscole* (F).

الوصق غدة مغذية سائلها شديد الزوجة يسلق الطلع عند السحليات.

### ٢٥١٦٩ - لُوطُوس هو اللاطس، اطلبه.

*Lotus* (S).

*Lotier* (F). *Lotus* (E).

جنس نباتات برية وزراعية من القرنيات القرافية. انزعاجه

Arum macul6 (F).

٢٥١٧٣ - **لُوف مَبْعَق**  
هو الاروم ، اطلبه .

Luffa acutangula (S).

Louffa anguleux (F).

نوع من اللوف الزراعي ، مهده الهند . ساقه تطول من ٣ الى ٩ امتار . اوراقه شديدة الخضار خضابية او سباعية التفصيص القلبي الشكل . ازهاره ثلاثية الاسدية . ثماره مستطيلة ، حشاشية الاصلع البازرة تطول من ١٥ الى ٣٥ سم . وتعرض من ٩ الى ١٠ سم . ليها شائع الاستعمال .

Lophyrus pinl (S).

Lophyre du pin (F). Pine sawfly (E). Gemeine Kiefernblattwespe (D).

حشرة من المنشاريات ، طولها يراوح من ٩ الى ١٠ سم . اجيالها الحولية ثلاثة . ذكرها اسود اللون . انثاها ملطخة بالاصفر ، تمتع مكثها على بناتق الصنوبر فينقت عن يرقات دقيقة همة تلثم الاهداب النامية وتقضي عليها .

٢٥١٧٦ - **لُوقاس**

هو اللابيون الاقلع ، اطلبه .

Leucaenidae (S).

Leucaenidae (F). Leucaenidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة المدد جميعها متوسطة القد او صغيرة . اعطائها العالم . تميش على الاحشاب البرية والزراعية اخصها النجيليات .

Leucania (S). Leucanie (F).

جنس حشرات حرشفية من فصيلة اللوقيات . انواعها عديدة منتشرة في معظم اسواق العالم . اجسامها صغيرة القد . وراشها قليلة الزراكن والاهداب يتكرر فيها الاسمر وشققاته || اشهرها واضرها لوقيات النجيل .

٢٥١٧٩ - **لُوقانيّة النجيل**

Leucania forey (S). Leucanie du mais (F).

حشرة من اللوقيات ، طولها نحو ١٧ سم . ثوبها حنطي اللون اسمر الموج . وراشها الى السمر اللوردية . رقبها دقيقة الجسم تطول نحو ٣ سم . رأسها الى الجؤرة . ثوبها حنطي اللون وردي الموج يطوى تحطيط اسمر قاطب ويعترض تنخله نقط سود نظامية الازتكاز || تركب النجيليات البرية والزراعية اخصها الذرة والمصان والحلقة فتؤذي المصنّف وقد تقضي عليه عند كثرتها .

٢٥١٨٠ - **لُوقانيّة دكيسة**

Leucania impura (S). Leucanie impure (F).

Leucania impura (E).

حشرة من فصيلة اللوقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط والناطق الداخلية الشاخة . فراشها بجارسة قوتها رقيق الازهار . سرقتها تميش على عصف النجيليات البرية || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ سم . بسطها نحو ٣٣ سم . رأسها اكلس اللون اصعب الموج . عينهاا كبرتتان . زبابهاا غيطيان . جرشها وبطنها الى الكلسة الصهباء الموج || وراشها عند الشقين الى الكلسة تملوها مشقة سمره عند الذكر ، شهبا عند الانثى || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تشرح في

نبات طبي يلثم الجرح وينفع من البواسير . نفع ازهاره يقضي على التهاب العين .

٢٥١٦٦ - **لُوطِيّات**

Lorées (F).

سبط من فصيلة اللقرنات القرائية ، اشهر اجناسه اللولوس .

٢٥١٦٧ - **لُوعَانِيّات** ، **سَبَجِيّات**

Loganiaceae (S). Loganiacées (F). Loganiaceae (E).

فصيلة نباتية من مزدوجات الملقحة متحدة القعاات . تشمل ٣٠ جنساً و ٣٥٠٠ نوعاً من النباتات الشبية والنجبية والشجرية . اوراقها بسيطة ، كاملة ، اذينية ، متقابلة . ازهارها صغيرة القد ، لا قياسية الازتكاز . ثمارها كرابل مزدوجة ، متغلقة . اكثرها من نباتات البلاد الاستوائية والحرارة . معظمها جمالي يحوى بعض الناممر السامة اخصها السرّكين والبروسين .

٢٥١٦٨ - **لُوف** ، **لُيف** ، **قَبْلَجُوش**

Luffa (S). Louffa (F). Towel gourd (E).

Schwammkürbis (D). Luffa (I).

جنس نباتات عشبية حولية عارشة من فصيلة القرعيات . انواعه ١٠ ينبتا المناطق الحارة . سرقتها مستطيلة ، حوالته شمشية . اوراقها متعاقبة ، منقطة ، قليلة الشكل ، خضابية او سباعية التفصيص . ازهارها وحيدة المسكن ، كبيرة القد ، صفراء اللون . ثمارها غيارية الشكل مستطيلة . تسحبها عشن الليف الحاموي الاسفنجي التركيب || اشهر انواعه ما يلي .

٢٥١٦٩ - **لُوف أسطواني** ، **لُوف مصري**

Luffa cylindrica, L. aegyptiaca, Poppla fabiana (S).

Louffa cylindrique, Eponge végétale, Pétrole, Tor-

chon (F). Egyptian towel gourd, Rag-gourd, Ve-

getable sponge (E). Aegyptische Schwammkürbis (D).

Luffa d'Égypte, Petola, Pecuola, Spugna vegetale (I).

نوع من اللوف الزراعي الشائع الاستعمال . ساقه تطول من ٣ الى ٧ امتار . اوراقه خضابية التفصيص الكلوي الشكل . ازهاره خضابية الاسدية . ثمار اسطوانية تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم . ليها شائع الاستعمال المنزلي .

٢٥١٧٠ - **لُوف الحية** ، **أذن الرأب**

Arum dracunculus, Dracunculus vulgaris (S).

Serpentaire commune, Gouet serpentaire (F).

Common dragon, Snake plant, Dragon arum (E).

Drackenwurz, Schlangenkraut (D). Aro sarpone,

Dragontes, Serpentaria (I).

نبات عشبي ارموي بري ورتبي من فصيلة القلقاسيات . اذوته حشولية مبطلية . اوراقه برتنية مستطيلة الزناد . وريقاتها ورتية التجميع ، فصلها سناني الصفحة الخضراء المزركنة والمبجعة بالاسمر والاخر والاصفر . ثمرهاه يطول من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ينهي بשרاف يحوى الصبة لونه الى الجؤرة المابقة .

٢٥١٧١ - **لُوف جعد**

هو الاروم الايطالي ، اطلبه .

٢٥١٧٢ - **لُوف عَطْرِي**

Aristolochie serpentaire (F).

هو الزارونه الثعباني ، من النباتات الطبية ، اطلبه .



لوف اسطواني



لوفر الصنوبر



لوقيات النجيل



لوقيات دسة

تسبن ، القسم الماوي وصاصي المراج ، مبشر الملب المتشبب للثالك ، وقسم سفلي اغبر المراج يملو تجميع اسود يكتنف قواعد الرواجب . رأسها اسود اللون . وواجب سمراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن جراب تملقه في النبات .

٢٥١٨٨ - **لُوم** هو التلرج المنقولي ، اطله .



لؤلؤة البنسج

٢٥١٨٩ - **لُوماسيكية** Lomatia (S). Lomatie (F). جنس نباتات جينية برية وندائية من فصيلة الفصيات . انواعها المعروفة كثيرة مهدا بلاد امريكية واسرائيلية . سيقانها فروعها لا قياسية الشكل منها البسيطة والمسندة والمقرضة . ازهارها عتقويدي التجميع ، طرفي وضووي الارتكاز . ازهارها جملة الشكل ثلوية التركيب لونها الى الصفار الاغبر || اشهر انواعها الحدائقية ما يتبع .

٢٥١٩٠ - **لُوماسيكية بهيئة الورق** Lomatia ilicifolia (S). Lomatie à feuilles de houx (F). نوع من اللوماسيكية جنبتها تملو من متر الى مترين . اوراقها بيضيه واحليجية وسناية الشكل . نصلها اخضر اللين حل صفحته ، مفروض الحافة او مسنن . عتاقيد الزعرية مستطيلة رهلة . تنورها يستمر من تموز الى آب .

٢٥١٩١ - **لُوماسيكية حد يدية** Lomatia ferruginea (S). Lomatie ferrugineuse (F). نوع من اللوماسيكية جنبتها تملو من مترين الى ٣ امتار . اوراقها مستطيلة الاعناق ثلاثية التفريص . نصلها ماس الصفرة العليا خلي السفل خله حديدي المراج عتاقيد الزعرية متوسطة الحجم والكثافة معظمها طرفي الارتكاز . تنورها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٥١٩٢ - **لُوماسيكية صباغية** Lomatia tinctoria (S). Lomatie colorante (F). نوع من اللوماسيكية جنبتها تملو من متر الى مترين . اوراقها متوسطة القد لا قياسية التفريص ، نصلها لامع البشرة حل صفحته . عتاقيد الزعرية صغيرة الحجم كثيفة التجميع . يزورها صباغية تحصب الماء بالاحمر اللودي . تنورها يستمر من تموز الى آب .

٢٥١٩٣ - **لُوهف** Serrasalm (S). Serrasalmie (F).



لوهف

الواحدة لوهفة . جنس اسماك نهريه من متوحات المئاته وفصيلة القرصانيات . انواعها المعروفة قليلة العدد يكثر وجودها في بعض انهر امريكية الاستوائية || اجسامها مسطحة ، بيضيه الشوزن ، متباينة الاحجام . رؤوسها مقطوعة ، واسمة الاشدق ، مرصوة الانسان الحادة . اثنواها الى الخصار البحري المتفاوت المتباة تكثر فيه القرشة . زعانفها الذيلية ثاقبة || تتميز بجسدها القانعة اذ انها تقسم كل ما تشاهد في الماء وكثيرا ما ترقق شباك الصيادين || لحمها فاخرة الصنف مرغوب فيها .

٢٥١٩٤ - **لُويحقي** هو البازي ، اطله .

٢٥١٩٥ - **لُويزة** و **لُيسيه** Lippia (S). Lippie (F). جنس نباتات خشبشيه برية وزندية من فصيلة رعي الحام . انواعها زهاء ٩٠ اصنافها المناطق الاستوائية والحارة . اوراقها كاملة ، صغيرة ، دقيقة السنن . ازهارها لا قياسية التجميع يكثر فيها السنلي والسنكولي || اشهر انواعها الزراعية ما يلي .

الليل . تعاطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتص المكان لتعلل على الصفحات السفلى من نصال المصف || السرفة تطول نحو ٤٥ سم . جسمها اسطواني الشكل ، ماس انتشار تملو نقط سود نظامية الارتكاز . رأسها الى الخروية ثوبها عتلي اللون ، اغبر المراج يملو تخطيط احمر قاطب ومتمرس . مدنها الى السرة . وواجبها سود || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي في الثرية حيث تنفخ السرفة ملتصقة بجلباب من البطين .

٢٥١٩١ - **لُولاية** Grand Nacré (F).

فراشة تدعى ارجينيس البرادي ، اطلها .

٢٥١٩٢ - **لُوتسب** Vis (F). Screw (E).

قطعة اسطوانية معدنية او خشبية مفروسة حازونيا تستعمل في اغراض قش . اشهر اللواب :

لواب ارجيس Vis d'Archimède (F).

لواب لا نهائي Vis sans fin (F).

لواب مضاعف Vis multiple (F).

لواب ماس Vis tangente (F).

لواب هولندي Vis hollandaise (F).

٢٥١٩٣ - **لُوتسب سلاسي** Cycle méritail (F).

هو الدورة السلاسية ، اطلها .

٢٥١٩٤ - **لُوتسبي** Spiral (F).

٢٥١٩٥ - **لُولزة** Perle (F).

هي الدرة . ج لؤلؤ ولاؤلؤ .

٢٥١٩٦ - **لُوليات ، مطبخة الأجحة**

Plecoptera (S). Pléoptères (F). Plecoptera, May flies, Ephemeral flies, Shad flies, Lake flies (E).

رئية مشترات من طبقة مستقيبات الجناح . انواعها عديدة زهاء ٧٠٠ تجمعها بعض القسائل والاجناس . تتميز بعيناتها القادرة الثلاثية التركيب وبانطباع اجنحتها الى الوراء عند الراحة والهمود || ريقاتها مائية تعيش حاملة على الصخور المنورة بالماء .

٢٥١٩٧ - **لُولوية البنفسج**

Boloria selene (S). Nacré des violettes (F).

Boloria selene (E).

حشرة من فصيلة البشوريات ورتبة حشرشيات الاجنحة . موطنها يطل الاقاليم المتدلة الحارة من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشمالية . فراشها واحة قوتها رحيق الازهار . سيقانها تمش على اوراق البنفسج البري والزراعي || جسمها مستطيل القد يطول نحو ١٥ سم . يمتلئ نحو ٣٨ سم . رأسها كسني اقرب . عينها كبرتان . زياتها صولفانيان . مرطها دقيق الجرم . جوشنها وبعنها الى الكسني || وراشها عند الشفون الى الصخرة الصنائية يطولها تجميع ونقيح وتنظيف وثمة جميعها الى الكسني الحنطلي المراج || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في اواخر آب . تسرح في النهار . تعاطل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتص المكان ميعادها على نصال اوراق النبات المائل || السرفة تطول نحو ٣٢ سم . جسمها اسطواني الشكل . ثوبها الى العسلية الخضر . يملوها غطاء جانبيين اسودان يفضلان الجسم الى

٢٥٢٠٤ - **ليكاح** \*  
*Acinopus picipes* (S).  
 حشرة من فصيلة الهربولويات ، طولها يراوح من ١٢ الى ١٧ سم . جسمها مخدوب الظهر . ثوبها الى السواد اللحي . تعيش في الارربة البنية الرملية تقيم تحت الحجارة والاشخاب . تسرح في الليل . قوتها البيلور والحبوب وقد تنقب الديدان القارضة وتفتريها || يرقاتها خاضعة قليلة الاذى .

٢٥٢٠٥ - **ليكاح أسود** \*  
*Acinopus picipes* (S).  
 حشرة دهوية خاضعة وقائمة من فصيلة الهربولويات ورتبة غديات الاجنحة . موطنها بعض مناطق البلاد الممتدة الحرارة من الشرق الادنى واروپة || جسمها صغير القد ، غصنور الشكل ، مخدوب الصفة العليا ، عادم الجناح ، يطول من ١٥ الى ١٧ سم . ثوبها الى السواد اللحي . رأسها كبير القد ، مستدير الشكل ، قصير الحنك . فكها ضليمان ، زباناها عظيمان دقيقان ، عيناها صغيرتان || الاثني اصغر قدأ من الذكر واكد ثوباً منه واقصر زبانا واضخم بطناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة في الجملانة في اوائل حزيران وتبقى حتى اوائل ايلول . تسرح في الليل وتبيت في النهار تحت الحجارة . قوتها البيلور والحبوب وتنقب الديدان القارضة وتفتريها .

٢٥٢٠٦ - **ليكاس**  
*Lias*  
 طبقة ارضية توجد في اسفل الاراضي الجورية .

٢٥٢٠٧ - **ليسات**  
*Mortier* (F). *Mortar* (E).  
 خليط من الكلس والزليل او من الاسمنت والزليل يضاف اليه الماء اللازم ويستعمل في البناء لتاسك الحجارة فيما بينها .

٢٥٢٠٨ - **ليبرالولا** \*  
*Libratula* (S).  
 جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم وفصيلة الغلويبات ، انواعها المعاصرة المحروقة قليلة العدد . موطنها حلجان جزر اقيانا . تعيش بين رصاف المرجانيات ، احداتها شبه بيضية الشكل ، ثنائية المصارع تلتب في مدافع المرجان وتستقر عليها .

٢٥٢٠٩ - **ليبيريللا** \*  
*Libertella* (S).  
 جنس فلور مجهرية من فصيلة الرغيفيات . انواعها قليلة العدد والاغصان تركيب السوق والاغصان الباسية || ونيتيه لا قياسية الشكل والشكل والحجم ، مشبهة عصير هلامي التركيب ، اصفر اللون او وردي . بويضاته خيطية ، حلالية الشكل ، شفافة .

٢٥٢١٠ - **ليبريبه** \*  
*Libertia* (S).  
 جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السويديات . جذورها ليفية . سوقها منتصبة معتدلة الارتفاع . اوراقها ضيقة النصال ، ثنائية التصنيف . ازهارها حمرية التنجيم ، رتاجية الترتيب تبدو كاسنابل وفي بياض اللون او زرقاء . تزود ثمرتين في الماكن والحدائق || انواعها المحروقة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٢٥٢١١ - **ليبريبه جميلة** \*  
*Libertia formosa* (S). *Libertia belle* (F).  
 نوع من الليربيه . عشبة ترينينية معمرة . ساقتها منتصبة

٢٥١٩٦ - **لوزية سكرية ، ليته سكرية** \*  
*Lippia dulcis*, *L. asperifolia* (S). *Lippie sucré* (F).  
 نوع من اللوزية وهي عشبة سبروتية ترينينية معمرة تطلو نحو ٣٠ سم . ساقتها فروع . اوراقها سكرية الطعم ، متقابلة ، منفذة ، نصلها يضيي الشكل ذات الزام الاخير يطول من ٣ الى ٤ سم . ازهارها عثكولي التنجيم ، ابلي الارتيكار او طري . ازهارها صغيرة القد بياض اللون فواحة العرف المطري || تنورها يستمر طوال الصيف .

٢٥١٩٧ - **لوزية ليمونية** \* ، **ليته ليمونية** \*  
*Lippia citradora* (S). *Lippie citronnelle*, *Citronnelle* (F). *Herb Louisa*, *Lemon verberna* (E). *Citronnenkraut*, *Lemonkraut* (D). *Cedrina*, *Cetrina*, *Erba limoncina* (I).  
 نوع من اللوزية الترينية وهي جنبه سبروتية معمرة تطلو نحو ٣٠٠ سم . ساقتها منتصبة فروع . اوراقها منتقة ثلاثية الارباعية الصفة ، نصلها سنائي الصفة يطول من ٨ الى ١٠ سم . || ازهارها هريي الشكل . ازهارها بنفسجية اللون . اوراقها وازهارها فواحة العرف المطري القريب الشبه من الليمون وفي تستعمل استهلاك الشاي || تنورها يستمر من محو الى آب .

٢٥١٩٨ - **لوزية ثورية العبد** \* ، **ليته ثورية العبد** \*  
*Lippia nodiflora*, *L. canescens* (S). *Lippie fleuri aux noeuds* (F).  
 نوع من اللوزية وهي عشبة ترينينية معمرة . منبها الاصفاق الحارة . ساقتها مستقيمة مدادة . قرونها تطلو نحو ٣٠ سم . اوراقها صغيرة القد ، اهليجية الشكل ، نصلها سنن الحلفة . ازهارها عثكولي التنجيم ، عثدي الارتيكار . ازهارها صغيرة القد تطلو من ٣ الى ٤ سم . وهي عادمة العرف وردية اللون او ليلية || تنورها يستمر من ايار الى ايلول .

٢٥١٩٩ - **لوتيق**  
*Alcernanthere* (F).  
 نبات يعطي لقحة الحبل ، اطلبه .

٢٥٢٠٠ - **لشامة** \*  
*Innocuité* (F). *Innocuousness* (E).  
 اللشامة كون شيء غير مضر او غلوس الشيء من الضرر .

٢٥٢٠١ - **لشنة**  
*Hérison* (F).  
 هو القنفذ ، اطلبه .

٢٥٢٠٢ - **ليكاح** \* ، **قصص** ، **بيلك**  
*Lamia* (S). *Lamie*, *Touille*, *Nasillarg*, *Requin-mar-soulin* (F). *Lamia*, *Porbeagle*, *White shark* (E).  
 سمكة بحرية مفترسة وحيدة الجنس من السفليات الثريديات . جسمها مردني الشكل يطول نحو ٨ امتار . غطها غرطوي يشرف على الفم . نياستها خيطية مستطيلة . ثوبها وصافي اللون يمتد وزرق مع اقترابه من ثوب الغهر ويتر ويبيض عند البطن || حياتها بحابية سربها يراوح من ٥ الى ٢٠ زوجاً . تألف البعاب الباردة والمعتدلة ، ويدهنها في المتوسط . قوتها الاملاك من اي نوع كانت . لها مأكول . تجست منها واحدة حل الشاطئ اللبناني قرب نهر الكلب ، في ضيه ، وذلك في اواخر شهر شباط عام ١٩٥٨ .

٢٥٢٠٣ - **ليكاح** \*  
 اللبأ : الارض البعيدة عن الماء .



لوزية ليمونية



لوزية ثورية العبد



لياء



لياح



لياح أسود

ترتفع نحو ٤٠ سم. اوراقها ثنائية التصفيف ، ضيقة التصل . ازهارها شبه سنبل التجميع . ازهارها بيضاء اللون ، فواحة العرف الطور || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

### ٢٥٢١٢ - ليبرييه رشيقة \*

*Libertia pulchella* (S). *Libertia gracileus* (F).  
نوع من الليبريه . عشبة تزيينية معمرة . ساقها غليظة ترتفع من ١٥ الى ٣٠ سم . اوراقها شبه سنانة الشكل تطول من ٨ الى ١٥ سم . ازهارها شبه سنبل التجميع . ازهارها مستطيلة الاذن ، بيضاء اللون || تنويرها يستمر طوال شهر نيسان .

### ٢٥٢١٣ - ليبرييه زرقاء \*

*Libertia corulescens* (S). *Libertia bleuteus* (F).  
نوع من الليبريه . عشبة تزيينية معمرة . ساقها صلبة ترتفع من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها مستطيلة ، ضيقة ، جامدة التصل . ازهارها شبه صيرافي التجميع ، سنبل التريب . ازهارها صغيرة الجرم زرقاء اللون يملؤها شمع احمر || تنويرها صيفي .

### ٢٥٢١٤ - ليبرييه كبيرة الزهر \*

*Libertia grandiflora* (S).  
*Libertia à grandes fleurs* (F).  
نوع من الليبريه . عشبة تزيينية معمرة . ساقها صلبة ترتفع من ٦٠ الى ٩٠ سم . اوراقها كبيرة القند تطول من ٣٠ الى ٧٥ سم . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها كبيرة الجرم بيضاء اللون || تنويرها صيفي .

### ٢٥٢١٥ - ليت \*

*Erythaea* (S). *Palmier bleu* (F).  
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة النخلات. انواعها قليلة . اصلها البلاد الحارة والاستوائية . اجلاها منتصبه مستقيمة . اوراقها مدورة ناجية . غوصها ثنائي التعليق جانبه التصل المنتصب || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

### ٢٥٢١٦ - ليت سرح \*

*Erythaea edulis*, *Brahea edulis* (S). *Palmier bleu inerme* (F).  
نوع من اللبث الزراعي . شجرته شجرة تلو من ١٢ الى ١٥ م . برهتها كثيفة الالراق . اوراقها مستطيلة اجرائه كبيرة القند ، قطرها يراوح من ١٥٠ الى ١٨٠ سم . غوصها جانبه التصل . جيل الخضار البحري الزاهي . ثمارها بلحمة الركب ، بيضيه الشكل ، صغيرة القند ، سكرية الطعم ، مأكولة .

### ٢٥٢١٧ - ليت شائك \*

*Erythaea armata* (S). *Palmier bleu piquant* (F).  
نوع من اللبث الزراعي التريبي . شجرته تلو من ٤ الى ١٢ م . برهتها معتدلة الكثافة . اوراقها الخضار الازرق الغني المراج . قطرها يراوح من ٥٠ الى ١٢٠ سم . غوصها جانبه التصل ، جرائنها تطول من ٧٠ الى ١٥٠ سم . وهي شائكة الدرز ، غليظة الحشف الاسود المحة .

### ٢٥٢١٨ - ليت \*

*Spire* (F).  
*Single turn, Whoral* (E).  
نلية دورة الخط الحلزوني .

### ٢٥٢١٩ - ليت \*

*Lela* (S). *Lela* (F). *Leia* (E).  
جنس حشرات من فصيلة القرضيات وربة ذوات الجناحين . انواعها المعروفة ٣٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد المتحدة الحارة || اجسامها خضراء تطول من ٤ الى ٨ م . رؤوسها صغيرة . عينها متباعدة عند الشقين . قرونها الاستشعارية غليظة . ملاسها ربابية العقل . مارشها نقطية . كولاسها شبه ريشية الشكل . بطونها احليجية . اوتها ملونة . رواشها قسطانية التخصيب يملؤها تجنيم وتبيج . قوائمها مستطيلة . ظنايبها مجهزة بمخارص قوية || تألف المراج والغابات والمروج وصفات مجاري الماء ، قوتها طلع الازهار ورحيقها . اساريمها خاضعة او دامتة وبمسها عار .



لينا نافلة

### ٢٥٢٢٠ - ليتا ناطقة \*

*Lyta vesicatoria* (S).  
*Cantharide du frêne* (F). *Green cantharide* (E). *Spanische Fliege* (D).  
حشرة طيبة نافلة من فصيلة الملويدات ، ثوبها ذهبي اللون صناعي المراج . جسمها يطول من ١٥ الى ٢٥ م . الذكر اصفر قدام من الانثى . مرتها الاشجار الحرجية اصعبا المران يقد تؤذيها بالتهامها اوراق . رقاتها تعيش على بعض النباتات المثمرة || كانوا وما زالوا يلتصقونها لتجنينها وخصفها واستعمال كمنافط .

### ٢٥٢٢١ - ليتو \* لثو \*

وسلة المكابيل المثمرة وهو حارة عن دسيت مكمب . مضغفاته الكاليتري (١٠ ليتو) والمكوكليتر (١٠٠ ليتو) اما اجزاء فهي الليتير والستيليتو واللثير .

### ٢٥٢٢٢ - ليتشي \*

*Litchi* (S).  
*Litchi*, *Poncosu* (F). *Litchi* (E).  
جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة المابونيات . مهجها البلاد الاستوائية الاسوية . انواعها قليلة . اوراقها متعاقبة متعقة احليجية . ازهارها عتيق التجميع ، محوري وتاجي الايكاز ، ازهارها صغيرة القند بيضاء اللون ، ثمارها ذكية العرف توكل وتستهمل في استعمار بعض القناديد والمشروبات الروحية || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

### ٢٥٢٢٣ - ليتشي اصفر \* ، وسبرطان \*

*Nephellium lappaceum* (S). *Néphélium*, *Ramboutan* (F). *Rambutan*, *Rampostan* (E). *Rampostan-Frucht* (D). *Nefelio* (I).  
نوع من اللبتي الزراعي . ثماره قليلة الشكل صفراء اللون مأكولة ويستخرج من حمصها بدم تخميره وتقطيره قنديد كحول شائع الاستعمال في الشرق .

### ٢٥٢٢٤ - ليتشي صيني \*

*Litchi chinensis* (S). *Litchi du Chine* (F). *Litchi*, *Leechee* (E). *Litschibaum* (D). *Litchi* (I).  
نوع من اللبتي الصيني مهده الصين حيث تكثر زراعته الاستنادية . ثماره بيضيه الشكل والحليم حواء اللون مأكولة ويستخرج من حمصها بدم تخميره وتقطيره قنديد كحول لاذع شائع لاط في الاستعمال .

### ٢٥٢٢٥ - ليتو \*

*Lithobius* (S). *Lithobie* (F). \* *ليتوب* \*  
*Lithobius* (E). *Brauner Steinkriecher* (D).  
جنس دويبات من فصيلة الليتوبيات . انواعها كثيرة العمد



ليتشي اصفر



ليتشي صيني



ليتوب

**أَبُو عُرَيْفَ، أَمْ عُرَيْفَ، أَمْ قَيْسَ**  
Fourmil-ion, Myrmé-léon (F). Ant-lion, Myrme-leon (E).  
جنس حشرات من عصبيات الجناح. أنواعه عديدة منتشرة في جميع اصقاع البلاد الحارة وفي بعض مناطق البلاد المعتدلة. حشراتا مرتقة تعيش على ريق الانهار ، أما دعاميها فغزيرة قصيد الحشرات الصغيرة اغصها النمل.

**٢٠٢٣٣ - لَيْثَمِ**  
Licmetis (S).  
Licmetis (F). Licmetis (E).  
جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات. انواعه المعروفة ثلاثة موطنها استراليا ونيهانية وبزر سلان. تألف الثنايات والمواقع الرطبة. ملجأ الحياتي جاهي. افواجها قليلة العدد. قوتها البذور والنبسل والمساقل وبعض الحشرات والاساربع || اجسامها متندلة القد ، تطول من ٤٥ الى ٥٥ سم. تتميز بتقاعدها المحبة الذرية التي تطول من ٥ الى ٦ سم. ويقتصر اذناها المستديرة الاطراف. انثواها الى البياض المائي يعاود مولج اصفر او اخضر يشمل الصفعة السفلى من الجناح ويمتد الى الاطليان والافنيك. رؤوسها وحاسرها وكشاتها الى العمرة التي تختلف مواجها مع اختلاف الانواع.

**٢٠٢٣٤ - لَيْثِيوم**  
Lithium  
فلزات قوية توجد في الطبيعة وفي بعض النباتات اغصها النخج || وهو ابيض اللون فصي الرهجة اصلب من البوتاسيوم والصوديوم. نقله النوعي ٥٩. ينصهر في ١٨٠ درجة مع.

**٢٠٢٣٥ - لَيْثِيَجِيَّة**  
Ligia (S). Ligie (F). Ligia (E).  
جنس دوبيات بحرية من القشريات متساويات الارجل وفصيلة الطرومليات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم. تألف التطويط البحرية || اجسامها صغيرة ، اهليجية الشكل ، متندلة التطييط. رؤوسها صغيرة. عيونها جاحظة. قروها الاستعمارية مستطيلة ، مركبة. ملابسها الشرجية فارة الاطراف المستدقة المستطيلة.

**٢٠٢٣٦ - لَيْثِيَجَة**  
Liche (F).  
سمكة بحرية تدعى سمندره ملساء ، اطليبا .

**٢٠٢٣٧ - لَيْثِيَكَة**  
Lyda (S). Lyde (F).  
جنس حشرات من المشاويات غشائيات الاجنحة. انواعه نحو ٥٠ اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة ، ملونة. اجنحتها شفافة. ريقاتها مستدقة تهمة تركيب الانجار الحرجية والمشمرة اغصها الصنوبر والتربوب والدراق والاجاص فلتهم الارواق وتقضي عليها || اشهر انواعها واغرها ما يلي .

**٢٠٢٣٨ - لَيْثِيَكَة الإِجَاص**  
Neurotoma flaviventris (S). Lyde du poirier (F).  
Pear web-spinning sawfly (E). Gesellige Birnblattwespe (D).  
نوع من الليفة وسيدة الجبل الحولي ، جسمها يطول من ١٢ الى ١٤ سم. لونه الى السمرة يطولها يتبع متفرص اصفر يمتد من الرأس الى الشرج || ريقها برتقالية اللون ، سواء الرأس ، عديمة الارجل البطينة تظهر في الربيع . تركيب اوراق الانجار المشرة اغصها الاجاص .

منتشرة في معظم اصقاع العالم . اجسامها مركبة من ١٥ حلقة تحمل ١٥ زوجا من الجرامز منها ثلاثة ازواج صغيرة القد .

### ٢٠٢٣٧ - لَيْثِيُوب مَيْذُول

Lithobius forcipathus (S). Lithobie à tenailles (F).  
Lithobius (E).

دوبية مفترسة ميذولة من فصيلة الليثوبيات ورتبة الشفعاخيات شقويات الارجل ، موطنها يشمل معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من المئين القدم والجليد || جسمها قريب الشبه بجسم الحريش ، مبطط الشكل ، مستطيل . مركب من ١٥ سكة . الذكر اصغر قدما من الانثى يطول نحو ٣٥ م. والانثى تطول نحو ٦٠ م. رأسها صغير الحجم ، مستعرض الشكل . عينها زرقية تسان . شيفها ضليان ، مقبوس ينثيان بكلاشيتن قويتين . زباناها مستطيلتان احوجان . جرامزا نشطة . ثوبا الى النشفة الخفيفة الموج . مدنها بجرامزا الى النشفة التبراء || تألف الاراضي الزراعية والمالحة . مسرحها دجوي . قوتها الحشرات والرخويات الصغيرة . غصها مؤلة لكنها قليلة الاذى .

**٢٠٢٣٨ - لَيْثِيُوبِيَّات**  
Lithobiidae (S).  
Lithobiidae, Lithobies (F). Lithobiidae, Lithobius (E). Steinläufer (D).  
فصيلة دوبيات من الشفعاخيات الشقويات الارجل . اجسامها وانواعها عديدة ، اشهرها الليثوب .

### ٢٠٢٣٩ - لَيْثُوفَانَة سَمَرَاء

Lithophana semibrunnea (S). Lithophane semibrune (F). Lithophana semibrunnea (E).  
حشرة من الشفعاخيات حشرشيات الاجنحة. موطنها بعض اسراج الشرق الادنى . فراشتها جارسة قوتها ريق الانهار . سرقتها تعيش على اوراق السديان || جسمها متصد القد يطول نحو ١٧ م. مبططها نحو ٤١ م. رأسها فاسي الشكل ، اسر اللون . عينها كبرتان . زباناها غيطات . جوشنها اسر اللون ، حطلي الموج . بطها حطلي اللون اسر الحيد || روشنها الامانيان الى الحطلي الاسمر يطول بتيج اسر قاتم . روشنها الخلفيان الى الحطلي الاخير يطولون تقطيط اسود في اختار الخاجري . اهدابها حطية || لها جبل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايلول وتبقى حتى ايار . تسرح في الليل . تمتع الممكن لطعنا مستطيلة على الصفحات التشلل من نصال اوراق السديان || السرفة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول نحو ٣٥ م. جسمها اسطواني الشكل ، شديدة التشار . ارمد اللون ، اسر الموج يطول نحو ثلثي اغير وتامة غطوط جانبية متمرسة ضفراء اللون . رأسها غزويبي الشكل ، اسود . مدنها وراجبها الى السرفة || طول الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع ويتقضي في التربة حيث تنضج السرفة ملتصقة بجلباب من الطين .

**٢٠٢٣٠ - لَيْث**  
Lion (F).  
الليث هو الاسد . ج. ليوث .

**٢٠٢٣١ - لَيْث** الليث : نبات ملف (اللسان) .

**٢٠٢٣٢ - لَيْث عَفْرَيْن** ، **بَقْرَة بَيْتِي إِسْرَائِيل** ،



ليثوب ميذول



ليثوبان سمراء



ليث عفريين



ليث



ليذة الاجاص





ليدة الدراق



ليدرك سوني العرف



ليدك شتم



ليدك عراب



ليدك مسك



ليشة

اتواعه المرفوعة خمسة منبتها حوض البحر الابيض المتوسط  
وجزر كنارية || جميعها نباتات نجمة قراءه اوراقها  
مركبة ، وثرية ، ثلاثية الوريقات و نغلة الشكل .  
ازهارها عقدي طرفي . ازهارها صفراء اللون و أرجوانية .  
ثمارها قرون مبطلة خلية القنار || اشهر انواعه اللبب  
المشمب والليذب اليوناني .

#### ٢٥٢٤٦ - لَيْدَبْ مُشْعَب

*Adenocarpus divaricatus* (S).  
*Adenocarpa divariqué* (F).

نوع من اللبب . طوعي في جبال لبنان . فروعه مزغبة  
الساه . وريقاته الغلية بيضيه النصال . اما العليا  
فسنانية || تنويره صيفي . ازهاره صفراء اللون .

#### ٢٥٢٤٧ - لَيْدَبْ يُونَانِي

*Adenocarpus graecus* (S).  
*Adenocarpa de Grèce* (F).

نوع من اللبب . طوعي في جرد لبنان . فروعه وكروس  
ازهاره مزغبة وخليه || تنويره صيفي . ازهاره صفراء اللون .

#### ٢٥٢٤٨ - لَيْدُون

هو الاسلخ ، نبات بري طبي ، اطلبه .

#### ٢٥٢٤٩ - لِيْرِدُونْدُون

*Liriodendron* (F).

هي شجرة التولب ، اطلبها .

#### ٢٥٢٥٠ - لِيْسَر

*Lys* (F). *Lysis* (E).

اسم تعريفي يطلق على الاخلال النسيجي الذي تسببه  
بعض المواد المنصوبة المرفوعة بالليزين .

#### ٢٥٢٥١ - لِيْزُول ، لِيْسُول

سائل دهني كثيف المادة، جويوز اللون، اسمر الماجة، مركب  
من الكريوزوت والقطران والشمع والصابون . وهو من  
المطهرات الفعالة الثابتة الاستعمال الزراعي .

#### ٢٥٢٥٢ - لِيْزِين

*Lysine* (F). *Lysin* (E).

الليزين مادة عضوية بسيطة تحلك خاصة تلويب  
الكرينات الحمر وحجيرات النسيج والبكتيريات .

#### ٢٥٢٥٣ - لِيْسُتِين

*Leycesteria* (S).  
*Leycesteria* (F).

جنية معمرة برية وريبتين من فصيلة المغانيات . منبتها  
البلاد الاسيوية الحارة . ساقها منتصبة فراءه جواء تملو  
من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها عابلة متناقبة ، نصلها  
بيضي الشكل ذات الزام الاخير يطول نحو ١٦ سم . ويعرض  
نحو ٩ ازهارها حيلة القالب ، يضاء اللون ، وريدة  
التنحيس . أرجوانية القنابات ، عقودية التجميع ، متدلية .  
ثمارها حنينة جويوزة || تنورها يستمر من آب الى ايلول .

#### ٢٥٢٥٤ - لِيْسِن

*Chrysopogon* (S).  
*Chrysopogon* (F).

نبات عشبي بري مروي حولي من النجيليات . يكثر  
في الاراضي الجبلية الموحاة . وهو من نباتات لبنان الطوية .

#### ٢٥٢٥٥ - لِيْشِيَّة

*Lichia amia* (S). *Liche amia* (F).

سمكة بحرية من الاسقمريات . جسمها اعليجليي الشكل ،

#### ٢٥٢٣٩ - لَيْدَكَةُ الدَّرَّاقِيْن

*Neurotoma nemorens* (S). *Lyde du pacher* (F).  
*Apple web-spinning sawfly* (E). *Gesellige Pfirsich-*  
*blattwespe*, *Steinobee-Gespinnstblattwespe* (D).

نوع من الليدة . وحيدة الجيل الحولي ، جسمها يطول من  
٧ الى ٨ سم . لونها الى السمرة السوداء . رأسها مبغ بالاصفر  
يطها جمعد بالابيض . تظهر في اواخر نيسان ، تمتع  
مكثا على سطوح الاوراق السفلى فينثف من برقات  
منطقة قمة لونها الى الخضرة المابتة تملوها خطوط سمر  
قائطة ، تركب بفس الاثمار المصرة انحصها الدراق  
واللوز فتلهم الاوراق بعد ان تمتلها ينزلها المنكبوتي  
الذئبق .

#### ٢٥٢٤٠ - لَيْدَكَّة و لَيْدَاكَّة

*Rhodopaxillus* (S). *Rhodopaxille* (F).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريقيات  
انواعه المرفوعة قليلة العدد اسطانيا النبات والحراج الجبلية .  
تتميز بالونها الزاوية . جميعها مأكولة مستحبة العلم  
والرث || اعرف انواعه واشهرها الاربعة التالية :

#### ٢٥٢٤١ - لَيْدَكَّة مُسَوِّتِي الْعَرَف

*Rhodopaxillus irinus* (S). *Rhodopaxille iris* (F).

نوع من الليدك . يعيش على الدبال والمواد النباتية المنحللة .  
يوجد عند اطراف النباتات وفي منطقاتها . ساقه غليظة ،  
مستضخمة القاعدة ، معتدلة الارتفاع ، غبراء اللون .  
نكته قلنسوية الشكل ، سوسلية العرف ، ليلكية اللون  
يطولها موج عناني ، قطرها نحو ٧ سم . اطراسها صفراء  
اللون || لحيتها مأكولة ، فاخرة الصنف .

#### ٢٥٢٤٢ - لَيْدَكَّة شَحِيْم

*Rhodopaxillus saevus* (S). *Rhodopaxille sinistre* (F).

نوع من الليدك . يعيش على الدبال في المراعي . ساقه  
قصيرة ، مستضخمة ، بنضجية اللون . نكته كبيرة القف  
قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى البني الاسفع يزو عن  
الحافة . اطراسها الى الصفرة البنية الموج || لحيتها جيدة  
الصنف ، مأكولة .

#### ٢٥٢٤٣ - لَيْدَكَّة عَرِيْثَان

*Rhodopaxillus nudus* (S). *Rhodopaxille nu* (F).

نوع من الليدك . يعيش على المراد النباتية المنحللة . ساقه  
معتدلة النلاخة والارتفاع ، مستضخمة القاعدة ، ليلكية  
اللون ، نكته صاجية الشكل ، قطرها نحو ١٠ سم . لونها  
الى البنفسجي يطولها موج كسني اسفع . اطراسها ليلكية  
اللون || لحيتها مأكولة فاخرة الصنف .

#### ٢٥٢٤٤ - لَيْدَكَّة مُسِيْك

*Rhodopaxillus sordidus* (S).  
*Rhodopaxille sordide* (F).

نوع من الليدك . يعيش على الدبال في حواشي الغابات ،  
ساقه معتدلة الجرم بنضجية اللون . نكته منتشرة الصفحة  
المنتدرة ، قطرها نحو ٦ سم . لونها الى البنفسجي ،  
اطراسها الى الغبرة اليلكية الموج || لحيتها جيدة الصنف ،  
مأكولة .

#### ٢٥٢٤٥ - لَيْدَبْ

*Adenocarpus* (S). *Adenocarpa* (F).

جنس نباتات برية وتريبتين من فصيلة القرنيات افراشية .

من عضوبة ومعدنية || أنواعها المعروفة كثيرة أشهرها الثلاثة التالية :

**٢٥٢٦٧ - ليكوريديس بيهي** \*  
*Lycoris radiata* (S).  
*Lycoride rayonnante* (F).

نوع من الليكوريدس . عشبة دوفسية سرقية منبتها الصين واليابان . شراخها يملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . أوراقها قدية الشكل تفرش نحو ٢ سم . نصلها الى الخضر البحري . ازهارها قصيرة الكلوس منبسطة البتلات النجمية الشكل ، قطرها نحو ٤ سم . لونها الی الحمرة القرمزية يعطوها اطار ابيض || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

**٢٥٢٦٨ - ليكوريديس مدني** \*  
*Lycoris sanguinea* (S). *Lycoride rouge-sang* (F).

نوع من الليكوريدس . عشبة دوفسية سرقية . منبتها اليابان . شراخها يملو من ٣٥ الى ٥٠ سم . أوراقها صغيرة نحيلة ، تظهر بعد الاثمار ، لونها الی الخضر الالامس . ازهارها معتدلة الحجم تطلو من ٤ الى ٦ سم . قطرها نحو ٤ سم . لونها الی الحمرة الدامية اللامعة || تنويرها يستمر من تموز الى آب .

**٢٥٢٦٩ - ليكوريديس مدلب** \*  
*Lycoris aurea* (S). *Lycoride dorée* (F).

نوع من الليكوريدس . عشبة دوفسية جادة متطلبة . منبتها الصين . شراخها يملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . أوراقها قدية الشكل ، نصلها الى الخضر البحري . ازهارها عادية العرف تطلو نحو ٨ سم . لونها الی الصفار الذهبي || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

**٢٥٢٧٠ - ليكوس** \*  
*Lycus* (S). *Lycus* (F). *Lycus* (E).

جنس حشرات من فصيلة الليكوسيات . وربة مخدبات الاجنحة . انواعها المعروفة عديدة : منتشرة في بعض المناطق الاستوائية والحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، هباء ، تطلو من ٧ الى ١٢ م . رؤوسها صغيرة ، عيونها بارزة ، تأثيرها وفكوكها نظامية . ملابسها صغيرة . قرونها الاستشعارية خيطية . كواسلها شبه مربعة الشكل ، الحادها لاسفة . قوائمها نشيطة . اثنائها حلوة || الحشرة الجلجلة خاضعة وواضحة ، اما البرقة ففترسة .

**٢٥٢٧١ - ليكوسيات** \*  
*Lycidae* (S). *Lycidae* (F). *Lycidae* (E).

فصيلة حشرات من مخدبات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض اصقاع البلاد الاستوائية والحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة النشيط ، تطلو من ٩ الى ١٥ سم . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة ، تأثيرها وفكوكها وبلاسلها نظامية . قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها صغيرة ، الحادها لاسفة ، رشفة . ارسافها خاسية القفل || اشهر اجناسها الليكوس .

**٢٥٢٧٢ - ليكوفوسية أرجوانية** \*  
*Lycophotia porphyrea* (S). *Lycophotia pourpre* (F). *Lycophotia porphyrea* (E).

حشرة من الفسقيات حرشفات الاجنحة . موطنها بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية

كبير القد ، يطلو نحو ١٠٠ سم . تتميز بمشعلها الثاني الانسان الذرية الحادة الذي يتقدم الزعفة الظهرية . اصنافها شرق البحر المتوسط . يكثر وجودها في المق . لحمها مأكول متوسط العنت .

**٢٥٢٧٦ - لبطة**  
*Pellucida* (F). *Pellucida* (E).

اللبط : قشر القصب اللازق به . الواحدة لبطة .  
**٢٥٢٧٧ - لبتيات**  
*Lygaeidae*  
فصيلة حشرات من نصفيات الجناح تسمى ايضاً طريات . اطلبها .

**٢٥٢٧٨ - لبث**  
هو اللوث ، اطلبه .

**٢٥٢٧٩ - لبثاني**  
*Filamenteux* (F). *Filamentous* (E).

ما كانت نسجه ليفية اقرب .  
**٢٥٢٨٠ - لبثة**  
*Fibre* (bot.)  
الليف خلايا مستطيلة مرددية الشكل ، غشبية الجدران تجتمع على شكل نسيج ليفي .

**٢٥٢٨١ - لبثين** \*  
*Byssus* (F). *Byssus* (E).

مادة ليفية شديدة التمتدة تفرزها بعض الرغويات للاتصاق بالصخور المنمورة بالماء . وقد يحاك منها نسيجية اتم من الحرير لوناً الى الخيطي الذهبي المواج .

**٢٥٢٨٢ - لبثي** \*  
*Byssogène* (F). *Byssogenic* (E).

نمت تعريفه يطلق على كل ما له صلة باللبث كالكندة اللبثية وغيرها .

**٢٥٢٨٣ - لبثي**  
*Ligneux* (F). *Ligneux* (E).

نمت تعريفه يطلق على النباتات الخشوية السوق والقروخ .

**٢٥٢٨٤ - لبثين**  
*Fibrine*  
هي الفبرين ، مادة آسية حيوانية او نباتية تستخرج من الدم في الحيوان على شكل خيط ابيض .

**٢٥٢٨٥ - ليكاست** \*  
*Lycaste* (S). *Lycaste* (F).

جنس نباتات معمرة نارية او امعية من فصيلة السحليات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ جميعها امريكية المهد وقد انتشرت زراعتها المربكة التزيينية في معظم اقطار المعمورة || سرها دوفسية تطلو من ٤ الى ٨ سم . أوراقها قليلة العدد معتدلة ، كبيرة النصال تطلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . ازهارها وحيدة كبيرة قطرها يراوح من ١٢ الى ٢٠ سم . تتركز على شاربخ دقيقة لبقة تملو من ٢٥ الى ٤٠ سم . ألوان ازهارها عديدة اكثرها الابيض والاحمر والاصفر والابيض المروشن بالجلوي والاصفر المرقط بالكتني ... تنويرها يستمر من تشرين الثاني الى اواخر آذار .

**٢٥٢٨٦ - ليكوريدوس** \*  
*Lycoris* (S). *Lycoride* (F). *Lycoris* (E).

جنس نباتات عشبية دوفسية من فصيلة الترسجات . منبتها الصين واليابان . شاربها مصمتة . أوراقها ضيقة النصال . ازهارها شبه قمية الشكل صفراء اللون او حمراء || تزروع للزينة ضمن البيوت وفي الحدائق . قروب في الارربة المنسوبة التركيب المنصري الوافرة المواد النفاذية



ليكاس



ليكوس



ليكوفوس ارجوانية

الكلوز من الرباعية التسعين . بتلاتها رباعية التفصيص . اسديتها ثنائية التركيب . مجارها جراء ثنائية المصارع . اعرف انواعه وراشهرها ما يتبع .

### ٢٥٢٧٦ - تيلك اوزق - تيلك مبدل

هو الأفران ، اطلبه .  
Lilas commun (F).

### ٢٥٢٧٧ - تيلك اوزب

Syringa pubescens (S).  
Lilas pubescent (F).  
نوع من اليلك التريبي جنبته تملو من ١٥٠ الى ١٥٠ سم . فروعهما بجوية اللون . اوراقها بيضيه ذرية ، نصلها خلى البشرة حل صفحته . ازهارها مستطيلة الشكل ، ارجوانية اللون ، يامينية العرف المستحب || ازهاره يستمر طوال شهر ايار .



ليكوفوسب نامية

### ٢٥٢٧٨ - تيلك حتملايا

Syringa emodi (S).  
Lilas de l'Himalaya (F).  
نوع من اليلك التريبي جنبته تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه اهلجية الشكل نصلها اسم العروق ، خلى البشرة الشغل . ازهارها ذرية ، غبراء اللون ، كريمة الرائحة || ازهاره يستمر طوال شهر حزيران .

### ٢٥٢٧٩ - تيلك ويشي

Syringa pinnatifolia (S).  
Lilas à feuilles pennées (F).  
نوع من اليلك التريبي جنبته تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها مركبة ويشية . وريقاتها سباعية او تساعية العدد ، نصلها ازغب الصفحة الشغل . ازهارها ودية اللون خاتبة العرف || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

### ٢٥٢٨٠ - تيلك حيمي

Syringa chinensis (S).  
Lilas de Chine (F).  
نوع من اليلك التريبي تجرته تملو من ٥ الى ٦ أمتار . اوراقها سنائية التصل مستطيلة الانعاق الجبوية اللون . ازهارها الى البياض الثلجي شكل كريمة الرائحة || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

### ٢٥٢٨١ - تيلك عربش اوزق

Syringa oblata (S). Lilas à larges feuilles (F).  
نوع من اليلك التريبي ، جنبته تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقها مستعرضة تطول وتعرض طول ١٢ سم . نصلها لامع البشرة حل صفحته ، شبه الخشخاش الباق . ازهارها ليكية اللون فواحة العرف الطري || ازهاره قصير الامة يدوم نحو ١٥ يوما ابتداء من النصف الثاني من نيسان .

### ٢٥٢٨٢ - تيلك قارسي

Syringa persica (S).  
Lilas de Perse (F).  
نوع من اليلك التريبي ، جنبته تملو من ٢ الى ٣ سم . انتادها واقتناها نجيلة . اوراقها سنائية ، نصلها جامد الصفحة زاهر الخشخاش يطول نحو ٤ سم . ازهارها بنفسجية اللون فواحة العرف الطري || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

### ٢٥٢٨٣ - تيلك باباني

Syringa japonica (S).  
Lilas japonais (F).  
نوع من اليلك التريبي ، تجرته تملو من ٥ الى ٧ أمتار . اوراقها سنائية ذرية ، نصلها خلى الصفحة الشغل ، بحري اللون ، ازهارها حادة العرف ، لونها الى البياض الثلجي ، قوتها كبير الة يطول نحو ٣٠ سم . ويعرض نحو ٢٠ سم . تنوره يستمر طوال شهر حزيران .



ليك

قوتها رقيق الازهار . سرقتها تمشي على اوراق الخلدنيات واخصها البسم || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٢ م . نصلها نحو ٣١ م . رأسها فاسي الشكل . عينها كبرتان . زباناها غيطان . مرشها معتدل الجرم والطول . جوشها ويصلها الى الكلفة المشيرة بالاسيولي || ووشها الاماميان الى الحمة الابرجوانية تملوها زركشة يفساه وتزاورق سود ورقية سطية . ووشها الخلفيان الى الكلفة يملوها مزاج اشخ وحار اسمر يستبق الاحداث البتنية || لها جيل واحد في الحول . تظهر ، القراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تماطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتفتح الممكن مجاديا على الصفحات السفلى من نصل الارواق || السرعة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٣٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار . قوتها الى انفسار الاطسل تملوه ثلاثة خطوط غبراء اللون يتوسطها الجبوري الاسود المزاج . رأسها الى الجبوة . مدبا الى النملة . وارجابها سود || طور الاكمال الذي يضر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ينغفي في التربة ضمن جلباب من الطين يلحف السرعة .

### ٢٥٢٧٣ - ليكوفوسب نامية

Lycophotia saucia (S). Lycophotia polyphage (F).  
Lycophotia saucia (E).

حشرة من فصيلة الفسيات حشرقيات الاجنحة . موطنها عند من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشالية والبلاد الاسيوية . فراشتها جارسه قوتها رقيق الازهار . سرقتها خاملة نامة تمشي على اوراق النباتات المختلفة من القبول الى النباتات الزراعية والصناعية والتريبية والاشجار الحرة || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٨ م . نصلها تراوح من ٤٠ الى ٥٠ م . رأسها فاسي الشكل . عينها كبرتان . زباناها غيطان . مرشها معتدل الجرم والطول . جوشها ويصلها الى الخشخاش الاسود المزاج || ووشها الاماميان الى الجبوة الصنابية المزاج تملوها زركشة وتزاورق سمراء اللون . ووشها الخلفيان الى البياض الاخير يطوقه حشار سطلي || لها ثلاثة اجيال في الحول . تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وفراشة الجبل الثاني في حزيران وفراشة الجبل الثالث في ايلول . تسرح في الليل وتعاظم بعد ظهورها بنحو عشرة ايام وتفتح الممكن مجموعات متباعدة العدد على الصفحات السفلى من نصل الارواق التي تلتاس التربة || الطور الاسروي يستمر نحو ستة اسابيع في الجبلين الاول والثاني ونحو ٢٧ اسبوعا في الجبل الثالث . والسرعة عند ادراكها الكمال الجسوري تطول من ٤٥ الى ٤٥ م . جسمها مستدق القدم مستطيل المؤخر . قوتها متعاطل السرعة والكهبة يطوه خط لبي اسود متعرضه فقط سفر . رأسها منقط بالاصود || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ، في جميع الاجيال ، يتغني في تربة ضمن جلباب من الطين .

### ٢٥٢٧٤ - تيل - كورليون

Couriloun (F). Whimbrel (E).  
الليل هو فرخ الكروان . يفاك فلان اجين من ليل .

### ٢٥٢٧٥ - تيلك \* - ليتج - ليتج

Syringa (S). Lilas (F). Lilac, Pipe tree (E). Lilac, Flying (D). Lilac, Siringa, Lilac, Sirena (I).  
جلس نباتات برية وتريبية من فصيلة الترينيات . انواعه عديدة منها الجنبات والاشجار . انتابها واراقها متقابلة . ازهارها قوتها التجميع ، ناجي الارتكاز . ازهارها قصيرة

الكهباة اللون بين تكون الصفحة اليسرى يضاء اللون غبراء المواجه . وهي من الاسماك المأكولة المتحمبة الطعم .

### ٢٥٢٩٣ - ليمنوغال غفاس

*Limnogaes mergulus* (S) *Limnogaes plongeur* (F). حيوان لين حاشر من فصيلة المذاليات . موطنه جزيرة مدسكير . يألف غفاس مجاري الماء . قوته الحشرات والديدان || جسمه صغير القد مكرم بطول نحو ٢٦ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٣ سم . رأسه فيه غزيرتي الشكل مستطيل الخيط . عيناه وأذناه صغيرتان . جوارحه قصيرة . جميع اصابعه مخبئة عما يساعده على السباحة والغوص ثوبه الى الشققة السمراء . وبره دقيق ناعم || الاثنى ثور قطع في كل رص من ٨ الى ١٠ جراه .

### ٢٥٢٩٤ - ليمنوفيليات

*Limnophiliidae* (S). *Limnophiliidae* (F). فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها متباينة الحجم . اثارها تراوح من الطلعة الى السمرة . ملابسها الفكية ثلاثية الاجزاء عند الذكور ، حاشيتها عند الاناث . رثامها مسووجة . اجنحتها الامامية رقيقة يملؤها بعض الخمل الممتلئ . قوائمها الامامية مجهزة بمنحس ظنبوي الارتكاز . قوائمها الوسطى ثلاثية المناحس || اساريمها تمشي في الماء ملحوقة بمجلايب مختلفة الاشكال منها الاسطوانية والمخروطية والمهرمسة والمبططة . اشهر اجناسها :

*Limnophilus* (S). **اليمفيل**  
*Anabolia* (S). **الانابوليا**  
*Grammotaulius* (S). **الغراموتولس**  
*Colpotaulius* (S). **الكولبوتولس**  
*Mesophylax* (S). **الميزوفلاكس**  
*Halesus* (S). **الهلسوس**  
*Drusus* (S). **الدروسوس**  
*Enoclyta* (S). **العتيل**

### ٢٥٢٩٥ - ليمور

*Lemur* (S). *Lémur* (F). *Lemur* (E). جنس حيوانات لاحة صغيرة من الليموريات . انواعه المعروفة اربعة . مهداة غفاس وبرنقات جزيرة مدسكير . جميعها مستطيلة الشكل . مسطيلة الاجسام الرشيقة والاذناب الجليلة || تألف الغافيات . تسرح في الليل او في النهار . قوتها الحشرات والمطاط ويختلف الزخافات والطير والبار .

### ٢٥٢٩٦ - ليموريات

*Lémuriens, Prosimiens* (F). رتبة حيوانات لينة من القرصيات اليمشيات تشمل ٤ فصائل تضم بعض الاجناس والديدان من الانواع . جميعها صغيرة القد و رشيقة القوام ، مستطيلة الاذناب .

### ٢٥٢٩٧ - ليمون

*Citrus* (S). جنس اشجار وتجويرات مشرة برية وزراعية من الحشويات . انواعه عديدة اعطائها البلاد الحارة . سورها منتصبة فراءه ، فناء ، حشفة . اوراقها معتقة . نساها مستطيلة لامة الخضار . ازهارها غثنوية مثرية عطرة . ثمارها مختلفة الاشكال والاجسام والالوان . يذهب فيها الاخضر الاصفر

### ٢٥٢٩٨ - ليليات

هي التفتيات ، فصيلة حشرات ، اطلبها .

### ٢٥٢٩٥ - ليلية

هي التسمية من الحشرات ، اطلبها .

### ٢٥٢٩٦ - ليلية الجنبجل \* هيبال الجنبجل

*Hapialus humuli* (S). *Hépiale du houblon*. *Phalène du houblon* (F). *Ghost swift moth* (E). *Hopfenwurzelbohrer* (D).

حشرة من اليليات ، جسمها غليظ الشكل حنطي اللون ، بسطها تراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم . الاثنى اكبر حجما من الذكر . رواشها الى الصفرة النورية يملؤها تقيح احمر . رواش الذكر فضية اللون جزئية الاهداب . جيلها الحولي واحد . يكثر وجودها من حزيران الى تموز . تمشي رقتها على جهور الجنبجل تسطها وتؤذيها .

### ٢٥٢٩٧ - ليلية قارضة

هي فراشة النودة القارضة ، راجعها .

### ٢٥٢٩٨ - ليلية

*Laelia* (S). *Lélie* (F). *Laelia* (E). جنس نباتات شتية امنية من فصيلة السملليات . شاربها لاقطاسية الارتفاع . اوراقها حشكية النصال القاسية . ازهارها متفوي التجمع ، طري الارتكاز . ازهارها كبيرة بعضها عطري المرف || انواعها المعروفة قليلة ، اشهرها التالية :

### ٢٥٢٩٩ - ليلية غراشيه

*Laelia furfuracea* (S). *Lélie furfuracée* (F). نوع من اليلية منها المكسيك . ساقها ربيعة تملو نحو ٧٠ سم . اوراقها عديدة اهليجية النصال الخراشيه الصفحات العليا . ازهارها كبيرة القد عطرة ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى الياض الناجي يملؤها في وسطها بقعة مستديرة صفراء || تنويرها يستمر طوال فصل الخريف .

### ٢٥٢٩٠ - ليلية قزعة

*Laelia pumila* (S). *Lélie naine* (F). نوع من اليلية . ساقها دقة مستطيلة متتمبة تحمل ورقة واحدة اهليجية النصل . زهرها واحدة كبيرة القد ، وردية اللون ، قطرها نحو ١٠ سم . وهي فواحة المرف الطل ، ترتكز على شراخ يرتفع نحو ٥ سم . || تنويرها يستمر عدة اسابيع بين ايلول وتشرين الاول .

### ٢٥٢٩١ - ليلية مستطيلة الاقان

*Laelia peduncularis* (S). *Lélie à long pedoncule* (F). نوع من اليلية . منها المكسيك . ساقها شراخية قصيرة تحمل ورقة واحدة اهليجية النصل المقطوع الطرف . ازهارها وردية اللون مبقنة بالبنفسجي || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

### ٢٥٢٩٢ - ليمندة

*Limnanda vulgaris* (S). *Limnanda, Lime* (F). *Dab* (E). سمكة بحرية من الملساوات الجانيبات الدم تنتمي الى جنس اسماك موسى . جسمها بيضي الشكل مبط الغالب يطول نحو ٣٠ سم . وهي تتميز باختلاف لون صفحي جسمها وبارتكاز منها الواحدة فوق الاخرى على الصفحة اليسرى



ليلية الجنبجل



ليلية غراشيه



ليمندة



ليمور

منها الحلوة ومنها المأكولة ومنها الحامضة ومنها الحامضة المرة. أشهر أنواعها ما يلي .

٢٥٢٩٨ - **لَيْمُونُ أَصَالِيَا \*** ، **بَرْغَمُوت** ، **زُبُون**  
Citrus bergamota, C. bergamia (S). Bergamotier, Bergamotier (F). Bergamot orange (E). Bergamot-tenzitron (D). Bergamotta (I).

نوع من الليمون الزراعي المجهول المهد. تكثر زراعته الصنانية في بعض مواسم المتوسط انحصار السواحل الإيطالية حيث يستخرجون من قشور ثماره عطر البرغوت. ثمرته صغرية القد، اغصانها متفرقة. اثمارها ولونها خضراء اللون، اوراثها مسطيلة الانحناء. ازهارها بيضاء اللون، فواحة العرف المطري. ثمارها برعمية الشكل مقطوعة الرأس. قشورها كثيفة الجيوب العطرية غزيرة المادة. عصارة حمورها حامضة.

٢٥٢٩٩ - **لَيْمُونُ أَقْصَدِي \*** ، **يُوسُفُ أَقْصَدِي \*** ، **يُوسُفِي** ، **مَنْدَارِين**

Citrus nobilis, C. nobilis deliciosa, C. deliciosa (S). Mandarinier (F). Mandarin orange (E). Mandarine, Jericho Orangenbaum (D). Mandarina (I).

نوع من الليمون الزراعي المشهر. حمويه واصرامه عديدة، مهدا الصين وقد عث زراعتها معظم المناطق الحارة اغصانها البحرية. اثمارها صغرية القد تملو من سترن الى سبعة اثمار. سوقها متعقبة، اغصانها متفرقة، انحدافها. اثمارها دقيقة مسطيلة. اوراثها متعاقبة، متعقة، بسيطة. نصلها احليجي الشكل، ذلق الزام الاخير، لونه الى الخضرة العائقة. ازهارها بيضاء اللون خافتة العرف. ثمارها مستديرة متخففة القطبين تملو من ٥ الى ٧ سم. قشورها مشطلة رافعة دقيقة لا ترضع بالخصوص. وهي غزيرة المسود العطرية الذكية العرف. لونها عند الادراك يراوح من الاصفر الاخضر المواج الى الاصفر الصناني الاخر التويج. لباب حمورها مستحب النكهة، سكري الطعم غني ببعض الطوائص الصمغية الناعمة. (راجع جدول زراعة السوسوم (Satsuma)). ثمارها زاهية اللون الاصفر الصناني، حامدة البلور، معتدلة العرف والنكهة. ثمرتها متوسطة القد تحمل الصقع خاصة اذا كان طعمها ليمون بري || واليوسفي رطب في الارربة العميقة النور، الحصى والقليلة الانحناء. متطلباته الغذائية لا تقل من متطلبات البرتقال لانه شره يستلزم العناصر النضوية والمعدنية بكرة.

٢٥٣٠٠ - **لَيْمُونُ الْبَحْرِ \***

Ximenia americana (S). Ximénie, Prune de mer (F). حبة مشمرة من فصيلة الازيديات. مهدا المناطق الاستوائية الافريقية والامريكية. ساقها فروع. فروصها اغنية الاثنا عشر قصيرة القاب، اوراثها متعاقبة و سانية النصل الجامد ثمارها غضوية الشكل والقد، حامدة الطعم، مأكولة.

٢٥٣٠١ - **لَيْمُونُ الْجَنْتِي \*** ، **كُوبُفُوت** ، **كُوبُفُون**

Citrus decumana paradisi, C. paradisi (S). Grapefruit (F). Grape-fruit (E). Lederorangenbaum (D). Pomei (I).

غرب من الليمون الهندي الزراعي. ثمرته تملو من ٨ الى ١٠ اثمار. ساقها وانحدافها قليلة الحشف القصير، اغصانها فارقة. اثمارها قليلة الكثافة. اوراثها كبيرة القد يفضي الشكل. ثمارها كثار الليمون الهندي شكلي وحجمي ولونا الا انها اجرد عصارة واقل مرارة وموضوعة وهي تؤكل مع السكر.

٢٥٣٠٢ - **لَيْمُونُ بَرْتَقَال**

Orange هو البرتقال، اعليه.

٢٥٣٠٣ - **لَيْمُونُ بَرِّي**

Citrus trifoliata, C. triptera, Poncirus trifoliatus (S). Citronnier à 3 folioles (F).

نوع من الليمون مهد الصين واليابان. ثمرته صغرية صغرية القد تملو نحو ٣ اثمار. ساقها متعقبة حشفة فروعها. فروصها قليلة الانحناء متوسطة الانحداف والاثان. اوراثها مركبة ثلاثية الوريقات. وريقاتها احليجية النصل المسن المقطوع الطرف. ازهارها كبيرة القد يضاء اللون خافتة العرف. ثمارها بحجم التفاحة الصغيرة وهي حامدة مرة لا تؤكل. قشورها رقيقة لونها الى الصفار الباهت. وهو شائع الاستعمال كالتالنج لانه يفرس للتطعيم نظرا لنشاطه وينتاج وسرعة اثماره وقوة احماله الصقيع.

٢٥٣٠٤ - **لَيْمُونُ حَامِض**

Citrus medica (S). Citronnier, Limonier (F). Lemon tree, Common lemon (E). Limonenitzitron (D). Citreno, Limone (I).

نوع من الليمون الزراعي السبروتي. مهد المشرق الهندي الصينية وجوارها. حمويه واصرامه عديدة. اثمارها تملو من ٣ الى ٦ اثمار. سوقها وفروعها حشفة. حشفها حاد الحدة يطول نحو ٣ سم. اغصانها فارقة. اثمارها وزاوية موشحة بالبنفسجي. اوراثها متعاقبة متعقة. اغصانها حامدة الجناح، نصلها يفضي الصفحة المستطيلة للشعارة الحافة. ازهارها خماسية النصل، فواحة العرف المطري، لونها الى البياض تشوبه ماجة ارجوانية. ثمارها يفضي متعقبة تنتهي بنذلة صغرية حامدة الطوق. عصارة حمورها حامضة الطعم حامدة المرارة.

٢٥٣٠٥ - **لَيْمُونُ حُلُو**

Citrus aurantium aurantifolia, C. limetta, C. limonium dulcis (S). Limettier doux, Limonier doux (F). Sweet lemon tree (E). Süsse Limone (D). Limone douce (I).

نوع من الليمون الزراعي المأكول الجار. ثمرته تملو من ٤ الى ٧ اثمار. ساقها وفروعها حشفة. اغصانها متعقبة الانحناء. اثمارها ونوايسها فسقية اللون، اوراثها بحجمه الانحناء. نصلها يفضي الصفحة، مسنة الحافة. ازهارها عطرية، يضاء اللون، صفراء المواج. ثمارها مستديرة تنهي بحليمة مقطوعة. قشورها مائسة، باحة الصفار. حمورها غزيرة العصارة الحالية من الحامض الليموني.

٢٥٣٠٦ - **لَيْمُونُ كُمُكَات \*** ، **كُمُكَات \***

Citrus japonica (S). Kumquat (F).

نوع من الليمون الزراعي المشهر، مهد اليابان وفروصها ثمرته تشبه ثمره اليوسفي، اوراثها سانية النصل العائق الحفصار. ثمارها تؤكل بكاملها عند الادراك وفي صغرية الحجم كروية الشكل او مسطيلة. قشورها مائسة ميمكة اللباب، حمورها دقيقة لا تملو من الحموضة || اعليه اقليم اليوسفي وقد يستر يده حنافة وانسألا اذا طعم ليد الليمون البري. حمويه المشهورة اثنان المستدير والمستطيل. رابع كمكات.



ليمون اصيليا



ليمون اقصدي



ليمون البحر



ليمون الحنف



ليمون حامض



ليمون حلو



ليمون كمكات

٢٥٣١٦ - **لينارا الحروز** هي نضارية الحور، اعلينا .

٢٥٣١٧ - **لينات الزعالي** Malacotétragyns (F).  
Malacotetryll (E). رتبة من الاسماك .

٢٥٣١٨ - **لينات الصدف** Malacostracées (F).  
Malacostraca (E). صفيح حيوانات من القشريات .

٢٥٣١٩ - **لينات العبد** Malacodermes (F).  
Malacoderma (E).  
لينة من الحشرات العنيدة الالوانية شلت من ريقانها  
لكنها لينة الالوان . نضالها حديد اشهرها البراهيات .

٢٥٣٢٠ - **ليناريه** ، حبّاحب Linaria (S).  
Linaire (F).  
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الخنازيريات .  
انواعه نحو ١٢٠ منها الاشباب والجنات الحولية والمصرة .  
اوراقها وازهارها لا تقياسية الشكل والتجميع والانتظام  
والارتكاز || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٥٣٢١ - **ليناريه ارجوانية** Linaria purpurea (S). Linaire pourpre (F).  
نوع من الليناريه المصرة وهي بجملة جادة تملو من ٦٠  
الى ١٠٠ سم . اوراقها خفيفة خضراء . السفل منها غنية  
التجميع والعليا متعاقبة . ازهارها صفويدة ارجوانية اللون  
صغيرة اللد || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

٢٥٣٢٢ - **ليناريه اسلية** Linaria spartea (S).  
Linaire jonciforme (F).  
نوع من الليناريه الحولية وهي عشية سريرية تملو من  
٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها خفيفة مستطيلة اسلية الشكل ،  
السفل منها غنية التجميع ، أما العليا فتعاقبة وهي برية  
اللون قليلة اللد . ازهارها الى الصفار الباهت ، قواعدها  
برقالية الموج . يزورها نحلة حامدة الجناح || ازهارها  
يستمر من ايار الى آب .

٢٥٣٢٣ - **ليناريه باهية** Linaria pallida (S).  
Linaire pâle (F).  
نوع من الليناريه المصرة . ساقها مدادة طول نحو ٨٠ سم .  
اوراقها متعاقبة مدقة كبيرة اللد . نضالها مستدير الصفة ،  
سباعي الفصوص . ازهارها طرية العرف تملو نحو ٢ سم .  
لوها الى الزرقة الباهت || ازهارها يستمر من ايار الى  
تشرين .

٢٥٣٢٤ - **ليناريه حوشاء** ، حبّاحب احمر Linaria elatine (S). Linaire élatine, Muflier élatine,  
Velvete, Véronique femelle (F). Cancerwort, Pointed  
leaved toad-flax (E). Spießleinkraut (D). Elatine,  
Linaria veronica, Veronica femina (I).  
نوع من الليناريه المصرة وهي بجملة خضراء حشاء تملو نحو  
٦٠ سم . ترطب في الاثربة الطيبة . اوراقها ستانية ،  
خفيفة ، متعاقبة . ازهارها صفراء اللون صغيرة اللد .  
ازهارها يستمر طوال فصل الخريف .

٢٥٣٢٥ - **ليناريه خملية** Linaria pilosa (S).  
Linaire velue (F).  
نوع من الليناريه المصرة . ساقها مدادة طول نحو ١٢٠  
سم . اوراقها كبيرة اللد كثيرة التفصيص . نضالها خلي  
البشرة الحبل اللون . ازهارها متوسطة اللد لوها الى الزرقة  
البنفسجية || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٥٣٢٧ - **لينون مالح** ، **لينون مصري** ،  
بشزهيير Citrus limonum pusilla (S).

Limón d'Egypte, Petit limon d'Egypte (F). Egyptian  
small lime (E). Egyptische kleine Limonenzit-  
rone (D). Limone piccolo, Limoncello calabrese (I).  
نوع من اللينون الحامض . اصطناعه البلاد الحارة تكثر  
زرارته في مصر والهند وبعض المناطق الامريكية . ثمرته  
صغيرة اللد تملو من ٣ الى ٥ اطار . اغصانها متدبة .  
انتادها فناء . اوراقها بحرية اللون ، مجنسة الاغصان ، يضيئة  
النضل . ازهارها صفويدة اللد يضيء اللون ، ثمارها صغيرة  
شبه كروية . اقشورها مأللة رقيقة ، حصوصها غزيرة  
الصارة الشديدة الحوضة .

٢٥٣٢٨ - **لينون هندي** ، **لوراسكين** Citrus decumana, C. maxima (S). Pamplemoussier,  
Châdque (F). Pomelo tree, Shaddock tree (E).  
Pompelmusorangebaum (D). Pompa di Genova,  
Pompelmo (I).

نوع من اللينون الزراعي ، هذه الثمرة جزر الزايج . ثمرته  
تملو من ٥ الى ١٥ اطار . ساقها واغصانها خضراء . اغصانها  
زبداء اللد . اوراقها كبيرة اللد تملو نحو ١٠ سم .  
وتعرض نحو ٥ اغصانها مجنسة ، نضالها يضيئة جامدة  
لامسة الخضار . ازهارها صفويدة التجميع يفم من ٦ الى  
١٠ اطار كبيرة اللد ، يضاء اللون ، مستحبة العرف  
الطري . ثمارها مستديرة ، منخفضة الرأس والعقب .  
قشورها براوح من ١٠ الى ١٥ سم . قشورها صميكة خشنة  
لوها الى الصفرة . حصوصها كبيرة الحجم ، متوسطة  
الصارة الحامزة المرة المأكولة مع السكر .

٢٥٣٢٩ - **لينونات** ، **ميتركات** Citrate

٢٥٣٣٠ - **لينون** Citron (F). Citron, Lemon (E).  
هي ثمرة اللينون الحامض .

٢٥٣٣١ - **لينون حنونة** Limette, Lime (F).  
Lime (E). هي ثمرة اللينون الحلو .

٢٥٣٣٢ - **لينون هندي** Pompolón, Poméio, Pamplemousse, Shaddock (F).  
هي ثمرة اللينون الهندي اي الفراسكين . Shaddock (E).

٢٥٣٣٣ - **لينونيت** ، **هيماتيت اسمر** Limonite, Hématite brune (F). Limonite, Brown  
haematite (E).

معدن حديدي اسمر اللون يعرف كياويو باكسيد الحديد  
الحيدراكي الطبيعي . وزنه براوح من ٣٦ الى ٤ وصلابته  
من ٥ الى ٥.٥ وهو نضري حديم التبلور والانتظام .  
اشكاله عديدة اغصانها اللينونيت اثنري اللون واللينونيت  
البلل المعروف بالفرصة الصفراء واللينونيت الشاكي واللينونيت  
المحبب .

٢٥٣٣٤ - **لين الجلد** Malacoderme (F).  
Malacodermatous (E).

نعت تعريفي يطلق عل كل حيوان لين الجلد ان من  
الزواحيات او غيرها .

٢٥٣٣٥ - **لين العظم** Osteomalacia (F).  
Osteomalacia (E).  
شاذية تصيب البقر الحلوب سببا نقص في الفسفور يمو  
الى قلة نسبته في الاغصان والاحلاف التي تنتجها الابقار .



لينون مالح



لينون هندي

## ٢٥٣٣٢ - لينارية مقدونية

*Linaria macedonica* (S). *Linaria de Macédoine* (F).  
نوع من اللينارية المعمرة وهي بجملة سبروتية تملو من ٥٠  
الى ١٠٠ سم. ساقها متضخمة قليلة الفروع. أوراقها  
لاطة، نصلها ينحني الشكل ذات الزوايا الخشيرة. أزهارها  
مستطيلة الاذن، متوسطة الحجم، لونها الالوان الصفراء الزاهية.  
أزهارها يستمر طولك فصل الصيف.



لينارية دلاسية

## ٢٥٣٣٣ - لينارية ورنالية

*Linaria genistifolia* (S). *Linaria à feuilles de genêt* (F).  
نوع من اللينارية المعمرة وهي بجملة سبروتية صغيرة القد  
تملو نحو ٦٠ سم. أوراقها لاطة، متضخمة، نصلها  
كالزوايا وهو جامد الصلابة بحري اللون. أزهارها  
مستطيلة القد، قصيرة الاذن باحة الصفار. أزهارها  
يستمر من حزيران الى آب.

## ٢٥٣٣٤ - لينيت ٥، لينيت

*Lignite*  
هو الخشب المنقسم والقسم الاذن. نوع من الفحم  
الحجري الحديث العهد المتوسط الصلابة.

## ٢٥٣٣٥ - لينين

*Lignine*  
هي اللينين، المواد الكيماوية الطبيعية، التي تملو الصلابة  
والقوة في النسيج النباتية الخشوية.

## ٢٥٣٣٦ - لينوت ٥

*Astroemeria ligtu* (S).  
*Liuto* (F).  
نبات عشبي زراعي من فصيلة الزنجيبات. أصله البلاد  
الامريكية. تكثر زراعته في البيرو والشيلى. بذراته  
مستطيلة لا قياسية الشكل والحجم يستخرج منها لبون  
ينحني «فرون» لذية الطعم شائع الاستعمال فيده المرعى  
وصاحب المدة والامعاء الضعيفة لانه سريع الهضم عديم  
الانفعال مع اي طعام كان.



لينوت

## ٢٥٣٣٧ - لينوت عفيرين

*Myrmelionides* (F).  
*Myrmelionides, Ant-lions* (E).  
هي الميونيات، فصيلة حشرات من صبيبات الجناح.

## ٢٥٣٣٨ - لينود ٥

*Liods* (S).  
*Liods* (F). *Liods* (E).  
جنس حشرات من فصيلة اليروديات ودية عذبات الاجنحة  
انواعه المعروفة قليلة، نحو ١٢، أعطائها تحمل معظم  
اقلام النصف النبال من الكثرة الارضية. أجسامها  
صغيرة، محدبة، اهليلجية الشكل، تملو من ٤ الى  
٦ م. رؤوسها صغيرة، مستترضة. عيونها صغيرة،  
باردة. تأثيرها وفكوكها نظائية. ملاسها قصيرة.  
قرونها الاستشعارية صولجانية. كواسلها مستترضة.  
الحادها لاطة، تحلة التخديد القاطب، قوائها نشيطة  
مهدبة. أثوابها ملونة لماعة. تعيش على الفطور الدالة  
وفي الاعشاب النخرة.



ليود

## ٢٥٣٣٩ - لينوديات ٥

*Liodidae* (S).  
*Liodidae* (F). *Liodidae* (E).  
فصيلة حشرات من عذبات الاجنحة. أجسامها وانواعها  
للمروفة عديدة، منتشرة في معظم اقطار العالم. أجسامها  
صغيرة، محدبة، تملو من ٢ الى ٦ م. رؤوسها صغيرة،  
مستترضة. عيونها باردة. تأثيرها وفكوكها قياسية.  
قرونها الاستشعارية صولجانية. كواسلها

## ٢٥٣٣٩ - لينارية دلماسية

*Linaria dalmatica* (S). *Linaria de Dalmatie* (F).  
نوع من اللينارية المعمرة وهي بجملة سبروتية تملو من ٦٠  
الى ١٢٠ سم. ساقها متضخمة قليلة الفروع. أوراقها  
لاطة متضخمة. نصلها ساني الشكل، مستعرض القاطعة،  
بحري اللون. أزهارها كبيرة القد تملو من ٣ الى ٤ سم.  
لونها الالوان الصفراء الزاهية. أزهارها يستمر من تموز  
الى آب.

## ٢٥٣٣٧ - لينارية صنجابية، حجاب الشقوق

*Linaria cymbalaria* (S). *Linaria cymbalaire, Cymbalaire, Ruines de Rome, Lierre des murailles* (F). *Cymbalaria, Ivy leaved toad-flax, Kienflworthe-ivy* (E). *Zimbelkraut, Gemeines Zimbelkraut* (D). *Linaria cimbalaria, Rovine di Roma* (I).  
نوع من اللينارية للمعمرة، تعيش بين الصخور وعلى الجدران  
القدية. ساقها مستطيلة تملو نحو ٨٠ سم. أوراقها متضخمة  
مستعرضة خماسية الفصوص. نصلها احمر الصلابة السفلى.  
أزهارها بليكية اللون صغيرة القد. أزهارها يستمر من  
ايار الى تشرين.

## ٢٥٣٣٨ - لينارية عادية \*، حجاب مبدول

*Linaria vulgaris* (S). *Linaria commune, L. vulgaire, Muffler bâtard, Lin sauvage* (F). *Butter and eggs, Dragon-bushes, Toad-flax* (E). *Flackskraut, Frauenfächleinkraut, Leinkraut* (D). *Linaria comune, Abrotano salvatico, Urinaria* (I).  
نوع من اللينارية البرية الطيبة المبدولة المعمرة، تكثر  
في البور وعلى حافة الطرقات. مجملتها تملو من ٣٠ الى  
٧٠ سم. أوراقها متضخمة، نصلها ضيق الصلابة ثلاثي  
المروق بحري اللون. أزهارها الالوان الصفراء الباهات بملوحا  
عنه قواعدها مولوج اسفح. أزهارها يستمر من حزيران  
الى ايلول. أوراقها وأزهارها كريمة الرائحة تستعمل ضد  
الواسير.

## ٢٥٣٣٩ - لينارية كبيرة الزهر

*Linaria grandiflora* (S). *Linaria à grandes fleurs* (F).  
نوع من اللينارية المعمرة وهي بجملة سبروتية تملو من ٧٠  
الى ١٤٠ سم. أوراقها غنية التجميع، نصلها خطي الشكل  
بحري اللون. أزهارها نورية، كبيرة القد تملو نحو ٤ سم.  
لونها الالوان النفسجية يملو تجميع ارجواني وبشعة صفراء.  
أزهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

## ٢٥٣٤٠ - لينارية كركهانية

*Linaria amethystea* (S). *Linaria amethystea* (F).  
نوع من اللينارية الحولية وهي عشية مثدية تملو نحو ١٥  
سم. أوراقها خطية لا قياسية التجميع والانتظام لونها الالوان  
الخضراء البحري. أزهارها كركهانية اللون يملوحا عنه  
قواعدها مولوج بنفسجي. أزهارها يستمر من تموز  
الى آب.

## ٢٥٣٤١ - لينارية مراكشية

*Linaria maroccana* (S). *Linaria marocaine* (F).  
نوع من اللينارية الحولية وهي عشية سبروتية تملو من ٢٥  
الى ٣٥ سم. أوراقها محدبة لا قياسية التجميع والانتظام.  
نصلها خطي البشرة احمر اللون. أزهارها كبيرة القد  
بنفسجية اللون ارجوانية الملوحة. أزهارها يستمر طول  
فصل الصيف.

فرعاه تملو نحو ٨٠ سم. أوراقها ايّدة بقسيّة الشكل ،  
تطول من ٥ الى ٦ سم. نصلها جامدة ، مائلة الصفحات  
اللامعة . ازهارها علقى التجميع ، طرفي الارتكاز .  
ازهارها بيضاء اللون ، متاكها ارجوانية ، كمابرها ثلاثية  
المصاريع || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

مستمرضة . اغمارها لاحقة . اثوابها ملونة لماعة || تمش  
عل الفطور الذائبة والمنحلة وفي الاغشاب النخرة والقردي  
وتحت الحاء || اشهر اجناسها الاسود واليفيل .

٢٥٢١٠ - لبوفيل بقسيّ الورق °

*Leleophyllum buxifolium* (S).

*Leleophyllum à feuilles de buis* (F).

جنبه برية وتزيينية معمرة من فصيلة الخلتجيات . ساقها





Diluter (F). To dilute (E). ٢٥٣٤٨ - مائه

مائه المثلثه اذابه . مائه الملح في الماء . مائه الكلس في الماء .

Candélabre (F). ٢٥٣٤٩ - مائله \*

Pyramidal fruit-tree (E). شكل من اشكال التشذيب خاص بالشجر المستوي شمدان .

Reflet (F). Reflection (E). ٢٥٣٥٠ - مائجه ، موائج

٢٥٣٥١ - مائجه كده ، زهره المجد

Clanthus (S). Clanche (F). Glory-pea, Parrot's-bill (E). Prachtwicks, Kuhmesblume (D). Clanto (I). جنس نباتات زرينيه معمره من فصيلة القرقيات الفراشية . انزلها المعروفة قليله . اصنافها جزر المحيط الهادي . سوقها عشوشه ، اوراقها وزريه التركيب مشطيه . ازهارها كبيره القده ، بجمله الشكل . سميت زهره المجد لان جهازها يمجده الخالق || اعرف انزلها ما يلي :

٢٥٣٥٢ - مائجه بهيه \*

Clanthus speciosus (S). Clanche de Dampier (F). نوع من المائجه وهي بجمله سرويه تملو نحو ٩٠ سم . ساقها فروع . وريقاتها سنانيه الشكل . نصلها نام اللبس ، فني البشره . ازهارها خماسيه او سداسيه التجميع ، كبيره القده ، تملو من ٨ الى ١٠ سم . لونها الى الاخضر الانبجاني يملوها عند قاعده الزايه بقمه جويه لاسه . ازهارها يشمر طولا الصب .

٢٥٣٥٣ - مائجه عارشه \*

Clanthus puniceus (S). Clanche ponceau (F). نوع من المائجه وهي جنه سرويه عارشه تملو نحو ١٢٠ سم . ساقها مشقوقه القروع . وريقاتها اعليجلجه .

Eau (F). Water (E). ٢٥٣٤١ - مائه

جسم مائه عادم اللون والعظم والرائحه . نقله النوبي ١ وزله الاتيني ١٨ يجمده عند بلوغه درجه الصفر وما فوقها من المقياس الستيفرادي ويغل عند بلوغه نحو ١٠٠ سم في الضبط الجوي العادي || وهو من اكثر مواد الكون انتشارا . يوجد في الطليه على ثلاث حالات : سائل بخار في الجو . وسائل جاد في المواقع الباردة فيكون جليدا عند القطبين والجليا في الجبال العاليه . وسائل سائل في البحار والانهار والينابيع || والماء كايونيا هو نتجه تآلف جميعه بين الاكسيجين والهيدروجين بنسبه ١ الى ٢ .

Eaux résiduales (F). ٢٥٣٤٢ - مائه التجير

Residuum water (E). هو الماء الناتج من معادل السكر والانشا والتقطير .

Eaux fontales (F). ٢٥٣٤٣ - مائه الجتين

سائل لزج خاص يشمر الجتين في الرسم .

Eaux aux Jambes (F). ٢٥٣٤٤ - مائه الرئس

رسم يصيب الخيل في رملها وسوقها فيحدث فيها تشققا تسيل منه ماده مائعه كربه الرائحه .

٢٥٣٤٥ - مائه الخعاب ، مائه الجكوير

Eaux d'égouts (F). Sewage, Sullage (E). هو ماء المنازل والقوارع .

٢٥٣٤٦ - مائه الخراشيف ، مائه الكفف

Eaux-vannes (F). Sewage (E). هو خليط من الماء والبرك والرجيع الصادر عن الكفف .

Purin (F). Dung-water (E). ٢٥٣٤٧ - مائه المزال

سائل مركب من بول الحيوانات والماء المستعمل من الزبل .



مائجه بهيه

Substance (matière) (F). **مَادَّة** ٢٥٣٦٣  
Matter (E).

Article (jur.) **مَادَّة** ٢٥٣٦٤  
تقسم القوانين والمراسم والقرارات والمعقود الى مواد . والمادة هي النص الواضح للشيء المقصود .

Corps du délit (F). **مَادَّةُ الْجَرِيْمَةِ** ٢٥٣٦٥  
Corpus delicti (E).  
هي الوقائع المادية التي تدل على الجريمة وصفتها .

Adjuvant **مَادِدٌ** ٢٥٣٦٦  
المواد المادحة، مواد قليلة تصاف الى بعض الادوية او الشحات الغذائية فتريد تفעה الغذائي .

Némotocide (F). **مَادُوْدَة** ٢٥٣٦٧  
Nematocide (E).  
كل مادة تستعمل في القضاء على الديدان الثعبانية .

Matérialisme (F). Materialism (E). **مَادِّيَّة** ٢٥٣٦٨  
المادية مذهب القائلين بانه لا يوجد في هذا الكون سوى مادة وحركة ، وان الجيلة والحياة والضمير ما هي الا مناشع يفسرها تحليل المادة والحركة .

Madia (S). Madi, Madie (F). **مَادِيَّة** ٢٥٣٦٩  
Madi, Tarweed (E). Olmadie (D). Madia (I).  
نبات عشبي ينجم صناعي من فصيلة المركبات ، مهد الاصل بلاد الشيل زرع لبزوري التي يستخرج منها مادة دھنية تستعمل في صناعة الصابون . وقد زرع ايضا لاستهلاك كسباد خضري .

**مَادِّي** ٢٥٣٧٠  
المادي : السلس الأبيض او الجديد او خالصه .

Capra falconeri (S). **مَارْخُور** ٢٥٣٧١  
Bouquetin markhor, Markhor, Chèvre de Falconer (F). Markhor (E).

اسم فارسي بمعنى آكل الحيات لانهم زعموا انه يأكلها . وهو نوع من الابل ضروبه المعروفة اربعة اعطائها اسراج ومزقعات التبت والافغان وكثير... يتميز باستطاعة وانتصاب قروته الخنزيرية الضليمة . جسمه يطول نحو ١٣٥ سم . ويبلغ نحو ١٠٠ سم . الاذن اصفر جنة وقرنا من الكزك . خافته ثنائي الضرع وهي قطع من جدي الى جيلين || والمارخور يبيض اجلها يد من ٢٠ الى ٥٠ و ٧٠ نفرا وهو يتصالب مع الماعز وتواجه بحسب السيلة .

Canna des Indes (F). **مَارْزُونَان** ٢٥٣٧٢  
هو قننا الهند ، اطلبه .

**مَارْزُونَانِيَّات ، قَنُونِيَّات** ٢٥٣٧٣  
Cannaceae (S). Cannacées (F). Cannacese (E).  
فصيلة نباتية من سيدات الفلقة عديدة الاجناس والالوان اشهرها المارزوان .

Enrymère (F). **مَارِغ** ٢٥٣٧٤  
مارغ او مارغة نمت تمرين يطلق على كل حشرة تركيب النباتات في جميع اعضاءها اعصها الهوائية من الساق الى الورقة والثمره .

تصلها خيل البشرة ، حريري للمس ، فني اللون . ازهارها خماسية او سداسية التجميع تطول من ٨ الى ١٢ سم . لوها الى الاربوئي، قاعدة اربها بيضاء || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

Malidae (S). **مَاجِيَّات ، مِجِيَّات** ٢٥٣٥٤  
Majdés (F). Majdās (E).

فصيلة من القشرية حشرات الابل . قصيرات الابل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة جميعها بحرية اعطائها بحار البلاد المعروفة الحارة || اجسامها متباينة القد ، تطول من ١٢ الى ٢٤ سم . تتميز بدهونها اللينة الشائكة الاطراف وبلاقطها الكثيرة الضليمة || بعض انواعها مأكلة ، مستحب الطعم .

Jaune d'œuf (F). **مَاح** ٢٥٣٥٥  
Yolk of an egg (E).  
المح : صفرة البيض .

Improductif (F). **مَاحِل ، مِشَحَل** ٢٥٣٥٦  
Unproductive, Idle (E).  
ماحل ومحال كل ارض لا تحسب قط .

Manettia (S). Manettie (F). **مَاحُور** ٢٥٣٥٧  
جنس نباتات جنينية عارضة ممرية من فصيلة القنويات . انواعها قليلة معظمها بري وبعضها زرع . موطنها دقيقة مشقلة . اوراقها ابيدة متعاقبة متفكة . ازهارها قمية الشكل عوربة الارتكاز او تاجية || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

Manettia ignita (S). **مَاحُور قِرْمِزِي** ٢٥٣٥٨  
Manettie rouge feu, M. à fleurs vermillon (F).  
نوع من الماحور الزرع . ساقه دقيقة لولبية تطول نحو اربعة امتار . اوراقها اهليجية الشكل ، تصلها مقطوم القاعدة ذلق الزام الاخير . ازهاره عوربة وتاجية الارتكاز ، قمرية اللون ، لامعة للمواج . قطر قعها نحو ٤ سم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

**مَاحُور قَلْبِي الْوَرَق** ٢٥٣٥٩  
Manettia cordifolia (S). Manettie à feuilles en cœur (F).  
نوع من الماحور الزرع . ساقه دقيقة تطول نحو خمسة امتار . اوراقه قلبية القاعدة مستطيلة النصل الذروب في زامه الاخير . ازهاره كبيرة القد ، اربوئية اللون البوي ، قطر قعها نحو ٥ سم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

**مَاحُور مُرْدُوحِ الْوَرَق** ٢٥٣٦٠  
Manettia bicolor (S). Manettie bicolore (F).  
نوع من الماحور الزرع . ساقه دقيقة نحيلة تطول نحو اربعة امتار . اوراقه سنائية مستطيلة الاضلاع ، تصلها ذروب القاعدة والطرف . ازهاره قمرية الالوان ، اربوئية القسم ، صفر الحنار والخالقة . قطر اقاعها يراوح من ٢ الى ٣ سم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

Makairo (F). **مَاحِرَة** ٢٥٣٦١  
سكة بحرية تدعى سارية ، اطلها .

Amouillante (F). **مَاحِض** ٢٥٣٦٢  
About to calf (E).  
الانث من الحيوان ان حجر او بقرة او ثالة او نمجة او هنر حان وضعها .



ماحور



مادي



مارخور



ماره



ماروت



مارش



مازيون



مازيون هندي

Bois Joli, B. gentii (F). Mezereon, Dwarf laurel, Spurge olive (E). Echter Seidelbast, Kellershals (D). Laureola gentile, Blondella, Mezereon (I).

نوع من الدفنة عديد القصب ويصلو من ٧٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقه متعاقبة مستطيلة ، نصلها ملس البشرة بطول نحو ٨ سم. ويعرض نحو ٢٠ سم. أزهاره عطرية ، غنية بالتجميع عوروية الارتكاز ، تسبق الأوراق . البتلات تحتل مع القصب منها الأبيض والآخر والوردي || ثماره عنبية لونها إلى الحمرة . يستخرج منها من الأوراق مادة فعالة سامة يقال أن القليل منها ينفع من الاستسقاء واليرقان وضغف الكلى .

Daphné alpestris (F). - مازورون جبلي  
أطبخ دفنة أبيض .

Daphné camellée (F). - مازورون مكجس  
نبات من الدفنة ، أطبخ دفنة سفيرة .

٢٥٣٨٩ - مازورون هندي \* ، هرج ، بطريرة  
ثريكات

Clitoria ternatea (S).  
Clitorie de Ternate (F). Blue clitoria, Butterfly-pea (E). Blue Clitoria-blume (D). Fagiolo indiano, Fior celeste (I).

نوع من البطرية من فصيلة الثريبات القراشية . وهو نبات عشبي زراعي متسلق يصل نحو ٩٠ سم. أوراقه مركبة ثلاثية ، وريقاتها بيضيه لسة . أزهاره كبيرة لبد زرقاء اللون تتميز بعدم انتظام بتلاتها . وهي تستعمل في الهند لتدوين الرز للمطبخ وبعض الحلويات . أما ثماره فسنبية دقيقة مستطيلة ، بزورها صغيرة مستديرة ممره اللون .

٢٥٣٩٠ - مازورونيات  
Thymelaeaceae (S).  
Thymelacées (F). Thymelaeaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلتين عديمة الفلوات . اجناسها وأزهارها كثيرة العدد معظمها عشبي وبعضها جنبي مه الطيبي والصبغي والرائحي .

٢٥٣٩١ - مازون  
Eufs de fourmis (F).  
Eggs of the ants (E).  
بيض النمل .

٢٥٣٩٢ - مازوت  
Mazout (F). Oil fuel (E).  
سائل وقود تشبه من تقطير النفط الخام .

٢٥٣٩٣ - مازور .  
Dacelo (S). Martin-chasseur (F).  
جنس طير من المازوريات . أنواعه عديدة أطرافها فضية الأرجاء تشل معظم خطوط المحيط الهادي ، جميعها مستعرضة التأثير الكبيرة المتتالية الصفحة السفلى . أجسامها ريمية ، اجنحتها متحدة الطول ، اذنانها مستعرضة ، أصابعها قصيرة وقوية || يألف الحياة الجبلية . أسراه بعد من ١٠ إلى ١٠٠ || أعرف أنواعه واشهرها المازور الجبار .

٢٥٣٩٤ - مازور جبار \*  
Dacelo gigantea (S).  
Martin-chasseur géant (F). Laughing jackass (E).

طائر من المازور ، قال فيه الجاسط : « طائر مبارك ينشأ به اصحاب السبق » طوله يراوح من ٤٧ إلى ٥٠ سم. يسلط نحو ٦٥ سم. ثوبه حاقب اللون . رأسه مستطيل الريش اللدبي الاسمر . محمر مستعرض الخط الاسود . ظهره إلى السمرة . بطنه إلى الصبغة يطولها مزج اسود . جناحه إلى الزرق الباقية . فواده إلى السواد اللامع . ذنبه إلى الجلوة

Dolichotis patagonica (S). - مازو ٥٥ \*

Maru, Lièvre de Patagonie (F).  
حيوان لبون قاضم وحيد الجلس والنوع من فصيلة اللبوريات. موطنه الهول والمراعي الامريكية القائمة بين مندوزا وضيبي جران || جسمه متوسط القد طوله نحو ٥٠ سم. ارتفاعه ٤٠ سم. وذنبه ٤ سم. رأس صغير القد . عيناه مستطيلتان اذناه كبيرتان . عتقه طويل . كفه غليظ مستدير . قوائم رقيقة دقيقة . برأته قوية حادة . ثوبه إلى الصبغة اليرداء يطولها توشم ابيض . بطنه حاجي . وبره دقيق وكثيف ، شديد اللسنة ، نام الملس || يعيش بجاعات يراوح عدد افرادها من ١٠ إلى ٣٠ يسرح في النهار . قوته الاشباح ابرية أحصاها النمل || اذناه تقص مرتين في العام وتنتج كل مرة جروين . جبره ردهة كبيرة يحفرها على عمق ١٠٠ سم. مدخلها ويخرجها نفق واحد طوله نحو ٥ امتار .

٢٥٣٩٦ - مازوت \* ، شمر الكتب ، بابوتج  
تشن

Maruta (S).  
Maroute, Camomille puante (F). Mayweed, Dog-fennel (E). Stinkhunds-kamille (D). Maruta (I).

نبات عشبي بري سولي من المركبات وهو نوع من الاقحوان يكثر بين الزروع فيصح من الاشباح الضارة وهو كريح الرائحة عند اللس . أزهاره صفراء اللون .

٢٥٣٩٧ - مازور ، مازور  
Marum (F).  
هو صخر الحر ، اطليه .

٢٥٣٩٨ - مازو  
Oryx (F).  
هي الارخ ، اطليه .

٢٥٣٩٩ - مازو إفريقية  
Oryx beisa (F).  
هي الارخ الافريقي ، اطليه .

٢٥٣٨٠ - مازو البادية  
Oryx capensis (F).  
هي ارخ البادية ، اطليه .

٢٥٣٨١ - مازو الجزيرة  
Oryx beatrix (F).  
هي ارخ الجزيرة ، اطليه .

٢٥٣٨٢ - مازو الصحراء  
Oryx gazelle, Pagan (F).  
هي ارخ الصحراء ، اطليه .

٢٥٣٨٣ - مازو سودانية  
Oryx de Nubie (F).  
هي الارخ السوداني ، اطليه .

٢٥٣٨٤ - مازو  
Bryopsis (S).  
Bryopsis (F). Bryopsis (E).

جنس نباتات بحرية من الخفيات الخضراء . أنواعه المعروفة نحو ٢٥ . أطرافها تشل معظم بحار العالم || كلالها صغيرة . سوقها دقيقة ، شبه أسطوانية الشكل متتامة الافئدة المتراكبة الريشية النصال .

٢٥٣٨٥ - مازو  
Nitrière (F). Nitrebed (E).

المكان الذي يصنع فيه الأزوت او يتجمع فيه إلى تيرات والماتية قد تكون طبيعية كما في شيلي او اصطناعية كما في مصانع الأزوت .

٢٥٣٩٦ - مازورون \* ، دفنة سامة ، أم

Daphne mezereum, Thymelaea mezereum, Meze-  
reum officinal (S). Daphné mazaréon, D. jolibois,

٢٥٤٠٤ - مَاشِيَّة ، بُهْم ، قَتَم ، مَال  
Betail, Bestiaux (F). Cattle, Livestock (E).  
الابل والبقر والغنم والماعز . اشخصها ما كان منها للسل  
والقنينة . سميت ماشية لرميها وهي تحشي وقيل لكثرة سلها ،  
ج. مؤنثي .

٢٥٤٠٥ - مَاصَّات  
Cyclostomes, Siphonophores (F). Siphonophores (E).  
هي الحليقات الانواع رتبة من الاسماك .

٢٥٤٠٦ - مَاصَّة  
Pipette (F). Pipet (E).  
اداة مخبرية تستعمل لشفط السوائل . راجع شفاعة .

٢٥٤٠٧ - مَاصِر  
Enclos (F). Enclosure, Close (E).  
الماصر هو الحاجز تؤسر به الخيل والبقر والمواشي لحصرها  
في مكان معين ومنعها من اترقاد غيره .

٢٥٤٠٨ - مَاصِيعة  
البقرة التي ولي لبها .

٢٥٤٠٩ - مَاصِرْع  
Cephalosporium (S).  
جنس فطور مجهرية من الماصريعات وفصيلة الوطيطيات .  
انواعه عديدة معظمها دوي يعيش ويتكاثر على المواد  
النباتية المتحللة . امشاجها حزيلة مادة تركب سطوح  
حوائلها .

٢٥٤١٠ - مَاصِرِعِيَّات  
Céphaosporiées (F).  
Cephalosporites (E).  
حارة فطور مجهرية من فصيلة الوطيطيات . اجناسها ثلاثة  
وهي التريكوندريه والفلورية والمانوع .

٢٥٤١١ - مَاصِر  
Acescent  
لعت تربتي يطلن على جميع المواد الممكن ان تحبس .  
قالبيل والثار والحليب تجبر من المواد الماصرة لبها قابلة  
للتحسب .

٢٥٤١٢ - مَاصِر  
Pliqué (F). Sour (E).  
ينهي ماصراً كل مشروب يصير نحو التحليل او الفساد .

٢٥٤١٣ - مَاطِر ، مَطْطِر ، شَات  
Pluvieux (F).  
Rainy, Wet, Pluvieux (E).

٢٥٤١٤ - مَاعِز  
Ovis capra (S).  
Chèvre (F). Goat (E).  
الماعر للذكر والانثى ج. معز ومعز ومعزى . ويقال  
للذكر تيس ولانثى معز . والماعر حيوان مجر داجن من  
فصيلة التنيات . انواعه عديدة تمت بلوات الشعر تميزاً  
لها عن ذوات الصوف وهي النمر . وهي تميز ايضاً بقصر  
اذناها وقوة قوائمها وصلابة اظفارها التي تمكها من تسلق  
الصخور . انثاها اصفر قدماً من ذكورها . ضرورها ثنائية  
الحلف . يحلبها يدرم ١٥٤ ربياً تقص عند تمامه من جدي  
الانواع ما يتبع .

٢٥٤١٥ - مَاعِزِ التَّيْبَتِ  
Chèvre de Thibet (F).  
Tibetan goat (E).  
نوع من الماعز الموصوف بشعره الناعم الالبه لكنه يأتي  
بهد الكشمير من حيث الجودة .

الحذمة بالاسود . أما طرف الريش فأبيض || يأنف  
السطوط ويجاري الماء والاذخال ، قوته الاسماك والنظام  
والزرع والغاز والحشرات والحيات || انشاء قمع من  
٣ الى ٤ بيضات تحضنها وحدا نحو ٣ اسابيع .

٢٥٣٩٥ - مَازُونِيَّات  
Dacéloniens (F).  
حارة طير من القرالينات تشمل المازور والفتيش والقيون  
والماهل . اصطلحوا لبلاد الاسيوية والافريقية وجزر  
اقيانية || طيورها تتميز بمناقيرها المشرفة القاعدة ،  
الحفرة المنقطة السفلى ، اللحية المنقط . ريشها متوسط  
الكثافة ، اثوابها معتدلة الزرع واللحم || تألف الاجراع  
والمنافع والسطوط البحرية ويجاري الماء . قوتها الدهن  
والحشرات والقشريات والاسماك . تدن في تجاويف جلوج  
وافغان الانجار اليابسة .

٢٥٣٩٦ - مَاس  
Diamant (F). Diamond (E).  
هو السامور للشعول سموت صفحاته بالتمت .

٢٥٣٩٧ - مَاصِح  
Arpenteur (F). Land-surveyor (E).  
الماسح والمساح والأدري هو الذي يمسح الارض فيرسمها  
ويقس طولها وعرضها النخ .

٢٥٣٩٨ - مَاسَكَة  
Jonchale, Jonchère, Jonchéraie (F).  
Bed or plantation of rushes (E).  
منقع وما اشبه كثر فيه الأصل .

٢٥٣٩٩ - مَاشِ  
ماش المطر الارض : سمها فهو مطر متيش .

٢٥٤٠٠ - مَاشِ \* كَشْرِي  
Phaseolus mungo, Ph. radiatus (S). Haricot d'Angola,  
H. mungo (F). Green gram, Black gram (E). Mungo-  
bohne, Schwarzebohne (D). Fagolo a zigzag (I).  
نبات عشبي زراعي حولي من الفاصوليات وفصيلة القرنيات  
الفراسية . زراعته منتشرة في جميع بلاد الشرق . ساقه فروع  
قائمة . اوراقه متعق مركبة ثلاثية . ورقاتها بيضيه  
التصل المتصبع المذهب المعص . ازهاره خضيه التجميع ،  
زنادية الارتكاز ، صفر اللون ، خضر اللواج . ثماره  
قرون اسطوانية ضيقة مستطيلة . بذوره كروية الشكل  
سمراء اللون او خضراء مملطحة بالاسود . تحوي من العناصر  
الغذائية مسا قدره :

٢٣,٨٠ ٪ من المواد الازوتية

١,٤٦ ٪ من المواد الدهنية

٦٢,١٥ ٪ من المواد النشوية

زراعته مروية يبلر عادة على عقير الحنطة بعد تربص  
المزدرد وسره . بذار الدنم يراوح من ١٣ الى ١٥ كيلو  
وانتاجه من ٩٠ الى ١٢٠ كيلو .

٢٥٤٠١ - مَاشِ شَرِي  
Dolic de Chine (F).  
هو الدجر الصيني ، اطلبه .

٢٥٤٠٢ - مَاشُونِيَّات  
Mandibulates (F).  
نوع من المفصليات تشمل الحيوانات المجهزة بتكثير وزباني .  
اشهر صفونها القشريات والرخساعيات والحشرات .

٢٥٤٠٣ - مَاشُوط  
Chelmatobie (F).  
حشرة مؤذية تنمى ارقية الشتاء ، اطلها .



مازور جبار



ماش



ماعز التوبة



ماعز انقرة



ماعز سوري



ماعز كشمير



مأكلاك الغنات



مأكلاك بولون



مأكلاك ريس

وربة التجميع . وريقتها لا قياسية المد الذي يراوح من ١٩ الى ١٩ ، تصلها ايليحي الشكل ، مالم الصفحة العليا خالي السفل . ازهارها عتيقوي التجميع ، ازهارها صغيرة لينة يضاء اللون خضراء المروج || تنورها يستمر من حزيران الى تموز .

**٢٥٤٢٦ - مأكلاك** *Macacus (S). Macaco, Macaques (E). Makaken (D).* جنس قرد ذوالة من فصيلة المبرسات . انعامه ١٩ ، موطنها مختلف المناطق الاسيوية . اجسامها متوسطة او صغيرة القد ، اعظامها بارزة افعالها وسية . قوتها قوية ، اياها طويلة ، اذنانها لا قياسية . اثارها تختلف مع الانواع || تعيش جماعات متوسطة او كبيرة المد . تألف الاجراع والمضاب الصخرية والشلوط . قوتها الثار والحبوب والخشرات والنع والنعاء والصفاد || انماها ثار جروا واسدا يبلغ كمال شأله بمره سنوات .

**٢٥٤٢٧ - مأكلاك التبت** *Macacus thibetanus (S). Macaque du Thibet (F).* موطنه ارجاع التبت الشرقية وبشورية . جسمه متوسط القد ، رقيق القوام بطول نحو ٧٥ سم . وذنبه ١٥ سم . ثوبه جمل الشعر المستطيل ، لونه الى الكهية السوداء رتو عند البطن وتبقى عند الظهر || يعيش جماعات كبيرة تد من ٦٠ الى ١٢٠

**٢٥٤٢٨ - مأكلاك الغنات** *Macacus silenus (S). Ouanderou (F). Wanderoo (E).* موطنه تها ملبار والبنات . جسمه بطول نحو ٧٥ سم . وذنبه ٢٧ سم . ثوبه اسود اللون ، جمل الشعر المستطيل . حار وجهه افرق الجبهة ، ابيض اللون || تألف الغنات كثيفة البائية ، جماعت تتألف من ذكر وفس او ست اناث وبعض الصغار .

**٢٥٤٢٩ - مأكلاك بوقون** *Macacus cynomolgus (S). Macaque de Buffon, M. crabler (F).* موطنه مناطق وادغال الهند الصينية . يكثر قرب مصبات الانهر . يتسلق الاشجار ويسبح وينفوس || جسمه بطول نحو ٩٦ سم . وذنبه ٤٨ سم . ثوبه ينحرف من الجلي للجب الى الالكيب الاسمر . حار وجهه افرق البياض . جماعته قليلة المد تتألف من ذكر وفس اناث وبعض الصغار .

**٢٥٤٣٠ - مأكلاك ريسين** *Macacus rhesus (S). Macaque rhesus, Rhesus (F). Rhesus (E).* موطنه فسح الارباه يمنة من الهند الى اناام والصين ، جسمه متوسط القد ، صموري الشكل ، كثيف الشعر ، بطول نحو ٩٦ سم . ويرتفع نحو ٤٥ . قوته الى الكهية الصفراء ينحرف الى الجلوة مع اقترابه من فيج الظهر . وجهه واذن الى البصرة السوداء ، ذنبه بطول نحو ٢٥ سم . قوته الثار والحبوب والخشرات على اختلافها يتسلق الاشجار ويسبح وينفوس || يعيش جماعات كبيرة المد .

**٢٥٤٣١ - مأكلاك شائع** *Macacus sinicus (S). Macaque commun, Bonnet chinols (F). Bonnet macaque (E).* موطنه مناطق الهند الجنوبية حتى يمي . تألف الغنات الكثيفة ويغزو الحقول والمزارع والساكن . طوله نحو

**٢٥٤٣٢ - ماعز النوبة** \* *Chèvre de Nubie (F). Nubian goat (E).* نوع من الماعز الافريقي . اجسامه كبيرة القد تملو من ٦٠ الى ٦٥ سم . يتنيز برؤوسه الجمل المفلطحة العادة للحي وبغضبة انه الهديرة وبفسر شعره . الاثى جيدة الد ، فصرها متوسط الحجم . مجموع درها الحلوي يراوح من ٢٥٠ الى ٤٥٠ ليتر .

**٢٥٤٣٧ - ماعز انثركه** \* *Chèvre d'Angora (F). Angora goat (E).* نوع من الماعز المشهور باستطالة شعره الابيض الناعم . منه ضرب اسود الرأس والنعق ، فث الشية موصوف بوفرة شعره الناعم .

**٢٥٤٣٨ - ماعز سوري** \* *Chèvre de Syrie, Ch. mambrine (F). Syrian goat (E).* نوع من الماعز موطنه جبال لبنان وسورية . جسمه بطول نحو ٦٠ الى ٧٠ سم . ورو افطح الرأس ، اكث الشية ، كبير الاذن المتضلبة الفارشة ، الاثى جماء الرأس كبيرة الفرس . متوسط مجموع درها الموصي يراوح من ٤٠٠ الى ٥٠٠ ليتر .

**٢٥٤٣٩ - ماعز كشمير** \* *Chèvre de Cachemire (F). Cashmirian goat (E).* نوع من الماعز الموصوف بشعره الناعم الحريري المروج . يكثر في بلاد كشمير . حيث يستعملون شعره .

**٢٥٤٤٠ - ماعز** *Miauler (F). To mew (E).* ماع النور : ماء ومنا .

**٢٥٤٤١ - ماعز** *Polycarpique (F). Polycarpic (E).* ماعل م . ماعلة نعت تعريفي يطلق على كل ليات ممر يزهو ويشمر اكثر من مرة في الحول .

**٢٥٤٤٢ - ماعطوط** *Vermicide (F).* هو كل مادة تستعمل للقضاء على الديدان .

**٢٥٤٤٣ - ماقبل الحيوان** *Protérozoïque (F). Proterozoic (E).* اسم يطلق على الحقبة الثالثة من اياج ما قبل الكمبري ؛ ذلك لان آثار المتحمرات والاحافير المكتشفة حتى الآن ، بتلاصقة الى المداور الجيولوجية المعروفة ، تنفي وجود حياة حيوانية حتى اواخر هذه الحقبة .

**٢٥٤٤٤ - ماقبل الكمبري** *Précambrien (F). Precambrian (E).* اسم يطلق على الاباج البدائي من تاريخ تكوين ضفور الارض . وهذا الاباج الطويل الاسد الذي تم فيه تنفيذ الصخور ، والذي يمثل خسة اسداس حجر الارض ، يقسم الى ثلاث حقبة - حقبة التكوين ثم الحقبة السميقة ثم حقبة ما قبل الحيوان . راجع حياة .

**٢٥٤٤٥ - ماقية** *Masckie (S). Masckie (F).* نبات معقود التصريف على اسم البستاني الروسي « ماسك » (١٨٢٧-١٨٨٦) وهي شجرة برية وحدانية الجنس والنوع من فصيلة القرنيات . ساقها تملو من ٥ الى ١٥ م . خشبها صلب المود اسمر اللون . اوراقها عابلة ، مركبة ،

Rouleur (F). Roll (E). **٢٥٤٤٢ - مَالِي**  
المالي والملق: محدلة أسطوانية تستعمل في حذل التربة  
أو تحليتها. راسع ملامسة.

Propriétaire (F). **٢٥٤٤٣ - مَالِك**  
Proprietor, Owner, Holder (E).  
هو الذي له حق الملكية.

Héron (F). Heron (E). **٢٥٤٤٤ - مَالِكُ الْخَرْتَرِين**  
هو البيلشون - أطلبه.

Courtlière (F). Mole-cricket (E). **٢٥٤٤٥ - مَالُوش**  
حشرة مذيبة تدعى الحالوش والمعنجرس، أطلبها.

Mammoth **٢٥٤٤٦ - مَامُوث**  
هو الصناجة - أطلبها.

Glaucium (S). **٢٥٤٤٧ - مَامِيصًا & مَمِيصًا**  
Glaucia, Glaucière (F).  
جنس نباتات عشبية من فصيلة الخشخاشيات. أنواعه  
قليلة منها الحولية والممرسة، أوراقها حاشنة، متعاقبة،  
كبيرة اللثة مقرصة. أزهارها كبيرة الحجم، فردية التجميع.  
ثمارها حقية. بزورها دهنية يستخرج منها مادة زيتية  
عادمة الغلواض تستعمل في الطب كزيت الخشخاش.  
وهو ينفع من السحمة والرطوبات واسترخاء الجفن وضعف  
البصر كحلا، والارام واللفاسل الحادة طلاء ويقطع  
الدم والاسهال مطلقاً. وجهه يسمن جداً وهو يفسد الطعام  
ويصلحه للزور.

**٢٥٤٤٨ - مَامِيصًا حَمْرَاء \* & خَشَخَاش فِينِيقي**  
Glaucium corniculatum (S). Glaucia cornue, G. à fleurs rouges, Glaucienne (F). Red horned poppy (E). Roter Hornmohn (D). Papavero cornuto piccolo (I).  
نوع من الماميشا الحولية ساقها مليئة للحاء تملحو من ٥ سم.  
أزهارها حمراء اللون، كبيرة اللثة، قطرها نحو ٥ سم.  
ثمارها مبرعة الخسف، حقية الشكل، تطلو من ١٠ إلى  
٣٠ سم. || تزود قترين ولاستفراج للزيت من بزورها.  
أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

**٢٥٤٤٩ - مَامِيصًا صَفْرَاء \* & خَشَخَاش مَقْرَن**  
Glaucium flavum (S). Glaucia jaune, G. à fleurs jaunes, Pavot cornu (F). Sea poppy, Yellow horned poppy (E). Gelber hornmohn (D). Papavero cornuto giallo, P. marino, Parallo (I).  
نوع من الماميشا الحولية. ساقها مرطاة تملو من ٥٠ إلى  
١٠٠ سم. أزهارها إلى الصفراء المذهب. قطرها يراوح من  
٦ إلى ٨ سم. سفها مقوس الشكل يطول من ١٥ إلى  
٣٠ سم. || ترطب في السواحل الرملية. تزود قترين  
ولاستفراج للزيت من بزورها || أزهارها يستمر من  
حزيران إلى آب || الماميشا الصفراء شديدة الرائحة والمرارة،  
قابضة، كانت تستعمل في الإكحال، وتصير زهرها قطرة  
للبثور.

**٢٥٤٥٠ - مَامِيرَان**  
Curcuma (F).  
أطلب كركم صباغي.

**٢٥٤٥١ - مَامِيرَان صَغِير**  
Renoncula ficaroides (F).  
هو الخوذان النثي، أطلبه.

**٢٥٤٥٢ - مَان**  
هو اللزحمان، أطلبه.

٥٥٠، وذنبه ٥٥٥. ثوبه إلى الكهبة الخضراء يملوها مواج  
اسمر. وجهه وأذناه ويده إلى السمرة الغامقة || جماعته  
تعد من ١٢ إلى ٥٠.

**٢٥٤٣٢ - مَآكَكَ مَسْتَوِج \***  
Macacus pileatus (S).  
Macaque couronné (F).

موطنه جزيرة سرنديب. يألف الغابات الكثيفة وينزو  
الحقول والحدائق. جسمه ربع الوجة، طولُه نحو ٥٠ سم.  
وذنبه ٥٥ سم. ثوبه إلى الصبغة الصفانية. بطنه وباطن  
قوائم إلى البياض الأثير. حنار جبهته منتصب الشعر،  
تأسي الشكل، جماعته تعد من ١٠ إلى ٢٥.

**٢٥٤٣٣ - مَآكَكَ مَسِين \***  
Macacus nemestrinus (S). Macaque maimon, Singe-  
cochon (F). Pig tailed macaque (E).

موطنه برمانيه وبلق وجزر الزابج. جسمه يطول نحو  
٤٦ سم. ويرتفع ٤٠ سم. رأسه مخروطي الشكل، مستطيل  
العلم. قوائمه قوية وغلظية، ذنبه مقوس يطول نحو  
١٨ سم. ثوبه إلى السمرة يمتزج مع اقترابه من ثوب الظهر.

**٢٥٤٣٤ - مَآكُول**  
Comestible (F).  
Edible, Eatable (E).  
هو الصالح للأكل.

**٢٥٤٣٥ - مَآكُون \***  
Ovicida  
الماكُون هو كل دواء يقضي حسل مكن الحشرات &  
ج. موكين.

**٢٥٤٣٦ - مَآيَكِي**  
Aristotelia macqui (S).  
Maqui de Chili (F).

نوع من الأريستوتيلية، جنسية زراعية من فصيلة  
الزيتونيات. ساقها منتصبة تملو نحو ثلاثة أمتار.  
أغصانها حرة الساق. أوراقها أليفة، متعاقبة، بيضيه  
التصال اللامعة المسنة الخفاف، تطلو من ٦ إلى ١٢ سم.  
وتعمر من ٣ إلى ٦ سم. أزهارها عرقدية التجميع،  
محوري الارتكاز. أزهارها صغيرة، بيضاء اللون، ثمارها  
عنبية أبيضوانية اللون مأكولة تنبت من المرطبات اللتافة.

**٢٥٤٣٧ - مَآكِينَة**  
Machine (F).  
Machine, Engine (E).

كل جهاز آلي هدفه الاقتصاد يدعى مآكينة. لذلك  
فالماكينات كثيرة المند أشهرها الصناعية والكهربية والزراعية  
والتجارية.

**٢٥٤٣٨ - مَال**  
Biens (F). Weals (E).  
المال ما ملكته من جميع الاشياء. يقال هو المال وهي  
المال. قال الشاعر:  
والمال تلدي بقاوم ذوي حسب

**٢٥٤٣٩ - مَالَات**  
Malate  
ملح حفص التلخاف.

**٢٥٤٤٠ - مَالَيْن**  
Maltine (F).  
هي الملتين، أطلبها.

**٢٥٤٤١ - مَالَكَة \***  
Bloccnose (F). Bloccnosa (E).  
منج سلكي تتبته بعض الحشرات في كامل دورتها  
الحياتية أو في جزء منها.



مأكلك خالع



مأكلك متوج



مأكلك مسين



ماميشا حمراء



ماميشا صفراء

وغاباتها || تصين بحمال وفسال اذنان الذكور وبقلة الطيران وبسرعة الملو . سوتها متحدة الارتفاع . اصابعها نشيطة . غخالها جالسة || اعرف اجناسها واشهرها المانور والعرطون .

Mahogon (F).

٢٥٤٦٠ - مأكون

هو الأكاجو ، اطلبه .

Mahonia (S).

٢٥٤٦١ - مأكونيه

Mahonia, Mahonie (F). Mahonia (E).

جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة البرباريسيات . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها زراعي وثري . اوراقها ابيدة مركبة . وريقتها وثرية المدد ، متشاربة الحافة . ازهارها متفردة التجميع ، صفراء اللون ، مستحبة الكرنف . ثمارها ثنوية الشكل ، باذنجانية اللون ، مأكولة وثرية || اعرف انواعها واشهرها ما لي .

٢٥٤٦٢ - مأكونيه بهنبيه الورق

Mahonia aquifolium (S). Mahonia à feuilles de houx (F).

جنس سرقية تملو من ٧٥ الى ٢٠٠ سم . وريقات اوراقها بيضا الشكل تملو من ٣ الى ٩ ، نصلها ضيق الصلصة الثلاثة المستطيلة . ازهارها الى الصفرة الموشة بالاحمر . حناقتها الزهرية تطول من ٨ الى ١٠ سم . || ازهارها يستمر طوال شهر اذار .

٢٥٤٦٣ - مأكونيه حزنية

Mahonia pinnata, M. fascicularis (S). Mahonia fasciculé (F).

جنس سرقية قمره تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . وريقات اوراقها تملو من ٧ الى ١٣ ، نصلها بيضا الشكل ، جامد التسنين الثالث . حناقتها الزهرية كيفية التجميع تطول نحو ٨ سم . ازهارها صغيرة القند صفراء اللون || ازهارها يستمر طوال شهر ايار .

٢٥٤٦٤ - مأكونيه ربابية العروق

Mahonia nervosa (S). Mahonia nervé (F).

بجلة سرقية مثقوبة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . وريقات اوراقها تملو من ٩ الى ١٧ ، نصلها باهت اخضر باهتي العروق البارزة . حناقتها الزهرية تطول من ١٠ الى ٢٠ سم . ازهارها الى الصفار الكبيرتي || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٤٦٥ - مأكونيه مدادة

Mahonia repens (S). Mahonia rampant (F).

بجلة وكوبية مدادة تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم . وريقات اوراقها تملو من ٣ الى ٧ ، نصلها بيضا الشكل ، مغزوم القاعة ، بحري الصفحة الباعدة اللثة . ازهارها الى الصفرة السوية || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٤٦٦ - مأكونيه نباتية

Mahonia nepalensis (S). Mahonia du Népal (F).

جنس سرقية شائعة تملو من ٣ الى ٥ امتار . وريقات اوراقها تملو من ١١ الى ٢٥ ، نصلها ضيق الصلصة ، جبل الصغار اللامع . حناقتها الزهرية تطول نحو ٣٠ سم . ازهارها كبيرة القند بجلة الصفار المنحب || ازهارها يستمر طوال فصل الربيع .

Pangolin (F).

٢٥٤٥٣ - مأكس

جنس حيوانات لبونة من الدرد . اسمها الشائع ام قرق . اما مأكس فهو ترجمة الاسم العلمي .

Fore (F).

٢٥٤٥٤ - مانع

نمت تعريبي يعلق كل تبغ يتحل بسورة مائة مركزها التستيني دون العالفة ولفق الناطقة .

Empêchement (F). Hindrance (E). مانع

عائق يحول دون الجاز عمل ما كازواج مثلاً وذلك لانعدام احدي الشرائط القانونية المطلوبة . والمانع قد يكون :

مانع حائل Empêchement prohibitif (F). Prohibitive hindrance (E).

مانع معطل مانع فاسخ Empêchement dirimant (F). Invalidating impediments (E).

Menura (S). مأكور

Menure, Oiseau-lyre (F). Menura, lyre-bird (E).

جنس طير من فصيلة المانوريات . انواعه المعروفة ثلاثة : اعطائها بلاد استرالية حيث تالف المراج والغابات || اجسامها متوسطة القند . مناقدها قوية ، قليلة الاحديداب والتسنين . اجنحتها قصيرة . ارسافها متوسطة الطول حبيبة البشرة . ازقادها جرداء || ذكورها كبيرة الاذناب القيشارية الشكل . انثاهما ماعدة الزينة . اما انواعها الثلاثة المعروفة فهي :

مانور ألبرتي Menura Alberti (S).

مانور لكتوريا Menura Victorise (S).

مانور ميلون Menura superba (S).

نخص منها بالوصف المانور المبلول ، اطلبه .

٢٥٤٥٧ - مأكور مبدل ، مأكور أليق

طائر القيشارة الأليق

Menura superba (S). Menure commun, M. superba, Oiseau-lyre superba (F).

نوع من المانور . مهد اجراج استرالية . جسم الذكر يطول نحو ٤٥ سم . وذنبه ٦٠ سم . جسم الانثى ، بما فيه اللتب ، لا يتجاوز ٩٠ سم . || ثوبه الى الوردية الخطية العائقة ، اخفيك جردوي المراج . ذرون احمر . يطه الى الوردية القرمزية . قوادمه واباهر وسناكه الى السمرة الخطية الحمره المراج . ذنبه قيثاري الشكل لونه الى السمرة الخطية المبيضة بالوردية القصبية . ثوب الانثى داكن الالوان الغليظة الزمراء || يألف الاجراج التي تتخللها الصغور والاراضي الملائسة ، يردد جميع اصوات الطير والحيوان وينها الملو والتنباع || قوي الحشرات والديدان يلتغتها ابناً كانت وفي الجلالة التراكمة || يدخن حش في الادغال او في الاجراج الممتدة الشابة على اسمن الادوية . حشنته بيغة واحدة ترخها الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها البناء .

Blade (F). مأكوري

سمكة بحرية تدمي حنجرية ، اطلها .

Manuridae (S). مأكوريات

Manuridae (F). Manuridae (E).

فصيلة طير من الجرايم لاقتفات النبل وريقات اللداتير . اجناسها وانواعها قليلة المدد . اعطائها جبال استرالية



مانور ميلون



مأكونيه

- Râperie (F). **مَبْرَشَة** ٢٥٤٨٤  
معمل لبرش الجذور وتقطيعها أو سحقها .
- Orangerie (F). **مَبْرَكَة** ٢٥٤٨٥  
Orangery (E). هي بستان البرتقال .
- Sardine (petite) (F). **مَبْرُوم** ٢٥٤٨٦  
Pilchard (small) (E). المبروم السردين الصغير لا يتجاوز طوله ٥ سم .
- Porte-graines (F). **مَبْرُورَة** ٢٥٤٨٧  
هي البزرة ما يزرع من البقول ويختلف النباتات العشبية للمصنوع على يزرعها . ج. مبررات و بزارى .
- ٢٥٤٨٨ - **مَبْرُورَة**  
المبسورة أو القدم المبسوطة نجم ثمر من كوكبية برج التوأمين  
مركزه على الركبة اليسرى من التوأمين المتقدم .
- Omnivore (F). **مَبْشَار** ٢٥٤٨٩  
Omnivorous (E). نمت تعريفي يطلق على كل حيوان قوته اللحم والنبات .
- Racle (F). Scraper (E). **مَبْشَرَة** ٢٥٤٩٠  
Oignonière (F). Onionbed (E). **مَبْشَرَة** ٢٥٤٩١  
هي حقل البصل .
- Canardière (F). **مَبْشَرِي** ٢٥٤٩٢  
Duck-pond (E). غدير شمس ياليط أو غدير حضير لصيد البط البري .
- Melonnière (F). **مَبْطَحَة** ٢٥٤٩٣  
المبطحة حقل التفاح .
- Culture de pastèque (F). **مَبْطَحَة** ٢٥٤٩٤  
هي حقل البطيخ .
- Jardin potager (F). **مَبْطَحَة** ٢٥٤٩٥  
Kitchen-garden (E). هي البستان الممد لزراعة الخضار .
- ٢٥٤٩٦ - **مَبْطَحَة** ، **مَبْطَحَة** ، **مَبْطَحَة**  
Hatif, Précoce (F). Early, Precocious, Forward (E). صفة النبات السريع النمو والقريب الإدراك .
- Drosomètre (F). **مَبْطَل** ٢٥٤٩٧  
Drosometer (E). الميلاط جهاز يستعمل في قياس ما يسقط من سدى وئدى  
في وقت معين ؟ غالباً من الغروب الى الشروق .
- ٢٥٤٩٨ - **مَبْطَل**  
Accrescent نمت تعريفي توصف به مختلف أعضاء الزهرة ، دون  
المبيض ، التي تتابع نموها بعد الإخصاب .
- Houssale (F). **مَبْطَحَة** ، **مَبْطَحَة** ٢٥٤٩٩  
Holly-grove (E). منبت البشيرة .
- Mabouya ponctué ٢٥٥٠٠ - **مَبُونِيَّة مُنْقَطَعَة**  
هي الحكاة المنقطعة ، المطبأ .

- Mahonia japonica (S). **مَاهُونِيَّة يَابَانِيَّة** ٢٥٤٩٧  
Mahonia du Japon (F). جنبة سروية فرعا، تملو من ٢٥٠ الى ٣٠٠ سم. وريقات  
أوراقها تمد من ٩ الى ١٩ نصلها غيبق الصفحة، ضرب  
الزام الاخضر، يطول نحو ١٢ سم. حنايقها الزهرية معتدلة  
الكثافة تطول نحو ١٥ سم. أزهارها متوسطة القد جميلة  
الصغار الزاهي . أزهارها يستمر من أيار الى حزيران .
- ٢٥٤٩٨ - **مَاهُونِيَّة**  
Métaphysique (F). هي الميتافيزيك ، أطلبا .  
Metaphysics (E).
- ٢٥٤٩٩ - **مَالِج**  
Liquide (F). Liquid (E).
- ٢٥٥٠٠ - **مَالِي**  
Hydraulique (F). Hydraulic (E).
- ٢٥٥٠١ - **مَالِي**  
Ruche (F). Hive (E). النحلة والكورة والغدير هي مأوى للنحل .
- ٢٥٥٠٢ - **مَالِي**  
Guâpier (F). هي خلية الزناير .  
Wasps' nest (E).
- ٢٥٥٠٣ - **مَالِي**  
Coéchangiste, Copermutant (F). Permutant (E). هو احد الطرفين في عقد الدبل أو المقايضة .
- ٢٥٥٠٤ - **مَالِي**  
Réciprocité (F). Reciprocity (E). هي الاتفاق على موضوع معين .
- ٢٥٥٠٥ - **مَالِي**  
Concours (F). Concourse (E). هو الاشتراك في عقد قانوني .
- ٢٥٥٠٦ - **مَالِي**  
Concours agricoles (F). Cattle show (E). مسابقات تقويمها الحكومة أو الجعيرات والتعاونيات الزراعية  
توزع فيها الجوائز المالية والشهادات. وهي تتناول الحيوانات  
والانتاج والمصنوعات والآلات الخ... الناية منها تشجيع  
الزراعة بساتير فرمها وتنشيط الجودة والاتقان .
- ٢٥٥٠٧ - **مَالِي**  
Cisailles (F). **مَالِي** ، **مَالِي**  
Shears, Clipper (E). مقص كبير يستعمل في جز الخضر وبتر الانثان الزائدة  
في جنبات وأجبار الزايرين .
- ٢٥٥٠٨ - **مَالِي**  
Evaporimètre (F). **مَالِي**  
Evaporimeter (E). مقياس القوة المبصرة في الجو .
- ٢٥٥٠٩ - **مَالِي**  
Convertible **مَالِي**
- ٢٥٥١٠ - **مَالِي**  
Semoir (F). آلة تستعمل في نثر البذار أو الإسمدة .  
Seed-bag, Sowing-machine, Drill (E).
- ٢٥٥١١ - **مَالِي**  
Cténoides (F). Ctenoïde (E). نمت تعريفي يطلق على الاجسام التي تملو أطرافها الطليقة  
بعض الأهداب للربة الشائكة كما في بعض الاسماك .
- ٢٥٥١٢ - **مَالِي** ، **مَالِي**  
Fulgurimètre (F). **مَالِي** ، **مَالِي**  
Fulgurimeter (E). مقياس قوة الكهرباء الجوية .
- ٢٥٥١٣ - **مَالِي**  
Râpe (F). Grater, Rasp (E). آلة تبرش الجذور السقولية كالشوندر والجوزر...



مِرْشَ حَرْشَة الفَرْخ





مناع

Divergent ٢٥٥١٥ - مُتَبَاعِدٌ ، قَبَاعِدِي  
ما كان مختلف الاتجاه .

Dissemblable (F).  
Dissimilar (E).

٢٥٥١٦ - مُتَبَايِن

Volatil (F), Volatile (E).

٢٥٥١٧ - مُتَبَيِّر

Fissuré (F), Cracked (E).

٢٥٥١٨ - مُتَبَدِّح

Dispersé (F), Scattered (E).

٢٥٥١٩ - مُتَبَشِّر

Toupetière (F).

٢٥٥٢٠ - مُتَبَقَّة

كل تربة تزرع تباً عدة سنوات متتابة . ج مناع ،  
والذي يتصلب لزراعة التبغ يلعب تبالاً .  
٢٥٥٢١ - مُتَبَكَّة ، لِيَان (F), Hayloft (E).  
مقبة لحفظ الخنثى والبن .

٢٥٥٢٢ - مُتَبَاكَّة الأجنحة

Homopters (S), Homoptères (F), Homopters (E).  
رتبة حشرات من طبقة نصفيات الجناح . فصائلها وأنواعها  
عديدة مظهرها صغير القدر بمنح وبشفا حدم الجناح .  
تطورها تدريجي . أعضائها ثاقبة مامة تمكها من ارتفاع  
السح . أشهر فصائلها الأرقيات والحمايط والغفريرات  
والزيريات ...

Pondre (F).

٢٥٥٢٣ - مُتَبَّح ، مَسْرًا ، باض

To lay (E).

يقال باض الطير وسراً السلك ويتح الحشرات .

Endosmômetre (F).

٢٥٥٢٤ - مُتَبَحِّل

Endosmometer (E).

مقياس التماسك أو التناقد .

Fossiles (F), Fossils (E).

٢٥٥٢٥ - مُتَبَحِّرَات

هي الأساطير ، المظالم .

Homofocal

٢٥٥٢٦ - مُتَبَحِّد البؤرة

Monadelph (F).

٢٥٥٢٧ - مُتَبَحِّد الخوايطات

Monadelphous (E).

٢٥٥٢٨ - مُتَبَحِّد المركز ، مُشْتَرَك المركز

Concentrique (F), Concentric (E).

٢٥٥٢٩ - مُتَبَحِّد التصلبات ، مُتَبَحِّد الكأسيات

Gamosepale (F), Gamosepalous (E).

صفة الزهرة الملتصقة الفصولات الكأسية .

٢٥٥٣٠ - مُتَبَحِّد التصلبات ، مُتَبَحِّد

التويجات ، مُتَبَحِّد التصلبات

Gamopétale (F), Gamopetalous (E).

صفة الزهرة الملتصقة القلمات أي التويجات والبلات .

٢٥٥٣١ - مُتَبَحِّل

Réductible (F), Reducible (E).

مكن تحليلة .

Acidifiable (F).

٢٥٥٣٢ - مُتَبَحِّض

نعت ترميضي يطلق على كل مادة قابلة التعميض .

Focométra (F), Focometer (E). ٢٥٥٠١ - مِيقْتَر  
جهاز يستعمل لتحديد المسافة البؤرية .

Cellier (F).

٢٥٥٠٢ - مِيقْتَرَة

Cellar, Store-room (E).

Diagramme (F), Diagram (E).

٢٥٥٠٣ - مِيقْتَان

هو البيلال ، المظلم .

Léthifère (F).

٢٥٥٠٤ - مِيقِيْد ، مِيقِيْت

Lethiferous, Deadly (E).

نعت ترميضي يطلق على المصارات النباتية والادوية الحاشورية  
التي تقتضي على الحياة .

Ovaire (F), Ovary (E).

٢٥٥٠٥ - مِيقِيض

المبيض في الحيوان هو العضو الذي يتكون فيه البيض  
أو البويضات || والمبيض في النبات هو الجزء الأسفل  
المتفخ من الملقح ، يحوي من بويضة الى عدة بويضات  
ويصير ثمرة بعد الانغاص .

Mûrserie, Mûrserie (F).

٢٥٥٠٦ - مِيقَانَة

Mulberry plantation (E).

بستان التوت .

Odômetre (F), Odometer (E).

٢٥٥٠٧ - مِيقَار

آلة تقاس بها المسافة .

Gynécée (F).

٢٥٥٠٨ - مِيقَاع \* ، وكرِيم

Gynaeceum (E).

هو مجموع أعضاء التأنيث في الزهرة وهو مؤلف من المبيض  
يطولو قلم انبوي ينتهي بالمققة .

Métaldéhyde (F).

٢٥٥٠٩ - مِيقَالِدِهِيْد

Metaldehyde (E).

مادة كبريتية فائقة تستعمل في القضاء على جميع أنواع  
الرضويات التي تركب المزروعات . تحضر بمعدل ٥ %  
وليس أكثر مزوجة بالبخالة أو بخشارة الخشب وتنتشر على  
الترية حيث الحظرون والبراق وغيرها تقتضي عليها جميعها .

٢٥٥١٠ - مِيقَان

ما بين كل مودين .

Méthane (F), Marsh gas (E).

٢٥٥١١ - مِيقَان ، مِيقَان

غاز ملتبس عديم اللون .

Phaneroptera falcata (S).

٢٥٥١٢ - مِيقَان \* ٥

Phanéroptère (F).

حشرة من الجنادب ولصيلة القبريطيات . جسمها صغير  
القد ، أخضر الزنوب ، أسمر النشفة والشفة ، يطول عند  
الذكور من ١٢ الى ١٥ سم . ويطول عند الإناث من ١٦  
الى ١٨ سم . جناحها بطولان من ٢٥ الى ٢٣ سم . وبتأطاها  
من ١٨ الى ٢٢ . مرز الاثى غليظ الحجم أسمن الشكل  
يميل الطرف المستقيم بطول من ٥ الى ٦ سم . || اناتها  
تحتج السرة في حمار الاوراق والمصنف داخل اللون فينفذ  
من يد نومة تنرود حافة التصل قبل أن تستكن من السير  
والنشد .

Consistance (F), Consistance (E).

٢٥٥١٣ - مِيقَانَة

Figuerie (F).

٢٥٥١٤ - مِيقَانَة

المثانة كرم التين أو المكان الذي تكثر فيه الجهار التين .



منان

انواعها المعروفة قليلة المدد اعطائها بعض مناطق المحيط الهادي . تعيش عل الصخور المنصورة قرب الشطوط || اصدانها شبه هرية الشكل وحيدة المصارع . سقاط اصدانها يتطور مع العمر ويصبح كالنصوة . اجسامها مخروطية . رؤوسها شبه اسطوانية . ميزانها قاعدية . لراسها انبوية قليلة الاستطالة . خياشيمها نظامية . ارجلها وحيدة مبطلة .

Isométrique (F). **مُتَسَاوِي الأبعاد** ٢٥٥٤٨  
Isometric (E).

Isotrope (F). **مُتَسَاوِي الاتجاه** ٢٥٥٤٩  
Isotropic (E).

Equilatéral (F). **مُتَسَاوِي الأضلاع** ٢٥٥٥٠  
Equilateral (E).

Equidistant **مُتَسَاوِي البُعد** ٢٥٥٥١

Equilangle, isogonex (F). **مُتَسَاوِي الزوايا** ٢٥٥٥٢  
Equiangular (E).

Isomorphe (F). **مُتَسَاوِي الشكل** ٢٥٥٥٣  
Isomorphic (E).

Isobare (F). **مُتَسَاوِي الضغط** ٢٥٥٥٤  
Isobaric (E).

Isocèle (F). **مُتَسَاوِي الضلعين** ٢٥٥٥٥  
Isosceles (E).

Isodynamique (F). **مُتَسَاوِي القوة** ٢٥٥٥٦  
Isodynamic (E).

Isopoda (S). **مُتَسَاوِيات الأرجل** ٢٥٥٥٧  
Isopodes (F). Isopods (E). Asellin (D).  
رتبة حيوانات من القشريات .

Grimpeurs (F). **مُتَسَلِّقات** ٢٥٥٥٨  
Climbers (E).

رتبة من الجورجيات طيورها صغيرة القد أو متوسطة تتميز بتسلقها الاشجار . فصائلها عديدة اشهرها البيضاوات والبقايات والطرفونيات والطوقانيات والقهقريوات والبقايات .

Grimpante (F). **مُتَسَلِّقة** ٢٥٥٥٩  
Climbing, Twining (E).

النباتات المتسلقة والماربية التي تنبجس سوقها حسن الانتصاب يكون هائل .

Accipiens **مُتَسَلِّم** ٢٥٥٦٠  
للمسلم أو القايض هو من يقبض المفرد عليه او الملكية .

Homologue (F). Homologous (E). **مُتَسَاوِيَة ، مُتَسَاوِيَة ، مُتَسَاوِيَة** ٢٥٥٦١

Isomère (F). **مُتَسَاوِيَة الأجزاء** ٢٥٥٦٢  
Isomeric (E).

Isotopie (F). **مُتَسَاوِيَة الخواص** ٢٥٥٦٣  
Isotopic (E).

Démagogue (F). **مُتَشَرِّع** ٢٥٥٦٤  
Demagogue (E).

المُتَشَرِّع من يتظاهر بخدمة الشعب لامتلائه اليه .

Lézardé (F). **مُتَشَقِّق ، مُتَشَدِّع** ٢٥٥٦٥  
Cracked (E).

Converti (F). Converted (E). **مُتَحَوِّل** ٢٥٥٣٣

٢٥٥٣٤ **مُتَحَوِّل**  
متح الجراد : اذا رز ذنبه وغرزه ليبيض .

Hibernant (F). Hibernating (E). **مُتَحَدِّر** ٢٥٥٣٥  
صفة الحيوان الذي يبيت زمن الشتاء متحدرًا باستمرار النوم .

Catoptéropes (F). **مُتَحَدِّيات** ٢٥٥٣٦  
Catoptopa (E).

لة من القشريات عشاريات الارجل تنتمي الى مرتبة فصار الذيل || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة المدد . اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة القد أو متوسطه . تتميز بدروعها شبه المربعة والقليلة الاصداب .

Intercalaire (F). Intercalary (E). **مُتَحَدِّل** ٢٥٥٣٧  
صفة الاشياء المتخلطة . راجع بيني .

Interlobaire (F). **مُتَحَدِّل الفصوص** ٢٥٥٣٨  
Interlobular (E).

Adaptation **مُتَد** ٢٥٥٣٩  
هو الالتيا والازلاب .

Mètre (F). Metre (E). **مُتَر** ٢٥٥٤٠  
وحدة قياسية وضمتها الثورة الفرنسية وقد شاع استعمالها الآن في جميع اقطار العالم باستثناء البلاد الانكليزية والامريكية || يعتبر طول المتر مساويًا لجزء واحد من المشرقة ملاين جزء التي تولدت زام الحاضرة أو المسافة بين القطب وسط الاستواء || اجزاء المتر هي السيمتر اي عشر المتر ، والسنتيمتر اي جزء من متر ، والميليمتر اي جزء من ألف . اما مضاعفات المتر فهي الديكاسمتر اي عشرة امتار والميكرومتر اي مائة متر والميكرومتر اي ألف متر .

Métrier (F). To measure (E). **مُتَر** ٢٥٥٤١  
قاس بالمتر .

Centiare, Mètre carré (F). **مُتَر مَرِيع** ٢٥٥٤٢  
Hundredth part of an are (E).

وحدة مساحة قياسها الطولي والعرضي متر واحد .

Mètre cube (F). **مُتَر مَكْمَب** ٢٥٥٤٣  
Cubic meter (E).

وحدة حجمية قياسها الطولي والعرضي والارتفاعي متر واحد .

٢٥٥٤٤ **مُتَوَاقِع**  
نعت تعريبي يطلق على كل حلوب من بقرة ونمجة وصُر ولانة ينقطع دودا بسرعة . تقول بقرة متوآق . ج متوآق .

Conjugué (F). **مُتَوَاقِع ، مُتَوَاقِع** ٢٥٥٤٥  
Conjugata (E).

٢٥٥٤٦ **مُتَوَاقِعَات الأسنان**  
Opotérodontes, Typhlopidae (F). Typhlopidae (E).  
مرتبة من الحيات تكون أسنانها إما في الفك الاصل أو في الفك الاسفل .

٢٥٥٤٧ **مُتَوَاقِعَة** \*  
Mitrularia (S).

Mitrularia (F). Mitrularia (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرغويات مبدئات الارجل اماميات الخياشيم وحيوانات الاجهزة وعضلية المينيسيات .



مترولة

٢٥٥٦٦ - مُتَصَرِّف (F). Settlor (E).  
هو من يملك الثبر تبرعاً سواء بجهة في حياته أم بواسطة  
بعد وفاته .

٢٥٥٦٧ - مُتَصَلِّب ، عَرِين °  
Sclérophyte (F).  
Sclerophyte (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل نبات أوراقه صرورة جامدة  
الصلل الثخين .

٢٥٥٦٨ - مُتَمَثِّلَات °  
Rudistes (F).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات فصليحيات الخياشيم  
عادات الرخوس || أجناسها وأزواجها المروفة عديدة ،  
جميعها من متحجرات الأبالج الثاني . من ميزاتها سماكة  
الإسداق والتفارت البين في مصاريها وأحجامها ||  
اعرف أجناسها وأشهرها الخلمة .

٢٥٥٦٩ - مُتَعَارِف  
Axiome (F). Axiom (E).  
٢٥٥٧٠ - مُتَعَمِّيات  
Organismes (F).  
Organisme (E).  
٢٥٥٧١ - مُتَعَهَّد  
Soumissionnaire (F).  
Tenderer (E).  
الشهد المتكفل بأجراء أمر .

٢٥٥٧٢ - مُتَعَهَّد هو الملتزم أو المقاول .  
٢٥٥٧٣ - مُتَعَهَّد إِذْنُ التَّسَلُّم  
Fillériste (F).  
هو الذي يتعهد تداول الإذن من يأتى إلى آخر ثم يسوي  
الحسايات التي استرجعها هذه البرع .

٢٥٥٧٤ - مُتَفَحَّجَة  
Pommerale (F).  
Apple-orchard (E).  
في يستأن التفتح .

٢٥٥٧٥ - مُتَقَبَّل ، مَعْبَان  
Tâcheron (F).  
One working by the job (E).  
عامل أجرته منوط بما يقوم به من عمل .

٢٥٥٧٦ - مُتَقَطَّع  
Discontinú (F).  
Discontinuos (E).  
هو الذي لا يستمر على حال .

٢٥٥٧٧ - مَتَك °  
Anchère (F). Anther (E).  
هو في النباتات الجزء العلوي من النضو الذكري في الزهرة .  
راجع التثيرة .

٢٥٥٧٨ - مَتَكَّة  
Rostre (F). Rostrum (E).  
هو في الخشرة مقدم الرأس عندما يكون على شكل الجلم .  
وعو الأترج أو الكباد .

٢٥٥٧٩ - مَتَكِّي °  
Staminé (F). Stamine (E).  
صفة الإزهار الوسيطة التي المهززة بسداة ويشير أي متك .

٢٥٥٨٠ - مَتَلَاعِمِ التَّمَار  
Gymnocarpe (F).  
Gymnocarpus (E).  
٢٥٥٨١ - مَتَلَام °  
Billonneur (F). Ridger (E).  
محرث ذو مقلين يقلبان التراب بجمّة ويساراً فنصح  
الزراعة .

٢٥٥٨٢ - مَتَنَابِب عَكْسًا  
Inversement proportionnel (F). Proportional inversely (E).  
٢٥٥٨٣ - مَتَنَلُون  
Multicolore (F). Multicolour (E).  
كثير الألوان المختلفة .

٢٥٥٨٤ - مَتَنَالِيل  
Amétole, Homomorpha (F).  
نمت تعريفي يطلق في علمي الحيوان والنبات على الأعضاء  
أو الأجزاء المتشابهة للشكل .

٢٥٥٨٥ - مَتَنَالِيل الأَجْزَاء  
Métamérisé (F).  
نمت تعريفي توصف به الأجزاء المتأثلة في كامل الجسم  
أو في قسم منه .

٢٥٥٨٦ - مَتَنَالِيل الأصابع  
Homopode (F).  
نمت تعريفي يطلق على كل حيوان أصابعه متأثلة المند  
في قوائم الأربع .

٢٥٥٨٧ - مَتَمَثِّلَات الأَسْنَان °  
Denticèles, Odontocèles (F).  
مرتبة حيوانات بحرية لبونة من رتبة الحويقيات تشمل  
الحيتان من ذوات الأسنان المتأثلة غير قابلة التجديد ||  
أجناسها المروفة ٢٤ تنحسم أربع فصال : الجعلليات  
واللفليقيات والمثريات والفققيات .

٢٥٥٨٨ - مَتَمَسِك ، مُنَدِّج  
Compact  
٢٥٥٨٩ - مَتَمَجَّجَة ، حَزَزُونِيَّة  
Spirille (F).  
Spirillum (E).  
نمت تعريفي شامل يطلق على البكتيريات والميكروبات  
الحيطية الشكل من أي نوع كانت .

٢٥٥٩٠ - مَتَمَكِّب °  
Tropicalisé (F).  
نمت تعريفي يطلق على كل مادة صار أخضاسها إلى  
المقلبة .

٢٥٥٩١ - مَتَمَن  
Châtré (F).  
To castrat, To geld (E).  
مَن الحصان والثور والكيش والنيس ... فح صغسًا  
واستخرج خصصها .

٢٥٥٩٢ - مَتَمَن  
المَن ، ما أرتفع من الأرض واستوى . ولتَن نبات يعرف  
بالأوتيس . ومن اللنة أصولها والفاظها وبفرداتها . ومن  
الكتاب ما جاء فيه دون الشرح والحواشي . ومن العرطن  
جاذتها . ويقال اليوم ركب من طائرة أو باخرة .

٢٥٥٩٣ - مَتَمَنُ الفَرَس  
مَن الفرس نجم نير من كوكبة نجوم الفرس الاعظم .

٢٥٥٩٤ - مَتَمَسَاب طَرْدًا  
Directement proportionnel (F). Proportional directly (E).  
٢٥٥٩٥ - مَتَمَسَاب عَكْسًا  
Inversement proportionnel (F). Proportional inversely (E).



متك



متلام

دون سواها . تدن في تجاويف الاشجار . انثاها تبيض مرتين في العام ، المرة الاولى في اواخر اذار والثانية في اواسط حزيران . ذكورها تقتناب مع انثاها في حضان البيض الذي يستمر نحو اسبوعين .

**٢٥٦١١ - مَتَوَكِّل الغاب (S). Certhia familiaris (S). Grimpeur des bois (F). Tree-Creeper (E).**

طائر من المتقنلات . اطلاله تشمل الشرق الاود واروبه . يأنف المناطق الجبلية واصحصا احرار الترنوب والشربين || جسمه صغير انثد بطول نحو ١٤ سم . بسطه نحو ١٦ سم . ثوبه متداخل الالوان . راسه ورداؤه وظهوره وصغره الى الشققة السراء تملعوا رشفة بيضاء . جناحاه جملدان بالابيض . زوره وصدره وبطنه الى البياض الناصي تشوبه مشقة فراء . ذنبه متوسط الطول رتاجي الريش ، اسمر اقلون ، اشجع المواج . متفاده بين الاحديداب اسمر اللون . رساء قصيراتان ضحيتان . غنائه بصيغة ، حادة الاطراف ، سوداء اللون || يأنف معطر احرار الجرد . يتسلق ساق الصجرة حتى لفتة ويرتبي منها الى الارض ثم يتسلق غيرها متقبيا عن الحشرات ويرقاتها ومكثها . طيرانه قصير الشوط وانتقاله على الارض فرصة غرقاء || يثن عشه في تجاويف الاشجار . الانث تبيض مرتين في الدم الاول في اواخر اذار والثانية في اواسط حزيران . الذكر يتناب الانث في حضان البيض الذي يستمر نحو اسبوعين . يبضها حاجي اقلون تملو رشفة جوية تتكاثف عند العقب || قوته الحشرات ويرقاتها ومكثها لذلك فهو من الطيور الجزيلة النفع .

**٢٥٦١٢ - مَتَوَكِّلَات (S). Certhidae (S).**

**Certhidés (F). Certhidae (E).**  
فصيلة طير من الجواثم رقيات المناقير . اجناسها وانواعها عديدة جميعها من الطيور النافعة . قوتها الحشرات .

**٢٥٦١٣ - مَتَوَنِي (S). Métouien (F). Metonic (E).**

من متون (Métou) اسم سلم . تمت تعريفه يطلق على دورة فلكية مدتها ١٩ سنة ، تدعى الدورة المتونية ، يقع بعدها كل من ايام الاسابيع في التاريخ ذاته من الاخير . والدورة المتونية تشمل ٢٣٥ هلة او شهر قري او ٦٩٣٩٧ يوما و ٧٠ ٪ من اليوم .

**٢٥٦١٤ - مَتَبَّاسِر (F). Lévygyre (F). Levogyrate (E).**  
ما كان سطح استقطابه متجها الى اليسار .

**٢٥٦١٥ - مَتَبَّاسِين (F). Dextrogyre (F). Dextrogyre (E).**

ما كان سطح استقطابه متجها الى اليمين .

**٢٥٦١٦ - مَتَبَّزَكَة (S). Mutialis (S). Mutisie (F).**

جلس لياقات جنينية بمصرة عارشة من فصيلة المركيات . انواعها المعروفة ٣٠ اصلها بلاد امريكا الجنوبية . اوراثها متماثلة لا قياسية التركيب منها البسيطة ومنها المركية التي تنتمي بمواقي دقيقة مستطيلة . وريقاتها شائعة متماثلة . ازهارها كبيرة القد متراكبة السيدات الثلاثية التنس . بزورها غروطية مستطيلة تنتمي بقتازع ريشية || اشهر انواعها التزيينية ما يتبع .

**٢٥٥٩٦ - مَتَبَّيَة (F). Sapinière (F). Fir wood, Fir-grove (E).**

مفرس تنوب او حورية تنوب .

**٢٥٥٩٧ - مَتَبَّيَّح (F). Récessif (F). Recessive (E).**  
تمت تعريفه يطلق على الصفات الوراثية المسودة .

**٢٥٥٩٨ - مَتَبَّيَّح (F). Oryx beisa (F).**  
هي الاروخ الافريقي ، اطلبه .

**٢٥٥٩٩ - مَتَبَّيَّحُوج ، مَتَبَّيَّحُوج (F). Hydrogéné (F). Hydrogenated (E).**  
مركب مع الهيدروجين او يحوي بعض الهيدروجين .

**٢٥٦٠٠ - مَتَبَّيَّح (F). Inculpé (F). Défendant, Accused (E).**  
هو من وقع عليه الاتهام .

**٢٥٦٠١ - مَتَوَاكِي ، مَتَوَاكِي (F). Parallèle (F). Parallel (E).**

**٢٥٦٠٢ - مَتَوَاكِي الحَرَاكَة (F). Isotherme (F). Isotherm (E).**  
مطابقة درجة الحرارة في اماكن مختلفة .

**٢٥٦٠٣ - مَتَوَاكِي السَطُوح (F). Parallélopipède, Parallelepiped (F). Parallelepiped (E).**

**٢٥٦٠٤ - مَتَوَاكِي المستطيلات (F). Parallélopipède rectangulaire (F). Rectangular parallelepiped (E).**

**٢٥٦٠٥ - مَتَوَاكِيَة ، مَرَقَاة (F). Progression.**  
قد تكون متوالية حسابية (F). Progression arithmétique (F). Arithmetical progression (E).

**٢٥٦٠٦ - مَتَوَاكِيَة (F). Progression géométrique (F). Geometrical progression (E).**

**٢٥٦٠٦ - مَتَوَاكِيَة (S). Matuta (S). Matute (E).**

جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الأرجل قصيرات الذيل اهرمات وفصيلة الكروليات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة اصصها شواطي البحر الاحمر والمحيط الهندي || اجسامها صغيرة القد رافضة الدروع المملوحة المجهزة بسنين جانبيين كبريين . ارجلها الخلفية والاسامية ملقية الاطراف . ملاقطها كبيرة ونشطة || طوبها كاتعة السند لا تتوكل .

**٢٥٦٠٧ - مَتَوَسَّج ، وَاجِب (F). Doit (F). Debit (E).**  
هو المطلوب من صاحب الحساب .

**٢٥٦٠٨ - مَتَوَسَّط الطول (F). Médoligne (F).**  
تمت تعريفه توصف به بعض سلالات الحيوان والطيور كالتلح والابشار والاشمام والمآذر والنجاج المستدلة الطول .

**٢٥٦٠٩ - مَتَوَسَّط لِسَبِي (F). Moyenne proportionnelle (F). Geometrical mean (E).**

المتوسط النسبي والمتوسط الناسب والمتوسط التناسبي واحد .

**٢٥٦١١ - مَتَوَكِّل (S). Certhia (S). Grimpeur des bois (F). Tree creeper (E).**

جنس طير من فصيلة المتقنلات . انواعها عديدة جميعا نافعة . تألف المناطق الجبلية اصصها الحرجية . قوتها الحشرات



مَتَبَّة



مَتَوَكِّل



مَتَوَكِّل الغاب



مَتَبَّة

levkoje Matthiole (D). Violacciocco (I).

نوع من المكنبولا التريبتية. ضرورها عديدة، جميعها حولية أو حولية تملو من ٣٠ إلى ٨٠ سم. سوقها فراءة. أوراقها بحرية اللون عناقيدها الزهرية كبيرة القند. أزهارها مكبسة مختلفة الألوان يكثر فيها الاخضر والبغيسي. جميعها فواحة العرف المستحب || أزهارها يستمر طوال فصل الربيع.

٢٥٦٢٦ - مَنَكَا المَسَا، هو القرائس.

Emblavement, Emblavage (F). مَنَارَكَة  
Wheat-sowing (E).

هو الخفل وكل مزدوع سمه وكرب ويلد وانير.

Prototype مَنَاطَل  
هو السب، اطلبه.

Vessie (F). Bladder (E). مَنَكانَة، مِيوَكَة  
عضو رئيسي في الجهاز البولي. والثانة تتكون من جراب عضلي يستلني البول ويصممه بعض الوقت.

Fixateur (F). مِغْبَات ٥  
Fixing solution (E).

نمت تعريفي يطلق على كل مادة تتميز بخامسة التثبيت. ج مثابت.

٢٥٦٣١ - مِغْبَاق ٥، مِغْبَاق ٥

Limnimètre, Limnomètre (F). Limnimeter (E).  
جهاز يستعمل في تقدير ارتفاع مستوى البحيرات والاهوار.

Mixtion مِغْج  
مُخج الشيء : خلطه.

Siphon مِغْصَب، مِغْصَب، مِغْصَب

٢٥٦٣٤ - مِغْصِيبَات، مِغْصِيبَات  
Siphonose (S). Siphonées (F). Siphonose (E).  
فصيلة من الخفيات الجفهر.

Tarière (F). Auger, Drill (E). مِغْصَب  
هي البريمة، أداة تستعمل لفتح.

٢٥٦٣٦ - مِغْصِيبَات

Trematoda (S). Trématodes (F). Trematoda (E).  
صف من الديدان المريفات.

Trypanosoma (S). مِغْصِيبَات

Trypanosomes (F). Trypanosoma (E).  
حيوانات دنيا طفيلية من الازالي السليات.

Orbicole (F). Orbicool (E). مِغْصَاف ٥

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان أو نبات يسطيع الالباد في مختلف اقاليم المحورة.

Perversité (F). Perversity (E). مِغْصَافَة

الغلبة عيب خلقي أو فساد في الاخلاق. مثالب الحكم والقباض.

٢٥٦١٧ - مِغْصَافَة حَظِيَّة الْوَرَق

Mutisia linearifolia (S). Mutisie à feuilles linéaires (F).  
نوع من الميزرة. ساقها قصيرة تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقها خطية الشكل. نصلها ملتصقة الاطراف تنتهي بحوائط مستطيلة. أزهارها ثنائية السينات، كبيرة القند، قرمزية اللون || أزهارها يستمر طوال فصل الصيف.

Mutisia decurrens (S). مِغْصَافَة صَاحِدَة  
Mutisie décurrente (F).

نوع من الميزرة، ساقها دقيقة فراءة تملو من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقها صاعدة كاملة، نصلها سناني الشكل بحري اللون ينتهي بطفة فراءة || أزهارها برتقالية اللون تملو من ١٥ إلى ١٢ سم. أزهارها يستمر طوال فصل الصيف.

٢٥٦١٩ - مِغْصَافَة مُسْتَعْرِضَة الْوَرَق

Mutisia latifolia (S). Mutisie à feuilles larges (F).  
نوع من الميزرة، ساقها تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقها صاعدة لاطفة قلبية الشكل، نصلها مسن الحافة ثلاثي الأضبان. أزهارها وردية السينات، صفر الاقراص، مذنبة القلائد، ساقها القنايات المغارشة || أزهارها يستمر من ايلول الى تشرين.

Mutisia clematicis (S). مِغْصَافَة مَلْعَوِيَّة  
Mutisie clématite (F).

نوع من الميزرة، ساقها دقيقة تحيلة تملو من ٦ إلى ١٠ أمتار. أوراقها مركبة، ووريقاتها شعية التجميع ثمانية أو عشارية الاضلاع. نصلها احليجية الشكل، خلية البشرة. حواملها ثلاثية الالتصاق. أزهارها كبيرة القند، حمراء اللون، مستطيلة الاعناق، متدلية || أزهارها يستمر من الصيف الى الخريف.

٢٥٦٢١ - مِغْصَافَة مِغْصَافَة

Matisia (S). Matisie (F).  
جنس الشجار برية وزراعية من فصيلة الميزازيات مهددا بعض مناطق امريكة الاستوائية || اشجارها كبيرة دائمة. سوقها منتصبة تملو من ١٢ إلى ١٥ م. أوراقها متعاقبة، ممتدة. نصلها سنائية الشكل، جامدة الوثل، ناشرة اللروق السباعية الاضلاع. أزهارها ضمي التجميع. أزهارها مستطيلة الاعناق، بيضاء اللون، وردية المواجه ثاميا نووية، بيضيه الشكل، خامسة الخلود، مأكولة مستحبة الطعم القريب من طعم الشمس.

٢٥٦٢٢ - مِغْصَافَة  
Matico (F).  
هو التامبول الضيق الورق.

٢٥٦٢٣ - مِغْصَافَة  
Méthyène (F). Methylene (E).  
كحول مستطير من الخشب.

٢٥٦٢٤ - مِغْصَافَة  
Matthiola (S). Matthiole (F).  
جنس نباتات حشوية وجنية من فصيلة الصليبيات. انواعها عديدة، معظمها بري منه المصم والمحول والحولي. جميعها قريبة الشبه من الحيري، سوقها وأوراقها زبداء. أزهارها حلقودية، طرفية، عطرية. ثمارها غردلية ثنائية الخلد. زهورها دقيقة مبطلة حنطية اللون.

٢٥٦٢٥ - مِغْصَافَة مِغْصَافَة \*، مِغْصَافَة لَيْلِي  
Matthiola bicornis (S). Matthiole à 2 cornes, Giroflée des jardins (F). Night scented stock (E). Garten-



مِيزَة



مِيزَة مِيزَة

۲٥٦٤١ - مُثَلَّث (F). Terné (F). Ternate (E).  
نمت ترميضي توصف به الاعضاء الباقية الثلاثية الاجزاء  
او التركيب .

۲٥٦٤٢ - مُثَلَّث (F). Triangles  
شكل هندسي ثلاثي الاضلاع والزوايا .

۲٥٦٤٣ - مُثَلَّث (F). Tribasique (F).  
Tribasic (E).  
مثث الاساس او مثث القاعدة كل حاض فيه ثلاث  
ذرات هيدروجينية تسبذل بقرات قاعدية .

۲٥٦٤٤ - مُثَلَّث (F). Trilatéral (F).  
Trilateral (E).  
۲٥٦٤٥ - مُثَلَّث (F). Triangle austral (F).  
۲٥٦٤٦ - مُثَلَّث (F). Triangle australe (E).  
مثث الجنوب كوكبة نجوم منها الجنوب تمتد بين المذبح  
المربع والحك ومائير الفردوس والمطاويس || نجم الزاوية  
العليا من المربعة الثالثة والنبيان الاخريان من المربعة  
الرابعة .

۲٥٦٤٥ - مُثَلَّث (F). Triangulaire (F).  
۲٥٦٤٦ - مُثَلَّث (F). Triangular (E).  
۲٥٦٤٧ - مُثَلَّث (F). Triangle boréal (F).  
۲٥٦٤٨ - مُثَلَّث (F). Triangulum borealis (E).  
مثث الشمال كوكبة نجوم تمتد بين ساويس والمرأة المسلسلة  
والحمل || ارجل نجومها تشكل مثلثا قائم الزاوية لامتساوي  
الاضلاع .

۲٥٦٤٩ - مُثَلَّث (F). Triangle rectang (F).  
۲٥٦٤٨ - مُثَلَّث (F). Right-angled triangle (E).  
۲٥٦٤٩ - مُثَلَّث (F). Triangle isocèle (F).  
۲٥٦٤٩ - مُثَلَّث (F). Isocèles triangle (E).  
المكان الخمص لحفظ الذبيك . والمكان الجبل المد لحفظ  
النحوم والوسائل السريعة الاختيار . وآلة المدة لاصطناع  
الصنيع .

۲٥٦٥٠ - مُثَلَّث (F). Sphaerulites (S).  
۲٥٦٥٠ - مُثَلَّث (F). Sphaerulites (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الجياشم  
وفصيلة المصليات . انواعها للمروقة قليلة المد جميعها  
من متحجرات الطبقة الطباشيرية || اصدانها جلونية  
الشكل ، غمدية ، مثلمة ، تركيز على قواعد اسطوانية  
مجموعة تغلف مع اقترابها من القمة واطراف الجملون .

۲٥٦٥١ - مُثَلَّث (F). Fongible (F).  
۲٥٦٥١ - مُثَلَّث (F). Fungible (E).  
المثليات او الاغذية المثلية هي كل موزون او مقس او  
مكيل يصلح بعضه ببدل من البعض الاخر . وان لم تكن  
كلها فهي قيمة (Non Fongibles) .

۲٥٦٥٢ - مُثَلَّث (F). Fructifère (F).  
۲٥٦٥٢ - مُثَلَّث (F). Fructiferous (E).  
۲٥٦٥٣ - مُثَلَّث (F). Fructier (F).  
۲٥٦٥٣ - مُثَلَّث (F). Fruit-bearing (E).  
نمت ترميضي يطلق على كل امره به علة تتسلط على جهازه  
الحيوي فتحمه وتدفعه على عرض شواره .

۲٥٦٥٤ - مُثَلَّث (F). Fruiterie (F).  
۲٥٦٥٤ - مُثَلَّث (F). Fruit-loft (E).  
المكان المد لحفظ الثمار .

۲٥٦٥٥ - مُثَلَّث (F). Jardin fruitier (F).  
۲٥٦٥٥ - مُثَلَّث (F). Orchard, Fruit-garden (E).  
هي بستان الاشجار المثمرة الفاكية .

۲٥٦٥٦ - مُثَلَّث (F). Octogone (F).  
۲٥٦٥٦ - مُثَلَّث (F). Octogon (E).  
۲٥٦٥٧ - مُثَلَّث (F). Cystite (F).  
۲٥٦٥٧ - مُثَلَّث (F). Cystitis (E).  
التهاب المثانة او وجعها .

۲٥٦٥٨ - مُثَلَّث (F). Daphne gnidium, Thymelaeos hirsuta (S).  
۲٥٦٥٨ - مُثَلَّث (F). Daphné gnidium, Garou, Thymelée, Salnbols (F).  
۲٥٦٥٨ - مُثَلَّث (F). Gnidium, Spurge flax (E).  
۲٥٦٥٨ - مُثَلَّث (F). Purgierstrauch, Rispenblütiger Seidelbast (D).  
۲٥٦٥٨ - مُثَلَّث (F). Barbosa, Dittinella, Laureola lupina (I).  
نوع من الفنتة تلطو من ٧٠ الى ١٢٠ سم . فروعها  
مستقيمة عديدة . اوراقها متعصبة لاحافة الفرح والند .  
نصلها جلدي النسيج ، جامد التركيب ، مستطيل القد .  
ازهارها عنقودية التجميع ، حامية الارزكاز ، بيضاء اللون ،  
فواحة الورد || ازهارها يستمر من نيسان الى ايلول .  
يستخرج من لحائها وجلودها واوراقها بعض المواد الفعالة  
الشائعة الاستعمال المسمى والطبي .

۲٥٦٥٩ - مُثَلَّث (F). Perliculture (F).  
۲٥٦٥٩ - مُثَلَّث (F).  
المثية هي تربية النشع وغيره من الحمار المغول في احواض  
خاصة بساتنحات معينة لاستخراج اللؤلؤ الذي يتكون في  
اجوفها بعد سبع او ثمان سنوات .

۲٥٦٦٠ - مُثَلَّث (F). Pigeonneau (F).  
۲٥٦٦٠ - مُثَلَّث (F).  
البحر : فرخ الحمام .

۲٥٦٦١ - مُثَلَّث (F). Young pigeon (E).  
۲٥٦٦١ - مُثَلَّث (F).  
البحر : فرخ الحمام .

۲٥٦٦٢ - مُثَلَّث (F). Suc (F).  
۲٥٦٦٢ - مُثَلَّث (F).  
مخاطبة الشيء : حصارته .

۲٥٦٦٣ - مُثَلَّث (F). Culture de noyers (F).  
۲٥٦٦٣ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٦٤ - مُثَلَّث (F). Champ (F).  
۲٥٦٦٤ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٦٥ - مُثَلَّث (F). Champ magnétique (F).  
۲٥٦٦٥ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٦٦ - مُثَلَّث (F). Vesicaria (S).  
۲٥٦٦٦ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٦٧ - مُثَلَّث (F). Vésicair (F).  
۲٥٦٦٧ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٦٨ - مُثَلَّث (F). Blasenschütchen (D).  
۲٥٦٦٨ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٦٩ - مُثَلَّث (F). Vescicaria (I).  
۲٥٦٦٩ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٧٠ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٧٠ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٧١ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٧١ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٧٢ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٧٢ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٧٣ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٧٣ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٧٤ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٧٤ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٧٥ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٧٥ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٧٦ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٧٦ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٧٧ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٧٧ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٧٨ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٧٨ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٧٩ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٧٩ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٨٠ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٨٠ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٨١ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٨١ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٨٢ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٨٢ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٨٣ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٨٣ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٨٤ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٨٤ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٨٥ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٨٥ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٨٦ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٨٦ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٨٧ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٨٧ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٨٨ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٨٨ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٨٩ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٨٩ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٩٠ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٩٠ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٩١ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٩١ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٩٢ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٩٢ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٩٣ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٩٣ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٩٤ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٩٤ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٩٥ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٩٥ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٩٦ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٩٦ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٩٧ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٩٧ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٩٨ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٩٨ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٦٩٩ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٦٩٩ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

۲٥٧٠٠ - مُثَلَّث (F).  
۲٥٧٠٠ - مُثَلَّث (F).  
الحجاز : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .



مثلة



مثنان



مجال

تنتهي إلى عدة فواصل، منها الأليات والبقريات والجلبليات  
والزرايات والنسنيات الخ .

Extirpateur (F). **مِجْتَه** ، **مِجْتَه** ٢٥٦٧٦  
Weeder, Weeding-tool, Spud (E).  
محراث خاص يستعمل لاقطاع الأعشاب الرديئة .

Essoucheur (F). Grubbing (E). **مِجْتَات** ٢٥٦٧٧  
جهاز آلي يستخدم في اقطاع أرويات الانجار .

Ju choir, Perchoir (F). **مِجْتَم** ٢٥٦٧٨  
Roosting-place, Roost (E).  
خيشات متفرعات في الخيم يحط عليها الدجاج . ومن الخيام  
الطبيعية المشهورة :

Héronnière (F). Heronry (E). **مِجْتَم البُيُوت**  
Corbeautière (F). Rookery (E). **مِجْتَم الغُريان**

٢٥٦٧٩ - **مِجْتَج** الخبيث : ادراك العنب ونضجه .

٢٥٦٨٠ - **مِجْدَاب** ، **مِجْدَاب** ، **مِجْدَاء** ،  
**مِجْدَبَة** ، **مِجْدَل** ، **مِجْدَل** ، **مِجْدَلَة**

Terrain improductif (F). Unproductive ground (E).  
هي التربة التي لا تنحب قط .

Littoral, Riva (F). **مِجْدَاح** ٢٥٦٨١  
Sea-coast, Sea-board (E).  
المخاض هو ساحل البحر . ج مجاح .

Régénérateur (F). **مِجْدَاد** ٢٥٦٨٢  
Regenerator (E).

Epouvantail (F). **مِجْدَاك** ، **مِجْدَاك** ، **مِجْدَاك** ٢٥٦٨٣  
Scarecrow (E).  
ما ينصب في الحدائق والزرورع مزينة بقطير والوش .

Alfe (F). Wing (E). **مِجْدَاك** ٢٥٦٨٤  
هو الجناح أو القسط . مجداك الطائر : جنس حمار .  
يقال خفق الطائر مجداكه .

٢٥٦٨٥ - **مِجْدَح**  
المجح نجم صغير يضي أيضاً حادي النجم ، أظله .

٢٥٦٨٦ - **مِجْدَع**  
المجدع من الحبر : المقطوع الأذن والمجدع من النبات  
ما قطع أعلاه .

Bec droit (F). Straight bill (E). **مِجْدَاك** ٢٥٦٨٧  
المجدع المققاد الجالس المادم للتحجين والبرية .

Radicant (F). **مِجْدَاك** ٢٥٦٨٨  
Radicant, Radicating (E).  
نبت ترابي ياتي توصف به البوق التي تخرج جفوها  
هوائية تتدل حتى التربة .

Aviron, Rame (F). **مِجْدَاك** ، **مِجْدَاك** ٢٥٦٨٩  
Oar, Scull (E).

٢٥٦٩٠ - **مِجْدَلِيَّات الأَرْجُل**  
Copepoda (S). Copépodes (F). Copepoda (E).  
رَبَّة حيوانات صغار من صف الثقريات تتميز بأرجلها

Exhibitionnisme (F). **مِجْدَلِيَّة** ٢٥٦٩٨  
هي الجلعة ، أظله .

٢٥٦٩٩ - **مِجْدَان سَاحِر** ٥ ، **مِجْدَان سَاحِر** ٥  
Satyrus circe (S). Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (E).

حشرة من فصيلة الهبات وربة حشرليات الاجنحة .  
موطنها معظم المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط الى  
أروبة وإفريقية الشمالية . فراشها واضحة قريبا مفتر الانجاز .  
سرتها تمشي على صفت النجيليات || جسمها كبير القدر .  
يعول نحو ٢٣ م . بسطها نحو ٦٦ م . رأسها كسني  
البرق اللذان . منهاها كيرتان . زباناها صرطنانيان .  
مرشها متدل الجرم والطول . جرشها وبطنها الى الخيطي ||  
رواشها كسنتية اللون ويلعبها عند الذكر مرة لامة وسبع  
بنج بيض وسبع نقط خضبة هامشية الازتكاز . ويلعبها  
عند الانثى خمس بنج بيض تحترق الصفحة بكامل مرشها ||  
لها جيل واحد في الخول . تظهر الفراشة في تموز . ترحب  
في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو سبعة اصابع وتنتج  
المكن طعنا على الصفحات السفلى من نصال المصنف ||  
السرة طول نحو ٣٦ م . جسمها شبه أسطواني الشكل ،  
مالس القشور . نوبها الى السرة الكسنتية ويلعبها خطان  
جانبيا صبايان ويكتنفها خمسة خطوط سود قاطبة وثلاثة  
أطواق صدرية جلوية وتسمى أطواق بطنية سود . شرجها  
ذلق الطرف المفلوق . ملها ورواجها الى السرة || طور  
الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة أسابيع ينتهي في التربة  
تحت الجفانة .

٢٥٦٩٠ - **مِجْدَلِيَّات** ٥  
Satyridae (S). Satyridae (F). Satyridae (E).

فصيلة حشرات فراشية من ربة حشرليات الاجنحة .  
اجناسها وانواعها المحررة كثيرة العدد . معظمها متوسط  
القدر أو صغير . تتميز بالبنان الالوي بين الثقلين ||  
اجسامها قليلة الصلابة . رواشها كاملة ، الخلفية منها  
قليلة التفريغ أو عادته . ملابسها متعصب . قورنها  
الاستشارية تحلة صرطنانية الشكل || طيراتها مزيج من  
الحوم والرقصة والسيف السريع القصير الشوط ||  
اساريمها تمشي على النجيليات وهي مجرة بزوائه شرجية  
صغيرة فرقة || أشهر اجناسها الهبان والرافلة والشوكة .

٢٥٦٩١ - **مِجْدَانَة**  
Champignonnière (F). Mushroom bed (E).  
المكان المحد لراحة الفطور .

٢٥٦٩٢ - **مِجْدِيل** ٥  
Formatif (F). Formative (E).  
نبت ترابي يدل على وجود الجبلية . كقوك القطب  
المجبل للدلالة على القطب الذي تتكون فيه التربة في البيفة  
المزكوة .

٢٥٦٩٣ - **مِجْدِيَّة**  
Présure (F). Rennet (E).  
هي السرة ، أظله .

٢٥٦٩٤ - **مِجْدِيَّة**  
Fromagerie (F). Cheese farm, Cheese-trade (E).  
المحل المختص بصناعة الجبن .

٢٥٦٩٥ - **مِجْدَرَات**  
Ruminants (F). Ruminants, Ruminating (E).  
الحيوانات التي تجمر أكلها وهي من مزدوجات الاصابع



مِجْدَان

2٥٧٠٧ - مَجَسَّة الحَقُون (E). Sirloin (F). Aloyau

2٥٧٠٨ - مَجَسَّة الخَصِيرَة (F). Travers

2٥٧٠٩ - مَجَسَّة العَجَزِين (E). Breadth (F). Maniement des abords

2٥٧١٠ - مَجَسَّة رَأْس الكَتِف (F). Avant-cœur, Paleron (F). Shoulder-blade, Chuck (E).

2٥٧١١ - مَجَسَّة رَأْس الوَرَك (E). Bord (F). Edge (E).

2٥٧١٢ - مَجَسَّم مُرَبَّع الوُجُوهُ (F). Tétraèdre (F). Tetrahedron (E).

2٥٧١٣ - مَجَسَّم نَائِص (F). Ellipsoïde (F). Ellipsoid (E).

2٥٧١٤ - مَجَسَّسِيَّة ، مَجَسَّسِيَّة (F). Palpabilité (F). Palpability (E).

2٥٧١٥ - مِجْصَاص (F). Gypsomètre (F). Gypsumeter (E).

2٥٧١٦ - مِجْصَاعَات (F). Exoacces (S). Exoacées (F). Exoacées (E).

2٥٧١٧ - مِجْصَاعَة (F). Exoacus (S).

2٥٧١٨ - مِجْصَاف (F). Four à dessécher, Séchoir au feu (F). Bake house, Drying-house (E).

2٥٧١٩ - مِجْصَافَة \* ، مِجَم (F). Etuve (F). Stove (E).

2٥٧٢٠ - مِجْصَافَة \* (F). Arillé (F). Arillate (E).

2٥٧٢١ - مِجَل (F). Arillé (F). Arillate (E).

2٥٧٢٢ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٢٣ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٢٤ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٢٥ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٢٦ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٢٧ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٢٨ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٢٩ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٣٠ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٣١ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٣٢ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٣٣ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٣٤ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٣٥ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٣٦ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٣٧ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٣٨ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٣٩ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٤٠ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٤١ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٤٢ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٤٣ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٤٤ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٤٥ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٤٦ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٤٧ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٤٨ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٤٩ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٥٠ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٥١ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٥٢ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٥٣ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٥٤ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

2٥٧٥٥ - مِجَلَة الحَرِير (F). Sérilmètre (F). Serimeter (E).

الهندانية الشكل . فصائلها وأجناسها وأنواعها كثيرة العدد . أصلاؤها جميع البحار والمياه العذبة تعيش متطفلة على الأسماك .

2٥٦٩١ - مَجْدُور (F). Foetus (E). Multiple  
المجذور : الحاصل من ضرب عدد في نفسه .

2٥٦٩٢ - مَجْجُر (F). Foetus (E).  
المجج : ما في بطن الحوامل من اللحم وغيرها من ذوات الطلف .

2٥٦٩٣ - مَجْجَر (F). Resch, Level (E).  
قناة مسطحة لجر الماء .

2٥٦٩٤ - مِجْجَرَام ، هِلِيُومِتِر (F). Héliomètre (F). Héliometer (E).  
جهاز يستخدم في قياس قطر دائرة الأجرام السماوية .

2٥٦٩٥ - مَجْجَرَة ، شَرَج السَّيَّاه (F). Voie lactée (F). Galaxy, Milky way (E).  
بياض يرى في السماء يتكون من ألوف النجوم المتقاربة التي تلمس نور بعضها بعضاً فصارت كأنها مصاب أبيض . وهي ترى في الشتاء أول الليل في ناحية من السماء . وهي رحوية تراهها نصف الليل متعة من المشرق إلى المغرب وفي آخر الليل من الجنوب إلى الشمال .

2٥٦٩٦ - مِجْجَرَة (F). Houe d'entrée (F). Hoc (E).  
أداة زراعية تستعمل لرفع التراب وترتيبه .

2٥٦٩٧ - مَجْجَرَى مَاء (F). Courant d'eau (F). Current, Stream (E).  
أداة يوقية أو آلية تستعمل لجز صوف الدواجن .

2٥٦٩٨ - مِجْجَر (F). Tondeuse (F). Shearer, Clipper (E).  
أداة يوقية أو آلية تستعمل لجز صوف الدواجن .

2٥٦٩٩ - مِجْجَرَاكَة (F). Balsamine des jardins (F).  
هي البساتنة التي تزين به الحدائق .

2٥٧٠٠ - مِجْجَرَاغِيَّات (F).  
هي البساتنة التي تزين به الحدائق .

2٥٧٠١ - مِجْجَرَاغَات (F). Contre-espalier (F). Espalier facing another (E).  
هي الأشجار المثمرة القائمة على الأسلاك وقد صارت تشبهها وفقاً لقائمة .

2٥٧٠٢ - مِجْجَرَة ، شَبَكَة (F). Filet (F). Dash (E).  
الشبكة يصاد بها السمك .

2٥٧٠٣ - مِجْجَس ، مِجْجَسَة (F). Manet, Maniement (F). Handling (E).  
ما يتخذ باليد من جسم الحيوان لحرقه سمته أو هزاله .

2٥٧٠٤ - مِجْجَسَاك (F). Stéréoscope (F). Stereoscope (E).  
منظار جسم . جهاز بصري يمكن من مشاهدة الرسوم بقشاشها بفعل التنصيد الذي تؤتته النظارتان .

2٥٧٠٥ - مِجْجَسَاكِي (F). Stéréoscopique (F). Stereoscopic (E).  
منظار جسم . جهاز بصري يمكن من مشاهدة الرسوم بقشاشها بفعل التنصيد الذي تؤتته النظارتان .

2٥٧٠٦ - مِجْجَسَة الأذن (F). Oreillette, Oreillon (F). Auricle, Earlet (E).  
منظار جسم . جهاز بصري يمكن من مشاهدة الرسوم بقشاشها بفعل التنصيد الذي تؤتته النظارتان .



مِجْجَسَاك



مِجْجَسَاك



مِجْجَسَاك



٢٥٧٢٧ - **مِجَنَّاخِي** °  
Pterygoidian (F).  
Pterygoidian (E).

تمتع تعريفي يطلق على بعض عظام الفك الجناحية الشكل.

٢٥٧٢٨ - **مُجَنِّح**  
Alifère (F).  
Aliferous, Aligerous (E).

تمتع تعريفي يطلق على الحشرات التي تحمل اجنحة .

٢٥٧٢٩ - **مُجَنَّنَاتُ أَصْلًا**  
Pterygotes,  
Pterygogénènes, Ptilotes (F). Pterygotes (E).  
طائفة من الحشرات تشمل معظم شرب ورتب الحشرات  
المعروفة وقديما ٤ شرب ١٤ طبق ٢٩ رتبة . أما  
فصلها واجناسها فعدة آلاف .

٢٥٧٣٠ - **مُجَنَّنَاتُ الْأَرْجُل**  
Pteropoda (S).  
Pteropoda (F). Pteropoda (E).  
رتبة من الرخويات الملحية التي تتميز بأرجلها المنحنية .

٢٥٧٤١ - **مُجَنَّنَاتُ الْأَيْدِي**  
Cheloptera (S).  
Cheloptères, chauves-souris (F). Cheloptars (E).  
رتبة حيوانات ليلية راسمة تتميز بشفاه جلدي يكتنف  
قوائمها فيمكنها عند انتشاره من الطيران ٥ اجسامها  
كردية ، صغيرة القد وروسها بشعة . اذنتها متباينة  
الاشكال والاحجام . تشبهها كامل الانظمة ، مغارات  
العدد الذي يختلف مع الاجناس . امتلاكها قصيرة . ارجلها  
خاصية الاصابع ، دقيقة الحبال الشفيدة الانحناف .  
ايديها فردية الاصابع ٥ انماها اكبر قدماً من ذكورها ،  
وفي ثنائية الثديي وحويلة الحمل ، يحملها يدم من ٣٨  
الى ٤٠ يوماً تضع في تمامه جرأ واحداً يكتفي ويسمع بعد  
الوضع ستة ايام ، ويصير بعد اليوم الماشي . ترشعه الام  
ويتصل بصدرها حتى الغطاء اي نحو سبعة اصابع ٥ انواعها  
المعروفة نحو ٤٩٠ بجميعها عشرات الاجناس تنقسم الى ست  
فصائل تنتمي الى مرتبتين ، مرتبة الطوايط ومرتبة الخفافيش  
كما هو موضح في الجدول التالي للاسفل .

٢٥٧٤٢ - **مَجَنَّف** °  
Talus (F). Slope (E).  
الجنب الارض المنحدرة على شكل جلون .

٢٥٧٤٣ - **مُجَهَّر** ° ، **مِكْرُوسَكُوب**  
Microscope  
جهاز بصري يستخدم لتكبير وتوضيح المراتب الصغرية  
الدقيقة . وهو على انواع البسيط ، والتركيب والالكتروني  
والوحيد النظارة والتناهي المنظارات .

٢٥٧٤٤ - **مِجْهَر**  
Microscope (F).  
Microscopium (E).

المجهر كوكبية نجوم جنوبية المقع مركزها تحت برج الجدي ٥  
يوجدوا قليلة العدد جميعها من المرتبة السادسة والسابعة .

٢٥٧٤٥ - **مِجْهَرِيَّات** °  
Microzoaires (F).  
Microzoarian, Microzoon (E).

المجهرية حوريات دنيا لا تشاهد الا بواسطة المجهر .

٢٥٧٤٦ - **مَجْهَرْد**  
Effort, Tension (F).  
Sress, Strain (E).

هو ما تستطيع حله الرحلة الطمحة من الباطن دون ان  
تتأذى . يعبر عن الحمل بالكيلوغرام وعن الرحلة الطمحة

٢٥٧٢٤ - **مِجَلَّةُ الْحَلِيب**  
Lactoscope (F).  
Lactometer (E).

جهاز يستخدم لمعرفة مقدار المواد السنية الموجودة في  
الحليب .

٢٥٧٢٥ - **مِجَلَّةُ السَّحَاب** ، **مِشْحَاب** °  
Néphoscope (F). Nephoscope (E).  
آلة تستخدم لمعرفة اتجاه السحب ورسوها .

٢٥٧٢٦ - **مِجَلَّةُ الْوُلُوء** °  
Lucidoscope (F).  
Lucidoscope (E).

جهاز يستعمل في التمييز بين الاشياء الطبيعية والمزودة  
او الصنية .

٢٥٧٢٧ - **مِجَلَّاح** ° ، **دِيكُوتِيل**  
Dicotyles (S). Pécarl (F). Pecary, Mexican hog (E).  
جلس حيوان من فصيلة الخنزيريات موطنه امريكا الوسطى  
والجنوبية ، طوله نحو ١٠٠ سم . علوه ٤٠ وذنيه ٢ سم .  
نظيفته مستطيلة اذناه صغيرتان منتصبان . جسمه كثيف  
الغلب القليل . قوائمها نحيلة ٥ يعيش جماعات كبيرة  
تدورها الفصول الممئة . يألف الاخراج ولادفك الرطبة  
وصفات الانهر . قوته الجلود والبار والحليب . مسرحه  
من الغروب الى الفجر ، لا يقرب الاماكن الآهلة ٥ اناته  
تفجع جروين مرة واحدة في السنة ٥ اعرف انواعه واشهرها :

**مِجَلَّاحُ اَبِيضُ الْبَرَامِط**  
Dicotyles labiatus (S).  
Pécarl à lèvres blanches (F).  
**مِجَلَّاحُ الْمَكْسِك**  
Dicotyles angulatus (S).  
Pécarl du Mexique (F).  
**مِجَلَّاحُ نَجاكُوك** ، **مِجَلَّاحُ مَطْوَك**  
Dicotyles tajacu (S).  
Pécarl Tajacou (F).

٢٥٧٢٨ - **مِجَلَّاد**  
Pagoscope  
هو الخدار ، مكشاف الجلد ، المظهر .

٢٥٧٢٩ - **مِجَلَّة** ، **نَقَّاطَة** ، **بَيْتَة**  
Ampoule (F). Ampulla (E).

٢٥٧٣٠ - **مِجَلَّةُ دَوْ**  
Glacière  
راجع مِجَلَّة .

٢٥٧٣١ - **مِجَلَّةُ دَوْ**  
Coudrale (F). Hazel-cops (E).  
مفرد اشجار البندق .

٢٥٧٣٢ - **مَجْلِسُ وَصَايَة**  
Conseil de tutelle (F).  
مجلس قانوني مؤلف من بعض اقرباء القاصر او المجهور  
عليه ، مهمته حماية القاصر ورعاية اعمال الوصي او التمم .

٢٥٧٣٣ - **مَجْمَع**  
Académie (F). Academy (E).

تعبير يطلق على مجموعة من العلماء يجتمعون لاجل النظر في  
المسائل العلمية العائدة الى اختصاصهم .

٢٥٧٣٤ - **مَجْمُوع**  
Total

٢٥٧٣٥ - **مَجْمُوعَة** ، **رَكْمَة** °  
Agrégat (F).  
Aggregate (E).

مجموعة مواد مختلفة متراكمة .

٢٥٧٣٦ - **مِجَنِّح** °  
Pterygoide (F).  
Pterygoid (E).

ما كان شكله كالجنح .



مِجَلَّاح



مِجْهَر

**Cheiroptères** مَحَنَّات الأَيْدِي

Genre	جنس	Sous-Famille	عائلة	Famille	فصيلة	Sous-ordre	مرتبة
Roussettes	شفافة			Pteropodidés	وطواطيات	Mégachiroptères	وطواط
Cynonycteris	رداسة						
Epomophores	حيثر						
Cynoptères	سقطوم						
Harpie (Céphalote)	مساخة						
Macroglosse	لثانة						
Eonycteris des cavernes	مرحاب						
Nésonycteris	حيويش						
Rhinolophes	عماش			Rhinolophidés	عماشيات	Microchiroptères	خفايش
Triaienops	خناطل						
Phyllorhines	دباش						
Authops orné	دملوح						
Cœlops	ذنباب						
Mégadermes	مطاب			Nyctéridés	وسرناك		
Nyctères	وحرة						
Oreillards	طمرق			Vespertilionidés	خفاشيات		
Synotes, Barbastelles	سحاة						
Vespérugos	خفاف						
Scotophiles	ذعاط						
Vespertillions	خفاش						
Minioptères	زبابع						
Furies	دوس	Emballonuriné	رماسات	Emballonuridés	رماسيات		
Saccoptéryx	غضوف						
Diclidures	دماس						
Noctilions	نكتيل						
Emballonures	رماس						
Taphiens	شقلان						
Rhinopomes	عينوم						
Chiromèles	زغداب	Molossiné	هيرات				
Molosses	هيرة						
Nyctinomes	ضفدع						
Mystacops	غوبر						
Vampires	نراف			Phyllostomidés	ورقيات		
Phyllostomes	ورقية ، فيلستوم						
Glossophages	مصاص						
Desmodes	علوق						
Diphyllies	عولق						

بالاستمرار المربع . ويختلف المجهود باختلاف التفرص  
الطوابير لذلك فهو قد يكون :

مجهود أمن Effort de sécurité (F).  
Safe stress or strain (E).

مجهود التواء Effort de torsion (F).  
Torsional stress (E).

مجهود ضغط Effort de compression (F).  
Compressive stress (E).

مجهود شد Effort de traction (F).  
Tensile stress (E).

مجهود كسر Effort de rupture (F).  
Ultimate stress (E).

٢٥٧١٧ - ميجنوكه ، ميسجاش ، مسككة  
Aéromètre (F). Aerometer (E).

جهاز خاص يستعمل في تحديد كثافة الهواء .

٢٥٧١٨ - مجبوقات ، لاحشريات  
Coelenterés (F). Coelenterata (E).

شعبة من الحيوانات لا أعضاء لها فيها مجموع واحد له  
فتحة واحدة إلى الخارج تقوم مقام الفم والاستمساك بها .

٢٥٧١٩ - مجبوقات القرون  
Cavicornes (F).  
Cavicornes (E).

قسم من المجربات ذوات القرون الخفيفة كالبلع والذئب .

٢٥٧٥٠ - مجبيل  
Magilus (S).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الأرجل وفصيلة  
المجبيلات . أنواعها المعروفة قليلة المدد أعطائها البحر الأحمر  
وبعض مناطق المحيط الهندي . تعيش في تجاويف مدافع  
الرجلان || أصدانها كلسية المادة ، بيضاء اللون ، تحيط  
التحزيب ، صفراء ، محورة ، ثلاثية الفلب أو رباعية  
في أول عهدها ثم تطول مع مرور الزمن تصبح كالقشر  
الاسطوانية الشكل .

٢٥٧٥١ - مجبيليات  
Magilidae (S).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الأرجل .

أجناسها وأنواعها المعاصرة المعروفة قليلة المدد منتشرة في  
بعض بحار المناطق الحارة || أمرف أجناسها وأشهرها  
المجبل .

٢٥٧٥٢ - مئج ، مئج  
Vitelus

صفرة البيض ، وهو العرنيل .

٢٥٧٥٣ - مئجات هي الخيطي الترمزي ، اعلميه .

٢٥٧٥٤ - مئجاجة  
Phyctomia (F).

Phyctomy (E).

الحاجة أو الفيتونومي علم يبحث في تشريح النبات .

٢٥٧٥٥ - مئجاش  
Pauciflore (F). Pauciflorous (E).

نمت ترميزي يدل على قلة الزهر في أي شكل كان من  
الشكل الانفرار . فنقول منابها ومناقيدها ومشاكها  
نورها غامق .

٢٥٧٥٦ - مئجاش ، مئجاشية ، مئجاشون  
Ostrea (S). Huitre (F). Oyster (E).

جنس حيوانات من الرخويات وفصيلة المحاريات . أنواعها

كثيرة المدد تقسم إلى فئتين الأولى تشمل محار المياه البحرية  
وهي منتشرة في معظم بحار العالم . والثانية تشمل محار المياه  
المنخفضة التي تعيش في الأنهار والبحيرات || وهو من  
الرخويات الصغيرة الاحساس ، القليلة الحركة ، يتغذى  
بالكائنات الدنيا الحيوانية والنباتية التي تدخل في مع الماء .

٢٥٧٥٧ - مئجاشون ، مئجاشون  
Ostrea edulis (S). Huitre ordinaire (F). Edible oyster (E).

نوع من المحار المينول للأكل . يكثر على الصخور  
المغمورة بالماء على طول الشاطئ اللبناني . وهو يربى  
في أحواض خاصة مهيئة فيكثر بسرعة .

٢٥٧٥٨ - مئجاشون  
الحاربان هما رأسا الورك المستديران اللذان تدور لهما  
رؤوس القنديلين .

٢٥٧٥٩ - مئجاشون ، مئجاشون  
Pavillon de Forailie (F). Pavillon, Auricle (E).

راجع قوف وصيوان .

٢٥٧٦٠ - مئجاشون  
Ostrécicole (F).

٢٥٧٦١ - مئجاشون ، مئجاشون  
Ostréides (S). Ostreidae (E).

فصيلة من الرخويات ذوات الصدفتين .

٢٥٧٦٢ - مئجاشون  
Vinago (S).

Vinago (F). Vinago (E).

جنس طير من الجواثم حاميات الشكل وفصيلة الترونيات .  
أنواعها المعروفة قليلة المدد موطنها بعض اصقاع افريقية  
الاستوائية والحارة . ملجها الحياتي جامي . ألوانها خضراء  
المدد . تجوب البلاد في طلب الرزق . قوتها البزور  
والحبوب وبعض الثمار البورية والحشرات والديدانيات ||  
أجسامها شبيهة بالحمام الزايل . مناقيدها مستطيلة .  
أرسانها كاسية . ألوانها تختلف من الأنواع جميعها حادة  
الالوان السفماء العامة .

٢٥٧٦٣ - مئجاشون  
Comptable (F).

Accountable, Responsible (E).

الوكيل الموثق على الحساب .

٢٥٧٦٤ - مئجاشون ، مئجاشون  
Comptabilité (F). Accounts, Book-keeping (E).

٢٥٧٦٥ - مئجاشون ، مئجاشون  
٢٥٧٦٥ - مئجاشون ، مئجاشون

٢٥٧٦٥ - مئجاشون ، مئجاشون

٢٥٧٦٥ - مئجاشون ، مئجاشون

٢٥٧٦٥ - مئجاشون ، مئجاشون

٢٥٧٦٥ - مئجاشون ، مئجاشون

٢٥٧٦٥ - مئجاشون ، مئجاشون

٢٥٧٦٥ - مئجاشون ، مئجاشون

٢٥٧٦٥ - مئجاشون ، مئجاشون

٢٥٧٦٥ - مئجاشون ، مئجاشون

٢٥٧٦٥ - مئجاشون ، مئجاشون

٢٥٧٦٥ - مئجاشون ، مئجاشون

٢٥٧٦٥ - مئجاشون ، مئجاشون

٢٥٧٦٥ - مئجاشون ، مئجاشون

٢٥٧٦٥ - مئجاشون ، مئجاشون



مئج



محار مألوف



مئجاش

الاسم الفرنسي	التاج	الحبل باليوم	الحيلوان	Transmission (F).	مَحَاكِلَة - ٢٥٧٦٧
Guenon	١	٢١٠	دحية	Transmission, Transmittal (E).	جهاز ميكانيكي .
Lièvre	٥-٣	٢٢	ذراة	Poulie de transmission (F).	مَحَاكِلَة - ٢٥٧٦٨
Fouine	٧-٢	٥٦	دلق	Pulley (E).	هي البكرة المبدية السفات التي تستعمل في رفع الاثقال .
Louve	٦-٣	٦٨	ذئبة	Egrappoir (F).	مَحْبِلَة - ٢٥٧٦٩
Lale	٨-٥	١٤٠	رث		آلة لتصل حب الثوب عن التفروق اي السلوش .
Renne	١	٢٤٦	رنة	Terra fertile (F).	مَحْبِلَة - ٢٥٧٧٠
Civette	٤-٣	٧٢	زبادة	Fruitful soil (E).	المهار : الارض اللينة السريمة النبات . « لنا جبال وصى محار » ج . محار .
Rat des moissons	٩-٣	٢٢	زبانة	Granulaire, Granuleux (F).	مَحْبِلَة - ٢٥٧٧١
Girafe	١	٤٥٠	زرافة	Granular, Granulous (E).	ذو حبوب .
Muscardin	٧-٢	٢٨	زغبة	Jus de grenade (F).	مَحْبِلَة - ٢٥٧٧٢
Belette	٨-٣	٣٥	سرعية	Juice of pomegranate (E).	الحبرم : ماء حب الرمان .
Marte	٦-٢	٥٦	مستور	Stalle, Box (F).	مَحْبِلَة - ٢٥٧٧٣
Ecreuil	٤-٣	٢٨	سجباب	Stall, Box (E).	الحبس واليكس : مرقد الفرس الواحد في الاصطبل .
Chamois	٢-١	١٦٥	شمواء	Désoperculateur (F).	مَحْبِلَة - ٢٥٧٧٤
Chat sauvage	٤-٣	٥٦	فسيون		أداة خاصة يشتر بها العمل .
Taupe	٥-٣	٢٨	طويون	Gestation (F).	مَحْبِلَة - ٢٥٧٧٥
Biche	١	١٨٥	ظبية	Gestation, Pregnancy (E).	الحبل هو مدة الحمل ، اي زين تكوين الجنين ، يستمر من الاخصاب الى الوضع    مدة تختلف مع نوع الحيوان ، اقصرها ١٣ يومًا وأطولها نحو ٧٦٠    وقد ذكرنا في الجدل التابع أشهر أنواع الحيوان ومدة حملها باليوم وعدد نتاجها :
Campagnol	٧-٤	٢٢	عكبر الحقل		
Chèvre	٣-١	١٥٤	عنز		
Eléphant	١	٧٦٠	عشوم		
Blaireau	٥-٣	٦٥	غريراء		
Gazelle	١	١٥٤	غزاله		
Souris	٨-٥	٢١	فأرة		
Jument	١	٣٤٥	فرس ، حبر		
Lérot	٦-٤	٢٨	فرب		
Tigresse	٥-٣	١٠٠	فزاره		
Morse	١	٢٦٠	فظ		
Phoque	١	٢٧٦	فقمة		
Léoparde	٥-٣	٩٦	فهدة		
Hermine	٨-٥	٦٠	قائم ، حرين		
Hamster	٧-٣	١٦	قداد هستر		
Loir	٦-٢	٢٨	قرقندون		
Loutre	٣-٢	٦٣	قنصاعة		
Hárissonne	٦-٤	٤٨	قنفذة		
Rhinocéros	١	٥٥٠	سكر كدن		
Chienne	١٠-٣	٦٣	كلية		
Cobaye	٥-٢	٦٨	كوباي		
Lama	١	١٦٨	لاما		
Lionne	٣-٢	١١٠	لبرة		
Mars	٢	٦٠	ماره		
Maïmotte	٦-٢	٣٥	مردوط		
Mandrill	١	٢٧٠	ميمون		
Chamelle	١	٣٢٠	ناقة		
Brebis	١	١٤٧	نمجة		
Panthère	٥-٣	٩٦	نمرة		
Chatte	٧-٥	٦٠	هرة		
Lynx	٤-٢	٦٣	وشق		
Bouquetin	١	١٦٧	وعل		
Chevreuil	٢-١	٢٧٠	يأسور		



محبل



مِجَبِين



مِخْرَد



مِخْرَد التَّحْجِج



مِخْرَد التَّحْجِج



مِخْرَد بَرَابَان



مِخْرَد ذُو مَقْيَنِين



مِخْرَد هَادِي



مِخْرَد كَثِير المَقَاتِع

Calorifère (F). Heat-conveying (E). مِخْرَد - ٢٥٧٩٠

يحمل الحرارة وينقلها . جهاز يؤمن التسخين .

Bolomètre (F). مِخْرَد طَبْيِي - ٢٥٧٩١

Bolometer (E).

ميزان حرارة ينقل بالمقاومة الكهربائية .

Charrue (F). Plough (E). مِخْرَات - ٢٥٧٩٢

الغراث أداة الحراثة . ج محاريث . وأغاريث حديثة الاشكال تختلف باختلاف الاعمال المطلوبة .

٢٥٧٩٣ - مِخْرَات الْجَنَاح

Charrue déboiseuse (F). Clearing plough (E).

هو المِخْرَات المدة لاقطاع اوراق اشجار .

٢٥٧٩٤ - مِخْرَات التَّحْجِج ، مِخْرَات الْجَدَاوِل ،

مِخْرَات التَّشَابِير

Charrue rigoleuse, Ch. fossayeuse (F). Ditching plough (E).

مِخْرَات تفتلج به جدران الاسقاء .

٢٥٧٩٥ - مِخْرَات التَّنْبِيق \* ، لَقَابِيَة

Charrue défonceuse (F). Trenching plough (E).

مِخْرَات يستعمل في تنقب التربة الزراعية على اعماق تراوح من ٥٥ الى ٨٠ سم .

٢٥٧٩٦ - مِخْرَات الْحُمُوم

Fouilleuse, Sous-soleuse (F). Subsoil-plough (E).

مِخْرَات فيه اصابع تحرك الحوم مع استيقاظ تراب في مكانه .

٢٥٧٩٧ - مِخْرَات بَرَابَان \* ،

مِخْرَات يقلب التربة رأساً على عقب . (E). Belgian plough

٢٥٧٩٨ - مِخْرَات فُو مَقْيَنِين \*

Charrue bisoc (F). Bi-share plough (E).

مِخْرَات مركب من باسنتين .

٢٥٧٩٩ - مِخْرَات عَادِي \* ، مِخْرَكَة

Araire (F). Swing-plough (E).

هو المِخْرَات الذي يشق التربة .

٢٥٨٠٠ - مِخْرَات كَثِير المَقَاتِع \*

Charrue polysoc (F). Polysshare plough (E).

هو المِخْرَات العديد البرانس وهو يستعمل لزحف التربة .

٢٥٨٠١ - مِخْرَكَر . Thermomètre enregistreur (F).

Self-registering thermometer (E).

هو الابيات ، اطلية .

٢٥٨٠٢ - مِخْرَكَر القُصْرَى وَالذُّنْبَا \*

Thermomètre maxima-minima

نوع من ميزان الحرارة الثنائية الجيوب المازلة والاعمة الزئبقية التي يدل كل واحد منها على حرارة .

٢٥٨٠٣ - مِخْرَقَاق . Brûleur (F). Housse-burner (E).

جهاز يسهل وينفط احتراق المراد الملقية .

٢٥٨٠٤ - مِخْرَكَرَان . Graine de coton (F).

Cotton seed (E).

هي حبة القطن . ج محارن .

٢٥٨٠٥ - مِخْرَد . مفصل المتق .

٢٥٨٠٦ - مِخْرَد . هو المشفر . ج محار .

٢٥٧ مِجَبِين

ين تيجان من برج الجدي مركزها على الذنب واحد الاثنتين انورد من الاخر ويعدى اخفى المِجَبِين .

٢٥٧ مِخْرَكَة . Grésière, Grésierle (F).

لع الحجر الريلي . Sandstone quarry (E).

٢٥٧١ مِخْرَج . جمع المود : قشره .

٢٥٧١ مِخْرَكَر \* . Lithopage (F).

رِس الحِجَارَة . Lithophagous (E).

٢٥٧٨ مِخْرَكَر \* . Lithoxyle (E).

ل نبات تمورث مايعته الخشبية الى مادة حجرية دون يرد في الشكل يدعى مِخْرَكَر .

٢٥٧٨ مِخْرَج . Parc (F). Park (E).

مِخْرَج هو الحديقة ماذا ما قاله لبيد . وفي التهذيب : المِخْرَج : لمعى المتخفف ، ج محاجر .

٢٥٧٨١ مِخْرَج صَحْي . Lazaret (F).

Lazaretto (E).

مِخْرَج مخصص لايواء الحيوانات القادمة من بلاد وبه .

٢٥٧٨٣ مِخْرَج . Bec (F). Beak, Bill (E).

مِخْرَج الطائر : منقاره ومنقاده ومنسره .

٢٥٧٨٤ مِخْرَجِين \* . Streptopus (S).

Streptope (F).

جنس نباتات ترينية جنسورية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة قليلة . بعضها فروع موقفة . اوراقها متضاربة

ثنائية النصل الساعد الانشباب . ازهارها فردية التجميع ، ابطية الانكازك ، جرسية الشكل ، مستطيلة الزنادة ، متدلية .

لونها يختلف باختلاف النوع ، منها الابيض الاخضر المولج والآخر والازرقواني . ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٥٧٨٥ مِخْرَدِي الاطراف

Busqué, Convexilligne (F). Convexilinear (E).

نعت وصفي تعريفي يستعمل في تصنيف التواجن انحصها الخليل .

٢٥٧٨٦ مِخْرَدُوت \* . Demi-sang (F). Half-bred (E).

المِخْرَدُوت ج . محاريد . هو كل حيوان ناتج من سلالة خيطة صريحة حيث يسلا لا رسن لها .

٢٥٧٨٧ مِخْرَدُوك \* ، مِخْرَدُوك الجِئْد ، مِخْرَدُوك

Pagoscope

جهاز مؤلف من ميزاني حرارة ، ناشف ورطب . يستعمل لدلالة على حالة الرطاب الجوي وبالتالي على امكانية حصول الصبر والملاج الاسود . وقد يثنى من الحدث قبل وقوه بضع ساعات .

٢٥٧٨٨ مِخْرَد \* . Amérir, Amerrie (F).

To alight (E).

حط بطائرته المائية على سطح الماء .

٢٥٧٨٩ مِخْرَد \* . Amérissage, Amerrissage (F).

Alighting (E).

انحر وصول الطائر المائية الى سطح الماء .

٢٥٨٢٣ - مَحَشَّش : محش الجلد : قشره من اللحم .

٢٥٨٢٤ - مَحَشَّش : Broussure, Brûlure (F).  
Blight, Frost-nip (E).

المحش الإحراق في البشرة . الصقيع يحشش البشرة والنصل  
أي يحرقها .

٢٥٨٢٥ - مَحَشَّش \* : مَحَشَّشَة

Faucheu, Tondeuse de gazon (F). Lawn-mover,  
Mowing-machine (E).  
آلة ميكانيكية تستعمل لحش كلاً المروج .

٢٥٨٢٦ - مَحَشَّش مَائِي : Faucardeur (F).  
آلة ميكانيكية تستعمل لحش النباتات المائية في الأنهار .

٢٥٨٢٧ - مَحَشَّشَة \* : Râtelier (F). Rack (E).  
وعاء خاص بتركز فوق المثلث العادي يوضع فيه الكس  
والثمن لتخلط البهائم شيئاً شيئاً دونه أن تبصره .

٢٥٨٢٨ - مَحْشَبَة : Grève (F). Strand (E).

المحْشَبَة شط مطبق يجري أو نهري تغمره الحصى والزمال  
الحشْبَة . ج محاسب .

٢٥٨٢٩ - مَحْشَد ، مَحْشَدَة ، حَصَادَة .

Molssonneuse (F). Reaper (E).  
راجع حصادة ومنها الجامة والرافطة الخ .

٢٥٨٣٠ - مَحْشُول ، حَشَّي ، حَشَّي ، حَلْهَلْ ، نَزَلْ  
Récolte (F). Harvest, Crop, Vintage (E).

ما يحش من زراعة الأرض .

٢٥٨٣١ - مَحْشَر : Procès-verbal (F).  
Official report (E).

معد يدون فيه للأمور المولج الوقائع المادية والأعمال التي  
قام بها .

٢٥٨٣٢ - مَحْشَن ، مَحْشَم : Incubateur, Couvoir (F). Incubator (E).  
هو المرنش ، أطلبه .

٢٥٨٣٣ - مَحْشَب \* ، مَحْشَبَة : Serpe (F).  
Bill-hook, Hedge-bill (E).

أداة سادة منقطة الطرف تستعمل في تشذيب الأشجار  
وتقطع الأخشاب .

٢٥٨٣٤ - مَحْشَب : Assiette (F).  
أشجار الحرج المعدة للقطع .

٢٥٨٣٥ - مَحْشَبَة جَوَائِيَة : Station météorologique (F). Meteorological station (E).

مركز مجهز بما يلزم لتدوين الأحوال الجوية ودراسها .

٢٥٨٣٦ - مَحْشَبَة زَوَائِيَة : Station agronomique (F). Agronomic station (E).

مركز علمي وعمل يبحث في مختلف النباتات والثورن  
الزراعية والأختبارية لاستخلاص نتائجها .

٢٥٨٣٧ - مَحْشَطَار \* : Sirex  
جنس حشرات من فصيلة المحطاريات . أنواعه المعروفة ١٢  
أجسامها اسطوانية الشكل طويلاً يراوح من ٣٠ إلى ٤٠ سم .

Triangulaire (F).  
Triangular (E).

٢٥٨٠٧ - مُحَرَّرٌ \* :

ما كان شكله مثلث الزوايا .

Oxystomes (F).  
Oxystoma (E).

لثة من القشريات عشاريات الأرجل تنتمي إلى رتيبة قصار  
الذيل . أجسامها وأنواعها المعروفة متوسطة المدد جميعها  
من مطل بحار البلاد الحارة . أجسامها صغيرة . تتميز  
بدرمها المستديرة وبأنواعها الحمرسة الشكل || أشهر  
فصائلها الكركليات .

٢٥٨٠٩ - مُحَرَّك : Moteur (F). Motive, Motor (E).  
كل كائن حي أو جهاز آلي يقوم بعمل ميكانيكي . لذلك  
فالمحركات تقسم إلى حية وجمادة . المحركات الحية كالرجل  
والقوس والذئور... والمحركات الجمادة هي الآلية التي  
تديرها إحدى القوى المتغيرة ككثاياه والرياح والكهرباء  
والحرارة ، الخ .

٢٥٨١٠ - مُحَرَّك جَسَادِي : Moteur inanimé (F).  
Inanimate motor (E).

٢٥٨١١ - مُحَرَّك حَرَوِي : Moteur thermique (F).  
Thermic motor (E).

٢٥٨١٢ - مُحَرَّك حَيَّ : Moteur animé (F).  
Animated motor (E).

٢٥٨١٣ - مُحَرَّك كَهْرَبَائِي : Moteur électrique (F).  
Electric motor (E).

٢٥٨١٤ - مُحَرَّك مَائِي : Moteur hydraulique (F).  
Hydraulic motor (E).

٢٥٨١٥ - مُحَرَّك هَوَائِي : Moteur aérien (F).  
Aerial motor (E).

٢٥٨١٦ - مُحَرَّوَة : المحروقة واحدة المحروقة ، شجرة يفسد ثمرها في الملح لا  
تخالط شيئاً إلا غلب ريحها عليه وتنت في البادية وهي  
ذكية الريح جداً . (عن ابن شميل ، اللسان) .

٢٥٨١٧ - مِخْرَ \* : Inciseur, Coupe-sève,  
Pince-sève (F). Ringing-knife (E).

أداة تستعمل لحز الأشجار المطلوب استئصال مصاصها .

٢٥٨١٨ - مِخْرَمَة : Botteloir, Botteleuse (F).  
Binder, Sheaf-binding machine (E).

أداة تستعمل في ضم صالغ الحليون وتجزئها .

٢٥٨١٩ - مِخْسَة : Etrille (F). Curry-comb (E).

٢٥٨٢٠ - مِخْسَر ، مِخْسَر : loue (F). Cheek (E).  
هو الجزء الجانبي من الرأس في الحيوان والطير ومن البيختر  
في الحشرات ، وهما عسمران .

٢٥٨٢١ - مِخْسَرِي ، عِخْدِي : Jugal

٢٥٨٢٢ - مِخْسَل : Ebarbeur (F).  
Paring machine (E).


آلة ينزع بها شعاع الشمر بعد المدرس .



محرار القصوى والدنيا



محز



محش



محشد



محشد



محطب

٢٥٨٥٠ - مَحْكَمَةٌ  
Cour, Tribunal (F).  
Court, Tribunal (E). هي المحكمة التي تلي القضاء .

٢٥٨٥١ - مَحْكَمَةُ الِاسْتِنْفَافِ  
Cour d'appel (F). Appel court (E). هي المحكمة التي تنظر في جميع القضايا التي حكم فيها ابتدائياً .

٢٥٨٥٢ - مَحْكَمَةُ الْيَدَايَةِ  
Cour de première Instance (F). قضاء أول درجة .

٢٥٨٥٣ - مَحْكَمَةُ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ  
Cour internationale d'arbitrage (F). أنشئت هذه المحكمة بمقتضى اتفاق لاهاي عام ١٨٩٩ لكي تفصل بطريق التحكيم في جميع المنازعات الدولية التي لم تفلح الطرق السياسية في حلها . مركزها مدينة لاهاي .

٢٥٨٥٤ - مَحْكَمَةُ التَّمْيِيزِ ، مَحْكَمَةُ التَّقْضِ  
Cour de cassation (F). Highest court (E). هي أعلى المحاكم درجة لأنه يطلب منها النظر في الأحكام التي صدرت عن محاكم الدرجة النهائية فهي تنقض منها ما ترى فيه مغايرة للقانون أو تفسيراً خاطئاً له .

٢٥٨٥٥ - مَحْكَمَةُ الْجَنَائِيَّاتِ  
Cour d'assises (F). Assize court (E). هي المحكمة التي تنظر في المسائل الجنائية وهي تتلزم من ثلاثة أعضاء تعينهم محكمة الاستئناف من المستشارين يكون أحدهم رئيساً .

٢٥٨٥٦ - مَحْكَمَةُ الْعَدَلِ الدَّوْلِيَّةِ  
Cour internationale de justice (F). International justice court (E). هي الإدارة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ولايتها تشمل كل ما هو منصوص عليه في الميثاق والمعاملات والاتفاقات الموصولة بها .

٢٥٨٥٧ - مَحَلُ الْإِقَامَةِ  
Domicile de fait, Résidence (F). Dwelling, Ordinary residence (E). هو المكان الذي يقم فيه المرء دون أن يكون لزماً موطنه القانوني .

٢٥٨٥٨ - مِحْلَابُ  
Galactophore (F). Galactophorous (E). ثمت تمرثي يطلق على كل رءاء ينقل الحليب أو يقرؤه إلى الخارج .

٢٥٨٥٩ - مِحْلَالُ  
Borderes (F). Memorandum, Schedule, Account (E). هو البيان التفصيلي الذي يوضح الأعمال والحسابات .

٢٥٨٦٠ - مَحَلَبُ  
Cerasus mahaleb, Prunus mahaleb (S). Mahaleb, Cerisier mahaleb, C. Ste Lucie (F). Perfumed cherry, Ste Lucie cherry (E). Lucienholz, Stein-Weichsel, Weichselkirsche (D). Cillegio mahaleb, C. odoroso, Pruno odoroso, C. canino, C. S. Lucia, Legno di S. Lucia (I). نوع من الكرز البري، شجرته كبيرة اللقد منتصبه الساق تملو نحو ١٠ أمتار . قروصها وأغصانها منتفخة . أوراقها صغيرة النصل . أزهارها نورية التجميع ، ثمارها حصى

الولها مختلفة ، قروصها الاستعارية خفيفة ، مرزاتها منتفخة || رقاتها خاشبة تركب الصنوبريات تقسردب الشكير والحشب .

٢٥٨٦٨ - مِحْطَارُ أُسُودٍ \*  
Sirax juvencus (S). Sirax noir, Sirax commun, Bouvillon (F). Polished horntail (E). Kiefernholzwespe (D). محطار كبير اللقد ، طولهُ نحو ٣٠ سم . لونه الى السواد الازرق ، جبرازه الى الحمرة . مرزه مخززي الشكل . يمتح مكنه داخل قشور الصنوبريات فوق الشكير يفتق عن رقات تقسردب الشكير والحشب بانفاق مستطيلة يمتدج .

٢٥٨٦٩ - مِحْطَارُ جَبَّارٍ \*  
Sirax gigas, Urocera gigas (S). Sirax géant (F). Giant horntail (E). Riesenholzwespe (D). نوع من المحطار ، طولهُ نحو ٤٠ سم . رأسه وجوشره وصلقات بطنه الوسطى سود . سائر جسمه مع جبرازه الى الصفار اناري . مرزه ينتهي بشفة حادة || رقاتها خاشبة تركب جميع الصنوبريات تقسردب الاشخاب وتطسبها .

٢٥٨٦٠ - مِحْطَارِيَّاتُ  
Siricidae (S). Siricidae (F). Siricidae, Horntails (E). Holz-wespen (D). فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها ولزواها قليلة العدد . أعطانها البلاد المعتدلة الحرارة . جميعها اسطوانية الشكل ، كبيرة اللقد ، طول اجسامها يراوح من ٢٠ الى ٤٠ سم . || رقاتها خاشبة مؤذية تفتش حل الصنوبر والتوتوب .

٢٥٨٦١ - مِحْفَافَةٌ ، قَلَاعَةٌ  
Arracheuse, Arrachoir (F). Grubbing plough (E). آلة تستعمل لقع البطاطا والشوند والجذر .

٢٥٨٦٢ - مِحْطَارُ  
Sablère (F). Sand-pit, Gravel-pit (E). هو المرملعة ، منجم يستخرج منه الرمل .

٢٥٨٦٣ - مَحْفُوظَاتُ ، كَنْسِرَوَاتُ  
Conserves (F). Preserves (E). الحبق : الشجر المقارب بينه في الغرس .

٢٥٨٦٤ - مَحَقُّ  
Fermo (F). Farming, Farm (E). الحقله في المزرعة . ج . محقل . وفي الحديث « ما تصنعون بمحافلكم » .

٢٥٨٦٥ - مَحَقَلَةٌ  
Fermo (F). Farming, Farm (E). الحقله في المزرعة . ج . محقل . وفي الحديث « ما تصنعون بمحافلكم » .

٢٥٨٦٦ - مِحَقَّتُ  
Injecteur (F). مِحَقَّتُ

٢٥٨٦٧ - مِحَقَلَةٌ \*  
Seringue (F). Syringe, Squir (E). أداة تحقن بها السوائل في جسم الحيوان وفي جوفه .

٢٥٨٦٨ - مِحَكُّ ، مَشْحَبُ  
Raclette, Racloir (F). Scraper (E). الحكاك جهاز يستعمل في قياس قوة الاحتكاك .

٢٥٨٦٩ - مِحَكَاكَةٌ  
Tribomètre (F). Tribometer (E). الحكاك جهاز يستعمل في قياس قوة الاحتكاك .



محطار أسود



محطار جبار



محقة



حلب

Axile, Axillaire (F). **مَحَوْرِيّ** ٢٥٨٨٠  
Axial, Axillary (E).

Herbe d'Inde (F). **مَحَوْرُ** ٢٥٨٨١  
نبات بري طبي يعرف باسم اخيراتيس ، اطلبه .

Fascié (F). **مَحَوْرَف** ، **مُشَمَّل** ٢٥٨٨٢  
Fasciated (E).

نمت تعريفني يطلق حل كل ما هو مسوم بمصالب ،  
وعل الثبات المصاب بالشملة اي الاغراب .

Biennal, Bisannuel (F). **مَحَوْر** ٢٥٨٨٣  
Biennial (E).

Transformateur (F). **مَحَوْر** ٢٥٨٨٤  
Transformer (E).

جهاز يغير درجة توتر التيار الكهربائي .

Teneur (F). **مَحَوِيّ** ٢٥٨٨٥  
Tenor, Percentage (E).  
هو ما تحواه كل مسادة معينة من الناصر المطلوب او  
الناصر المطلوبة ، ج . محوي .

Cercle (F). Circle (E). **مُحِيط** ٢٥٨٨٦  
هو الدائرة ، اطلبه .

Océan (F). Ocean, High sea (E). **مُحِيط** ٢٥٨٨٧  
البحر هو قسم شاسع المساحة من سطح ماء الكرة الأرضية.  
المحيطات المحددة أربعة : (١) المحيط الهادي الذي تبلغ  
مساحته نحو ٨٨ مليون كيلومتر مربع أي ما يقارب  
مساحة اليابسة بكاملها . (٢) المحيط الاطلسي الذي تبلغ  
مساحته نحو ٣٠ مليون كيلومتر مربع . (٣) المحيط  
الجنوبي ومساحته نحو ٤٨ مليون كيلومتر مربع .  
(٤) المحيط الهندي ومساحته نحو ٢٧ مليون كيلومتر مربع .

٢٥٨٨٨ - **مُحِيط الدائرة** ، **مُحِيط دائرية**  
Cercle de la circonférence, Périmètre, Périphérie,  
Pourtour (F). Circle of circumference, Periphery,  
Perimeter (E).

Petites fourmis (F). **مُحِيل** ٢٥٨٨٩  
Small ants (E).

الحيل : اصغر النمل . قال الاغطل :

« ولو بات يبري الدار فوق جلودها

لأثر في ابراهيم محيلها »

Méillot à petites fleurs (F). **مُحِيلَة** ٢٥٨٩٠  
هي الحنظل الصغير ، اطلبه .

Moelle (F). **مُخ** ٢٥٨٩١  
هو النخاع وهو المكك ، اطلبه .

Tenants (F). Adjacent lands (E). **مُخَارَج** ٢٥٨٩٢  
هي قطع الارض المجاورة لتلك من جهة العرض .

Docks, **مُخَارِز عُمُومِيَة** ٢٥٨٩٣  
Magasins généraux (F). Docks, Ware house (E).

٢٥٨٩٤ - **مَخَاس الزُّعُرُور** ، **مَخَاس ثَمَاسِيّ**  
النَّسْط

Cryptocephalus  
octopunctatus (S). Cryptocéphale octoponctué (F).  
Cryptocephalus octopunctatus (E).

حشرة خاضعة من النضاريات منسلات الاجنحة . تألف

القد ، سداه اللون ، حريقة العلم . استعاضها صلبة  
معرفة طيبة الرائحة مرترب فيها || وأغلب يستعمل خاصة  
كعظم لبيض انواع الكرز لانه نبات سبروتي يعيش في  
عظم الارثية || « محارة مفرحة - مقوية الحواس  
مطلقاً ، تمنع الخلقان والبر وسيق النفس واللبنم ، وتقي  
للعدة وابواب الكبد والكل والطحال والخصى وعسر البول  
شرباً . ويقلل به يطلع الكلف والجرب » .

Escargotière (F). Snailery (E). **مَحَلَّة** ٢٥٨٩١  
هي المكان المدة لتربية الحلزون .

Réducteur (F). Reducer (E). **مُحَلِّل** ٢٥٨٩٢

Solution **مَحَلُول** ٢٥٨٩٣

Bouillie (F). Wash (E). **مَحَلُول** ، **سَائِل** ٢٥٨٩٤

Vernaculaire (F). Vernacular (E). **مَحَلِّيّ** ٢٥٨٩٥  
ما هو خاص بالبلد كقولك الاسماء المحلية او اللغة المحلية .

Pèse-acide (F). **مِحْطَاس** ٢٥٨٩٦  
Acetometer (E). مقياس او ميزان الحواض .

Edulcoré (F). Sweetened (E). **مُحَمَّل** ٢٥٨٩٧

نمت تعريفني يطلق حل كل دواء تافه العلم او مرّ أخيف  
اليه بعض السكر تحسناً للذائق .

Acidifiant (F). Acidifying (E). **مُحَمِّل** ٢٥٨٩٨  
نمت تعريفني يطلق حل كل مادة تقود الى التخميض .

Mammoth (F). **مَحْمُود** ٢٥٨٩٩  
هو الصنابة ، اطلبه .

Scammonée d'Alep (F). **مَحْمُودَة** ٢٥٩٠٠  
هي السقمونيا ، اطلبه .

Convulvaceae **مَحْمُودِيَّات** ٢٥٩٠١  
فصيلة نباتية مشهورة باسم اليليايات ، اطلبه .

Cumulo-nimbus **مَحْمُودِيّ** ٢٥٩٠٢  
هو الزكام ، لوح من اليوم ، اطلبه .

Test **مَحْن** ، **مَحْن** ٢٥٩٠٣

٢٥٩٠٤ - **مَحْوَرَة** كثيرة الحيات ، يقال ارض حوارة .

Axe (F). Axis, Axon (E). **مَحْوَر** ٢٥٩٠٥  
هو نقطة الارتكاز .

٢٥٩٠٦ - **مَحْوَر أَقْصِيّ** ، **مَحْوَر سِنِيّ**  
Abscisse (F). Abscissa (E).

٢٥٩٠٧ - **مَحْوَر النهر**  
Thawleg اعرق خط في قامه . واذا كان النهر بين دولتين حد  
محوره سداً بينهما .

٢٥٩٠٨ - **مَحْوَر صَادِيّ**  
Ordonnée (F). Ordinate (E).

٢٥٩٠٩ - **مَحْوَرَة**  
Peupleraie (F). Plantation of poplar trees (E).

مغرس الحور وكل مكان فيه حور .



مَخَاس الزُّعُرُور



## ٢٥٨٩٧ - مَخّاسُ ثَمَافِي الثَّقَط

Cryptocéphale octoponctué (F).

هو مخّاس الزعرور ، اطليه .

## ٢٥٨٩٨ - مَخّاسُ تَجِيب

Cryptocéphale distingué (F).

هو مخّاس العُشب ، اطليه .

Dentelure du limbe (F).

## ٢٥٨٩٩ - مَخّاسُ

استان حافة نصل الورقة .

Prise à partie (F).

## ٢٥٩٠٠ - مَخّاسُ الثَّقَافِي

وسيلة طعن غير جارية مؤداها رفع دعوى على القاضي امام محكمة الاستئناف او التفتش والارام يطالب فيها بتبويض عن ضرر وقع من عمل صدر منه يتصل بطريقته ويطلب عليه القانون .

Gué (F). Ford (E).

## ٢٥٩٠١ - مَخّاسُ

كل مكان من البهر قليل العمق والماء يمكن اجتياز حله الاقدام .

Ecrémuse (F).

## ٢٥٩٠٢ - مَخّاسُ \* قَرَاة

آلة تستعمل لفرز الكائنات من الحليب .

Separator (E).

## ٢٥٩٠٣ - مَخّاسُ

بيع الثّار ويخر لم يبد صلاحها .

Sébastien (F).

## ٢٥٩٠٤ - مَخّاسُ

هي شجرة البستان وتكسى اطباء الكلية .

Mucilagineux (F).

## ٢٥٩٠٥ - مَخّاسُ ، ثَمَافِي

الاجسام الغاطية اجسام لزجة مركبة من الكربون والاكسجين وكليدروجين توجد في عدة نباتات .

Myxinidae (S).

## ٢٥٩٠٦ - مَخّاسُ

فصيلة السمك الغاطية من قسم المصاصات .

Quitance (F). Receipt (E).

## ٢٥٩٠٧ - مَخّاسُ

هي الابراء .

Contravention

## ٢٥٩٠٨ - مَخّاسُ

العمل الذي يقوم به المرء خلافاً لاحكام القانون او النظام .

Braconnage (F).

## ٢٥٩٠٩ - مَخّاسُ الصَّيْد

عدم التقيد بالتعليمات الصيد المرصية الاجراء .

Tube à essai (F).

## ٢٥٩١٠ - مَخْبَر

Tube of trial, Pipe of essay (E).

Laboratoire (F).

## ٢٥٩١١ - مَخْبَر

هو المختبر ، اطليه .

Fournil (F). Bake house (E).

## ٢٥٩١٢ - مَخْبَر

بناء الفرن واذاوات الخبازة .

Boulangerie (F).

## ٢٥٩١٣ - مَخْبَرَة ، مَخْبَرَة

صناعة الخبز وسكانها .

Baking (E).

البرادي والاحراج للبعثرة الاشجار . خنافسها ويرقاتها تعيش على اوراق الزعرور والبقوق والبنلق والنباتات الدفلية || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ م . ثوبها متراكب الاوان ، كوسلها الى السرة السوداء تملوها ازوايق متماثلة العدد . بطنها وبرازها سود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجلجلة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الثبار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتفتح المكن مباحداً على الصفحات السفلى من نصال الازراق || والبرقة عند ادراكها الكمال الجسدي تطول نحو ١٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، دقيق الجرم ، سداسي الارباب ، حطلي اللون ، اصفر الموج ، اسمر الرأس والارباب .

## ٢٥٨٩٥ - مَخّاسُ العُشب \* ، مَخّاسُ تَجِيب

Cryptocéphale primarius (S). Cryptocéphale distingué (F). Cryptocéphalus primarius (E).

حشرة خاضعة من النضاريات مفصدة الاجنحة . تألف البرادي والاراضي للمصاة . خنافسها ويرقاتها تعيش على النباتات الشبيهة || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ م . ثوبها متراكب الاوان . رأسها وكوسلها وبطنها وبرازها الى السوداء الاخضر الموج . ظهراتها الى الحمرة الازرقانية يملوها عشر نقط سود . رأسها صغير الجرم . عينها صغرتان . زباناها محيطيان . ظهراتها مستبدل الاحديدان مقطوم الطرف اللاصق . غذائها متباينة التحيز الخفيف || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجلجلة في ايار وتبقى حتى ايلول . تسرح في الثبار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتفتح المكن على الصفحات السفلى من نصال المعص والاوراق || والبرقة عند بلوغها الازراق اتام تطول نحو ١٠ م . جسمها اسطواني الشكل سداسي الارباب ، اخبر اللون ، اصفر الموج ، اسود الرأس ، يملوه من جانبيه خط من النقط السمر المنحنية بزاوي من الحلب القصير || طور الاكمال ينقضي في التربة ضمن حبيرة جرابية الشكل .

## ٢٥٨٩٦ - مَخّاسُ النِّسْرِين \*

Cryptocéphalus Mariae (S). Cryptocéphale de Marie, C. des églantiers (F). Cryptocéphalus Mariae (E).

حشرة واطعة خاضعة من النضاريات مفصدة الاجنحة . تألف البرادي والاحراج . خنافسها تعيش على اثمار النسرين والعرعر والابل والدراهم ... يرقاتها تعيش على الازراق فتقتطع الخصب بين الثروق ثم تلم نصل وتعيش في داخله || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م . ثوبها الى الشقعة العمقراء البرتقالية الموج . كوسلها ثلاثي الازوايق السود . ظهراتها يملح بالاسود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجلجلة في اواسط ايار وتبقى حتى اواسط آب . تسرح في الثبار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتفتح المكن على الصفحات السفلى من نصال الازراق || والبرقة عند ادراكها الكمال الجسدي تطول نحو ٧ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، ثني اللون ، اسمر الرأس والارباب تملوه ثلاثة خطوط لاطية عمراء اللون || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي في التربة ضمن جراب من المواد النباتية المنجونة بالبراز والرياح .



مخّاس العُشب



مخّاس النسرين



مخّاس



مخّاس

Rayonneur (F). مِخْبَطْ آد \* مِخْبَطْ  
Drill (E).  
جهاز ثنائي أو ثلاثي أو حلقي الإنسان يستعمل في تحذيد  
الترية خطوط مستقيمة متساوية الأبعاد البيئية .

Canaliculé (F). مِخْبَطْ  
Channelled, Furrowed (E).  
نمت وصفي يطلق على بعض أعضاء الحشرات كالكواسل  
والأعقاد الميزابية التحذيد .

Narcotique (F). مِخْبَطْ د مِخْبَطْ  
Narcotic (E).  
كل نبات يحوي أشباه كلوية تحذد كالتيغ والحشاش  
وما أشبه .

Dominant (F). مِخْبَطْ د مِخْبَطْ  
Dominating, Ruling (E).  
هو العفار الذي ينتفع من الارتفاع .

Employeur (F). Employeur (E). مِخْبَطْ د مِخْبَطْ  
الخدم أو المستخدم هوب العمل الذي يستعين على عمله  
بالذين يستخدمهم .

Haçoir (F). Mèche, Mèche, Mèche  
Chopping-board, Chopping-knife, Chaff-cutter (E).  
آلة لا قياسية الشكل والحجم تستعمل في أغراض مختلفة  
أخصها تقطيع اللحم وفرم ورق التبغ وفرم الجذور الخ .

Stylée, Scylaire (F). Stylar (E). مِخْرَنْي  
شكل من زيات الحشرات ونصال الأوراق يشبه الخرز .

Cueille-fruits (F). مِخْرَنْي \*  
Gathering-fruits (E).  
أداة تستعمل لقلع الثمار .

Cône (F). Cone (E). مِخْرَنْي  
Conique (F). Conical (E).  
مِخْرَنْي الشكل

Conoïde, Cunéiforme (F). Conoid, Cuneliform (E).  
نمت تعريفي توصف به الأشياء المخروطية الشكل .

Conifères (F). مِخْرَنْي  
Coniferae (E).  
فصيلة نباتية مشهورة باسم صنوبريات .

Conirostres (F). مِخْرَنْي المنقار  
الشعرية من الطيور الجوارح تشمل عدة فصائل ، أشهرها  
الشعرويات والقريبات والقرقيبات .

Conicité (F). Conicalness (E). مِخْرَنْي  
Clapier (F). Hutch (E).  
مكان تربية الأرانب إن بقصص أو ردية .

Official مِخْرَنْي  
نمت تعريفي يطلق على كل نبات يستعمل في تركيب  
الأدوية .

Malaxeur (F). مِخْبَطْ \* مِخْبَطْ  
Kneader (E).

Laboratoire (F). Laboratory (E). مِخْبَطْ  
مكان التحريات والفحوصات والتحليل المختلفة .

Mixtiligne (F). مِخْبَطْ الخطوط  
Mixtilineal, Mixtilinear (E).  
كل رسم يخلط الخطوط بين المستقيمة والمنحنية .

Hétéromères (F). مِخْبَطَات الأجزاء  
Heteromera (E).  
رتبة حشرات من ممدات الاجنحة .

Hétérocardes (F). مِخْبَطَات الأذنين  
Heterocarda (E).  
رتبة حيوانات من الرغويات الحدية الأمايات الخياطين .

Hétéropodes (F). Heteropoda (E). مِخْبَطَات الأرجل  
رتبة حيوانات بحرية من الرغويات ممدات الأرجل .

فتائلها واجناسها وأنواعها عديدة جميعها شقية ، حية ،  
مفترسة . ملجئها الحيائي جماعي . تعيش في عرض البحر  
ولا تقرب الشواطئ . اصطناعها بحار البلاد الحارة والمعتدلة  
الحرارة . تسبح وتعمد على ظهورها ، بطونها موجهة نحو  
سطح الماء || أجسامها حلالية . رؤوسها تنتهي بأخطام  
متفاوتة الطول . أرجلها زعنافية الشكل تناسب الحياة  
البيئية || أشهر فصائلها الاقطنيات والمرينات .

Hétérocères (F). مِخْبَطَات القرون  
Heterocera (E).  
رتبة حشرات من حرشفيات الاجنحة تشمل عدة فصائل .

أشهرها القريبات والكاربات والنسقيات والحلويات والأزليات  
والنمشيات والقناتلات الخ... تتميز بالوانها المتراكبة الماعدة  
الزئاع ويقرونها الاستعمارية اللاقائية . عاداتها مجلبة  
بشرقة .


Hétérotriches (F). مِخْبَطَات الهدب  
Heterotriches (E).  
رتبة حيوانات دنيا من الهديات أو النقيبات الهدبية .

Hétéroptères (F). مِخْبَطَات الأجنحة  
Heteroptera (E).  
رتبة حشرات من طبقة نصليات الجناح . فصائلها واجناسها  
وأولادها كثيرة العدد جميعها تدريجية التطور . منظمها  
متوسط القند أو صغير . منها الجنبية والماعدة الجناح .

قرونها الاستعمارية قصيرة . أخطامها ثاقبة ماصة تمسكها  
من ثقب الانسجة النباتية وانصصاص النسج . من ميزات  
بعض فصائلها ما تنقذه ، عند الدفاع عن النفس ، من  
سوائل كريمة الرائحة تخزنها في جلد خاصة || أشهر  
فصائلها : الغمبيات والبيقات والطرقات والفاسيات .

Hétérocarpe (F). مِخْبَطَات الثمار  
Heterocarpous (E).  
نمت تعريفي يطلق على الشجار اللاقائية الثمار .

Fosse à fumier (F). مِخْبَطَات مِخْبَطَات  
Midden-pit (E).  
سفرة تصطنع لجمع الزبل على اختلاف مصادره .



مِخْبَطْ



خُذَادْ



خُزْفْ

وفي حرم السباد الممد لتكاثر القملور المأكولة كالنارايقرن المرئي وغيره || مظهره الخارجي ككل نغفة الشكل يضاه اللون أو صفراء تركيب طبقة البصرة السطحية حيث تتشب خيوطها المشابكة التي تحول دون نشوء النارايقرن وغيره || يكاتف باجتناح الاسمدة التي يلوها البفن والاسمدة الضوية الكثيرة المواد المتحلة التي قبل فيها التخدير .



مخصل

Rayonneur (F). Drill (E).  
آلة تستعمل لتخفيف صفوف الفرس ، راجع مخداد .

Mégamètre (F).  
Megameter (E).  
جهاز آلي يستعمل في تحديد خطوط الطول وهو شائع الاستعمال في الملاحة وفي الرصد .

Lolipes (S). Loblépède (F).  
مخطاف \*  
طائر وسيد الجنس والفرع من عمارة السماليات وفصيلة دجاجيات الارض . طوله نحو ٢٥ سم . ثوبه اسمر الظهر يملوه تنسيق ورقيق . بطنه وصدره واثنيكه بيض . رأسه اسود القبة ابيض الحمار . عيناه مكشطان بالاصور . منقاره مقطوم الطرف . ارجاعه قصيرة وقوية . اصابعه مفصصة الخناب || يرتاد البساتن والبيوتات يسبح ويومض كطيور كفتيات القدم . قوته الحشرات والشرافيف والفشريات والرخويات والاسماك الصغيرة || الاثني تدثر في البر ، قرب الماء ، بين الاشجار . تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٧ الى ١٩ يوماً .



غضير لوتيا

Graphique (F). Graphie (E).  
مخطط \*  
هو الخط البياني .

Zébré (F).  
Striped like the zebra (E).  
مخطط ، زردى \*  
نعت تعريفي توصف به الاثواب الحيوانية المخططة بخطوط متعرجة كما في سمار الزرد .

Mandibule (F). Mandible, Jaw (E).  
مخضم \*  
هو الفك أي فك منقار الطائر وما شاكله . ج مخاطم .

Mandibule (F). Mandible, Jaw (E).  
مخضبات الرؤوس \*  
Rhynchocéphales (F).

ربية من الزحافات يورد ظهورها الى الاباج الثاني وقد انقرضت ولم يبق منها سوى النوع المعروف بالمخربيه الذي يعتبر اقدم الزحافات المعاصرة لانه مثلك السبب الا لول .

Lavier (F). Lever (E).  
مخل \*  
هو الرافعة والنتلة ، امطابها .

Musette (F). Nose bag (E).  
مخلاة \*  
كيس صغير يوضع فيه العلف ويعلق برأس البادية .

Acéomètre (F).  
Acometer (E).  
مخلال \*  
الحلال جهاز يستعمل في قياس حوضه الحلل . ويدهى ايضاً لقياس التحليل .

Griffe, Serre (F).  
Claw, Talon (E).  
مخلب \*  
ظفر سباع الطير كالبرن من سباع الرشح .

Xylomètre (F).  
Xylometer (E).

المخشاب جهاز يستعمل في تعيين حجم قطعة من خشب غير مستقيمة . وذلك بقياس كمية الماء التي ترحلها تلك القطعة .

Glacière (F).  
مخشف \*  
راجع متلجة .

Tamis (F). Sieve, Sifter (E).  
مخشكة \*  
أداة تستعمل لفرض الحبوب والثمار والاجرام المختلفة بالنسبة الى الحجم .

Ligneux (F).  
Ligneus, Woody (E).  
مخشوشب ، ليثي \*  
يكون النبات خشبياً عندما تجمد الباقية فتكون فيها المادة الخشبية الصلبة القاسية ، وكذلك النبات المشبي . وما بين اثنتين يسمى النبات المخشوشب أي الليثي .

Éliminé (F). Éliminate (E).  
مخشول \*  
كل حبوب من الحبوب أو النبات صار ابعاده لنفس في صفاته المطلوبة أو المرغوب فيها .

Fertile (F). Fat, Rich (E).  
مخشاب \*  
هي التربة الجيدة الاثارة بالمادة الجلب .

Fécondateur (F).  
Fecunder (E).  
مخشب ، مزيك \*  
اغضب والمزك من الحيوان تن كان يحل طاعة الاغصاب .

Barattage (F). Churning (E).  
مخضض \*  
فوز الكتاة يمد هزها لاجتاج واندهام الكريات الزبدية وانفصاها عن الخيض .

Gazonnant (F).  
Grassy, Turfy (E).  
مخضفر \*  
ارض كثيفة الشب الاخضر المعمر . راجع غضير وينضور .

Gazon (F).  
Grass, Turf, Sward (E).  
مخشرة \*  
ارض كثيفة الشب الاخضر المعمر . راجع غضير وينضور .

Psychromètre (F).  
Psychrometer (E).  
مخشفل \*  
أداة تقاس بها رطوبة الهواء وذلك لمرة مقدار بخار الماء الموجود في الجو .

Eburné (F). Dentine (E).  
مخشون \*  
الحفون الشبيه بالاج .

Mycelophthora (S).  
جنس تطور مجهرية من فصيلة الرشويات . يتميز بكتائده الغصيرة الشعب ، الصغيرة القد ، البشبية الشكل ، اللاقاسية التجميع اذ انها تحوي الفردية والغصية || انواعه قليلة ، امرتها غضير لوتيا .

Mycelophthora lutea (S). Vert-de-gris du champignon de couche (F).  
مخشير لوتيا \*  
نوع من المخشير وهو فطر مجهرى يعيش على المواد الضوية



مخطاف

انزاعها نورية التجسج . ثمارها قفحة لونها الى الحمرة البرتقالية .

٢٥٩٧٦ - **مِخْلَبَة** *Linale commune (F).*  
عقبة مشهورة باسم ليناربه عادية ، اطباها .

٢٥٩٧٧ - **مِخْلُوق** *Créature (F). Creature (E).*  
كل كائن حي يدعى مخلوقاً . والمخلوقات الحية تقسم الى ملكتين بملكة الحيوان وملكة النبات || ملكة النبات تقسم نحو ٢٥٠ مليون نوعاً تنتمي الى مئات الفصائل والرتب والمصفوف || اما الملكة التفرقيية فمختلف انواع الحيوان المعروفة فهو نحو مليون ومائتين عشرين ألفاً كما هو مبین في الجدول التالي .

العدد التقريبي لمختلف أنواع الحيوان المعروفة  
*Nombre approximatif d'espèces animales connues*

صف	صنف	عدد الأنواع	Sub-classe	Classe
فقاريات	٩٠٠٠٠			Vertébrés
مفصليات	<ul style="list-style-type: none"> <li>حشرات ٧٥٠٠٠٠</li> <li>عنكبوتيات ٣٠٠٠٠</li> <li>قنبريات ٢٥٠٠٠</li> <li>دعماحيات ٨٠٠٠</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Arachnides</li> <li>Crustacés</li> <li>Myriapodes</li> </ul>
رغويات	١٠٠٠٠٠			Mollusques
حليقات	٨٠٠٠			Annélides
حويالات عظمية	٤٠٠٠			Bryozoaires
شوكيات	٥٧٠٠			Echinodermes
سلكيات	١٠٠٠٠			Nématodes (vers ronds)
برميات	١٤٥٠٠			Vers plats
ميرمكات	١٠٠٠٠			Catéodéris
إسبنجيات	٤٣٠٠			Spongiaires
أوكليات	٣٠٠٠٠			Protozoaires
دورات	١٥٠٠			Rocifères
مخلف	٢٠٠٠			Divers
	١٠٨٠٠٠			

٢٥٩٧٨ - **مِخْلَكُور** *Zymosimètre, Zymoscope (F).*  
*Zymosimeter (E).*

أقمار جهاز تقاس بواسطة درجة اختار السوائل .

٢٥٩٧٩ - **مِخْلَس** ، **مِخْلَسُ الزُّوْبَا** ، **مِخْلَسُ الْأَضْلاع** *Pentagone (F). Pentagon (E).*  
من الاشكال الخماسية وغيرها ما هو مركب من خمس زوايا او خمس اضلاع .

٢٥٩٨٠ - **مِخْلَسِي** *Pentagonal*  
ما كان شكله شكل الخمس .

٢٥٩٨١ - **مِخْلَبَة** \* *Tagetes (S). Tagète (F).*  
*Marigold (E). Saintpaulum, Studentenblume (D).*  
*Tagete, Puzzoloni (I).*  
جنس نباتات من الشرويات وفصيلة المركبات . انواعها عديدة معظمها بري . اوراقها لا قياسية الشكل والارتكاز . ازهارها صفراء اللون او برتقالية . بتلاتها حلية المسس يفرح منها عند اللس رائحة مسهبة || أشهر انواعها البرتقالية ما يلي .

٢٥٩٨٢ - **مِخْلَبَة جِيلَة** ، **قَرْنَفُل الهند** *Tagetes patulus (S). Tagète touffue, Œillet d'Inde, Veloutine, Passo-velours (F).*  
نوع من الحمضية الزيتية المشهورة . عروها عنبدة

٢٥٩٧٧ - **مِخْلَب** *Griffe (Hort.) (F). Root (E).*  
كلمة تطلق على جذور وخصوص وبجذامير بعض النباتات لقرب شبهها بالغالب .

٢٥٩٧٨ - **مِخْلَب التَّيْن** *Pterospora (S).*  
*Ptérospora (F). Dragon-root (E). Drachenrootbaub (D). Pterospora (I).*  
عشبة طفيلية معمرة في فصيلة المخلنجيات . اصلها انبلاد الباردة . تتميز بازهارها المعقودة التجسج الطريقة الشكل .

٢٥٩٧٩ - **مِخْلَب الصَّكَب** *Astragale (F).*  
هو الاسطراغالوس ، من نباتات الفصيلة القرنية ، اطباها .

٢٥٩٧٠ - **مِخْلَدَات** *Crassulaceae (S).*  
*Crassulacées (E).*  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القممالات . اجناسها وانواعها نغده ٢٠٠ معظمها نبات عشبي وبعضها جنبي . اوراقها متعاقبة لحية صغرة . ازهارها ، في الغالب ، عشوية وهي ابطية او هامية الارتكاز ، حيلة الشكل ، زاحية الاكوان . نباتاتها رغبة تمشي في جميع الارربة وقد تفصل القليلة الحبس .

٢٥٩٧١ - **مِخْلَدَة \*** ، **دَم العَاشِي** ، **زَرْ حِجَبي** *Gomphrena (S). Gomphréne, Amarantoide (F). Globe amarant (E). Gemeiner Kugelamarant (D). Amaranto, Amarantoide (I).*  
جنس نباتات عشبية مزينة من فصيلة القططيات . انواعها للمرة نحو ٨٠ معظمها بري وبعضها ترابي . اوراقها لاطنة متعاقبة . ازهارها نورية التجسج ، ابطية الارتكاز او طرية || أشهر انواعها الزيتية ما يلي .

٢٥٩٧٢ - **مِخْلَدَة بَرْتَقَالِيَة** *Gomphrena haszeana, G. aurantiaca (S). Gomphréne orange, Amarantoide de Haage (F).*  
عشبة حولية جادسة تغلغ نحو ٤٠ سم . اوراقها بيضيه النصل . ازهارها برتقالية اللون ، نوريها ثلاثية الازهار الكبيرة القند || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٥٩٧٣ - **مِخْلَدَة كَرَوِيَة** *Gomphrena globosa (S). Gomphréne globe, Amarantoide globe, Immortelle violette (F).*  
وقس (عاشق ومشرق) عشبة حولية قراء ثمانية تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها سانية النصل . ازهارها بنفسية اللون ، نوريها ثلاثية الازهار || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٥٩٧٤ - **مِخْلَدَة لَطِيْفَة** *Gomphrena pulchella (S). Gomphréne gracieuse, Amarantoide gracieuse (F).*  
عشبة حولية مبروتية قراء تملو نحو ٥٠ سم . اوراقها سانية صيغة تقطول نحو ٥ سم . ازهارها ودية اللون ، نوريها ثلاثية او خاسية الازهار ، قطرها يراوح من ٢ الى ٣ سم . || ازهارها يستمر من الصيف الى الخريف .

٢٥٩٧٥ - **مِخْلِس \*** *Sorbus aria (S). Alouchier (F). Chequer tree, Maple service, Wild service tree (E). Wilder Elsebeerbaum (D). Bacarello, Mangiolo (I).*  
نوع من الصربة وهي شجرة برية قراء برمية الشكل تملو من ٢ الى ١٥ م . اوراقها متعاقبة ، صابلة . نصلها يطول من ٦ الى ١٤ م . ويعرض من ٤ الى ٩ سم .



مخلدة



مخلص



مخار



مخلية

٢٥٩٩٥ - **مُخَيَّرَكَة** \* Culture de concombre (F).  
زراعة الخيار وموضع هذه الزراعة .

٢٥٩٩٦ - **مُخَيَّض** \* Babeurre, Lait écorné (F).  
Whey, Buttermilk (E).  
الحليب الباقى بعد فرز شدته ، ويؤلف أيضاً بالمخفوش .

٢٥٩٩٧ - **مُخَيَّطُ الْمَاء** \* Ceyx  
جنس طير من القريبات. أنواعه ثمانية موطنها البلاد الآسيوية. تتميز بمناظرها الكبيرة القند الطليقة القاعدة الحمراء اللون. اجنحتها طويلة ، أذناها وراسها قصيرة . ألوانها الى الصبغة البرتقالية . رؤوسها واجنحتها سود تملوها نمشة بيضاء || تألف الشطوط البحرية ويجاري الماء . قوتها الاسماك والقشريات والحشرات حل اختلاف فصائلها. انماها تلدن في صدف الصغور تبين من ٧ الى ٩ بيضات تحضنها نحو الاسبرين .

٢٥٩٩٨ - **مُخَيَّطَة** \* Sébeste (F). Sebesten (E).  
خمرة الحطاة اي اللين . كانت ولا تزال تستعمل في الطب لتلين الصدر . كما تستعمل في صناعة ديق الطير .

٢٥٩٩٩ - **مُخَيَّطِيَّات** \* Cordiaceae (S).  
Cordiscaeae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها كثيرة المدد ، اعطائها البلاد الحارة والاستوائية . اشهر اجناسها الحطاة المعروفة بالسبتان .

٢٦٠٠٠ - **مُخَيَّكَة** \* Nimbus  
هي اللججة ، نوع من الغيوم ، اطلها .

٢٦٠٠١ - **مُدَّ** \*  
المُدَّ ، سكيال لا يقايي الحجم يختلف من بلاد الى بلاد ومن منطقة الى منطقة في ذات البلاد . ج امداد ومددة ومداد .

٢٦٠٠٢ - **مُدَّاعِيل** \* Abouissants (F).  
Bordering upon (E).  
هي قطع الارض المجاورة للملك من جهة الطريق .

٢٦٠٠٣ - **مُدَّاد** \* Plagiotrope (F).  
نمت وصفي يطلق على كل نبات نوعية جلوره اقية الانتساب .

٢٦٠٠٤ - **مُدَّاد** \* Hemidactylus turcicus (S).  
Hemidactylus verruculeux, Margouillat (F).  
حيوان يربوس من الغطاء وفصيلة الوزفريات . جسمه صغير القند يطول نحو ١٥ سم. رأسه بيضي اللون . عيانه مساحتان . اجفانه شفافة ثابتة . اذناه واذنيه المشاء الصواني المكفوف . لسانه مفلوق الطرف . ظهره مشطلي . بطنه كثير الحراشف الصيقة . ذنبه سريع الانقسام . قوائم صغرة . اصابعه نصفية الحطاب مجزئة بلواقظ حمزة تمكثها من السير على السقف || ثوبه الى الصبغة الخضيلة المرقشة بالانمز والاعير ، لكنه يمان الحيط الموجد فيه || يألف المواتح الكثيرة الحجازة والسكان الاضية . يسرح في التبار وفي الليل . قوته الذباب واليربوس والنايك والدبدان || يعتبر من الزخافات النافعة .

٢٦٠٠٥ - **مُدَّاد** \* Traçant (F). Running (E).  
نمت تمرني يطلق على الجلود الاقية الانتساب وعلى السوك التي تفتش التربة .

فوارقها لله النبات ولون الانزاع . جميعها حولية تملو من ٢٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها لا قياسية الارتكاز ، خلية النصل . انزعاجها عطيفة الجميع . تاجية . ثوبها الى الصفرة المتفاوتة التشويج والمواج || تنورها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٥٩٨٣ - **مُخَيَّلِيَّة لَامِيَّة** \* Tagetes lucida (S).  
Tagète luisante (F).  
عشبة سرودية معمرة ، طرشيوية الرائحة والطعم ، تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها كاملة متعابلة . نصلها ساني الشكل، مسن الحافة ، لامع الصفحة الشديدة الخضار . ازهارها احداق متعابدة كالمعقود . ازهارها لينة نارية اللون || تنورها يستمر من آب الى تشرين الثاني .

٢٥٩٨٤ - **مُخَيَّلِيَّة مَرْقَلَة** \* Tagetes signatus (S). Tagète mouchetée (F).  
عشبة سرودية معمرة تملو من ٩٠ الى ٧٠ سم. اوراقها متعابدة غرضة وسنتة . ازهارها حلقى التجميع . ازهارها ذهبية اللون مرقلة بالجلوي || تنورها يستمر من تموز الى تشرين .

٢٥٩٨٥ - **مُخَيَّلِيَّة مُتَنَصِّبَة ، وَرْدَة الهِنْد** \* Tagetes erecta (S). Tagète dressée, Rose d'Inde (F).  
عشبة سرودية حولية تملو من ٨٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها لا قياسية الارتكاز ، كثيرة التشريح القدي المسن . ازهارها عطيفة التجميع ، كبيرة القند ، ثوبها الى الصفار الكبريتي اللامع || تنورها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

٢٥٩٨٦ - **مُخَيَّن** \* غن العيد : قشره .

٢٥٩٨٧ - **مُخَيَّنَات** \* Androgyne (F).  
Androgynous (E).  
نمت تمرني يوصف به كل نبات يجعل الانزاع الذكورية والانثوية معاً كالجزء مثلاً .

٢٥٩٨٨ - **مُخَيَّق** \* Etouffoir (F). Extinguisher (E).

٢٥٩٨٩ - **مُخَيَّيَّات** \* Hyalostilbacées (F).  
Hyalostilbaceae (E).  
عمارة تطور مجهرية من فصيلة الكبيبيات، تتميز باصفاها المروائية للشفافة . اجناسها وانواعها عديدة اما المزدوي سها قليل . اشهر اجناسها المؤذية الازارية والكحية .

٢٥٩٩٠ - **مُخَيِّي ، مُخَيَّيَّي** \* Sensorial (F).  
Sensorial (E).  
نمت تمرني يطلق على كل ما هو منسوب الى الخيخ .

٢٥٩٩١ - **مُخَيَّب** \* Hétérogame (F).  
Heterogamous (E).  
نمت تمرني يطلق على النباتات المزواجية التي تحمل زهوراً ذكوراً واناثاً في تزوير واحد . راجع فيرن .

٢٥٩٩٢ - **مُخَيَّبَال** \* Epidiascope

٢٥٩٩٣ - **مُخَيَّبَخ** \* Sensorium (F). Sensorium (E).  
الخيخ مركز الحواس في الدماغ اي انة المركز الذي يتلقى الاحساس وينظمه .

٢٥٩٩٤ - **مُخَيَّر ، مَدِّي ، مَهْو** \* Lait mouillé (F). Milk and water (E).  
هو الحليب الميعوب بالماء .



مُخَيَّطُ الْمَاء



مُدَّاد

## ٢٦٠١٧ - مَدَّاهِين صَفْصَالِي الرَّقَى \*

*Helianthemum salicifolium* (S). *Hélianthème à feuilles de saule* (F). Willow leaved rock-rose (E). *Sonnenröschen*, *Citrörschen* (D). *Eliantemo* (I).  
بجلة سبروتية تملو من ١٠٠ إلى ١٢٠ سم. فروعها منفردة مسطولة. أوراقها متعقبة صفصافية الشكل. أزهارها حثركلية التجميع، محورية الإرتكاز، ولها الی الصفار اللهبی اللامع تملو رقتة أرجوانية || أزهارها يستمر من أيار إلى آب.

٢٦٠١٨ - مَدَّاَوَاة (F). *Treatments* (E).  
هي المداجلة و أطبها .

٢٦٠١٩ - مَدَّسَب و مَوْتَسَب (F).  
*Acuminé* (F). *Acuminata* (E).

نمت تعريفی توصف به أعضاء النبات والحشرات التي تنبت على شكل الحنة و بدتها .

٢٦٠٢٠ - مَدَّيْنَة و مَتَيْنَة (F).  
*Tannerie* (F). *Tannery* (E).

٢٦٠٢١ - مَدَّة (F). *Délai* (F). *Delay*, *Time* (E).

٢٦٠٢٢ - مَدَّكَرَات (F).  
*Entélégyes* (F). *Entelegyna* (E).

فتة من العناكب تتميز ببيوتها المركبة من ثمان زلأم و بالنباتات الكشورية المشرقة عند الذكور و الاناث .

٢٦٠٢٣ - مَدَّج \* و مَشَّق \* (F).  
*Notacanth* (F).  
جنس اسماك بحرية من فصيلة المذجيات. أنواعه المعروفة قليلة منتشرة في جميع بحار العالم . اجسامها مستطيلة الشكل مدنية، طول من ٣٠ إلى ٤٥ سم. رؤوسها مقبوضة، اخطاها منقبضة صغيرة. عيونها مستديرة بارزة . زعانفها الظهرية مؤلفة من ٦ اشواك حادة، أنفها الى السمة الرصاصية يطولها مزاج اسفح . لحونها مأكولة متوسطة الصنف .

٢٦٠٢٤ - مَدَّج مَبْدُول \* و مَشَّق مَبْدُول (F).  
*Notacanthus vulgaris* (S). *Notacanthus commun* (F). *Common Notacanthus* (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة المذجيات ورتبة ثنائيات الزوائف . اصحابها معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ونها البحر الابيض المتوسط . تتميز من اسماك الثغاف المتوسطة الغور || جسمها سطوي الشكل ، مستطيل الذنب ، متعدل التتبطيع ، يطول نحو ٤٥ سم. ثوبها الى اللسنة الرصاصية السفاه المزاج . ظهرها شديدة السمرة . بطنها باحت الخضاب . رأسها شارف الجبهة . منقبض الخطر ، صغير الفم ، قصير الشفق العريض . اسنانيا صغيرة و ذرية . عيناها صغيرتان ، بارزتان . حذقة عيناها سوداء لامة . زعنفتها الظهرية كثانية من ستة مناسخ متتابعة منطقة ، شائكة . الصدرية تساعية الشع الشع السرة . الحوضية بطنية الإرتكاز ، سباعية الشع ، الفرعية مستطيلة ، غيبية ، تمتد حتى طرف الذليل و يتقدمها تسعة مناسخ حادة الاطراف . ذيلها عادم الزعقة ، دقيق الطرف || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٦٠٢٥ - مَدَّجِيَّة (F).  
*Poulailler* (F). *Hen-house*, *Hen-roost* (E).

هي ذرية الدجاج المشيدة وفقاً لقواعد الفن والمغتصبات الصحية .

٢٦٠٠٦ - مَدَّكَرَة (F).  
*Verminière* (F).  
حفرة يرق فيها الود الذي يحمل طعاماً للسك .

٢٦٠٠٧ - مَدَّكَر و فُلْكَ (F). *Orbite* (F). *Orbit* (E).  
طريق الكوكب السيار .

٢٦٠٠٨ - مَدَّكَرَة و قَبَّة (F). *Orbital* (F). *Orbital* (E).  
المدايرة خط سير الجرم المتحرك .

٢٦٠٠٩ - مَدَّكَرِي و فُلْكَِي و قَبِّي (F).  
*Orbital* (F).  
نمت تعريفی يطلق على كل ما له صلة بخط سير الاجرام المتحركة .

٢٦٠١٠ - مَدَّاقَة (F).  
كل سمكة تعيش بين الصخور لا تبعد عنها تدعى مَدَّاقَة .

٢٦٠١١ - مَدَّام (F).  
*Vin*  
هو الخمر والنبيذ وابن الحانة وابن اللذ .

٢٦٠١٢ - مَدَّامَكَة (F). *Oenologie* (F). *Oenology* (E).  
هي علم الخمر ، علم يبحث في صنع الخمر وسفطها .

٢٦٠١٣ - مَدَّان (F).  
*Eau salée*, *Eau de mer* (F). *Sea-water* (E).  
المد الملح ، ماء البحر .

٢٦٠١٤ - مَدَّان \* (F).  
*Plectranthus* (S). *Plectranthus*, *Chinese basil* (E). *Hahnensporn* (D). *Plectranthro* (I).  
جنس نباتات جنتية معمرة عطرية من فصيلة الشفويات. أنواعه زهاء ٤٥ معظمها بري ومنها تربسي . سوقها فروعها تملو من ٦٠ إلى ١٥٠ سم. فروعها غيبية الانفرج زباه اللحاء . اوراقها كاملة متعاقبة متعقبة . نصلها قلبي الشكل ، مسن الحافة ، خلي للبرشة حسل صفحتيه . ازهارها صغيرة القند زقاء اللون حثركلية التجميع فواحة العرف المستعيب الذي يفر منه العث .

٢٦٠١٥ - مَدَّاهِين و زَهْرَة الشَّمْس (F).  
*Helianthemum* (S). *Hélianthème* (F).

جنس نباتات مجلية معمرة من فصيلة الالذنيات . أنواعه عديدة معظمها بري منبت الجبال والخصاب و بعضها تربسي يزرع بين الصخور . سوقه فروع . فروعه مستطيلة . اوراقه لا قياسية الإرتكاز والشكل . ازهاره صغيرة القند متعددة الالوان . وهو يرغب في المواق الجافة وفي الامراض الجنوبية الكثيرة الصبح || احرف أنواعه وأشهرها ما يلي .

٢٦٠١٦ - مَدَّاهِين شَالَع \* (F).  
*Helianthemum vulgare* (S). *Hélianthème commun* (F). *Herbe d'or* (F). *Sun-rose*, *Common rock-rose* (E). *Echtes Sonnenröschen* (D). *Panaces*, *Chironia*, *Erbo d'oro* (I).

نوع من المدايين ، فروعه الزراعية عديدة، تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. فروعها مستطيلة . اوراقها متعاقبة اذنية . نصلها بيضي الشكل يطول من ١٠ إلى ٤٥ سم. ويرس من ١٥ إلى ١٥٠ أزهارها بسيطة او مكبسة تعرض من ٤ إلى ٤ سم. اوراقها عديدة تختلف باختلاف الفروغ منها الاصفر والابيض والوردي والاحمر || ازهارها يستمر من أيار إلى آب .



مدان



مدايين شائع



مدايين صفصالي الرق



مدج مدول

تتقضى وتتكور عند الطلب . بعض اجناسها أدري والبعض الآخر جزئي التسنين || اشهر اجناسها التاتو والتاتوزيه والبعار .

Ferme d'élevage (F).

٢٦٠٢٦ - مَدَنِيَّة ٥

Rearing farm (E).

هي المزرعة المخصصة لتربية الدواجن من أي جنس كانت . وهي تشمل الأرض وما عليها من أبنية ومعدات .

٢٦٠٤٢ - مَدَنِيَّة ٥

Crocethia alba (S).

Corcort des sables (F). Sanderling (E).

طائر من طوال الساق القواطع وفصيلة الزرقائيات ، مشاه بعض شطوط البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر . مصيفه شطوط البحار الشمالية ، قوته البذبان والقشريات والرخويات التي تلتفها الأمواج || جسمه صغير القد يطول نحو ١٨ سم . ثوبه الصيفي إلى السوداء تلوو رقشة صناعية يتخللها الأبيض في الرأس والرقاء والجناح والذنب ، صدره إلى الشقعة ، بطة أبيض . متقاده وساقه إلى السمرة السوداء . ثوبه الشتوي إلى البنية في الرأس والرقاء والجناح والذنب وإلى الأبيض الناصع في الصدر والبطن . الأني تتحل بنفس الثوب || يذتن النحوصه في الربال . الأني تحضن رسلها من ٢ إلى ٤ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٧ يوماً .



مدنية

٢٦٠٤٣ - مَدَنِيَّة ٥

دوية تسج كالمتكبر (اللسان) .

Tropisme (F). Tropism (E).

شلج عرشي في نحو بعض أعضاء الاجسام الحيوانية والنباتية تثر فيه وتوجهه بعض العوامل الخارجية كالنور والحرارة والصقيع والافئذاء .

Fumivore (F).

٢٦٠٣٠ - مَدَنِيَّة ٥

Smoke-consuming (E).

نعت تعريفي يطلق على كل جهاز يتنص الدعان ليجرقه .

Polypter (F). Polyp (E).

٢٦٠٣١ - مَدَنِيَّة ٥

مجموعة من المذيع تيش على قاعدة كلسية واحدة .

Provision (F).

٢٦٠٣٢ - مَدَنِيَّة ٥

Provision, Store (E). اطلها .

Apport (F).

٢٦٠٣٣ - مَدَنِيَّة ٥

Lactigène (F).

٢٦٠٣٤ - مَدَنِيَّة ٥

Lactigenous (E). كل ما ينشأ الدُر ويُرِد من قدره .

Tubérigène (F).

٢٦٠٣٥ - مَدَنِيَّة ٥

نعت تعريفي يطلق على الجين المندرة الشكل .

Glabe, Moete de boue (F). Giebe, Sod, Clod (E).

٢٦٠٣٦ - مَدَنِيَّة ٥

الكنتة من التراب المماسك .

Galéga (F).

٢٦٠٣٧ - مَدَنِيَّة ٥

هي المكانة ، اطلها .

Processus (F). Process (E).

٢٦٠٣٨ - مَدَنِيَّة ٥

انظور التدرجي النتيق المتتابع .

Batteuse (F).

٢٦٠٣٩ - مَدَنِيَّة ٥

Threshing-machine (E).

آلة ميكانيكية تستعمل لدرس الحنطة والشعير .

Armadille (F).

٢٦٠٤٠ - مَدَنِيَّة ٥

هو التاتو ، حيوان صلب الجلد المندرج ، اطلها .

Dasypodidae (S).

٢٦٠٤١ - مَدَنِيَّة ٥

Dasypodidae (F). Dasypodidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة . اجناسها واقواها المعروفة عديدة جميعها ملحقة بدروع عظمية وضفوفية حزامية التركيب

٢٦٠٤٧ - مَدَنِيَّة ٥

Requérant, Demandeur (F). Plaintiff, Pétitioner (E).

٢٦٠٤٨ - مَدَنِيَّة ٥

جوزة التاربييل المفردة من لها ينفر بها .



مدريون



مشاشة زبا

Dopé (F). Doping (E). ٢٦٠٦٤ - **مُدْمُوش** \*

من اجترع للمشفة ان كان انساناً او جرّح المشفة ان كان حيواناً .

Cuverie, Cuvier (F). ٢٦٠٦٥ - **مُدْكُفَة**  
السرداب او البناد الذي تحفظ فيه دنان الخمر .

Pommelé (F). Dappled (E). ٢٦٠٦٦ - **مُدْكُر**  
شبة من شيات الخليل وهو ان يكون في شعر الفرس لكت تحالف سائر لونه .

Oléomètre (F). ٢٦٠٦٧ - **مِدْهَكَان** \* ، **مِدْهَات** \*  
Oleometer (E).  
جهاز تقاس به كثافة الادعان والزيوت .

٢٦٠٦٨ - **مُدْهَوْب** \*  
Nécrosique, Nécretique (F). Necrotic (E).  
المدهوب من النباتات ما كان مصاباً بالذهب أي النخر .

Orbiculaire (F). Orbicular (E). ٢٦٠٦٩ - **مِدْوُكَار**

Spatule rose (F). ٢٦٠٧٠ - **مِدْوَالَس**  
هو الملاحقي ألودي، طائر من طول الساق ، اظله .

Trochanter (F). ٢٦٠٧١ - **مَدْوَر** ، **مِدْوَر**  
عضو يجمع الحرقلة الى الفخذ .

٢٦٠٧٢ - **مِدْوَر** \*  
Cyclomètre (F). Cyclometer (E).  
جهاز يستعمل لقياس الدوائر .

٢٦٠٧٣ - **مُدْوَس** \* ، **مَدْوَر** ، **قَرْجَ الْبَحْرِ**  
Medusa (S). Méduse (F). Medusa, Jelly-fish (E).  
الوحيدة ملوسة وملونة . جنس حيوانات هلامية بحرية .  
انواعها واشكالها عديدة تغلب فيها الاستدارة .  
الوانها تراوح من الاصفر الباهت الى الازرق الساجوني .  
وهي تضيء في الليل وتبدو من بعض الظروف والحالات  
شفافة كالزجاج . واذا ذهرت من شيء قلفته برشاش ناعف  
يلدع كثرها النار . أشهر انواعها قنديل البحر وركبة البحر .

٢٦٠٧٤ - **مَدْوُوسِيَّات** \*  
Méduses (F). Medusae (E).  
حيوانات هلامية بحرية صغيرة القد تلتقي الى عدة فصائل  
واحدها ملوسة .

٢٦٠٧٥ - **مَدْوُوكَة** \*  
Madoqua (F).  
جنس ظباء افريقية متوسطة القد ، ربعة الجسم ، جملة  
الشكل ، حنطة الثوب ، مستطيلة الاذن ، قصيرة الذنب .  
انثاها جهار . قرون ذكورها صغيرة القد ، مبطلة القرواح  
المتنامية الحيدة ، عاتلة الاطراف المستديرة المدببة .  
انثواها المعروفة سنة . اصحابها شامة الاطراف تمتد من  
تمام البحر الاحمر الى السودان والحيفة والصين والكمبوت .

٢٦٠٧٦ - **مَدْوُل** \*  
Médulle (F). Medulla, Pith (E).  
اسم يطلق على كاسل المكك النباتي ، والداعلي والخارجي .

٢٦٠٧٧ - **مَدْوُلَم** \* ، **دَوْلَمِي** \*  
Dolomitique (F). ٢٦٠٧٧ - **دَوْلَمِي** \*  
Dolomitic (E).  
نعت تعريفي يطلق على ما كان تركيبه دؤولم .

Plaignant (F). ٢٦٠٤٩ - **مُدْعِي**  
Plaintif, Complainant (E).  
هو من رفع ظلامته او دعواه امام المحكمة .

Défendeur (F). ٢٦٠٥٠ - **مُدْعَى عَلَيْهِ**  
Defendant (E).  
هو الذي ترفع عليه الدعوى .

Conjuguees (F). ٢٦٠٥١ - **مُدْعَمَات**  
Conjugates (E).  
فصيلة نباتية من رتبة اخشيات الخضر . اجناسها وانواعها  
عديدة ، جميعها من نباتات المياه العذبة ، تتميز باشكالها  
الطليعية الماددة الفروع .

Alléomorphe (F). ٢٦٠٥٢ - **مُدْعُوش** \*  
نعت تعريفي يطلق على الصفات المتباينة المختلفة .

Amont (F). ٢٦٠٥٣ - **مُدْقُق** \*  
Up-stream, Up-river (E).  
المدقق او حالية النهر هي الجهة التي تصدر عنها المياه  
الجارية . يقابلها المصب .

Enfouisseur (F). Burier (E). ٢٦٠٥٤ - **مِدْقَنَة**  
هي المطرقة ، أداة تصاف الى الحراث فتحرر التراب في التلم  
ليطوره مغلب الحراث .

Légende (F). Legend (E). ٢٦٠٥٥ - **مِدْقَال** \*  
تفسير ما في رسم او خارطة من حروف وعلامات وتصاویر  
والرمان الخ .

٢٦٠٥٦ - **مِدْقَة** \*  
Pistil  
هي طرف المتاع اي عضو التأنث في الزهرة . وهي عند  
ادراكها تفرز مواد لزجة تمكن جنينات الطلع من  
الاتصال للانصاب .

Pistillat (F). Pistillate (E). ٢٦٠٥٧ - **مِدْقِي** \*  
صفة الاظهار السيدة التي المجهزة بملقات اي اعضاء  
انثوية .

٢٦٠٥٨ - **مِدْقَال** ، **أُنْدِيس** \*  
Indices (F). Index (E).

٢٦٠٥٩ - **مِدْقَنَة**  
Placnaie (F).  
Plantation of plane-trees (E).  
غابة الدلب والارض الكثيرة الدلب .

٢٦٠٦٠ - **مِدْقُج**  
Hérissou (F).  
هو القنفذ ، اظله .

٢٦٠٦١ - **مِدْقَالِك**  
Cordon du maçon,  
C. du charpentier (F). String, Strand (E).  
للمدك هو خيط البناء والنجار . وقد شاع استعماله للدلالة  
على صاف الحجارة البنية .

٢٦٠٦٢ - **مِدْقَكَة**  
Râteau (F). Rake (E).  
اداة تنشي بحشفة ممتدة تتخلل اسنان من حديد تدم  
بها التربة أي تسوي .

٢٦٠٦٣ - **مَدْمَدِي** \*  
Fluviatile (F). Fluvatile (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان يعيش في المياه العذبة .  
وعلى كل نبات يعيش فيها او ينبت على ضفافها وبريقها .



مدقة



ملوس



مدركة



Dichogamie (F).

Dichogamy (E).

تفاوت زمن الإدراك التناسلي الذي يحصل بين الأعضاء الذكورية والانثوية في تنور بعض النباتات .

Coursier très rapide (F).

٢٦٠٨٩ - مدّاق

الفرس السريعة جداً .

٢٦٠٩٠ - مدّال \* ، مدّشك مدّبل \*

Centetes ecaudatus (S). Tanrec commun (F).

Tanrec, Tenrec (E).



مدّبل

حيوان ليون حاشي وحيد الجنس والنوع من فصيلة اللدليات. موطنه جزيرة مدغشكر . يألئ المناطق الجبلية حيث تكثر السراخس . مسرعة دجوي . قوته البدان والحشرات وبعض جلود النبات || جسمه مكروم صمغوي يطول نحو ٤٠ سم . رأسه شبه مخروطي الشكل ، مستطيل الخطم . فكك الأعلى يتقدم الأسفل . عيناه صغيرتان . أذناه مستعرضتان . ذنبه ماسح لا يوجد له . جرابه قصيرة أصابعه قوية . أظفاره مخيطة ، حادة الأطراف . حلبة لبد قصير تتخلله مسال ذرية الأطراف متباينة الطول والكثافة تكثف الرأس والعتق ويحيط الظهر حتى الكفل || يباته الشتوي يستمر نحو خمسة أشهر . جمره نفق مستطيل يحضره في التربة || الاتق ثلثو تضع في كل رمص من ١٥ الى ٢٥ جرأ .

Centetidae (S).

٢٦٠٩١ - مدّاليات \*

Centetidae (F). Centetidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة حاشرة . اجناسها وأنواعها قليلة العدد أعطتها جزيرة مدغشكر || اجسامها صغيرة ، مكروية ، متقبضة ، أخطامها مستطيلة جرابها قصيرة . أظفارها قوية ، ذرية . بعضها كثيف الوريد الناعم ، قصير الذنب أو مستطيل والبعض الآخر ماسح الذنب أو عادمة ، حلبي الوريد وتطوّر مسال متباينة الكثافة واللؤلؤ || اعرف اجناسها اللدال والميسل والميكروفل والميكروفل .

Gobe-mouches (F).

٢٦٠٩٢ - مدّباب \*

هو أشكال الذباب ، أظله .

Muscipidae (S).

٢٦٠٩٣ - مدّبابيات \*

Muscipidae (F). Muscipidae (E).

فصيلة طير من الجوارح السليبات المنانير . أنواعها نحو ٣٧٥ جميعها من المصانير الصغيرة البند . أخطاها تشمل مختلف مناطق المسال القدم - تألف النباتات والحدائق والجائز . قربها الحشرات اغصها الذباب .

Autel, Vesta (F). Are (E).

٢٦٠٩٤ - مدّبح مريخ

الملبح المربع كوكبة نجوم جنوبية الملبح مركها تحت ذنب المغرب || حدد نجومها ثمانية منها ثلاثة من المرتبة الثالثة .

Terre nue (F). Naked land (E).

٢٦٠٩٥ - مدّحاة \*

الارض البور لا شجر فيها .

Gter (F).

٢٦٠٩٦ - مدّو \*

To spoil, To damage (E).

مذرت البيفة : فسدت فهي مذرة . والجوزة كذلك .

Polype (F). Polyp (E).

٢٦٠٧٨ - مدّ يخ \*  
جنس حيوانات بحرية من المحفّات . أنواعه عديدة ، اشكالها كالبات ، أفرانها كلسي المادة سريع التحجير تعيش عليه وفي داخله .

Barbotage (F). Mess, Mash (E).

٢٦٠٧٩ - مدّ يند \*

شراب مرطب للدواجن يرتكز على التقيق وبعض النخالة .

Cynanchum (S).

٢٦٠٨٠ - مدّ يند \*

Cynanche, Cynanque (F). Scamony plant (E). Roter Hundswürger (D). Scamones (I).

جنس نباتات مدادة من فصيلة الصقلابيات . أنواعه عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم . معظمها بري وبعضها تزييني . سوقها مدادة عظفة يستخرج منها عصارة لبنة طبية . أوراتها مثقفة متقابلة مزاوية التصل . أزارها خاسية التركيب ، صيوائية التجميع ، محورية الارتكاز . اعرف أنواعه واشهرها المدّ المدّ المطر .

Cynanchum indicum (S).

٢٦٠٨١ - مدّ يند عطر \*

Cynanque odorant (F).

جنية مصمرة متسلقة تطول نحو ٣٠٠ سم . ساقها وبريها عطرية اللحاء الخلية . أوراتها مستطيلة الاثاق . نصلها خلي الصنفعة يطول نحو ١٤ سم . ويرفص نحو ٨ . أزارها جرسية الشكل ، صفراء اللون ، عطرية الرائحة الشبيهة بالياسمين || أفرارها يستمر من اواسط تموز الى اواسط آب .

٢٦٠٨٢ - مدّ يكة \*

Turbo (S).

Turbo, Sabot (F). Turbo, Turban-shell (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل وفصيلة المنيديات . أنواعها المعروفة قليلة العدد أعطتها بحار البلاد الحارة || أصدافها كبيرة القد ، متساكنة ، محزونة الاعقاب ، لؤلؤية الصفحات الداخلية ، فسيمة الثغوات شبه المستديرة || لحومها مأكولة وأصدافها صناعية .

Turbinidae (S).

٢٦٠٨٣ - مدّ يقيات \*

Turbinidae (F). Turbinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل امانيات الجهاش . اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والاستوائية || أصدافها غليظة متساكنة لؤلؤية الصفحات الداخلية بعضها يشبه المدّة والبعض الآخر يشبه المداس || اعرف اجناسها واشهرها المدية والدرعوسية والنبيفة .

Débiteur (F). Debtor (E).

٢٦٠٨٤ - مدّ يدين \*

هو في الشمول من يجب عليه تنفيذ الالتزام وفي التخصص من كان عليه الدين .

٢٦٠٨٥ - مدّ يونية \* ، مدّ يوب \*

Débit (F).

Débite (E).

هو ما على المرء من حساب ودين أو ما هو مطلوب منه .

٢٦٠٨٦ - مدّ يخير \*

Intestins (F).


Intestine, Bowel, Gut (E).

هي الامعاء . يقال ملأت الدابة مدّ يخيرها .

٢٦٠٨٧ - مدّ ياع \*

Pore-épice à queue blanche (F).

هو الشحم الابيض الذنب ، أظله .



مدّية



مدّال

الى الصفرة يملؤها تجذيع ممترض لا قياسي الشكل اسود اللون. ورشناها الخلفيان مذنبان وبقيجان بالاحمر والاسفلح. تظهر في اوائل الربيع ، تمتع مكها على اوراق اللوز والدرناق والحوخ والكركوز فينبف من يرقات غاصلة تلثم بعض اجزاء الاوراق .

### ٢٦١٠٧ - مِذْرَآب مَكُون \* ، مَكُون \*

Papilio machaon (S). Machaon, Grand porte-queue (F).

فراشة كبيرة القند من عماره المذنايات . جسمها اسمر اللون . بسطها لا تقل من ٧٥ سم . ورشها الى الصفرة يملؤها تجذيع وتنبج وتسبق وتسليج متراكبة الالوان يكثر فيها الاسود والاسفلح والاحمر . ورشناها الخلفيان مذنبان. تظهر في اوائل الربيع . تمتع مكها على اوراق الجزر والشيار فينبف من يرقات تعيش على الاوراق فتلتهمها .

### ٢٦١٠٨ - مِذْرَآبِيَّات \*

Papilioninae عماره شحات من فصيلة الفراشيات ورتبة سرفشيات الاجنحة صرغيات القرن . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . منتشرة في جميع بلاد العالم . فراشاتها متوسطة القند وكبيرة . ألوانها متباينة الالوان الفاقمة . اشهر اجناسها المذنب والمذئاب والحيام .

### ٢٦١٠٩ - مِذْرَآب \*

Comète (F). Comet (E). كوكب طالع منتقل تلبه بحماة مضئية . حركة دورانه حول الشمس مستقيمة المدار || عدد المذنبات المعروفة حتى الآن يتناهز ١٥٠٠ اشهرها « مذنب هالي » الذي يظهر كل ٧٦ سنة وقد ظهر عام ١٩١٠ وظهور أيضاً عام ١٩٨٦ .

### ٢٦١١٠ - مِذْرَآب \*

Urodèle (F). Urodele (E). نعت تعريفي يطلق ، في علم الحيوان ، على كل دويبة او يرقة او اسروع مجعزة بذنب او بزايلة تشبه الذنب .

### ٢٦١١١ - مِذْرَآبِيَّ \*

Sperme (F). Sperm (E). هو مني الحيوان عامة ، راجع في .

### ٢٦١١٢ - مِذْرَآب ، حَال \*

Solvant (F). Solvent (E). مذيب

### ٢٦١١٤ - مِذْرَآبِيَّ ، مَغْيِرْ ، مَهْوْ \*

Laît mouillé (F). Whey (E). اللبيق والمخير والمهز ، مزيج من اللبن والماء .

### ٢٦١١٥ - مَرْ \* ، شَوْكَة \*

Croc, Trident (F). Hook, Trident (E). اداة تستعمل في الزراعة لقبب القرب .

### ٢٦١١٦ - مَرْ \*

Amer (F). Bitter (E). نعت يطلق على ما كان طعمه ضد الحلو .

### ٢٦١١٧ - مَرْ \*

Myrrhe (F). Myrrh (E). صمغ راتنجي يستخرج من سوقه شجر المر . قال الدكتور ديزي مفتاح في احياء التذكرة من الانطاكيا ما سرفيت : وهو السرى في المقالات وهو معروف يسيل من شجرة بالمغرب فيجسد قطعاً الى حرة صافية . ومنه ما يرسد على ساق الشجرة وقد جد كالكاجم وهذا هو المر المعروف بالبطارخ لانه يحساكي يفسح السمك في دسوته وسفرته

### ٢٦١٩٧ - مِذْرَآة \* ، مِذْرَآي \*

Fourche (F). Fork, Pitchfork (E). اداة من خشب او حديد تلوى بها الحنطة ويرفع بها الكلا والزبل وغيرها .

### ٢٦١٩٨ - مِذْرَآة \*

Semoir (F). هي المبدرة .

### ٢٦١٩٩ - مِذْرَآع \*

المذراع من الخيل والبر وسائر الدواب من كانت امة اشهر سلالة او مرقاً واجود اصلاً من ابيه .

### ٢٦١٠٠ - مِذْرَآع ، مِذْرَآع ، مِذْرَآع \*

Mouillage (F). Soaking, Wetting (E). هو المزج بالماء كخسل اللبن بالماء فهو مذيق وغير .

### ٢٦١٠١ - مِذْرَآقَة \*

Polyphyllis (F). Frenching (E). علة جسمية قليلة الاذن شائعة في جميع بلاد العالم تترى التير تشبه اتصال اوراقه وتقفى على صفه || منظرها الخارجي اصفرار في الاوراق يبدأ من سافة النصل وينتشر تدريجاً نحو الداخل الى ان يتناغم الصلغ فتير الورقة صفراء النسيج ، غضراء الصلغ والعروق ، رافعة الوثن الشين || وفي حال اشتداد البلة فانها تسبب وباط الشلة وترا كب الاوراق التي تصعب مدمرة ، مستطيلة اتصال الغبقة ، متصبية الأطراف ، ملتوية الرؤس || اسبابها الرئيسية عديدة ومتباينة انحصارها قلبية الترة وفرد وطوبها وضمت بحملها الازوتي وقلة موادها الضروسية ومصرها الجربوي || يقول العالم « ستينبرج » ان الملقرة حلة يجدها ذينان خاص يفرزه نقطور . ترى ينحس باليلوس سريوس . وان هذا اللبذنان الذي يسبب اختلال الايض الازوتي في النبات ينشط تكورن الحوامض الامينية اللبيلية التي تعمد حله الشرايب او تغرد اليها .

### ٢٦١٠٢ - مِذْرَآع ، مِذْرَآع \*

Adulte (F). Adult (E). من دخل في الدور الثاني من حياته وهو الدور الثالث بين الفترة والشينوخة .

### ٢٦١٠٣ - مِذْرَآقَة \*

Mémoire (F). Memorandum, Bill (E). حريضة تفصيلية تسرد وقائع القضية واسبابها وما آلت اليه .

### ٢٦١٠٤ - مِذْرَآة \*

Travail (F). Trave (E). آلة تربط بها الحيوانات الكبيرة لتدل تسهل مداواتها .

### ٢٦١٠٥ - مِذْرَآب الحَبِيَّات \*

Papilio alexandor (S). فراشة متوسطة القند من عماره المذنايات . جسمها اصفر اللون يملوه خط مستعرض قاطب اسود . بسطها نحو ٦٥ سم . ورشها الى الصفرة يملؤها تجذيع اسود اللون مختلف الاشكال والاحسام . ورشناها الخلفيان مذنبان وبقيجان بالاحمر || تظهر في اواخر الربيع ، تمتع مكها على منظم نباتات الفصيلة السويانية فينبف من يرقات غاصلة تعيش على الاوراق فتلتهمها .

### ٢٦١٠٦ - مِذْرَآب اللُّوز \*

Papilio podalirius, P. sinon (S). Flamé (F). فراشة متوسطة القند من عماره المذنايات ، جسمها حنطي اللون يملوه خط قاطب اسود ينقطع عند مؤخر الظهر ثم يعد فيملو البطن الى التخرج . بسطها نحو ٦٥ سم . ورشها



مِذْرَآة



مِذْنَاب الحَبِيَّات



مِذْنَاب اللُّوز



مِذْنَاب مَقُون



مَرْ

وسهوكه وليس بالريء. ومنه ما يعصر فيسيل ماء ثم يجمد مائلًا إلى السوداء ويصير الحبة السائلة ويسعى للز الحليبي وهو دين الثاني || وهو ركن عظيم في المرام والألاكحال على اختلاف أنواعها. وهو ينفع سائر التزلات والصداع...

يكتسب به فيحل المدة وغلظ الجفن، ويزيل الرماد بلبن النساء، والقرع بماء الورد والحلبة. ويدمل سائر القروح إذا نثر فيها وقد غسلت قبله بماء لسان الحمل. ويشد اللطف ويزيل قروصها ويوسعها والاسنان بالغمر والزيت مضغصة. والسهال ووجع الظهر، وشربة القصبه استحلًا في الدم. وواجب الكبد والكلى، والمثانة والبدان شربًا خصوصًا مع الترس والافستين. وأمراض الإبرام خصوصًا الصلبة والكتن حتى احتماله ولو بماء الأس. ويلجم الفتق إذا تموي عليه ويحل حرق النساء والمفاصل والقرص مطلقًا. ويزيل نثر الأبط بالبش وضعت الشعر. وانتثاره بالغمر والالادن ودهن الأس، والقروح بالسل، والتآليل والأثار كلها. دغانه ينبت شعر الأفيان وينوم بنفسه شأ ويحفظ الحق طلاء مع دهن اللوز المر ينفع في أمراض الأذن، ومع التنع أمراض الأنف، وهو يفسر المثانة وينسقط الأجبة ويصلحه السمل ورشبه إلى ثلاثة ويده فلفل أو قسط أو جذباستر.

٢٦١١٨ - مِرَّ \* Commiphora myrrha (S). Myrrh tree, Myrrha (E). Myrrhenbaum (D). Albero del mirra (I). نوع من البلسان من فصيلة البخوريات. شجيرة صغيرة القند شائكة، يقطر الصمغ من ساقها حل شكل دموع حواء اللون شاحبة مغبضة. أوراقها معتقة مركبة ثلاثية الوريقات، أخشابها ولحاءها عطرية الرائحة النفاذة. صمغها جيد الصنف شائع الاستعمال الطبي.

٢٦١١٩ - مِرَّ افريقي \* Commiphora schimperi (S). Commiphore d'Afrique (F). African myrrh tree (E). Echter Myrrhenbaum (D). Albero del mirra d'Africa (I). نوع أشجر من المر، أعطانه البلاد الإفريقية يكثر في الجزائر ومراكش. شجيرة صغيرة القند شائكة. يستخرج من سوق صمغ راتنجي المادة جيد الصنف صلب اللون، شائع الاستعمال الطبي.

٢٦١٢٠ - مِرَّ حبشي \* Commiphora abyssinica (S). Commiphore d'Abyssinie (F). Coarsa myrrha (E). Afrikanischer Myrrhenbaum (D). Commifora (I). نوع من المر، أعطانه الحبشة وسائر أفريقية الشرقية وجزيرة العرب. شجيرة صغيرة القند شائكة. ثمارها مججمة الجوز كانت ولا تزال تستعمل في بعض المستحضرات الطبية. صمغ راتنجي المادة جيد الصنف يأتي بمد المر الأثري جودة.

٢٦١٢١ - مِرَّ سنج \* Métayer (F). Metayer (E). هو من استعمل الأرض بالمرارة، أغلب مزارع.

٢٦١٢٢ - مِرَّاة مسطشكة \* Andromède (F). Andromeda (E). المرأة المسلسلة كوكبة نجوم موقعها قرب القطب النجالي. عدد نجومها ٥٩ أشهرها ثور الرأس والسرة والقندم وصيد بالقرب من هذه الكوكبة سديم لولبي اكتشف عام ١٩١٢ يبعد عن الأرض نحو ٨٠٠٠٠٠ سنة ضوئية وقطره نحو ١٠٠٠٠٠ سنة ضوئية.

٢٦١٢٣ - مِرَّاة \* Enflourage (F). طريقة صناعية لاستخراج العطر تركز على مرث الاثمار في الدهن أو الشمع.

٢٦١٢٤ - مِرَّاح \* Etable (F). Scabie (E). هو ماوى البقر والقنم واللغز وسائر الدواب، أي موضع راحتها في الليل.

٢٦١٢٥ - مِرَّار \* Centauree étoilée (F). هو القنطريون النجمي، أغلبه.

٢٦١٢٦ - مِرَّاركة \* Vésicule biliaire (F). Gall-bladder (E).

٢٦١٢٧ - مِرَّاركة \* Amertume (F). Acerbic (E). وصف ميكروبي يترى أخطر فيفسها بعد أن يميب طمها اذ يجعله مر المذاق.

٢٦١٢٨ - مِرَّاركة الحشيش \* قنطريون صغير، قصه الحية، طوطر \* Erythrae centaurium (S). Erythrae centaurée, Petite centauree, Herbe à la fièvre (F). Earth-gall, Centaury, Fever wort (E). Echte Tausendgüldenkraut (D). Centaurea minore, Blondella, Caccia-fèbbre (I).

نوع من الاريثريا وهو نبات حشيش بري حولي طلي صغير القند. ساقه فروع مستقيمة. أوراقه متعاقبة صغيرة. نصلها ضيق المسطحة، حلي البشرة، أصلح اللون، شديد المرارة || يستعمل منه في الطب القنم الزهرية والأوراق وهي مقوية المعدة دافعة الحصىات. ويحضر منه متعوق هاضم يستعمل في حالات زيادة الحموضة والقرحة المعدية أو المعوية ذلك لأن هذا النبات يحوي بعض الأملاح القلوية بنسب كبيرة لها منافها الطبية.

٢٦١٢٩ - مِرَّاركة الصحاري \* Chicotin (F). هي الحنظل، أغلبه.

٢٦١٣٠ - مِرَّاس \* Ophonus sabulicola (S). حشرة من فصيلة الميراسيات. طرفا براوح من ١٤ إلى ١٧ مم. وأنها وكسلها إلى السمرة السوداء. غداها ال الزرقاء الصفراء يملؤها موانع اشقر || تكثر في الأتربة الكلسية. تركب أزهار نباتات الفصيلة الميراسيات وتلتهم البذور منه تكويها || رقاتها خاضعة قليلة الأذى.

٢٦١٣١ - مِرَّاس \* Chirotauthis (S). Chirotauthis (F). Chiroteuthis (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات وأصيات الأبريل وفصيلة المراسيات. أنواعه المعروفة قليلة العدد أعطائها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الأبيض المتوسط || اجسامها شبه وشية الشكل، زعانفها مستديرة طرفية الارتكاز. رؤوسها أسطوانية. عينها كبيرة صامخة. ثمانية من جرابها طليقة صعبة متقاربة الطول واثنان شديدا الطول عادتا الحاجبان ينهيان برعى سنانية الشكل.

٢٦١٣٢ - مِرَّاسِيَّات \* Chirotauthidae (S). Chiroteuthidae (F). Chiroteuthidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات وأصيات الأبريل، ثنائيات الخياشيم، عشاريات الجراب. اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المحيط الاطلسي



مر



مرارة الحشيش



مراس



مراس

تبتية اللون صناعية. أوزانها طيبة وصلبة || كانت قشور المران تستعمل استعمال الكينا قبل مرطبها وهي مرققة عاقفة للحراة. أما الأوراق فتفيد الفوصة والنقرس. احرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٦١٤١ - **مران أبيض** \* Fraxinus alba (S).  
Frêne blanc, F. d'Amérique (F). American white ash (E). Amerikanische Weissesche (D).  
شجرة سبروتية باسقة تملو من ٢٠ الى ٤٠ م. مهدا امريكية الشالية. أوزانها تطويل نحو ٣٠ م. وريقاتها تدم من ٧ الى ٩ ، تصلها ساني الصفة بطول ١٥ سم. ويعرض ٥ سم. وهو أحمل اللون مدبب المقصه سنن الحافة. انزهارها حشكولي ، طرفي وبحوري الازتكاز ، يطول نحو ١٠ سم. انزهارها يفضاء اللون.

٢٦١٤٢ - **مران أحمر** \* Fraxinus pubescens (S).  
Frêne rouge (F). American ash, Red ash (E). Amerikanische Rotesche (D). Frassino rosso americano (I).  
شجرة سبروتية تملو من ١٢ الى ١٨ م. وريقاتها تدم من ٧ الى ٩ ، تصلها أخضر اللون يحمر في الخريف وهو سناني الشكل مدبب المقصه سنن الحافة يطول نحو ١٢ سم. صفحته السفلى خلية البشرة. انزهارها حشكولي ، طرفي وبحوري الازتكاز ، يطول نحو ١٥ سم. انزهارها فستقية اللون.

٢٦١٤٣ - **مران أسود** \* Fraxinus nigra (S).  
Frêne noir, F. à feuilles de bureau (F). American black ash (E). Amerikanische Schwarzesche (D). Frassino nero (I).  
شجرة سبروتية جميلة الشكل، تملو من ١٠ الى ٢٠ م. براعمها خضراء خضر نمشة بالاسود. وريقاتها تدم من ٩ الى ١١ ، تصلها بيضي الشكل ، لاملي الانتشاب، حابق الخضر. انزهارها حشكولي التجميع ، كبير اللقد. انزهارها فستقية اللون.

٢٦١٤٤ - **مران ذروب الورق** \* Fraxinus oxyphylla (S). Frêne oxyphylle (F).  
شجرة متوسطة اللقد تملو من ١٠ الى ١٥ م. براعمها الى الشقة السفعاء المواج. وريقاتها تدم من ٧ الى ١٣ ، تصلها سناني الشكل ذروب الزوام الاخضر، صفحته السفلى خلية البشرة. انزهارها حشكولي التجميع طرفي الازتكاز. انزهارها بيض.

٢٦١٤٥ - **مران شامخ** \* Fraxinus excelsior (S).  
Frêne élevé (F).  
أكبر انواع المران واشهرها واسرعها نموًا وانعمها. مجبرته سبروتية تملو من ٣٠ الى ٤٥ م. خراصمها اسطوانية، براعمها سود. وريقاتها تدم من ٩ الى ١٥ ، تصلها سناني الشكل، سنن الحافة. انزهارها حشكولي التجميع، طرفي الازتكاز وبحوري. انزهارها بيض يطولها موج اخضر. يستخرج من سوقها باطن لا بأس به سكري الطعم يحوى نحو ٧٠ ٪ من المنبت.

٢٦١٤٦ - **مران شائع** \* **متي** \* Fraxinus ornus (S).  
Frêne à fleurs, F. à manne, Orne commun (F). Manna-ash, Flowering-ash (E). Blumen Esche, Manna Esche (D).  
شجرة سبروتية ميلولة تملو نحو ١٥ م. فروصها حر

والبحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه وشمية الشكل او جرابية. زعانفها مستديرة طرفية. رؤوسها مستطيلة. عيونها كبيرة ماحكة. جرمها لامتناهية الطول والشكل || اعرف اجناسها واشهرها المران والمرس.

٢٦١٤٣ - **مراش** \* Spinax (S).  
Spinax (F). Spinax (E).  
جنس اسماك بحرية مفترسة من فصيلة المراهيات. انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمتعددة الحرارة || اجسامها مسطيلة ، شبه وشمية الشكل. اعطائها ذلقة شارفة. اسنانها منشارية ، حادة تقطع كل شيء. جلودها مجعبة. زعانفها كبيرة. الذيلية لامتناهية الشطرين || اشهر انواعه واعرفها المران الاسود (S. niger) الذي يحوي البحر الابيض المتوسط.

٢٦١٤٤ - **مراشكة** \* Mulch  
مواد فضوية مختلفة اغصبا الورق واتشش تملش على التربة لحفظ رطوبتها ولتبع تكاثر اعصابها الطوية ولوقايتها من قساة البرد.

٢٦١٤٥ - **مراهيات** \* Spinacidae (S).  
Spinacidae (F). Spinacidae (E).  
فصيلة اسماك بحرية مفترسة من الاشلاق. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها بحار البلاد الحارة والمطلة الحرارة || جميعها وشمية الشكل ، متباينة اللقد والحجم. منها الصغير والوسط والكبير || اغلاتها شرمة ماحكة ، لا تمر بسكة الا قصبتها الى شطرين.

٢٦١٤٦ - **مراهكة** \* Plaidoirie, Plaidoyer (F).  
Pleading, Speech for the defence (E).  
المرافعة هي عرض وقائع الدعوى ومطالب المتقاضين شهاديا امام القاضي. وهي حق يحول القانون لكل متقاض.

٢٦١٤٧ - **مراكي** \* المراق نجم ثير من كوكبة الدب الاكبر.

٢٦١٤٨ - **مراهكة** \* Dosimétrie, Titrage (F).  
Dosimetry, Titration (E).  
فن قياس التركيز والاعلاط.

٢٦١٤٩ - **مراهري** \* Kobus (S). Cobe, Kob (F).  
جنس حيوانات لبونة من الفيلاء الكبيرة اللقد. انولمه حسة اعطائها البلاد الافريقية. اجسامها منسجمة القوام طرفية الشكل تطلو من ١٧٠ الى ٢١٠ سم. وتقلو من ١٤٠ الى ١٥٠ سم. ألوانها الى الخططي الاحمر المواج ومنها البلقا. فلكلر منها قرنان كيران لولبيان. أما الانثى فليها عني رباعية الاختلاف. اصغر قلداً من الذكر || يالفت النسب والتناوب ويجاري الماء. ابله يراوح من ١٥ الى ٢٥ لفرًا.

٢٦١٥٠ - **مران** \* **لسان العصفور** Fraxinus (S). Frêne (F). Ash-tree (E). Esche (D). Frascio, Frassino (I).  
جنس اشجار حرجية ويزينة من المراهيات وفصيلة الزيتونيات. انواعه عديدة منها الجنبات والشجيرات والاشجار الباسقة. اوزانها مركبة وزية متعاقبة عابلة. انزهارها حشكولي. انزهارها يفضاء اللون او فستقية. ثمارها جناحية. براعمها سود. لحاء سوقها واغصانها الى الريدة السوداء. اغصانها



مراش



مراهري



مران احمر



مران شامخ

٢٦١٥٥ - مرثاني (F). Epigé (F). Epigenous (E).  
تنت تمرثني يطلق على البزور التي ترتفع زياراتها عند  
الانتاش فوق سطح التربة .

٢٦١٥٦ - مرثاة (F). Lals (F). Staddle (E).  
المرثاة . ج مرثاي . هي الشجرة الباقية عند قطع الغابة .



مران شائع

٢٦١٥٧ - مرثع (F).  
طائر من طير الماء قبح الهيئة (الجاحش) .

٢٦١٥٨ - مرثيد (F).  
المرثيد هو بحس المرثاني . وفي الحديث أنه تيم بحريه  
النم . وهو الفضاء وراء البيوت يرتفع به . وهو الموضع  
الصالح لتجفيف الثمر .

٢٦١٥٩ - مرثيس ، صيركة (F). Paddock (E).  
Enclos pour caprins et ovins (F).  
حظيرة الغنم والماعز .

٢٦١٦٠ - مرثع (F). Carré (F). Square (E).  
شكل حتملي قائم الزوايا المتساوية الاضلاع .

٢٦١٦١ - مرثع الزوايا (F). Quadrangulaire (F).  
Quadrangular (E).

٢٦١٦٢ - مرثع الزوايا والمثلث (F). Tétragone (F).  
Tetragon (E).

٢٦١٦٣ - مرثع متحرف (F). Trapèze (F).  
Trapezium (E).  
مربع متوازي القاعدتين الكبيرى والصغرى .

٢٦١٦٤ - مرثيات (F). Confitures (F). Preserve (E).  
المربيات هي آثار المخبوزة بالسكر .

٢٦١٦٥ - مرثة (F).  
« بقلة تنفرض على الارض لها ورق مثل ورق الهندباء  
أو ارض ولها نورة صفراء واروية يفضاء وتقطع مع ارضها  
فخسل ثم تؤكل بالخل والحلزون وثيها حلقة سيرة » (من ابي  
حنيفة) . ج مر وأمرار .

٢٦١٦٦ - مرثة (F). Heron goliath (F).  
هو البشون الجبار ، اطلبه .

٢٦١٦٧ - مرثاج (F). Lithophage (F).  
هو الحجار ، اطلبه .

٢٦١٦٨ - مرثوق (F). Vivarium (F). Vivarium (E).  
المرثوق قصص لاجناس الطول والعرض والارتفاع ، غالباً  
مزيج أو مغلوغ يشريط ضيق النواطب ، يشتمل لتربية  
النويات والحشرات .

٢٦١٦٩ - مرثقع (F). Fastigié (F). Fastigate (E).  
تنت تمرثني يطلق على الفروع النباتية المرتفعة الاطراف  
نحو العلاء .

٢٦١٧٠ - مرثقع جوي (F). Anticyclone (F).  
Anticyclone (E).

٢٦١٧١ - مرثعة المبيض (F). Superior ovary (F).  
تنت تمرثني يطلق على اثمار النباتات المرتفعة المبيض  
من فئة المتحمات الثمالات .

اللحاء ، صفر التشريح . وريقاتها تد من ٥ الى ٩ ،  
نصلها اعليجي الشكل بطول نحو ٩ سم . ويعرض نحو ٥  
تسبته مستدير الاطراف ، ازهارها عكولي ، طرفي ،  
لبد التجميع ، بطول نحو ١٥ سم . ازهارها يضاء اللون .  
يستخرج من سوقها باخر من لا بأس به يحوى ٧٢ %  
من الميت .

٢٦١٤٧ - مران صيني (S). Fraxinus chinensis (S).  
Frêne de Chine, Orne de Chine (F).

شجرة سبروتية تريينية مهددا الصينى تملو من ١٢ الى  
١٥ م . براعمها سود في الشتاء حمري الربيع . وريقاتها  
تعد من ٥ الى ٧ ، نصلها اعليجي الشكل بطول نحو ١٤  
سم . ويعرض نحو ٦ سم . حروف بارزة ، تسبته متشاري .  
ازهارها عكولي طرفي بطول نحو ١٨ سم . ازهارها يضاء  
اللون . ثمارها جلوية .

٢٦١٤٨ - مران كثير الزهر (S). Fraxinus floribunda (S). Frêne floribond, Orne flor-  
rifère (F). Bitter-ash (E).

شجرة سبروتية مهددا الهند تملو من ١٠ الى ١٢ م .  
وريقاتها تد من ٧ الى ١٣ ، نصلها سناني الصنفه بطول  
نحو ١٥ سم . ويعرض نحو ٥ وهو مائل البشرة ، دقيق  
التسبين الحاد . ازهارها عكولي طرفي بطول نحو ٢٥ سم .  
ازهارها يضاء اللون فبراء المراج .

٢٦١٤٩ - مران معيبي الورق (S). Fraxinus parvifolia (S). Frêne rhomboidal, Orne de  
Bunge (F).

جنية تريينية سبروتية مهددا الصينى تملو نحو ٢٠٠ سم .  
وريقاتها تد من ٣ الى ٧ وهي معيبة الشكل تطول نحو  
٤ سم . وتعرض نحو ٢ ، نصلها سنن الحافة ، عتقا  
مزفر اللحاء . عتاكلها الزعرية طرفية الاوتكان تطول من  
٥ الى ٧ سم . ازهارها يضاء اللون .

٢٦١٥٠ - مران منشوريه (S). Fraxinus mandshurica (S). Frêne de Mandchourie,  
F. du Japon, Tamo (F). Japanese ash, Tamo (E).  
Japanische Eiche, Tamo (D). Fraxino giapponese,  
Tamo (I).

شجرة شائعة تملو من ٢٥ الى ٣٠ م . مهددا منشوريا .  
فروعها رباحية التصلب . وريقاتها تد من ٧ الى ١١ ،  
نصلها ضيق الصنفه ، مدبب القصة ، مستطيل العتق ،  
باحث الخضار البحري . ازهارها عكولي التجميع مستطيل  
الشكل . ازهارها ييض ، خضر المراج .

٢٦١٥١ - مرثاة (F). Frénale (F).  
Ash-grove or plantation (E).  
مفرس المران أو حجرة المران .

٢٦١٥٢ - مرثانيات (F). Fraxinées (F).  
سبط من فصيلة الزيتونيات اشهر اجناسه المران .

٢٦١٥٣ - مرثانين (F). Fraxétine, Fraxine (F).  
خلوكوزيد يكثر بجموده في غاه المران . ويوجد أيضاً في  
غاه القندل الهندي . يستخرج من اللحاء يده نفعها بالما  
وغلانيها . ثبلوره ايزري الشكل ابيض اللون . طعمه مر  
حريف . يلدوب في الماء وفي الكحول .

٢٦١٥٤ - مرثب (F).  
المرب : الارض الكثيرة الثبات .



مران كبير الزهر

٢٦١٨٢ - **مرثيشية \*** Martynia (S), Martynie (F).  
جنس نباتات عشبية من المرتقيات. أنواعها قليلة، جميعها أمريكية المنبت منها البرية ومنها الزينية. أوراقها متدقة لا قياسية الشكل والأزهار. أزهارها جولة القالب، زاهية الألوان، لا نظامية التجميع والأزهار. ثمارها جبراء مقرنة الأطراف. اعراف أنواعها وأشهرها ما يلي.

٢٦١٨٣ - **مرثيشية حنولية** Martynia annua, M. diandra (S), Martynie annuelle (F).  
عشبة حولية زباه غدية لزجة تملو من ٤٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها متدقة متقابلة قلبية الشكل، نصلها خلى البشرة خماسي التنس، أزهارها بيض القنار أرجوانية الأطراف. ثمارها بيضية مألثة قننبي ثلاثة متقادية الشكل قصيرة. أزهارها يستمر من حزيران إلى تشرين.

٢٦١٨٤ - **مرثيشية غوطونية** Martynia proboscidea (S), Martynie à trompe, Bicornie trompe d'éléphant, Cornares, Ongles du diable (F).  
عشبة حولية زباه لزجة تملو نحو ٩٠ سم. أوراقها متدقة متقابلة قلبية الشكل، نصلها مستطيل الزنار خلى الصفحة المتصبة المستعرضة التنس. أزهارها كبيرة القند، موعجة القنار، غائرة الأطراف الحامسة التفريض. قناتها إلى البياض الأصفر المولج يعلو تنمش اخضر وأحر، أطرافها موعجة بالبنفسجي يعلو مزاج أرجواني، ثمارها غوطونية الشكل تطول نحو ١٥ سم. || أزهارها يستمر من حزيران إلى آب.

٢٦١٨٥ - **مرثيشية صفراء الزهر** Martynia lutea (S), Martynie à fleurs jaunes, Bicornie jaune (F).  
عشبة حولية زباه لزجة تملو نحو ٦٠ سم. أوراقها متقابلة، متدقة، قلبية الشكل، مستديرة الطرف. نصلها خلى البشرة مسن الحافة. أزهارها عقودية التجميع مذهية اللون يطلوها عند انتشابه موالج أحر || أزهارها يستمر طوال شهر آب.

٢٦١٨٦ - **مرثيشية عطرية** Martynia fragrans (S), Martynie odorante, Bicornie odorante (F).  
عشبة حولية زباه لزجة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقها متدقة متقابلة ثلاثية القنوس، نصلها خلى الصفحة المتقاربة التنس. أزهارها عطرية، بنفسجية اللون، أرجوانية المشعة، سفلية التجميع. ثمارها تطول نحو ١٢ سم. أزهارها يستمر من تموز إلى أيلول.

٢٦١٨٧ - **مرثيشية كلبية** Martynia craniolaria (S), Martynie craniolaire, Craniolaire (F).  
عشبة زراعية حولية زباه غدية تملو من ٥٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها متدقة متقابلة كلبية الشكل مسن الحافة. أزهارها يضاء اللون كبيرة القند تطول نحو ٨ سم. ثمارها كبيرة كرويس المصافير، غرولية الزائدة، جذورها سحرية الشكل، مأكولة ورتب.

٢٦١٨٨ - **مرث و مرث** Mascération (F), Maceration (E).  
نقع جسم صلب في الماء أو في سائل آخر ليئين أو لإذابة بعض اجزائه الكيماوية.

٢٦١٧٢ - **مرثكفك** ، **حخادم** Dominié, Servant (F).  
الحرقن والمرثقن به. هو الذي عليه حق ارتفاق لمعار آخر.

٢٦١٧٣ - **مرثكفك** Dominant (F).  
المعار المرثقن أو المخنوم هو الذي يتنفع من الارتفاق.

٢٦١٧٤ - **مرثك** ، **مرثك** ، **مرثك** ، **مرثك** Litharge, Protoxyde de plomb cristallisé (F), Li-tharge (E).  
هو بروكسيد الرصاص المنصهر المتبلور البرتقالي اللون.

٢٦١٧٥ - **مرثكفك الجنبعة** ، **حجورم** Délinquant (F), Delinquant, Offender (E).  
هو الذي يرتكب فلة يعتبرها القانون الجنائي جنحة يعاقب عليها.

٢٦١٧٦ - **مرثيشية \*** ، **مرثيشية** Mertensia (S), Mertensie (F), Blue-bella (E), Lun-genwurz (D), Mertensia (I).  
جنس نبات من فصيلة الحمصيات معقود للترتيف، باسم العليوب مرتس (١٧٦٤-١٨٤١). أنواعها المروفة ١٥، جميعها عشبية معمرة، أصلها البلاد المتدلة الحرارة. أوراقها كاملة متقابلة. نصلها موعجة بنده شفافة. أزهارها عقودية التجميع. توججات أزهارها انبوبية الشكل، أشهر أنواعها الزينية ما يلي.

٢٦١٧٧ - **مرثيشية لعلبية** Mertensia echinoides (S), Mertensie vipérine (F).  
عشبة من المرتسية تملو نحو ٤٠ سم. ساقها وفروعها مزجة اللحاء. أوراقها ستانية الشكل، نصلها خلى البشرة حل مسطح. أزهارها كثيفة التجميع متوسطة القند لونها إلى الزرقاء الباقية || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

٢٦١٧٨ - **مرثيشية سيبيرية** Mertensia sibirica (S), Mertensie de Sibérie (F).  
عشبة عشوية من المرتسية تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها وفروعها سرسة. أوراقها قلبية الشكل متدقة، نصلها ناعم النسيج المتجمع. أزهارها بنفسجية اللون متصبة. أزهارها يستمر من أيار إلى تموز.

٢٦١٧٩ - **مرثيشية عككبية** Mertensia paniculata (S), Mertensie paniculée (F).  
عشبة من المرتسية تملو من ٤٠ إلى ٦٠ سم. ساقها وفروعها مهدبة اللحاء. أوراقها ستانية التصل المستطيل الضيق. ثمرها حكرلي التجميع مغلاف سائر. أنواع جلها. أزهارها إلى الزرقاء الليلية. توججها خلى الصفحة، مسن الحافة. أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

٢٦١٨٠ - **مرثيشية فيرجينية** Mertensia virginica (S), Mertensie de Virginie (F).  
عشبة من المرتسية تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. ساقها وفروعها عريضة. أوراقها اطيحية مقطوعة تطول من ١٠ إلى ١٥ سم. وتعرض من ٥ إلى ٨ سم. أزهارها كبيرة القند متدلية، لونها إلى الزرقاء الجميلة. أزهارها يستمر من آذار إلى حزيران.

٢٦١٨١ - **مرثيشيات** Martyniaceae (S), Martyniacées (F), Martyniacées (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات. اجناسها وأنواعها قليلة العدد، أشهرها المرتيشية.



مرثيشية



مرثيشية



مركبات

Pageau, Pagel (F). - مَرْجَان

هو القناري، جنس سمك من فصيلة الاسبوريات .

Zoanthaires (F). - مَرْجَان زَهْرِي

Zoantharia (E).  
رنية حيوانات بحرية عديدة الفصائل والجناس . جميعها  
جسمية الافراز كالمرجان، ملتحها فسيحة الاربعاء تتكون  
منها الشعاب والمستمرات والجزر .

Corallaires (F). - مَرْجَانِيَّات

شعبة حيوانات بحرية من صف المرجيات .

Berberidopsis corallina (S). - مَرْجَانِيَّة

Berbaridopsis coral (F).  
جنية ترينينية مسمرة من فصيلة النشويات . ساقها مرعية

الفروع متسلقة تلصق من ممرين الى ثلاثة امتار . اورلتها  
اليفة، متعاقبة، معتقة، قلبيّة الشكل . نصلها جامد  
الصفحة الالامية ، مدبب التستين الشاك . ازهارها عتودي  
التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها تساعية التلات والفصل،  
ساحية الاسدية ، مرجانية اللون ، كروية الشكل ،  
متدلية || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

Coralline (F). - مَرْجَانِيَّة

عشبة تدعى ثور الله ، اطبله .

Chaudière, Cuiseur, - مَرْجَل

Ebouillanteur (F). Copper, Boiler (E).  
قدر كبير من النحاس او الحديد يملئ بالماء .

Fronde (F). Sling (E). - مَرْجَمَة \*

هي الصفحة المغل من نصل ورقة البرخس حيث توجد  
الحفاق . وقد تتصلب بصيغة الجمع فتدل عمل مجموعة  
المفحات السفل من أوراق البرخس الواحد .

Praticulture (F). - مَرْجَوِيَّة

المرجوية علم يبحث في زراعة المروج والمراعي .

Praticole (F). - مَرْجَوِي

نعت تعريفية يطلق على كل حشرة او طائر او حيوان

مأواه المروج .

Emergula (S). - مَرْجُونِيَّة \*

Emergula (F). Emergula (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرضويات مدليات الازبل

امانيات انثياشم الحلقية وقصيلة الصديديات . انواعها  
المروقة نحو ١٠٠ منها ٤٥ منتشرة في بحار البلاد المعتدلة  
الحرارة . تعيش على الصخور قرب الشطوط || اصداؤها  
شبه مخروطية الشكل ، مضغلة السطوح المحززة اقلية  
شبه بيضيه الشكل ، رمية الارادية المضغدة ، صغيرة

الرؤوس ، كبيرة العين الجاحظة القائمة على قواعد اللواس  
الخارجية . لواسها قصيرة ، مخروطية . ارجلها وحيدة  
مستعرة ، ملوقة بزوائد انبوبية الشكل .

Corail (F). Coral (E). - مَرْجَان

حيوان بحري من المنخ المرجوات وهو من الحيوانات الركية  
التي تعيش راحة على صخور واشباب القاع . انفرانها جسمي  
عديد الالوان يكثر فيه الاحمر الغروي ( المرجاني )

Epler (F). To ear (E). - مَرْح

مرح نرود : خرج منبله .

Etagère (F). Whacnoe (E). - مَرْكَلَة

رف مستقل لا يستند الى حائط ، ج مرآته .

Couvoir (F). - مَرْكَلَة ، مَحْضَن

Incubator (E).  
عش في سلة او في صندوق وما اشبه ترشم فيه الدجاجة  
الرتقاء حضنتها . وهو ايضاً بناء تجمع فيه الحوافر والحفصات .

Ner (F). Nosa (E). - مَرْكَم

المركم والمركم الانف وقد كثر اسناده الى الحيوان .  
ج مراكيم .

Faire paltre (F). - مَرْج

To graze, to feed, to tend (E).  
مرج الدابة : ارسلها ترعى في المرح .

Prairie (F). - مَرْج

Meadow, Grass-land (E).  
ارض لسيحة مغطاة بنبت فيها العشب طويلاً او يبار

وتمرج فيه الماشية او يعيش ويحفظ . نباتاته مختلفة  
وعديدة اشيعها من القطنيات والنجليات . والمرج قد  
يكون :

Prairie artificielle (F). - مَرْج صَنَعِي

Artificial meadow (E).  
ترتكز اعشابه على القطنيات كالبرسيم والقصة والباقية...

Prairie naturelle, Pré (F). Meadow (E). - مَرْج طَبِيعِي

وهو المرج اللعوف بالرعى او المتجم .

Prairie temporaire (F). - مَرْجاً وَقْئِي

Temporary meadow (E).  
هو الذي لا يبقى اكثر من بضع سنوات وتكون اعشابه

من النجليات والقطنيات .

Pré-verger (F). - مَرْج قَامِر

Orchard-meadow (E).  
مرج طبيعي غرس فيه شجر مشر كالأجاص والتفاح

لاستفادة من العشب والثمار معاً .

Piezographe (F). - مَرْجَجَاك

Piezograph (E).  
المرجاج جهاز يستعمل في قياس القوى الاهتزازية وضغطها .

Faneuse (F). Hay-making (E). - مَرْجَجَاد

اداة تستعمل في تقليب الاعشاب المحشوة اجتناباً لمعها

وتجفيفها في جلفانها .

Sonda (F). - مَرْجَسَاك

هو السيار ، اطبله .

Séismographe, Sismographe, Tromomètre (F). - مَرْجَسَال \* ، مَرْجَجَكَة

Séismograph, Tromometer (E).  
آلة تسجيل الهزات الارضية بما في ذلك مدة الزلازل وصفه .

Corail (F). Coral (E). - مَرْجَان

حيوان بحري من المنخ المرجوات وهو من الحيوانات الركية

التي تعيش راحة على صخور واشباب القاع . انفرانها جسمي

عديد الالوان يكثر فيه الاحمر الغروي ( المرجاني )

من عايق وباهت . والاسود والابيض . أما الابيض

فنادر الوجود .



مرجبلية





٢١١٣٢ - مِرْدَلِيَّات Mouche des narcisses (F).

حشرة من الذباب مشهورة باسم سرفيد الأرجس .

٢١١٣٣ - مِرْدَلِيَّات Vanne (F). Sluice, Water-gate (E).

٢١١٣٤ - مِرْدَلِيَّات Oviscapte (F). Oviscapt (E).

جهاز متح السرة أو المكن في بعض الحشرات، ويصنع أشعة، أطلسها .

٢١١٣٥ - مِرْدَلِيَّات Pal Injecteur (F).

Injecting tube (E).

أداة تحقن بها التربة لأغراض شتى أخصها التطهير والتسميد للملح للملح .

٢١١٣٦ - مِرْدَلِيَّات \* مِرْدَلِيَّات ، مِرْدَلِيَّات ،

Hygromètre (F).

Hygrometer (E).

أداة تستعمل في معرفة الرطوبة الجووية أي كمية بخار الماء الموجودة في الجو بالنسبة إلى درجة الحرارة .

٢١١٣٧ - مِرْدَلِيَّات شعري ، مِرْدَلِيَّات شعري

Hygromètre à cheveux (F).

مِرْدَلِيَّات يرتكز على تمدد وانكماش الشعر الذي يتأثر بالرطوبة

٢١١٣٨ - مِرْدَلِيَّات \* Balance de précision (F).

هو ما يميزه ميزان الدقة لانه تحقيق التركيب يتأثر بكسور الميزان .

٢١١٣٩ - مِرْدَلِيَّات Circus (S).

Busard (F). Buzzard (E).

جنس طير من حمارة المزيات وصغيرة الصقريات. أنواعه عديدة منتشرة في معظم أقطار العالم، جميعها من الكواس التي تقتبس القوافم والجذران والصائير والمطاة والحشرات. أجسامها متوسطة الحجم، طولها يراوح من ٤٠ إلى ٦٠ سم. اجنحتها وأرجلها وأذناها طويلة. أوتها إلى البتة المرقطة. تدل في الأجنحة الخرجية الباسقة أو على الحفيض وفي أوتها الصخور. أناتها تحسن من ٣ إلى ٤ رفات ٤ أسابيع أشهر أنواعها الأربعة التالية .

٢١١٤٠ - مِرْدَلِيَّات البَطَّاح Circus strigiceps (S).

Busard blafard, B. des stappes (F). Pallid harrier (E).

طائر من المردة صغير الجثة، أحمر اللون المرقط بالأسمر، أسود المنسر، أحر العينين والرجلين. وهو من القواطع يألف السبب والبطاح، قوته الزخات من مطاء وميات ودويبات وبعض الحشرات .

٢١١٤١ - مِرْدَلِيَّات الدَجَّاج \* ، صقر الفيران

Circus cyaneus (S). Busard Saint-Martin (F). Hen harrier (E).

طائر من المردة، متوسط القد طويل الجناحين والرجلين والذنب. قوته إلى البتة المرقطة بالأسمر، وهو أسود المنسر، أصفر العينين والرجلين. يصيد القوافم والصائير والصفادع والمطاة والحشرات وبراق الدجج. يدن وكته على الحفيض بين القصب والزار .

٢١١٤٢ - مِرْدَلِيَّات الصَّيَّاع \* ، دَرَّاج

Circus ceruginosus (S). Busard des marais, B. harpaye, B. des roseaux (F). Marsh harrier (E).

طائر من المردة، كبير الجثة طوله يراوح من ٥٥ إلى ٦٠ سم. قوته إلى الصبهة المرقطة. وهو من القواطع يألف

كيريتان، زيانها غيبان، ظهراتها لا يلحف كابل البطن، بطنها مستطيل السمكة الشرجية المدية الطرف || لها جيل واحد في الجيل، تظهر الحشرة الجملانة في أواخر نيسان وتمشي حتى أواخر آب. تشرح في النهار. ثلثه في تموز || البرقة عند بلوغها الكمال الجسموي طولها نحو ١٢ سم. جسمها مبطل الشكل، مستطيل المقدم، مداسي الرواجب، ضخم الرأس، ضلع التأثير الفكية، أطول اللون، يسود في الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوماً ينقضي تحت السماء مليقاً من كل غلاف .

٢١٢٢٩ - مِرْدَلِيَّات \* Mordellidae (S).

Mordellidae (F). Mordellidae (E).

فصيلة حشرات واسعة من رتبة غديات الاجنحة || اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات المناطق الحارة، خنافسها تأت ثباتات الفصيلة الخفية، يرقاتها دامت تعيش على المواد النباتية السائلة نحو الاغصان || جميع حشرات صغيرة القد قلما يتجاوز طولها ١٠ م. أجسامها لاقطامية الشكل، اغداها لا تلحف بطنها المكشورة المستطيلة المدية الاطراف الشرجية. زيانها خيطية، مستطيلة، مركبة من ١١ فصلة، ارساخ جرمها الخلفية رباعية المقل اما ارساخ الجرام الوسطى والامامية فغاسية || أشهر اجناسها المردة والزملوقة والريشة .

٢١٢٣٠ - مِرْدَلِيَّات ، مِرْدَلِيَّات Quenouille (F).

Distaff (E).

شكل من اشكال الهيكل المثبتة في تشذيب بعض الاجنحة الشجرة والثرينية || والشكل المردني يكون اتيق قاعدة وجسماً من الوشي واكثر ارتفاعاً .

٢١٢٣١ - مِرْدَلِيَّات البَرِّقُون \* Odonestis pruni, Gastropache pruni (S).

Odonestis du prunellier, Bombyx du prunellier (F).

Odonestis pruni (E).

حشرة من فصيلة اللحيات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الأقصى إلى اربوية . فراشتها صيف تعيش على غزونها الاماعي . سرتها تعيش على اوراق البرقوق والزهرود والاباجس ... جسمها مستطيل مكرم يطول نحو ٢١ سم. موطنها نحو ٤٤ م. وأنها حطلي اللون . ميناها كيريتان، زيانها مشطيان . موطنها جعدة . موطنها وبطنها إلى الحطلي الاكلف || ورشاتها الاماميان إلى الحطلي الاكلف ملوحة ماجة حمراء وسط مرقص اسمر ونقطة وسطى بيضاء . ورشاتها اخفان إلى الحطلي الاكثف . اهدابها إلى الشفة || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الغزاة في تموز . تشرح من الغروب إلى الفجر في اليالي الممطرة . تماثل بعد ظهورها بنسر اربعة ايام وتضع المكن لطحاً على ملأ الجلود والافاصان || السوفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٤٤ م. جسمها شبه اسطواني الشكل . ثوبها إلى الحطلي الاسمر المواجه يطولها من الرأس إلى الشرج خط عريض من الهلب القصير تتخلله منه كل مفصل حيدى نسة من الهلب المستطيل . ميناها وشرجها ودراجها كاسية . شرجها ينقضي بزائدة صخرة لمولية الشكل || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي تحت الثشور وبين السماء ضمن صلجة ينقلها غشاء كالنخامة اغبر اللون .



مردلة البرقوق



مِرْدَلِيَّات



مِرْدَلِيَّات



مِرْدَلِيَّات



مِرْدَلِيَّات

٢٦٢٥٤ - مرسوم (F). Décret (F). Decree, Order (E).  
هو كل قرار يوقعه رئيس الجمهورية. وتختلف أسماء المراسم باختلاف موضوعاتها فتكون: جمهورية وحكومية وعامة وتنظيمية وعامة.

٢٦٢٥٥ - مرسوم قانون (F). Décret-loi (F).  
هو كل نص تشريعي يصدره رئيس الدولة في أثناء غياب المجلس النيابي ويكون نافذاً كالقانون بشرط موافقة المجلس، عند انعقاده، عليه.

٢٦٢٥٦ - مرسونية (S). Marssonina, Marsonia (S).  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرنفيات. يتميز بكتلاته الشفافة الثنائية الحالية البيضاء الشكل أو المستطيلة المنعقفة. يركب الأوراق فيلطحها. قصبته آدمية الارتكاز تصدع البشرة || أنواعه عديدة لكنها قليلة الأذى. أضرها ما يلي.

٢٦٢٥٧ - مرسونية البرسيم (S). Marssonina medtuginis (S).  
فطر مجهرية من المرسونية يصيب البرسيم واللغة والنفل في سوقها وأوراقها. مظهره الخارجي يثور صغيرة لا قياسية الشكل، حطية اللون، ممره الاطار، تركب السوق والاوراق فتؤذيها || يكافئ بالخرس عند ظهور الومر ومنهم من سرخ الماشية في المقاضب لثراها.

٢٦٢٥٨ - مرسونية التامول (S). Marssonina betulae (S).  
فطر مجهرية من المرسونية يصيب التامول في اوراقه. مظهره الخارجي يثور صغيرة مستديرة شقره اللون حطية الاطار لا قياسية الترتيب تركب نصل الاوراق حسل صفحاتها العليا || اضراره زهيدة لا تستوجب المكافئة.

٢٦٢٥٩ - مرسونية الحور (S). Marssonina populi (S).  
فطر مجهرية من المرسونية يصيب اوراق الحور وبصيلها. مظهره الخارجي يثور متتابعة حلولة اللون بيضوية الاطار تركب نصل الاوراق وقد تشاهد يرمة قصب الذبول والاحبال.

٢٦٢٦٠ - مرسونية الخس (S). Marssonina panattoniana, M. perforans (S).  
فطر مجهرية من المرسونية يصيب الخس فيؤذي. مظهره الخارجي يقع مستديرة لونها الى السمره قطرها من ٢ الى ٣ مم. تبدو مبررة حل صفحات نصل الاوراق الخارجية ثم تمتد وتتلاقى وتركب الاوراق الواحدة تلو الاخرى حتى الساق || يكافئ بتقلع النباتات الموصية وينفخ النباتات الباقية يحمل كبريات النعاس او سائل يورده الحور المركز ٨٠٪ || ومن الواجب تطهير البذار قبل استعماله بواسطة الاغص. المكني (Vert malachite) المركز ١٪.

٢٦٢٦١ - مرسونية الصفصاف (S). Marssonina salicicola (S).  
فطر مجهرية من المرسونية يصيب اوراق بعض انواع الصفصاف. مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل والخرس، مستنة الاطار، حطية اللون، تركب نصل الاوراق فتؤذي كالبثور الراضة || اضراره زهيدة لا تستوجب المكافئة.

المنقع والبحيرات ويجاري الماء. قوته القواض والطيور المائية والصفاد.

٢٦٢٦٣ - مرزقة ومزداة (S). Circus cinereus (S). Busard cendré, B. de montagne (F). Montagn's harrier (E).  
طائر من المرزقة، متوسط القد، ارجله الثوب المتعبد الرقطة، اسود المنسر، اسفر العينين والرجلين. ومنه من القواض، يألف الجبال والنباتات والبحيرات وشطوط الأنهار. قوته العطاء والصفاد والحشرات.

٢٦٢٦٤ - مرزقة (F). Rizière (F). Rice-plantation (E).  
هي عقلة الارز أو الارض المروسة رزاً.

٢٦٢٦٥ - مرزق، مسالك، مشحط (F). Charrasson, Echafas, Etaçon de vigne, Paiseau (F). Vine-prop, Vine-stick, Stay, Shore (E).  
مست يستعمل للحم الكريمة أو لرفعها عن التربة.

٢٦٢٦٦ - مرزوم، مرزوم (F). Flamant (F).  
هو النحام من طير الماء، طويل الرجلين والرق، اوجح المتعار، في اطراف جنبه سواد، اطلب نحام.

٢٦٢٦٧ - مرزوم (F).  
الميرزومان نجان مع الشريرين.

٢٦٢٦٨ - مرزوم الدواغ (F).  
مرزوم الدواغ نجم يتعرف أيضاً بالدواغ المبسولة، اطلبه.

٢٦٢٦٩ - مرزويات (F). Busards, Circiens, Circinés (F).  
عامة طير من فصيلة العقريات. انواعها عديدة تتميز بقدمها الرشيق الاحف. مناسرها قصيرة عجيبة. سوطها مستطيلة. اذنابها عجيبة. ارساغها مستندة معتلة الطول. غناها عامرة || اخطائها المالم. تألف الاماكن الرطبة. قوتها القواض والزحافات والحشرات.

٢٦٢٧٠ - مرسب (F). Précipité (F).  
المرسب والراسب واحد.

٢٦٢٧١ - مرستويات (F). Mérostomes (F).  
صنف من المفصليات التحيجرات ترتديه الصنفي يأتي بين القشريات والمكنوتيات || من هذا الصنف يوجد رتبة واحدة ماصرة تقوى مروديات الانذاب.

٢٦٢٧٢ - مرستج (F). Amphicomis (S).  
جنس غنائل من فصيلة الجعلليات ورتبة مندبات الاجنحة. انواعه عديدة، اعطائها الشرق الاوسط. اجسامها متوسطة القد زيا. رؤوسها قصيرة. قرونها الاستشارية صفيحة التركيب. ارساغها خاسية الفصل. اناثها اكبر قداً من ذكورها || تعيش على ثلاث الانواع والاوراق الغنية. رقاتها مقوية الشكل، سداسية الارجل تعيش في التربة على المواد الصغوية والنباتية السائرة الى الانحلال.

٢٦٢٧٣ - مرستن (F). Nez des solipèdes (F).  
المرستن هو انف ذوات الحافر.



مرزقة المنقع



مرج



مرسونية البرسيم

٢٦٢٧٤ - مَرُوسِيَّةُ ٥ Robot (F), Robot (E).

جهاز آلي يقوم مقام الانسان في انجام بعض الاعمال .

٢٦٢٧٥ - مَرُوسِيَّةُ ٥ Parasité

٢٦٢٧٦ - مَرُوسِيَّةُ الْجَوَاتِ Observatoire météorologique (F), Meteorological observatory (E).

مكان جهاز بالمدلة اللازمة لرصد التحويلات الجوية .

٢٦٢٧٧ - مَرُوسِيَّةُ Adhérent (F).

يقال لجوز مَرُوسِيَّةُ ومَرُوسِيَّةُ اذا تعلق خروج له .

٢٦٢٧٨ - مَرُوسِيَّةُ وَصَم Maladie (F).

Illness, Diseases (E).

انحراف صحي سببه تقاوس الضور عن القيام بوظيفته حل

الرجه الاكل || الاوصام التي تصيب الحيوان والنبات

حديثة منها داخلية وخارجية وظفيلية وبكتيرية . الخ .

٢٦٢٧٩ - مَرُوسِيَّةُ البثور الساري ، دَرَمِيَّة Dermite (F), Pol-e-vil (E).

وصم سار يصيب الخيل والفرس .

٢٦٢٨٠ - مَرُوسِيَّةُ الحَرَاثِف Lépidorthose (F).

Lepidorthosis (E).

وصم جرثومي يصيب الاسماك بحرشفها .

٢٦٢٨١ - مَرُوسِيَّةُ الْخَرَزِيَّاتِ Coccidiose, Maladie du gros ventre (F).

وصم جرثومي يصيب الارانب خاصة والطيور الداجنة

معدنة .

٢٦٢٨٢ - مَرُوسِيَّةُ الصَّحْن Bleime (F).

Sand-crack (E).

وصم يصيب باطن حافر الخيل .

٢٦٢٨٣ - مَرُوسِيَّةُ الظِّلْفِ ، تَعَفُّنُ الظِّلْفِ Necrosis bacillaris (S), Pézin (F), Foot-rot (E).

مرض معد يصيب اطراف الضأن .

٢٦٢٨٤ - مَرُوسِيَّةُ الفُطْر الشَّعَاعِي Actinomycose (F), Actinomycosis (E).

هو الحاروش وصم يصيب اللواتي وينتقل الى الانسان .

سببه الفطر الشعاعي . مظهره قباب في الفك واللسان .

عوارضه هزال وضعف وحى وانخفاض في الوزن . وقد

يمتد الى اشحاء الحيوان وظلمة جلده .

٢٦٢٨٥ - مَرُوسِيَّةُ التَّمْلِ Phtiriasis (F).

Pthiriatosis (E).

كل مرض جلدي سببه الحشرات من قمل وقراد . . .

٢٦٢٨٦ - مَرُوسِيَّةُ التَّمْتَمِجَاتِ Spirillose (F).

Spirillosis (E).

وصم يفتأ من وجود التمتجمات في الدم .

٢٦٢٨٧ - مَرُوسِيَّةُ بَكْتِيرِي Maladie bactérienne (F), Bacterial illness (E).

كل مرض سببه البكتيريا .

٢٦٢٨٨ - مَرُوسِيَّةُ جِلْدِي ، دَرَمَتُوز Dermatoze (F), Skin disease (E).

تعبير شامل يطلق على جميع الاوصام الجلدية منها كان

سببها .

٢٦٢٩٢ - مَرُوسِيَّةُ الْقَيْبِ ٥ Marssonina acerina (S).

فطر مجهري من المرسونية يصيب اوراق القيقب وقد

يمتد الى الاغصان والافاناد . مظهره الخارجي يقع صغيرة

مفرقة الزوايا تبدو سمراء اللون ثم تتحول نحو الصبغة

البياض . تركيب نصل الوراق ولحاء الاغصان والافاناد .

اضرارو زائدة لا تستوجب المكافحة .

٢٦٢٩٣ - مَرُوسِيَّةُ Mercuriales (F).

سبط من فصيلة الجرسيات يشمل الكثير من الاجناس

والانواع معظمها بري وبعضها زراعي زينة .

٢٦٢٩٤ - مَرُوسِيَّةُ Peuplier de l'Euphrate (F).

هو الطور الفرقي الجليل للشكل ، اطلبه .

٢٦٢٩٥ - مَرُوسِيَّةُ ٥ Marsilea (S).

Marsilea, Marsille (F), Marsilea, Nardoo (E).

Marsille, Kleeforn (D), Marsilea (I).

جنس نباتات عشبية مائية معمرة من فصيلة المرسليات ،

انواعها قليلة العدد . سوقها جذمورية مدادة تنبت في الماء .

جلودها نحيلة تنمو في السيل تقابلها اوراق مستطيلة

الزناد رباعية الوريقات المتقابلة المتطابقة على سطح الماء .

اشهر انواعها :

مرسيلة السنغال ٥ Marsilea senegal (S).

Marsilea pygmaea (F).

٢٦٢٩٦ - مَرُوسِيَّةُ ٥ Marsilea aegyptiaca (S).

Marsilea d'Egypte (F).

٢٦٢٩٧ - مَرُوسِيَّةُ ٥ Marsilaceae (S).

Marsiliaceae, Marsiliaceae (F), Marsiliaceae (E).

فصيلة نباتية من المتغيرات . اجناسها وانواعها حديثة ،

جميعها اشعاب جذمورية مدادة تعيش في اسماط المياه

القليلة النور .

٢٦٢٩٨ - مَرُوسِيَّةُ Myrte commun (F).

هو الآس الجربي ، اطلبه .

٢٦٢٩٩ - مَرُوسِيَّةُ Terre imperméable (F).

Impervious earth (E).

هي الارض المسكبة التي اذا اطمرت سالت سريعاً .

ج مروض وامراض .

٢٦٣٠٠ - مَرُوسِيَّةُ ٥ Scirile (femelle) (F).

Sterile (female) (E).

٢٦٣٠١ - مَرُوسِيَّةُ ٥ Scirile (femelle) (F).

Sterile (female) (E).

٢٦٣٠٢ - مَرُوسِيَّةُ ٥ Robotologie (F).

Robotology (E).

المرشدة علم يبحث في تطوير الاجهزة الآلية وتكسيها من

انجاز ما يقوم به الانسان من اعمال .

٢٦٣٠٣ - مَرُوسِيَّةُ ٥ Suoir, Trompe d'insecte (F), Sucker (E).

جهاز انبري لثقب يمكن الحشرات من ارتشاف السوائل .



مرسيلة



مرقة

## ٢١٣٠٣ - مَرغَاوِيلَا شَرِبِيَّة

Echinops tournefortii (S), Boulette de Tournefort, Echinope de Tournefort (F).

حشبة معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. سوقها حلبيّة اللحاء ، حلجها غطيّ مستطيل أكثر أبيض اللون وبضعة آخر . أوراقها جامدة النصل الخامسي التفريش ، الشائك الحافة . أزهارها وردية وبض و رؤسائها متوسطة القد .

## ٢١٣٠٤ - مَرغَاوِيلَا لَرَجِيَّة

Echinops viscosus (S), Boulette visqueuse, Echinope visqueux (F).

حشبة معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها كثيرة الفروع اللينة للزجبة . أوراقها كبيرة اللد ، خدية التفريش ، زغبية للتصل اللذي للزج ، شائكة الحافة . أزهارها غبراء اللون ، رؤسائها صغيرة الحجم .

## ٢١٣٠٥ - مَرغَاوِيلَا وَضِيَّة

Echinops humilis (S), Boulette humble, Echinope humble (F).

حشبة معمرة قليلة الفروع تملو نحو ٦٠ سم. أوراقها قطعية البشرة على صفحتها . أزهارها زائفة الزرقة ، قطر الرؤيئة نحو ٤ سم.

## ٢١٣٠٦ - مَرَعَة

Porzana (S), Porzane (F), Porzana (E).

المرعة . ج. مرع . جنس طير من دجاجيات الماء وفصيلة التفلقيات ، أنثاه المرفقة ١٦ جميعها من طيور العالم القديم . أجسامها متوسطة القد وصغيرة . أثوابها إلى الصهبة الخطئية يعلوها رقبن أبيض وتبيح أسود || أعطائها تمتد من الهند إلى أروبة ومن الصومال إلى مراكش . معظمها من القواطع يحجب مناقع البلاد في طلب الرزق والمصيف والمشي . أحرف أنواعها وأشهرها المرة للشائعة .

## ٢١٣٠٧ - مَرَعَة شَائِكَة \* ، مَرَعَة مَرُوطَة

Porzana maruette (S), Porzana marouette, Marouette (F).

طائر من المرع ، قدره قدر السباقي ، ثوبه إلى الصهبة الخطئية السمره الموج ، رأسه متمش بالابيض . زوره ويطنه إلى البياض الناصع . صدره إلى الطمعة الخطئية المزاج . ظهره أسود التبيح أبيض الخمار . جناحه مجذع بالآخر . منقاره جالس الارتكاز ، اسمر القاعدة ، آخر انطرف ساقه إلى الخضار الاسفر || يألف المناقع وضفاف البحيرات والأنهار . قوته الحشرات والبراغي ويزور إلى نباتات المائية . مرتبه من الغروب إلى الظلمة ومن الضحى إلى الضمر . يئن شته وسط جم السعادي . أثناء تخضن نحو ١٢ بيضة .

## ٢١٣٠٨ - مَرَحِيْر

Chèvre d'Angora (F).

هو مازن انقره ، اطلبه .

## ٢١٣٠٩ - مَرَعَوِي ٥

Prallal (F), Meadow (E).

## ٢١٣١٠ - مَرَعِي

Embouche, Gagnage, Herbage (F), Pasture-land, Rich meadow, Grass-land (E).

مرج طبيعي تسوم الماشية أمشابه .

## ٢١٣١١ - مَرَعِي أَحْمُوت

Clio (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات تسمى مرعوسة ، اطلبا .

## ٢١٣١٢ - مَرَعَاد ٥

Hygrophyte (F).

نمت تعريفني يطلق على كل نبات ينمو في المواقع الرطبة .

## ٢١٣١٩ - مَرَعِي دُودُ الْأَمْعَاء

Helminthiasis (F), Helminthiasis (E).

هو الخملستاز ، وصم تسببه المديدان في الأمعاء .

## ٢١٣٢٠ - مَرَعِي سَارِي ، مَرَعِي وَيْسَلْ ، وَيَاء

Maladie infectieuse (F), Infectious disease (E).

كل مرض جرثومي أو ميكروبي ينتقل بالمعدى من حيوان إلى آخر .

## ٢١٣٢١ - مَرَعِي قُطْرِي

Maladie cryptogamique (F), Cryptogamic disease (E).

كل مرض تسببه الفطور ، بجهرية كانت أو غير بجهرية .

## ٢١٣٢٢ - مَرَعِي مُعْدِي

Maladie contagieuse (F), Contagious disease (E).

كل مرض جرثومي أو ميكروبي ينتقل بالمعدى من فرد إلى فرد .

## ٢١٣٢٣ - مَرَعِي ٥

Sialagogue (F), Sialogogic (E).

نعت تعريفني يطلق على كل مادة تسبب إفراز الرضاب .

## ٢١٣٢٤ - مَرَعِي مُضَخَّ

Concasseur (F).

هو الجاروش ، اطلبه .

## ٢١٣٢٥ - مَرَعِي مُرَقَّب ، مَرَعِي مُرَقَّب

Hygromètre (F).

هو المرزاق ، اطلبه .

## ٢١٣٢٦ - مَرَعِي مُشَرِي شَعْرِي

Hygromètre à cheveux (F).

هو المرزاق الشعري ، اطلبه .

## ٢١٣٢٧ - مَرَعِي مُشَرِي ، مَرَعِي مُشَرِي

Améchyte (F).

هو الكركمان ، اطلبه .

## ٢١٣٢٨ - مَرَع

مرع وسرع المكان : انصب بكثرة الكلا .

## ٢١٣٢٩ - مَرَعَان

Clématite toujours verte (F).

هو الملحى البني ، اطلبه .

## ٢١٣٣٠ - مَرَعَاوِيلَا \* ، شَوْكُ الْجِمَعَال

Echinops (S), Echinope, Boulette (F).

جنس نباتات برية شبيهة من فصيلة المركبات الأنبروية الزهر . أنثاه عديدة منها الحلوية والحولة والممسة . سوقها فراء . أوراقها كبيرة اللد شائكة النصل . أزهارها رؤيئة كروية الشكل || أحرف أنواعها وأشهرها ما يلي :

## ٢١٣٣١ - مَرَعَاوِيلَا زَرْقَاء

Echinops ritro (S).

Boulette azurée, Echinope azuré (F).

حشبة معمرة تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم . أوراقها كبيرة اللد فلقية التفريش . نصلها أخضر الصفعة العليا المائلة ، أبيض السفلى الخملية ، شائك الحافة . أزهارها زرق . قطر الرؤيئة يراوح من ٣ إلى ٤ سم .

## ٢١٣٣٢ - مَرَعَاوِيلَا شَائِكَة ، شَوْكُ الْجِمَعَال

الشائع ، رمي الإبل ، سكتاني

Echinope commun (F).

نوع من المرعاوِيلَا ، مشهور باسم رمي الإبل ، اطلبه .



مرعاوِيلَا



مرعة شائعة

## ٢٦٣١٢ - مرقعة

المرقة والمرق : الروضة الكثيرة النبات .

## ٢٦٣١٤ - مرقعود الياسمين

Margarode du jasmin, Pyrale du jasmin (F).

فراشة من المرقشقيات وفصيلة الناريات مشهورة باسم نارية الياسمين ، يرتقا مذيبة .

## ٢٦٣١٥ - مرقعوتيت

Reine Marguerite (F).  
Queen Margaret (E).

نبات تزييني حولي يعرف بالخنكار ، اطلبه .

## ٢٦٣١٦ - مرقعورين

Margarine  
زبدة صناعية مركبة من ادهان نباتية مع شحم البقر .

## ٢٦٣١٧ - مرقعصف

Marcgravia (F).

جلس نباتات برية وتزيينية عارضة من فصيلة المرقشقيات . منبتها البلطقي بعض مناطق امريكا الاستوائية || انواعه المعروفة قليلة العدد منها السريعة ومنها المتسلقة المباشرة . اوراقها مزديسة الشكل ، ابيدة ، متعاقبة . ازهارها عتودي التجميع . ثمارها كروية ، جامدة ، حراء اللون .

## ٢٦٣١٨ - مرقعصيات

Marcgraviaceae (S).  
Marcgraviaceae (F). Marcgraviaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . اجناسها وانواعها متوسطة العدد . اصنافها بعض اصناف امريكا الاستوائية || نباتاتها متباينة الاشكال ، منها الاجار والشجيرات والمتسلقات . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، جامدة المتصال السنتنة الاطراف . ازهارها لاقياي التجميع منه الصبواني والدقوني والسنلي ، جميعها مستطيلة المالحق . ازهارها لاقياية الحميم . كوكوسها لانظامية التركيب منها الثنائية الفسل والثلاثية والاحادية . عدد بتلات توجيهاها بمائل عدد الفسل ، جميعها ملونة . ثمارها كروية ، دياة ، جامدة القشور || اشهر اجناسها المرقع .

## ٢٦٣١٩ - مرقعنة

Mérogenie (F). Merogony (E).  
المرقة اعصاب يويضة متساحلة بحوي منوي .

## ٢٦٣٢٠ - مرقعني

Mérogenique (F).  
Merogenic (E).

نمت تدريفي يطلق على كل ما له صلة بالمرقة ككوك اعصاب مرقني .

## ٢٦٣٢١ - مرقعوسة

Prolifera (F). Prolific (E).  
نمت تدريفي توصف به الاثنى الكثيرة النتاج .

## ٢٦٣٢٢ - مرقعول

Mergulus (S).  
Mergule (F). Mergulus (E).

جنس بطور بحيرة من فصيلة البطريقيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اصنافها مناطق الدائرة القطبية . لا ترك اليم الى اليابسة الا في زمن الترميم والحيالة . الرحالة القطبية تلقها بطير الجليد || ملجئها الحياتي جاعي . اسرابها وافرة العدد . قوتها الهوى والخضرات والدمايين والقشريات والاصمك الصغيرة || اشهر انواعه واغربها واعما انتشاراً المرقعول القترم او المرقعولة .

## ٢٦٣٢٣ - مرقعول قترم ، مرقعولة

Mergulus alle (S).

Mergule nain (F). Little auk, Dovekie (E).  
جسها صغير القد ، يطول من ٢٠ الى ٢٢ سم . رأسها محتدلاً لجرم ، قصير المتقاد الاسود . حذقة منها كسكتية الابن . ذنبها مخروطي الشكل . قصير . وسعها الى السمة والصفيحة العليا من الجناح ، ابيض الصدر والبطن والصفيحة السفلى من الجناح . اباها يبيض الاطراف . ثوبها الشتوي يتقلص فيه الاسود ليسل حله الاكعب || الاثنى ابيز قدماً من الذكور وتحتل بنفس الثوب . موكلها نقرة بين صدور الاحادح . الاثنى تحضن بمناوبة الذكر بيضة واحدة شبه اجاصية الشكل ، اصفر من بيضة الدجاجة . الترميم يستمر نحو اربعة اسابيع والصغير يمو على سطح الميم بعد التفكك باسبوع .

## ٢٦٣٢٤ - مرقعوي

Casarca (F).  
هو الشهران ، طائر من الدحل مشهور باسم ابو فرقة .

## ٢٦٣٢٤ - مرقعي ، سينور بيري

Felis tigrina (S).  
Margay, Chat tigre (F). Margay (E).

حيوان لاسم مفترس من فصيلة السنوريات . موطنه بعض اصناف امريكا الوسطى والبرازيل . يأنف الاسراج ولا يتشد عن الماء حيث يكثر قصه . ملجئه الحياتي خفي اي أن الذكر يكوم عدة اناث || جسمة احيث القوام رشيقها يطول نحو ٨٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٨ سم . رأسه محتل الجرم . اذناه صغيرتان ، مستديرتان كاسيتان . عيناه صغيرتان مكملتان . ثوبه الى الصهبة الصفراء ويلبها بتيجج وتندبر اسود . صدره الى الصهبة البتراء المشيرة بالاسود . بطنه الى الصهبة الخطية المرقشة بالاسمر . ذنبه متتابع الاطراف السود || سرعه دجوي . يتسلق الاشجار عتقة ويمدو على الافرض بسرعة . قوته الطير والجردان والفار والزحافات والفضادح .

## ٢٦٣٢٥ - مرقعيط

Erodium à feuilles de byrone

هو الجراب الفاشري الورق ، اطلبه .

## ٢٦٣٢٦ - مرقعاق

Grue (F). Crane (E).  
آلة رافعة ، تبيض الانتقال وتنقلها .

## ٢٦٣٢٧ - مرقع

Élévateur (F). Elevator, Lift (E).  
جهاز ثابت او نقال يستعمل في رفع وتنشيف البراميل والصناديق والبالات الخ .

## ٢٦٣٢٨ - مرقق ، مرققي

Coudé (F). Elbow (E).  
موصل اللاراع من المعدن . ج مرقق .

## ٢٦٣٢٩ - مرقق

المرقق نجم ثير من كوكبة سيابس .

## ٢٦٣٣٠ - مرقق الثربا

مرقق الثربا نجم من كوكبة الجبار .

## ٢٦٣٣١ - مرققي

Coudé (F). Elbowed (E).  
شكل من الازباي ، قائم لزاوية ، يشبه المرقق .

## ٢٦٣٣٢ - مرققين ، مرققين

Morphine (F).  
Morphia (E).  
مادة شبه قلووية عذرة ومسكنة تستخرج من الافيون .



مرغول



مرقي

Composante (F). **مُرَقَّة** ٢٦٣٤٩ -  
Component (E). وهي قد تكون اتقية أو رأسية .

Centre, Point central (F). **مُرَقَر** ٢٦٣٥٠ -  
Centre, Middle (E). هي نقطة الدائرة .

Centre de gravité (F). **مُرَقَرُ الثِقَل** ٢٦٣٥١ -  
Centre of gravity (E).

**مُرَقَرُ الدَّائِرَةِ ، نُقْطَةُ الدَّائِرَةِ** ٢٦٣٥٢ -  
Centre d'un cercle (F). Centre of circle (E).

Centre estatique (F). **مُرَقَرُ مُطْلَق** ٢٦٣٥٣ -  
Astatic centre (E).

Accumulateur (F). **مُرَقَم** ٢٦٣٥٤ -  
Accumulator (storage cell or battery) (E).

Pot (F). **مُرَكَن ، قَارُورَة** ٢٦٣٥٥ -  
وعاء من فخار تزوع فيه النباتات أو تستنبت ريشاً تنقل  
الى مستقرها . ج مران مران وقوارير .

Investi (F). Invest (E). **مُرَكُون** ٢٦٣٥٦ -  
نعت ثمرينى يطلق عل الاموال ، اخصها غير التقديرة ،  
للمسوقة لعل ما او المفعول معين .

Merlus, Merluccius (S). **مُرَقُوش** ٢٦٣٥٧ -  
Merluce (F). Hake (E).

جنس اسماك بحرية بيضوية من فصيلة الفادسيات . اعطائها  
بحار البلاد الحارة والمتدلة الحرارة || اجسامها احليجية .  
رؤوسها . كبيرة . اشداتها مسلحة باسنان قوية هربية  
الشكل . زعانفها الظهرية والثرجية مستطيلة الشكل ،  
خالية من المناسخ الشائكة || انواعها المعروفة اثنان المرلوش  
البطل الذي يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط  
والمرلوش الامريكى المعروف أيضاً بمرلوش الشيلي .

**مُرَقُوش صَبْلُوك** ٢٦٣٥٨ -  
Merluccius merluccius (S).

Merluce commune, Merlu (F). Common Hake (E).  
نوع من المرلوش . سمكة بحرية بيضوية مقشرة نعمة يكثر  
وجودها في البحر الابيض المتوسط || سرها وافر العدد .  
سرسها عرض البحر خارج المياه الاقليمية ، لا تقرب  
من المحاذي الا في زمن التفرقة || جسمها شبه احليجي  
الشكل ، يطول من ١٠٠ الى ١٣٠ سم . رأسها كبير  
الجرم . ثوبها الى الطحلة الغبراء السفاه المواجه . غطها  
الاجنبي اسود . بطها الى الثيرة البيضاء || زعانفها الظهرية  
اثنان . زعنفتها الشرجية واحدة || لحمها جيد الصنف .  
كبدها وافر المادة الزيتية الجيدة .

Amaraque (F). **مُرَقَاوَل** ٢٦٣٥٩ -  
هو المروء ، اطلبه .

Germandrée ambrée (F). **مُرَقَاوَر** ٢٦٣٦٠ -  
هو الطورقون الكوربي ، ليات عطري مدي مقو  
للأصصاب ومفيد لها . وهو منه وافر ويشاد للتشنج .

Babine, Babouine (F). **مُرَقَمَة** ٢٦٣٦١ -  
Lip (pendulous) (E).  
المرة والمرة : شفة البقرة وكل ذات ظلف لانها ترتم بها .

Barbe du blé (F). Beard (E). **مُرَق** ٢٦٣٣٣ -  
هي سكة السنبلة وتسمى سفا وشعاع . ج أرقاق .

Puccinia **مُرَق** ٢٦٣٣٤ -  
وسم فطري يترى النبات ويؤذي ، اطلب سمام .

Progression (F). **مُرَقَّة** ٢٦٣٣٥ -  
هي التوالي وقد وضعها لانها تؤدي سنى التوالي والمزيد  
دور المطلوب .

Uranomètre (F). **مُرَقَاع** ٢٦٣٣٦ -  
Uranometer (E).

جهاز يستعمل في تقدير المساحات الفضائية ان بين  
الكواكب او بينها وبين الارض .

Aplatisseur (F). **مُرَقَّة \* ، مِرَقَّة** ٢٦٣٣٧ -  
Grain-crushing mill (E).

آلة لتريق الحبوب السلفية ، مركبة من اسطوانتين تدوران  
في اتجاهين مفاكين تسحق الحبوب التي تمر بينها دون  
ان تكسرها .

Apode (F). Apod (E). **مُرَقَال** ٢٦٣٣٨ -  
هي الحشرة العديمة الارجل . ج مرقال .

Télescope (F). **مِرَقَب \* ، راصِدَة** ٢٦٣٣٩ -  
Telescope (E).

آلة مجهزة لرصد كواكب الفلك وسياراته ونجومه .

Stalle (F). Stall (E). **مُرَقَد** ٢٦٣٤٠ -  
شقة الفرس الواحد في الاصطبل .

Pyrite (F). Pyrites (E). **مُرَقَشِيَّتا** ٢٦٣٤١ -  
هو كبريتور الحديد ويكون اصفر اللون او ابيض .  
راجع بريت .

**مُرَقَى عَشْرِي ، مِقْيَاس عَشْرِي** ٢٦٣٤٢ -  
Echelle décimale (F). Decimal scale (E).

Doseur (F). **مُرَقَاز \* ، مَنَشَاع** ٢٦٣٤٣ -  
Doslmeter (E). جهاز المراكزة او قياس التركيز .

Sarcloir (F). Spud (E). **مُرَقَاش** ٢٦٣٤٤ -  
اداة لركش التربة ، يستعمل باليد .

**مُرَقَب الفَرَس** ٢٦٣٤٥ -  
مركب الفرس نجم ثير من كوكبة السفينة .

Composé (F). Composé (E). **مُرَقَب** ٢٦٣٤٦ -  
Multiple (F). **مُرَقَب** ٢٦٣٤٧ -

Compositae (S) **مُرَقَبَات** ٢٦٣٤٨ -  
Composées (F). Compositae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الثغلفين وسيدة القمامة سفلية  
الاسدية . تكثر من اكبر الفصائل النباتية ، انواعها حدة  
آلاف تجمعها ثلاثة اسباط : الشعاعية والنبوية الزهر  
ولسنية الزهر . منها الاجار والشجيرات والجنات والاعشاب .  
حصارتها مألوفة او لينة . اولافها متعاقبة او متعاقبة .



مرقال



مِرَقَب



مرلوش مبدول

## ٢٦٣٧٣ - مَرْمُوتُ الْقُطْبِ ، مَرْمُوتُ كَنْدَا

Arctomys monax, A. empetra (S). Marmotte monax, M. de Québec, Monax (F). Canadian marmot, Monax (E).

نوع من المرموط، موطنه يمتد من كندا إلى كليفورنيا. جسمه يطول نحو ٣٧ سم. وذنبه ١٧ سم. وبره كثيف التجميع، متوسط الطول. ثوبه إلى العنق السراة، يلمع أصفر المراح.



مرموت

## ٢٦٣٧٤ - مَرْمُوتُ بُولُونِيَّة

Arctomys bobac (S). Marmotte bobac, M. de Pologne, Bobac (F). Polish marmot, Bobac (E).

نوع من المرموط موطنه يشمل بلاد بولونية وغاليسه وروسيا الجنوبية. جسمه يطول نحو ٣٧ سم. وذنبه ٩ سم. ثوبه إلى الصبغة، حنار عينيه إلى السرة، طرف ذنبه إلى السواد، وبره ليد التجميع متوسط الطول.

## ٢٦٣٧٥ - مَرْمُوتُ حِمَالِيَا

Arctomys himalayanus (S). Marmotte de l'Himalaya (F). Himalayan marmot (E).

نوع من المرموط، صغير القد، كثيف الور الثام المتوسط الطول. موطنه جبال حماليا حتى ارتفاع ٤٠٠٠ م. من سطح البحر.

## ٢٦٣٧٦ - مَرْمُوتُ شَالَع \*

Arctomys marmotta (S). Marmotte commune (F). Common marmot (E).

نوع من المرموط يعيش من ٩ إلى ١٠ سنوات. موطنه جبال أروية. جسمه يطول من ٢٨ إلى ٤٥ سم. وذنبه من ١٦ إلى ١٨ سم. وزنه في الخريف قبل بيانه الشتوي يراوح من ٧ إلى ٨ كيلو. ثوبه إلى الصبغة الخفيفة يملأ مراح صناعي يتحول إلى الأحمر القمحي مع استسالة العمر. رأسه وأطراف قوائم وذنبه إلى السرة. أثناء نضج جروين في أواسط شهر حزيران.

## ٢٦٣٧٧ - مَرْمُوتُ مَدَّهَب

Arctomys aureus (S). Marmotte dorée (F). Golden marmot (E).

نوع من المرموط صغير القد كثيف الور الثام، ثوبه إلى الصبغة الصفانية الملهبة. موطنه بعض جبال الهند والباير.

## ٢٦٣٧٨ - مَرْمِيزُوكَة

Meromyza (S). Meromyza (F). Meromyza (E).

جنس حشرات من فصيلة الخزياتيات ودية ذوات الجنحين. أنواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المحتلة الحارة || أجسامها صغيرة، هياها، طول من ٣ إلى ٦ م. رؤوسها مكورة، عينيها كبيرة، فارة عند الشقين. قرونها الاستشارية قصيرة، تنتهي بنسيلة دقيقة، ملاصقة صغيرة. أعطانها متفصلة الجرم. كواسلها مستطيلة، مرقونة، بطونها أنسيابية الشكل. رواشها كبيرة، قسطانية التخفيف. انغادها الخفيفة فضحة تمكنا من التغفر || الحشرة الجبلانة واثقة رتمها البراري والمروج. البرقة تمشي على سرق التنبليات وقد تركب القمح والأرز فتسبب أضراراً زهر السابل.

## ٢٦٣٧٩ - مَرْمِيس

Rhinoceros (F). هو الكركدن، أطلبه.

## ٢٦٣٨٠ - مَرْمُوت

Surmulot (F). هو جزء الخناص، أطلبه.

Marbre (F).

## ٢٦٣٨١ - مَرْمُوت

هو الرخام، أطلبه.

Marbré (F). Marbled (E).

نعت ترميزي يطلق على ما كان يشبه الممر.

## ٢٦٣٨٤ - مَرْمِيسِيَّات \*

Myrmicidae (S). Myrmicidae (F). Myrmicidae (E).

فصيلة حشرات من فئائيات الاجنحة المحصورة ونف الحموليات. أجسامها وألوانها المعروفة قليلة العدد موطنها بعض اصقاع البلاد الباردة والغطية || أجسامها شبيهة بأشواها إلى الجؤرة التفاتة المساجات. جميعها منجحة. حاما دقيقة. ذرية، معدلة الطول || أشهر أجناسها المرمس (Myrmique).

## ٢٦٣٨٥ - مَرْمِيسِيَّة

Arénacé (F). Sandy (E).

نعت ترميزي يطلق على كل ثربة خرواية كثرت فيها نسبة العنصر الرمي.

## ٢٦٣٨٦ - مَرْمَلِكَة ، مَحْفَار

Sablère, Carrière de sable (F). Sand-pit, Gravel-pit (E).

منجم يستخرج منه الرمل.

## ٢٦٣٨٧ - مَرْمَلِكَة

Jardin de grenadiers (F).

هي بستان الرمان.

## ٢٦٣٨٨ - مَرْمُورَة

Pagei marbré (F).

المرمورة سمكة بحرية تدعى فرديسي منج، أطلبه.

## ٢٦٣٨٩ - مَرْمُورَة

Marmoset (F).

هو الحبال من القرود اللبية.

## ٢٦٣٩٠ - مَرْمُورَة \* ، مَرْمُورَة ، مَرْمِيزُوكَة ، مَرْمِيزُوكَة

Calceolaria (S). Calceolaria (F). Slipperwort (E). Pantoefblume, Schubblume (D). Calceolaria (I).

جنس نباتات مشبية ليفية ومخشوشة من فصيلة الخنازريات. أنواعها عديدة، منها الحولية والهولة والمصرة، معظمها بري وبعضها ترابي كثير الضروب والأصرام. سوقها زبه. أوراقها متعاقبة كاملة. أزهارها خريبة الشكل تشبه الخف. ألوانها متباينة عديدة تراوح من الأبيض إلى الأحمر الغامق.

## ٢٦٣٩١ - مَرْمُورَة

Arctomys (S). Marmotte (F). Marmot (E). Marmelietier (D).

جنس حيوانات لبنة قاضمة من فصيلة السنجابيات. أنواعها المعروفة ١٥، جميعها متوسطة القد بطيئة الحركة. رؤوسها مستديرة، أذانها صغيرة مستديرة. أذنانها قصيرة جللة. صوفها متوسط النعومة || أعطانها الجبال العالية. بيئاتها الشتوي يدوم نحو أربعة أشهر. تنميش جهامات في أجمار تحفرها في الحرم على أعماق تراوح من ٩٠ إلى ١٢٠ سم. جحرها نفق قلته نحو ١٥٠ سم. وطوله من ٨ إلى ١٠ أمتار ينهي برمة عرضها ٢٠٠ سم. أحرف أنواره وأشهرها ما يتبع.

## ٢٦٣٩٢ - مَرْمُوتُ التَّبَسْت

Arctomys robustus (S). Tibetan marmot (F).

أكبر أنواع المرموط، موطنه جبال التبت. ثوبه إلى السرة الخفيفة. وبره كثيف، لين، مستطيل.



مرموت شالع

**٢١٣٩٠ - مرهآه \***  
Hypsomètre (F).  
Hypsometer (E).  
جهاز آل يمكن المده من تحديد ارتفاع المكان أو الشيء .

**٢١٣٩١ - مرهآه**  
نمت وصني يطلق عل الاسكة القليلة الشجر كتوك كحديقة مرهآه أو غابة مرهآه أو ارض مرهآه .

**٢١٣٩٢ - مرهيبك \***  
Impondéré (F).  
Unweighed (E).  
المربل ما كان عادم الوزن أو القياس .

**٢١٣٩٣ - مرهكة**  
Etang artificiel (F).  
Artificial mere, A. pond (E).  
حور صني تحزن فيه مياه الشتاء .

**٢١٣٩٤ - مرهم**  
Liniment, Onguent, Pommade (F). Liniment, Unguent, Ointment, Pomade (E).  
مركب طبي دهني مختلف العناصر والالوان، استعماله خارجي.

**٢١٣٩٥ - مرو**  
Quartz  
ضرب من الصوان مختلف الاشكال البلورية والاحجام الشبانية .

**٢١٣٩٦ - مرو\* ، حقيق الشيوخ ، خربكشاش ، مرماحوز ، برد قوش معقد ، زغبير**  
Origianum maru, O. amaracus, Majorana maru (S).  
Amaraque, Marjolaine vraie (F). Amaracus (E).  
Amarakuschubline (D). Amaraco (I).  
بجلة معمرة عطرية زراعية من فصيلة الفويات .  
تتلو من ٢٠ الى ٥٠ سم . ساقها وفروعها حذوية اللون .  
فروعها منفرجة مسترسلة . اوراقها لائقة كاملة اهليلجية ،  
تصلها خلي البشرة حل صفحية . ازهارها سبلي التنجيم .  
ازهارها قليلة العدد وردية اللون || ينبت من التوابل  
وهو مقو للعدة ، منه ، طارد الرياح . يستخرج منه  
بالتقطير زيت طيار كانوري الرائحة له استعماله الطبي .

**٢١٣٩٧ - مروكة**  
Maerus (S).  
Maerua (F). Maerua (E).  
جنس نباتات مجلية وجنية معمرة من فصيلة الكبريات .  
انواعها المعروفة نحو ٢٠ منبتها بعض المناطق الافريقية  
اغصنها المشرقة عل البحر الابيض المتوسط || سوقها فروع .  
اوراقها بيضيه النصال الجامدة ، صغيرة الربليات .  
ازهارها عشودني التنجيم . ازهارها معتدلة الاحجام ملونة  
من الابيض الى الاصفر والاحمر والاريجاني . ثمارها  
عنية وقرية البذور او شعية || تنويرها دبعي .

**٢١٣٩٨ - مروكاز\* ، بارومتر**  
Baromètre (F).  
Barometer (E).  
جهاز خاص وضع لقياس الضغط الجوي وهو يتكون  
عادة من وعاء الزئبق وانبوبة شمية ترفس في الوعاء وسام  
دقيقة ينفذ منها الهواء وسواق مدرج يدل عل ارتفاع  
الضغط أو انخفاضه .

**٢١٣٩٩ - مرواز مسجل \***  
Baromètre enregistreur (F). Registrar barometer.  
Self-registering barometer (E).  
مرواز جهاز بالعدة اللازمة لتكوين انفعالات الضغط الجوي.

**٢١٣٨١ - مرّبة**  
Clapier (F). Hutch (E).  
اقفاص الارانب وكل مكان خصص لتربية الارانب  
وتكاثرها .

**٢١٣٨٢ - مرّبة \***  
Coregonus maraena (S).  
Corégone, Marène (F).  
سمكة نهرية من مفتوحات المائة وفصيلة السلمونيات .  
اصطادها معظم بحيرات الشرق الاوسط واروية الوسطى ||  
جسمها متوسط القد ، معتدل التطيط ، بطول نحو ٣٠ سم .  
لونها الى الزرقة الفضية المالح يبق في الرأس والظهر ويتر  
في البطن . زعنفتها القليلة فارقة ، شبه هلالية الشكل ||  
لحما ان مدخن او ملح رائج السوق في ادوية الوسطى .

**٢١٣٨٣ - مرّنجية**  
Moshringia (S). Méringie (F).  
عشبة معمرة من فصيلة القزنفليات . مهدا حشاب رهام  
بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط . ساقها نحيلة فروع .  
اوراقها سنائية بطول من ٢ الى ٣ سم . نصالها مقعرة  
السطوح ، بحرية الحصار . ازهارها بيضاء اللون ، صغيرة  
القد . ترطب في المواقع الوعرة والاثربة الكلسية || تنويرها  
يستمر من حزيران الى آب .

**٢١٣٨٤ - مرندكة**  
Laurière (F).  
كل موقع تكثر فيه اشجار الرند اي الفار يدعى مرندة .

**٢١٣٨٥ - مرّطكة**  
Maranta (S).  
Marante (F). Arrow-root plant (E). Arrowroot-  
pflanze (D). Cannacoro, Erba da freccle (I).  
جنس نباتات جلمودية برية زراعية من البرنطيات  
وفصيلة النجيليات . انواعها المعروفة حسة ، منبتها المناطق  
الحارة . اوراقها كبيرة القد مستطيلة الزنبد الحامسة . تصلها  
سنائي الشكل بارز المرو . ازهارها سنبلية او عشودنية  
اللون || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة  
التالية .

**٢١٣٨٦ - مرّطكة اسلية**  
Maranta juncea (S).  
Marante élancée (F).  
نوع من المرطكة الزراعية ترطب في الاربة الرطبة . اوراقها  
سنائية كبيرة منتسبة . شماريتها الزهرية تملو من ١٠٠  
الى ١٥٠ سم . ازهارها سنبلية التنجيم || جذاميرها  
دقيقة مستطيلة قليلة الماددة النشوية .

**٢١٣٨٧ - مرّطكة قصبة\* ، ارّوكة**  
Maranta arundinacea (S). Marante arundinacée (F).  
نوع من المرطكة الصناعية الشائعة الاستعمال ، ترو من  
اجل جذاميرها النشوية الياب التي يستخرج منها الارروت  
وهو نوع من النشا الدثالي ، دقيقه يحوي :  
١٠٢٥ ٪ من المواد الاثوية  
٠٢٢٥ ٪ من المواد الدهنية  
٨٥٠٥٥ ٪ من المواد النشوية والسكرية

**٢١٣٨٨ - مرّطكة هندية \***  
Maranta indica (S).  
Marante de l'Inde (F).  
نوع من المرطكة الزراعية ترطب في الاربة للهبالية الخسبة .  
يستخرج من جذاميرها الارروت اعطى الجيد الصنف  
والانتاج الذي يحتل المركز الثاني بعد الارروت القصب .

**٢١٣٨٩ - مرّطقيات**  
Marantacées (F).  
Marantaceae (E).  
سبط من فصيلة النجيليات ، اشهر اجناسه المرطكة .



مرنة



مرلطة قصبة



مرلطة هندية




مرهآه



مرو



مرواز



مرواز مسجل



**Palimpsestis or, مَرُوش الحَوَر ٢٦٤٠٨**  
Cymatophora or (S). Cymatophora or, l'Or (F).  
Palimpsestis or (E).

حشرة من فصيلة الشرقيات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشها واسعة قوتها رقيق الازهار . مرشها تمش على اوراق الخور والصنصاف || جسمها وبني الشكل يطول نحو ١١ م . بسطتها نحو ٣٤ م . رأسها حنفي اللون . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشها مثل الطيل . جوشها وبطنها الى الحنطي المنحني المراج || ورشها الامامية الى الخنطي الاخير تملو رقشة الى الصخرة وخطوط معترسة الى السرة . ورشها انقلبان الى الحنطي الكلف المنحني المراج تملو حدة وسطى حلالية يبراه || لها جيلان في الحول . تظهر فرائدة الجيل الاول في نيسان وتظهر فرائدة الجيل الثاني في تموز . تسرح من مصر الى فصحة الجبل . تعامل بد ظهورها بنمو اربعة اسابيع وتفتح المكان لطفا على الصفحات السفلى من نصال الازراق || السرة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٦ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مائل للتشاور . ثوبا الى الخضار البشري الجراج بالابيض والاصفر . رأسها جزوي اللون . مذهبها ورواجها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما يتقضي ضمن صلبة تحميها السرة تحت القشور او بين شقوق الحاء .



مروء الشبع



مروء الخور

**Laité (F). Soft-roed (E). مَرُوك ٢٦٤٠٩**  
كل سمكة ذكر لا يزال جراجها الشلخي مله . بالرول تمتت بالرول . كقولك طرسوج مروء .

**Irrigée (F). مَرُوي ، مَسْقُوي ٢٦٤١٠**  
Irrigated (E). هو النبات او الزرع الذي يسقى .

**Esophage (F). مَرِيء ٢٦٤١١**  
Esophagus, Gullet (E). جزء من انبوب الهضم مركز بين البلعوم والمعدة .

**Anémomètre (F). مَرِيح ٢٦٤١٢**  
Anémomètre (E). جهاز يحدد مهب الريح وسرعته وتخطها .

**Rentable (F). مَرِيح ، مَرِيح ٢٦٤١٣**  
Prolif-carning (E). كل استئثار يعود على صاحبه بايراد سنوي يغطي الاكلاف ويؤمن بعض الدخل الصافي .

**Prolifère (F). مَرِيح ، مَرِيح ٢٦٤١٤**  
Proliferous (E). صفة الشيء الذي يتكاثر . ونعت تعريفي توصف به الازهار والثمار التي تنتهي باذن مودة .

**Mars (F). مَرِيح ، مَرِيح ٢٦٤١٥**  
Mars (F). Mars (E). كوكب سيار من الفلكس ينتمي الى مجموعة النظام الشمسي . يبعد عن الشمس ياتي بعد الارض . لونه الى الصفار الاحمر . جرده يقل عن جرم الارض نحو ٧ مرات وكذلك نحو عشر مرات . مرعة دورته الانتقالية في الفضاء نحو ٨٧٩٦٦ كيلومتر بالساعة . دورته الفلكية حول الشمس تستغرق نحو ٦٨٧ يوما . دورته المحورية الذاتية تستمر



مريخ

**Baloea (S). مَرُوب ٢٦٤٠٠**  
Baloea, Marrube (F). جنس نباتات عشبية بوية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعه المعروفة متوسطة العدد . اعطائها تشمل بعض مناطق الشرق الاوسط والادد واروبية وافريقية الشالية || سويها عشائية فراع تملر من ٣٠ الى ٨٠ سم . اوراقها متعابلة ، اهلبيجية النصال الخشنة المسنة الختار . ازهارها محوري الارتكاز . ازهارها بياض اللون وبها الابيض الاصفر المراج . ازهارها واورانها فواحة العرف للاستسحب || تنويرها صيفي .

**Eventail (F). مَرُوشة ٢٦٤٠١**  
Fan-shaped (E). شكل من اشكال تقليم الشجر ، يشبه المروسة .

**Palmier éventail (F). مَرُوشة ٢٦٤٠٢**  
هي القول نوع من النخل التريزي .

**Flabellé, Flabelliforme (F). مَرُوشية ٢٦٤٠٣**  
Flabelliform (E). نمت وصفي يطلق على ما كان شكله كالمروسة .

**Stylot (F). مَرُود ٢٦٤٠٤**  
كل انبوب من مجموعة الانابيب التي تشكل قلم اللقطة في الزهرة . وهو محور البكرة والخديدة التي تدور في الجلام وكل نصل دقيق مثلوث . ج مراد .

**Xiphosures (F). مَرُوديات الأذئاب ٢٦٤٠٥**  
رتبة من المفصليات الشيفسيات المرتبويات . فضائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد . منظمها الساق من متحجرات الاحتباب الاول || المعاصر منها الآن فصيلة واحدة تصدح لميطيات .

**Epithrix parvula (S). مَرُوش الشبع ٢٦٤٠٦**  
Flea beetle (E).

حشرة من مفصليات الاجنحة وفصيلة الخضاريات . جسمها صغير القند يطول نحو ٢ م . ثوبها الى السرة المابقة . وهي من الحشرات التي تطير وتقفز حسب تقفي الحاجة . اجسامها الحولية تراوح من ٢ الى ٣ . اناتها تمتع المكان على الاحصاب البرية فينتف من رقات دقيقة تحمله غبار اللون يبلغ طراها عند كمال تطورها نحو ٤ م . || ازهارها تمرد الى الحفرة والرتة . الحشرة تقضم نصال التبغ على صفحتها العليا في المشتل وتعل صفحتها السفلى بالحقول تقضم الازراق وتحطم من قوتها . اما البرية التي تمش على المواد المنصوبة في التربة فانها لا تتأخر عن قرض جلود الشفليات الناشئة || مكانتها نظرا لسرعة حركتها واعتنائها في التربة وبين الاحصاب تبدأ بتنظيف المشتل او الحقول من جميع الاحصاب البرية واذا كان لا بد من دواء فيجب ان يكون شديد الفعالية . كاخضر باريس وزرنايات الرصاص والروتينون .

**Rejet, Rejeton (F). مَرُوش ٢٦٤٠٧**  
Shoot, Sprout (E). هو الرود والفصيلة والبتلة والفرخ وقد يحسن تخصيصه بركة النبات الخشوب .

سرعية في المسانف ، عارشة في الثابات حيث يبلغ طولها نحو ٥٠ سم. ثمارها وشعة الجراب الذي يطول من ٣٠ إلى ٤٠ سم. ويعرض نحو ٤ سم. بزورها كثيرة العدد ، صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، ولونها إلى السرة الصفانية يعلوها تبيج ذهبي . راحتها سرعرة ، مقسة . طعمها يبدو كطعم البندي ثم يتحول فوراً إلى مرارة العظم || يستخرج منها نحو ٢٢٪ من الدهن الجمالي الطبي الاخضر اللون .

#### ٢٦٤٢١ - سرعرة الغابون ، سرعرة لطيفة

*Serophantus gratus* (S). *Strophanthus agréable* (F).  
نوع من المبررة . مهدا الغابون وبعض مناطق نيجيريا الجنوبية والكونغو . جنبها داسية أو سرعية في المسانف ، عارشة في الثابات . ثمارها متوسطة الحجم . بزورها اهليلجية الشكل ، تطول من ١٢ إلى ١٥ سم . وتعرض ٣ إلى ٥ سم. لونها إلى السرة الكستنية الزيتية المزاج . راحتها سرعرة ، مقسة ، لا تقبل الانقباض . طعمها شديد المرارة منذ الاول || يستخرج من بزورها نحو ٣٤٪ من الدهن الجمالي الطبي الاخضر اللون .

#### ٢٦٤٢٢ - سرعرة تشاد ، سرعرة كُعب

*Strophanthus Kombe* (S). *Strophanthus de Kombe* (F).  
نوع من المبررة ، مهدا مناطق تشاد ومجيرات افريقية الوسطى . جنبها داسية في المسانف ، عارشة في الثابات . ثمارها اصفر قدماً من ثمار مريرة السودان اما بزورها فانجس وقت يبلغ طولها نحو ٢٠ سم. لونها إلى السرة اخضر المزاج . راحتها قليلة الصرامة اللبوية . طعمها شديد المرارة || يستخرج من بزورها نحو ٣٠٪ من الدهن الجمالي الطبي الاخضر اللون .

#### ٢٦٤٢٣ - سرعيس

*Histioteuthis* (S). *Histioteuthis* (F).  
جنس حيوانات بحرية من الرغويات رأسيات الاربيل وفصيلة الرماصات . انواعها المعروفة قليلة اعدادها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || اجسامها جرابية الشكل مستندقة الاعقاب . حيونها كبيرة مائعة . زعانفها طرفية نصف دائرية الشكل . رؤسها اسطوانية كبيرة مندمجة مع الاجسام . جرابها متباعدة الاشكال منها ستة محطة ومجموعة متساوية الطول واثنان طليقتان محجبتان واثنان مستطيلتان تلتصبان برؤس متباعدة الشكل عادمة الحاجم .

#### ٢٦٤٢٤ - سريس

*Myrris* (F).  
هو السرفل الطري ، اطليه .

#### ٢٦٤٢٥ - سربيع

*Fertile* (F).  
*Fertile, Fruitful, Rich, Fat* (E).  
صفة الخصب في التاج والانتاج والثمار والالات .

#### ٢٦٤٢٦ - سرعكة

*Laemargus* (S). *Laimargus* (F).  
جنس اسماك بحرية ولودة من فصيلة السمندويات . انواعها المعروفة اربعة ، منها لوفان بحويان بحار الشمال ونوع يحبب المحيط الهندي والاربع يحبب البحر الابيض المتوسط وهو اصفر قدماً لانه لا يطول اكثر من متر بيتا الانواع الاخرى تطول من ٤ إلى ٦ امتار || وتعيش مربية

نحو ٢٤ ساعة و٣٠ دقيقة || والاربع كالارض له بحار وجو ويولد في فلكه قران «سُورِس» و«دُيُوس» ، ودورة الاول تستمر نحو ٧ ساعات و٣٠ دقيقة ، ودورة الثاني نحو ٣٠ ساعة و٢١٠ دقيقة || والمتجمدون يسمونه النحس الاصفر لانه دون زمل في النحوة . واضافوا اليه البطش والقتل والتهرب .

#### ٢٦٤١٦ - سربيع

المادة الصلبة البيضاء الكاثية في جوف القرن .

#### ٢٦٤١٧ - سوريس

*Picris* (S). *Picride* (F).  
*Yellow succory* (E). *Bitterich* (D). *Picride* (I).  
جنس نباتات عشبية طيبة من فصيلة المركبات اللبينية الزهر . انواعها عديدة جميعها برية . سوقها فراء غزيرة العصارة اللبينة المرة الطعم . اوراقها متعاقبة ، لاطفة ، متباعدة الشكل صغيرة القد . نصلها منشاري الحافة ، خلي البثرة على سطحه ، بحري اللون . اذعارها ورؤية بحيلة الصغار || والمرير يزيل الجرب والحكة ويدل البول وينفع من ضعف الكبد والقصة واذا اخذ مع النحوة فتت الحصى والعلق البول وهو يصدح وتصلحه الكثيره .

#### ٢٦٤١٨ - سوريرة

*Chondrilla* (F). *Chondrilla* (E).  
هي الخندويل ، نبات طبي ، اطليه .

#### ٢٦٤١٩ - سوريرة

*Strophanthus* (S). *جيفكة* \*  
*Strophanthus* (F).  
جنس نباتات برية ، طيبة ، صمرة ، من فصيلة الدفليات . انواعها المعروفة ٥٠ مهدا المناطق الاستوائية والاقاليم المتاخمة من البلاد الافريقية والمحتمية . تحدد انواعها ونباتاتها الطوعية هو التالي :

افريقية الشرقية والوسطى	تثبت ١٥ نوعاً
افريقية الشمالية	تثبت ١١ نوعاً
افريقية الجنوبية	تثبت ١١ انواع
مدغسكر	تثبت ٣ انواع
اخذ ماليزية	تثبت ١٢ نوعاً

سوقها رها كلها متباعدة الاشكال ، منها الشجيرات والجنبات والعوارد والسرعية الفروع والداسية . يبدو ان شكلاتها الرئيسية تعود الى بعض العوامل التنوعية ، اخصها الضع . اوراقها اهليلجية ، مقنعة ، لاقياسية الانقسام ، منها المتعاقبة والمتعاقبة والقصية ومنها المائلة النصال والمزغية . اذعارها طفقة التجميع ، طرفية الارتكاز ، مخلفة الالوان . كروها لينة ، حامية الانطلاق . بتلاتها قديمة مستطيلة . مآبرها سهمة ، مديدة الاطراف . ثمارها مركبة من جرابين متقابلين . بزورها مستطيلة ، متكية الطرف ، لتتصق بغزقة من الهلب المستطيل الدقيق الناعم || يستخرج من بزورها ، باستثناء الفترة ، مادة جميلة طيبة . شديدة المرارة تدعى سروبنتين (*Strophantine*) كانت ولا تزال تستعمل من قبل بعض قبائل مجاهل افريقية في علاج التيسال السامة . وتستعمل طبياً في علاجات القلب وانقباضه وفي تحسين الدورة الدموية واستقرار النبض والقضاء على شيق التنفس || أشهر انواعها الطبية الثلاثة التالية .

#### ٢٦٤٢٠ - سوريرة السودان ، سوريرة سوريرة

*Strophanthus hispidus* (S). *Strophanthus hispidus* (F).  
نوع من المبررة . مهدا السودان ومجيبه ونيجيريا . جنبها



سوريس



سوريرة



سريس



سربعة

التي تستعمل باستمالة عظمتها وبشرها الاطعم الاثري المواج الذي يعين مع اقترابه من الظهر ويبقى عند البطن لا قياسية مسوكتها فاعرة الصنف مرغوب فيها . حبوبها مأكولة متوسطة الصنف ، ويستخرج من اكبادها الصلصة مادة زيتية شائعة الاستعمال .

### ٢٦٤٢٧ - مرتبة \* Margaritana (S).

Margaritana (F). Margaritana (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات فصليتها الخياشيم ولصيلة النباتات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في مصر انهر وبحيرات افريقية واروپية وآسية وأمريكة || اصداها شبه بيضية الشكل ، محدبة ، مستطيلة ، لا متساوية المصاريع والاعمال . بعض انواعها ينتج اللؤلؤ الفاخرة || تعيش بين الصخور او في الرمال والاسمال . حبوبها مأكولة متوسطة الصنف .

### ٢٦٤٢٨ - مرتبة \* Carthame (F).

هو القرم ، نبات من فصيلة المركبات ، اطله .

### ٢٦٤٢٩ - مرتبة \* Murex

جنس حيوانات بحرية من الرخويات المهديات ذات الاصداغ . انواعه عديدة اشهرها المريق الفينيقي (ابو دينار) والمريق اليوناني || اصداغه مدنية شائكة . كانوا يستخرجون منه في الزمان الفاخر خضاباً ارجوانياً ثانياً يستعمل في صبغ انفس الثياب .

### ٢٦٤٣٠ - مرتبة \* Muricidae (S).

Muricidae (F). Muricidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات مدنيات الدريل وحيوانات الاجهزة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة والمحتلة الحارة . كان لها شهرة في الزمان الغابر ايام الفينيقيين اذ كانوا يستخرجون من بعض انواعها الصباغ الازرق المشهور || اعرف اجناسها واشهرها الحثريين والفرفرة والسكيس .

### ٢٦٤٣١ - مرتبة \* Marica (S).

Marique (F). Marica (E).

جنس نباتات عشبية سيمورية سرولية من فصيلة السوسنيات . منبتها البرازيل ، شجارتها منتصبة ، وقمة اوراتها خضيفة النصال ، جميلة الخضار الزاهي . ازهارها زرقاء اللون او بيضاء || تزود القرين في الحدائق . انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها الزرقاء .

### ٢٦٤٣٢ - مرتبة \* Marica corulea (S).

Marique bleue (F).

نوع من المركبة . منبتها البرازيل ، شجارتها مستظلة الحجم يرتفع من ٦٥ الى ١٠٠ سم . اوراتها صغيرة الحجم ، خضيفة النصل ، جميلة الخضار الزاهي . ازهارها كبيرة لثقة ، قطرها نحو ١٠ سم . لها الازرق الزرقاء اليلكية للمواج || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

### ٢٦٤٣٣ - مرتبة \* Sauge officinale (F).

نبات طبي ، يعرف بالقوسية الحنزنية ، اطها .

### ٢٦٤٣٤ - مرتبة \* Morina (S).

Morine (F). Whorl flower (E). Quirkarde (D).

Morina (I).

جنس نباتات زينة معمرة من فصيلة البهباسيات . انواعها

### ٢٦٤٣٥ - مرتبة صفراء الزهر

Morina culteriana (S). Morine de Coulter (F).

بجلة زينة تعلو من ٦٥ الى ٩٠ سم . ساها فراء فناء . اوراتها خضيفة ، نصلها يطول نحو ٢٠ سم . ويعرض نحو ٢ سم . ازهارها صفراء اللون ، ثنائية التجميع ، ابطة وتاجية الازنكار || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

### ٢٦٤٣٦ - مرتبة صفراء

Morina bulleyana (S).

Morine de Chine (F).

بجلة سرولية زينة تعلو نحو ٦٥ سم . ساها فراء تملوها خطوط مستطيلة من الزغب الاطعم . اوراتها سنانية تطول من ١٢ الى ١٥ سم . ازهارها بيضاء اللون ، فورية التجميع ، طريقة الازنكار || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

### ٢٦٤٣٧ - مرتبة عجمية

Morina persica (S).

Morine de Perse (F).

جنية سرولية زينة تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساها فراء . اوراتها مقابلة خضيفة ، نصلها يطول نحو ١٥ سم . ويعرض نحو ٣ سم . صفحت خلية البشرة متبادعة التنسج التي الحصف . ازهارها ابطة وطولية الازنكار ، وردية اللون ، خلية الصلصة || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

### ٢٦٤٣٨ - مرتبة مستطيلة الزوق

Morina longifolia (S). Morine à longues feuilles (F).

جنية زينة تعلو من ٨٥ الى ١٢٠ سم . ساها فراء . اوراتها خضيفة ، نصلها يطول من ١٥ الى ٣٠ سم . ويعرض من ٢ الى ٤ سم . سحارها مدورة الخلق ، دقيق الحصف . ازهارها متوسطة القد ، ابطة وطولية الازنكار ، ثيرة بيضاء اللون ثم تنحرف الالودي وتنسفر على الحرة القانتة . ازهارها يستمر من تموز الى آب .

### ٢٦٤٣٩ - مرتبة \* Mérinos (F).

Marino sheep (E).

ضأن بني مرين ، سلالة من الضأن المشهور بفراة صوف ونموته وجودة صنفه .

### ٢٦٤٤٠ - مرتبة \* Murenidae (F).

هي فصيلة الشقيبات ، اطها .

### ٢٦٤٤١ - مرتبة \* Mérone (F).

هو الزيد ، اطها .

### ٢٦٤٤٢ - مرتبة \* Allibite (F). Nutritive (E).

لمادة او المواد الغذائية المقابلة للتشثيل المباشر في الجسم .

### ٢٦٤٤٣ - مرتبة \* Vin de bon goût (F).

الخمر اللذيذة الطعم .

### ٢٦٤٤٤ - مزاد الانتصار

Adjudication au revidage, A. à la révision (F).

هو المزاد الذي يفضح لانتاف قوم تآمر على ان لا

يقانصوا في المزايدة الثنية وذلك ليسو المطروح بمن



مرتبة



مرتبة



مرتبة



مريوس

- Enchère (F). Auction (E). **مَزَايِدَة** ٢٦٤٥٧  
هي عرض مبلغ أهل من الأثن الاساسي أو من المبالغ التي سبق عرضها في أثناء المزاد .
- Beurrerie (F). Butter factory (E). **مَزَايِدَة** ٢٦٤٥٨  
هي محل الزبدة ، بناء مخصص لصنع الزبدة ويبيعها .
- ٢٦٤٥٩ - **مَزَايِدَة** هي الخفاة ، اطلبها .
- Mazus (S). Maze (F). Mazus (E). **مَزَايِدَة** ٢٦٤٦٠  
جنس نباتات عشبية معمرة برية وتربيتية من فصيلة الخنازيريات ، انواعها المرونة قليلة العدد بعضها من نباتات الهند والبيض الآخر من استراليا وتسانية || سوقها قصيرة أو جعدة أو مدادة . اوراقها اهليلجية ملوقة . ازهارها حقنوي التجميع ، شمراخي الارتكاز || اعرف انواعها واشهرها النوعان التاليان .
- Mazus rugosus (S). **مَزَايِدَة خَشْنِيَّة** ٢٦٤٦١  
Maze rude (F).  
نوع من المَزَايِدَة ، ساقها فروع قصيرة تملأ من ١٠ الى ٢٠ سم . اوراقها مشرمة غشنة . عناقيدها الزهرية تطول من ٨ الى ١٥ سم . ازهارها الى الزرقة الباهتة الجميلة || تنويرها يستمر من ايار الى ايلول .
- Mazus pumillo (S). **مَزَايِدَة قَرْمَة** ٢٦٤٦٢  
Maze pygmée (F).  
نوع من المَزَايِدَة ، ساقها جعدة . اوراقها غشنية مشتمة النصال ، شمراخيتها الزهرية قصيرة . ازهارها يبيضه اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .
- Amandier amer (F). **مَزَايِدَة** ٢٦٤٦٣  
هي شجرة اللوز المر . ج مزج ، اطلبها .
- ٢٦٤٦٤ - **مَزَايِدَة**  
الزجل : الموضوع الذي يرسل منه الحمام الزاجل الهادي .
- Concurrentiel (F). **مَزَايِدَة حَامِيَّة** ٢٦٤٦٥  
Competitive (E).  
نعت تعريفي يطلق على ما هو قابل للمزايدة .
- Sep (F). Frame of plough (E). **مَزَايِدَة** ٢٦٤٦٦  
قطعة من الخرافات ترصف في قمر التلم عند الحراثة .
- Terroir (F). Soil (E). **مَزَايِدَة** ٢٦٤٦٧  
هو الميصر ، اطلبه .
- Binaire (F). Binary (E). **مَزَايِدَة** ٢٦٤٦٨  
هو كل مركب من عنصرين .
- Bilatéral (F). **مَزَايِدَة الْأَطْرَاف** ٢٦٤٦٩  
Bilateral (E).  
هو كل اتفاق أو عقد ملزم للجانبين المتعاقدين .
- Diocardes (F). **مَزَايِدَاتُ الْأَذْيَن** ٢٦٤٧٠  
قسم من الرغويات المدية .
- Amphipodes (F). **مَزَايِدَاتُ الْأَرْجُلِ** ٢٦٤٧١  
Amphipoda (E).  
رتبة من القشريات .
- جنس حل احدم فيبعونه ويقسمون الفرق بين العتتين وهو من الاعمال غير المشروعة التي يعاقبها القانون .
- ٢٦٤٤٥ - **مَزَايِدَةُ النَّهْرِ** ، **مَزَايِدَةُ الْأَسْتِرْسَالِ**  
Adjudication sur folle enchère (F).  
هو ما يعرف بإعادة المزاد على مدة الملتزم .
- ٢٦٤٤٦ - **مَزَايِدَةُ النَّاقِصَةِ** ، **مَزَايِدَةُ**  
Adjudication au rabais (F).  
هو ان يرسو الالتزام او المبيع على من يمرض أدنى ثمن يلتزم به القيام بالمسل على الوجه المفصل والمشرح في دفتر الشروط وفي البيان التفصيلي للمروفس لتتأسس المتنافسين .
- ٢٦٤٤٧ - **مَزَايِدَةُ جَبْرِ**  
Adjudication sur saisie immobilière (F).  
هو المزاد الذي يتم فيه حجز العقار بعد الاجراءات القانونية المبرومة من تسجيل ونشر .
- ٢٦٤٤٨ - **مَزَايِدَةُ قَضَائِيَّةٍ**  
Adjudication judiciaire (F).  
هو الذي يجري في المحكمة وفقاً لنص قانوني او امر رسمي بعد استكمال الاجراءات القانونية .
- ٢٦٤٤٩ - **مَزَايِدَةُ تَعَدُّرِ الْقِسْمَةِ**  
Adjudication sur licitation, Licitation (F).  
هو مزاد يقع على مقدار شائع بين ملاك كانوا اشتره او ورثوه ولا يمكن قسمته حيناً .
- ٢٦٤٥٠ - **مَزَايِدَة**  
Bletissement, Bletissure (F).  
Becoming over-ripe or sleepy (E).  
المزارة كالقوب والقفل هو زيادة نضج الثمر او ابتداء ذبوله بعد تمام نضجه .
- ٢٦٤٥١ - **مَزَايِدَة** ، **مَزَايِدَة** ، **مَزَايِدَة** ، **مَزَايِدَة**  
Métayer (F). Metayer (E).  
هو من استعمل الارض بالمزارة .
- ٢٦٤٥٢ - **مَزَايِدَة** ، **مَزَايِدَة**  
Métayage, Colonage (F). Metayage (E).  
هي اجارة مزرية الى اجل ما يدفع المستأجر بمقتضاها الى المؤجر قسماً من حاصلاتها بنسبة يتفقان عليها . ويقال للمستأجر مزارع . وهذه المزارعة قد تكون :
- ٢٦٤٥٣ - **مَزَايِدَة بِالْمُزَايِدَةِ**  
Colonage partiaire (F).  
مزارعة المحاماة
- ٢٦٤٥٤ - **مَزَايِدَة**  
Colonage perpétuel (F).  
مزارعة مستديمة
- ٢٦٤٥٥ - **مَزَايِدَة الْعَمَلِ**  
Absentéisme (F).  
Absenteeism (E).  
استئلال الارض بالمزارة على ان يتصل صاحب الارض بوكيل .
- ٢٦٤٥٤ - **مَزَايِدَة**  
Hérison (F).  
هو القنفذ ، اطلبه .
- ٢٦٤٥٥ - **مَزَايِدَة الْعَمَلِ**  
Vacation  
هو الوقت الذي ينقضي ببعض الاشخاص للشرط بهم عمل معين في القيام بأعباء هذا العمل او المهمة .
- ٢٦٤٥٦ - **مَزَايِدَة حَقِيْقِيَّةٍ**  
Command (F).  
هو الذي يستمر يوم المزايدة حتى يرسو المزاد على سواه ظاهراً في حين انه صاحب الصفقة .

٢٦٤٧٢ - مُزْدَوِجَات الأصابع

Artiodactyles (F). Artiodactyla (E).  
رَبِية من اللبونات منها الجِثَارَات والجِسْقِيَّات .

٢٦٤٧٣ - مُزْدَوِجَات التَّنَفُّس

Dipnés, Dipneustes (F). Dipnoi (E).  
طائفة من الاسماك تعتبر سُلُقَة الانتقال بين الاسماك والقرنأزب .

Dibranches (F). مُزْدَوِجَات الخَيْشُوم  
رَبِية حيوانات من الرخويات الرأسيات الايليل .

Décussée (F). مُزْدَوِجَة التَقْطِيع  
Decussate (E).  
هي الاوراق المتخالفة اثنين اثنين تقاطعاً محوياً .

Dicotylédone (F). مُزْدَوِجَة السَّلَكَة  
Dicotyledon (E).  
أحد قسمي مستورات البزور من النباتات . راجع ثنائية السَّلَكَة .

Distyle (F). مُزْدَوِجَة السَّكَم  
Distyle (E).  
نمت تمرغيفي يطلق عل كل نبات ازهاره مزدوجة أقلام السبات .

Distigmate (F). مُزْدَوِجَة المَيْسَم  
Distigmat (E).  
نمت تمرغيفي يطلق عل كل نبات ازهاره مزدوجة المياس .

Distigmate (F). مُزْدَوِجَة المَيْسَم  
Distigmat (E).  
نمت تمرغيفي يطلق عل كل نبات ازهاره مزدوجة المياس .

Bière (F). Beer (E). مُزْرُ  
هو البيرة تحضيماً وهو القنديد المستخلص من سائر الحبوب النشوية كالشعير والحنطة والذرة ...

Porcherie (F). مُزْرَب إختلازير  
راجع زريبة الخنازير .

٢٦٤٨١ - مُزْرَد \* ، مُدْرَع جَبَّار

Priodontes giganteus (S).  
Priodonte, Tatou géant (F).  
حيوان لبون أدره وحيد الجنس والنوع من فصيلة الممرعات . موطنه معظم غابات امريكا الجنوبية . يألف المواقف القريبة من الماء . مسرعه دجوي يستمر من الغروب الى الفجر . ملبسته الحماقي فردي الا في زمن التساقط والحضانة التي تستمر نحو ستة اشهر . وجاره نفق لسبح مستطيل يحفره بين جذور الاشجار . قوته اللعناء والحياث والوزغ والقتران وبمض المواد النباتية || جسمه شبه اطيلسي الشكل ، قليل القطعشة ، بطول نحو ١٦٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٥٠ سم . رأسه مخروطي الشكل . أذناه يرقبان قصيرتان . جرابمزه قصيرة خاصة الاصابع الامتسارية الطول المسلحة بالخاطر حادة اعصها اطراف الاصابع الثالثة والرابعة من الجرابمز الامامية . رأسه وجسمه وذنيه مغطوة بدرع من الزرد النظمي الماد . ثوبه اسود اثنى باستثناء الرأس والبطن والذنب فلنهما الى البياض الاخير .

٢٦٤٨٢ - مُزْرَعَة ، مُسَاكَة ، جِرْبَة ، كُرْد ، عَزْبَة  
Ferme, Métairie (F).  
Lease, Farming, Land, Small farm (E).

٢٦٤٨٣ - مُزْرَكَة

المزركة . ج. مزارف . هي المياسات في التربة وقد ساحت بها الدرة بحسب قيا الماء حتى تمتلئ ثم يساق للماء الى فيهره .

Cloaque (F). Cloaca (E). مُزْرَق  
فجوة المسالك البولية والمعدة والتناسلية عند بعض الفقاريات واعصها الطير .

Boisés (F). مُزْعَامِيَّات \*  
عارة من فصيلة البرليات . اجناسها وانواعها عديدة . معظمها من حطب المناطق الاستوائية الامريكية وجزر المحيط الهادي ، اعصها مدغسكر . وبعضها اسوي وافريقي || اجناسها متباينة الاطوال التي تراوح من متر الى عشرة امتار || اشهر انواعها :

Anacunda (F). أُنَاكَنْدَة  
Boa constricteur (F). بَوَا مُقْلَصَة  
Boa arc-en-ciel (F). بَوَا لُطَانِيَة  
Boa de Cook (F). بَوَا كُوك  
Boa javelot (F). دَسَاة

Epinette (F). مُزَقَّ \*  
Spinet, Box for fattening poultry (E).  
قفس يرب فيه الدجاج الممد لتسمين .

Luscinia succia (S). مُزْكَة \* ، مُسْهِر  
Gorge-bleue à miroir roux (F).  
طائر من الفرار وفصيلة السعليات . صغير أبيض طوله نحو ١٥ سم . ثوبه متركب الالوان الجميلة المتشقق والزخرفة . صفه مقلد بالازرق || وهو من القراطع محبوب البلاد في طلب الرزق . قوته الحشرات والديدان وبعض الحار النعينة التي تملك في الحريف . يألف الملتاح وبحاري الماء وصفات البحيرات . يفتن انصومه بين الادغال وفي القاصب . انثاه تحفن من ٤ الى ٦ بيضات نحو ١٥ يوماً .

Gaveuse (F). مُزَكَة  
Cramming apparatus (E).  
أداة لرق الكثير .

Hybride (F). مُزَكُوب \*  
Hybrid, Mongrel (E).  
المزكوب كالمساج ، نمت تمرغيفي يطلق عل كل حيوان او نبات جبين .

Fécondé, Imprégné (F). مُزَكُوم \*  
Imprégate (E).  
نمت تمرغيفي يوصف به البيض المكوش الصالح للتخصيم .

Glossière (F). Slide (E). مُزَلَّاق  
Glotte (F). Glottis (E). مُزَمَّار

٢٦٤٩٢ - مُزَمَّار  
هو فم الحجره او فم قصبه الرنة .

٢٦٤٩٣ - مُزَمَّار الراعي \* ، مَسَامِس  
Allama (S). Allame, Fléauze (F). Water plantain (E).  
Froschöffel, Wasserflesch (D). Allamo (I).  
جنس نباتات بطورية مائية معمرة من فصيلة الزماريات . انواعها عديدة معظمها يعيش في الازهار والنانع الممورة



مَزْدَة



مَزَق



مَزَقَة



مَزَمَّار الراعي

٢٦٥٠٢ - مِزَوَاة Parallax (F), Parallax (E).  
المزواة زاوية عند كل نجم أو كوكب يقابلها قطر الفلك الأرضي أو نصفه .

٢٦٥٠٣ - مِزَوَاة Pantomètre (F), Pantometer (E).  
جهاز يستعمل في قياس جميع الزوايا والأبعاد .

٢٦٥٠٤ - مِزَوَاة Clinomètre (F), Clinometer, Inclinator (E).  
المزواة جهاز يستعمل في قياس الميل الحاصل بين سطح مستقيم وخط أفقي .

٢٦٥٠٥ - مِزَوَاة Gonfomètre (F), Gonimeter (E).  
هو المنقل، جهاز يستعمل في قياس زوايا الأرض عند مسحاها .

٢٦٥٠٦ - مِزَوَاة Anguleux (F), Angulus (E).  
نمت تعريفي وسمي يطلق على ما كان شكله كائزواية .

٢٦٥٠٧ - مِزَوَاة Crèche (F), Manger (E).  
هو وعاء الزاد .

٢٦٥٠٨ - مِزَوَاة  
المزود والملحف والثرة ثلاثة أسماء لنجم نير واحد من كوكبة برج السرطان .

٢٦٥٠٩ - مِزَوَاة Masoreus (S), Masorée (F), Masoreus (E).  
جنس حشرات من فصيلة المزوريات ورتبة غدييات الاجنحة . أنواعها المعروفة عشرة اصطلحنا بعض مناطق افريقية والمهند وروبية . بعض أنواعها أصبح عكاشي لانتقاله مع الفستق السوداني الى جميع مرائ العالم || اجسامها صغيرة ، معتدلة انبساط ، تقوّل من ٤ الى ٦ مم . رؤوسها معتدلة الجرم . عينوها صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية قلادة الشكل . تأكلها وفكوكها وملامسها قياسية . كواسلها ضيقة القواعد . بطونها مغلطحة . اغمارها لاسعة ، سباعية الاغادي النحيلة القاطية ، يملؤها بعض الهلل . غنابيل قوائمها مجهزة بمخاض متشارية التستين || الحشرة الجلجلة مقررة ودائمة البرقة ايضاً .

٢٦٥١٠ - مِزَوِيَات Masoreidae (S), Masoreidae (F), Masoreidae (E).  
فصيلة حشرات من مجديات الاجنحة . اجناسها والواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تقوّل من ٤ الى ١٠ مم . رؤوسها صغيرة ، مستعرضة القفن ، عيونها ناشرة . تأكلها وفكوكها قياسية . قرونها الاستشعارية خطية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها مستعرضة ، ضيقة القواعد المنصورة . اغمارها سباعية الاغادي النحيلة القاطية ، يملؤها بعض الهلل . غنابيلها كثيرة الشاكك ومجهزة بمخاض كبيرة ، متشارية التستين || تألف الحقل المزدرة وريال السواحل جميعها دامة ومقررة || اشهر اجناسها المزور الذي يكثر وجوده في زراعات الفستق السوداني .

ويبضا وكثر على ضفاف البحيرات والانهر . اوراثها اربية الانتشابه ، لا قياسية الشكل والحجم . انمارها ضمية التجميع صغيرة القد سريعة السلب . قال الانطاكي : « نباتاته طيبة الرائحة يزورها تحمل الاروام والسوم مطلقاً وارجاع الاروام وتدر البرق وتفتت الحمى وتخلل الانتفاخ والمغص مع يدر الحذر والعسل . واذا شله به الشمر طوله وعطياً رائحة الرأس » .

٢٦٤٩٤ - مِزَمَارُ الرَّاعِي الْمَائِي \* ، اذان العنثر Allisum plantago (S), Flöteau plantain, Plantain d'eau (F), Mad-dog weed (E), Echer Froschölöffel (D), Plantagine aquatica, Barba silvana (I).  
نوع من مزمار الراعي تكثر زراعته في احواس الماء للترين . عشبته تقوّل من ٣٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه كبيرة القد فضية الشكل ، نصلها قلبي القاعدة ذلق الزام الاخير . انماره كثيرة العدد صغيرة الحجم لوّسا الى البياض الموشج بالوردي . وهو نبات طبي صبره مرطب خافض للحرارة ويدر البول .

٢٦٤٩٥ - مِزَمَارِيَات Allismaceae (S), Allismacées (F), Allismaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد، جميعها نباتات جلمورية متعمية او مائية . اوراقها اربية الانتشابه معتقة . انمارها عنقودية التجميع مستطيلة الزناد المنصب .

٢٦٤٩٦ - مِزَمَاج Luxuriant (F), Luxuriant (E).  
نمت وسمي يطلق على لكينات الريان النضر الرمح .

٢٦٤٩٧ - مِزَمُول \* Myzomela (S), Myzomèle, Mismomèle (F).  
جنس طير من الجوارم رقيقات المناقير وفصيلة المغتريات . انواعها المعروفة نحو ١٠ موطيا يمتد من استراليا الى ماليزية . ملجئها احيائي جامعي . جامعاتها قليلة العدد . تألف البراري والادغال . قوتها الحشرات الخنثى والديدان ورسق الانهار || اجسامها صغيرة القد تقوّل من ١٢ الى ١٥ سم . مناقيرها مدبة الاطراف المدببة . اجنتها معتدلة الجرم . اذانها مقنونة . اقوابها متباينة الالوان جميعها زاهية الخصب . انثاها اجبت غصبا من ذكورها . قدتن احشائها في الادغال . انثاها تحضن بتأدية الذكور . على مرتين في الحول ، من ٤ الى ٦ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوما .

٢٦٤٩٨ - مِزَمُوم Intrusif (F), Inclusive (E).  
نمت تعريفي يطلق على ما كان له صفة التزم .

٢٦٤٩٩ - مِزَهَاة Multiflore (F), Multiflorous (E).  
نمت تعريفي يوصف به كل نبات كثير الازهار .

٢٦٥٠٠ - مِزَهَاكِيَات Anthozoaires (F), Anthozoa (E).  
فئة حيوانات بحرية من المفوقات تتميز بمداعنها المشابة بالازهار البسرية .

٢٦٥٠١ - مِزَهَر Florifère (F), Floriferous (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل نبات مزهر او كثير الزهر .



ميزمار الراعي المائي



ميزمول



ميزان



ميزون

بسطها من ٤٠ الى ٤٥ سم. ورؤوسها مستديرة، خناباتها انبوية الشكل فارقة || تنبش جهات قليلة المدد. تألف الانجبار الحربية القليلة. مسرهما من الفسق الى الغبر. قوتها الجار على اختلاف انزلها.

Pot (F).

٢٦٥٢١ - **مَسَاد**  
نحي السنن أو السمل.

٢٦٥٢٢ - **مَسَادِعُ مَسَاعِيَةٍ**

Paramètres climatiques (F).  
Climatic parameters (E).

المساعد المناخية مجموعة العوامل الواجب معرفتها في تحديد اقليم معين أو كورة أو بقعة || أهمها ملجن الاطوار وكتيها وتوزيعها. التبخر. الاشعاع الشمسي. الحرارة القصوى والدنيا والرياح. الرطوبة الجوية النسبية. الرؤية. الرياح. الضغط الجوي.

Electroda

٢٦٥٢٣ - **مَسَار**  
هو للاباح، اطلبه.

Mésentré (F).

Mesentery (E).

٢٦٥٢٤ - **مَسَارِيحُ ، مَسَارِيَةٍ**  
هي طباط الصفاق.

Mesorchium

٢٦٥٢٥ - **مَسَارِيحُ الْخَصِيَةِ**

Mesovarium

٢٦٥٢٦ - **مَسَارِيحُ الْمَبِيضِ**

Alisme (F).

٢٦٥٢٧ - **مَسَاس**

نبات طبي جلمووري مائي يعرف بجمفاد الراعي، اطلبه.

Anredra (S). Anrédère (F).

٢٦٥٢٨ - **مَسَاسَة**

جنس نباتات معمرة عارضة من فصيلة الكسرمقيات. انواحه قليلة منها البرية والزارعية الأريينية. اصطنائها البلاد الحارة. انزادها جيلة الشكل ملونة.

Assistance (F).

٢٦٥٢٩ - **مُسَاعَدَة**

هي الاسعاف ، راجعه.

Bail à complant

٢٦٥٣٠ - **مُسَاعَاة ، مَسَاعَاة**

هي ان يطيح المالك مزرعة مفروسة أو غير مفروسة فيلزم المساعير أما يتعهد افراسه أو يفرضه مقابل مقدار معين من الجار. ويشترط فيه وجوب قيام المساعير بالتزامه على اكل وجبه والا فتعسف الاجارة حتما بدون مقاضاة.

Pastéiste (F).

٢٦٥٣١ - **مُسَالِف**

المسالف المشايخ المنجب بالمناخي.

Conduits génitaux (F).

Genital ducts (E).

٢٦٥٣٢ - **مَسَالِكُ تَسَالِيَةٍ**

هي الموادر التناسلية.

Poreux (F), Porous (E).

٢٦٥٣٣ - **مَسَامِي**

ذو مسام.

Porosité (F), Porosity (E).

٢٦٥٣٤ - **مَسَامِيَة**

كون الشيء ذا مسام.

Actionnaire (F).

Shareholder (E).

٢٦٥٣٥ - **مُسَاهِم**

هو كل من يملك سهماً في شركة سامية.

٢٦٥٣٦ - **مَرْوَزَّة \*** ، كَبْدَمَة مَرْوَزَّة

Labrus turdus (S). Labre tourd, Tourd (F).  
Labrus turdus, Wrasse (E).

نوع من الكيدم. سمكة بحرية بيضاء. اصطنائها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط. تعتبر من اسماك المهاج والحناف || جسمها احليجي الشكل ، يطول من ٢٢ الى ٣٠ سم. ثوبها قليل التباين بين الشقين. اللون السائد هو الاخضر يعقب وتشتد لخته عند الظهر ويغير عند البطن.

خضاب الذكر اميق واللغ من خضاب الانثى || واسها مخروطي الشوزن. فكها متعادلان. شفقها متوسط الانفرج. اسناتها كبيرة ، حادة. عينها كبيرتان جاسطتان. زعنفتها الظهرية مستطيلة ، ارجوانية اللون يملوها بليج ازرق واخضر. زعانفها الصدرية والشرجية تتحلل بخضاب الظهريه. الحوضية جلوية اللون اما الذيلية فسناية الشكل ، جلوية اللون يملوها كالظهريه تبقيج ازرق واخضر || لها جيد الصف، مرغوب فيه.

٢٦٥٣٧ - **مِرْوَلَة \*** Gnomon, Cadran solaire (F).

٢٦٥٣٨ - **مِرْوَلَة** Sen-dial, Gnomon (E).  
هي الساعة الشمسية ، قوامها قضيب عمودي ميل ظله بحدد الرقت.

Gonimétrie (F).

Gonimetry (E).

٢٦٥٣٩ - **مَرْوَلَة**

٢٦٥٤٠ - **مَرْوَلَة**

Dasyphyllé (F).

٢٦٥٤١ - **مَرْوَلَة**

هو المدان أو مقياس الامعان.

٢٦٥٤٢ - **مَرْوَلَة**

Oleagineux (F).

Oleaginous, Oily (E).

٢٦٥٤٣ - **مَرْوَلَة**

هي الاغضاء النباتية ، اغصنها البزور والثار ، الفنية بالمواد الزيتية.

٢٦٥٤٤ - **مَسَاح**

Arpenteur, Géomètre (F). Surveyor, Geometer (E).

٢٦٥٤٥ - **مَسَاح**

الذي يمسح الارض يقيس طولها وعرضا لحرفة مساحتها. راجع ارقي.

٢٦٥٤٦ - **مَسَاحَة**

Superficie (F).

Superficies, Area (E).

٢٦٥٤٧ - **مَسَاحَة**

Cadastre (F).

Cadastral survey, Survey (E).

٢٦٥٤٨ - **مَسَاحَة**

المساحة هي مجموعة الدفاتر والرسوم والخرائط التي تذل على مساحة الاراضي الزراعية وغير الزراعية وبيان الابنية والمقارنات وتخطيطها وتوزيعها على وجه التفصيل في البلاد.

٢٦٥٤٩ - **مَسَاحَة**

ويراد بها ايضا الامال نفسها التي يقوم بها الاختصاصيين الذين تنوط بهم الادارة هذه المهمة. لتفرض الرئيسي من هذه الامال هو تحديد الملكية العقارية بالدفعة الواجبة ثم تقدير الضرائب التي يتقوى الملاك على دفعها منظراً.

٢٦٥٥٠ - **مَسَاحَة**

Harpyia (S).

Harpie céphalote

٢٦٥٥١ - **مَسَاحَة**

جنس حيوان من فصيلة البطاطيات. انواحه المعروفة ثلاثة ، موطنها للفرق بيزور المحيط الهادي حتى استرالية.

٢٦٥٥٢ - **مَسَاحَة**

اجسامها صغيرة لثقة ، طولها يراوح من ١١ الى ١٢ سم.



مَرْوَزَّة



مَرْوَلَة



مَسَاحَة

Intimé (F). - مُتَأَنَّف عليه  
Respondent, Defendant (E).  
هو المتداعي الذي استنصف الحكم الصادر بحقه .

Néophyte (F). - مُتَنَجِّد °  
Neophyte (E).  
التحق حديثاً .

Mire à œufs (F). - مُتَنَجِّلي °  
أداة خاصة بفحص البيض حل الضوء الصناعي تميزاً  
لمزكوم من غير المزكوم .

Creux (F). - مُتَنَجِّف °  
نمت تعريفي يطلق حل التبخر العادية الطعم المألوف أو  
التي يتميز عليها ببب فاضح يحبه الذوق .

Lapidifique (F), Lapidific (E). - مُتَنَجِّج  
صالح لتنجير .

Bénéficiaire (F), Beneficiary (E). - مُتَنَجِّق °  
Emulsion - مُتَنَجِّل °

Emulsion - مُتَنَجِّل °  
سائل مائع يعمل زائداً من المواد الدهنية أو الراتنجية  
المعلقة .

Sensitive (F). - مُتَنَجِّية °  
حبة زينية مركنية تدعى حساسة ، اطلبها .

Employeur (F), Employer (E). - مُتَنَجِّد °  
رب العمل الذي يستعين حل عمله بالآلين يستعملهم .

Employé (F). - مُتَنَجِّد °  
Employed, Servant (E). - كل من أدى الخدمة المنوطة به .

Extrate (F), Extract (E). - مُتَنَجِّج °  
هو جزء من عقد رسمي أو حكم ينسخ بحرفه ويسلم آل  
طالبه ويكون له قوة الاتبات التي لستة الأصل .

Polygalées (F). - مُتَنَجِّدات °  
هي البوليفانيات ، اطلبها .

Latier (F). - مُتَنَجِّد °  
هي البوليفان ، اطلبها .

Echauffant (F), Heating (E). - مُتَنَجِّط °  
نمت تعريفي يطلق حل الإحلاف والحبوب التي تلتظ حرارة  
الجسم وتسبب الإدفاء .

Commodataire (F). - مُتَنَجِّير °  
هو الذي يأخذ البين المارة من المير في عقد العارية .

Firme (F), Firm (E). - مُتَنَجِّل °  
Firme agricole, - مُتَنَجِّل زراعي °

Exploitation agricole (F), Farming (E). - مُتَنَجِّل زراعي °  
Futurisme (F). - مُتَنَجِّية °

Futurism (E). - مُتَنَجِّية °  
المستقبلية نظرية حديثة في فلسفة الفن قولها مزيج من

٢١٥٣٦ - مُتَاهَكة ، مُتَاهَكة الغرماء  
Contribution  
هو أن يسام كل واحد من الزموا دفع دين مشترك في  
دفع حصة من هذا الدين من الجميع .

Equivalent - مُتَاوي ، مُتَكَاوٍ °  
Egalité (F), Equality, Parity (E). - مُتَاوِة °

Limnomètre (F). - مُتَابَح °  
Limnimeter (E).  
هو المثبات جهاز يستعمل في تقدير أرواط مستوى  
البحيرات .

Sonde (F). - مُتَابَر °  
Sounding-line, Lead (E).  
أداة السبر ، تقع حل أشكال مختلفة . تستعمل في الطب  
والزراعة والأرض .

٢١٥٤١ - مُتَابَل ° ، أُو سِيَال ° ، قُرُف °  
المقاصب °  
Panurus (S).  
Panure, Mésange des roseaux (F).

جنس طير من فصيلة القرقييات . أنواعه المروفة قليلة  
العدد ، أصلها الشرق الأوسط وأوروبية الجنوبية والشرقية .  
اجسامها وأذناها مستطيلة . اجنحتها مستطيلة القد ،  
منقرية الأطراف . منقارها قصيرة مستعرجة الفراءد ،  
مستعرجة أطراف الخاطم العليا البيضة التنجيين || أعرف  
أنواعه وأشهرها السبال القضي .

٢١٥٤٢ - مُتَابَل لَفِي °  
Panurus biarmicus (S). Panure à moustaches (F).  
Bearded titmouse (E).

طائر من السبال . طوله نحو ١٧ سم . سباله لطفة سوداء  
خلفية تمتد من أنزده وقاعدة الجفن آل طرف العنق . رأسه  
أل الزقة الرمادية المزاج . عنقه ووجهه آل البياض  
النفسي . ظهره آل الصهبة الصنابية . جناياه آل السرة  
الخطية الجذبة بالابيض . بطنه آل الصهبة الفاتحة . ذنبه  
رتاجي ألریش المترآكب ، أصغر ألذن ، حنطى المزاج .  
منقاره وسدنة حية آل الصفار المايق . ريشه وأصابعه آل  
الردة الرصاصية || أصغانه الشرق الأوسط وأوروبية الجنوبية  
والشرقية بألف المناطق والمقاصب وبحارى الماء || قوته  
الحشرات وبلور الثباتات المتقدمة والمالية || يدفن في  
الادفال والأسل . عنه كالجرب تقع فيه الاتق من ٩  
أل ٨ بيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو ١٣ يوماً .

٢١٥٤٣ - مُتَبَك ، مُتَبَر °  
Fonderie (F).  
Foundry (E).  
المعمل المجهز لتلويب المعادن وصباها .

٢١٥٤٤ - مُتَبَل ، عُنْطَل °  
Organe mâle des insectes (F), Manly organ of in-  
sects (E).  
العضو الذكري في الحشرات .

٢١٥٤٥ - مُتَبَاوِر °  
Locataire (F).  
Tenant, Lodger (E).  
هو الذي تنقذ الإجارة من مالك المين باسمه .

٢١٥٤٦ - مُتَبَايَف °  
Appelant (F), Appealing (E). - مُتَبَايَف °  
هو المتداعي الذي يستأنف الحكم الصادر .



مِسَار (١)



مِسَار (٢)



مِسَال لَفِي



مُسْتَبَل



## ٢٦٥٧٧ - مُسْتَكْتَفُ الْحَلِيبِ \*

Lacto-densimètre (F). Lacto-densimeter (E).  
ميزان خاص يقيس كثافة الحليب .

## ٢٦٥٧٨ - مُسْتَكْتَفُ الزُبْدَةِ \*

Lacto-butyromètre (F). Lacto-butyrometer (E).  
ميزان خاص يقيس زبدة اللبن أي مقدار المواد السنية في الحليب أي اللبن .

## ٢٦٥٧٩ - مُسْتَكْتَفُ دَعْمَانِ \*

Décombant (F). Decumbent (E).  
نمت تعريفى وصلى يطلق على غتلت الجذوع والفروع النباتية المسترخية التي لا تستطيع الانتصاب .

## ٢٦٥٨٠ - مُسْتَكْتَفُ \* Absorptiomètre (F).

Absorptiomètre (E).  
جهاز يستعمل في قياس مدى الحور الفلورة لفلان الكرونيكي .

## ٢٦٥٨١ - مُسْتَكْتَفُ \* Pépinière (F). Nursery (E).

هو المشتل ، اطله .

## ٢٦٥٨٢ - مُسْتَكْتَفُ Document, Titre (F).

Document, Titre (E).  
هو السند ، اطله .

## ٢٦٥٨٣ - مُسْتَكْتَفُ \* Héloide (F).

نمت تعريفى يطلق على كل ما له صلة بالمستكمتات كالنباتات المستقيمة والحبيات المستقيمة .

## ٢٦٥٨٤ - مُسْتَكْتَفُ \* Mycetobia (S).

Mycétobia (F). Mycetobia (E).

جنس حشرات من فصيلة المستويات زرقية ذات الجناحين . أنواعها المروقة سبعة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والباردة || أجسامها صغيرة ، نحيلة ، تطول من ٢ الى ٤ م . رؤوسها مكورة . حوزنها متقاربة عند الذكور ، متباعدة عند الاناث . قرونها الاستشعارية خيطية ، ملابسها مستطيلة . أعينها صغيرة وقصيرة . كواسلها وبطنها شبه اسطوانية . رواشها ملونة . قوائمها مستطيلة ، مهدبة الظنايب || اسارمها عاردة ، تمش على القنطور .

## ٢٦٥٨٥ - مُسْتَكْتَفُ \* Mycetobillidae (S).

Mycétobillidae (F). Mycetobillidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين ، أجسامها وأزمارها المروقة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || أجسامها صغيرة ، تطول الى ٦ م . رؤوسها شبه مكورة . حوزنها متباعدة عند الاناث ، متقاربة عند الذكور . رواشها ثلاثية عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، مركبة من ١٧ فصلة . ملابسها ملونة . قوائمها مستطيلة || يرقاتها ملكية تمش على العصرة النباتية التي ترشح من الجروح || اشهر اجناسها المستوية .

## ٢٦٥٨٦ - مُسْتَوْدَعٌ وَخَزْنٌ حَاصِلٌ

Dépôt (F). Depot, Warehouse (E).

## ٢٦٥٨٧ - مُسْتَوْدَعٌ عَمَّاكِرِ Office (F).

Dispensary (E).

الانكار الخيالية للتضاربة . وكثيرها مادة مدبرة مستمرة التجديد . وصل الكلمة ان تستحث الشعور وإلا فلا لزوم لها .

## ٢٦٥٩٥ - مُسْتَكْرَاتُ الْخَيَاثِيمِ \*

Pârenibranches (F).

فئة من السرفويات تتميز باستمرار وجود جهازها الخيشوي في مختلف أطوارها الخيائية ، من الطور البلوطي الى الطور النهائي .

## ٢٦٥٩٦ - مُسْتَكْتَفُ Polarimètre (F).

Polarimeter (E).

## ٢٦٥٩٧ - مُسْتَكْتَفُ Polarisant (F).

Polarizant (E).

## ٢٦٥٩٨ - مُسْتَكْتَفُ الْفَيْعَالَاتِ Dialypétales (F).

Dialypetalous (E).

نمت تعريفى يطلق على النباتات ذات الأزهار المستقلة البتلات .

## ٢٦٥٩٩ - مُسْتَكْتَفُ الْأَشْرَافِ Rectiligne (F).

Rectilinear (E).

الحويان الذي تشكل أطرافه خطوطاً مستقيمة لا احديداب فيها ولا تقعر .

## ٢٦٥٩٠ - مُسْتَكْتَفُ الزُّبَانِ Recticorne (F).

نمت تعريفى يطلق على كل حشرة مستقيمة الزبان .

## ٢٦٥٩١ - مُسْتَكْتَفُ الْمُنْقَادِ Rectirostre (F).

نمت تعريفى يطلق على كل طائر متقاده مستقيم الشكل .

## ٢٦٥٩٢ - مُسْتَكْتَفُ الْجَنَاحِ Orthoptéroïdes (F).

Orthopteroids (E).

طبقة حشرات تنتمي الى شعبة اليرقانيات وطائفة الجنحات اصلاً ، تشمل حالياً خمس رتب وهي اللزليات والاشانيات والقصصيات ومستقيمة الاجنحة والجلفليات ، جميعها كبيرة النخف مستطيلة الساق ، ارساها مفصليّة تتكون من ثلاث عقل او اربع ، اناثها تتميز بأجهزتها التناسلية المسلحة بمرزات قوية .

## ٢٦٥٩٣ - مُسْتَكْتَفُ مَتَالِيفِ Lignes droites concourantes (F).

## ٢٦٥٩٤ - مُسْتَكْتَفُ الْأَجْنَحِ Orthoptera (S).

Orthoptères (F). Orthoptera (E).

رتبة حشرات من طبقة مستقيبات الاجنح . فصائلها واجناسها وأزوارها كثيرة العدد تشمل اكبر مجموعة من الحشرات الكبيرة القند . اجسامها واشكالها والوانها عديدة || من اشهر فصائلها الجندبيديات والجراديات والقنوطيات .

## ٢٦٥٩٥ - مُسْتَكْتَفُ الْعُرُوقِ Rectinerve, Rectinerviæ (F).

نمت تعريفى يطلق على كل رفة متوازية العروق المتجهة من القاعدة الى القمة .

## ٢٦٥٩٦ - مُسْتَكْتَفُ \* Anémètre, Densimètre (F).

Aræometer, Densimeter (E).

مقياس الكثافة .



مستكف



مستكف الحليب

Triangulation ٢٦٦٠٣ - مَسْحَنَةٌ  
عملية تأريخ ورمز بواسطة المثلثات تمهيدا لكليل المساحة.

Oserale (F), Oser-bed (E). ٢٦٦٠٤ - مَسْحَرَكَةٌ  
منبت السوجر أي المصفاة .

Broyeur (F). ٢٦٦٠٥ - مَسْحَقٌ  
آلة تستعمل لسحق المسالك والكتب وما أشبه .

Broyeur-effibreux (F). ٢٦٦٠٦ - مَسْحَقٌ مَسْحَقٌ  
آلة لسحق وألشف أكل من المسحق العادي .

Brole (F), Brake (E). ٢٦٦٠٧ - مَسْحَكَةٌ  
آلة لسحق بيا سوق القنب والكتان قبل مشقها .

Gourmeste (F). ٢٦٦٠٨ - مَسْحَلٌ  
Curb, Curb-chain (E).  
سلسلة صغيرة متصلة بطرفي الشكبة تكون تحت جملة  
الفرس السفلى .

Catalyse (F), Catalysis (E). ٢٦٦٠٩ - مَسْحَلَةٌ  
هي التحليل بالاملاسة أو الإختلال بمجرد ملامسة مادة  
أخرى لا تتغير .

Catalytique (F). ٢٦٦١٠ - مَسْحَلِيٌّ  
Catalytic (E).  
هو ما يتميز بالإختلال اللسي .

Poudre de sang (F). ٢٦٦١١ - مَسْحُوقُ الدَّمِ  
مركب عضوي تجد فيه السج النباتية والحيوانية مغلف  
المواد الغذائية اللازمة لحياتها . وهو يستخرج من الدم  
بعد تجفيفه ومعالجته لقتضاه من رائحته الكريهة . مظهره  
الخارجي حبيبات دقيقة صمراء اللون سواء الموائع اللامعة .  
يستعمل في أطراف اللواجم على اختلاف أنواعها ويستعمل  
في الزراعة كمهاد أزوتي عضوي لأنه يحوي من ١٠ إلى  
١٤ ٪ من الأزوت . وهو من أنشط الاسمدة الطبيعية  
لكنه يبطئ الانفعال والتأدية .

Poudre d'os (F). ٢٦٦١٢ - مَسْحُوقُ الْعَظْمِ  
سماد فسفوري عضوي يصنع من العظم الذي يحوي  
الكثير من صفات الكلس وكرهات الكلس || أشكاله  
التجارية المستعملة ثلاثة : الخام واللاشمي واللاشمي .

Poudre d'os brut (F). ٢٦٦١٣ - مَسْحُوقُ الْعَظْمِ الْخام  
هو المتأخر من سحق العظام كما هي دون معالجتها وهو يحوي :

من ١٥ إلى ٢٥ ٪ من الحامض الفسفوري  
ومن ٣ إلى ٥ ٪ من الأزوت

غير أن ما يحوي من شحم ، يؤثر فاعلية الحسب وينشط  
بعض الأوصاف البكتيرية المؤذية ، يجعله محدود الاستعمال .

Poudre d'os dégrasée (F). ٢٦٦١٤ - مَسْحُوقُ الْعَظْمِ الْأَشْجَمِي  
هو المتأخر من سحق العظام بعد استخلاص ما فيها من شحم .  
وهو يحوي :

من ١٥ إلى ٢٥ ٪ من الحامض الفسفوري  
ومن ٣ إلى ٥ ٪ من الأزوت

وهو قليل الاستعمال كسموق العظم الخام .

٢٦٥٨٨ - مَسْتَوَاتِ الْبُزُورِ ، وَعَاكِثَاتِ الْبُزُورِ  
Angiospermes (F), Angiosperms (E).

أحد قسمي باديات الزهر وهو يشمل النباتات التي تكون  
بيضها في بويض وزرعتها في ثمرة || تقسم مستورات  
الزهور إلى قسمين : وحيدات الفلقة وذوات الفلقتين .

٢٦٥٨٩ - مَسْتَوَاتِ الزَّهَرِ ، حَفِيَّاتِ الْوَلَكِ  
Cryptogames (F), Cryptogams (E).

قسم من المملكة النباتية ؛ نباتاته مستورة أعضاء التناسل  
تحتضن إلى ثلاثة صفوف : مستورات الزهر الوائعية ،  
الطحلبات والمشريات .

٢٦٥٩٠ - مَسْتَوَاتِ الزَّهَرِ الْوَعَائِيَّةِ  
Cryptogames vasculaires, Pteridophytes (F), Vas-  
cular cryptogams, Pteridophyta (E).

صنف من النباتات الحفويات الأعضاء التناسلية . أشهر  
نباتاتها السراخس والكنبانيات التي تحمل ثلاثة أعضاء فقط  
وهي الجذور والسيق والاوراق .

٢٦٥٩١ - مَسْتَبِكٌ ، مَسْتَبِجُونُ التَّطْعِمِ  
Mastic à greffer (F), Mastic for graft (E).

مادة مركبة عازلة يستعملها البستاني في ستر جروح التطعيم  
أو التقليل لوقايتها من الهواء والحرارة .

٢٦٥٩٢ - مَسْتَبَلَةٌ  
Marrière (F), Mari-pit (E).  
المسجلة هي مقلع السجل .

٢٦٥٩٣ - مَسْتَبَلَةٌ  
Marrière (F).  
هي المسجلة

٢٦٥٩٤ - مَسْحٌ  
Arpentage (F).  
قياس مساحة الأرض .

٢٦٥٩٥ - مَسْحَاءٌ  
Terre plate (F), Flat land (E).  
أرض مستوية ذات حصى صفار ، ج. صلب وسلي .

٢٦٥٩٦ - مَسْحَابٌ  
Néphoscope (F).  
Nephoscope (E).

جهاز يستعمل لدراس تحركات السحب .

٢٦٥٩٧ - مَسْحَاةٌ  
Niveleur (F), Leveller (E).  
أداة يستعملها البستاني لتبسيط الأكود ومنع أعضاده .

٢٦٥٩٨ - مَسْحَاةٌ آليَّةٌ  
Ravale (F).  
آلة زراعية مجرورة تستعمل لبسط التراب وتوسيته .

٢٦٥٩٩ - مَسْحَاةٌ  
Anémographe (F).  
Anemograph (E).

جهاز يسجل سرعة الريح واتجاهها ويقيسها .

٢٦٦٠٠ - مَسْحَاةٌ  
٢٦٦٠١ - مَسْحَاةٌ  
هو الهواء ، أعليه .

٢٦٦٠٢ - مَسْحَاةٌ  
Aérifère (F).  
Aeriferous (E).

نمت تعريفية يطلق على ما هو غصن ينقل الهواء اللازم  
لتنفس هذه النبات والحيوان . نسيج مسامي ، فيمرات  
مسامية ...

٢٦٦٠٣ - مَسْحَاةٌ ، وَسِيطٌ  
Catalyseur  
جسم يحدث التحليل بالاملاسة .



مسحاج

## ٢٦٦١٥ - مَسْحُوقُ الْعَظْمِ الْأَهْلَامِيِّ (F).

Poudre d'os déglutiné (F).

هو الماتني من سحق العظام بعد استخلاص ما فيها من شحم وهلام . مظهره الخارجي مسحوق ناعم أبيض اللون يحوي :  
من ٢٩ الى ٣٤ ٪ من الحامض الفسفوري  
ومن ١٥ الى ١٢ ٪ من الأزوت  
وهو جزييل الفاتلة شائع الاستعمال .

## ٢٦٦١٦ - مَسْحُوقُ الْقَرْنِ (F).

Poudre de corne (F).

Horn meal (E).

سماد عضوي ينتج من سحق القرن والظلوف بعد تحميمها أو معالجتها بالبخار . وهو يحوي :  
من ١٠ الى ١٥ ٪ من الأزوت  
من ٤ الى ٦ ٪ من الحامض الفسفوري  
من ٧ الى ١ ٪ من الكلس

يعتبر من الاسمدة الجزيلة النفع الطويلة الاجل لانه يخدم في التربة أكثر من سولين .

## ٢٦٦١٧ - مَسْخ (F).

Monstruosité (F).

Monstrosity (E).

ج . مسوخ . شاردة غريبة أو وراثية تشوه الشكل المألوف .

## ٢٦٦١٨ - مَسْخَكَةٌ (F).

Cultivateur (F).

Cultivator (E).

آلة تستعمل للحرث المبلحي تنشق التربة دون ان تقلبها ويثقل ذراتها .

## ٢٦٦١٩ - مَسْخُودٌ (F).

Sympode (F).

Sympode (E).

نمت تعريفية يوصف به كل حيوان أو نبات شذت بعض أعضائه عن قاعدة الانفراد الذاتي كما في غروف البحر الذي تنحمت بسلامه . وكما هي حال القمامة في النبات .

## ٢٦٦٢٠ - مَسَد (F).

Fibre

ج . ساد وأساد .

## ٢٦٦٢١ - مَسَدَاسٌ (F).

Sextant

جهاز يمكن من قياس الابعاد الزاوية وتحديد ارتفاع الكواكب عن الأفق .

## ٢٦٦٢٢ - مَسَدَاسٌ (F).

Sextant

Sextant d'Uranie (F).

المسداس كوكبية نجوم جنوبية الموقع شكلها يشبه المسداس || نجوما قليلة العدد جميعها من المرتبة الخامسة وما دونها .

## ٢٦٦٢٣ - مَسَدَاسٌ (F).

Nébulose (F).

Cloudy (E).

٢٦٦٢٤ - مَسَدَاسٌ (F).

Hexagone (F).

Hexagon (E).

شكل منتظم سدس الزوايا والاضلاع .

## ٢٦٦٢٥ - مَسَدَسُ السُّطُوح (F).

Hexaèdre (F).

Hexahedron (E).

## ٢٦٦٢٦ - مَسَدُومٌ (F).

Obnubilé (F).

نمت تعريفية يطلق على الاشياء التي ينشأها الغمام أو الغمام أو الدخان ...

## ٢٦٦٢٧ - مَسَدِيٌّ (F).

Fibreux (F).

Fibrous (E).

## ٢٦٦٢٨ - مَسْرَا (F).

Frayerre (F).

Spawning place or season (E).

المكان حيث يبيض السمك .

## ٢٦٦٢٩ - مَسْرَكَةٌ (F).

Oviducta (F).

Oviduct (E).

الممرأة قناة البيض .

## ٢٦٦٣٠ - مَسْرَبَةٌ (F).

Poli glanduleux (F).

Glandulous down (E).

عضو ليفاني خلي ادب ينشأ على مختلف أجناس النباتات .

## ٢٦٦٣١ - مَسْرَطَةٌ ، مَسْرَطٌ (F).

Esophage (F).

Esophagus (E).

هو مجرى الطعام في الحلق ويدعى البلغم والريء .

## ٢٦٦٣٢ - مَسْرُوكٌ (F).

Balzane haut-chassée (F).

الفرس مسرول اذا بلغ التجنيب الركبتين أو المرقبين .

## ٢٦٦٣٣ - مَسْرَى (F).

Régime (F).

Rule (E).

هو مجموعة القواعد المفروضة أو المنبئة .

## ٢٦٦٣٤ - مَسْطَاحٌ (F).

Planimètre (F).

Parallelogramme (F).

Parimeter (E).

جهاز يستعمل في قياس السطح .

## ٢٦٦٣٥ - مَسْطَارٌ ، مَسْطَرَةٌ (F).

Moile (F).

Must (E).

عصير العنب الجليلد قبل أن يستحيل الى خمر .

## ٢٦٦٣٦ - مَسْطَبَةٌ (F).

Banquette (F).

Bench terrace (E).

سطح من الارض كفافه من التراب أو الحجارة يصنع في المراتع المنحدرة منشا لانجراف التربة .

## ٢٦٦٣٧ - مَسْطَحٌ ، مَسْطَرَةٌ (F).

Palier (F).

Landing, Stair-head (E).

## ٢٦٦٣٨ - مَسْطَحٌ مُتَوَكِّزِي الْأَضْلَاح (F).

Parallélogramme (F).

Parallelogram (E).

## ٢٦٦٣٩ - مَسْطَحٌ مُسْتَقِيل (F).

Parallélogramme rectangle (F).

Rectangular parallelogram (E).

## ٢٦٦٤٠ - مَسْطَحٌ مَعِين (F).

Parallélogramme oblique (F).

Oblique parallelogram (E).

## ٢٦٦٤١ - مَسْطَرَةٌ ، أَنْمُوجٌ (F).

Echantillon (F).

Sample, Pattern (E).

## ٢٦٦٤٢ - مَسْطَرَةٌ الْإِرْتِفَاع (F).

Mire (F).

Sight (E).

هي المير ، جهاز يمكن من تحديد الارتفاع النسبي .

## ٢٦٦٤٣ - مَسْطَرٌ (F).

Calorimètre (F).

Calorimeter (E).

جهاز يستعمل في قياس كيات الحرارة الناتجة والصادرة والواردة .

## ٢٦٦٤٤ - مَسْطَرِيٌّ ، مَسْطَرِيٌّ (F).

Calorifique (F).

Calorific (E).

نمت تعريفية تصف به الاشياء التي تولد الحرارة .

## ٢٦٦٤٥ - مَسْطَرِيَّات (F).

Calorimétrie (F).

Calorimetry (E).

درس طبعي يبحث في قياسات الحرارة .



مسففة



مسداس



مسطاح



مسار

Arrhes (F). **مُسْكَنْ** ٢٦٦٦٣  
Earnest, Deposit (E).  
هو البرين الذي يدفعه احد طرفي العقد الى الآخر  
ساعة التعاقد .

٢٦٦٦٤ - **مُسْكَنَة ، كَوْدَه**  
Planche à semis, Planche surélevée, Plate-bande (F).  
Border, Bed, Seed-bed (E).  
مستطيل من التراب أربع من سطح التربة مستقيم الاضلاع  
محاط بممر ضيق .

Bouillon blanc (F). **مُسْكِر الحُرُوت** ٢٦٦٦٥  
هو البوسير ، اطليه .

Local d'habitation (F). **مُسْكَن** ٢٦٦٦٦  
Dwelling-local (E).  
المسكن او محل السكن هو المكان الذي يخصصه المرء  
لسكنائه .

Habitation rurale (F). **مُسْكَن زُرَاعِي** ٢٦٦٦٧  
Rural residence (E).  
كل بناء او بيت ريفي يسكنه من اقام في الريف او  
تدور حل الريف مها كانت طبقة الاجتماعية ، راجع  
بيت زراعي .

Massicot **مُسْكُوت** ٢٦٦٦٨  
هو بروتكسيد الزئبق الاصفر اللون .

Moschifère (F). **مُسْكِي** ٢٦٦٦٩  
Moschiferous (E).  
نمت تعريفي يطلق على الاجهزة الخاصة التي تفرز مادة  
المسك ويجمعها عند الحيوان .

Muscat (F). **مُسْكَاة ، مُسْك** ٢٦٦٧٠  
صفة العنب المسكي العرف وفي الكرومة غروب عديدة  
مشهورة بهذا العرف المذاقي .

Moschins (F). **مُسْكِيَات** ٢٦٦٧١  
نفة من فصيلة الآليات تشمل جنساً واحداً يدعى ايل  
المسك .

٢٦٦٧٢ - **مُسْلَاح**  
النخلة التي يكثر بمرها وهو اخضر . وفي حديث مسا  
يشتره المشتري على البائع انه ليس له مسلح ولا محضار .

Erode (F). **مُسْلَاح** ٢٦٦٧٣  
نوع من الجزأب ، مشهور باسم ابو مسلة ، اطليه .

٢٦٦٧٤ - **مُسْلَاح ، مَهْيَاح**  
المكان الذي يكثر فيه سلح الطير .

Abattoir (F). **مُسْلَاح** ٢٦٦٧٥  
Slaughter-house (E).  
المكان المد لنحر وسلح وقصاة الحيوانات ويدهى الجوزر .

٢٦٦٧٦ - **مُسْلَاحَة ، مِسْلَح**  
Scarificateur (F). Scarificator, Hoeing-machine (E).  
أداة تبهر ذرات التراب وتسوي سطح التربة وتقلع  
الاعشاب .

Malcolmia (S). Malcolmie (F). **مُسْلَاح** ٢٦٦٧٧  
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الملبليات .

Pal Injector (F). **مُسْلَقَة** ٢٦٦٤٦  
Soil injector, Root injector (E).  
أداة زراعية تستعمل في حقن التربة لمكافئة بعض الحشرات  
والاصنام النباتية .

Homéotherme (F). **مُسْتَوْر** ٢٦٦٤٧  
Hom.othermal (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل حيوان ثابت الحرارة المستقرة .

Courbine (F). **مُسْتَار** ٢٦٦٤٨  
سمكة بحرية تدعى مصقار ، اطليا .

Masca (F). **مُسْتَه** ٢٦٦٤٩  
سمكة بحرية تدعى ايضاً خليد ، اطليا .

Projection **مُسْطَاح** ٢٦٦٥٠

Projection horizontale (F). Horizontal projection (E). **مُسْطَاح اُفْقِي** ٢٦٦٥١

Projection verticale, Élévation (F). Vertical projection, Elevation (E). **مُسْطَاح رَاسِي** ٢٦٦٥٢

Projection orthogonale (F). Orthogonal projection (E). **مُسْطَاح عَمُودِي** ٢٦٦٥٣

Cypraea (S). **مُسْطَاحَة ، وَدَعَة** ٢٦٦٥٤  
Porcelaine (F).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات المدليات . انواعها  
عديدة . امثالها صغيرة القد ، شبه بيضية ، مبطلة .  
تكثر في بحار البلاد الحارة . تستعمل لتزيين الدواب .

Irrigué (F). Irrigate (E). **مُسْقُوتِي** ٢٦٦٥٥  
المسقوي او المروي هو كل زرع يسقى .

Peau de poisson (F). **مُسْك** ٢٦٦٥٦  
Fish skin (E).  
المسك هو جلده المسك ، ج سُوك .

Muse (F). Musk (E). **مُسْك** ٢٦٦٥٧  
مادة دعنية عطرية سمراء اللون يفرزها ايل المسك .

٢٦٦٥٨ - **مُسْك الجَن**  
اسم يطلق قسلاً على عدة نباتات انصها حشيشة الريح  
والنيسوم .

٢٦٦٥٩ - **مُسْك الدَّقَائِر** هي الحبابة .

Tubéreuse (F). **مُسْك زُومِي** ٢٦٦٦٠  
هو الزنبق نبات ثنائي من النرجسيات .

Saccharimètre (F). **مِسْكَار \*** ٢٦٦٦١  
Saccharimeter (E).  
جهاز يستعمل في قياس مقادير السكر الموجودة في  
الموائل . ويدهى ايضاً مقياس السكر وعشار .

٢٦٦٦٢ - **مِسْكَالَة** هو الجبلوه ، اطليه .



مسلة



مسكار



مسلة

٢٦٦٨٨ - مَسْتَكَف \* Brousse (F). Bush (E).

المسكف كل فلاة أو فيفاء أو سهب تملؤها بعض الاشجار الميترية التجميع . ج مساف .

٢٦٦٨٩ - مَسْتَكَات الأَسِيْنَة Odontoglosses (F).

فئة من الرضويات تحمل في اطراف السنبها بعض الانسان الصغيرة الذرية .

٢٦٦٩٠ - مَسْتَحَج \* Courant d'air (F).

Wind current (E).  
مر الريح ويجراها في اي مكان او ميق كان .

٢٦٦٩١ - مَسِير Gorge-bleue (F).

هو المزة ، طائر من الدخليات ، اطها .

٢٦٦٩٢ - مَسِيرُورَة Aristoloche siphon (F).

هو زراوته سيفو ، اطها .

٢٦٦٩٣ - مَسَهَك Courant d'air (F).

Air current (E).  
هو المسح اي مر الريح او مجرى الهواء .

٢٦٦٩٤ - مَسَهَل Purgatif (F).

Purgative, Purging (E).  
دواء يطلق البطن . اشهر مسهلات الحيوان : سلفات السودا وسلفات المغنيزا وزيت الخروع .

٢٦٦٩٥ - مَسَهْم ، مَسَهَب Cheval demi-sang (F).

Half-bred horse (E).  
الفرس المجهين .

٢٦٦٩٦ - مَسَوَاط Spatule (F).

Spatula, Palette-knife (E).  
اداة من خشب تستعمل لطحن الزبدة وسائر المصنوعات .

٢٦٦٩٧ - مَسَوَاتِي Cadran (F). Dial-plate, Dial (E).

٢٦٦٩٨ - مَسَوَاك \* Oldenlandia (S).

Oldenlandia (F). Indian madder (E). Oldenlandia (D). Oldenlandia (I).  
جلس نباتات عشبية وجنية من فصيلة القويوات ، انواعها ٢٠٠ ، اصلها البلاد الحارة . مظهرها يري وبضها زراعي صناعي يستخرج من جلدها مادة صلبة حمراء اللون .

٢٦٦٩٩ - مَسَوَاك الزراعي Pasterage (F).

هو المصايب ، نبات من فصيلة السليبيات ، اطها .

٢٦٧٠٠ - مَسَوَاك ، مَسَبَكَة ، مَسَبَكَة

Présure (F). Rannet (E).  
خيرة قابلة للذوبان تستخرج من منقعة الجدي الرقيق . تستعمل في تجبين الحليب .

٢٦٧٠١ - مَسَوَاك ، مَسَوَاك Dominé (F).

Dominated (E).  
نمت تمرني يطلق على كل شجرة لا يزيد ارتفاع سنبها عقب قنة الشجرة السالمة .

٢٦٧٠٢ - مَسُوس Eau saumâtre (F). Briny (E).

المسوس الماء بين المالح والمليح . قال الرازي :  
ولو كنت ملاك كنت لا حظ المالح ولا مسوا

انواعها عديدة منبتها حوض البحر المتوسط . سوبها فرهاد تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقها متعاقبة اهلجية مقطوعة . نصلها على البثرة مسن الحافة . ازهارها طرفي الاركان ، متقوي التجميع . ازهارها صغيرة القد يكثر فيها الابيض والاحمر والقرنزي || اشهر انواعها الزينية ما يتبع .

٢٦٦٩٠ - مَسَاح بحري Malcolmia maritima (S).

٢٦٦٩١ - مَسَاح ثنائي اللون Malcolmia bicolor (S).

٢٦٦٩٢ - مَسَاح جهادي Malcolmia littorea (S).

٢٦٦٩٨ - مَسَاك Palisseau (F). Vine-stick (E).

هو المرزح ، مسد يستعمل لدم الكمية او لرغها من التربة .

٢٦٦٩٩ - مَسَس Acanthe-ursine (F).

نبات يدمي اقتنا رهلة ، اطها .

٢٦٦٨٠ - مَسَسَكَرَة ، مَسَسَقَرَان Aristoloche cotonneuse (F).

هو الزراوته الازغب ، اطها .

٢٦٦٨١ - مَسَسَكَة Piscine, Vivier (F).

Fish-pond, Fish-wei, Stew (E).  
حوض كبير ترب في الاسماك .

٢٦٦٨٢ - مَسَسَا Digue (F). Dike, Embankment (E).

حاجز يقام في وجه المياه لتحويل جزء منها او لتخفيف سرعة انسيابها .

٢٦٦٨٣ - مَسَسَج Bigarré, Rayé (F).

صفة الشيء المجهج . Motley, Streaked, Striped (E).

٢٦٦٨٤ - مَسَسَجَل Anargié (F).

نمت تعريف يطلق على من اضمحلت فيه عوارض الانهادف .

٢٦٦٨٥ - مَسَسَد Tuteur (F). Prop (F).

هو كل حود يوضع بجانب القرية او الشجرة لتستند اليه . لذلك يحسن ان يكون مستقيماً وان لا يقل متوسط قطره من ٤ سم . افضلها صلب كالستديان والبلوط... تتعلم المساند في اواخر الربيع فتتلف وتنشر اطرافها العليا بالمشار وتثبت اطرافها السفلى التي تستند التربة بالمنجل او بالقدوم ثم تفتش بمحلول سلفات النحاس وتبني كذلك حتى ينتج المحلول من قة المسد . والمحلول يتركب من كيلو سلفات النحاس في عشرة لترات ماء . وهو يحفظ المساند من النخر نحو سيمة احوام . ويصعب من افرخان الذي ان اصابها تقش الى جميع الاغراس والاشجار .

٢٦٦٨٦ - مَسَسَد Espalier (F).

الخط من الاشجار المشرفة القائمة على جدار . ج مسندات .

٢٦٦٨٧ - مَسَسَدَة \* Mussenda (S). Mussende (F).

جلس نباتات جنينية من فصيلة القويوات . انواعها المعروفة زهاء ٥٥ . جميعها من نباتات العالم القديم . اصلها البلاد الاستوائية والحارة . سوبها فرهاد . اوراقها متعاقبة اهلجية . ازهارها على التجميع ، تاجي الاركان . ازهارها خماسية التركيب ، مسطلة الانابيب . لحاء سوبها وانفادها حافسة . اوراقها تملد القروح . ازهارها تنفع الصدر وتذهب بالسعال وتلازم الجروح .



مسندة



مسوك

٢٦٧١٧ - مِسْبَس \* ، شَجَرَة الجِرْح ، نَبْع  
Nicotiana glauca (S).  
عَلْوَكَا

نوع من نبع رستنيكا وهو بنية برية معمرة في المناطق الحارة ، حولية في المعتدلة . يعيش على السواحل اللبنانية . ساقه خشبية منتصبة فراء تليق من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . أوراقه متعاقبة ، متبادلة الارتكاز ، معققة ، مستطيلة الزناد . نصلها رمحي الشكل ، جامد الصلابة ، بحري اللون . ازهاره خماسية التركيب ، طرفية الارتكاز ، صفراء اللون . ثماره جرداء رباعية الفلق تلتصق ببعض البعض في الدققة ، الكروية ، الكستنية اللون || يقال ان أوراقه طيبة تفيد الجراح وتطأها .

٢٦٧١٨ - مَسِيكَة  
Terre imperméable (F).  
Impermeable soil (E).  
المسكة من الارضين التي تملك الماء وتمنع انصرافه .

٢٦٧١٩ - مَسِيكَة  
Armoise dorée (F).  
هي القيصوم الكافوري ، اطليه .

٢٦٧٢٠ - مَسِيكَة  
Erodium moschatum (F).  
هي الجذاب المسكي ، اطليه .

٢٦٧٢١ - مَسِيل  
Hydromètre (F).  
Hydrometer (E).  
مقياس كثافة السوائل وقوة الدفاعة .

٢٦٧٢٢ - مَسِيل  
Baradine (F).  
هو الخندق الذي يصنع في الارض الجبلية المتحدرة بجمع الاطمار وتوجيهها شوقاً من انصرافها .

٢٦٧٢٣ - مَسَا  
٢٦٧٢٤ - مَسَا  
هو الجزر وقيل نبت يشبهه .

٢٦٧٢٥ - مَسَاء  
Périptadecien (F).  
Peripatetic (E).  
المشاة من اتبع فلسفة ارسطو .

٢٦٧٢٦ - مَسَاكِلِي ، قَرْمَد آفِي  
Pépliniériste (F).  
Nurseryman (E).  
هو من تعامل في استنار المشاتل .

٢٦٧٢٧ - مَسَاكِرَة  
Apomixie (F).  
هو التكاثر آتيل البادد الاخصاب .

٢٦٧٢٨ - مَسَاكِرَة  
Ferme, Métairie (F).  
Farm, Small farm (E).  
ارض زراعية يديرها صاحبها بمقد .

٢٦٧٢٩ - مَسَاكِرَة ، إِشْتِرَاك  
Stipulation (F).  
هي كل شرط او اتفاق او قيد ينص عليه في العقد .

٢٦٧٣٠ - مَسَاكِرَة التَحْكِيم  
Clause compromissoire (F).  
Stipulating arbitration of clause (E).  
شرط الزامي منصوص يقضي على المتعادلين بان يطرحوا المنازعات التي تنشأ فيما بينهم من هذا العقد على محكمين مختارين .

٢٦٧٣١ - مَسَاكِرَة ، شَرِيك  
Sociétaire (F).  
Associate (E).  
مشارك

٢٦٧٣٢ - مَسَاكِرَة  
Terrain meuble (F).  
Light, Mellow soil, Loose ground (E).  
هي التربة الخوارة اي التربة اللسوية التركيب الحكيمة الغنية بالمنصر الدبال الذي يجعلها لينة .

٢٦٧٣٣ - مِسْقَة \*  
Solarium (S).  
Solarium, Cadran (F). Solarium (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وقصيلة المسقيات . انواعها المماصرة المعروفة نحو ١٥ منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصنافها مدوّارة حمزة الحمار والفسحة ، ملوّنة ورفوشة اجسامها مستطيلة . رؤوسها قصيرة مدمجة الاطعام ثنائية القواس المعروفة . اسقاطها قربة المادة .

٢٦٧٣٤ - مِسْقِيَّات  
Solaridae (S).  
Solaridés (F). Solaridés (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد اطلسها بحار البلاد الحارة || اصنافها مدوّارة ، صاجية الملح ، حمزة الحمار ، ملوّنة ، مرقوشة ، متساوية الزخرفة والرفشة || اعرف اجناسها واشهرها المسقة .

٢٦٧٣٥ - مَسْرُوبَة  
Responsabilité (F).  
Responsability (E).

هي الالتزام بازالة الضرر الواقع على الغير بفعل المرء او سببه او بفعل غيره . وتستعمل في الصبح التالية :

مسؤولية الاضرار (F).  
مسؤولية المرء عن فعل غيره  
Responsabilité du fait d'autrui (F).

مسؤولية المرء عن فعل حيوانه  
Responsabilité du fait des animaux (F).

مسؤولية المرء عن الاجادات  
Responsabilité du fait des choses inanimées (F).

مسؤولية المرء عن مبانئه  
Responsabilité du fait des bâtiments (F).

مسؤولية تعاقدية  
Responsabilité contractuelle (F).

مسؤولية قانونية  
Responsabilité légale (F).

مسؤولية مخففة  
Responsabilité atténuée (F).

مسؤولية مدنية  
Responsabilité civile (F).

مسؤولية مشتركة  
Responsabilité partagée (F).

٢٦٧٣٦ - مَسِيْبَاع  
Capacimètre (F).  
Capacimeter (E).

جهاز يستعمل في قياس السعة الكهربائية .

٢٦٧٣٧ - مَسِيْبَال  
Fluximètre (F).  
Fluximeter (E).

جهاز يستعمل في قياس سرعة النفع المغناطيسي واستدلالة .

٢٦٧٣٨ - مَسِيْب  
Aval (F). Down-stream (E).

المنصب أو ساقطة النهر هي الجهة التي تسفل المياه الجارية .

٢٦٧٣٩ - مَسِيْب ، مَسِيْب  
Dissolvant (F).  
Dissolvent (E).

٢٦٧٤٠ - مَسِيْد  
Codominant

نعت تعريفي عربي يطلق على الانجبار المشتركة في السيادة .

فالشجرة المميدة هي التي تكون قبتها او جزء منها تحت مستوى قن الانجبار السائدة .

٢٦٧٤١ - مَسِيْر  
Trajectoire (F). Trajectory (E).

خط سير الاجرام المتحركة . ج مساري .



مسقة



مسي

Haras (F).

٢٦٧٢٨ - مُشَبَّكَة

٢٦٧٢٧ - مُشَاش هو النظم الطويل ، أطله .

Breeding-stud, Stud (E).

مؤسسة تربي يكرام الخيل المولدة للزود .

٢٦٧٢٨ - مُشَاشَة Carilège de l'extrémité des os

Caniveau, Emissaire (F).

٢٦٧٢٩ - مُشَبَّرَة

٢٦٧٢٩ - مُشَاش \* Notopteris (S).

Channel stone, Gutter, Overflow channel (E).

Notoptère (F). Notopterus (E).

قناة لصرف المياه ، وهي قناة الصرف الأساسية التي تنتهي إليها مياه الأسراب وما شبه .

جنس اسماك بحرية من فصيلة المشاطيات . انواعها المهرقوة قليلة العدد منتشرة في بعض الانهر الاسيوية اصغها انهر واخوار العراق واندك . جميعها كبيرة القد تطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . زعانفها الظهرية صغيرة ضيقة . زعانفها البطنية والشرجية متتامة كالشط . لحوبها ماكرة متوسطة الصنف || اشهر انواعها مشَاش شيلانا (Notopterus chilana) الذي لا يقل طوله عن ١٠٠ سم . والذي يكثر وجوده في اخوار الهند ومليزيا .

Amentifère (F).

٢٦٧٤٠ - مُشَبَّرَق \*

Rassasiant (F).

٢٦٧٤١ - مُشَبَّع

تمت تحريفي يطلق على كل تبع منجم الصفات المماثلة التي تتركز دون القاعة وفوق الموزونة .

٢٦٧٣٠ - مُشَاطِيَّات \* Notopteridae (S).

٢٦٧٤٢ - مُشَبَّع ، مُشَبَّر ، مُشَمَّم

Notoptéridés (F). Notopteridae (E).

Imprégné (F). Impregnated (E).

فصيلة اسماك بحرية وبحيرية من مفتوحات المثانة . اجناسها وانواعها المهرقوة قليلة العدد جميعها من اسماك مناطق البلاد الحارة || اشهر اجناسها المشَاط .

Prévenu (F).

٢٦٧٤٣ - مُشَبَّو ، فَشِين

٢٦٧٣١ - مُشَاع Indivis (F). Undivided (E).

Accused (E).

هو الذي تلقى عليه شبه اقتراف الجريمة .

الملكية الشائعة غير المنقصة .

٢٦٧٤٤ - مُشَاشَات Dispersif (F). Dispersive (E).

٢٦٧٤٥ - مُشَاشَر \* Extracteur (F). Extractor (E).

٢٦٧٣٢ - مُشَاق \* Pecten (S).

جهاز آلي يستعمل لاستخراج العسل من الخواويب وذلك بتأثير القوة الانابتة .

Peigne (F). Pecten (E).

٢٦٧٤٦ - مُشَاشَع ، مَالِك على الشُّبُوع

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة المشَاشيات . انواعها المهرقوة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم واصغها البلاد المعتدلة الحرارة || اصغها كبيرة القد ، شبه مرسية الشكل ، شعاعية التخذيد ، لامتلاوية المصاريع ، الايمن منها شديد التخذيد قليل التخذيد || تعيش طليقة على الرمال وتتغذى بصره . لحوبها ماكلة جيدة الصنف .

Indivisaire (F). Co-parcaner (E).

هو ما يملك مع غيره مالا على الشيوع .

٢٦٧٤٧ - مُشَرَكَة Collectif (F). Collective (E).

٢٦٧٤٨ - مُشَرَكَات Hamamelidaceae (S).

٢٦٧٣٣ - مُشَاق ، مُشَقَّة ، مُشَر Hamamelidaceae (F).

Hamamelidacées (F). Hamamelidaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . نباتها اشجار وشجيرات . اوراقها معتقة اذنوية . ازهارها عثرية . ثمارها جرد صغيرة معظم انواعها بري وبعضها طبي وزينة .

Filasse (F). Filasse, Hari, Tow (E).

ما خلص بالثمن من لحاء النباتات اللينة كالكتان والقنب قبل نزله .

٢٦٧٤٩ - مُشَرَكَة \* Hamamélis

٢٦٧٣٤ - مُشَاقَة Tille, Taille (F). Hemp-herb (E).

هي قشور القنب والريزوفون .

Hamamelis (S). Hamamèle, Hamamélis, Noisetier sorcier (F). Witch hazel (E). Zanbarnus (D). Amamelide, Trilipo (I).

جنس شجيرات وجنات برية وزينة من فصيلة المشركات . انواعها قليلة العدد . اوراقها متعاقبة معتقة مائلة . نعلها يبيض الصفحة مسن الحافة . ازهارها محروية الانذكاز ، جميلة الشكل ، وباهية او خالية البتلات || اوراقها ولها موطا طبية تستعمل في بعض العلاجات الصدرية . اشهر انواعها اللينينية ما يلي .

٢٦٧٣٥ - مُشَاقِيَّات \* Pectinidae (S).

Pectinidés (F). Pectinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم الرباعية حادمت اللعاب . اجناسها وانواعها المهرقوة عديدة معظمها من متحجرات الاراضي الثالثة . انواعها المعاصرة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصغها متباينة الاشكال والاحجام ، بالغة التخذيد ، لامتلاوية المصاريع || احرف اجناسها المعاصرة المشَاق .

٢٦٧٥٠ - مُشَرَكَة خَمَلِيَّة Hamamelis mollis (S). Hamamélis veloucé (F).

٢٦٧٣٦ - مُشَاق Narchécia (F).

هو الكروندان ، أطله .

شجرة متوسطة القد غارسة تعلو نحو ١٠ امتار . موها

٢٦٧٣٧ - مُشَاقِيَّة \* Pérépactisme (F).

الصين . اوراقها خلية البشرة على صفحاتها السفلى ازهارها كبيرة للقد ، عاقنة العرف ، لونها الى الصفرة الزاهية ، كروها خرية عاقبة || ازهارها يستمر من اواخر كانون الى اواخر اذار .

Peripacticism (E).


المشَاقية اسم يطلق على فلسفة ارسطو لانه كان لا يلتقي دوروه الا ماشيا بصحبة طلابه .



مشَاش



مشَاق



مشَاش



مشَرَكَة

2٦٧٥٩ - مِشْجَارٌ ٥  
Dendromètre (F).  
Dendrometer (E).  
أداة تستعمل في قياس الانحجار لتقدير الملو والحجم .

2٦٧٦٠ - مَشَجَرٌ  
Bois (F). Wood, Forest (E).  
موضع الشجر ونبتته الطبيعي .

2٦٧٦١ - مِشْحَارَةٌ ٥  
Nigrospora (S).  
جنس فطور مجهرية من النخديات وفصيلة الطحيطيات . تتميز  
بجذعها الثنائي التكوين والشكل . الخصب منها بسيط  
التركيب ، فردي التجميع ، منتصب الارتفاع ، عابق  
اللث . أما الماقر ففسي التجميع مداد . كئاشدا  
كروية ، متعامة ، كثيرة العدد || أحرف أنواعه مشحارة  
الذرة ومشحارة الموز .

2٦٧٦٢ - مِشْحَارَةُ الذُّرَّةِ ٥ (S).  
Nigrospora oryzae (S).  
فطر مجهرى مركب غرائس الذرة قرب ادراكه سحبا فيلسد  
الالفاف بعد أن يسبب انحلالها وأسودادها ما يلذى من  
تساقط الحب قبل الانعاج والقطاف || يدارك باجتنب  
المواقع الرطبة ويكافح باستعمال مسحوق شيرلان تمفيرا  
على النبات .

2٦٧٦٣ - مِشْحَارَةُ المَوْزِ ٥  
Nigrospora musae (S).  
فطر مجهرى مركب ثمار الموز المخفوفة فيسبب اللباب  
ويعود الى الانحلال دون أن يبدو حل للشرة ما يتم من  
الاصابة || يكافح عنه ظهور أول اصابة بفضخ الكباشات  
المخفوفة بمائل شيرلان المركز من ١ الى ٢٪ .

2٦٧٦٤ - مِشْحَبٌ  
Racloir (F). Scraper (E).

2٦٧٦٥ - مِشْحَةٌ  
Teinte (F).  
Tint, Shade, Hue (E).

2٦٧٦٦ - مِشْحَرَةٌ ٥ مِشْحَمَةٌ  
Faulde (F).  
2٦٧٦٧ - مِشْحَطٌ  
Charasson, Pisseau  
هو المرزح أي المموك، عويد يوضع تحت قضيب الكرمر  
يرفعه عن التربة .

2٦٧٦٨ - مِشْحَطَابٌ ٥  
Lactomètre, Pèse-lait (F).  
Lactometer (E).  
هو ميزان الحليب، جهاز يستعمل لتقدير نسبة المواد  
السمية الموجودة في الحليب .

2٦٧٦٩ - مِشْحَلٌ ٥ مِشْحَلٌ  
Baliveau (F).  
Staddle (E).  
كل فرع أو شجرة من الخيش تركت بدون قطع لتكبر  
وتصير عجة . ج. اعجاز .

2٦٧٧٠ - مِشْحَلَبٌ ٥  
Serpette (F).  
Pruning-knif, Serpette (F).  
سكين خاص يستعمل في قطع الفروع والقضبان المرضية  
وفي النظم .

2٦٧٧١ - مَشَرٌ ٥ مَشَرٌ  
مشر ومشر الشجر : مخرج ورقه واكتس خضرة .

2٦٧٥١ - مُشْتَرَكَةٌ رَيْعِيَّةٌ  
Hamamelis vernalis (S). Hamamelis prinatier (F).  
جينة سبروتية تملو نحو ٢٠٠ سم . مهدا البلاد الاسريكية .  
ساقها فضاء . فروعها منتصبه . أوراقها تطول نحو ٦ سم .  
نصلها مائل الصفحة . ازهارها عطرية الرائحة ، حمر  
الكوز ، صفرا البتلات || ازهارها يستمر من  
كانون الثاني الى اواخر اذار .

2٦٧٥٢ - مُشْتَرَكَةٌ قِيرَجِيَّةٌ  
Hamamelis virginiana (S). Hamamelis de Virginie (F).  
جينة سبروتية تملو من ٣ الى ٤ امتار . مهدا امريكة  
الشالية . أوراقها مائلة الصفحة تطول من ٥ الى ٨ سم .  
ازهارها صفراء اللون . ازهارها يبتنئ حدة اصيل الورق  
ويستمر من اواسط ايلول الى اواسط كانون .

2٦٧٥٣ - مُشْتَرَكَةٌ يَابَانِيَّةٌ  
Hamamelis japonica (S). Hamamelis japonica (E).  
شجرة سبروتية صغيرة للقد فائزة تملو من ٤ الى ٧ امتار .  
مهدا اليابان . غروبها الازيانية اربعة . الوان ازهارها  
تختلف باختلاف غروبها منها الاصفر الذهبي والكبريتي  
والليسوي والبرتقالي . جميعها عطرية مستحبة المرق .  
ازهارها يستمر من شباط الى نيسان .

2٦٧٥٤ - مُشْتَرِيٌّ ٥ بِرْجِيْسٌ  
Jupiter (F).  
Jupiter (E).

المشتري أو البرجيس أكبر كوكب في مجموعة النظام  
الشمسي . يعتبر ألم كوكب بعد الزهرة . موقعه بين المريخ  
وزحل . جرم كتله يفوق جرم الأرض نحو ١٢٩٥ مرة  
وتطهر يفوق قطر الأرض نحو ١١ مرة . سرعة دورته  
الانقلابية في الفضاء نحو ٤٦٩٨٠ كيلومتر بالساعة .  
دوره المحورية حول الشمس تستمر نحو ١٢ سنة . مدة  
اليوم البرجيسي نحو عشر ساعات . ويدور في فلكه اربعة  
أقار كبيرة ومائة صغيرة . أسماء الكبيرة : إيو ، اروب ،  
غاميد ، كليتيو . أما الصغيرة فارقانها من ١٢ الى ١٢  
لأنها لا تحمل أسماء || والمنبتيون يستعملون المشتري السعد  
الأكبر لانه فوق الزهرة في السعادة واضافوا اليه الخيرات  
الكثيرة والسعادات الطيبة .

2٦٧٥٥ - مُشْتَقٌّ  
Dérivé (F).  
Derivative, Drifted (E).

2٦٧٥٦ - مِشْكَلٌ ٥ مِشْكَلِيَّةٌ ٥ مِشْكَلِيَّةٌ  
Pépinière (F). Nursery (E).  
مكان تستنبت فيه الفراس والنباتات المختلفة فنشأ فيه  
ومكث فترة من الزمن الى أن تنقل وتزود في مستقرا .

2٦٧٥٧ - مِشْكَلُونٌ ٥ شَاوِلٌ  
Plantoir (F).  
Dibble (E).  
أداة من حديد أو خشب تستعمل في التشتيل أي فرس  
الشتل .

2٦٧٥٨ - مِشْكَنٌ ٥  
Filière (F). Spinneret (E).  
المشكن القومعة التي يخرج منها الخيط عند نضج الحشرات  
كمكيط الحرير عند دودة القز وكالتواس عند الرقادة ||  
وهو أيضاً جهاز من القنولاد يستعمل في جذب المادد  
ومدها وتحويلها الى أسلاك .



مشتلون



مشحارة الموز



مشخاب



مشذب





مُشط



مُشط الرامي



مُشط الرامي البري



مُشط الزَّهراء

عُشب فيها أنثان تُسَوَّى بها القصاب ويُغلى بها الحُب .  
وللمُشط أشكال ، أعماها استعمال :

Herse en bols (F).	مُشط عَشبِي
Herse rotative (F).	مُشط دَوَّار
Herse traînante (F).	مُشط زاحف
Herse canadienne (F).	مُشط كَندي
Herse émotteuse (F).	مُشط مدبري
Herse souple (F).	مُشط مرن
Herse articulées (F).	مُشط مفصل
Herse norvégienne (F).	مُشط توجيبي

٢٦٧٨٩ - مُسْطَف ، تَمِشِطُ

Hertage (F).  
Harrowing (E).  
حرَّاة سطحية بالمسْطَف ، القصد منها تنعيم التربة وتطهيرها من الحشائش .

Chromis (F).  
٢٦٧٩٠ - مُسْطَف

هو البُلغِي ، جنس اسماء بحيرية ونهرية من فصيلة المُشطيات .

٢٦٧٩١ - مُسْطَفُ الدُّثْبِ

و ثب صَغير طَيِّب الرائحة يُقارب الكُزْبَرَة .

٢٦٧٩٢ - مُسْطَفُ الرَّاعِي \* ، شَوْكَةُ الدَّوَّاجِ

Dipsacus fullonum (S). Chardon à foulon (F). Bonnetier, Cardère à foulon (F). Draper's teasel, Fuller's teasel, Teazle (E). Weberkard, Kardendistel (D). Cardo del lanajo, Dissaco, Lattugoni (I).  
نبات عَشبِي زُرَاعي صَناعي من فصيلة الدَّيبَاسِيَّات .  
رُويَساته الزَّهرية حُرُوفات شائكة مُترابكة مُترابطة مُنبطة الأطراف تُؤلف أكوازاً اسطوانية تستعمل في تَهذيب الصوف .

٢٦٧٩٣ - مُسْطَفُ الرَّاعِي البَرِّي \*

Dipsacus sylvestris (S). Cardère sauvage, Cabaret des oiseaux, Baignoire de Vénus (F). Wild teasel, Shepherd's rod, Barber's brushes (E). Schuttkarde (D). Dissaco salvatico, Erba messella, Verga da pastore (I).  
نبات عَشبِي يَري شائك من فصيلة الدَّيبَاسِيَّات . يَزوره مأكَل للصَّافِر أعماها الحَسين ولشَهابه . يَستَمر من أُنثابات الصَّارة لِأنه يَملُح على سائر النَباتات التي تَعيش بِقربهِ .

٢٦٧٩٤ - مُسْطَفُ الرَّجُلِ

Métatars (F).  
Metatarsus (E).

٢٦٧٩٥ - مُسْطَفُ الزَّهراء \* ، مُسْطِيفَة

Scandix  
جنس لَباتات عَشبِيَّة من نَفسِيلة الخَبيات . أزهارها المَعرونة ١٠ ، جَميعها بِرِيَّة . أو راقها متعاقبة مركبة طويلة الأُزاد . أزهارها غَيمية التَجميع بِغشاء اللَين . يَتَكَثَّر بين الأُزود وتُوجد في جَمع البلاد . أشهرها وأعماها مُشط الزَّهراء الطويل .

٢٦٧٩٦ - مُسْطَفُ الزَّهراء العَظِيلِ

Scandix pecten-veneris (S). Scandix peigne de Vénus, Aiguille de berge (F). Shepherd's needle, Venus' comb (E). Echter Nadelkerbel, Venus-kamm (D). Scandica, Forasacco, Pettine di venere (I).  
نوع من مُشط الزَّهراء يَكثر في الأرض البور وبين الأُزود فيُعَمِّقها ويَؤذيها .

٢٦٧٧٢ - مُسْطَراب \* Liquomètre (F).

Liquometer (E).  
المُستَراب هو ميزان المُسترويات ، جَهاز يستعمل لقياس دَرجة الكحول في المُسترويات الرُويَّة .

٢٦٧٧٣ - مُسْطَرَّة Thalle (F). Thallus (E).

هي جَهاز شُجاع عَظِيات الزَّهر كالغُطُور والأُلاع .

٢٦٧٧٤ - مُسْطَرَّة

طائر صَغير مَدبج كانه ثوب وُثي (اللسان) .

٢٦٧٧٥ - مُسْطَرَّة Couleuvre à échelons (F).

هي الحَثلث الأَشر ، اطلبه .

٢٦٧٧٦ - مُسْطَر على الوَسي

Subrogatuteur (F). Deputy-guardian (E).  
هو الذي يَقوم بِمَقام الوَسي على القَاصر إذا تَضرَّبت مصالحُها ، أَمَّا مَهْمَتُه الأصلية فُهي مُرااة أَعمال الوَسي .

٢٦٧٧٧ - مُسْطَرَّة Edmeuse (F).

هي المُصَفَّة ، آلة تَحشُّ الزَّهر عالياً عَشيَّة من الفُسمجان .

٢٦٧٧٨ - مُسْطَرِب Boisson (F).

Drink, Beverage (E).

٢٦٧٧٩ - مُسْطَرُوج ، لِاسْطِيفَة Agame (F).

Agamous (E).

٢٦٧٨٠ - مُسْطَرُوج ، تَصْمِيم

Projet (F).  
Project (E).

٢٦٧٨١ - مُسْطَرُوج اسْتِيبَاطِي

Projet préalable (F).  
Previous project (E).

٢٦٧٨٢ - مُسْطَرُوج عِندَ اذِي

Avant-projet (F).  
Advance project (E).

٢٦٧٨٣ - مُسْطَرُوج العَقْد

Avant-contrat (F).  
Advance contract (E).

٢٦٧٨٤ - مُسْطَرُوج قَانُون

Projet de loi (F).  
Draft bill (E).

هو المُشروع الذي تَضمه الحُكُومَة وتَقدمه إلى المَجلس النيابي بِاسم رَئيس الجُمهُوريَّة لِيقَره ويَصيح قَانُوناً .

٢٦٧٨٥ - مُسْطَرُوبات المَناكِير ، مَنيَّيات المَناكِير

Dentirostris (F). Sickelbill (E).

رُقيَّة من الطُيور الجَرام تُشمل بِعض الفُصائل ، أشهرها الدَّغليَّات واللَّهريَّات والمُسترويات والصَّرديات .

٢٦٧٨٦ - مُسْطَرِيَّات ، نَباتات عَظِيلَة

Thallophytes (F). Thallophyta (E).

صنف من المُلكة النَباتية . نَباتاته تُتَكون من جَرم يَحي فُطراً أو دَلاً . وهي عَامة الجُلدور والسُوق والأُزواق والأُزمار . أبناسُها وأُزواعُها تَمد بِغُضَّة آلاف جَمعها ثَلاث شُعب : البَكتَريَّات والخَليَّات والفُطَريَّات .

٢٦٧٨٧ - مُسْطَش Suros (F). Spilt, Tumour (E).

حَلَّة تَمرِّي أَثِيل وهي تُزِيدُ في الرُطوب .

٢٦٧٨٨ - مُسْطَش Herse (F). Harrow (E).

أداة تُستعمل لِتَسطِيف التَّربة . يُعي « شُعبة من حديد أو

- Actinales ٢٦٨١١ - مُشَعَّات  
رتبة من المرجانيات تشمل العديد من الفصائل والجناس  
والأنواع .
- Indicateur (F). ٢٦٨١٢ - مُشَعَّار ٥  
Indicator, Indicatory (E).
- Radiomètre (F). ٢٦٨١٣ - مُشَعَّاع  
Radiometer (E).  
المشاع جهاز يستعمل في قياس شدة التور .
- Compte-gouttes (F). ٢٦٨١٤ - مُشَعَّاف  
Dropper, Drop-tube (E).
- Terebellum (S). ٢٦٨١٥ - مُشَعَّاب \*  
Térébelle, Tarière (F). Terebellum (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرغويات مغذيات الارجل  
وتفيلة الدلاحيات . أنواعها المعروفة عديدة ، بعضها من  
متحجرات الاحقاب الثالثة والبعض الآخر معاصر  
متشتر في بعض بحار البلاد الحارة اغصها المحيط الهندي ||  
اصداؤها صاروخية الشكل ، مستطيلة الفتحة القليلة  
الانفراج . اجسامها صغيرة القد ، غروطية الاخطام  
المستطيلة .
- Fané (F). Faded (E). ٢٦٨١٦ - مُشَعَّون  
نمت تعريفى توصف به الاعضاء لنهايتها الذائبة .
- Atelier, Local de travail (F). ٢٦٨١٧ - مُشَعَّول  
Work shop (E).  
هو المكان المزد للشل .
- Ænanthe (F). ٢٦٨١٨ - مُشَعَّيل  
هو الرازيانة و نبات من الصيرانيات ، اطلها .
- Phellandre (F). ٢٦٨١٩ - مُشَعَّيل مائي  
اطلب ورازيانة مائية .
- Pneumatique (F). ٢٦٨٢٠ - مُشَعَّاط ٥  
Pneumatic (E).
- Diaphanomètre (F). ٢٦٨٢١ - مُشَعَّاف ٥  
Diaphanometer (E).  
جهاز يمكن من درس وتحديد شفاف الاجسام والسوائل .
- Babine du chameau (F). ٢٦٨٢٢ - مُشَقَّر ، مُشَقَّر  
المشقر من البعير كالجملفة من الفرس . ج مشافر .
- ٢٦٨٢٣ - مُشَقَّ سمكة بحرية مشهورة باسم مدج .
- ٢٦٨٢٤ - مُشَقَّ مبدول  
Notacanthus commun (F).  
سمكة بحرية تدمى مدج مبدول ، اطلها .
- ٢٦٨٢٥ - مُشَقَّ ، مُشَقَّر  
Tailage (F). Stripping (E).  
غسل المشاقة اي القشرة من سوق القنب والكتان وما  
اشبه .
- Ebroutage ٢٦٨٢٦ - مُشَقَّ ، مُشَقَّاق ، هَتَّ  
فصل ورق التوت من القشال قبل تقديمه الى دود القز .
- Dérayure (F). Water-furrow (E). ٢٦٨٢٧ - مُشَقَّق  
منخفض يترك بين السكين في الحراثة تسهية لصرف  
المياه .
- Métacarpe (F). ٢٦٧٩٧ - مُشَطَّ الَيْدَة  
Metacarpus (E).
- Fissifolié (F). ٢٦٧٩٨ - مُشَطَّوَر النَصَل  
Fissifoliat (E).  
نمت تعريفى يطلق على كل نبات يحمل أوراقاً نصالها  
مشطورية الأطراف .
- Diatomaceae (S). ٢٦٧٩٩ - مُشَطَّوَرَات  
Diatomacées (F). Diatomaceae (E).  
فصيلة من الخث السمر . اجناسها وأنواعها كثيرة العدد  
جميعها نباتات مجهرية من وحيدات الخلية . تعيش في  
المياه الملحة والمالحة .
- Kigélie (F). ٢٦٨٠٠ - مُشَطَّوَرَة  
هي الكيجلية ، اطلها .
- Pinnal, Pinné (F). Pinnate (E). ٢٦٨٠١ - مُشَطَّي  
شكل من اشكال أوراق النبات يشبه المشط .
- Pectiné (F). Pectinate (E). ٢٦٨٠٢ - مُشَطَّي  
شكل من الزباني يشبه المشط .
- Ctenodonte (F). ٢٦٨٠٣ - مُشَطَّي الأَسنان  
Ctenodonte (E).  
من الحيوان والاسماك من كانت اسنانه كالشط .
- Bipectiné (F). ٢٦٨٠٤ - مُشَطَّي مُزْدَوِج  
Bipectinate (E).  
شكل من الزباني يشبه المشط المزدوج من جهتي الطول .
- Chromidae (S). ٢٦٨٠٥ - مُشَطَّيَات  
Chromidés (F). Chromidés (E).  
فصيلة اسماك من رتبة شالكاكات الزماتف .
- Ctenophores (F). ٢٦٨٠٦ - مُشَطَّيَات  
Ctenophora (E).  
رتبة حيوانات دنيا من شعبة مجوفات البطن .
- ٢٦٨٠٧ - مُشَطَّيَات الخِيَّاشِيم  
Ctenobranches (F). Ctenobranches (E).  
رتبة من الرغويات مغذيات الارجل اماميات الخياشيم .  
نصالها واجناسها وأنواعها عديدة . جميعها وحيدة المشط  
الخيشوي والاذنين والخنفر . وجميعها أيضاً يمينية الاعضاء  
لأن الاعضاء اليسارية المقابلة ضامرة لا عمل لها .
- Rétribution (F). ٢٦٨٠٨ - مُشَعَّ ٥  
Remuneration, Reward (E).  
المشع حيلة تدفع اجراً او مكافأة لمن يقوم بعمل .  
فالمدفوع والراتب والجزاء والشكر والانتداب والبلصة والمالة  
والتعويض جميعها تعتبر من الامشاع .
- Radiomètre (F). ٢٦٨٠٩ - مُشَعَّ ، مُشَعَّاع  
Radiometer (E).  
مقياس شدة اشعة التور .
- Flustra (S). ٢٦٨١٠ - مُشَعَّاب ٥  
Flustrelle (F). Flustra (E).  
جنس حيوانات طحلبية بحرية ثولية التجميع متشعبة تعيش  
على الفيرس .



مشعة

البشرة، من الحافة. ازهارها عشوية كبيرة القد، بيضاء اللون، وريدة المواج. ثمارها لحمية السويك، لا قياسية الشكل، خلية البشرة، قصيرة الاذن، للذئدة الطعم، مستحبة البرف والتكهة. صمغها بيضيه خشبية عطيفة وبنفسطة تحضن رزرة جاملة للساب الابيض. وثمره المشمش توكل طازية ورطب وتجفف ويصنع من صمغها رب ناضج لدن يملك الاجزاء صمغي الشكل يدعى قر اللين يكثر استهلاكه في البلاد العربية.

٢٦٨٢٨ - **مُشْفَسِي** ° Commensurable  
نعت تعريفي يطلق على ما يمكن قياسه هو وغيره بمقياس واحد مشترك.

٢٦٨٢٩ - **مُشْفَسِيَّة** ° Commensurabilité (F).  
Commensurability (E).  
امكان قياس كيتين او اكثر بمقياس واحد.

٢٦٨٣٠ - **مُشْفَكَة** Filasse (F), Tow (E).  
هي المادة التي ما خلص بالمشق من لحاء النباتات اللينة كالقنب والكتان.

٢٦٨٣١ - **مُشْفَن** Scarificateur (F).  
المسلفة تسوي بها التربة المبلورة.

٢٦٨٣٢ - **مُشْفَرَقُ الْجَنَاح** Fissipenne (F).  
Fissipinna (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل طائر مشقوق الجناح.

٢٦٨٣٣ - **مُشْفَوَاتُ الْأَرْجُل** Schizopodes, Fissipeds (E).  
رتبة حيوانات من القشريات.

٢٦٨٣٤ - **مُشْفَوَاتُ الْأَنْسَنَة** Fissilingues  
رتبة من الطغائيات تشمل بعض الفصائل. تتميز بالسنتها المستطيلة المشرفة الفارقة الاعاذه.

٢٦٨٣٥ - **مُشْفَوَاتُ الْمَتَالِير** Fissirostres (F).  
Fissirostrous (E).  
رتبة من الطيور الجواثم.

٢٦٨٣٦ - **مُشْكَاة** Guirlande (F).  
Garland, Wreath (E).

٢٦٨٣٧ - **مُشْكَاك** Allotropique (F).  
Allotropic (E).  
صفة بعض الاجسام كالكربون والفسفور وغيرها التي تتصل بأشكال حكيمة مختلفة دون ان يتبدل شيئاً من تركيبها الجزيئي.

٢٦٨٣٨ - **مُشْكَطَا** Menche aquatique (F).  
هو النوع المائي، الطيه.

٢٦٨٣٩ - **مُشْكَاة** Fraisière (F).  
Strawberry-bed (E).  
قطعة ارض مفرسة بشكلًا، ج. شاك.

٢٦٨٤٠ - **مُشْكُوز**  
هو المشمش اللوزي المحلو المخ. الواحدة مشكوزة.

٢٦٨٤١ - **مُشْكَاس** Mélioscope (F). Heliocope (E).  
منظار الشمس.

٢٦٨٤٢ - **مُشْكَاسِي** Hélicoptique (F).  
Heliocopic (E).

٢٦٨٤٣ - **مُشْمِش** °  
Prunus armeniac, Armeniaca vulgaris (S). Abricotier (F). Apricot tree (E). Aprikosen, Echta Aprikose (D). Albicocca, Armellini, Melico (I).  
شجرة مشمرة من فصيلة الورديات. تلثم من ٧ الى ١٥ م. ساقها قصيرة. اغصانها وفروعها مشنطة. ثمرها تكون في اول صيفها مساهم ثم تتشقق مع مرور الزمن. اوراقها حاذية، مستطية، مدبقة، قليبة الشكل. لصلها نالس

**مهد:**  
قبل انه من ثبوت الجسم او ارضيا وقد انفجرا اخيراً حل انه من ثبوت الصين لانهم هرفوه واستمروه منذ زهاء ٢٠٠ سنة قبل الميلاد، وقد أدخل من الصين بالتالي الى الهند فالجسم فالمرق فاروبيا قتركيا فالبرتغال فإيطاليا.

**الليم:**  
لو لم يكن المشمش من النباتات البكورة الاقرار ولو لم يكن ازهاره يستيق الاوراق ويتأثر من صقيع الربيع لكانت سائر النباتات الممتدة توافقه. لذلك فهو رطب في الاماكن الدافئة والمعارض الجنوبية والمواقع التي لا تكثر فيها الريح الموسما.

**تربته:**  
ينمو ويعيد في جميع الارربة ولا يألف من كثرة الحمى اما بعض شدة الانتماج والطريرة المستحكة || وهو من الاجشجار المسقوية التي تتطلب الري المنتظم وقد تنضج من الجفاف.

**تكاثره:**  
يتكاثر بالبذر وبالطعم. والتطعيم يتم عادة بالرقبة، معلوم وهي. أما الاجشجار التي يحسن تقصيلها كاهيات فهي اللوز في الارربة الكلسية والخوخ في الارربة المنجبة والذواق في الارربة العميقة القليلة الرطوبة والمشمس الكلالي في سائر الارربة.

**فروبه:**  
فروبه عديدة تقسم الى فئتين: فئة المشمش الكلالي وهو ما كانت يلموه مرة الطعم غنية بالحامض السينيديكي وفئة المشمش اللوزي (المشكوز) وهو ما كانت يلموه مأكولة عادية الحامض السينيديكي || اشهر فروبه الوطنية ما يتبع:

- **السوسي:** ثمرته متوسطة القد فائشة. ساقها جلوية اللون قليل التشقق. اوراقها عابقة الخضار صغيرة القد. ثمارها كبيرة الحجم خاضرة الى الحمرة وهي للذئدة الطعم خافتة البرف والتكهة. يزورها حلوة مأكولة.

- **البيلدي:** اصراعه عديدة، اشهرها المارودي والخشاني. ثمرته متوسطة القد كروية الشكل. ساقها جلوية اللون عريقة الشقوق. فرعها مشنطة متراصة. اوراقها كبيرة القد زاهية الاخضرار. ثمارها كبيرة الحجم برتقالية اللون للذئدة الطعم يكثر استهلاكها في النعرج. يزورها حلوة مأكولة.

- **الحوي:** له صرمان «الكيز» و «القيس» ثمرته كبيرة القد ساقها مرارة كثيرة الشقوق. اغصانها مشنطة متراصة. اوراقها زاهية الاخضرار. ثمارها متوسطة الحجم للذئدة الطعم ذكية البرف والتكهة لغيا الى الصغرة الذعية. يزورها حلوة الطعم مأكولة.

- **السنداني:** ثمرته كبيرة القد شائعة. ساقها كهياء اللون مرارة المواج. اوراقها صغيرة المساحة مستطيلة البت



مشمش

**٢٦٨٥٣ - مِشْوَسي** °  
Hypogée (F).  
Hypogaeal, Hypogean (E).  
نمت تمريني يطلق عل البزور التي تستقر زباراتها ، عند الانتاش ، تحت سطح التربة وهي تكاسم بذلك البزور المربانية التي ترتفع زباراتها فوق سطح التربة .

**٢٦٨٥٤ - مَشْطُوط \*** °  
Achromistichum (S). Acrostic, Acrostique (F). Full-fern, Horn-fern (E). Füllfarn (D). Acrostico (I).  
جنس نباتات برية وتربينية من السرخسيات البسباجيات . انواعها المعروفة قليلة ، تربي في المناطق والمواقع الرطبة الظليلة . اوراقها قرصية الانتشاب تعطل من ٣٠ الى ١٠٠ سم . تحجبها لا يتعدى حدود الزايم الثالث . تشرعها مشاري الشكل ، مستدير السن .

**٢٦٨٥٥ - مِشْشُوك** °  
Escrape, Escrapoire (F).  
Small sickle (E).  
منجل خاص يستعمل في تشويل الجملاد .

**٢٦٨٥٦ - مَشْبِطَاو** °  
Hétérois (F). Heterosis (E).  
المشيط هو هجلا السب الاول اي السلالة الاول عندما يكون عظم القدر . ويحيث ان صفات المشيط صفات انتافقية لا تستقر ولا وراثية فهجلا السب الثاني لا يكون مشيطا لانه يرد الى صفات دحه وندفه . ج. مشايط .

**٢٦٨٥٧ - مِشْبِطَاوي** °  
Hétérotrique (F).  
Heterotic (E).  
نمت تمريني يطلق عل بعض العوامل او الصفات المميزة التي تقود الهجن الى الشيطا او التفوق الشيطاي .

**٢٦٨٥٨ - مَشْبِطَاع** °  
Diagmètre (F).  
Diagmeter (E).  
جهاز يستعمل في قياس الاصلية اي قابلية الثقل الحفاري في الاجسام .

**٢٦٨٥٩ - مَشْبِكَة** °  
Allure (F). Carriage (E).  
طريقة سير ائحل وسائر الدواب كالخطو والمسلجة والنجيب والعدو .

**٢٦٨٦٠ - مَشْبِكَة** °  
Muschia (S). Muschle (F).  
جنس نباتات تربينية عشبية عشوشية معمرة من فصيلة الجريسيات . انواعها المعروفة قليلة البد ، معدها حوض البحر المتوسط . سورها متضبة لزاما ، اوراقها كبيرة ، فارشة ، مسننة الاطراف . تصالها رجلة مسترخية تعطل من ٣٠ الى ٦٠ سم . ازهارها حثكولي التجميع ، هري الشكل . ازهارها صفراء اللون او حمراء تعطل من ٤ الى ٥ سم . || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

**٢٦٨٦١ - مَشْبِجَة الفُطُر** °  
Mycélium (F).  
Mycellum (E).  
خيوط دقيقة متشابكة كثيفة التجميع نامية تحمل البزور في الفطور . ج. امشاج .

**٢٦٨٦٢ - مَشْبِطَة** °  
Plantain triomphe (F).  
هي لقمة التنبجة ، اطليه .

**٢٦٨٦٣ - مَشْبِطَة** °  
Scandix (F).  
هي مشط الزهراء ، اطليه .

باعة الخضار . ثمارها الى العفرة اللامعة وهي قرية الشبه من الحسوي لكها دونه للة وكذا . بزورها حلوة مأكولة .

**العصبي** : شجيرة كبيرة القد شائعة . ساقها جزوية سررا ليلية التفتيق . اغصانها فارشة منبسطة . اوراقها بيضية الصفحة ، قلبية القاعدة ، حيلة الخضار الغام . ثمارها كبيرة القد حيلة للشكل صفراء اللون غضراء المواج لباها جامد المكسر ، سكري الطعم غالت العرف والنبكة . - الكلاوي : الكلاوي : اغصانه عديدة . انجارها شائعة ، سوقها جزوية اللون متوسطة الخشونة والتفتيق . اغصانه منفردة . اوراقه قلبية مدببة المعصدة . فصلها قليل الاغضار والزهرة ، ثماره كروية الشكل صفيرة القد خزرية الصدارة تستعمل في صناعة قر الدين . بزوره مرة الطعم .

**للؤلوي** : المشلول : العصبي : شجيرة متوسطة القد فارشة ، اوراقها شديدة الخضار . ثمارها كروية الشكل متوسطة القد حيلة اللون الابيض تشوبه حرة ودية . لباها غزير الصدارة لذيد الطعم ذكي العرف والنبكة . بزورها حلوة مأكولة .

**٢٦٨٤٤ - مِشْشِش اليابان**  
Kaki (F).  
هو الكاكي ، اطليه .

**٢٦٨٤٥ - مِشْشِش امريكة**  
Mammée d'Amérique  
شجرة مشمرة مشهورة باسم جباس امريكة ، اطليه .

**٢٦٨٤٦ - مِشْشِشَة**  
Abricot (F). Apricot (E).  
هي ثمرة المشش . راجع جدول الفيتانيات .

**٢٦٨٤٧ - مِشْشِشَة**  
Mespilus (S). Néflier (F).  
جنس شجيرات برية وزراعية من فصيلة الورديات . انواعها قليلة العدد ، البرية منها شائكة والزراعية مرسة . اوراقها عابلة متعقة اطليجية ، فصلها يارز العروق عشن للمسس خلي البشرة . ازهارها كبيرة القد بيضاء اللون . ثمارها ككار الاكيدنيا لكها اصفر سحجا واقل سذقا ، لونها الى السرة الكستنية || اشهر انواعها للمشلة المبولة .

**٢٦٨٤٨ - مِشْشِشَة مَبْدَلَة \*** °  
Mespilus germanica (S). Néflier commun, N. germanique, Merlier, Nêle (F). Medlar tree, Dutch medlar (E). Deutsche Mispel (D). Nespelo (I).  
نوع من المشلة وهي شجيرة زراعية تعطل من ٢٥٠ الى ٤٠٠ سم . ساقها مرسة . اوراقها اطليجية مستطيلة ، فصلها يارز العروق ، خلي البشرة ، اصل اللون . ازهارها كبيرة القد تعطل نحو ٤ سم . ثمارها كستنية اللون شديدة الحسوة الحامضة تؤكل بعد تمام كبرها .

**٢٦٨٤٩ - مِشْشِشَة يابانية**  
Néflier du Japon (F).  
هي الاكيدنيا ، اطليه .

**٢٦٨٥٠ - مَشْشَن**  
المن هي المندوش او الخوش او التزيق التي يسبها الترد في الثار والاوراق || الثار المششونة هي الثار التي عليها الترد .

**٢٦٨٥١ - مَشْشَن**  
مشن البقرة والناقة ؛ سلب ما في ضررها .

**٢٦٨٥٢ - مَشْشَق \*** °  
Local de pente (F).  
هو المتدوع المد لتفتيق مشاكلك التبع او عيوبه ويثا يمين وقت التصفيط والرمز .



مشلة مبولة



مشق



مشوط

Plantain majeur (F). **٢٦٨٧٥ - مصاعبة**  
هي لسان الحمل الكبير . ج . مصاص .

Plantain moyen (F). **٢٦٨٧٦ - مصاعبة صغيرة**  
هي لسان الحمل المتوسط . الحلبه .

Pleospora (S). **٢٦٨٧٧ - مصاع**  
جنس تطور مجهرية من السمنيات وفصيلة السمنيات . تتميز بأصنافها البسيطة التي تبتدئ غائرة في نسج النبات المتحارب ثم تظهر منتصبة مطاطة . ينفذها ينفذ الشكل ملون تفصله الزوايا المسترسمة المشطية || أنواعه عديدة أهمها ما يلي .

**٢٦٨٧٨ - مصاع البرنقالي**  
Pleospora hesperiderum, Macrosporium hesperiderum, Sporodesmium piriforme (S). Noir de l'orange, Nebbia (F).

فطر مجهرى يصيب ثمار البرتقال فيطيلها || مظهره الخارجى يقع خلية قديم بأمتة اللون ثم يميل إلى السرة والسواد تركب الثمار فتحمض وتشوهها وتصلبها كالفن . وهو على نصل الأوراق نكت سمر كالمش || يكافح باستعمال أحد الفواطير الفعالة .

**٢٦٨٧٩ - مصاع البقول**  
Pleospora herbarum, Stemphylium botryosum, Macrosporium commune, M. parasiticum, M. allierum (S).

فطر مجهرى يؤذي البند من البقول ، نحو : د . نوحاً منها بعض النباتات القرنية والصلبية والسيبانية ، كما يصيب البندور وورق الشاي وثمار الحفصيات الخزونة || مظهره الخارجى نكت سمر كثيفة تملأ نصل الأوراق فتتفجها وتؤشم الثمار الخشونة تقبب الحفن الأسود الذي يقضي عليها || يكافح باستعمال الفواطير العادية .

**٢٦٨٨٠ - مصاع التفاح**  
Pleospora mali, Hendersonii mali (S).

فطر مجهرى يصيب أوراق التفاح ليزيد || مظهره الخارجى يقع سمر مهدبة الاطراف البنفسجية تركب نصل الأوراق التفاح فتصلبه وتحمه عن القيام بعمله الجوى على الوجه الاكل || يكافح ان طوى ، نحو : د . خوخاً من ثقاتم شره ، باستعمال أحد الفواطير وأصعبها حائل بوردر .

**٢٦٨٨١ - مصاع الجوتون**  
Pleospora hyacinthi, Cladosporium fasciculare (S).

فطر مجهرى يصيب الجوتون على اختلاف أنواعه فيطيلها وقد يصيب جفافه || مظهره الخارجى يقع مستديرة لونها إلى الجوزة يطولها وراش من الخليل الأصفر تركب أسفاط البصل الخارجية || أضراره فاعدة إذا لامته العوامل الجوية ورطوبة التربة لانه يسبب انحلال الخلايا ومغنيا . يكافح بالتحارب البصل عند أدراكه وبترديه فلتس ندة من الزئبق ، خارج المكان المروي ، قبل بدء نموه .

**٢٦٨٨٢ - مصاع الخشخاش**  
Pleospora papaveraceae, Helminthosporium papaveris, Dendryphium penicillatum (S). Helminthosporioses de l'œillette (F).

فطر مجهرى يصيب الخشخاش ليزيد وقد يصيب يباه . مظهره الخارجى يكون على الشتل الحديثة العهد يقع سمر تركب شتخ الأسود فتقلبها وتقتفي على النبات . ويكون على الشتل البالغة يقع حطية تركب نصل الأوراق تقبب

Brunia (S). Brunnie (F). **٢٦٨٦٤ - شيك**

الواحدة مشبكة ، جنس نباتات جنبية يرية وتزيينية من فصيلة الشيكيات . أنواعه المعروفة نحو عشرة . أما ضروبه التزيينية فعديدة . سوطها منتصبة معتدلة التغليف . أوراقها متعاقبة ، صديرة النصال . أزهارها خاسية التركيب ، عديدة الألوان ، يكثر فيها الأزرق والأصفر والوردي .

Bruniaceae (S). **٢٦٨٦٥ - شيكيات**  
Bruniaceae (F). Bruniaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلتلين عديدة الفعالات . أجسامها وأوراقها المعروفة متوسطة العدد ، منتبها بعض اصقاع افريقية الجنوبية || جميعها جنبات ممرمة . سوطها فراء . أوراقها متعاقبة شكلية . نصالها خلية البشرة . أزهارها خاسية التركيب . يزورها صديرة تكثر فيها الاستدارة || أشهر أجناسها الشيك .

Placancrales (F). **٢٦٨٦٦ - شيكيات**  
Placentalia (E).

شعبة من صف الفرصيات . فصائلها وأجناسها كثيرة العدد تجتمع إلى ١٢ رتبة : البدر والخرقيات وفرادات الاصابع ويزوجيات الاصابع والخرطويات والقوقم والخرقيات والخرطويات الاقدام واللوامس ومجنحات الايدي والليموريات والرتيبات .

Placenta, Arrière-faix (F). **٢٦٨٦٧ - شيمعة**  
Placenta (E).

الجيب الغشائي الذي يتكون في الجنين داخل الرحم ويخرج معه عند الوضع .

Choroide (F). Choroid (E). **٢٦٨٦٨ - شيمعة**  
غشاء العين القائم بين الصلبة والشبكية .

Exsuction, Exsuction (F). **٢٦٨٦٩ - مص**  
Sucking up or out (E).

**٢٦٨٧٠ - مصاع**  
نبت له قشور كالبصل بعضها فوق بعض كلما قشرت أصبحت ظهرت أخرى (اللسان) .

Confiscation **٢٦٨٧١ - مصادرة**  
مقوبة موضوعها استعمال مال المحكوم وأستلاء الحكومة عليه .

**٢٦٨٧٢ - مصارف كبدية**  
Frais frustatoires (F). Frustratory expanse (E).  
هي التي تنفق دون وجه في الدوى فتبقى على حائق متفحفا .

Glossopha (S). **٢٦٨٧٣ - مصاص**  
Glossopha (F). Mange-langue (F).

جنس سمنافش من فصيلة اللورقيات . أنواعه عديدة ، موطنها البلاد الحارة . ألوانها إلى السرة الفاحة . أجسامها صديرة القد . فراطها منتصبة ، ضيقة ، ذلقة . ألبنتها فائقة الطول منتصبة سلسلة عجلات خيطية منتفخة إلى الوراء || تميرن منفردة . ذكرورها تقرب ألتائها عند الكرم . تآلت تجاوير الإجاز وأواب الصخور . سمرها يدوم طراو الليل . ثوبها الخشرات والخلالين .

Absorptivité (F). **٢٦٨٧٤ - مصاصية**  
Absorptiveness, Absorptivity (E).

هي قوة الامتصاص .



مصاص



مصاع البرنقال



مصاع البقول



مصاع التفاح



مصاع الجوتون

٢٦٨٩٣ - مَصَّتْ  
المصت هو ادخال اليد في رحم الانثى لمصته واستخراج ما فيه .

٢٦٨٩٤ - مَصْح ، مَصُوح ، Virescence (F).  
هو التبدل الطارئ في لون الزهر .

٢٦٨٩٥ - مَصْحَفَات القَشَار Placophores (F).  
رقة من الرغويات اصدانها مصفحة القشار . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة معظمها من المتحجرات والمناصر منها منتشر في جميع بحار العالم .

٢٦٨٩٦ - مَصْحَكَر Saxatile  
نمت تحريش يطلق على كل نبات يعيش وينمو على الصخور وفي الهامجر .

٢٦٨٩٧ - مَصْد  
المصد والمصدر الحفبة العالية ، وقيل أصل الجبال .

٢٦٨٩٨ - مَصْدَر ، مَصْدَر ، مَصْدَر Origine, Source (F). Origin, Spring (E).

٢٦٨٩٩ - مَصْرَاب Lacto-fermentateur (F).  
جهاز يستعمل في قياس حموضة اللبن الرائب .

٢٦٩٠٠ - مَصْرَاد Frileux (F).  
لا يصبر على البرد .

٢٦٩٠١ - مَصْرَاع Valve (F). Valve, Clack (E).  
أحد أجزاء الصمام الثري في البئر المفتحة .

٢٦٩٠٢ - مَصْرَاعِي Valvulaire (F). Valvular (E).  
٢٦٩٠٣ - مَصْرَد

Claie à gravier, C. à sable, Tamis (F). Wattle, Screen, Sieve, Sifter, Strainer (E).  
غربال يفصل الرمل من الحصى والحجارة .

٢٦٩٠٤ - مَصْرَف Drain, Bardeau (F).  
Drain, Drain-pipe, Shingle (E).  
سيل ماء تنصرف فيه المياه التي ترشح من الأرض الزراعية عقب رجاء وقد شاع استعمال انابيب الأجر لهذه الغاية . والمصارف تنتهي بالبئر . والمصارف تنتهي بالبحر .

٢٦٩٠٥ - مَصْرَف ، مَصْرَف Banque (F). Bank (E).  
هو كل عمل أنثى المتاجرة بالثريد او الأوراق ذات البدل المال .

٢٦٩٠٦ - مَصْرَف الإِمْدَار Banque d'émission (F). Issuing house (E).  
هو المصرف الممنوح له امتياز اصدار أوراق النقد من الحكومة .

٢٦٩٠٧ - مَصْرَف زُرْكَمِي ، مَصْرَف زُرْكَمِي Banque agricole (F). Agricultural bank (E).  
مصرف يختص بامداد ارباب المزارع الزراعية بالمال على سبيل القروض الطويلة الاجل .

٢٦٩٠٨ - مَصْرَف عَقَارِي ، مَصْرَف عَقَارِي Crédit foncier (F). Loan society (E).  
مصرف يقرض المال لاجال طويلة لقاء رهن الثمار .

جفاف التسج || يكافح بتطهير البذار بمادة الفوربول المركز ٣٥ .. / او قفيرا بأحدى المركبات الزئبقية .

٢٦٨٨٣ - مَصَاعِ الشُّونْدَر \*  
Pleospora betae, Phoma betae, Ph. tabifica, Ph. sphaerosperma, Phyllosticta tabifica (S).  
فطر مجهرى يصيب أوراق الشوندر فيؤذيها ويسبب ذبولها . مظهره الخارجى يقع صفيرة مستديرة حطية اللون ، تركب الأوراق فتسبب جفاف التسج ببقية الدبول ثم العطب . يكافح عند ظهوره باستعمال أحد الفوطاير المعتدلة المنصر للقتال .

٢٦٨٨٤ - مَصَاعِ العُكْن \*  
Pleospora putrefaciens, Clasterosporium putrefaciens, Sporodesmium putrefaciens (S).  
فطر مجهرى يركب أوراق الشوندر في أواخر مهدها أي قبيل الانقلاص منه وجيرة || مظهره الخارجى يقع مهدبة لا قياسية يملؤها خلل أصفر تركب القسم الأكبر من النصل لا يؤذيها منه إلا القليل والارث || أغزاره زبدية إلا إذا استحسح في كامل الزراعة وهذا لا يكون إلا في مواقع خاصة || يكافح باستعمال أحد الفوطاير المادية المتوسطة للمادة القتالة .

٢٦٨٨٥ - مَصَاعِ المُنْدِيك \*  
Pleospora albicans, Phoma albicans (S).  
فطر مجهرى يركب جهازز الهندباء فيؤذيها ويسبب انقلاص اغزارها وسقدها || مظهره الخارجى يقع مهدبة لا قياسية الشكل والحجم ، لونها الى البنية ، اطرافها المهدب ينحرف من الخنطلى الى الاسود وعند وصولها الى هذا الطور يملؤها في وسطها شحمة حلقة بيضاء . تركب نصل الأوراق وسويقات الاغزوار || يكافح عند ظهوره على الأوراق باستعمال أحد الفوطاير المادية المعتدلة المنصر للقتال .

٢٦٨٨٦ - مَصَاعِ \*  
Botryomyces (F). Botryomyces (E).  
المصاعة مرض جلدي يمتري الحيوان . مظهره الخارجى دمل صفيرة ممتدة شبيهة بالمنع تسبها بعض الميكروبات اعصا الكروية .

٢٦٨٨٧ - مِصَالِكَة Sérologie (F). Serologie (E).  
هي درس الامصال وعواصها المختلفة وانفعالاتها ونتائجها .

٢٦٨٨٨ - مِصَالِكَة ، مِصَالِكَة Peat salt (F). Whey (E).  
الماء الذي يخرج من الحليب المخبث عند اصطناع الجبن .

٢٦٨٨٩ - مِصَالِكَة ، مِصَالِكَة Transaction  
هو الاتفاق الذي يقدمه الملتزمون ليقضوا به نكاحاً قائماً او متوقفاً بزل كل سهم من شيء من مطالبه .

٢٦٨٩٠ - مِصَالِكَة Sérologique (F). Serologie (E).  
منوط بالمصل او مختص به .

٢٦٨٩١ - مِصَان Canne à sucre (F).  
هو قصب السكر ، اطليه .

٢٦٨٩٢ - مِصْبَة ، مِصْبَة Embouchure (F).  
Embouchure, Mouth (E).  
ملقى مياه الأنهر بالبحر .



مَصَاعِ الشُّونْدَر

Laminoir (F). ٢٦٩٢٦ - **مِصْلَاح**Flattening-mill, Rolling-mill (E).  
الآلة الخاصة بتصنيع اللادن .Dolichocephale (F). ٢٦٩٢٧ - **مُصَنَّعُ الرَّأْس**Dolichocephalic (E).  
نمت تصنعي مِيز يوصف به الرأس المستطيل عند بعض الحيوانات الأهلية كالإبقار والأخنام .Conchacé (F). ٢٦٩٢٨ - **مُصَقَّد**

نمت ثمريني يطلق على الإصداف الثنائية المصراع .

Courbine (F). ٢٦٩٢٩ - **مِصْكَار ، مِصْكَار**

سكة بحرية تدمي لوت المتوسط ، أطلها .

Sérum (F). Serum (E). ٢٦٩٣٠ - **مَصَل**Petit lait (F). ٢٦٩٣١ - **مَصَل**

هو المصالة ، أطلها .

Tuberculine (F). Tuberculin (E). ٢٦٩٣٢ - **مَصَلُ السِّل ، لَنْفَاكُوسُخ**

مصل كالث تخمن به الإبقار قيقن من أنها مصابة أو غير مصابة بالسِّل البقري .

Bec-croisé (F). ٢٦٩٣٣ - **مُصَلَّب**

هو الصيق ، طائر من الشرشوريات ، أطله .

Amendements agricoles (F). Improvement, Manuring of ground (E). ٢٦٩٣٤ - **مُصْلِحَات زُرَاعِيَّة**

هي التي تصلح التربة تزيده خصبا . والمصلحات عديدة منها التسميد المضي والخضري والمعدني والإسماء والصرت والتربيل والتدليل الخ .

Intérêt (F). Interest (E). ٢٦٩٣٥ - **مَصْلَحَة**

هو كل ما يصلح به المرء من شأنه بمنفعة تأتيه إذا هو زاول سقا أو أقام دعوى .

Service des haras, S. de remonte (E). ٢٦٩٣٦ - **مَصْلَحَة الخَلاَئِف ، مَصْلَحَة خَيْلِ النَّزْو**

دائرة حكومية تابعة للبابية البيطرية في وزارة الزراعة تمنح بشؤون خيل النزو .

Plén (F). Full (E). ٢٦٩٣٧ - **مُصَنَّب ، مُثَلَّث**

نمت وصفي يطلق على ما لا جوف له كالقرن مثلا .

Cervicornes (F). ٢٦٩٣٨ - **مُصَنَّبَاتُ الْقُرُون**

نمته من الغنيرات ، قرنوها مصفة غير مجوفة كالأيل .

Gummière (F). ٢٦٩٣٩ - **مُصَنَّع**

ينتج الصمغ أو يحوي الصمغ ويصطنعه .

Réservoir (F). Reservoir (E). ٢٦٩٤٠ - **مَصْنَع**

حوض تجمع فيه المياه للاستعمال الصناعي ويعرف أيضاً باسم حاووز .

Cynomoir (F). ٢٦٩٠٩ - **مُصْرُور**

هو الطروث ، أطله .

Cynomorées (F). ٢٦٩١٠ - **مُصْرُورَات**

سبط من الطروثيات يشل بعض الاجناس والأنواع .

Dépense (F). Expenditure (E). ٢٦٩١١ - **مُصْرُوف**

هو المال المنفق .

Faux frais, Menus frais (F). Incidental expenses, Petty expenses (E). ٢٦٩١٢ - **مُصْرُوفَات ثَرَوِيَّة**Serre (F). ٢٦٩١٣ - **مِصْرِيَّة ، وَام**Greenhouse (E).  
بناء من زجاج ، يلحف أو يستر عنه الحاجة ، تستبث فيه لياتات البلاد الحارة التي لا تتحمل البرد .Serre froide (F). ٢٦٩١٤ - **مِصْرِي بَارِدَة**Conservatory (E).  
هي التي يكمن فيها بجمرة الشمس داخل الزجاج .Serre chaude (F). ٢٦٩١٥ - **مِصْرِي حَارَة**Hot-house (E).  
هي التي تستمد حرارتها بطريقة ثابتة حيث يراوح مطلقا من ٢٤ إلى ٢٨ سغ في زمن البرد والشتاء .Trieur (F). ٢٦٩١٦ - **مُطْفِقِيَّة ، قَرَاة**Sorting-machine (E).  
آلة تفرق الفلك عن الحب والحب عن بقية بعض بالنسبة إلى حجمه .Lentisque (F). ٢٦٩١٧ - **مُطْفِقَاك**

هو البطم الشرقي ، أطله .

Mûre de ronce (F). ٢٦٩١٨ - **مُصَكَّة ، مُصَكَّة**Blackberry (E).  
ثمرة المليق وأتباعه من عرس وغيره وهي حمراء اللون توكّل .Anode ٢٦٩١٩ - **مُصْعَد ، أُنُودَة**

هو لاسب التيار الكهربائي في المفلط .

Ascenseur (F). Lift, Elevator (E). ٢٦٩٢٠ - **مُصْعَد**

جهاز يستعمل في رفع الأشخاص والأثقال .

Sublimé (F). Sublimat (E). ٢٦٩٢١ - **مُصْعَد**Paratonnerre (F). ٢٦٩٢٢ - **مِصْكَة**Lightning-conductor (E).  
رأس دافع الصاعقة .Liquidateur (F). Liquidator (E). ٢٦٩٢٣ - **مُصَفِّف**

من نشاط به اعمال التصفية .

Raffinerie (F). Refinery (E). ٢٦٩٢٤ - **مِصْفَاة**

معمل مجهز بالآلة للتصفية .

Filtre (F). Filter (E). ٢٦٩٢٥ - **مِصْفَاة ، وَاطِح**

أداة تصفى بها السوائل ، وقد تكون من غزف أو رمل أو نعم الخ ...



مصري

## ٢٦٩٥٢ - مَصَامُصْ أَمْرِيكِي

*Evonymus americana* (S). *Fusain d'Amérique* (F).  
نوع من المصامص ، جنته صغيرة القند تملو من ١٠٠  
الى ٢٠٠ سم. فروعها منتصبه ماله. أوراقها عابله  
تطويل من ٤ الى ٨ سم. وتعرض من ٢ الى ٣ ، نصلها  
خلى الصفحة السفلى قادم التنسين ، أزهارها وردية اللون  
رباعية البتلات ، حقايقها مستديرة جوزية اللون رباعية  
الفلق || أزهارها يستمر طوال شهر حزيران .

## ٢٦٩٥٣ - مَصَامُصْ عَرَبِيصْ الْوَرْق

*Evonymus latifolia* (S). *Fusain à larges feuilles* (F).  
نوع من المصامص المبلول ، جنته تملو من ٢ الى ٥  
امتار . فروعها ماله. أوراقها عابله تطويل من ٨ الى  
١٤ سم. وتعرض من ٤ الى ٦. نصلها جامه الصفحة ،  
سمن الحافة . أزهارها خماسية البتلات احمر . حقايقها  
قمرية خماسية الفلق || أزهارها يستمر من ايار الى  
حزيران .

## ٢٦٩٥٤ - مَصَامُصْ قَرْقَم

*Evonymus nana* (S).  
*Fusain nain* (F).  
نوع من المصامص ، جنته صغيرة القند مشونة تملو من  
٥٠ الى ٨٠ سم. فروعها مجذارية مستقيمة . أوراقها  
عابله متباددة سنانية ، نصلها لامع الصفحة يطول نحو ٥ سم.  
ويعرض نحو ١ . أزهارها رباعية البتلات والاسدية ، ثلاثية  
التجميع لوها الى الحفرة احمراد المواج . حقايقها وردية  
اللون رباعية الفلق || أزهارها يستمر من ايار الى حزيران.

## ٢٦٩٥٥ - مَصَامُصْ مَبْدُولْ \* ، مَصَامُصْ أَرْوَبِي

*Evonymus vulgaris*, *E. europaeus* (S). *Fusain commun*,  
*F. d'Europe*, *Bonnet de prêtre*, *Bois à lardoir* (F).  
نوع من المصامص المبلول ، جنته تملو من ٣ الى ٦ امتار.  
فروعها فروعها التصلع ماله. أوراقها عابله سنانية  
تطويل من ٧ الى ١٠ سم. وتعرض من ٣ الى ٤ ، نصلها  
مالس الصفحة الجامدة ، سمن الحافة . أزهارها الى الحصار  
الاصفر . حقايقها رباعية الفلق احمر . زودها وردية .  
أزهارها يستمر من نيسان الى ايار .

## ٢٦٩٥٦ - مَصَامُصْ مَجْدَارْ

*Evonymus radicans* (S). *Fusain radican* (F).  
نوع من المصامص ، جنته مشونة صغيرة القند. ساقها مجذارية.  
فروعها دقيقة بحرية اللون . أوراقها أبيضه تطويل نحو ٥ سم.  
وتعرض نحو ٢ ، نصلها جامه الصفحة المسنجة بالايباض  
المسندة . أزهارها رباعية البتلات والاسدية ، زينة اللون ،  
حقايقها وردية رباعية الفلق || أزهارها يستمر من  
حزيران الى آب .

## ٢٦٩٥٧ - مَصَامُصْ يَابَانِي \*

*Evonymus japonica* (S). *Fusain du Japon* (F).  
نوع من المصامص ، جنته منتصبه تملو من ٣ الى ٨ امتار.  
فروعها مفصلة خضر اللحاء . أوراقها أبيضه تطويل من ٧  
الى ١٠ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ ، نصلها جامه الصفحة  
المسندة والمزركشة بالايباض والاصفر . أزهارها رباعية  
البتلات والاسدية لوها الى الحصار الفسقي . حقايقها حر  
رباعية الفلق || أزهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٦٩٥٨ - مَصَامُصَة \* *Intégration* (F). *Integration* (E).

المصامصه الحلق شيء يأخر لإتمامه أو لإتمام كاله .

٢٦٩٤١ - مَصْنُوعَةٌ \* *Séplophores* (F).

المصنوعة والمصنوعات فئة من الرغويات ثنائيات الحياتيم ،  
عشاريات الارجل ، مجهزة بصنخ كالحبشار وأمثاله .

٢٦٩٤٢ - مِصْهَر *Haut-fourneau* (F).  
*Blast-furnace* (E).

موقد خاص عمودي الارتكاز يستعمل لتلويب الحديد  
تحت تأثير الحرارة المرتفعة .

٢٦٩٤٣ - مِصْوَاتْ *Sonometre* (E). *Sonometre* (F).

جهاز يستعمل في قياس الاصوات ومقابلتها وتصنيفها .

٢٦٩٤٤ - مِصْوَح *Virescence* (F).

هو المسح ، التبدل الطارئ الذي يغير لون الزهر الطبيعي.

٢٦٩٤٥ - مِصَادُ الْحَيَوِيَّةِ ، مُرْدُ ، أَنْتِيْبِيَوِي *Antibiotique* (F). *Antibiotic* (E).

مادة ينتجها كيين سمن تمارش نحو غيره من الكائنات ||  
المضادات الحيوية المروفة حتى الآن تقسم الى فئتين :  
- فئة الفنجيات كالبنيسلين والسترپتوميوس والتتراسكلين .  
- وفئة البكتيريات كالتيوتريسين والبايسترامين .

٢٦٩٤٦ - مِصَادُ السَّحَالِ *Béchique* (F). *Bachic* (E).٢٦٩٤٧ - مِصَارْغَة \* *Polygamie* (F). *Polygamy* (E).

المصارغة تعدد الزوجات عند الرجل .

٢٦٩٤٨ - مِصَامُصْ *Eau caumâtre* (F).  
*Brackish water* (E).

المصامص : لماء لا يطلق ملحوه وضده القطيع وهو الصافي  
الزلال .

٢٦٩٤٩ - مِصَامُصْ *Evonymus* (S).  
*Fusain* (F). *Spindle tree* (E). *Spindelbaum*, *Pfaffen-*  
*hütchen* (D). *Fusano*, *Evenimo* (I).

جنس اشجار وجنات برية و زينة من فصيلة القاتيات.  
انواعه عديدة ، أصطاتها فسيحة الاربعاء تشغل الشرق  
والغرب وامريكا . أوراقها متبادلة منفعة كاملة مرطاب .  
أزهارها متكوية التجميع ابطية الارتكاز . ثمارها جرد  
مستديرة مقصصة . زودها مرة الطعم مقيته وسهلة .  
أشجارها صفراء اللون شديدة الصلابة شائعة الاستعمال  
الصناعي . نصحها يستعمل في التصوير وفي صناعة  
البابرد || احرف انواعه وأشهرها ما يتبع .

## ٢٦٩٥٠ - مِصَامُصْ أَسْوَد \*

*Evonymus atropurpurea* (S). *Fusain noir* (F).  
نوع من المصامص ، جنته تملو من ٣ الى ٧ امتار . فروعها  
ماله . أوراقها عابله تطويل نحو ١٢ سم. وتعرض نحو ٦ .  
نصلها سمن الحافة خلى الصفحة السفلى . أزهارها رباعية  
البتلات الازرقانية . حقايقها الى الجزرة السوداء المواج .  
أزهارها يستمر طوال شهر حزيران .

## ٢٦٩٥١ - مِصَامُصْ أَكْثَنْتْ

*Evonymus verrucosus* (S). *Fusain varruqueux* (F).  
نوع من المصامص ، جنته تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم.  
فروعها مشولية اللحاء . أوراقها عابله يفضية ذرية ، نصلها  
سمن الحافة يطول نحو ٦ سم. ويعرض نحو ٣ . أزهارها  
جوزية اللون رباعية البتلات . ثمارها برتقالية اللون ،  
رباعية الفلق || أزهارها يستمر من ايار الى حزيران .



مصامص أسود



مصامص مبلول



مصامص ياباني



Embryon humain (F). **مُضَيَّع** ٢٦٩٧٣  
Human embryo (E). هي الملقحة البشرية.

Embryonnaire (F). **مُضَيَّع**، **جَيْتِي** ٢٦٩٧٤  
Embryonic (E).  
نعت تعريفي يطلق هل ما هو غنص بالخصبة أو الجنين.

Polygone (F). Polygon (E). **مُضَلَّع** ٢٦٩٧٥

٢٦٩٧٦ - **مُضَلَّع دَائِرِي**، **مُضَلَّع** مستدير  
Polygone circulaire (F). Circular polygon (E).

Quadrilatère (F). **مُضَلَّع رُبَاعِي** ٢٦٩٧٧  
Quadrilateral (E). فيه مربع رباعي اضلاع.

Polygone régulier (F). **مُضَلَّع مُنْتَظِم** ٢٦٩٧٨  
Regular polygon (E).

Manège (F). **مُضَمَكَّر** ٢٦٩٧٩  
Horsemanship (E). للبدان المد لتفسير الخيل.

٢٦٩٨٠ - **مُضَمَكَّة**. صوت الحية من لسانها.

Ascendance, Piqûre (F). **مُضَوَّر** ٢٦٩٨١  
Ascendance (E).  
وصم فطري يصيب الخمر تسببه خيرة الخلل الحظايطية.

Photomètre (F). **مُضَيَّاه** ٢٦٩٨٢  
Photometer (E).  
جهاز يستعمل في قياس حدة الضوء أو قوته.

Entomophyte (F). **مُضَيَّب** ٢٦٩٨٣  
Entomophyte (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل نبات من غنيات الوبيع  
تظلل عليه الحشرات.

Hampe (F). Stem, Flower-stalk (E). **مُطَا** ٢٦٩٨٤  
الطا هو الشراخ. مشاء مطوان. ج أسطاء.

٢٦٩٨٥ - **مُطَاوَرَة**. الارض الكثيرة العلبه.

Caoutchouc (F). **مُطَاط** ٢٦٩٨٦

Phanérogame parasites (F). **مُطَالِيل** ٢٦٩٨٧  
هي النباتات الطفيلية من باديات الزهر كالجنفيل والأكشوث.

Fins (F). **مُطَالِب** ٢٦٩٨٨  
راجع اغراض.

Réclamation (F). **مُطَالَبَة** ٢٦٩٨٩  
Complaint, Request, Claim (E).  
الاثامس أو الادعاء باقرار حق أو حالة.

Revendication (F). **مُطَالَبَة** ٢٦٩٩٠  
Claiming (E).

رنع دعوى يطلب راضها الاعتراف هل بحق الملكية على  
مال معين.

Plastique (F). **مُطَاوَع**، **مُطَيَّاع** ٢٦٩٩١  
Plastic (E). هو ما كان قابلاً للشكل والتشكل.

Pompe (F). Pump (E). **مُضَخَّة** ٢٦٩٩٢  
آلة تستعمل في رفع أو دفع المياه والسوائل وقد تكون يدوية  
أو محركية. أما اشكالها فثلاثة وهي:

Pompe foulante (F). Force-pump (E). **مضخة دافعة**

Pompe aspirante (F). Suction-pump (E). **مضخة رافعة**

Pompe aspirante foulante (F). Suction-force pump (E). **مضخة رافعة ودافعة**

٢٦٩٩٠ - **مُضَر**  
Ascence (F).  
ابتداء الحوضفة في كل مادة.

٢٦٩٩١ - **مُضِر**، **مُضَرِّر**، **مُضَرِّر**  
Piqué (F). Sour (E).  
ما كانت قسدة الحوضفة من ضرر وجعة وما اشبه.

٢٦٩٩٢ - **مُضَرِّح**  
Harpagus (S).  
Diodon, Harpagus (F).

جلس طير من حمارة البراة نصليصة الصقريات. انواعه  
قليلة جميعها ريشة القوام صغيرة القد. اثوابها موشة تنلب  
فيها الجذوة الخطيفة اللواج. بطونها غير حمرة. ازوارها  
بيضاء. ارساغها صبر. || موطها الذابات الكثيفة. قد يش  
منفردة، قوتها القوام والمناوير والحشرات. تدش في  
الاجنار الرقيقة، اناتها تحضن من ٣ الى ٥ زفئات مدة  
٤ اسابيع.

٢٦٩٩٣ - **مُضَرِّم**  
Pyromètre (F). Pyrometer (E).  
جهاز يستعمل في قياس الحرارة العالية.

٢٦٩٩٤ - **مُضَرَّب** **يه**  
Multiplicande (F).  
Multiplicand (E).

٢٦٩٩٥ - **مُضَرَّب** **ليه**  
Multiplicateur (F).  
Multiplier, Multiplying (E).

٢٦٩٩٦ - **مُضَرَّب** **كدا**  
Factorielle (F).  
Factorial (E).

٢٦٩٩٧ - **مُضَرَّوَة**  
Himanthalia (S).  
Himanthalia (F). Himanthalia (E).

جنس نباتات بحرية من الخفيات السر. انواعها المعروفة  
قليلة التمدد اصطناعيا. جميع بحار البلاد الحارة والمتدلة  
الحرارة || كلابها شديدة القصر. قواعدها قديمة الشكل  
ينشب في قعرها غسمة من السيور الفرقة يراوح طرطا من  
متر الى ثلاثة امتار.

٢٦٩٩٨ - **مُضَعَّاف**  
Diplostémons (F).  
نعت تعريفي يطلق على كل صليل او جيش يكون عدد  
اسديته فيصف عدد التقاتلات او الفصل.

٢٦٩٩٩ - **مُضَعَّن**  
Narcisse tazette (F).  
هو الزرجس الشرقي، اطلبه.

٢٦٩٩٠ - **مُضَعَّج**  
Mastication

٢٦٩٩١ - **مُضَعَّج** **البيج**  
Chiquer (F).  
To chew tobacco (E).

٢٦٩٩٢ - **مُضَغَّاط**  
Compresseur (F).  
Compressor (E).

اسم يطلق على مختلف الاجهزة المضاعطة اعصها الملامسات  
ومضغيط الغاز.



مضح



مضرم

Tourbière (F). **مِطْرَبِيَّة** ٢٧٠٠٣  
Peat-bog, Peat-moss (E).  
هي التُّرابُ و منجم التُّراب الغضوي .

Gaufrier (F). **مِطْرَمَكَة** ٢٧٠٠٤  
Waffle-iron (E).  
جهاز معدني كابس يصطنع رقائق الشمع المعدة لتجهيز  
التفطير أي خلية النحل .

Pluvial (F). **مِطْرِيّ** ، **شَتَوِيّ** ٢٧٠٠٥  
Pluvial, Rainy (E).

Porte-greffe, Sujet (F). Stock (E). **مِطْعَم** ٢٧٠٠٦  
الإصل الذي يركب فيه الطعم أو الإصل الذي يفرس  
في الأرض .

Pantogreffe (F). **مِطْمَعَة** ٢٧٠٠٧  
أداة للتطعيم تطعم بضعة قصبان في آن واحد .

Billot à patée (F). Clog (E). **مِطْمَعِيَّة** ٢٧٠٠٨

Greffon (F). Graft (E). **مِطْمَعُوم** ٢٧٠٠٩  
هو الطعم ، أطلبه .

Parasite (F). **مِطْفَال** ٢٧٠١٠  
Parasite, Hanger-on (E).  
نمت تمرّني يطلّق على كل نبات يعيش طفلياً على غيره  
من النباتات .

Arglière (F). Clay-pit (E). **مِطْفَلَة** ٢٧٠١١  
المقع الذي يستخرج منه الطفل أي الصلصال .

Diplodia (S). **مِطْق** ٢٧٠١٢  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنفيات ، يكتسبها  
فردية كروية تنشأ محفوفة ثم ترقى وتثرف . جرمها  
سحب الثلاث ، حنطي اللون يملو من صغير . بويضاته  
حنطية لاهليجية ، طولها نحو ١٥ ميكرون . غلبتها ثنائية ،  
غنيوة الثورية الفاصلة || أنماؤه قليلة ، جميعها مؤذية ،  
أمرها .

Diplodia griffoni (S). **مِطْق الإجاص** ٢٧٠١٣  
فطر مجهري يركب اغصان وانفساد الاجاص والتفاح  
ينظفها ويحميها || مظهره الخارجي يشور كثيفة التجميع  
تركب الحماة فتفصدع البشرة بعد أن تقرر الحادمة وتشويش  
يكاظم باقتطاع الاغصان الموصوبة وينظفها الجروح مع  
العلم أن هذا الفطر يتعدى على الانجوار الضعيفة دون سواها .

Diplodia zeae (S). Dry-rot du maïs, Pourriture sèche  
des épis (F). **مِطْق الدَّرَّة الصَّفْرَاء** ٢٧٠١٤

فطر مجهري يصيب الدرة الصفراء في سويها ويظفرها  
ويصفها . مظهره الخارجي يقع لا يقاسية الحجم والشكل  
جراه اللون سريمة الاتساع تركب المصف فتؤذي . وهو  
السيال والامطار مشيح أثير اللون ثم يتعرف الى السرة  
فيبدو كالعفن الاسود الجاف || يكاظم ينظف البذار  
بروسطة املاح الزئبق . ومن المستحسن اجتناب الزراعة في  
المواقع الرطبة والتخلي عن زراعة الدرة في الارابة المويومة  
نحو ثلاث سنوات .

Dama (F). Dam (E). **مِطْبَخَة** ٢٦٩٩٢  
أداة من خشب أو حديد تضرب بها الأرض لترص .

Plecoptera (S). **مِطْبَخَة الأجنحة** ٢٦٩٩٣  
Plécoptères (F). Plecoptera (E).  
هي اللوليات ، رتبة من الحشرات ، أطلها .

**مِطْبَخَة** ٢٦٩٩٤  
المطبخة هي مؤخر ظلت الشاة وقيل هنة كالفلكة في رجلها  
تسبح بها الأرض .

Minotarie (F). **مِطْبَخَنَة** ٢٦٩٩٥  
Flour-mill, Flour-store (E).  
البناء الملمد لمصنع الطحين وهو يحوي جميع أجهزة الطحن  
وستودعاته الثقيل .

Pluie (F). Rain (E). **مِطْر** ٢٦٩٩٦  
المطر هو الماء المنهمر من السحاب ، ج أمطار . والمطر  
هي الدفنة من المطر .

Rafle (F). **مِطْر** ٢٦٩٩٧  
Head of maize stripped of all its fruit (E).  
سنبول الذرة والدغين وإشباعها . ج أمطار .

**مِطْرَاق** ٢٦٩٩٨  
الائش المطراق هي القرينة العهد بطرق التحمل أياها .  
تستعمل في التمية والمزعة والبقرة .

**مِطْرَاق البَحْر** \* ، **نَصَار** ٢٦٩٩٩  
Sphyrna (S). Requin-marteau, Squal-marteau, Mar-  
teau (F). Hammer-head (E).

من اسمائها : أبو مطرقة وسكة الاسكندر . جنس اسماك  
بحرية ييوس ولون من فضيلة القرشيات ورتبة الاشلاق .  
انواعها المعروفة ستة جميعها من الاسماك المفترسة الشرسة  
الخفية . قوتها الاسماك والقشريات وكل ما تستطيع اليه  
سبيلا في البحر || اصطناعها مياه مجاذع واغوار البلاد  
الحارة || اجسامها وشعة الشكل تغطى من ٣ الى ٥ أمتار .  
انواعها الى الكهنة تنقسم الى زعمو وتغير مع اختلاف الانواع .  
رووسها كطرفة النحات ، اسطوانية الشكل ، ممرقة الارتكاز  
يفوق طولها ربع طول الجسم . صيبتها كبيرة ، مستديرة ،  
بارزة ، تحتل اطراف المطارق المقنطوية . اصطناعها لائحة  
لكنها كبيرة الشفق وسلحة بثلاثة صفوف من الاسنان  
الذرية الحادة القوية للتحركة . زناقتها سبع تمسكتها من  
سرعة الانقلاب والحركة . زناقتها الثرجية فارقة عالية  
الشكل || اهرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

**مِطْرَاق البَحْر الأطلسي** ٢٦٩٩٩

Sphyrna zygaena (S).  
نوع من مطراق البحر ، تكثر في المحيط الاطلسي ، اصطناعها  
مجاذع البلاد الحارة . طولها يراوح من ٣ الى ٥ أمتار .

**مِطْرَاق البَحْر المَحْوَط** ٢٦٩٩٩

Sphyrna tudes (S). Maillet (F).  
نوع من مطراق البحر . اصطناعها مجاذع البحر الابيض  
المحيط . طولها يراوح من مترين الى أربعة أمتار .

**مِطْرَاق البَحْر الهندِي** ٢٦٩٩٩  
Sphyrna blochi (S).  
نوع من مطراق البحر . اصطناعها تحت من مجاذع الهند  
الى الخليج الفارسي فالبحر الاحمر ففضيق زنجبار . طولها  
يراوح من ٣ الى ٤ أمتار .



مطراق البحر



مطرقة



مقل الاجاص

## ٢٧٠٢٦ - مَقْطَرَات

Antiseptiques, Désinfectants (F). Antiseptic, Disinfecting (E).

مواد فعالة بسيطة أو مركبة تقضي على الجراثيم المرضية مثلها حامض الفينيك والليزول . الخ.

## ٢٧٠٢٧ - مَقْطَوَار

Polyphasé (F).

Polyphase, Multiphase (E).

كثير الأطوار .

## ٢٧٠٢٨ - مَقْطُورَة

Montacuta (S).

Montacuta (F). Montacuta (E).

جنس حيوانات بحرية من الرضويات فصليتها الخياشيم وفصيلة اليرسويات . أنواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من صلب بحار المناطق الشالية . أجسامها صغيرة القذ . أصدانها بيضيه اللون ، قليلة الإصدان ، ناشرة السن المصرية . ألوانها سوية تفرح من الأبيض التبي إلى المصفر .

## ٢٧٠٢٩ - مَقْطُوق

Calandre (F).

طائر من فصيلة التبريات يدعى علم ، أظله .

## ٢٧٠٣٠ - مَقْطُوكَة

Couleur à collier (F).

هي الحفاش المطروق ، أظله .

## ٢٧٠٣١ - مَقْطُوكَة ، أَم حَمَرْد

Asplis (S).

Aspe (F).

جنس اسماك بحرية وبهرية من الشبويات . أنواعها المعروفة قليلة يكثر وجودها في البحر الاسود وفي بحيرات وآهر الشرق الاوسط وأروية الجنوبية . أجسامها مستطيلة الشكل طويلا يراوح من ٢٥ الى ٥٥ سم . زعانفها الظهرية صغيرة القد عادية الحشف . اسنانها الامامية السفلية محبة كغالب البلير . لحومها مأكولة متوسطة الصنف .

## ٢٧٠٣٢ - مَقْطُول

Longe (F). Lunge, Tether (E).

المقود أو الحبل الذي يربط من مرسل الدابة لجروا .

## ٢٧٠٣٣ - مَقْطَى ، طَعَامُ الْأَرْثَب

Phagnalon rupestre (S). Phagnale (F).

نبات عشبي برّي طيب من فصيلة المركبات ، مهد البلاد المتصلة بالحارة . يوجد في المواق الربط من الربوط اللبنانية . أوراقه متعاقبة ، لسة ، صغيرة القد . أزهاره خضبة التجميع ، هامة الارتكاز ، مستطيلة المالحق الدقيقة . تنويره ربيعي . منافته الطبية محبة .

## ٢٧٠٣٤ - مَقْطِيع

Tropophyte (F).

Tropophyte (E).

نعت ثمريلي يطلق على كل نبات يتكيف مع حوامل التربة حيث يعيش فلا يتجنى صيف ولا تقيده رطوبة .

## ٢٧٠٣٥ - مَقْطِيع

Plastique (F). Plastic (E).

هو الماطوع ، ما كان قابلاً للشكل والتشكل .

## ٢٧٠٣٦ - مَقْطِيف

Spectromètre, Spectroscope (F). Spectrometer, Spectroscope (E).

منظار طيفي ، بجلة الاشباح .

## ٢٧٠٣٧ - مَقْطِيرَة

Oisellerie (F).

Bird-catching, Bird-shop (E).

هي صيد الطيور وتربيتها وفي أيضاً محل تربية الطيور .

## ٢٧٠١٥ - مَقْطَقُ الصَّنَوِير

نظر مجهري تركيب اعداب الصنوبر فيميلها ويقود البياض الي قنقدت اعدابها الي الذبول واليباس .

## ٢٧٠١٦ - مَقْطَقُ نَاقَال

Diptodia natalensis (S).

نظر مجهري يصيب النخل في كربه واصل سفع . منظره الخارجي يقع فصية مستطيلة ضفراء اللون ثم سراد تركيب بشرة النخ فتقوياً وتعتري البسر تنصبه || يكافح عند ظهوره يستأيل سائل يورده الحبل نحو ١ ٪ يضاف اليه حليل النسبة اي ما يساود نحو ١ ٪ من الزيت الشتوية .

## ٢٧٠١٧ - مَقْطَب

Problème (F). Problem (E).

٢٧٠١٨ - مَقْطَب

Débit (F). Sale, Retail (E).

ما حل المرء من حساب أو ما هو مطلوب منه .

## ٢٧٠١٩ - مَقْطَر ، زَيْق

Fil du maçon (F).

Mason-line (E).

خيط البناء .

## ٢٧٠٢٠ - مَقْطَرَة

هي اللغة ، أظله .

## ٢٧٠٢١ - مَقْطُورَة

Silo (F). Silo, Store-pit (E).

هي السيرة بناء خاص تحفظ فيه الحبوب والاعلاف .

## ٢٧٠٢٢ - مَقْطُورَة

Momot (F). Motmot (E).

جنس طير من فصيلة المطويات . انواعها المعروفة ٢٠ اصنافها البلاد الامريكية الحارة . تألف الاجراع والنايات . تتميز باستعالة اذنانها الرتاجية التركيب الثنائية الرقال الخريطة قدر ثلاثة اصابع قبل الاطراف . مناقيرها خفيفة مستطيلة شارقة الحامل العليا المستنة الطغاف || قوتها الحشرات والدوديات والورز والفقران . تدلش اوكارها في اوقاب الصنوبر . تضع الاش من يعضتين الى ثلاث بيضات فضفاضا بمنوبة الذكر نحو ثلاثة اصابع || اشهر انواعها العظم المبلول .

## ٢٧٠٢٣ - مَقْطُور مَقْدُول

Prionites motmota (S). Momot vulgaire (F).

نوع من المطوط . اطائه تشمل معظم مناطق البرازيل والفويان . طوله نحو ٥٠ سم . لونه متباين الالوان ، ظهره واعالي جناحيه الى اغصار الزئقي . تناكب الى الزئقة السنجرية . منته زورده وبشرته وبلته الى الصبة النحاسية الموح . صخره وقه رأسه سود . جبته صفراء اللون يقابلها من الوراء حمار اخضر يطق القطن . حياته الى الجفرة . منقاره اسود . رساء الى الريدة السمره || يألف الاجراع البعيدة من كل حمران . قوته الحشرات والورز والفقران .

## ٢٧٠٢٤ - مَقْطُورِيَّات

Momotidae (S).

Momotidae, Prionitidae (F). Momotidae (E).

لفصيلة طير من الجوارم منيات المناقير . انواعها المعروفة عديدة يجمعها جنس واحد يدعى مطوط || مهدها منظم اجراع امريكية الوسطى والجنوبية . قوتها الحشرات والورز والفقران .

## ٢٧٠٢٥ - مَقْطِيع

Autoclave (F).

Autoclave, Vacuum-pan (E).

مرجل محكم اليد ترتفع فيه الحرارة والبخار للمضغوط ، يستعمل لتعطير .



مقطوط ميلول



مقطاه

٢٧٠٤٩ - مُعَادَلَةٌ بِنَانِيَّةٌ ، مُعَادَلَةٌ تَقْصِيصِيَّةٌ  
Equation graphique (F), Graphic equation (E).

٢٧٠٥٠ - مُعَادَلَةٌ سِنِيَّةٌ  
Formule dentale (F), Dental formula (E).

٢٧٠٥١ - مُعَارٍ  
Aptère (F), Apterus, Wingless (E).  
هي كل حشرة عادية الروشن أو الفمد .

٢٧٠٥٢ - مُعَارِضٌ شَرْعِيٌّ  
Contradictoire légitime (F), Legitimate adversary (E).  
هو ما كان يثقل في قضية من قضايا النسب جميع خصوم المتنازع في نسبة الموجودين والاحتماليين .

٢٧٠٥٣ - مُعَارَضَةٌ مِنَ الْغَيْرِ  
Tierce-opposition  
هي إحدى طرق الطعن غير العادية في حكم لا يكون للمعارض طرأاً أو مثلاً فيه ولكنه يكون قد أجسب بمقتضاه .

٢٧٠٥٤ - مُعَاصٍ  
Milieu (F), Medium (E).  
هو البيئة ، أطلبها .

٢٧٠٥٥ - مُعَاكَلٌ  
Ligne de conduite (F), Line of conduct (E).  
الملك منحج السلوك المتبع .

٢٧٠٥٦ - مُعَالٍ كَسْتِيٌّ  
Hylactes castaneus (S), Mégalyonx châtain (F).

طائر من الجوارثم سنيات المناقير وبفصيلة لافقات التمل . موطن بلاد الشبلي . ملجته الحياتي زويجي . يألف البراري الدفلة - يغتسل قصير غيرة من الطير . قوته الحشرات والتمل || جسمه ريمه بطول نحو ٢٢ سم . يتميز بصغر المنقاد والجناح والذنب . ساقاه وأصابعه شديدة النشاط تمكنه من العدو السريع . ثوبه كستني الرأس والرداء والجناح وأطراف الذنب ، اشهب الزور والصدر والبطن . بطنه مجذع بالكستني . متفاد وساقه الى الطحلة السمراء || الاثنى تحمل بثوب الالكر .

٢٧٠٥٧ - مُعَالِجَةٌ ، مُدَاوَلَةٌ ، عِلَاجٌ  
Traitement (F), Treatment (E).  
حيلة وسائل النجاة بالحيلان أو النبات لانتفاء الامراض أو لمداواتها . لذلك فالعلاج قد تكون واقية أو شافية .

٢٧٠٥٨ - مُعَالِجَةٌ بِالْحَصْلِ  
Sérothérapie (F), Serothrapy (E).

٢٧٠٥٩ - مُعَالِمُ الْأَرْضِ  
Aboutissant et tenante (F), Adjacent lands (E).  
هي قطع الأرض المجاورة للملك من جهتي الطول والعرض .

٢٧٠٦٠ - مُعَالِنَةٌ  
Informatique (F).  
هي الاستقصائية ، أطلبها .

٢٧٠٦١ - مُعَالِنَةٌ ، مُسَالِنَةٌ  
Alternative (F), Alternative, Alternata (E).  
نمت تسمي يطلق حل كل شجرة تحمل عاماً وتختلف آخر .

٢٧٠٦٢ - مُعَالِيَّاتٌ ، فُطُورٌ مُعَدِبَةٌ  
Gastéromycètes (F), Gastromycetes (E).  
فصيلة فطور من الدعاميات .

٢٧٠٦٣ - مُطَيِّرَةٌ (E), Large bird-cage (F), Volière (F).  
البناء للمد تربية الطير .

٢٧٠٦٩ - مُطَيِّعٌ  
Chambre à humidification (F), Damping room (E).

حجرة رطبة يوضع فيها التبع الجاف ليلين .

٢٧٠٦٠ - مُطِيلٌ  
Ductile (F).  
ما كان يتصف بخاصة اللط .

٢٧٠٦١ - مُطَيٌّ  
Grenadier sauvage (F), Wild pomegranate-trees (E).  
هو الزمان البري ، جلناره مغربي يحرسه التمل فيكثر صله .

٢٧٠٦٢ - مُطَيَّاعَةٌ  
Umbrella (S), Ombrella (F), Ombrella (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل سفقيات الخياشيم وفضيلة المظاعيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها مظاعة الحنت ومظاعة المتروك || اصداها مظلية الشكل ، قليلة الارتفاع ، تغلف الغليل من الجسم . اجسامها بيضية اللون ، متساكنة ، حوزها كبيرة قاعدية . ارجلها فضفاضة ، محيائها سفقية و رقية الشكل . ارجلها وسيدة ، كبيرة ، مبطلة ، ماسة الصنعة السفلى .

٢٧٠٦٣ - مُطَيَّاعِيَّاتٌ  
Umbrellidae (S), Umbrellidés (F), Umbrellidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية . من الرغويات مديات الارجل سفقيات الخياشيم . اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصداها صغيرة مظلية الشكل . ارجلها فارضة بيضية اللون أو مستديرة || اعرف اجناسها المظاعية والتيلويدن .

٢٧٠٦٤ - مُطَيَّعَايٌ ، مُطَيِّيٌّ  
Culture sèche (F), Dry farming (E).  
الذي تسقيه السماء من الزرع .

٢٧٠٦٥ - مُعَاتٌ  
Expédient (F), Expédient (E).  
المعاش الطريقة المناسبة .

٢٧٠٦٦ - مُعَادِلٌ ، مُطَيِّرٌ  
Pair (F), Equal, Even (E).

٢٧٠٦٧ - مُعَادَلَةٌ  
Equipollence  
التصادل في القوة أو القيمة .

٢٧٠٦٨ - مُعَادَلَةٌ  
Equation .  
المعادلة في علم الرياضيات هي مائلة الشيء أن في النسبة أو في الصيغة . والمعادلات عديدة منها :

المعادلة التفاضلية .  
المعادلة الثنائية  
المعادلة الزمنية  
المعادلة السنوية  
المعادلة المكسبة  
المعادلة المعية  
المعادلة الخالية  
Eq. du second degré (F).  
Eq. du temps (F).  
Eq. annuelle (F).  
Eq. réciproque (F).  
Eq. simultanée (F).  
Eq. incompatible (F).



مظاعة



معال كستني

- Rhécostat (F). **مُعَدِّلَةٌ** ، **رَيْسَتَا** ٢٧٠٨٠  
Rheostat (E).  
جهاز يزداد أو ينقص المقاومة في التيار الكهربائي المقصود تقويته أو تخفيفه .
- Minéral, Métal (F). Métal (E). **مُعَدَّن** ٢٧٠٨١  
المعادن اجسام طبيعية تتميز بصفاتها الكيماوية النقية وبخواصها الفارقة عنها الصلابة وقابلية الصهر والسحب والطرق باستثناء الزيت المائع في الحرارة العادية .
- Epierrure (F). **مُعَدَّن** ، **صَالُور** ٢٧٠٨٢  
Cleanser (E). آلة تقلع الحجارة من الارض وتجمها .
- Minéralisation (F). **مُعَدِّلَةٌ** ٢٧٠٨٣  
Mineralization (E). المدة والتدوين واحد .
- Minéral (F). Mineral (E). **مُعَدِّلِي** ٢٧٠٨٤  
نعت .
- Minéralogie (F). **مُعَدِّلِيَّة** ٢٧٠٨٥  
Mineralogy (E). علم للمعادن وهو يبحث في تكوينها وتركيبها الحكي والكيميائي وطرق استغلالها واستعمالها وفوائدها .
- مُعَدِّلِيَّات** ، **مُعَدِّلِيَّات الأَرْجُل** ٢٧٠٨٦  
Gastéropodes (F). Gastropoda (E). صف حيوانات من الرخويات .
- مُعَدِّلِيَّات وَلَوِيَّة** ٢٧٠٨٧  
Gastéropodes pulmonés (F). Pulmonate gastro-  
podes (E). صنف من الرخويات للمعدية .
- Erminette, Herminette (F). **مُعَدِّلِي** \* ٢٧٠٨٨  
Adze, Hovel (E). أداة تستعمل لمرق التربة واقتلاع الاشجار الصارية .
- Peu profond (F). Little deep (E). **مُعْدِر** ٢٧٠٨٩  
تربة مرة : قليلة السق وقليلة النبات .
- Pelade (F). Pelada, Fox-evil (E). **مُعْدِر** ٢٧٠٩٠  
المر : سقوط الشعر والریش .
- مُعْرَاكِج** ٢٧٠٩١  
قال القزويني : دابة عظيمة حبيبة مثل الارنب صفراء اللون حل رأسها قرن واحد أسود لم يرها شيء من السباع والذئاب الا حرب (الجاحظ) .
- Hibernia (F). **مُعْرَاكِة** ٢٧٠٩٢  
هي معربة الشجر ، اطلبها .
- Tic **مُعْرَكَةٌ** ، **عُرْكَ** ٢٧٠٩٣  
كل حادة مستقيمة يمتدحها الفرس كصكك الانسان وبلغ الحمار ونفس الجدران والارباحاج يمتدح ويسرعة الخ... .
- مُعْرَشَةٌ** ٢٧٠٩٤  
هي المشرقة ، اطلبها .
- Exposition (F). Exhibition (E). **مُعْرِضٌ** ٢٧٠٩٥
- Etalonnage (F). **مُعَارِفَةٌ** ٢٧٠٩٦  
Gauging, Standardization (E).
- Symbiose (F). Symbiosis (E). **مُعَارِيفَةٌ** ٢٧٠٩٤  
هي الاشراك الثنين في الميعة بين فردين مختلفين وهو لا يسري على الذكر والانثى والاب والابن والعنقيل وراثته .
- Visita (F). Viste, Search (E). **مُعَارِيفَةٌ** ٢٧٠٩٥  
مُعَارِيفَةٌ ٢٧٠٩٦ هي الجيتكو ، اطلبها .
- Liane (F). Liana (E). **مُعْتَرَشَةٌ** ، **مُعْرَشَةٌ** ٢٧٠٩٧  
كل جنبه مستقيمة الساق كثيرة الفروع .
- Herbivore (F). **مُعْتَشِبٌ** ٢٧٠٩٨  
Herbivore, Herbivorous (E). ما كان قوته الشب .
- Eluë (F). **مُعْتَرِشٌ** ٢٧٠٩٩  
كل مادة تنفصل عن غيرها بواسطة عائق تدعى معتوق .
- Fumigant (F). **مُعْتَنٌ** ٢٧٠٩٠  
Hâtif, Précoc (F). **مُعْتَنَالٌ** ٢٧٠٩١  
Early, Precocious, Forward (E). صفة النبات الذي ينمو ويترك سريعاً .
- Pétrin (F). **مُعْتَنَجٌ** ، **مُعْتَجَكَةٌ** ٢٧٠٩٢  
Kneading-trough (E).
- Mastic à griffer (F). **مُعْتَجُونُ التَطْلِيمِ** ٢٧٠٩٣  
Graft mastic (E). ويصنع صمغ التلميم وطلاء التلميم ، اطلبه و ستيك .
- مُعْتَدٌ** ٢٧٠٩٤ هو البقل الرخص والتمر النقص .
- Matériel agricole (F). **مُعْتَدَاتُ زِرَاعِيَّة** ٢٧٠٩٥  
Agricultural material (E). هي الادوات والاجهزة الزراعية الآلية .
- Statoeope (F). **مُعْتَدَالٌ** ٢٧٠٩٦  
Statoeope (E). المعدال مرزاز تفاضل يتأثر باضمت تقالبات الضغط الجوي ، يستعمل في الملاحة الجوية خاصة عند الارتفاع او الهبوط .
- Estomac (F). **مُعْتَدَلَةٌ** ، **مُعْتَدَلَةٌ** ٢٧٠٩٧  
Stomach (E). جزء من جهاز الهضم في الحيوان . والمعدة انواع فهي بسيطة عند اليليات وبركية عند المبررات حيث تمكن اصحابها من اعادة الطعام الى الفم لمضغه الا اما انسان المعدة المركبة فاربعة وهي : أم التلافيف والأنفحة والقنطرة والكروش .
- Taux (F). **مُعْتَدِّلٌ** ٢٧٠٩٨  
راجع حق .
- Statocyste (F). Statocyste (E). **مُعْتَدِّلٌ** ٢٧٠٩٩  
المعدل جهازان التوازن عند الرخويات . مركزه الرأس أو بالقرب منه .

مرة حاملة لها استمالها الطبي || أشهر أنواعه المزرونة المبلول .

### ٢٧١٠١ - مَعْرُوز مَبْدُول \*

Cneorum tricoccum (S). Camélé commun (F).  
نوع من المزرورين وهو جنية سرورية مبلولة تملو من ٩٠ إلى ١٢٠ سم. ساقها فراء. أوراقها أبيض زيتونية الشكل. نصلها ورديد البرق ، ملتصق الحمار ، لامع الصفة البحرية اللون. أزهارها صغيرة القند ثلاثية التجميع صفراء اللون . ثمارها الى الخضرة الشديدة الاسمرار. يستخرج من أوراقها وبزورها عصارة مرة حاملة مسملة .

Cneoraceae (S). مَعْرُوزِيَّات \*  
Cnéoracées (F). Cneoraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلات الفصائل مرتعات المبيض . أجناسها وأنواعها عديدة ، أطباق الاقاليم المختلفة . أشهر أجناسها المزرورين .

Blieuse (F). Hoer (E). مَعْرُوزِيَّات \*  
جهاز زراعي يستعمل في حرق التربة تجره الدواب او الحركات .

Caprinés (F). Caprinae (E). مَعْرُوزِيَّات \*  
أحد قسي فصيلة الثنيمات .

Lait (F). Milk (E). مَعْرُوزِيَّات \*  
المس هو اللبن ، يقال ما في النجسة مس .

Tubériss (F). مَعْرُوزِيَّات \*  
مَعْرُوزِيَّات \*

Déshebant (F). مَعْرُوزِيَّات \*  
كل مادة عاشوية تقضي على بعض الأشباب الفسرة تقي مشابها .

Herbier du littoral (F). Herbal of littoral (E). مَعْرُوزِيَّات \*  
المعاشب المداحية هي المواعظ القريبة من البحار والشواطئ والتي تكثر فيها الثبوت والأشباب البحرية .

Décagone (F). Decagon (E). مَعْرُوزِيَّات \*  
مَعْرُوزِيَّات \*

Pressoir (F). Press (E). مَعْرُوزِيَّات \*  
كل آلة تستعمل للصر من عصر البائر الى الحبوب للذك فالمصاصر حديد الاشكال والاحجام .

Brontomètre (F). Brontometer (E). مَعْرُوزِيَّات \*  
جهاز آلي يسجل الموجات والظواهر الجوية (الترابولوجية) أثناء الزلازل والمواسم والاضايع . من البرق والصاعقة والارعد الى هبوب الرياح وسرعتها الخفية والارضية الى الاضطراب وغزاراتها الى البرد وحجمه الى الضغط الجوي .

Echenilloir (F). Branch-opper (E). مَعْرُوزِيَّات \*  
أداة تستعمل في الاعصال تمكن العامل من الوصول للقضاء على الاساريع والديدان المغتصبة في احوالي الانجار .

Nimbus مَعْرُوزِيَّات \*  
هي البجعة نوع من الغيوم ، اطلها .

Exposition agricole (F). مَعْرُوزِيَّات \*  
Agricultural exhibition (E).

مكان يمرض فيه كل ما له علاقة بالزراعة من النبات والبار والحبوب الى الحيوان والادوية والمعدات .

Déchaussé (F). مَعْرُوزِيَّات \*  
مَعْرُوزِيَّات \*

Hibernia defoliari, Erannis defoliari (S). Hibernia defoliari, Phalène effeuillante (F). Mottied-umber moth (E). Grosser Frostspanner (D).  
حشرة من فصيلة الذرافعات ، ذكرها صغير القند اصفر الجسم والارواش المسننة والمزركشة بالاحمر والاسمر .

انتادها معارة سمراء اللون مستطيلة الجرازم والارياش والاشرة . تمتص كنها في اوائل الخريف عند انتشاب الانسان فيقتف في اوائل الربيع من رقات نمة تلثم البرام والارواق الفتية || تركب منظم الانجار الحرجية وبعض للمرة كالسديان والندارد والزان والبتولا والزيغون والخلص والزعزور والبنق والناصح والاجاص || تكافح في الشتاء باستمال أحد المواكين الفدالة .

Hibernia leucophaearia, Erannis leucophaearia (S). Hibernia grisâtre, Phalène du chêne (F). Hibernia leucophaearia (E).  
حشرة من الاقيات حرشقيات الاجنحة . ذكرها بجحة اناتها معار . موطنها البلاد المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشها صفة تميش على غزوتها الاعمال . سرقها تميش على اوراق السديان والقص ||

جسم الذكر منير قصير بطول نحو ٩ سم . بسطة نحو ٣٤ سم . رأسه الى الربعة . عتاه صغيرتان . زياناه مشطيان . جوشه ويته الى الربعة السراء الموج . رواشته وراية اللون يعلها قبيح بيوري وتسلج اسمر . اعداها الى الربعة الفضية || الاث مرة . جسمها اهلجي الشكل بطول نحو ١٠ سم . ويتنهي بمز حد . ثوبها الى الربعة السراء تملوها رقة مراء . جرانها مستطيلة تقطع تكنها من الانتقال بسرعة وين تعلق الانجار || لها جيل واحد في الحول . تظهر في نيسان . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ثلاث ساعات وتنتج المكن مباحدا على اباط الارواق || السرقة عند بلوغها الكواك تقطع نحو ١٨ م . جسمها اسطواني الشكل ، مبشر اطلب الدقيق القصير . ثوبها الى الكهبة تملوها ثلاثة خطوط سود قاطبة منها خطي نجاصف الغرض . رأسها الى الجفوة . شرحها محدوب الشكل ينتهي بركلة ذقة .

رأجاها البنية الوسطى شديدة الصغر مما يحلها تقترس عند الانتقال || طرد الاكمال يستمر نحو ٣٨ اسبوعا وينقضي في التربة ضمن غلاف من الطين والبراز المجدون بالريال .

Cneorum (S). مَعْرُوزِيَّات \*  
Camélé, Chamélé, Garousse (F). Spurge olive, Widow-wall (E). Kneser Knopispricke (D). Caméles, Calmolea (I).

جنس شجيرات وجنيات برية من فصيلة المزروريات . ازهارها عديدة ، بعضها من نباتات المناطق المعتدلة . أوراقها ابيدة متعاقبة . أزهارها خشوية ابطية الارتكار وسيدة او ثلاثية التجميع . ثمارها ثلاثية الفلقات اناشفة . بزورها



معرية الشجر



معرية رداء



مزرور مبلول



مصاصر



مصاصر



Hydroscope (F). **مِعْيَنَان** ٢٧١٥٤  
Water-diviner (E).  
هو الذي يستكشف البنايع ويمن موائها .

Terrair (F). Soil, Ground (E). **مَعْيَص** ٢٧١٥٥  
صفة الارض بالنسبة الى الزراعة كقولك معيص جيد  
الاتاء ، ومعيص كرم ، وطعم المعيص .

Losange, Rhombe (F). **مُعِين** ٢٧١٥٦  
Losange, Rhomb, Rhombus (E).  
جسم رباعي الاضلاع المتساوية .

Hydroscope (F). **مَعْيَنَة** ٢٧١٥٧  
Water-divining (E).  
علم استكشاف البنايع وتعيين موائها .

Rhomboidal (F). Rhomboidal (E). **مُعِينَة** ٢٧١٥٨  
مُعِينَة

Oculifère (F). **مَعْيُون** ٢٧١٥٩  
المعِين من كان يعمل عيناً . راجع جاحم .

Misuler (F). To mow (E). **مَعَا** ٢٧١٦٠  
معا وماغ وماء السور : صَوَّت .

Glossostemon (S). **مُعَات** ٢٧١٦١  
Glossostémon (F).  
جنس نباتات حشوية برية معمرة من فصيلة الخبائيات .  
انواعها قليلة العدد ، اصنافها الشرق الاوسط . اوراقها  
مستطبة متناظرة كفية . ازهارها صغيرة القد فردية || اشهر  
انواعها للمغات المعجمي .

**مُعَات عَجَمِي** ٢٧١٦٢  
Glossostemon brugueri (S). Glossostémon de  
Perse (F).  
نوع من المغات وهو حشوية برية طيبة تتلوه من ٥٠ الى  
١٠٠ سم . جذورها حنزالي الشكل احمر المادة اسود القلفة .  
ساقها وفروعها زهاء اللحاء . اوراقها مستطيلة الاضلاع  
خلية النصل . ازهارها صغيرة القد يضاء اللون || جلوره  
تستعمل مسحوقة وتدخل في عدة مركبات تقيء المرأة النفساء .

Avaries (F). **مَعَارِم** ٢٧١٦٣  
Damages, Averages (E).  
هي التلوار ، واجمه .

Magas (S). **مَعَاَس** ٢٧١٦٤  
Magas (F). Magas (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل  
وفصيلة التنديدات || انواعها المعروفة عديدة جميعها من  
متحيرات الاباج الاول .

**مَعَالِير** ٢٧١٦٥  
المخاطر والمخاطر : صنع ينضخه العرط وهو حلو يركل  
الا انه مقت الرائحة .

Hétérotrope (F). **مَعَارِير** ٢٧١٦٦  
Heterotropous (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل نقيض (ملقوسة نباتية) رأس  
طرفه لا يقابل انقور البزرة .

Néphélomètre (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٦٧  
Nephelometer (E).  
جهاز يمكن من درس الغبش وتعديله .

Vivace (F). Perenniel (E). **مُعَمَّر** ٢٧١٦٨  
نعت تعريفي يوصف به النبات الذي يعيش أكثر من  
سنتين .

Novale (F). **مُعَمَّر** ، **مُعَمَّرُوكَة** ٢٧١٦٩  
Newly broken-up (E).  
كل أرض عميرة مستحدثة .

**مُعَمَّل** ، **مُعَمَّلَة** ٢٧١٧٠  
Fabrique, Manufacture (F). Fabric, Manufactory (E).  
**مُعَمَّل البيرة** : **مُعَمَّل الجعة** ، **مُعَمَّرُوكَة**

Brasserie (F). Brewery, Brewhouse (E).  
معمل تصنع فيه البيرة اي الجعة .

Glucoserie (F). **مُعَمَّل الغلوكرز** ٢٧١٧٢  
Glucose-house (E).  
معمل يحول فيه النشا الى غلوكرز .

Grapperie (F). **مُعَمَّيَة** ٢٧١٧٣  
Graspery, Vinery (E).  
هي دفينة العنب ، بناء زجاجي السقف ويص الجوارب  
بجهاز بهذه التفتة يتصل لفرس الكرة وأنتاج العنب  
غلاتاً لزبان الاتاج الشبيبي .

Insectarium **مُعَمَّيَة الحشرات** ٢٧١٧٤  
مؤسسة علمية بجهاز بالوسائل الخاصة التي تمكنها من تربية  
الحشرات لفرض أطوارها وموائها .

Fiduciaire (F). Fiduciary (E). **مُعَمَّوْد له** ٢٧١٧٥  
هو الذي اوصى له بمال وفرض عليه دفعه للمستحق  
المهدي .

**مُعَمَّوْدَل** ، **مُعَمَّوْدَل** ٢٧١٧٦  
Métamorisé (F).  
نعت تعريفي يطلق على الاعضاء المائلة المتباينة في كامل  
الجسم او في جزء منه .

Pioche (F). Pickaxe (E). **مِعْوَل** ٢٧١٧٧  
اداة زراعية تستعمل في ركاش التربة . اشكاله واحجامه  
عديدة تختلف باختلاف الاعمال المطلوبة .

Coeliaque (F). Coeliac, Celliac (E). **مَعْوَرِي** ٢٧١٧٨  
Intestin (F). **مَعْمِي** ٢٧١٧٩  
Intestine, Bowel, Gut (E).  
عضو من جهاز الهضم يمتد من المعدة الى الاست وهو  
يقسم الى عدة اقسام اخصها المعى الدقيق والمعى الخليلج .

**مَعْمِي دَقِيق** ، **مَعْمِي** ٢٧١٨٠  
Intestin grêle (F). **عَصِيح** ٢٧١٨٠  
Small Intestine (E).  
القسم الوسطي من الامعاء .

Jéjunum (F). Jejunum (E). **مَعْمِي صَالِم** ٢٧١٨١  
المعى الصائم جزء من المعى الدقيق مركزه بين المعج وبين  
المعى الخليلج .

Côlon (F). **مَعْمِي غليظ** ، **مُعْرَان** ٢٧١٨٢  
Colon (E).  
القسم الاخير من الامعاء ينتهي في الاست .

**مَعْمِي لَغِيْف** ٢٧١٨٣  
Iléon, Iléum (F). Ileum (E).  
المعى الخليلج هو القسم الثالث والاخيل من المعى الدقيق ،  
مركزه بين المعى الصائم والاغور .



مِعْوَل



مِقْبَاش



## ٢٧١٧٦ - مَعْتَحْ غُرَوِي \*



مفك أخضر

*Alnus glutinosa* (S). Aune glutineux, Auline, Verne, Vergne (F). Common alder (E). Alder, Erlenbaum, Erla, Schwarzerle (D). Alno, A. ontano, Ancetano, Auners, Verna russa (I).  
نوع من المفك اللؤلؤ. شروبه عديدة تملؤ من ٥ إلى ٣ م. منبها المنافع ويجاري الماء. سيقانها جالسة قشورها إلى السرة السوداء. فروصها زياه. أوراتها ثلاثية أو خماسية التفصيص. نصلها عديد المروق الدقة، لامع البشرة المائلة على صفحتيه.

## ٢٧١٧٧ - مَعْتَحْ قَلْبِي الْوَرَق \*



مفك أريد

*Alnus cordata* (S). مَعْتَحْ قَلْبِي الْوَرَق (F). Aune à feuilles en coeur (F).  
نوع من المفك، شجرته صغيرة تملؤ من ٨ إلى ١٠ أمتار، فروصها مائلة. أوراتها قلبية الشكل تملؤ من ٥ إلى ١٢ سم. وتعرض من ٤ إلى ١٠ سم. نصلها مسنن، الحافة خلي الصفحة السفلى. مخاريطها فردية التجميع جوزية القند.

## ٢٧١٧٨ - مَعْتَحْ، مَعْتَحْ، مَعْتَحْ \*

*Mlellat* (F). مَعْتَحْ، مَعْتَحْ (F). Honey dew (E).  
مواد سكرية لزجة تنفصها صام أوراق بعض النباتات فيجربها النمل وتميش عليها بعض الفطور المجهرية كقطر السحار.

## ٢٧١٧٩ - مَعْتَحْ رِيَات \*



مفك غروي

*Nectarinidées* (S). Nectarinidées (E).  
نصيلة طير من الجوارم وريقات النectar. أجناسها والأوعا زهاء ١٢٠، جميعها صغيرة القند، بجلة الشكل، زاهية الألوان المُرَّاة، مستطيلة المنابير البقية. مهدها البلاد الحارة. تجرس رقيق الأجزاء والجائل السكرية.

## ٢٧١٨٠ - مَعْتَحْ رِيَة \*

*Melica* (S). Mâlique (F). Melic, Meick (E). Nickendes (D). Melica (I).  
جنس نباتات عشبية سولية أو معمرة من نصيلة النجيليات. أروعها عديدة جميعها حلفية ترعها للثام. وهي تنبت في معظم الإصقاع المعتدلة الحارة. سيقانها نحيلة منتصبة. أوراتها صفوية، متباعدة، قليلة. أزعارها صغيرة القند، عذقية التجميع، عطرية العروق، غزيرة الرقيق يحرمها النحل.

## ٢٧١٨١ - مَعْتَحْ، مَعْتَحْ \*

*Mâlongne* (F).  
نبات زراعي مشهور باسم بادنجان، أطيبه.



مفخرة

*Pluvioscope* (F). مَعْتَحْ دَقِ \*

*Pluvioscope* (E).  
المفك جهاز يسجل زمن وقوع المطر وبدة استمراره وشدة.

## ٢٧١٨٣ - مَعْتَحْ رِيَة \*

*Rame* (F). Oar (E).  
المفك جهاز مجذائي الشكل يكون منه بعض المفصليات والعضويات والقشريات والحشرات.

## ٢٧١٨٤ - مَعْتَحْ لَيْسِ الْكَرْزِ \*



مغذّيس الكرز

*Magdalis cerasi* (S). Magdalis des cerisiers (F). Magdalis cerasi (E).  
حشرة خاضعة خائبة مؤذية من فصيلة السوسيات وربة مفنات الأجنسة. تألف جناتن الأجرام الشرة من قنار وأجامس وكرز وغوغ... غناضها تميش على نصال الأوراق. يرقاها تنفخ الانداد والافصان حتى

٢٧١٨٨ - مَعْتَحْ لَيْسِ الْكَرْزِ \*  
Vache taurelière (F).  
في البقرة النملة المستعمدة أوداق أو الاستحرام.

٢٧١٨٩ - مَعْتَحْ رِيَة \*

## ٢٧١٩٠ - مَعْتَحْ، مَعْتَحْ، مَعْتَحْ \*

*Alnus* (S). Aune (F).  
جنس نباتات شجرية وجنية من نصيلة البيرليات، أروعها ١٦، أعطابها البلاد المعتدلة. تميش حل ضفاف البحيرات ويجاري الماء. أوراتها مائلة. أزعارها قديمة، انذكارية منها تظهر في الخريف والانتوية تأخر إلى الربيع. أعضائها قائمة الاستعمال الناصي لا يعلها الماء. فحمها يستعمل في صناعة الباريد. قشورها وأفرع اللسان تصلح ليداعا. أشهر أنواعها ما يتبع.

## ٢٧١٩١ - مَعْتَحْ أَخْضَر \*

*Alnus viridis* (S). Aune vert, Aunâtre (F). Green alder, Mountain alder (E). Grünerle, Drosle (D). Drossa, Drosale, Trosega (I).  
نوع من المفك وهو شجرة جبلية مبلولة تملؤ من ٢ إلى ٦ أمتار. أوراتها بيضيه ذلقة. نصلها بطول من ٣ إلى ٨ سم. ويعرض من ٢ إلى ٥ سم. وهو ثنائي التستين. أخضر الصفحة العليا خلي السفلى.

## ٢٧١٩٢ - مَعْتَحْ أَرْدَم \*

*Alnus incana* (S). Aune grisâtre, A. de montagne, Aune blanchâtre (F). Black alder, Hoary alder, Speckled alder (E). Weisserle, Grauerle (D). Auzano, Marassola, Ontanella (I).  
نوع من المفك اللؤلؤ. شروبه عديدة، أزعارها صغيرة القند تملؤ من ٥ إلى ١٤ م. أوراتها مزرانية تملؤ من ٤ إلى ١٢ سم. وتعرض من ٣ إلى ٩ سم. نصلها باهت الأخضر، أود الكليل، كثير العروق، مزدوج التستين.

## ٢٧١٩٣ - مَعْتَحْ الْيَابَان \*

*Alnus japonica* (S). Aune du japon (F).  
نوع من المفك، مهده اليابان. شجرته متوسطة القند تملؤ من ١٠ إلى ١٨ م. فروصها مضلعة زياه. أوراتها سنائية تملؤ من ٦ إلى ١٤ سم. وتعرض من ٢ إلى ٦ سم. نصلها قابل الزغب والأخيل، متباعدة التستين، ينتهي بهدية مستطيلة.

## ٢٧١٩٤ - مَعْتَحْ بَحْرِي \*

*Alnus maritima* (S). Aune maritime (F).  
نوع من المفك، شجرته صغيرة القند تملؤ من ٨ إلى ١٠ أمتار. فروصها مائلة. أوراتها تملؤ من ٥ إلى ١٢ سم. وتعرض من ٣ إلى ٦ سم. نصلها مائل الصفحة العليا خلي السفلى لا يقايي التستين ينتهي بهدية قصيرة. وهو يربح في المواقف الرطبة الساحلية ويجود قرب الماء.

## ٢٧١٩٥ - مَعْتَحْ صِبَاغِي \*

*Alnus tinctoria* (S). Aune tinctorial (F).  
نوع من المفك، مهده اليابان ومقدوريا. شجرته متوسطة القند تملؤ من ١٢ إلى ٢٠ م. ساقها كثبة سمراء اللحاء. فروصها الفتية مزرية. أعضائها قلبية الحمل. أوراتها أحليلجية مفنارية مقنطرة القاعدة تملؤ من ٩ إلى ١٢ سم. وتعرض من ٥ إلى ١١ م. نصلها بحري اللون خلي الصفحة السفلى. قشورها صبغية قائمة الاستعمال.

2٧١٩٨ - **مِقْرَقَة** Scoop, Ladle (E).  
رفش مقعر يستعمل في اخذات الماء والمواد المائعة .

2٧١٩٩ - **مِقْرُود** Truffe rouge (F).  
هو الكم الأحمر ، اطلبه .

2٧٢٠٠ - **مِقْرُوي** Mougri (F).  
نوع من القليل الزراعي المأكول يعرف بفجل الهند او قليل جاوا .

2٧٢٠١ - **مِقْرُك** Quenouille (F), Distaif (E).  
هو المردن ، شكل من اشكال تشذيب الشجر .

2٧٢٠٢ - **مِقْشِيل الْوَرْد** \*  
Megachilles centuncularis (S), Megachile (F).  
حشرة من المِقْشِيلِيَّات طولها نحو ١٢ سم . تركيب الورود والفل تقتصر نصل الارواق وتنقل الفتات الى غطائها

التي تقيمه في بعض التجاويف الخفية حيث تربي الفتات سنفا متتابعة يتخللها المكان ، يشاهد ويحيط به شيء من العمل || يعتبر من الحشرات الضارة لانه يلذي اوراق الورد والفل .

2٧٢٠٣ - **مِقْشِيلِيَّات** \*  
Megachilidae (S), Megachilidés (F), Megachilidae (E).  
فصيلة حشرات خاضعة جارية من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، قريبة الشيء من النمل . جميعها صغيرة القد ، طولها يراوح من ١٠ الى ١٥ سم . تقيم غشائياتها في تجاويف الاعشاب اليابسة .

2٧٢٠٤ - **مِقْص** Colique (F).  
Colic, Stomach-ache (E).  
عارض يعترى بعض الحيوانات كالخيل والبقر . اسبابه مختلفة وانواعه ايضا اغصها الكولري والعموي .

2٧٢٠٥ - **مِقْصَن ، مِقْصَد ، مِقْصَب** \*  
Ebranchoir (F), Pruning-tool (E).  
اداة تستعمل في قطع الاغصان والافئاد .

2٧٢٠٦ - **مِقْص** Momordica (S), Momordique (F).  
جنس نباتات عشبية مفردة وعارضة من فصيلة القنثاريات ، انواعه ١٢ منها الحولية والمصرة . اوراقها متعاقبة ، منقطة ، كفية ، زغبية ، خشنة . ازهارها فردية التجميع ، كبيرة القد ، وسيدة المسكن . ثمارها بيضيه الشكل ، لثولية للشعور . يزورها مبططة ، سحطية اللون ، بارزة التسنيج والازراكن || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

2٧٢٠٧ - **مِقْص الْكُوْشْنِيْن** \*  
Momordica cochinchinensis (S), Momordique de Cochinchine (F).  
نوع من المنض المسر ، منته الكوشنشن والهند . جذوره عشقولة ، ساقه تطول نحو ٨ امتار . حوافه بسيطة . اوراقه ثلاثية او خماسية التفصيص . ازهاره كبيرة القد قطرها نحو ١٠ سم . لونها الى الصفرة الباهتة ، بتلاتها سنانية الشكل ، مضلعة بالاسود . ثماره بيضيه حمراء اللون تطول من ١٠ الى ١٨ سم .

2٧٢٠٨ - **مِقْص بَلْسَمِي** \*  
Momordica balsamina (S), Momordique baumier, M. balsamina, Pomme de merveille, Pomme de Jérusalem (F), Apple of Jerusatem, Balsam apple (E), Balsamapfel, Wunderapfel (D), Momordica, Pomo balsamo, P. di meraviglia (I).  
اشهر انواع المنض . اعطانه فسيحة الارباع تمتد من الشرق

الاقبال قطعها وتؤذيها || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م . ثوبها الى السود الكامد . رأسها كبير الجرم ينتهي بمنك قاضم ثاقب . عينها كيرتان . زياتها صوطانيان . ظهرها مستدير المؤخر اللامع القارق الطرف . ارساعها رباعية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع . تسرح في الليل . تساهد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تترك المكان في ليل الافئاد والافئان في ثقبوت تتلججها بمنكها || البرقة مرقالة تطول عند تمام الادراك من ٦ الى ٧ م . اسمر اهليلج الشكل ، سحطي اللون ، اصفر المواج ، اسمر الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في طرف اللق الذي احفرته البرقة .

2٧١٨٥ - **مِعْد** Nutritif (F).

Nutritive, Nourishing (E).  
نعت تعريفي توصف به المواد الغذائية او التي لها علاقة بالتغذية .

2٧١٨٦ - **مِعْرَاس** \*  
Transplantoir (F), Garden trowel (E).

اداة مختلفة الشكل والحجم تستعمل في تحجوب التربة لتسكيها من اقتبال الشتول المطلوب غرسها .

2٧١٨٧ - **مِعْرَاس آلي** \*  
Transplantoir mécanique (F), Transplanting-machine (E).

جهاز آلي يؤمن غرس الشتول في التربة على ابعاد متساوية .

2٧١٨٨ - **مِعْرَب** Albinos (F).  
هو الاحسب ، اطلبه .

2٧١٨٩ - **مِعْرَقَة** Ocre (F), Ochre (E).  
تراب صلبالي يستعمل في التخصيب .

2٧١٩٠ - **مِعْرَقَة حَمْرَاة** Ocre rouge (F).  
تراب صلبالي اخر الخصب .

2٧١٩١ - **مِعْرَقَة صَفْرَاة** Ocre jaune (F).  
تراب صلبالي اصفر الخصب .

2٧١٩٢ - **مِعْرَد** Scare bridé (F).  
راجع ابو مقار ديك البحر .

2٧١٩٣ - **مِعْرُز** \*  
المعز او معز الذهب نجم ثير من كوكبة الدب الاكبر .

2٧١٩٤ - **مِعْرُز** Empatement (F), Footing (E).

2٧١٩٥ - **مِعْرُز السَّيْب** Ecarnoussure (F).  
معز نصاب امحرات .

2٧١٩٦ - **مِعْرُز الطَّعْم** Enture (F).  
Cut, Incision (E).  
الموضع الذي يوضع فيه الطعم من الملعط .

2٧١٩٧ - **مِعْرُوس** Birone, Haque (F), Truck (E).  
اداة من حديد مخروطية الطرف تغرز في التربة تفتح حفرة توضع فيها التمرة .



مفراس



مقشيل الورود



منض بلسمي

- الأدنى إلى الهند . ساقه تطول نحو ١٥٠ سم . حوالقه دقيقة .  
اوراقه ثلاثية أو خماسية التفصيص تطول وتعرض نحو ٨ سم .  
نصلها مائل الصفحة الالامعة ، مسن الحافة . أزهاره  
صفراء اللون ، اهليلية البتلات . قناباتها ليلية الشكل ،  
سنة ، طرية الارزكان . ثماره برتقالية الشكل واللون تطول  
نحو ٨ سم . وهي تتركب خضراء في أول حدها وتصيح طيبة  
عند نضجها وقد تدخل في عدة مستحضرات دالة ومفيدة .

### ٢٧٢٠٩ - مغض غلبي الورق \*

Momordica charantia (S). Momordique à feuilles de vigne, Margose, Paparah (F).

نوع من المغض ، منته البلاد الحارة . بقوهره ليقية التركيب .  
ساقه حارشة تطول نحو ٣٠٠ سم . حوالقه بسيطة . اوراقه  
خامسة أو سباعية التفصيص . نصلها مسن الحافة ، خل  
البشرة قنالة العمروق البارزة . أزهاره صفراء اللون ، خيفة  
البتلات . قناباتها تتوسط المائلين . ثماره برتقالية اللون ،  
مستطيلة الشكل ، ذرية الرأس والمقب ، لملوية القشرة  
الخشنة ، تطول من ١٥ إلى ١٨ سم . لها احمر اللون  
ماكول .

### ٢٧٢١٠ - مغض قلالي

Momordica involucreta (S). Momordique à involucre (F).

نوع من المغض ، منته افريقية الجنوبية . ساقه حارشة  
تطول نحو ٣٠٠ سم . حوالقه بسيطة . اوراقه صغيرة القد  
خامسة التفصيص ، نصلها مسن الحافة يطول ويعرض  
من ٤ إلى ٦ سم . أزهاره بيضاء اللون مستديرة البتلات  
قناباتها ثلاثية طرية . ثماره ارضوانية ، بيضة الشكل  
تطول نحو ٥ سم . لها احمر .

### ٢٧٢١١ - مغفر

المفر والمفرقة شجرة واحدة مشهورة باسم قرمزية .

### ٢٧٢١٢ - مغفريات ، قرمزيات

Coccidae (S). Coccidae (F). Coccidae (E).

فصيلة حشرات من فصيلة الاجنحة . اجناسها وانواعها  
كثيرة البند تتميز بصغر قدها وبازدواجها الشكل والشي  
وبافرازاتها الشمية أو اللكية || ذكروها تحيلة الجسم  
مجنحة . انثاها ماعار يفضية الشكل أو مكورة تعيش  
حل النسخ النباتية فتفتها وتمتص عصارتها .

### ٢٧٢١٣ - مغفيرة التفاح المدكبة

هي قرمزية التفاح ، اطلها .

### ٢٧٢١٤ - مغفيرة الحمضيات

Pseudococcus citri (S). Cochenille farineuse des agrumes (F).

حشرة من القرمزيات ، بيضة الشكل ، صغيرة القد  
مبطلة الجسم ، مخدة الظهر ، صفراء اللون ، تحيلة الثلاث  
الشهي البتلي التركيب || تركيب الحفصيات والمنشور  
وبعض نباتات الزينة . انصرارها مخدودة . تكاثرها كثيرا  
من القرمزيات .

### ٢٧٢١٥ - مغفيرة الياسمين

Orthesia insignis (S). Cochenille du jasmin (F).

حشرة صغيرة من القرمزيات ، ثوبها إلى الخضار البني  
ينشأها ندف شهي يمنفها من كل صوب . طويها مع  
كيس مكها يبلغ نحو ٧ مم . تركيب الياسمين والكرزات  
وغيرها من نباتات الزينة || تكاثرها كثر القرمزيات .

### ٢٧٢١٦ - مغفيرة مدكبة

Serpette (F).

هي قرمزية قورموزا ، اطلها .

### ٢٧٢١٧ - مغفور هو اللش ، اطله .

### ٢٧٢١٨ - مكلة

النسجة والمز التي تنتج في عام مرتين . ج مائل .

### ٢٧٢١٩ - مغلق

Indehiscent (F). Indehiscent (E).  
تمت تمرين يوسف به ما لا يفتح أو لا يتشقق من  
البزور وغيرها .

### ٢٧٢٢٠ - مغليم راجع منظمة .

### ٢٧٢٢١ - مئسا ، صهارة

Magma (F). Magma (E).

المغا ، فيزيائيا وكيميايا ، كل مادة رغو شبه مائنة  
كازجاج المصور أو كاطنح الذي يذلف به البركان  
عند ثورانه .

### ٢٧٢٢٢ - مئسدة الاجنحة

Coléoptères (F). Coleoptera (E).

رقة من الحشرات تعرف بغضبة الاجنحة ، اطلها .

### ٢٧٢٢٣ - مئمن

Essacheur (F). Sacking (E).

اداة تجمل الكيس قائما مفتوحا فيهل ملو حبا .

### ٢٧٢٢٤ - مئقاط

Magnétomètre (F). Magnetometer (E).

جهاز يمسك في قياس الاقطاب الممنطة .

### ٢٧٢٢٥ - مئطاطيسي ، مئطيسي

Magnétique (F). Magnetic (E).

### ٢٧٢٢٦ - مئنة \* ، مؤغثو ، ماهون

Swietenia mahagoni (S). Mahogony, Mahogony, Acajou à meuble (F). Mahogony tree (E). Mahogony

baum, Acajou baum (D). Mogano, Acajou (I).

شجرة متوسطة القد من فصيلة الازدرعيات . مهدا المناطق

الحارة الافريقية . خشها اصفر اللون ، اسفر المواج

نام الرقعة ، فاخر الصنف ، يعتبر من أجود أنواع

الأكاجو . وهو شائع الاستعمال في البلاد الاستوائية لانه

عازل طبيعي للحرارة القوية المئنة .

### ٢٧٢٢٧ - مئنط

Aimant (F). To magnetize (E).

### ٢٧٢٢٨ - مئنطة

Magnétisation (F). Magnetization (E).

### ٢٧٢٢٩ - مئنطة حيالية

Zoomagnétisme (F). Zoomagnetism (E).

علم يبحث في تأثير المغنطية على الاحياء .

### ٢٧٢٣٠ - مئنطيس ، مئنطيس

Aimant (F). Magnet (E).

### ٢٧٢٣١ - مئنطيس كهربي

Electro-aimant (F). Electro-magnet (E).

### ٢٧٢٣٢ - مئنطيسي كهربي

Magnéto-électrique (F). Electro-magnetic (E).



مغض غلبي الورق



مئنة

## ٢٧٧٤٠ - مَغْنُوطِيَّةٌ كَبِيرَةٌ الزَّهَرُ

*Magnolia grandiflora* (S). *Magnolia à grandes fleurs* (F).

نوع من المغنولية الأزبينية . جفرتها كبيرة القد هريمية الشكل تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م . أوراقها أبيضه تطلو من ١٢ إلى ٢٥ سم . وتعرض من ٦ إلى ١٢ سم . نصلها لامع البشرة عابق الخضار عل صفحته العليا ، أسفم اللون الزنجاري عطرة عل صفحته السفلى . أزهارها مكبسة تلبية اللون ، عطرية العرف ، قطرها يراوح من ١٨ إلى ٣٠ سم . يتلاتها تد من ٩ إلى ١٢ ، أقلام اسديتها أرجوانية || أزهارها يستمر طول طول شهر حزيران .

## ٢٧٧٤١ - مَغْنُوطِيَّةٌ كَبِيرَةٌ الْوَرَقُ

*Magnolia macrophylla* (S). *Magnolia à grandes feuilles* (F).

نوع من المغنولية الأزبينية . جفرتها متوسطة الحجم تملو من ٨ إلى ١٨ م . اغناها وزيماتها خلية تطلو من ٢٠ إلى ١٠٠ سم . عابلة كبيرة مستطيلة ، طولها يراوح من ٢٠ إلى ١٠٠ سم . وتعرضها من ١٠ إلى ٣٠ سم . نصلها أهليجي الشكل مقطوم القاعدة . أزهارها عظيمة القدر ، قطرها يراوح من ٢٠ إلى ٢٢ سم . وهي فواحة العرف ، بيضاء اللون ، سداسية البتلات المستديرة || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .

## ٢٧٧٤٢ - مَغْنُوطِيَّةٌ مَدَدُونَةٌ

*Magnolia coco*, *M. pumila*, *Talauma pumila* (S). *Magnolia coco* (F).

نوع من المغنولية الأزبينية . جفرتها متدولة تملو من ٢ إلى ٤ أمتار . أوراقها أبيضه سنانية ذرية تطلو من ٨ إلى ١٥ سم . نصلها أخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى . أزهارها صغيرة القدة قطرها نحو ٣ سم . وهي ثلاثية الفصل الأخضر ، سداسية البتلات ، فواحة العرف السطري ، عاجية اللون . أزهارها يستمر طول السنة .

## ٢٧٧٤٣ - مَغْنُوطِيَّةٌ مَحَرِيَّةٌ

*Magnolia officinalis* (S). *Magnolia officinal* (F).

نوع من المغنولية الطبية والزراعية ، مهدا الصين . جفرتها هريمية الشكل تملو من ٦ إلى ١٦ م . أوراقها عابلة كبيرة تطلو من ٣٥ إلى ٤٥ سم . وتعرض من ١٢ إلى ٢٠ سم . نصلها أخضر الصفحة العليا ، خلى السفلى البهية اللون . أزهارها مكبسة كبيرة القدة قطرها يراوح من ١٥ إلى ٢٠ سم . يتلاتها بيض اللون ، أقلام اسديتها قرمزية . || أزهارها يستمر طول فصل الربيع .

## ٢٧٧٤٤ - مَغْنُوطِيَّةٌ مُظَلِّبَةٌ

*Magnolia tripetala*, *M. umbrellae* (S). *Magnolia parasol* (F).

نوع من المغنولية الأزبينية . جفرتها مظلية الشكل تملو من ٥ إلى ١٥ أمتار . أوراقها عابلة أهليجية مستطيلة ، طولها يراوح من ١٢ إلى ٦٠ سم . نصلها مالمس البشرة جيل الخضار الزاهي . أزهارها بيضاء اللون . مستحبة العرف ، تسامية البتلات المستطيلة ، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٢ سم . || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .

## ٢٧٧٤٥ - مَغْنُوطِيَّةٌ مُؤَنِّفَةٌ

*Magnolia acuminata* (S). *Magnolia acuminé* (F).

نوع من المغنولية الأزبينية . جنبها سريرية تملو من ٨٠ إلى ١٥٠ سم . وهي في أقلها ويديتها شجرة شائعة تملو نحو ٣٠ م . أوراقها عابلة بيضيه ذرية ، نصلها يطلو من ١٢ إلى ٢٢ سم . ويعرض من ٦ إلى ١٢ سم .

## ٢٧٧٣٣ - مَغْنُوطِيَّةٌ

*Magnétisme* (F).

*Magnetism, Mesmerism* (E).

*Magnolia* (S).

*Magnolier, Magnolia* (F). *Magnolia* (E). *Magnolie, Lilienbaum* (D). *Magnolia* (I).

جنس اشجار وشجيرات وجنات برية عطية وزبينية من فصيلة المغنوليات . انواعها عديدة . أوراقها مستطية ، كاملة ، جلدية النصل اللامع . أزهارها كبيرة القدة ، ثلاثية الفصل ، عديدة البتلات المتركة ، كثيرة الاسدية ، فواحة العرف العطري . ثمارها تخاريط صغيرة القدة ناشقة || اشهر انواعها ما يلي :

## ٢٧٧٣٥ - مَغْنُوطِيَّةٌ بِحَرِيَّةٌ الْوَرَقُ

*Magnolia glauca*, *M. virginiana* (S). *Magnolia glauque, M. de Virginie* (F).

نوع من المغنولية ، جفرتها تملو من ٥ إلى ٢٠ م . أوراقها أبيضه بحرية اللون خلية الصفحة السفلى . نصلها يطلو نحو ١٨ سم . ويعرض نحو ٦ . أزهارها عطرية ، مكبسة ، عديدة البتلات البيض || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .

## ٢٧٧٣٦ - مَغْنُوطِيَّةٌ بَهِيَّةٌ

*Magnolia denudata*, *M. conspicua*, *M. precia* (S). *Magnolia magnifique, M. yulan* (F).

نوع من المغنولية الأزبينية . جفرتها تملو من ١٠ إلى ١٥ م . أوراقها عابلة ، لامة الصفحة ، تطلو من ٧ إلى ٢٠ سم . وتعرض من ٥ إلى ١٢ سم . أزهارها عطرية ، تسامية البتلات المنصبة ، قطرها يراوح من ١٥ إلى ١٥ سم . لوها إلى البياض الثلجي ونها ضروب وريدي اللون أو حواء . أزهارها يستمر طول شهر نيسان .

## ٢٧٧٣٧ - مَغْنُوطِيَّةٌ زَنْبِيكِيَّةٌ الزَّهَرُ

*Magnolia liliflora* (S). *Magnolia à fleurs de lis* (F).

نوع من المغنولية الأزبينية . ضروبه وأصنافه عديدة ، جميعها جنبات قرعاء تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم . أوراقها عابلة بيضية ، نصلها مقطوم القاعدة ذرب الطرف يطلو من ١٠ إلى ١٥ سم . ويعرض من ٦ إلى ١٠ سم . أزهارها زنبكية الشكل ، سداسية البتلات المملونة ، فواحة العرف السطري . أزهارها يستمر من نيسان إلى أيار .

## ٢٧٧٣٨ - مَغْنُوطِيَّةٌ صَغِيرَةٌ الزَّهَرُ

*Magnolia parviflora* (S). *Magnolia à petites fleurs* (F).

نوع من المغنولية الأزبينية . جفرتها تملو من ٣ إلى ٦ أمتار . أوراقها عابلة تطلو من ١٢ إلى ١٢ سم . وتعرض من ٤ إلى ٨ سم . نصلها مالمس البشرة كثير المروق القواضة . أزهارها بيضاء اللون ، عطرية العرف ، سداسية البتلات ، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٠ سم . || أزهارها يستمر طول شهر حزيران .

## ٢٧٧٣٩ - مَغْنُوطِيَّةٌ صَفْصَافِيَّةٌ الْوَرَقُ

*Magnolia salicifolia* (S). *Magnolia à feuilles de saule* (F).

نوع من المغنولية الأزبينية . جفرتها هريمية الشكل تملو من ٣ إلى ٦ أمتار . أوراقها عابلة ، صفصافية الشكل ، بحرية اللون تطلو من ٦ إلى ١٦ سم . وتعرض من ٣ إلى ٩ سم . أزهارها عطرية العرف ، بيضاء اللون ، ثلاثية الفصل ، سداسية البتلات ، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٢ سم . أزهارها يستمر طول شهر نيسان .



مغنولية

## ٢٧٢٥٦ - مِفْصَلَة ، مُتَوَلِّية

Dédifférenciation (F). Dedifferentiation (E).

المفاصلة أو المايضة الارتدادية ، بيولوجياً ، رجوع الحبيبات أو الخلايا إلى الحالة المضيئة عند زرع الانسجة.

## ٢٧٢٥٧ - مُفْتَح التَّامِين

هو الموزن الذي يفتح عند التاميين بتريقه والتزامه يملح معين . وهو الذي يفاوض وليس على الموزنين الآخرين الذين يقومون بمدد الأملق القبول .

## ٢٧٢٥٨ - مُفْتَرَشَة ، فَارِشَة

نمت تعريفي توصف به النباتات التي تلحف التربة بأوراقها والأشياء المنبسطة الصلصات الكبيرة .

## ٢٧٢٥٩ - مُفْتَرَسَات المَلَكَات

رقبة من الاسماك تعرف أيضاً بلبينات الزماف .

## ٢٧٢٦٠ - مُفْتَرَس

Carbonifère (F). Carboniferous (E).

## ٢٧٢٦١ - مُفَرَّد التَّحْدُب

Plan convexe (F). Convex plane (E).

## ٢٧٢٦٢ - مُفَرَّد التَّكَعُر

Plan concave (F). Concave plane (E).

## ٢٧٢٦٣ - مُفَرَّد الدَّوَر

Monophasé (F). Monophasis (E).

## ٢٧٢٦٤ - مُفَرَّدَات

Simples (F).

هي النباتات الطبية التي يعالجون بها بعض الأمراض .

## ٢٧٢٦٥ - مُفَرَّدَات الأصابع

Périssodactyles (F). Perissodactyla (E).

رقبة حيوانات تشمل ثلاث فصائل : الحلييات والكركتيات والتابيريات .

## ٢٧٢٦٦ - مُفَرَّصَة

Acinaire (F). Acinous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل نبات تملو لحاء ساه أو أغصانه حوصلات صغيرة تشبه الفرد ، وهي تزيينات طبيعية لا علاقة لها بأي وصف كان .

## ٢٧٢٦٧ - مُفَرَّق

Potentiomètre (F). Potentiometer (E).

مقياس فروق الجهد الكهربائي .

## ٢٧٢٦٨ - مُفَرَّقَة

Hachoir (F).

هي الخدعة ، راجعها .

## ٢٧٢٦٩ - مِفْصَاص ، مِفْصَاص

Multilobé (F). Multilobate (E).

ما كان كثير الفصوص أو الفلق .

## ٢٧٢٧٠ - مِفْصَلَة

Ecosseuse (F). Sheller (E).

آلة تستعمل لآلتزاع زرد القرليات من سننها .

## ٢٧٢٧١ - مِفْصَص ، مِفْصَص

Lobé, Lobulé (F). Lobate, Lobed (E).

## ٢٧٢٧٢ - مِفْصَعَة ، فِصَاعَة

Seringue (F). Syringe (E).

صفحة البليا بحرة اللون لامة ، صفحة السبل خلية ملهه . ازهارها غامدة العرف ، فستقية اللون ، قطرها نحو ١٠ سم . ثمارها كالتخاير الصغير تباد بحرة الخضار ثم تحمر شيئاً فشيئاً حتى الإدراك || ازهارها يستمر من أيار إلى تموز .

## ٢٧٢٦٩ - مُتَوَلِّية نَجْمِيَّة

Magnolia stellata (S). Magnolia acollé (F).

نوع من المتوَلِّية النَجْمِيَّة ، ثمرتها هرمية الشكل تملو من ٣ إلى ٥ امتار . أوراقها خالصة مألصة زاهية الخضار تملو من ١٢ إلى ١٤ سم . وتعرض من ٤ إلى ٥ سم . ازهارها مكبة نجمة الشكل تملو من ١٢ إلى ١٨ بلة ، قطرها نحو ٨ سم . يتلاتها عطرية العرف ، يضاء اللون ، قدية الصلصة ، مدبة الطرف ، منبسطة الارتكاز || ازهارها يستمر من آذار إلى نيسان .

## ٢٧٢٦٧ - مُتَوَلِّيات

Magnoliaceae (S). Magnoliacées (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين عديدة الفعالات ، اجناسها ٢٢ ، تشمل زهاء ١٥٠ نوعاً جميعها أشجار ونباتات . أوراقها متعاقبة بسيطة جلدية النصل . ازهارها خنثوية أو وحيدة المسكن ، فردية أو عنقودية التجميع . متبها البلاد الحارة ، فيها الطبية والصناعية والزينية .

## ٢٧٢٦٨ - مُتَغَي

Villa (F).

هي الدارة ، أطبا .

## ٢٧٢٦٩ - مُتَغَيِّرِيَا

Magnésie (F). Magnesia (E).

هي اكسيد المغنيزيوم ، يتغير في تصنيف العناصر الغذائية النباتية من العناصر الأولية .

## ٢٧٢٥٠ - مُتَغَيِّرِيَوْم

Magnesium (F). Magnesium (E).

مدن صلب ، لونه إلى البياض الفضي ، رمزه (Mg) وزنه الذري ٢٤,٣٢ . نقله النومي ١,٧٥ ينصهر في ٦٥٠°م . وهو يمتزج في الهواء الطلق ، اشتعاله بأمر اللهب العاجية . يستعمل في عدة مركبات صناعية . أما ملحه فسهل شديد القابلية .

## ٢٧٢٥١ - مُغِيَّاص

Hygrophile

نمت تعريفي يوصف به كل نبات لا يعيش إلا في المواقع الرطبة .

## ٢٧٢٥٢ - مِفْصَل

Touffu (arbre) (F). Thick (tree) (E).

الشجرة الملتفة الإفصان الكثيرة التورق .

## ٢٧٢٥٣ - مُغَيَّرَة \* ، حَشِيَّة البِطَاص

Mollugo (S). Mollugina (F). Mollugo, Carpet-weed (E). Weichkraut (D). Mollugo (I).

جنس اشباب برية حولية من المغيريات . أنواعه نحو ٣٠ ، أصلاتها البلاد المعتدلة الحارة . جميعها مرصوبة تستحبها الماشية .

## ٢٧٢٥٤ - مُغَيَّرِيَات

Molluginae (S). Molluginées (F). Molluginae (E).

فصيلة نباتية قريبة الشبه من الرجيليات . اجناسها وأنواعها قليلة العدد ، جميعها برية مرصوبة .

## ٢٧٢٥٥ - مُغِيَّاص

Mare (F). Pool, Pond (E).



مليرة

Epouillouse (F).

Cleansing apparatus (E).

صندوق صغير يوضع فيه الطائر باستثناء رأسه لمعالجة ضد الحشرات الطفيلية والقضاء عليها .

Funiculé (F), Funiculat (E). ٢٧٢٩٠ - مِفْصَلِي

نعت تعريفي يطلق في علم النبات على كل عضو مجهز بفنقل .

Argument a fortiori - مَفْهُومُ الْاَوْتُولُوبَةِ ٢٧٢٩١

حجة يراد بها تطبيق نص قانوني على حالة لم ينص عليها المفروض لان هناك اسباباً تجعل تطبيقه على هذه الحالة أولى من تطبيقه على المنصوص عليها .

Argument a contrario (F). ٢٧٢٩٢ - مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ

حجة ثبوتية لتدليل على المخالفة بين الامر الواقع والنص القانوني .

Argument « pari » (F). ٢٧٢٩٣ - مَفْهُومُ الْمَوَافَقَةِ

حجة يراد بها تطبيق نص قانوني على حالة لم ينص عليها لان اسبابها تضاهي اسباب الحالة المنصوص عليها .

Fondé de pouvoir (F). Legal representative (E). ٢٧٢٩٤ - مَفْهُومُ يَافِئُ التَّوَكُّعِ

المفوض له بالتوكيع هو الذي يوكله غيره بالقيام مقامه في بعض ما له من سلطة .

Eléphantiasis (F). ٢٧٢٩٥ - مَفْصُولَةٌ ، ذَكَاءُ الْفَيْسَلِ

التهاب مزمن يصدر جلد قوائم الخيل والبقر .

Ostiole (F). Ostiol (E). ٢٧٢٩٦ - مَقْ

هو الشق الدقيق المستطيل الذي يتفقد عن البوغ عند الإدراك .

٢٧٢٩٧ - مَقَارُ الْقُطْبِ ، مَقَارُ رَاهِبٍ

Fratercula arctica (S).

Macareux arctique, M. moine, M. commun (F).

Sea-parrot, Coulter-neb, Puffin (E).

نوع من المقار ، طائر مائي من فصيلة البيريفقيات . اعطاه المناطق القطبية الاسيوية والاروپية والامريكية . ينزع في زمن الشتاء الماحض الى البلاد الشمالية التي لا ينفرها الجليد || ملجئه الخفايا جماعي . اسرابه وافرة العدد .

قوته الاسماك والقشريات وبعض النباتات || جسمه دمية ، كثر ، يطول نحو ٣٥ سم . يتميز بمقاده البريمي الشكل ، المتساوي الطول والارتفاع . ثوبه العلوي الى السواد الاسم اللامع . ثوبه السفلي وعصره الى اليباض الناصع . عنقه مطوق بقلادة عريضة الجعدة من لون الرأس والرياء . مقاده اكهب اللون ، ازرق القاعدة ، احمر الطرف . صدقة عينه عاجية . اجفانه وكحلته عينيه الى

الجلوة . رساء الى الحمرة البرتقالية الموجاج || الاثنى امير قداً من الذكر وتحتل بنفس الثوب . وكنته ويمتلي بحفرها وترتيبها في اهل مرتفعات الجبال المدة الحصن . الحفنة تتألف من بيضتين فقط . الترخيم الذي يستمر من ٥ الى ٦ اسابيع وتقوم به الاثنى بمناوبة الذكر ، ينجز في الليل فقط .

Articulé (F), Articulata (E). ٢٧٢٧٣ - مِفْصَلِي

نعت تعريفي يطلق على كل عضو مركب من فصل ، كزبان الحشرة فهو مفصلي التركيب .

Arthropodes (F).

Arthropoda (E).

صنف من الحيوانات يشمل شعبة الحشرات وكثيرات الارجل والمكبيبات والقشريات .

Desmodie (F).

نبات تزييني من القرنيات مشهور باسم ارقيس .

Desmodie du Bengale ٢٧٢٧٦ - مِفْصَلِي الْبَنْغَالِ

نبات تزييني مشهور باسم ارقيس هندي ، اطلية .

Champignonnière (F).

Mushroom bed (E).

المكان المد لزراعة الفطور .

Muselière (F).

هي الكماة ، اطلية .

Octographe (F).

المفعل جهاز يستعمل في تسجيل حركات كل كائن حي لمعرفة مدى نشاطه .

Aphromètre (F).

Aphrometre (E).

جهاز يقاس به غنط الغاز الكربوني في قناني الحشر الفوارية .

Rentable (F). Profit-earning (E). ٢٧٢٨١ - مِفْطَال

راجع مرياح .

Van (F). Fan, Van (E).

اداة خاصة تستعمل في ذر البياض لفصل البر من البق . ج مفائل .

Voltmètre (F). Voltmeter (E). ٢٧٢٨٣ - مِفْلَاط

مقياس التحليل القلطي .

Failli (F).

Bank-rupt, Insolvent (E).

هو كل صاحب مستقل او متجر سحكت الحكمة بشهر افلاس .

Pleuronectidae (S).

Pleuronectidés (F), Pleuronectidae (E).

هي جانبيات اليوم ، اطلية .

Décussé (F). Decussata (E). ٢٧٢٨٦ - مِفْلُوقِي

صفة النشو النباتي المتساوي الانغلاق الطولي .

Fissiflore (F).

Fissiflora (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات منفلق التبرجات الزهرية .

Mouflon d'Europe (F).

نوع من الاروية ينحى ااروية كورسيكة ، اطلية .



مَقَارُ الْقُطْبِ

27308 - **مُتَاوِل رَادِف** (F). Sous-entrepreneur (F).  
Sub-contractor (E).

هو الذي يعمل على المقاول في جزء من العمل .

27309 - **مُقَاوِمَة** (F). Résistivité (F). Résistivity (E).

27310 - **مُقَايَسَة ، مَبَيِّن تَفْصِيلِي** (F). Davis (F).

Estimate (E). بيان مفصل بالاعمال المقصودة مقروناً ببيان كلفتها .

27311 - **مُقَايَسَة ، قِيَاس** (F). Echange, Troc (F).  
Exchange, Barter, Truck (E).

عقد يلزم أحد طرفيه الى الآخر شيئاً او يتنازل له عن حق مقابل من احدى او حق آخر . وفي كانت للمقايضة بيع اعيان او حقوق باعيان او حقوق فهي القياس .

27312 - **مُقَابِلَة** (F). Rétrocession (F).

Retrocession (E). التنازل الى الغير عن صفقة بما لها وما عليها .

27313 - **مُقَايِيس** (F). Mesures (F). Measures (E).

27314 - **مُقَبَض ، مِقْوَم** (F). Mancheron (F).

Stille (E). من اجزاء الخمرات ، الخشب التي يقبض عليها الفلاح لضبط التلم .

27315 - **مُقَبِّط** (F). Mélangeur (F). Mixer (E).

آلة تستعمل لتخلط الاشياء كالاسمدة وغيرها .

27316 - **مُقَبَّوْطَات** (F). Recettes (F).

Receipts, Returns (E).

27317 - **مُقَبَّرَة**

المقبوطة نجم ثير من كوكبة برج التوأين مركزه على الركنة اليسرى من التوأين المؤخر .

27318 - **مُقَيِّد** هو القائد ، اطلبه .

27319 - **مُقَيِّر ٥** (S). Maetra (S).

Maetra (F). Maetra (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم وقصيلة المقطريات ، انواعها المعاصرة المعروفة نحو ١٥٠ فصيلة منتشرة في معظم بحار العالم || امداها شبه هرية الشوثرن مائلة السطح ، مثابها معتدلة الطول مزدوجة || تعيش في الرمال المغمورة بالماء قرب المصببات والاعوار || لحمها مأكولة ، جيدة الصنف .

27320 - **مُقَيِّرِيَّات ٥** (S). Maetridae (S).

Maetridae (F). Maetridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة المدج جميعها معتدلة الحجم ، متشابهة الاشكال ، ثنائية المضارع ، مستغلة العلاقات الداخلية || اصلاها معظم بحار العالم اخصها بحار المناطق المعتدلة الحرارة || اشهر اجناسها المقثير والصمراع والصلوحة والكومنجة .

27321 - **مُقَشَّاة** (F). Culture de concombre flexueux (F).

زراعة القثاء وموضع هذه الزراعة كالبيضة الطبخ .

27298 - **مُقَارَض ، مُضَارِب**

Commanditaire (F). Sleeping partner (E).

هو الشريك في احدى شركات القراض او المضاربة فلا يفتن من ديون الشركة الا قدر ما يوزي حصته فاذا كانت شركة القراض بالسهم اطلق على المقارض اسم المساهم .

27299 - **مُقَاَسَة الْمُتَنَازِع فِيه**

Pacte de quota litis (F).

شرط يتنقذ بين المتقاضين والمهاضي على ان اتأب القضية تكون جزءاً من كسبها وهو محظور في اللوائح المهنية .

27300 - **مُقَاَسَة** (F). Compensation (F).

Compensation (E).

وهي اسدى وسائل الوفاء ، تعريفها الشامل ان يتوافق التزامان متبادلان بين شخصين ويكون حمل الالتزامين مبلغاً من النقد او اشياء مثلية من نوع واحد . ويكون مستحق الدفع خالين من النزاع واجبي الوفاء في مكان واحد . واداً ادى احد الالتزامين على الآخر كانت المقاصة في المبلغ الاصل فقط || والمقاصة قد تكون :

Compensation totale (F).

Total compensation (E).

مقاصة تامة مقاصة تعاقدية - باتراضي

Compensation conventionnelle (F). Conventional compensation (E).

مقاصة جزئية

Compensation partielle (F). Partial compensation (E).

مقاصة قانونية

Compensation légale (F). Legal compensation (E).

مقاصة قضائية

Compensation judiciaire (F). Judicial compensation (E).

27301 - **مُقَاَسَاة الضَامِينَ** (F). Poursuite (F).

Suit, Proceedings (E).

وهي القيام بالمساعي والتدابير القانونية للحصول على قرار قضائي او حكم . وهي في القانون الجنائي الإجماع والتحقيقات التي تجري للكشف عن الجاني او المجرم .

27302 - **مُقَاَسَاة الضَامِينَ** (F). Appel en garantie (F).

إدخال الضامن في الدعوى وهو إجراء خاص يراد به ادخال من يكون عليه ضمان في دعوى لم يكن داخلها فيها حتى يعمل من الضمون له ما يمكن ان يحكم به عليه .

27303 - **مُقَطَّاع** (F). Colporteur (F).

Hawker, Pedlar (E).

هو البائع الجوال .

27304 - **مُقَطَّاع** (F). Tâcheron (F).

One working by the job (E).

هو السائل المتقبل .

27305 - **مُقَام** (F). Dénominateur (F).

Denominator (E).

27306 - **مُقَاوِس** (F). Jockey (F).

هو الجوكي الذي يركب جواد الرهان .

27307 - **مُقَاوِل ، مُقْتَرَم ، مُتَعَدِّد** (F). Entrepreneur (F). Contractor (E).

هو الذي يرتبط بمقدد المقاوله ويأخذ على عاتقه القيام بعمل معين يساعده فيه عمال مأجورون .



مقير

٢٧٣٢٧ - مِقْرَاض \* مِقْحَطَة  
Ratissoire (F).  
Sécateur (F). مَقْصُ الشَّجَرِ  
Pruning-scissors (E).  
مَقْصُ تَقْلِمِ بَه أَصْغَانِ الشَّجَرِ .

٢٧٣٣٨ - مَقْرَدُون \*  
Macrodon (S).  
Macrodon (F). Macrodon (E).

جنس اسماك بحرية من مفتوحات الخياطة وفصيلة القرشانيات  
انواعها المرفوعة اربعة اطرافها انحر وبخيرات المناطق  
الاستوائية الاسيوية || اجسامها مستطيلة الشكل ،  
متدلة الطول الذي يراوح من ٢٥ الى ٣٥ سم ، رؤوسها  
متوسطة الحجم ، اشداقها ريشة . اسنانها كبيرة ، ذرية ،  
قوية الصف في الفكين . زعانفها الظهرية متدلة الحجم  
يغلب فيها الشكل المربع . زعانفها الخلفية غليظة  
الارتكاز ، صغيرة القد ، تقابل الظهرية . زعانفها  
التيالية مستديرة الاطراف عند جميع الانواع . اقواسها  
من الرتبة الى الكهبة . رؤوسها وظهرها اقرب غضابا  
من بطنها || لحونها متوسطة الصنف ، مأكولة || اعرف  
انواعها واشهرها مقردون ترابيرا (Macrodon trahira)  
الذي يكثر وجوده في انهر البرازيل والفويان .

٢٧٣٣٩ - مَقْرَط  
Pinceuse-rogneuse (F).  
اداة تستعمل لقطع شروخ الكوية .

٢٧٣٤٠ - مَقْرَعَة  
Courgerie (F).  
منبت القرع ويوضع زراعته .

٢٧٣٤١ - مَقْرَعَات  
Ascoceratidae (S).  
Ascoceratidae (F). Ascoceratidae (E).  
مرتبة من الرخويات تنتمي الى رتبة رباعيات الخياشيم  
فصلها وأجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها من  
متصغيرات الازمنة النارية .

٢٧٣٤٢ - مَقْرَنِس \*  
Macrorrhinus (S).  
Macrorrhine (F). Macrorrhinus (E).

جنس حيوانات لبونة ، مائية ، من فصيلة الققميات .  
انواعها المرفوعة قليلة العدد ، اعطائها بعض مناطق المحيط  
الهادي || اجسامها كبيرة القد . ذكورها اكبر من اناثها  
واضخم . رأس الذكر حديد المَقْدَم ، غليظ الشكل ،  
ينتهي بتفيل اسنن فكه العلوي يشرف على السفلي ، منته  
وقوامه قصير || قوتها الاسماك والرخويات والقشريات  
اللائي تقع جروا واحدا في العام || تصاد من اجل جلدها  
وزيوتها وعظامها || اعرف انواعها الفرطاني والضيقي  
الحلم .

٢٧٣٤٣ - مَقْرِنِسُ فِرْعَاوِي \*  
Macrorrhinus leoninus (S).  
Macrorrhine leonin (F).

نوع من المقرنيس . اعطائه مناطق جنوب المحيط الهادي .  
طوله نحو ٩ امتار ، فوهه كسني اللون يمتد عند الظهر  
ويصفر عند البطن .

٢٧٣٤٤ - مَقْرِنِسُ صَبِيحُ الخُطْم \*  
Macrorrhinus angustirostris (S).  
Macrorrhine à rostre étroit (F).

نوع من المقرنيس . اعطائه مجامح المكسيك وكليفورنية .  
طوله نحو سبعة امتار . ثوبه الى الجروطة السعداء المواج  
تتبع عند الظهر وتضيق وتبرز عند البطن .

٢٧٣٣٣ - مَقْدَفُ خَارِجِي \*  
Exopodite (F).  
نصل هريض قاطع مركب حل حضا تتحد به الاقدام  
والاغصاب .

٢٧٣٣٤ - مَقْدَفُ دَاخِلِي \*  
Endopodite (F).  
المقدف الداخلي ، زورولويجا ، جزء مفصل من الفك  
مركزة في الجانب الخارجي من الحرقفة حيث يشرف على  
الركبة || والمقدف الخارجي ، زورولويجا ، جزء من  
زوائد المفصليات يعملو ، مع المقدف الداخلي ، القسم  
القاعدي .

٢٧٣٣٥ - مَقْدَمُ الإِرْت  
Avancement d'hoirie (F).  
هو التبرع لاحد اقوية الإنسانين بجزء من نصيبه في  
تركة التبرع .

٢٧٣٣٦ - مَقْدَمُ الجِصْم \*  
Avant-main (F). Fore hand (E).

في الخليل والانعام وما اشبه .

٢٧٣٣٧ - مَقْدَمُ الجَوْشَن \*  
Prothorax  
هو في الحشرات القسم الاول من الجوشن او الحلقة  
الصدرية الاول .

٢٧٣٣٨ - مَقْدَمُ المِحْرَات \*  
Avant-train (F). Wheels (E).  
الجزء الامامي من المحرات حيث يوجد الناظم والميلتان .

٢٧٣٣٩ - مَقْدَمَات \*  
Primates  
هي الرئيسات ، رتبة من الثدييات تشمل مراتب البشرات  
والقرديات والليموريات .

٢٧٣٤٠ - مَقْدَمُورُ القِسْمَةِ ، قَابِلُ القِسْمَةِ ،  
مُقَسِّم  
Divisible  
هو ما كانت قسمته جائزة .

٢٧٣٤١ - مَقْدَمُوتِس \*  
Peril (F).  
نبات يقل شعوره باسم بقدونس ، اعلية .

٢٧٣٤٢ - مَقِير \*  
Amer (F). Bizar, Marsh (E).  
مقر الشئ . صار مرأ فهو مقر .

٢٧٣٤٣ - مَقِير \* مَقْعَدَان \*  
Alots (F).  
هو الاولوة ، آتات صناعي وتضفي .

٢٧٣٤٤ - مَقِير \*  
Acaule (F). Acaulous, Stemless (E).  
النبات العديم الساق ويديم ايضا نجمة .

٢٧٣٤٥ - مَقِيرَاس \* مَقْرَاك \*  
Réfrigérateur (F).  
Refrigerator (E).

٢٧٣٤٦ - مَقِيرَاس \*  
Greffoir (F).  
Grafting-knife (E).

سكين خاصة منققة الطررف تستعمل في التطعيم .



مَقْصُ



مَقْرَاض



مَقْرَاض



مَقْرَدُون



مَقْرِنِسُ فِرْعَاوِي



Cotonnerie (F). **مَقَطَنَة** - ٢٧٣٦٣  
Cotton-plantation (E).  
الأرض التي تزرع فيها الأقطان . ج. مَقَاطِن .

Chapon (F). Capon (E). **مَقْفُوش** - ٢٧٣٦٤  
هو الطير الذي فرخ الدجاج الخفي . ج. مَقَافِيش .

Tronqué (F). Truncate (E). **مَقْطُوم** - ٢٧٣٦٥

Epicyrus (S). Epicyrte (F). \* **مَقْطِي** - ٢٧٣٦٦  
جنس اسماك نهريّة من مقنحات الحانة وفصيلة السلمونيات .  
انواعه المعروفة قليلة العدد . اطلقها بعض انهر البلاد  
الحارة الاسيوية والامريكية || اجسامها اعليانية مبطنة  
تطول من ٣٠ الى ٢٥ سم . رؤوسها مستطيلة ، قصيرة .  
عينها كبيرة جاحضة ، اشداؤها رجيّة . ظهورها ربيعة ،  
مقننها يشرف على الرأس . تتميز بزيانها الفخمة والشرجيّة  
المستطيلة وبالطهرية الثنائية العدد المتفاوتة الحجم . اقواها  
الى الريكة يملوها موج نفسي || حولها مأكولة .

Alois (F). **مَقْعَدَان** - ٢٧٣٦٧  
هو الألوّة والمقر .

Gibbeux (F). Gibbous (E). **مَقْعَر** - ٢٧٣٦٨  
نعت تعريفي توصف به الاشياء المقعرة السطوح ومنها  
الأوراق والازهار .

Concavilligne (F). **مَقْعَر الاطراف** - ٢٧٣٦٩  
Concaviline (E).  
نعت تعريفي ومعني يتصل في تصنيف اللؤلؤين اشخاصها  
الليل والاقطار . ويكون مقعر الاطراف ذا جهة مقعرة  
وحجاج بارز وكفل منحن الخ...

\* **مَقْل** - ٢٧٣٧٠

Balsamodendron africanum, Haudelotia africanum  
(S). Balsamée d'Afrique, Arbre à baume (F). Bal-  
samodendron ksa, Bdellium tree (E). Afrikanischer  
Balsambaum (D). Albero balsamo d'Africa,  
Bdellio (I).

نوع من اللسان وفصيلة البخوريات ، منته البلاد الافريقية .  
يكثر في تمام حوض البحر الاحمر . شجرته متوسطة القد  
فرواه . اوراقه مركبة ثلاثية الوريقات البيضية الشكل  
المغطية الاطراف . ازهاره فردية محورية رباعية التركيب .  
ثمارة جراه رباعية الفلق . يستخرج من ساقه عصارة  
وراثنية بخورية فاخرة الصنف ويستعمل من زهره عطر  
حزير .

Marrube blanc (F). **مَقْل الصَّيْف** - ٢٧٣٧١  
هو الفراسيون الابيض ، اطلبه .

Bdellium indicum (S). **مَقْل الْيَهُود** - ٢٧٣٧٢  
Balsamée de l'Inde (F). Indian bdellium tree, False  
myrrh, gahal (E). Indisches Bdelliumbaum (D).  
Bdellio (I).

نوع من اللسان وفصيلة البخوريات . يكثر في بعض  
الاصقاع الهندية . شجرته صغيرة القد . اوراقه مركبة  
ثلاثية او خاسية الوريقات . ازهاره رباعية التركيب  
قواعة العرف || يستخرج من ساقه عصارة راثنية بخورية  
تستعمل في المايه ويستعمل من اوراقه دمن عطري  
مغروب فيه .

Malaxage (F). **مَقْس** - ٢٧٣٤٥  
Kneading, Working (E).  
مقس الزبدة بعد فصلها عن الخيض وضلها لتجانس  
اجزائها بعد طرد الهواء منها .

Sébastien (F). **مَقْسَاس** - ٢٧٣٤٦  
هو الدبق ، شجرة حرجية صناعية .

Crémomètre (F). **مَقْسَاد** - ٢٧٣٤٧  
Crémometer (E).  
مقياس القشدة .

Ebogueuse (F). **مَقْشَر** - ٢٧٣٤٨  
آلة تنزع القشور للشالكة التي تثلث ثمار الكستنا .

Décortiqueur (F). **مَقْشَرَة** - ٢٧٣٤٩  
Disbarbed (E).  
أداة من حديد تستعمل في تنظيف سوق بعض الاشجار  
من القشور اليابسة .

Sécateur (F). **مَقْصَ البُسْتَانِي** - ٢٧٣٥٠  
Pruning-shears (E).  
مقص البستاني . ويقص التقليم ومقص الشجر والمقراض  
واحد .

٢٧٣٥١ - **مَقْصَ الخَضِير** هو المبر ، اطلبه .

Cannale, Roselière (F). **مَقْصَبَة** - ٢٧٣٥٢  
Cane-plantation, Reed-bed (E).  
كل مكان زرع فيه القصب بكثرة او بيت طيبا .

Faux (F). Scythe (E). \* **مَقْصَب** - ٢٧٣٥٣  
أداة كالنجل كبيرة الشفرة المستطيلة تستعمل في الحصد  
والخش .

Luzernière (F). **مَقْصَبَة** - ٢٧٣٥٤  
Lucerne-field (E).  
المكان المخصص لزراعة القصب أي القصة .

٢٧٣٥٥ - **مَقْط** غيط يصاد به الطير .

Colportage (F). Hawking (E). **مَقْط** - ٢٧٣٥٦  
هو بيع التجوال .

Multipolaire (F). **مَقْطَاب** - ٢٧٣٥٧  
Multipolar (E).  
كثير الاقطاب .


٢٧٣٥٨ - **مَقْطَاع** ° ، **ميكرو توم** ° Microtome

Distillerie (F). **مَقْطَرَة** ° - ٢٧٣٥٩  
Distillery, Still-house (E).  
صناعة التقطير . وسيل انتاجه .

Section **مَقْطَع** - ٢٧٣٦٠

Soc (F). Ploughshare (E). **مَقْطَع** - ٢٧٣٦١  
جزء رئيسي من المحراث مكانه وراء السكين وظيفته قطع  
كتلة التراب انقيا .

Griffe (F). Root (E). **مَقْطَم** - ٢٧٣٦٢  
القطم ج. مَقَاطِن : هي الفروع الناشئة من اروة الخليلين  
واشباعه من النبات .



مَقْصَب



مَقْطَاع



مَقْلِي



مَقْل

## Lippe (F). ٢٧٣٨٥ - مَكْتَمَة ، مِقْتَمَة

Thick lower lip (E).  
هي المزمة اي شفة الحيوانات المجترّة كالإبل والقار والاعنام  
وللأعز .

## Pacte (F). Paw (E). ٢٧٣٨٦ - مَقْتَب

كف الأسد ، مخلب الأسد في مقبه ، ج قروب .

## Chênevière (F). Hemp-field (E). ٢٧٣٨٧ - مَقْتَبَة

مزدرع القنب مها اتسع .

## Mimule (F). ٢٧٣٨٨ - مَقْتَبَة

هي الدندل ، اطلبه .

## Calyptraes (S). ٢٧٣٨٩ - مَقْتَبَة \*

## Calyptrée (F). Calyptraes (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الارسل  
وحيدات الاجهزة وفضيلة القروصيات . انواعها المعروفة  
عديدة بعضها من متحجرات الطبقة الطباشيرية والثالدية  
والبيض الآخر معاصر منتشر في جميع بحار العالم ، جميع  
انواعها تحفر الشلق على الصخور ملحوظاً بارجلها ||  
اصداؤها يرمية الشكل . رؤوسها قصيرة مفلوكة المقدم .  
اقواها مستديرة . لوامسها مستطيلة . عيونها قصيرة قاعدية .  
غشائيمها حلبيّة الشكل ، قاسية .

## Miconia (S). Miconie (F). ٢٧٣٩٠ - مَقُونَة

## Indian bush (E). Mikonie (D). Miconia (I).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة القزانيات .  
انواعها زهاء ٥٥٠ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية .  
اوراقها لا قياسه الشكل والترتيب . انزعارها ابطية وطرفية  
الارتكاز . مجارها حمية مستديرة قاسية القشور . منها انواع  
حمية . اوراقها حطرة تستعمل استعمال الشاي ومنها طيبة  
يستعملون مجارها في معالجة حلل المرارة . ومنها صناعية  
صبغية غشائها اصفر اللون جيد الصنف .

## Licol, Licou (F). Halter (E). ٢٧٣٩١ - مَقُون

اداة من جلد أو حبل تستعمل لقيادة الدواب .

## Starter ٢٧٣٩٢ - مَقُون

حبل تصف عليه الخيل عند السباق . ج مقاروس .

## Bouleté, Juché (F). ٢٧٣٩٣ - مَقُون احْوَشَب

## Upright on fetlock-joint (E).

تقويس في حوشب الفرس يعتبر من حوشب الخيل القاصصة .

## Arqué, Brassicourt (F). ٢٧٣٩٤ - مَقُون الرَكْبَة

## Bandy-legged, Knee-sprung, Arched (E).

نعت يوصف به الفرس المقوس الركبة طبيعياً لا عن مرض  
ولا عن هرم .

## ٢٧٣٩٥ - مَقُونَس

وطائر معروف مطرق سواده في البياض كالحمام . (الجانظ).

## Machon (F). ٢٧٣٩٦ - مَقُون

فرافقة من المذانيات ، يرتقا تعيش على اوراق الجوز

والشبار . راجع مذئاب مقون .

## ٢٧٣٧٣ - مِقْلَاب ، ذاكثرة الانقلاب

## Tropique (F). Tropic (E).

المقلاب أو دائرة الانقلاب الحزام القائم بين دائرتي  
الانقلاب الصيفي والشتوي اي دائرة السرطان ودائرة  
الجدي .

## Tropical (F). Tropical (E). ٢٧٣٧٤ - مِقْلَاب

نعت تعريفية يطلق على كل ما له صلة بالمقلاب كقوك  
المناع القلاني والأمطار المقلابية والمنطقة المقلابية وهي  
أحر مناطق الكون .

## Atmomètre (F). ٢٧٣٧٥ - مِقْلَاص

## Atmometer (E).

جهاز خاص تقاس بولسته مقادير سوائل تبخرت في  
مدة معينة .

## Versoir (F). Mould-board (E). ٢٧٣٧٦ - مِقْلَب

جزء المحراث الذي يقلب كتلة التراب بعد أن يقطعها  
المقطع .

## ٢٧٣٧٧ - مِقْلَبَة ، مَقْتَب

## Tropicalisation (F).

المقلبة جعل المواد والقوازم الصناعية وغيرها لا تتأثر  
بالمناخ المقلابي .

## ٢٧٣٧٨ - مِقْلَبَة القاصي ، مَقْتَب شوكي

## Melocactus (S). Mélocacte, Mélocactus, Melon-car-

## don (F). Melon-thistle, Turk's-cap cactus (E). Melon-

## enkactus (D). Papone spinoso (I).

جنس نباتات لحمية شائكة من فصيلة الصباريات . انواعه  
نحو ٣٠ مقلها تزيين . اصلها البلاد الحارة . سوقها  
عظيمة الشكل ، مخززة ، شائكة ، عاصمة الورق . انزعارها  
اورسوسية الارتكاز ، كبيرة القد ، جميلة القالب والالوان  
الزاهية . مجارها ، صنية حراء اللون ، ملساء البشرة .

## Fauchard (F). Slash-hook (E). ٢٧٣٧٩ - مِقْلَب

المنجل يقطع به القث والشب .

## Carrière (F). Quarry (E). ٢٧٣٨٠ - مَقْن

ويدعى الحجر والمقطع ، هو المكان الذي تستخرج منه  
الحجارة .

## Déplantoir (F). ٢٧٣٨١ - مَقْن

## Garden-trowel (E).

اداة تستعمل لقلع النباتات الصغيرة مع ثني من التراب  
يحفظ شروشها ردياً تفرس في مكان آخر .

## Dégazonneuse (F). ٢٧٣٨٢ - مَقْلَعَة الخضير

## Unturfier (E).

محراث مفلطح المقطع الرخيص القصير ، له سكينان ، يستعمل  
في اقتلاع الخضير .

## Conserves (F). ٢٧٣٨٣ - مَقْلَعَات

## Conserves, Preserves (E).

هي الاطعمة المحفوظة المقطوع منها الهواء . وشهم من  
سماها معلبات . ويدعى ساءاً في مصر ، الكنسروة  
والكنسروات .

## ٢٧٣٨٤ - مَقْم

تضيب الثور والتيس وأجل . والمقلعة : وماء التضيب .



مَقْلَة القاصي



مَقْن



مقوَّنة



مقير

٢٧٤١٠ - مِقْيَاسُ الْغُلُوكُوزِ ، هِيْرَاَنُ الْغُلُوكُوزِ  
Pèse-moût, Glucomètre, Glucomètre (F), Glucometer (E).  
أداة تقاس بها المواد السكرية في عصير العنب أو في الخمر .

٢٧٤١١ - مِقْيَاسُ الْعَبْلَانِ  
Ebulliomètre, Ebullioscope (F), Ebuliometer (E).  
جهاز يمكن من معرفة درجة الحرارة للأزمنة لعلبان كل جسم أو مائع .

٢٧٤١٢ - مِقْيَاسُ الْقَشْدَاةِ ، هِيْرَاَنُ الْقَشْدَاةِ  
Butyrosopé, Crémomètre (F), Creamometer (E).  
هو المكثاة ، أداة تقاس بها نسبة القشدة في الحليب .

٢٧٤١٣ - مِقْيَاسُ الْقُوَّةِ  
Dynamomètre (F), Dynamometer (E).  
هو المنشاط ، أطلبه .

٢٧٤١٤ - مِقْيَاسُ الْكُحُولِ  
Pèse-esprits (F).  
هو المكحال ، أطلبه .

٢٧٤١٥ - مِقْيَاسُ الْكِلْسِ  
Calcmètre (F), Calcimeter (E).  
هو المكلاس ، جهاز يبين مقدار كربونات الكلس في التراب .

٢٧٤١٦ - مِقْيَاسُ الْمَسَاكِ  
Glossomètre, Glottomètre (F), Glossometer (E).  
هو اللسان ، جهاز يقاس به خطوط اكتمل لمرقة الاتواع الاصلع من غيرها في ارتشاش رقيق الزهر .

٢٧٤١٧ - مِقْيَاسُ اللَّوْنِ  
Colorimètre (F), Colorimeter (E).  
هو للوان ، جهاز يقاس به مقدار تلوّن السوائل والمائات لا سوا الخمر ، اطلب ملوان .

٢٧٤١٨ - مِقْيَاسُ مَيَوِيَّ  
Centésimal (F), Centesimal (E).

٢٧٤١٩ - مَقِيرٌ \* ، مَكِيرٌ  
Makaira (S), Makaire (F).  
جنس اسماك بحرية كبيرة القد من شائكات الزعانف وفصيلة الاسقمريات . انواعه المعروفة ثلاثة جميعها قريبة الشبه من صياث البحر ، اشهرها المقير الاسود الذي لا يقل طوله عن اربعة امتار وهو يتميز بكثر زعنفته الظهرية التي تشبه الشراخ ويمجازه المنظي الذي يند من فكه الاصل على شكل السيف .

٢٧٤٢٠ - مِقْيَفٌ  
Ehretia (S), Ehretia, Cabrillet (F), Ehretia (E), Ehretie (D), Ehretia (I).  
جنس اشجار وبجيرات من فصيلة الحمسنيات . انواعه نحو ٦٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والاستوائية . اوراقها متعقبة أو متعاقبة أو متعاقبة . ازهارها عسكوية التجميع ، ابطية الارتكاز وطرية . ثمارها مأكولة لكنها تقهه وهي نوية ، طمية ، قدراها قدر الحصة الكبيرة || اشهر انواعه ما يلي .

٢٧٤٢١ - مِقْيَفٌ كَبِيرُ الْوَرَقِ  
Ehretia macrophylla (S), Ehretia à grandes feuilles, Cabrillet à grandes feuilles (F).  
نوع من المقيف ، ثيبرته سريعة تطل من ه إلى ٨ امتار .

Mucuna (S).

Mucuna, Pois à gratter, Pois poulleux (F), Cowitch, Cowage (E), Jackfasel, Steechende Echte Fasel (D), Fagiolio di Rio Negro (I).

جنس نباتات حارثة من فصيلة البقوليات القرشائية . انواعها نحو ٢٥ ، اعطائها البلاد الاستوائية والحارة . سوقها لولية التبريش ، سوائها ثنائية . اوراقها مركبة ، طويلة الزناد ثلاثية الورديات . ازهارها كبيرة القد حراء اللون ، سنفاتها مفلطحة عجيبة مستطيلة الهدبة الطرفية الشائكة . بزورها مستديرة ، مبطلة ، هلبة البثرة ، تغفل عند لسها ما يفعله القراص .

Echelle, Mesure (F), Ladder, Scale (E).

٢٧٣٩٩ - مِقْيَاسُ اعْتِمَارِ اللَّبَنِ ، مِصْرَابٌ  
Lacto-fermentateur (F).  
أداة تعرف بوانتها جودة اللبن . اسماها أن الحليب الردي يروب قبل الحليب الجيد في حرارة مملونة .

٢٧٤٠٠ - مِقْيَاسُ الْأَدْهَانِ  
Oléomètre (F), Oleometer (E).  
أداة تقاس بها كثافة الادهان وتدعى مدعان .

٢٧٤٠١ - مِقْيَاسُ الاسْتَوَاءِ  
Niveau (F), Level (E).  
هو القادان ، أطلبه .

٢٧٤٠٢ - مِقْيَاسُ الْأَشْعَةِ  
Actinométre (F), Actinometer (E).  
آلة تقاس بها قوة الاشعة لا سوا الاشعة الشمسية .

٢٧٤٠٣ - مِقْيَاسُ الْأَمْلاحِ  
Pèse-sels (F), Araeometer for salt liquids (E).  
مستكشف يبين بمرقة درجة كثافة الاملاح .

٢٧٤٠٤ - مِقْيَاسُ الْجِصِّ  
Gypsomètre (F), Gypsumeter (E).  
هو المقيصاص ، أداة تستعمل لقياس كبريتات البوتاس في الخمر .

٢٧٤٠٥ - مِقْيَاسُ الْحَبِّيبِ  
Aphromètre (F), Aphrometer (E).  
هو المقفعا ، جهاز يقاس به ضغط الغاز الكربوني في قناني الخمر الفلوزة .

٢٧٤٠٦ - مِقْيَاسُ الرُّطُوبَةِ  
Hygromètre (F), Hygrometer (E).  
هو المرطاب ، أطلبه .

٢٧٤٠٧ - مِقْيَاسُ السُّطُوحِ  
Planimètre (F), Planimeter (E).  
هو المسطاح ، أطلبه .

٢٧٤٠٨ - مِقْيَاسُ السُّكَّرِ  
Saccharimètre (F), Saccharimeter (E).  
هو المسكار والمسقار ، أداة تبن مقدار السكر المذاب في السائل المقصود .

٢٧٤٠٩ - مِقْيَاسُ الشَّجَرِ  
Dendromètre (F), Dendrometer (E).  
هو المشجار ، أداة تستعمل لتقدير علو الشجرة وصيحتها .

Imperméable (F).

Imperméable, Impervious (E).

٢٧٤٣١ - مِكْتَام

صفحة التربة التي تملك الماء .

Acquis (F).

Acquired, Secured (E).

٢٧٤٣٢ - مِكْتَسَب

نمت تعريفاً تمتت به الصفة المكتسبة من الحيوان أو النبات حسنة كانت أم سيئة . وكلمة مكتسب هي نقيض خلتى أي فريسي .

Acquies (F).

An acquisition (E).

٢٧٤٣٣ - مِكْتَسَبَات

هي الاموال التي يكتسبها الزوجان في أثناء الزواج .

٢٧٤٣٤ - مِكْتَل ، سَل

Vendangeoir, Vendangaret (F). Grape-basket (E).  
وعاء ينقل فيه العنب من الكرم الى المصرة .

Bréviligne (F). Breviline (E).

٢٧٤٣٥ - مِكْتَل

نمت تصنيفي يطلق على الحيوانات القصيرة الجال المحيكل بالنسبة الى متوسط جال نوصها . أو ملانها .

Enclave (F).

Enclave, Gore (E).

٢٧٤٣٦ - مِكْتَنَفَة ، حَبِيسَة

كل ارض لا طريق لها ، والقانون يعطي صاحبها حق المرور .

Mycterus (S).

٢٧٤٣٧ - مِكْتِير \* \*

Myctère (F). Mycterus (E).

جنس حشرات من فصيلة السليبيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة سبعة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة والباردة || اجسامها صغيرة ، اعلاحيية الشكل ، تطول من ٦ الى ١٠ سم . رؤوسها صغيرة ، مستطيلة الاعظام . عيونها بارزة . تاشبهها وفكوكها وملابسها نظامية . قرونها الاستشعارية قلادية . كراسلها معدودة . اغامها لافعة . قوائمها نشطة . اثنائها وحيدة اللون ، تكثر فيها السمرة الفحمة والجلوة . كواسلها واغامها مغلقة بخيل دقيق اشبه اللون أو اخضر . تألف الحراج والبراري والحدائق . جميعها واثمة . اما البرقة فنادسة .

٢٧٤٣٨ - مِكْتِير ، شَبِيرُو Mycteria (S). Jabiru

جنس طير من اللقالق ، انواعه المعروفة ثلاثة : المِكْتِير الافريقي والامريكي والاسرائلي . جميعها كبيرة القد ، تتميز بمناقيرها الغليظة المستطيلة المسروبة القاعدة . اجنحتها رافلة . اذنانها قصيرة مربعة . ارسافها رقيقة . اصابعها كبيرة القد صغيرة الخياط والغالاب || اعرف انواعه واشهرها المِكْتِير الافريقي .

٢٧٤٣٩ - مِكْتِيرُ الْفَرِيقِي \* ، مِكْتِيرُ السَّنْفَال ،

لَقْلَقُ مَسْرُوجُ الْيَنْقَار . اَبُو مَيَّة ،

اَبُو مَيَّة Mycteria senegalensis (S).

Jabiru du Sénégal (F). Saddle-billed stork (E).

طائر من المكتير، موطنه افريقية الغربية . يكثر في السنغال . طوله نحو ١٥٠ سم . رأسه وصنقه وجناحاه وذنبه الى السواد اللامع الاسفح المواجه . اما سائر توبه فالى البياض الثلجي . حذقة عينه صليية . منقاد احمر الجسم تتوسطه لطفة

اعطائها فسيحة الارجاء تمتد من الهند الى اليابان . ساقها اسطوانية . فروجها مضطمة زياء اللحاء . اوراقها متعاقبة ، بيضية ، مقطوعة الطرف ، تطول نحو ٢٠ سم . ازهارها بياض اللون . ثمارها مأكولة .

٢٧٤٣٢ - مِفْيَت مُدْبِبُ الْوَرَق

Ehretia acuminata (S). Ehretia à feuilles acuminées, Cab. illet à feuilles acuminées (F).

نوع من المقيف وهو شجيرة جاذبة تملو من ٥ الى ٦ أمتار . مهددا الهند . ساقها وفروجها اسطوانية ملسة . اوراقها متعاقبة ، سنانية الشكل ، ذرية ومديبة . نصلها يطول من ١ الى ١٠ سم . ويعرض من ٢ الى ٤ سم . وهو مستطيل النسق ، مسنن الحافة ، لاص الصفحة || ازهارها بياض اللون . ثمارها مأكولة .

٢٧٤٣٣ - مِفْيِي \* Emétique (F). Emetic (E).

Emétique (F). Emetic (E).

٢٧٤٣٤ - مِكَا ، مَكُو Terrier (F).

Burrow, Hole (E).

هو جحر القزاع أي الارنب البري ونحوه . ج امكاه .

٢٧٤٣٥ - مِكَا \* Lepidium meyenil (S). Maca (F).

نبات حولي يقل من فصيلة الصليبيات . مهدد بعض مرتفعات جبال الالاند الاسريكية . ساقه لفتية الشكل والقد ، مأكولة . اوراقه قرصية الانشباب ، مركبة ، ورشية . شمرانه الزهري يملو نحو ٤ سم . ازهاره حشوكلي . ازهاره صغيرة القد ، وردية اللون . غريباته محبة مستطيلة . يزوره كروية دقيقة || يتكاثر باليزر . منته الاقالم الجردية . يرغب في الارربة الحارة الوافرة العناصر الغذائية .

٢٧٤٣٦ - مِكَا \* Certhiula (S). Sirli (F).

Bifasciated lark (E).

جنس طير من فصيلة القيريات . انواعها ستة ، بعضها صحراوي وبعضها من طور الشرق الادف واروبة ولسا جميعها تصيد في الجو ويهبط وهي في ذلك تمكو وتصفر . اجسامها صغيرة القد تطول من ٢٢ الى ٢٤ سم . اثنائها متداخلة الاثان يكثر فيها الاخراج والاضطل . صاويرها موشة . اعتاقها يبيض . مناقيرها قوية مستطيلة منقوشة الطرف . غالبها نشيطة . سادة الاظفار . تمكثها من استنثار التربة . || تألف الغشاب والاراضي الملحسة . قوتها الحشرات واليزور البرية || تلتش عنها في افحوص بين الاذغال والحشيم . حشفتها حولية تتألف من ٤ أو ٥ بياضات تحضنها بمناوبة الذكر .

٢٧٤٣٧ - مِكَا فَاة ، اَنْعَاب Emolumenta (F).

Remuneration (E).

هي ما يمنح من تمويض عن القيام بأمة لتأدية .

٢٧٤٣٨ - مِكَا كَة ، مِكَا كَة Moelle (F). Pith (E).

القسم الداخلي المركزي من ساق النبات .

٢٧٤٣٩ - مِكَا كِي Médullaire (F).

Medullary, Medulla (E).

٢٧٤٣٠ - مِكَبَس Presse (F).

Pressure, Throng (E).

آلة ضاغطة مختلفة الاشكال والاحجام تستعمل في عدة صناعات لغايات معينة .





مِكْنَاة



مِكْنَال



مِكْنَال الحمر



مَك



مَكْرَة مَبْلُوءَة



مَكْرُور نَظِي



مَكْرُور مَبْلُور

القائمة ذوب الزام الاخير ، يبدو احمر اللون ويستقر حل  
الخضار البحري تملوه خلة كثيفة . بتلات ازهارها صفيرة  
ضخيمة تطول نحو ٢ سم . ثمارها حامضة لا تؤكل .

### ٢٧٤٥٤ - مَكْرُورَة مَبْلُوءَة \* مِكْنَاة

*Amelanchia rotundifolia*, *A. vulgaris* (S). *Amélan-*  
*chier commun* (F). *Savoy medlar*, *Service-berry* (E).  
*Felsenbeer*, *Felsenbirne*, *Gemeine Felsenbeer*,  
*Traubenbirne* (D). *Aronia* (I).

نوع من المكر وهي جنبة مبلولة تملو من ١٠٠ الى  
٢٠٠ سم. اوراقها بيضيه مستديرة الطرف تطول نحو  
٤ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصلها يبدو قطبي الصفحة  
السفل ثم يستقر حل الحملة . بتلات ازهارها خلية البشرة .  
ثمارها سكرية الطعم مأكولة تطرها نحو ١ سم.

### ٢٧٤٥٥ - مَكْرُورَة يَابَانِيَّة

*Amelanchia asiatica* (S). *Amélan-*  
*chier du Japon* (F).  
نوع من المكر وهي شجرة دائمة متوسطة القد تملو من ٥  
الى ١٢ م. اوراقها سنانية ، نصلها خلي الصفحة مسنن  
الحافة يطول نحو ٧ سم. ويعرض نحو ٤ سم. بتلات ازهارها  
قدية الشكل خلية الصفحة الخارجية ، ثمارها سكرية الطعم  
مأكولة تطرها نحو ٢ سم.

*Carlsae* (S).  
*Cherry-orchard* (E).  
هي مزدوج الكرز .

### ٢٧٤٥٧ - مَكْرُورُومُ النَخْلِ °

هو زفقوق النخل ، اطلبه .

### ٢٧٤٥٨ - مَكْرُور °

*Macrurus* (S).  
*Macroure*, *Lépidolèpre*, *Grenadier* (F).  
*Macrurus*, *Rat-tail* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة المَكْرُورِيَّات . انواعه  
المبروفة ثمانية منتشرة في معظم بحار المناطق الحارة . جميعها  
مستطيلة الاخطام الذلقة ، قصيرة الاشداق السفلى ،  
كبيرة العين الجاحضة ، مستطيلة القدم ، مستدقة المؤخر  
النامد الزنفة ، سفنها مثلت الزباز ، مستطوق الطرف  
الشائك || اشهر انواعه المَكْرُور المَبْلُور والتفقي .

### ٢٧٤٥٩ - مَكْرُورُ لَفِي °

*Macrurus trachyrhynchus* (S).  
*Macroure argenté*, *Lépidolèpre argenté* (F).  
نوع من المَكْرُور يكثر ويبدو قرب الساحل الافريقي  
من البحر المتوسط والخليج الاطلسي . طوله نحو ٤٠ سم .  
ثوبه الى الطحلة الغضبية المواج يقيم مع اقترابه من الظهر  
ويبيض عند البطن . لحمه متوسط الصنف مأكول .

### ٢٧٤٦٠ - مَكْرُورُ مَبْلُور °

*Macrurus calceorrhynchus* (S). *Macroure commun*,  
*Lépidolèpre commun* (F). *Common Rat-tail* (E).  
نوع من المَكْرُور يكثر ويبدو في البحر الابيض المتوسط .  
طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الريدة البنفسجية المواج يقيم  
عند الظهر ويميل الى التفقي عند البطن . لحمه متوسط  
الصنف مأكول .

### ٢٧٤٦١ - مَكْرُورِيَّات °

*Macrouridae* (S).  
*Macrouridés*, *Macruridés* (F). *Macrouridae* (E).  
فصيلة اسماك بحرية من المملوالت شاكلات الزعانف .  
اجناسها وانواعها متوسطة البدن . اطلاتها بحار المناطق

سواء . اساقه الى الكعبة المابقة يطورها مواج احمر || يعيش  
ذكراً وانثى لا يفترقان . يَأْتَف مجاري الماء وصفات الأنهر  
وشواطئ البحر . قوته الخضرات والنبهات والاسماك .  
يُذَن في الاشجار . انتاه تحضن اربع بيضات .

### ٢٧٤٦٠ - مِكْنَاة \*

*Crémomètre* (F).  
*Creamometer* (E).  
اداة تقاس بواسطتها نسبة القشدة في الحليب .

### ٢٧٤٦١ - مِكْنَف

*Densimètre* (F).  
*Densimeter* (E).  
اداة تستعمل لمدرة الثقل النوعي في كل جسم .

### ٢٧٤٦٢ - مِكْنَف

*Condenseur* (F). *Condenser* (E).

### ٢٧٤٦٣ - مِكْنَفَة

*Condensateur* (F).  
*Condenser* (E).

### ٢٧٤٦٤ - مِكْنَحَال °

*Alcoolomètre* (F).  
*Alcoholometer* (E).  
هو ميزان الكحول ، جهاز ينطس في السائل الكحولي  
ليبين نسبة ما يحويه من كحول .

### ٢٧٤٦٥ - مِكْنَحَالُ الخَمْر °

*Vinomètre*, *Vinoscope* (F). *Vinometer* (E).  
جهاز يستعمل لقياس درجة الكحول في الخمر .

### ٢٧٤٦٦ - مِكْنَحَلَة

*Jacinthe muguet* (F).  
نبات زينة يذو جاست ، شرقي ، اطلبه .

### ٢٧٤٦٧ - مَكْنَة \*

*Râteau* (F). *Rake* (E).  
اداة تستعمل لتسوية التربة .

### ٢٧٤٦٨ - مَكْنَس

*Grange* (F).  
هو السقية ، اطلبه .

### ٢٧٤٦٩ - مَكْنَسَة

*Botteuse* (F).  
*Binder*, *Sheaf-binding machine* (E).  
جهاز يلوي آلي أو يستعمل لكس القش والبن وما أشبه .

### ٢٧٤٧٠ - مَكْر

*Irriguer* (F). *To irrigate* (E).  
سكر الارض : سقاها . اسكروا الارض فانها صلبة ثم  
اسرفوها . والمكرو هي السفينة . ج مكر ينكرو .

### ٢٧٤٧١ - مِكْرُورَة ° ، مَكْرُورَة °

*Rectificateur* (F). *Rectifying* (E).  
جهاز خاص يستعمل لتكرير الكحول وذلك بإعادة  
التقطير .

### ٢٧٤٧٢ - مَكْرَة

*Amelanchia* (S). *Amélan-*  
*chier* (F).  
جنس شجيرات ونباتات برية ويزينية من فصيلة الورديات .  
انواعها عديدة ، اطلاتها ابالام . سرتها فواها . اوراقها بسيطة  
مائلة ، نصلها كثيفة البروق . ازهارها عتقوي التجميع  
محوري الارتكاز . ازهارها قليلة العدد مستطيلة البتلات  
البيضاء . ثمارها نورية ، صلبة القد ، بنفسجية اللون || اصرف  
الواوها سناً لي .

### ٢٧٤٧٣ - مَكْرَة كَنْدِيَّة

*Amelanchia canadensis* (S). *Amélan-*  
*chier du Canada* (F).

نوع من المكر وهي شجرة متوسطة القد تملو من ٥ الى ١٠  
امتار . اوراقها مستطيلة ، نصلها يفي الشكل قطبي

٢٧٤٦٨ - مَكْرُورِيوم المُرَّ \*  
Macrophoma musae, Phoma musae (S).

وصم يمري المُرَّ سببه فطر مجهري يركب الارواق والآبار || مظهره الخارجي بقع مستديرة متناوبة سطحية أو سواد اللون تقطع التسلل من الضلع إلى الحافة . وهو ان الثَّار يقع سود صغيرة متناوبة كشو القشور دون ان تؤذي اللب || يكافح باستعمال سائل بودرو ويتغلغل معلق الكيماة عند اكتمال امشاطها بالورق الابيض او المستعمل من اي صنف كان .

٢٧٤٦٩ - مَكْرُون ٥  
Mucron

من صغيرة بارزة مختلفة الاشكال ترتكز عليها بقص الاعضاء الفطرية او النباتية كارتكازها على محور او على وثيرة . ج . مكران .

٢٧٤٧٠ - مَكْرُونِيكس  
Macronyx (F).

هو الزهد ، اطلية .

٢٧٤٧١ - مَكْس ، جَمْرُوك  
Douane (F).  
Customs, Custom-house (E).٢٧٤٧٢ - مَكْس المُرَّو  
Péage (F). Toll (E).

رسم محدد تفرضه السلطة على كل شخص او سيارة تمر في مكان معين .

٢٧٤٧٣ - مَكْسَان \*  
Trigonocephalus piscivorus (S). Trigonocephale

Ancistrodon piscivorus (S). Motton-mouth (E).  
حيه سرلودة سامة من الازاعي انبويات الاغاديده . موطنها يشمل امريكا الوسطى والمكسيك . تألف غشاف مجاري الماء والمناقع والمزرات || جسمها يطول نحو ١٥٠ سم . رأسها حرساني الشكل . عنقها دقيق وذنبها كذلك . قروية الشبه بالصنعية لكنها عادمة الجهاز الحركسي الصنعي الصوت || تعتبر من الازاعي الشرسة الجسيمة الشديدة الاذى .

٢٧٤٧٤ - مَكْسَحَة  
Ratissoire (F). Scraper (E).

أداة يدوية تستعمل في تسوية التربة وتظليلها من الاصابة .

٢٧٤٧٥ - مَكْسِيومَة الارنب  
Myxomatose (F).

Myxoma (E).  
تزيد حجروي يصيب الارنب فيعطى النسيج التي يتشكر فيها .

٢٧٤٧٦ - مَكْسَف ٥  
Thermoscope

محرار هوائي يستعمل في درس الفوارق الحرارية بين وسطين او بينتين .

٢٧٤٧٧ - مَكْسَف الجلكة ، مَكْسَلَة  
Pagoscope

جهاز يدل على الصقيع وهو من أدوات البحوث يستدل به على اماكن حصول الصقيع ليرى . راجع مجلد .

٢٧٤٧٨ - مَكْشَط  
Avant-soc, Rasette (F).

Tuning-wire (E).  
قطعة من المخرات تقدم السكة وتطبخها كسطرة .

٢٧٤٧٩ - مَكْشَطَة \*  
Emoussoir (F).

Moss-scraper (E).  
صفحة معدنية مسنة او قفاز من فريط يستعمل في كشط الطلع من الشجر .

الحارة . جميعها سامة تألف اللجاج وقتلًا تقترب من المجاحد والسطوط || اجسامها شبه رحيمة الشكل ، مستنقة الاذيال الناعمة الزعانف . مخروطية الرؤوس اللذقة ، كبيرة البثور المستديرة الجاحضة ، قصيرة الاشدق السفلى المنطفة . حراشها مثلثة الزوايا ، مستنقة الاطراف الشائكة . زعانفها الظهرية والشرجية تمتد كالناخس المتناوبة القصيرة حتى اطراف الاذيال || اعرف اجناسها واضهرها المكرورو .

٢٧٤٧٢ - مَكْرُوسُورِيوم ٥  
Macrosporium (S).

جنس فطور مجهرية من عارة الزاسيات وفصيلة اللطيمات . كانت انواعه فيما مضى عديدة وبخلفة الاشكال فآثر العلم الحديث ضرورة احاطها بالاجناس والمهارات التي تشبهها فلم يبق منها سوى النوع المعروف بمكروسوريوم الشام .

٢٧٤٧٣ - مَكْرُوسُورِيوم الشَّام \*  
Macrosporium cucumerinum (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق وممار الشام والبطيخ . مظهره الخارجي بقع صغيرة متراكبة سمراء اللون تملأ الاوراق والآبار وتغطيتها بجلالات متناوبة عابقة اللون تسبب يباس النسيج للتحللة ثم ذبول نصال الاوراق وتقريح قشور الثَّار || يكالغح يتطوّر البذار قبل زهره وقد يحسن نضج المخلطة عند ظهور الوصم . بأحد املاح النحاس المركز او المخلو من ٥٠ الى ٧٠ ٪ .

٢٧٤٧٤ - مَكْرُوسِيل  
Macrostylis (S).

Macrostyle (F).  
جنس شجيرات وجنيات برية وريبتينة من فصيلة السلايات . مشهورة بازهارها المستطيلة الالام الرقيقة السبات .

٢٧٤٧٥ - مَكْرُورِيوم ٥  
Macrophoma (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنغيات . يتميز بكتلاته المستطيلة القائمة ضمن بكتيدات سمكة الجلود ، ضيقة المقي الصغير || انواعه التي تم الاقتصاد الزراعي قليلة ، اعرفها :

٢٧٤٦٦ - مَكْرُورِيوم الشاي \*  
Macrophoma theicola (S).

فطر مجهري يصيب الشاي في افاده واوراه . مظهره الخارجي بثور قرصية مستطيلة تركب لاه الانداد خففي على نموها . ويقع حشلية تصيب نصل الاوراق في زانها الاخير فتذوقها || يكالغح يتغلم الانداد الموصية وينضج الجنبات بسائل بودرو او بغيره من القواطير المخرية .

٢٧٤٦٧ - مَكْرُورِيوم الفاصوليا \*  
Macrophoma phaseoli, M. corchori, M. cajanii, M. sesami (S).

فطر مجهري ناعم ، واسع الانتشار ، يوجد في جميع البلاد الحارة . يركب جلود وسوق وممار عدة نباتات مختلفة اصحابا الفاصوليا والبقطن والبطاطا الخلسرة والحمضيات والبن والكافور والطناسط والسند || يصيب الفاصوليا بجلودها وجنبها وساقها فيعفن الجذور والجنبات ويمنطق الساق بنشاد ليد اسمر اللون || وهو على القطن عفن اسمر يركب الجذور ويقع قرصية لونها الى الجلوة تملأ الساق فوق التربة || وقتنا يصيب البطاطا الخلية بحول لبانها الى مادة اسفنجية سوداء اللون || وهو في الحمضيات عفن اسود يركب الجذور ووصم يحل بلحاء السوق فيسبب جفافها وانسدادها ورنح حصاره صمغية تفقد الشجرة بعض حيويتها وتقودها نحو التقلعة || يكالغح باستعمال اسود الفوطير الفعالة غير المركزة على النحاس .



مَكْرُوسُورِيوم الشام



مَكْرُورِيوم المُرَّو



مَكْسَان



مَكْشَطَة



مكانة غزلية

٢٧٤٩٣ - مَكَبَة الاسْتِرْدَاد ، خَبَار الاسْتِرْدَاد  
Faculté de rachat  
هو حق ارتجاع المبيع بموجب شرط الرّاء .

٢٧٤٩٤ - مَكَنَس ، كِنَاص  
Retraite (F).  
Retiring (E).  
مولج الرّوح من الطّباء والبرّق تسمّى فيه من الحرّ .

٢٧٤٩٥ - مَكِنَس  
Sorgho à balais (F).  
نبات زراعي مشهور باسم ذرة المكاس .

٢٧٤٩٦ - مَكَنَسَة الْأَنْدَر  
Molène blanche (F).  
هي البوصير الأبيض ، اطّله .

٢٧٤٩٧ - مَكَنَسَة الْجَنَة  
Kochia (F).  
هي الحيشم ، نبات زيّبي جميل القالب والخضار .

٢٧٤٩٨ - مَكَنَسَة السّاحِرَة  
Balais de sorcière (F). Broom of the sorceress (E).  
تعريف وصفي يطلق على اثنان متشابهة مريضة تكون  
في بعض الانجبار الثمرة والحريفة مبيها فلور مجهرية  
مختلفة .

٢٧٤٩٩ - مَكَنَسَة  
Mécanisation (F).  
Mechanization (E).

٢٧٥٠٠ - مَكِرَن  
Potentiel (F). Potential (E).  
صفة القوة الكامنة .

٢٧٥٠١ - مَكْرُو  
Terrier du lièvre (F).  
Hole of the hare (E).  
جحر القرواي أو الارنب الوشي .



مَكْرَد

٢٧٥٠٢ - مَكْرَدَة \*  
Manucodia (S).  
Manucodia (F). Manucodia (E).

جنس طير من الجروام وفضيلة الزردوويات . أنواعه  
المروفة نحو ١٥ جميعها من طيور استرالية وألجز  
المجاورة . ملجتها الحيائي جماعي . جعانتها متوسطة المدد .  
تألف الثنايات . قوتها الحشرات والثمار والبلور || أجسامها  
ربعة تعلل من ٢٥ الى ٢٦ سم . انثواها تراوح بين  
الازرق والاضفر والاسود جميعها سفعاء المواج . رؤوسها  
مكّلة بفرش ناعم صغبر لونه يختلف من لون الرأس  
والرّداء . اجنتها ممثلة الجحم . اذناها مستديرة الاطراف .  
انثاها تتمتع بنفس الاثواب || تدفن اعشاشها في الانجبار  
قرفية . الاناث تحضن بمناوبة الذكور من ٤ الى ٦  
بضغات . الفترم يستمر نحو ١٥ يوماً .

٢٧٥٠٣ - مَكْرَدَة \*  
Limacoda (S).  
Limacode (F). Limacode (E).

حشرة من فصيلة المكرديات ورتبة عرشفيات الانحسة .  
اعطائها بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف  
الحراج التي تكثر فيها الاشجار الابيدة الدوام || جسمها  
صغبر اللند ، كثيف الخمل الناعم . بسطها نحو ٢١ سم .  
رأسها شبه مزاوي الشكل . صيها صغبرتان . خطها  
شديد القصر . ملساها قديقان ، مستطيلان . زباناها  
عيطيان . كرسها مكثافت الخمل . يلقها متراكب  
السف والخل || سرقها قريبة اللب بالخلزوت وتنقل  
ببلاء ملة . وهي خاضعة تدعى على اوراق السديان وبقير  
من الانجبار الابيدة .



مَكْرَدَة

٢٧٤٨٠ - مَكْعَب  
Cube (F). Cube, Cubic (E).

٢٧٤٨١ - مَكْعَبِي  
Cuboïde (F). Cuboid (E).

٢٧٤٨٢ - مَكْفَهَر  
Cumulo-nimbus  
هو الركام ، نوع من الغيوم ، اطّله .

٢٧٤٨٣ - مَكْلَاس  
Calcmètre (F). Calcmeter (E).  
هو مقياس الكّلس ، جهاز يمين مقدار كربونات الكّلس  
في التراب .

٢٧٤٨٤ - مَكْلَف ، مَعَهْرَد له  
Grevé (F).  
Burdened, Encumbered (E).

٢٧٤٨٥ - مَكْلَوْرَة  
Maclure (F).  
هي الفانة ، شجرة فراج من القراصات .

٢٧٤٨٦ - مَكْنَة  
Truffière (F).  
Truffie-ground (E).  
ارض نبت الكم .

٢٧٤٨٧ - مَكْنَة ، مَخَنَافَة  
Butteuss, Buttoir (F).  
Ridging-plough (E).  
محراث خاص يستعمل لكي تحفر المزروعات التي  
تتطلب هذه الحالة .

٢٧٤٨٨ - مَكْن  
Œufs d'insectes (F).  
Eggs of the insects (E).

المكن هو بيض الحشرات . الواحدة مكنة .

٢٧٤٨٩ - مَكْنَان \*  
Ovisac  
جراب المكن في بعض الحشرات وقد يكون في الباطن  
أو شربي الانبكاك .

٢٧٤٩٠ - مَكْنَانَة ، مَدْرَة  
Galega (S).  
Galega, Lavanèse (F). Goat's rue (E). Geiz-raute (D). Galega, Lavanese (I).  
جنس نباتات عشبية برية حولية ومعمرة من فصيلة القرنيات  
الفراشية . انواعها عديدة جميعها علفية تنشط الدر . اوراقها  
متعاقبة ، مركبة ، ريشية ، ورتبة . ازهارها عتقودية التجميع ،  
ابعية الارتكاز ، زرقاء اللون أو بنفسجية || اشهر  
انواعها ما يلي .

٢٧٤٩١ - مَكْنَانَة شَرْيَقِيَّة  
Galega orientalis (S).  
Galega oriental (F).  
نوع من المكناة وهي عشبة معمرة مبلولة تعلو من ٦٠  
الى ١٢٠ سم . ارضها ممدادة ، ساقها فراج خلية . اوراقها  
تعد من ١١ الى ١٧ وريقة . وريقاتها بيضية مدببة تعلو  
من ٣ الى ٥ سم . نصلها خلي البشرة على صفحتيه . ازهارها  
بنفسجية اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى آب .  
يقال انّها تحمل غواص المكناة الحزوية ولكنها دونها منعفة .

٢٧٤٩٢ - مَكْنَانَة مَحْزَنِيَّة \* ، سَدَاب الماعز  
Galega officinalis (S). Galega officinal, Rue des chèvres (F).

نوع من المكناة وهي عشبة مبلولة معمرة تعلو من ١٠٠  
الى ١٥٠ سم . ساقها فراج . اوراقها تعد من ٩ الى ١٣  
وريقة ، وريقاتها سانية تعلو من ٢ الى ٤ سم . نصلها  
مالس الصفعة مذهب الصفعة . ازهارها زرقاء اللون .  
ازهارها يستمر من حزيران الى آب . وهي صباغية وتعتبر  
من النباتات الطبية المونة تدخل في عدة علاجات اخصها  
علاج السلس .

## ٢٧٥١٢ - مَلَاة

بقلة طيبة ورخصة تلعب كشخمة (السان). الواحدة ملاحة.

Resumurie (S).

Résumure, Résumurie (F).

جنس نباتات مجلية وجنية من فصيلة الألبات. انواعها المروفة سبعة منها في بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط والشرق الاوسط || سوقها منتعشة رقيقة فراء علو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. أوراقها متعاقبة، متقاربة الاوتكاز، غطية النصال الصغيرة القذ البحرية اللون. ازهارها فردية التجميع، ابوية وطرية الاوتكاز، خاصة التركيب، يكثر فيها اللون الابيض. ثمارها خالية الفلق، تنويرها صيني || اعرف انواعها واشهرها الملاح البودي المعروف بحشيشة الحصف.

## ٢٧٥١٤ - مَلَاة دُوِيَّة

Résumurie vermiculée (F).

نبات بري طبي مشهور باسم حشيشة الحصف، اطلها.

Saline (F).

Salt-marsh, S.-mine, S.-pit (E).

المكان المدد لاصطناع الملح ونسجم الملح.

## ٢٧٥١٥ - مَلَاة

٢٧٥٠٦ - مَكِير هو للمير، اطله.

٢٧٥٠٧ - مَلَاب مَلَاب : كل عطر مائع.

## ٢٧٥١٦ - مَلَاة

مزدوح اللوز وكل ارض تكثر فيها اشجار اللوز.

Malieus (S).

Marteau (F). Malieus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الخياشيم، عادات المتأهب وفصيلة الاطريات. انواعها المروفة عديدة منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة اغصها المحيط الهندي || اصداؤها لانظامية، متباينة الاشكال، لاقياسية المصاريع، بعضها قريب الشبه بالمطاس. مفصلاتها عادية التسنين || تعيش لاصقة بصخور المجاح على اعماق تراوح من ١٥ م.

Crenatula (S).

Crenatula (F). Crenatula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الخياشيم عادات المتأهب وفصيلة الاطريات. انواعها المروفة ثمانية جميعها من عظم البحر الاحمر والحيط الهندي || اصداؤها شبه حروسة الشكل، رقيقة القدم، رقيقة المصاريع الامتصاصية، تحيلة التخديذ للؤلؤة الداخل || تعيش لاصقة بالاسفنج.

## ٢٧٥١٩ - مَلَاة، مَلَاة، مَلَق، مَلَقَة

Rouleau (F). Röll, Roller (E).

معدة اسطوانية تستعمل في حذل التربة الزراعية. اشكالها واحجامها عديدة تختلف باختلاف الغاية من استعمالها. اعما:

Rouleau plombeur (F).

ملاسة ماصة

Rouleau ondulé (F).

ملاسة متوجة

Rouleau à bannes (F).

ملاسة غطائية

Rouleau marqueur (F).

ملاسة غططة

Rouleau brise-mottes (F).

ملاسة مفتحة الحذر

Limacodidae,

Cochlididae (S). Limacodidae, Cochlididae (F).

Limacodidae, Cochlididae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المروفة نحو ١٠٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم اغصها المناطق الحساسة والاستوائية || اجسامها صغيرة. يغطيها تراوح من ٢٠ الى ٢٥ سم. رؤوسها معتدلة الجرم. حيوها صغيرة. اغصها شديدة القصر. ملاسها مسطيلة، تحيلة. قرونها الاستشارية غطية. بطونها متراكبة السهف النقيق والغمل الناعم. اجنحتها مستعرضة، عادمة التهيد || تسرح في الليل. اساريها شبه بيض الشونن، قصيرة الجرامز الصدرية، ثلثة الجرامز البطنية. جميعها غاصلة || اشهر اجناسها المكودة.

## ٢٧٥٠٥ - مَكِيلَة، قَدَاة

Module, Mesure de capacité (F). Modul, Dry measure (E).

اسم شامل يطلق على كل وحدة كمية من اي حجم كانت او سمة.



مَلَاب

## ٢٧٥٠٨ - مَلَاب، مَكِيلِيَّة

Malpighia (S). Malpighie, Malpighier (F). Barbados cherry (E). Barbadoskirschen (D). Malpighia (I).

جنس نباتات شجرية من فصيلة المليات، منها البلاد الاستوائية. اولها نحو ٢٠، اوراتها متعاقبة منقطة اهليجية. نصلها على البشرة ستن الحادة الشائكة. ازهارها عتقودية او نورية التجميع منها الاحمر والوردي والابيض. اعرف انواعها واشهرها:

Malpighie brûlante, Bois capitaine (F). مَلَاب حريف. ثجيرة امريكية المنبت، قشورها حازمة كاوية طيبة وصناعية.

Malpighie glabre,

Cerisier des Antilles, Mourellier, Xocat (F).

ثجيرة تكثر في المكسيك، ثمارها كرزية مأكولة لا تحلو من الحسوة وقد تزوع للزوين.

Epinard de Malabar (F).

## ٢٧٥٠٩ - مَلَابَر

بقلة زراعية تلعب بازية بيضاء، اوراتها تستعمل استعمال الاسبانج.

Malpighiaceae (S).

Malpighiacées (F). Malpighiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة الفعالات. اجناسها ٥٠ وانواعها ٦٠٠ منها من نباتات المناطق الاستوائية الاسريقية. جميعها اشجار وشجيرات وجنيات. اوراتها متعاقبة منقطة بيسية او مركبة. ازهارها خاصة الفعالات والبيلات، عتقودية التجميع، صفراء اللون او بيضاء او حمراء. ثمارها جراء مكبرة عديدة البزور.

Gelée, Givre (F). مَلَاة، صَبْر لَفِي

Frost, Jelly, Rime (E).

هو جمد نطق الماء على سطح التربة والنبات من حيوط درجة الحرارة الى ما دون الصفر.



مَلَاة



Féculerie (F). ٢٧٥٣٢ - **مَلْبَعة** °

Manufactory of faecula (E).

الملبة أو مصنع اللبوب أو منشأة البطاطا هي المصنع المخصص باستخراج اللبوب.

Laiterie (F). ٢٧٥٣٣ - **مَلْبَعة** ° ، **مَعْمَلْ أَلْبَان**

Dairy-farm (E).

المعمل الذي يمالج فيه الحليب ريثما يباع .

٢٧٥٣٤ - **مَلْبَعيًا** هي الملباء ، الملبه .Malt ٢٧٥٣٥ - **مَلْت**

هي الحبوب الناتفة صناعيًا لا سيما حبوب الشعير التي تستعمل في صناعة البيرة .

Maltage (F). ٢٧٥٣٦ - **مَلْتاج**

الملتاج أي صنع الملت، هو عمل استمالة الشعير وغيره من الحبوب إلى ملت أي حبوب ناتفة .

Maltase ٢٧٥٣٧ - **مَلْتاز**

خبرة قابلة للزوبان تحول الملتوز إلى حلوكوز قابل الاختيار .

Manducable (F). ٢٧٥٣٨ - **مَلْتَالِك**Verdoyant (F). ٢٧٥٣٩ - **مَلْتَج**

التحت الأرض اجتمع فيها وكثر . والأرض المنتجة : الكثيره الخضرة .

Conjonctive (F). ٢٧٥٤٠ - **مَلْتَحمة**

Conjunctiva (E).

ملتحة العين ، غشاء يلفح صفحة المقلة الخارجية وصفحة الاقناب الداخلية .

٢٧٥٤١ - **مَلْتَرَم** هو المقارن ، الملبه .٢٧٥٤٢ - **مَلْتَمَقَات الأصابع** ، **مَكَلَمَقَات**Syndactyles (F). ٢٧٥٤٣ - **الأصابع**

أحد قسمي الطيور الجوارح ، يشغل فصلي الخفاشيات والقرليات .

Volubile (F). ٢٧٥٤٣ - **مَلْتَف**

Volubile, Voluble, Twining (E).

صفة النبات العارضي الذي يلتصق بأي جسم كان فيسلفه ويلتف حوله حلزونيًا .

Circinal ٢٧٥٤٤ - **مَلْتَف** °

نمت تعريفي يطلق ، في علم النبات ، على كل عضو ، ان ورقة أو غيرها دائرية الالتفاف .

Convergent ٢٧٥٤٥ - **مَلْتَق**Plein (F). ٢٧٥٤٦ - **مَلْتَق**

المثلث والمصمت ؛ ما لا جوف له .

Maltose ٢٧٥٤٧ - **مَلْتوز**

نوع من السكر القابل للاختيار ، يحصل من تكسير النشا بالملت .

Contiguité (F). ٢٧٥٤٨ - **مَلَامَعة** Contiguité (E).Cément (F). ٢٧٥٤٩ - **مِلَاط**٢٧٥٥٠ - **مِلَاعِب ظِلَّة**

اسم يطلق على طائر ين صُغَفين هما الزفراف والقرنل الشائع ، اطلبها .

Platalea (S). ٢٧٥٥١ - **مِلَاعِقي** \*

Spatule (F). Spoon-bill (E).

جنس طيور مائية من طول الساق القواطع . أنواحه المعروفة ٨ ، تتميز بمناقيرها الكبيرة الملمعة الشكل ، يسوقها الغضاضة الذرية ، بأرماغها المستطيلة وبشائرتها المفرفة . تعيش قرب الماء . قربها السك والديبدان والخفشات والرخويات . تنشأ أوكنها في الانحجار وبين القصب . انائها تقع من يفتحين إلى أربع بيضات مستطيلة تحفها ثلاثة اسابيع ٥ أشهر أنواحه ما يلي .

٢٧٥٥٢ - **مِلَاعِقي أَبْيَض** ، **أَبْر مِلْعَكة** ، **دَوَاس**

Platalea leucorodia (S). Spatule blanche (F).

نوع من الملاحين وهو طائر كبير الجثة طوله نحو ٧٠ سم . ثوبه إلى الأبيض الناصع باستثناء مناقره ورسنيه السود ، ونحوه وزفده وطرف مناقره الصفرة . أرياش رأسه مستطيلة مهدلة . يعيش بجماعات كبيرة تنشأ في مكان واحد . يحوي البلاد في طلب المصيف والخش ، يكثر على شواطئ الخليج الفارسي والبحر الاسود وعلى ضفاف الدلتا وفي هولندا .

٢٧٥٥٣ - **مِلَاعِقي زَرْدِي** ، **أَبْر مِسْوط** ، **مَدَوَاس**

Platalea alaja (S). Spatule rose (F).

نوع من الملاحين طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه وردي اللون . أصله شطوط وضايف الشرق وأفريقية الشرقية . بجماعات متوسطة الكبر ، عدد أفرادها يراوح من ٦ إلى ٢٤ ، وهي تنشأ في مكان واحد .

٢٧٥٥٤ - **مِلَاعِقيّة**

Castles (F). نباتات تحلب من الجوزيات يدعى قتلعة ، اطلبها .

٢٧٥٥٥ - **مِلَاك**

Terrien (F). Landed, Proprietor (E). هو صاحب الاملاك أي الاراضي الزراعية والحرجية .

٢٧٥٥٦ - **مِلَاك البَحر**

Ange de mer (F). سمكة بحرية ولدت مفترسة مشهورة باسم سقطين ، اطلبها .

٢٧٥٥٧ - **مِلَامِس**

Palpes (F). Palps, Feelers (E). زوائد مفصليّة فككية تلمس الحشرات بواسطة ما أكلها وربما ميادها .

٢٧٥٥٨ - **مِلَباب** °

Féculomètre (F).

Faeculometer (E).

جهاز يستعمل في تحليل محو اللبوب الناشئ الموجد في مادة معينة .

٢٧٥٥٩ - **مِلْبان** °

Galactomètre (F).

Galactometer (E).

جهاز تقاس برأسه المواد السكرية والسمية والجينية والجلافة الموجودة في الحليب .



ملاعي

٢٧٥٥٨ - مُتَلَجِّن ° Régime (F).  
هو مجموعة المواليد والانفعالات الطبيعية التي تسيطر عليها  
المنى . كذلك ملجن الاطوار وملجن الرياح الع .  
ج ملجن .

٢٧٥٥٩ - مُلَح الملح : ورم في حروب الفرس دون الجرد فاذا اشتد  
فهو الجرد .

٢٧٥٦٠ - مُلَح Sel (F), Salt (E).  
الاملاح ، كالأزيا ، مواد ناتجة من ااحلال مدن محل  
الهيدروجين في حامض . فاذا اضيف مثلاً الحامض الكبريتي  
المخفف الى الزنك يتصاعد غاز الهيدروجين ويختفي المعدن  
ويتكون ملح كبريتات الزنك .

٢٧٥٦١ - مُلَح الْبَارُود ، تَطْرُون ، بَوَرَقْ أُرْمِي Nitre, Salpêtre (F), Nitro, Saltpetre (E).  
هو كالأزيا لنوات البوتاس، يحصل ويتجمع طبيعياً على  
الصخور الكلسية وعلى جدران الاتقاء الرطبة ويستعمل  
في صنع البارود .

٢٧٥٦٢ - مُلَح الطَّحَام Sel de cuisine, Chlorure de sodium (F), Kitchen salt (E).  
تسميه الكيماوي كلوريد الصوديوم . يستخرج بأكثرية  
من مياه البحر بعد ترقيدها وتبيخها في الملاحات ثم معالجة  
بلوراتها عن مجافاة خاصة .

٢٧٥٦٣ - مُلَحَان Janvier (F), January (E).  
هو شهر كانون الثاني .

٢٧٥٦٤ - مُلَحَان Halimodendron (S).  
Halimodendro (F).  
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة التريبات . انواعه  
المعروفة قليلة العدد ، جميعها اسوية المهد ، تبت في رمال  
الشواطى البحرية . معظمها جنبي وبضها شجر . اوراقها  
مركبة عابلة . ثمارها قرنية ، بزورها مفلطحة ، ا اشهر  
انواعه التريينية الملحان الفضي .

٢٧٥٦٥ - مُلَحَان فِيْهِ Halimodendron argenteum (S), Halimodendro argente (F).  
نوع من الملحان يعيش في الاربة الرملية الناحلة . جنينه  
شائكة فائضة تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها عابلة ، مركبة ،  
شغوية . وريقاتها رباعية العدد ، اهليلجية الشكل ،  
مقطوعة النصل البحري اللون الفضي المواجه . اوراقها كبيرة  
القد ، منها الثنائية التجميع ومنها الثلاثية ، معاليها مسطيلة  
متدلية . لونها الى الحمرة البفسجية المواجه || تنوره يستمر  
من ايار الى حزيران .

٢٧٥٦٦ - مُلَحَاوَات ، نَقِيْضَةٌ Feuillus (F),  
Leavy (E).  
هي الاشجار الحرجية والتريينية التي يسقط ورقها في الشتاء .  
تفيضها العروات والابادية اي الدائمة الخضرة التي لا يسقط  
ورقها . واحدتها ملحاه .

٢٧٥٦٧ - مُلَحَن Annexe (F).  
Annexed, Appended (E).  
هو كل تابع ملحق بأصل .

٢٧٥٤٨ - مُتَوَرِّاتُ الْأَجْنَحَةِ ° ، مُتَعَفِّكَاتُ الْأَجْنَحَةِ ° Stropsipères, Rhiptipères (F), Stropsiptera, Rhiptiptera (E).  
رتبة حشرات من طبقة غشائيات الاجنح . اجناسها وانواعها  
المعروفة قليلة العدد جميعها فصيلة الحَشِيْئِيَّات .

٢٧٥٤٩ - مُتَوَرِّة Latanier (F).  
هي الحشفت ، اطليه .

٢٧٥٥٠ - مُتَوَرِّين ° ، مُتَوَرِّين ° Maltine, Maisine (F).  
المتين اي كسب الذرة الصفراء هو التفل الناتج عن  
صناعة تقطير الذرة ، ويعتبر من اعلاف الماشية .

٢٧٥٥١ - مُتَوَرِّد ، تَشِيد Synanthérique (F).  
Synantheric (E).  
المثور والتشيد من الازهار ما كانت اسديتها ملتحمة المآثر .

٢٧٥٥٢ - مُلُج هو نوى المقل ، ج املج .

٢٧٥٥٣ - مُلَجَا Abri (F), Refuge, Shelter (E).

٢٧٥٥٤ - مُلَجْدَة ° Mulgedium (S), Mulgédie (F).  
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعها  
المعروفة عديدة . اعطانها بعض مناطق الشرق الاوسط  
واروبى || سوقها فراء تملو من ٥٠ الى ٢٠٠ سم .  
اوراقها كبيرة مفرصة لامتساوية التفرع . ازهارها عكوي  
التجميع . ازهارها متباينة الالوان يكثر فيها الازرق ||  
اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

٢٧٥٥٥ - مُلَجْدَة قَرْنِيَّة ° Mulgedium tataricum (S).  
Mulgédie de Tartarie (F).  
نوع من المجلدة التريينية . مهدا بلاد التتر . ساقها قليلة  
الفروع تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها حاضنة  
بحرية اللون . ازهارها عذقي التجميع . ازهارها الى الزرق  
الساجونية || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٧٥٥٦ - مُلَجْدَة جَبَلِيَّة ° Mulgedium alpinum (S), Mulgédie alpine (F).  
نوع من المجلدة التريينية السبروتية تعيش في جميع الاقربة  
ومختلف الموائل . مهدا جبال الشرق الأدنى وبعض جبال  
اروبى . ساقها فراء تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها حاضنة  
كبيرة النصال المرطاه . ازهارها عثقودي التجميع ، متدل  
الكثافة . ازهارها الى الزرق الباهة || تنويرها يستمر  
من تموز الى ايلول .

٢٧٥٥٧ - مُلَجْدَة كَبِيرَة الْوَرَق ° Mulgedium macrophyllum (S).  
Mulgédie à grandes feuilles (F).  
نوع من المجلدة التريينية . مهدا بعض المناطق التركية  
والقوقاز . ساقها فراء ، خلية الساه ، تملو من ١٠٠  
الى ١٥٠ سم . اوراقها كبيرة القد ، قليلة النصال ،  
مألسة الصفحات العليا ، مزغبة السفلى . ازهارها عكوي  
التجميع ، كبير القد . ازهارها الى الزرق الزاهية ||  
تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

## ٢٧٠٦٨ - ملحق التامين

Avenant (F).

Modification (E).

عقد كتابي يضاف الى وثيقة التأمين للدلالة على تعديل وقع في بعض شرائطها .

## ٢٧٠٦٩ - ملحق الوصية

Codicille (F).

Codicil (E).

هو الملحق الذي يحرره الموصي بعد تحرير وصيته إما لاتمامها او لتعديلها أو لالتامسها .

## ٢٧٠٧٠ - ملحوظ و ملحوظ

Prévisible (F).

Foreseeable (E).

## ٢٧٠٧١ - ملحوظات الملك

Plectognathes (F).

رتبة من الاسماك الغضائيات .

## ٢٧٠٧٢ - ملحق

Dragon (F). Sucker (E).

الملح والمعلقان : قصب ينمو من برصة مرضية نشأت على جذر نبات مقوق .

## ٢٧٠٧٣ - ملحوظات

Malachidae (S).

Malachilidae (E).

فصيلة حشرات وائمة وقائمة من رتبة غمديات الجناح || اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من حشرات البلاد الحارة وبعضها يأنث مناطق البلاد المعتدلة الحرارة مرتبها النباتات الشبية والادغال ترتشف ريق الانهار وتفتس الحشرات اللدنيا التي تقترب منها . وبعض اجناسها يتميز بجهاز خاص يمكنه من دفع حويصلات جانبية حرارة اللون تطلق منها رائحة اثيرة تحذر الاصصاب ، قليلة الاثى || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، مستعرضة الرؤوس . مستطيلة الزباني المستطيلة المركبة من ١١ فصلة . ارساغها خامية العق || يرقاتها تميش تحت الماء وفي الاغصان والخضرة ساعية وراء اساريع الحشرات الخالصة لارتسامها || اشهر اجناسها الملحية والمداشة والوسعة .

## ٢٧٠٧٤ - ملحوظة نكالية البثور

Malachius bipustulatus (S).

Malachie bipustulée (F).

حشرة وائمة جاذبة قانصة من فصيلة الملحيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف الحقل المزروعة والمزاري . خنافسها ترتشف ريق الانهار وتفتس الحشرات اللدنيا ، عند الحاجة ، فيبدو احمر اللون يفرز مادة اثيرة نافذة تحذر الاصصاب تكفي لشل مقاومة الفرم . يرقاتها تميش على جذور النجيليات وعلى ما تقترسه من اساريع الحشرات التاربة والائمة || جسمها صغير القد بطول نحو ٦ م . رأسها مستعرض الجرم ، قصير الخيط ، اخضر اللون . عيناها كبيرتان . زباناها غطيان . فكاهها غليمان . كوسلها شبه مربع الشكل ، اخضر اللون . ظهرها الى الخضر اللامس اما الاطراف الخلفية فال حمرة . غذاها خفيضا التميزيز للمجم الملووط . ارساغها خامية العق || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتميش حتى ابد . انبائها تهريق ولكن قرب سوق نبات وتحت الارواق التي تلامس التربة || البرقة عند الادراك انتم تطول نحو ٩ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، سداسي الراجوب القصيرة ، حنكي اللون ، اسمر الملاج

استنبت الرأس الاسود ، مستند للزعر والسكة الشرجية || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما يتغذى في التربة ضمن جلاب من الطين والبراز وينقل عند انطلاق الحشرة .

## ٢٧٠٧٥ - ملحوظة حمراء

Malachius rufus (S).

Malachie rouge (F). Malachius rufus (E).

حشرة وائمة قانصة من فصيلة الملحيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف البراري والمزاري والاحراج الغدلة . خنافسها ترتشف ريق الانهار وتفتس الحشرات اللدنيا . تتميز بجهازها الحويصلي القاسح الاثري الرائحة التي تحذر الاصصاب . يرقاتها تميش تحت لاء الانهار وفي الاغصان النضرة قوتها اساريع الحشرات الخالصة || جسمها صغير القد بطول من ٦ الى ٧ م . رأسها مستطيل الجرم اسمر اللون . زباناها مستطيلان مستطقان . عيناها كبيرتان . فكاهها غليمان . كوسلها صناعي اللون تتوسطه بقعة خضراء . ظهرها لاسمر مستدير الطرف اللصق ، احمر اللون . ارساغها خامية العق || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل نيسان وتعيش حتى اواخر سوزان . تسرح في النهار . تساف بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تنجح المكن تحت لاء الاجمار وتحت الانقاض || البرقة عند بلوغها الادراك انتم تطول من ١٠ الى ١٢ م . جسمها شبه اسطواني الشكل مستطيل الرأس ، مستطيل الطرف ، سداسي الراجوب القصيرة ، اسمر اللون ، اخضر الملاج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما يتغذى في اخر سرداب دخلته البرقة .

## ٢٧٠٧٦ - ملحوظة

Flectometre (F).

Flectometer (E).

جهاز يستعمل في قياس لدانة الماد تحت ضغط معين .

## ٢٧٠٧٧ - ملحوظة

Pellicule (F).

Pellicle (E).

صفحة او حصابة سليولوزية رقيقة منسوبة السطح تستعمل في غش الصناعات اخصها صناعة الافلام السينمائية حيث تطلى على اسدى جهتيها بمادة جيلاينية حساسة بثر لونها النور .

## ٢٧٠٧٨ - ملحوظة

Pelliculé (F).

ملقى بالملدن .

## ٢٧٠٧٩ - ملحوظة

Mélèze (F).

شجرة حرجية تسمى لايس ، اطلبها .

## ٢٧٠٨٠ - ملحوظة كاذب

Faux-mélèze (F).

شجرة حرجية وزينية تسمى لايس كاذب ، اطلبها .

## ٢٧٠٨١ - ملحوظة

Gonocytus (S).

Gonocytée (F).

جنس نباتات ثيمية ، متوسطة الارتفاع ، برية ، معمرة ، من فصيلة القرنيات الفرائسية . انواعها المعروفة قليلة العدد منتبها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط ، اخصها تهم لبنان والمنطقة العلوية السورية || سوقها متصبية ، فراء ، عادمة الشوك . اوراقها مركبة ، وثيرة المدد ، وريقاتها شبه ييفية النصال المستطيلة . ازهارها ابطية الانتشاب ، مستطيلة الزناد ، صفراء اللون ، مستعبة العرف ، يحرسها النحل .



ملحية ثنائية البثور



ملحية حمراء

Lin commun (F).

٢٧٥٩٢ - مَكْسَج

هو الكتان الشائع ، اطليه .

Melasmia (S).

٢٧٥٩٣ - مَكْسَمِيَّة

جنس فطور مجهرية من فصيلة الهذكيات ، انواعه قليلة  
عامة القيمة الاقتصادية . بكنهذاته ديمية التركيب ،  
فصية اللون ، ترتكز حل ونية فارقة فرجية الانفلاق .  
بوياته مخروطية منتفخة ، شفافة ، وسيدة الخلية .

Mylæsinus (S), Mylæsine (F). \* ٢٧٥٩٤ - مِلْسِين

الواحدة مسلية ، جنس اسماك ثورية من مفتوحات المائة  
وفصيلة القرصانيات . انواعه المعروفة ثلاثة موطنها انهر  
البرازيل والغويان || اجسامها بيضيه الشوزن ، مسطلة  
الجرم ، صلبة اللد ، تقوّلون الى ١٩ الى ٢ سم . زعانفها  
الظهرية والشرجية كبيرة مقابلة . اما الذيلية فهلاية  
الشكل . اوارها الى الخفسار المتفاوت المهابات || حوسها  
مأكولة ، متوسطة الصنف .

٢٧٥٩٥ - مِلْسِيَّت السَلْجَم

هي زخعة السلجم ، اطلبها .

٢٧٥٩٦ - مِلْسِيَّت المَلْفُوف

هي زخعة الملفوف ، اطلبها .

Fluoroscope (F).

٢٧٥٩٧ - مِلْصَاف

جهاز يستعمل في تشعيع اللاصق اي الفلورور الموجود  
في المواد المدنية .

Dugong (F).

٢٧٥٩٨ - مَلْصَة

هي الاطوم ، حيوان بحري غليظ الجلد ، اطلبه .

Compresseur à pistoles (F). ٢٧٥٩٩ - مِلْطَاس

جهاز آلي يستخدم في تشقيب المواد الصلبة كالصخور  
ونحوها .

Malthusianisme (F).

٢٧٦٠٠ - مَلْطُوسِيَّة

الملطوسية مذهب اقتصادي اجتماعي نادى به الاقتصادي  
الانكليزي «ملطوس» ملخصه ضرورة كبح الانجاب  
لان التكاثر البشري يزداد والمواد الغذائية الضرورية  
تنضب .

Tissu sous-cutané (F).

٢٧٦٠١ - مِلْطَى

Subcutaneous tissue  
قشرة رقيقة بين العظم والدم .

Cochléaire, Cochléiforme (F).

٢٧٦٠٢ - مِلْعَقِي

Cochleiform (E).  
ما كان شكله شكل الملعقة .

Cochléaria officinal (F).

٢٧٦٠٣ - مِلْعَقِيَّة

هي حشيشة اللعاق ، من النباتات الطبية ، اطلبها .

Clematidae (S).

٢٧٦٠٤ - مَلْعَوَّنَات

Clematidae (E).  
مجموعة نباتية من فصيلة الشقيقيات . اعطائها البلاد الحارة  
والمتدلة . انواعها كثيرة المدد معظمها مداد عارض . سوفها  
لغية . اوارها متقابلة طويلة البرجيلات ، صماتبة سامة  
محقة . ازهارها عادة يتلات كبيرة الفصل الملونة .

Malesherbia (S).

٢٧٥٨٢ - مَلْزُوبَة

Malesherbie (F).

جنس نباتات عارضة ، معمرة ، برية وتربيتية من فصيلة  
المزروبيات . انواعها المعروفة خمسة . منبتها الطوعي بعض  
مناطق الشيل والبيرو || تزود قنزين في المراكب وفي  
المواقع التي لا تخفى الصقع في الشتاء .

Malesherbiaceae (S).

٢٧٥٨٣ - مَلْزُوبِيَّات

Malesherbiaceae (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القمالات . اجناسها  
وانواعها المعروفة قليلة العدد . منبتها الطوعي بعض اصحاء  
امريكية الجنوبية || نباتاتها معمرة ، عارضة ، قريبة الشبه  
بالالاميات . اوارها متعاقبة . ازهارها خشوية ، كبيرة  
القد ، جميلة الالوان ، سننية الارتكاز . تتميز باستطالة  
انبوب الكرم وباسديتها المتدرجة في قاعدة الزورم ||  
اشهر اجناسها المزروبة .

Synallagmatic (F).

٢٧٥٨٤ - مَلْزُوم لِطَرَقَيْن

Synallagmatic, Reciprocal (E).  
هو المقد الذي يلتزم فيه كل فريق من المتعاقدين نحو  
الفريق الآخر .

Coobligé (F).

٢٧٥٨٥ - مَلْزُوم مع غَيْرِه

Coobligant (E).  
هو الشريك في الالتزام .

Amygdalaire (F).

٢٧٥٨٦ - مَلْزُوي

Amygdaloid (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل منجز يحوي بعض الحجات  
للحجرة او بعض الحصيات .

Châtrer (F).

٢٧٥٨٧ - مَلَس

To castrate, To geld (E).  
ملس المصية : استلها بعروقها . وملس الكبش : مل  
خصيية بعروقها فهو ملس والكبش ملوس .

Glossomètre (F).

٢٧٥٨٨ - مِلْسَان

Glossometer (E).  
هو مقياس اللسان ، جهاز تقاس به غراطين التحصيل  
لعرفة الانواع الاصغر من غيرها في جرس رحيق الازهار .

Anacanthinien (F).

٢٧٥٨٩ - مَلْسَاوَات

رئة من الاسماك الطغيات .

٢٧٥٩٠ - مَلْسُومَة \* ، سَاجَ هِنْدِي

Melastoma (S), Mélastome (F), American gooseberry (E), Schwarzmund (D), Melastoma (I).

جنس مجمرات وجنبات برية وزراعية من فصيلة الملسويات .  
مهدها المناطق الاستوائية . انواعها عديدة . اوارها منتفة ،  
متقابلة سنائية النصل . ازهارها محورية الارتكاز او هامية .  
ثمراها لوروية مستحبة العرف والطعم ، صعيها اسود اللون  
يدبح اللسان والقم .

Melastomaceae (S).

٢٧٥٩١ - مَلْسُومِيَّات

Mélastomacées (F), Melastomaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ، مستقلات القمالات ،  
منخفضات المبيض . اجناسها وانواعها زهاء ١٨٠٠ ، جميعها  
من نباتات المناطق الاستوائية . اوارها كاملة متقابلة .  
ازهارها لحامية التركيب .



ملسومة



ملسين



ملئى ارجوانية



ملئى جبالية



ملئى زرقاء



ملئى سامة



ملئى صفراء

**٢٧٦١٢ - ملئى شرقية** *Clematis orientalis* (5).  
*Clématite d'Orient* (F).  
 جنبة عارشة عديدة الفصوص طول من ٣ الى ٦ امتار.  
 اعطائها الشرق من شط بحر قزوين الى منشوريا . اوراقها  
 مركبة ، ثلاثية الفصوص القلبية الشكل ، المسنة الحافة .  
 تصلها بحري اللون . ازهارها رباعية الفصل ، قطرها نحو  
 ٣ سم . || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

#### \* ملئى صفراء \*

**٢٧٦١٣ - ملئى صفراء** *Clematis ochroleuca* (5). *Clématite jaune* (F).  
 بجلة فراء منتصبه تملو نحو ٦٠ سم . مهدا البلاد الامريكية .  
 اوراقها بسيطة لاطنة متقابلة ، تصلها بيضى الشكل مالى  
 الصفحة . ازهارها حامية الارزكاز ، فردية ، صفراء اللون ،  
 زيتية الملوحة ، اجابية الشكل ، متدلية || ازهارها يستمر  
 من ايار الى حزيران .

#### \* ملئى شيفلة الورق ، و ظبان \*

**٢٧٦١٤ - ملئى شيفلة الورق ، و ظبان** *Clematis angustifolia* (5). *Clématite à feuilles étroites* (F).  
 جنبة دخلقة مثندة تملو نحو ١٠٠ سم . ساقها منتصبه .  
 اوراقها مركبة . وريقاتها خضبة بسيطة او ثلاثية التفريض ،  
 مصفاة سامة . ازهارها كثيفة التجميع ، خافتة اللون ،  
 يضاء اللون . تكثر في بعض الاسراج الرطبة . تجلحها  
 الماعز ولا تنضرو منها .

#### \* ملئى عنكوبية \*

**٢٧٦١٥ - ملئى عنكوبية** *Clematis paniculata* (5). *Clématite à panicules* (F).  
 جنبة سرورية عارشة تطلو نحو ٤ امتار . مهدا اليابان  
 وكوريا . اوراقها مركبة . وريقاتها خضبة او صباغة  
 الازواج ، ريشية التركيب . تصلها بطول من ٥ الى ٨ سم .  
 ويمرض من ٢ الى ٤ . ازهارها عنكوبية التجميع ، رباعية  
 الفصل الشفافة ، قطرها نحو ٣ سم . || ازهارها يستمر  
 طوال شهر ايلول .

**٢٧٦١٦ - ملئى عتمبي ، مزغان ، حبل مسكي** *Clematis cirrosa* (5). *Clématite à vrilles, C. tou-jours verte* (F).  
 جنبة عارشة برية وريشية تملو من ٣ الى ٤ امتار .  
 حوافها مركبة ثلاثية . اوراقها ابدة بسيطة لا خضبة  
 الشكل . ازهارها قمية رباعية الفصل الخلية الجلمية  
 لونها الى البياض الاخير تملو مائة وريدي || مصفاة  
 اوراقها قليلة المادة القلوية الباسمة لكنها حريفة تحرق  
 الجلك || ازهارها يستمر من اذار الى كانون .

#### \* ملئى قلبية الورق \*

**٢٧٦١٧ - ملئى قلبية الورق** *Clematis cordata* (5). *Clématite à feuilles en coeur* (F).  
 جنبة عارشة تطلو نحو ٦ امتار . اوراقها مركبة مشطية .  
 وريقاتها تده من ٥ الى ٧ ازواج ، تصلها قلبى الشكل  
 مسن الحافة . ازهارها خلية الفصل البياض || ازهارها  
 يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

#### \* ملئى كركسية الورق \*

**٢٧٦١٨ - ملئى كركسية الورق** *Clematis apifolia* (5). *Clématite à feuilles d'ache* (F).  
 جنبة سرورية عارشة تطلو نحو ٣ امتار . اصفاة الصين  
 واليابان . اوراقها مركبة كركسية الشكل . تصلها اخضر  
 اللون مسن الحافة . ازهارها عقودية التجميع ، صفيرة  
 اللند ، رباعية الفصل ، يضاء اللون ، قطرها نحو ١٠ سم .  
 ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول .

**٢٧٦١٥ - ملئى** *Clematis* (5). *Clématide* (F). *Clematis* (E). *Waldrebe* (D). *Clématide* (I).  
 جنس نباتات معمرة عارشة من الملوحيات . انواعها عديدة .  
 اوراقها لا نظامية تكثر فيها الاشكال المركبة الريشية .  
 ازهارها عادمة البتلات تستضيف حيا بالفصل الملوحة المختلفة  
 الاجسام والاشكال || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

#### \* ملئى ارجوانية \*

**٢٧٦١٦ - ملئى ارجوانية** *Clematis coccinea* (5). *Clématite écarlate* (F).  
 جنبة فراء منتصبه تملو من ١٠٥ الى ٢٠٠ سم . فروها  
 جزوية اللون . اوراقها متقابلة ، لاطنة ، بسيطة ، تصلها  
 ساني الشكل ، بارز العروق ، خلى البشرة . ازهارها  
 ارجوانية اللون ، اجابية الشكل تطلو نحو ٤ سم .  
 ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

#### \* ملئى بحريرة \*

**٢٧٦١٧ - ملئى بحريرة** *Clematis maritima* (5). *Clématite maritime* (F).  
 جنبة فراء منتصبه تملو نحو ١٢٠ سم . منبها للشطوط  
 البحرية . اوراقها مركبة ، وريقاتها قمية التفريض  
 بحرية اللون . ازهارها صفيرة اللند تبينة البياض || ازهارها  
 يستمر من ايار الى تموز .

#### \* ملئى جبجية \*

**٢٧٦١٨ - ملئى جبجية** *Clematis montana* (5). *Clématite montagnarde* (F).  
 جنبة سرورية عارشة تطلو من ٤ الى ٦ امتار . ساقها  
 وفروها جزوية اللون . اوراقها مركبة مشطية . وريقاتها  
 اطلحجية الشكل ، عابقة الخضار . ازهارها يضاء اللون ،  
 ابطة الارزكاز ، مستطيلة المالحاق ، كبيرة اللند ، قطرها  
 يراوح من ٥ الى ٩ سم . || ازهارها يستمر من ايار  
 الى حزيران .

#### \* ملئى جبرية \*

**٢٧٦١٩ - ملئى جبرية** *Clematis campaniflora* (5). *Clématite en cloche* (F).  
 جنبة سرورية عارشة تطلو من ٣ الى ٤ امتار . اوراقها  
 مركبة ثلاثية . تصلها اخضر اللون عادم التنسنت . ازهارها  
 جبرية الشكل ، رباعية الفصل الازرق ، مستطيلة المالحاق ،  
 متدلية || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

#### \* ملئى زرقاء \*

**٢٧٦٢٠ - ملئى زرقاء** *Clematis viticella* (5). *Clématite bleue* (F).  
 جنبة سرورية عارشة تطلو من ٤ الى ٦ امتار . اوراقها  
 مركبة ثلاثية التثليل ، وريقاتها خضبة عادمة التنسنت .  
 ازهارها كبيرة اللند ، زرقاء اللون ، قمية الشكل ، رباعية  
 الفصل ، قطرها يراوح من ٥ الى ١٢ سم . || ازهارها  
 يستمر من حزيران الى ايلول .

#### \* ملئى سامة ، و شراب \*

**٢٧٦٢١ - ملئى سامة ، و شراب** *Clematis vitalba* (5). *Clématite des haies, C. brûlante, Herbe aux yeux, Berceau de la Vierge, Vigne blanche* (F).  
 جنبة مبطلو عارشة تطلو من ١٠ الى ٢٠ م . اوراقها  
 مركبة مشطية . وريقاتها تده من ٥ الى ٩ ازواج ، تصلها  
 حبل الخضار الزاوي . ازهارها رباعية الفصل الخلية  
 البياض اللون ، قطرها نحو ٣ سم . اسديتها وديقاتها بيض .  
 ازهارها يستمر من حزيران الى تموز . وهي تكثر في المواقع  
 الرطبة اعصها السباحات . مصفاة غزيرة المادة الباسمة  
 النشيطة .

## ٢٧١٢٨ - ملئفون \* Sicana odorifera (S).

Melocoton (F).

نبات زراعي حولي وحيد الجنس والنوع من فصيلة القرعيات. مهدد بعض مناطق امريكا الجنوبية. يستعمل كخض انواع القرع في الطبخ ويستعمل ايضا في تعطر المنازل والقاتحات المامة لاله فواح الحرف مستحب || ساقه عارضة طول نحو عشرة امتار. حوافها مجهزه بمساجيم تمكنها من الالتصاق بأي سطح كان. اوراقه معتقة وكثية و سباعية الفصوص. ازهارها صفراء اللون، كبيرة القد، خاسية البتلات، حمراء قرعية الشكل تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم. لونها، عند الادراك، الى الحمرة البرتقالية || تؤكل الثمار مطبوخة قبل دغورها في طور الادراك لان لبابها يتصلب عند الادراك وفعوض منه اربع عطر ثابت يستقر بعض الوقت.

## ٢٧١٢٩ - ملئفون Embryon (F). Embryo (E).

المادة الخلة المكونة الناشئة التي يستمر بها الحيوان والنبات. وهي في الانسان مشقة وفي الحيوان نعمة وفي النبات نثيب.

## ٢٧١٣٠ - ملك العقبان Alge Impérial (F).

هو العقاب القيصري، اطلبا.

## ٢٧١٣١ - ملكة النحل Reine des abeilles (F).

Queen-bee (E). هي النحلة الانثى البيض و اميرة ثول النحل والخلية والتغير.

## ٢٧١٣٢ - ملكوتية Malacologie (F).

Malacology (E). فرع من الزولوجية يبحث في شعبة الرخويات.

## ٢٧١٣٣ - ملكوك Melicoccus (S).

Mélisque (F). Melicoccus (E).

جنس اشجار وشجيرات برية عرو من فصيلة السابديات. انواعها المعروفة قليلة المدم موطنها بعض المناطق الاستوائية من البلاد الامريكية، اغصنها جبيكة || ساقها منتصبة كثيرة الفروع تطول من ٣ الى ١٠ امتار اوراقها ابيدة، مركبة، متعاقبة، وريقاتها شغمية العدد، ثنائية او ثلاثية الازواج، نساها جامدة الويل، يضية الشكل. ازهارها حنكولي التجميع، طرفي الازهار. ازهارها صغيرة يضاء اللون او وردية، عطرية الريح. ثمارها نوية مأكولة اللباب والمجبات.

## ٢٧١٣٤ - ملكية Propriété (F).

Property, Ownership (E). هي حق الاستعمال والاستمتاع والتصرف في الشيء اطلاقاً في نطاق القانون.

## ٢٧١٣٥ - ملكية مشتركة Copropriété (F).

Joint property (E). هي حق ملكية مال منقول او ثابت موزع على افراد متعددين. وقد تكون الملكية المشتركة شائعة او غير شائعة.

## ٢٧١٣٦ - ملكيس رومي Dracocéphale moldavicus (F).

هو رأس التنين الملداني، اطلبا.

## ٢٧١٣٧ - ملئوس Melampus (S).

Mélampe (F). Melampus (E). جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدميات الارجل وفصيلة الحفصيات. انواعها المعاصرة المعروفة نحو ١٠٠

## ٢٧١٢٩ - ملئى لهيب، ملئى عطرية، قميص

بنث الملك، عئصرة

Clématis flammula (S). Clématite odorante, C. flammula (F).

جنية مبدولة عارضة تطول نحو ٤ امتار. اصلها حوض البحر المتوسط. اوراقها مركبة شطية، وريقاتها ضيقة حريفة كارية تحرق الجلد. ازهارها صغيرة القد غبراء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

## ٢٧١٣٠ - ملئى متعقبة Clématis recta (S).

Clématite dressée, Téverin (F).

جنية حصاصه دغلة مبدولة تطول من ٦٥ الى ١٢٠ سم. ساقها منتصبة جوفاء. اوراقها مركبة ثنائية او ثلاثية الازواج. وريقاتها يضية النصل، بحرية اللون، صهارها لا تكوي، ازهارها مكسية، عطرية، يضاء اللون. ازهارها يستمر من ايار الى تموز

## ٢٧١٣١ - ملئم Périsme (F). Peristome (E).

ما يكتنف الفم في الحيوانات الدنيا وما يحوق ثغرة الفطور ج ملائم.

## ٢٧١٣٢ - ملئف، خنثيرة Treuil (F).

Windless, Hand-winch (E).

آلة بسيطة تستعمل لرفع بعض الاثقال.

## ٢٧١٣٣ - ملئف \* Brassica oleracea capitata (S).

Chou, Chou cabus, Chou potager (F). Cabbage, Drum head cabbage (E). Kraut, Kopfkohl (D). Cavolo, Cavolo cappucco (I). بقلة زراعية من فصيلة الصليبيات. ضرورها واسرارها كثيرة العدد. جميعها ملغلة الاوراق المأكولة اثنى بعض الفيتامينات الصحية. تحللها الاصلي يعطي:

٣٠٪ من المواد الازوتية

٥٠٪ من المواد العنيتية

٢٥٪ من المواد الهيدروكربونية

## ٢٧١٣٤ - ملئف بروكسل \* Brassica oleracea gemmifera (S).

Chou de Bruxelles (F). Brussels sprouts (E). Brüsselar kohlr, Rosenkohlr (D). Cavolo di Brusselle (I).

نوع من الملئوف الزراعي المأكول، تشابهه غمية الشكل، صغيرة القد، تعد من ٦ الى ٢٠ اذراكها تدرجي يتثنى من الاسفل.

## ٢٧١٣٥ - ملئف Gravid (F).

Gravid, Pregnant (E).

الملقح الحامل من الاناث او من كانت طائتها تمكثها من ذلك.

## ٢٧١٣٦ - ملئف Malachra (S).

Malachra (F). Wild ochra (E). Malachra, Weichmalve (D). Gombo salvatico (I).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الجبازيات. انواعها المعروفة خمسة، جميعها مرصوة، اصلها البلاد الامريكية. اوراقها متعاقبة لا قياسية الشكل والتفصيص. ازهارها رويسية منها الالبيض والالبي والوردي والاحمر.

## ٢٧١٣٧ - ملئط Pointe du bec (F).

Point (of the beak) (E).

هو طرف مقار كل طائر إلا الكاسر.



ملئى منتصبة



ملئوف



ملئوف بروكسل



ملئفون



ملئوك

Salinité, Salure (F).  
Salinity, Saltiness (E).

٢٧٦٥٠ - مَلُوحَة

٢٧٦٥١ - مَلُوحِيَّة \*  
Corchorus olitorius (S).

Corète potagère, Corètte potagère, Guimauve potagère, Mauve des Juifs, Mélochie (F). Jew's-mallow, Nalta juta (E). Judenmalve, Meluchie (D). Corcoro ortense, Malva del giardini (I).

ويُسمَّى من قال « ملوكية ». نبات عشبي ينقل سوي من فصيلة الرزقنات. يزرع لأوراقه المطبوخة الناعقة التي تفيد المعدة والأمعاء. متعلبل زراعته تربة مروية غرارة خصبة يكثر فيها عنصر الأزوت الضروي أو المعدني.

٢٧٦٥٢ - مِلُودَة  
Meloë (S). Méloé (F).

Oil beetles (E). Mäiwürmer, Ölkäfer (D).

جنس حشرات من الملويدات. أنواعه المروفة ١٢ أصنافها المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم. أجسامها تطول من ١٠ إلى ٤٠ م. ذكورها أصفر قداماً من أنثائها. أثيرها تراوح من الزرقاء إلى السوداء النحسي. يكثر وجودها في المراعي على الأعشاب البرية من نيسان إلى حزيران.

٢٧٦٥٣ - مِلُود مَلُون \*  
Meloë variegatus (S).

Méloé variable (F). نوع من الملود، ثوبه إلى الزرقاء الخضراء الملوحة، حمار رأسه وكشله وسر يلمع إلى الخضرة الصفراء الذكر يطول نحو ١٢ م. والأنثى نحو ٣ م. || يكثر وجوده في نيسان وأيار، مسرعه الأعشاب والمراعي والأزهار البرية.

٢٧٦٥٤ - مِلُودِيَّات (F). \*  
Meloïdæ (S). Méloïdæ (F).

Meloïdæ, Blister beetles (E). Blasenkäfer, Pflasterkäfer (D).

فصيلة حشرات من مخدبات الاجنحة. أجسامها وأرجلها عديدة، جميعها طويلة صغيرة اللثة أو متوسطة، بعضها طلي. مرتفعها الإختبار والأزهار والأعشاب. تفرز، عند لمسها، مادة صفراء اللون كريهة الرائحة. شواربها وبهجتها اللسوي يحويان مادة لافطة تنجج الجلد وتثير الياء || قرونها الاستشعارية صولجانية، مركبة من ٩ إلى ١١ فاصلة. أرسافها خماسة التركيب باستثناء الخلفية فاتها رباعية الفاصل.

٢٧٦٥٥ - مَلُودَة \*، مِلُودُون \*  
Malurus (S).

Malure, Mérion (F). Malurus (E).

جنس طير من الجوارث سنيات المنقار. أنواعه المروفة نحو ١٥ أصنافها بلاد أستراليا، ملجتها الحياتي جامي. جامعاتها قليلة العدد. جميعها من الأرباب تألف الأراج المجرمة الأشجار والبراري الدفلة. قوتها الحشرات أصحها الحمنة والتمل والديدان وبعض الثآليل الحبيبة || أجسامها صغيرة تطول من ١٢ إلى ١٦ م. تتميز بأشعالة أذنانها وبكثافة سبالها. ألوانها متباينة الألوان فيها الاسود والأخضر والاسي والأخضر الزيتي والجروي والكتشي والأشهب والاحمر والأشع. الثوب الاناث لا تختلف عن الثوب الذكور لكنها أقل زهاء ولعة || تدفن أعشاشها في الأدغال. أناتها تحفن نحو ٦ بيضات على مرتين في الحول. الذكور تنارب الاناث في الحفن.

٢٧٦٥٦ - مَلُون \*  
Chêne égllops (F).

هو السنفدان الرومي، أعليه.

منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة || أصلها شبه غرولية الشكل، طرية القلبية المنسوبة الخطوط. فوماتها مستطيلة مسنة الخلفات.

٢٧٦٣٨ - مَلَمَح \*  
Profil (F).

Profil, Side face (E).

٢٧٦٣٩ - مَلَمَس \*  
Palpe (F). Palp (E).

٢٧٦٤٠ - مَلَمَس شَقِيوي \*  
Palpe labial (F).

Labial palp (E).

٢٧٦٤١ - مَلَمَس فكي \*  
Palpe maxillaire (F).

Maxillary palp (E).

٢٧٦٤٢ - مَلَمَسِي \*  
Palpifère, Palpifère (F).

Palpifer (E).

نمت تمريلي يطلق على كل عضو حشري أو لثاتي يحمل لمساً أو يقوم بوظيفة للمس أو يشبه للمس.

٢٧٦٤٣ - مَلَمَح \*  
Aile (F). Wing (E).

ملح للطائر جناحه. ويقال لجناحي الطائر ملتصحة.

٢٧٦٤٤ - مَلَمَكَة  
Trompe de l'éléphant (F).

Trunk (E).

هي غرطوم الفيل يتلصق به الطعام ولما ويستعمله في الدفاع عن النفس وفي نقل الأثقال.

٢٧٦٤٥ - مَلَمَسِيوم \*  
Melanthium (S).

Mélanthe (F). Melanthium, Bunch flower (E). Braunblümchen (D). Melanthio (I).

جنس نباتات عشوية معمرة من السورجانيات. أنواعه المروفة ثلاثة ترعب في الموامق الرطبة الظليلة. سوقها نخلة تطول من ٢٠ إلى ٦٠ م. تنتهي بالعتائد الزهرية التي يراوح ارتفاعها من ٥ إلى ١٠ م. أوراقها قدية، غمبة، كثيرة العدد تطول من ٢٠ إلى ٣٠ م. وتعرض من ٦ إلى ١٨ م. أنزادها إلى البياض الاخضر الملوحة || أنزادها يستمر من أيار إلى تموز. وصغير حقلها مع مطلق المواد السكرية. يقتل الدياب.

٢٧٦٤٦ - مَلَمَكُونيس \*  
Melaconis (S).

جنس فطور مجهرية من الرغيات، راجع رفة.

٢٧٦٤٧ - مِلَهَاب \*، أَلَهوب \*  
Lance-flammes (F). Flame thrower (E).

آلة تصدر اللهب وتلقفه وهي تستعمل خاصة في مكافحة الجراد.

٢٧٦٤٨ - مَلَهَب \*  
Pyrocephalus (S).

Pyrocéphale (F).

جنس طير من الجوارث سنيات المنقار وفصيلة النصوليات. أنواعه المروفة نحو ٩٠ أصنافها تمتد من المكسيك إلى البرازيل || أجسامها صغيرة. رؤوسها متوتجة بطوار تشرف على القفر. ألوانها متراكبة الألوان الزاهية الجميلة يكثر فيها الأحمر الصناب الشبيه بلهب النار || قوتها الحشرات الصغيرة والديدان والحوام.

٢٧٦٤٩ - مِلُون \*  
Colorimètre (F).

Colorimeter (E).

هو مقياس اللون، جهاز تقاس به ألوان السوائل لا صيا الحجر اذ يمتازها نور النهار.



ملبوس



ملهب



ملرشية



ملود ملون



ملر

اعطائها بحيرات وانهار الهند الصينية وقد انتشرت تربيتها في الاكوادوريم نظراً لجالها وصغر قدها لانها لا تطول اكثر من ١٠ سم. ثوبها زبرجدي اللون مجنوع بالاصفر والاخر. الذكر يجمع سره الانثى تحت قبة عاتمة يصطنعها من النسالة والخاب ويحافظ عليه دون انقطاع حتى التفث والانسلخ.

**٢٧٦٦٩ - ميكيل** Régulus (F). Regulus (E).  
المليك نجم ثير من كوكبة الاسد الاصغر. يبعد عن الارض نحو ٦٥ سنة ضوئية.

**٢٧٦٧٠ - ميككة و جتعل** Abeille mère, Ab. femelle, Reine (F). Queen bee (E).  
الملكية او الجعل الانثى الكاملة الشوار الشقي من النحل. تتميز بجسمها الابيض المستطيل. وظيفتها مع المازن للمحافظة على استمرار النسل والتكاثر النوعي || تساهل مرة واحدة في حياتها وتعيش نحو خمس سنوات تتصح بخلها ملايين المازن.

**٢٧٦٧١ - ميليتر** Millimètre (F). Millimetre (E).  
جزء من ألف من المتر.

**٢٧٦٧٢ - ميليكرن** Millimicron  
هو جزء من اصل مليون جزء قسم اليها المايتر الواحد.

**٢٧٦٧٣ - ملين** Malléine (F).  
سائل يستخرج من تكثير قصبات الروام ويستعمل في تشخيص هذا المرض في الخيل.

**٢٧٦٧٤ - ملين** Laxatif (F). Laxative, Opening (E).  
سهل خفيف.

**٢٧٦٧٥ - ميكنة** Mélinet (F).  
هي السرته، عشية مثيرة طيبة، اطليا.

**٢٧٦٧٦ - ميولا** Melioli (S).  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الونجيات. انواعه عديدة معظمها من فطور المناطق الاستوائية. مشيها غليظ الشكل اسمر اللون دقيق الاهداب المشنونة الاطراف يذب حل بشرة الاناد والافان والاورق ويشترك بمراشف ينقلها في النسيج. اصنامه الخارجية مكورة الشكل تلحف ازقاتاً عديدة تحضن البويضات. بويضاته، عند الادراك، سمراء اللون ااطليعية الشكل لا قياسية الانقسام الجولي المتفرس.

**٢٧٦٧٧ - ملين** Million  
المليون : ألف ألف.

**٢٧٦٧٨ - ملين متر** Mégamètre (F). Mégaméter (E).

**٢٧٦٧٩ - مماتنة و شردكة** Mimétisme (F). Mimesis, Mimicry (E).  
راجع شودة.

**٢٧٦٨٠ - مماليل** Identique (F). Identical (E).  
**٢٧٦٨١ - ممد** الماء : المروي من النبات.

**٢٧٦٥٧ - ميلاف** Filandreux (F). Fibrous, Stringy, Thready (E).  
نمت تعريفي يطلق على ما كان كثير الالياف من الثيار واللحم وغيرها.

**٢٧٦٥٨ - ملب** Maelibe (S). Málibe (F). Maelibe (E).  
جنس دوبيات بحرية من الرعويات مديات الدوجل وفصيلة التينيديات. انواعه الماصرة المعروفة قليلة العدد اعطائها معظم بحار البلاد الحارة || اجسامها هراطة مستطيلة مبطلة، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. رؤوسها كبيرة عرجمة الشكل يملؤها في نغمها من منتصف الرأس الى طرف الجسم بعض الحليات الدقيقة || لونها الى الشبهة السمراء. حلياتها شديدة السرة. ارجلها صغيرة، قليلة العرض، مستديرة الاطراف.

**٢٧٦٥٩ - مليت** Melette (S). Melet (F). Melet (E).  
جنس اسماك بحرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الصابونيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها صغيرة، شبه وشية الشكل، تطول من ١٠ الى ١٨ سم. رؤوسها مستديرة الجرم، صغيرة الاضطام والاشداق. زعانفها الظهرية فردية تتوسط الظهر. الخرسية شديدة الصغر تقابل الظهرية. اما الذيلية ففاقة. انواها تراوح من الريدة الفضية المواج الى الشبهة الرصاصية. اشهر انواعها الثلاثة التالية :

**٢٧٦٦٠ - مليت** Meletta phalerica (S). Meletta de la méditerranée (F).  
نوع من المليات. يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط. لحها جيد الصنف || تستعمل استهلاك البردين.

**٢٧٦٦١ - مليت المتوسط** Meletta sprattus (S). Meletta commune (F).  
نوع من المليات. يكثر وجودها في المحيط الاطلسي. تستعمل استهلاك البردين والبلح.  
**٢٧٦٦٢ - مليت مسافة** Meletta vanenosa (S). Meletta vénéneuse (F).  
نوع من المليات. يكثر وجودها في المحيط الهندي. لحها ذافع السم فيت.

**٢٧٦٦٣ - مليت مسافة** Meletta vanenosa (S). Meletta vénéneuse (F).  
نوع من المليات. يكثر وجودها في المحيط الهندي. لحها ذافع السم فيت.

**٢٧٦٦٤ - مليج** Blongios nain (F).  
هي الرواق الصغير، اطليا.

**٢٧٦٦٥ - مليعة** Milligramme (F). Milligram (E).  
جزء من ألف من الغرام.

**٢٧٦٦٦ - ميلاف** Poisson-cherville (F).  
المليفا سمكة بحرية تقص سقره، اطليا.

**٢٧٦٦٧ - ميلاف** Macropodus (S). Macropode, Poisson de paradis (F). Paradise fish (E).  
سمكة نهريه وسيلة الجنس والنوع من كثيرات الزعانف.

**٢٧٦٦٨ - ميلاف** Macropode, Poisson de paradis (F). Paradise fish (E).  
سمكة نهريه وسيلة الجنس والنوع من كثيرات الزعانف.

**٢٧٦٦٩ - ميلاف** Macropode, Poisson de paradis (F). Paradise fish (E).  
سمكة نهريه وسيلة الجنس والنوع من كثيرات الزعانف.

**٢٧٦٧٠ - ميلاف** Macropode, Poisson de paradis (F). Paradise fish (E).  
سمكة نهريه وسيلة الجنس والنوع من كثيرات الزعانف.

**٢٧٦٧١ - ميلاف** Macropode, Poisson de paradis (F). Paradise fish (E).  
سمكة نهريه وسيلة الجنس والنوع من كثيرات الزعانف.

**٢٧٦٧٢ - ميلاف** Macropode, Poisson de paradis (F). Paradise fish (E).  
سمكة نهريه وسيلة الجنس والنوع من كثيرات الزعانف.



مليت



مليعة



مليولا





27724 - مَنَّ - قَرْتَجِين (F). Manne (F). Manna (E).  
مادة سكرية أو بالاحرى مزيج من السكر والمنسبت  
والدسرين تفرزه بعض النباتات اما طوعياً او بواسطة  
حر اللحاء او بتأثير وخز بعض الحشرات كقرمزية المن  
وزيز المران وغيرها || والمن يقع على اشكال عديدة  
تختلف باختلاف مصادرها وطرق جمعها . اما النباتات  
التي تفرز للمن فكثيرة العدد اشهرها الاثل التيلي والحوير  
والشوح والماتول والمران المنى .

27725 - مَن - Puceron (F).  
هو الأرق ، اطلبه .

27726 - مَن قُطِي \*  
Aphis lanigera, Eriosoma lanigerum, Myzoxylus  
mail, Schizoneura lanigera, S. crataegi  
(S). Puceron lanigère (F). Woolly aphid (E). Blue-  
taus (D).

حشرة صغيرة القد من الاقيات ، تركب التفاح من براعم  
الى جلوره . تمش ضمن نطاق من النورس الشمسي المتراكب  
الذي يشبه ندف القطن || اغزارها وخيشة العاتية . يكافح  
عند ظهورها باستعمال اسد الحواشير الفعالة نفساً على  
الاشجار ويجذبها لتسكين وصول السائل اللعالي الى منش  
الجلور .

27727 - مَنَاجِد - Spalacidae (F). Spalacidae (E).  
هي فصيلة الخلدات من رتبة القواضم .

27728 - مَنَاج - Climat (F). Climate (E).  
هو مجموعة العوازل الجوية المؤقتة المميزة . راجع اقليم .

27729 - مَنَاصِي - Climatérique (F). Climatic (E).  
كل ما له صلة بالمناخ .

27730 - مَنَار - Borne (F).  
Landmark, Milestone (E).  
ما يوضع لاشهار حدود المقار أو الملك . وما يوضع على  
الطرقات العامة للإرشاد ولتدلال المسافة .

27731 - مَنَارَات - Pupidae (S).  
Pupides (F). Pupidae (E).

فصيلة من الرخويات مديات الارجل رتوية . اجناسها  
وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم البلاد المعتدلة  
الحارة من السواحل الى الجبال والجرود ، ترقب في المواقع  
الرطبة ولا تحصى الصنوع || اصنافها شبه اسطوانية الشرن  
متفاوتة الاحجام تبدو كالأبراج او المنارات || احراف  
اجناسها واشهرها المنارة والمنسلطو .

27732 - مَنَارَق - Rorqual commun (F).  
هي المحركول المعروف ، اطلبه .

27733 - مَنَارَك \* - Pupa (S).  
Pupe, Malloet (F). Pupa (E).

جنس حيوانات برية من الرخويات مديات الارجل وفصيلة  
المنارات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم  
اصقاف البلاد المعتدلة الحارة ، ترقب في المواقع الرطبة  
ولا تخرج من مكانها الا بعد اول صماية مطر || اصنافها  
شبه اسطوانية الشرن تقضي مع الاقتراب من العقب .  
جميعها محارزة وبعضها او مسج او ماس . اجسامها  
شبه اسطوانية الخلاء .

27714 - مَمَلَكَة ، مَالم - Règne (F).  
Kingdom (E).  
اول قسم في تصنيف الاحياء والجماد . يقال مملكة او عالم  
الحيوان ومملكة او عالم النبات ومملكة الجماد .

27715 - مَمَلَكَة الجَمَاد - Règne minéral (F).  
Mineral kingdom (E).  
هي مملكة الكائنات الطبيعية الخارجة عن نطاق الحيوان  
والنبات ، التي لا تتنازل ولا تتحرك .

27716 - مَمَلَكَة الحَيَوَان - Règne animal (F).  
Animal kingdom (E).  
المملكة الحيوانية قسم من الكائنات الحية تتغذى بالنبات  
والحيوان وتتكاثر ونمى وتتحرك وتتغذى . اقسامها عديدة  
تبتنى بوسيدات الحية وتنتهي بالحيوان الناطق .

27717 - مَمَلَكَة النَبَات - Règne végétal (F).  
Vegetable kingdom (E).

المملكة النباتية قسم من الكائنات الحية . تحلها العامة :  
تتنازل من بعضها لكنها لا تحس ولا تستطيع الانتقال  
من مكان الى آخر . هي قند ملايين الانواع تنقسم اربعة  
اقسام رئيسية || اولها كروية ، اي اسفلها درجة  
المشريات وهي عادمة الجذور والسوق والاوراق كالفطيات  
والفطريات || ثانياها الطحليات وهي تشمل الطحالب  
والكبديات || ثالثها مستوزات الزهر الوائتية وهي تشمل  
السرغاس والامروسيات والخديريات || رابعا البروتيات وهي  
تشمل مريانات البذور وبعائيات البذور . من عريانات  
البذور المحرطيات والسيكاسيات . ومن وعائيات البذور  
رحيدات الفلقة ونثائيات الفلقة || الرسم النباتي التابع  
« ثمرة الانساب النباتية » يميز الاقسام وقروها ويبين  
درجات سلم الارتفاع النباتي من البدييات ذوات الحلية  
الواحدة الى الوائتات ذوات ملايين الخلايا .

27718 - مَمَلُوحَة ، مَسَحَة - Eclat (F).  
Fragment (E).  
كل فصيلة نباتية يرز لها جلور تمكها من الحياة  
المستقلة فيها او فصلت وزرعت وسما .

27719 - مَمَسَاة - Terre noire fertile (F).  
المساة : الارض السوداء الخصبه .

27720 - مَمَسَاكِيَّات - Nectrioidaceae (S).  
Nectrioidaceae (F). Nectrioidaceae (E).  
فصيلة فطور مجهرية من رتبة الزويات . اجناسها وانواعها  
عديدة لا مؤذية . تتميز بوظيفتها الجلدية التركيب المعقوفة  
في الانسجة النضلة التي تجمعها عند انتشارها . لونها  
يصرح من الاصفر الى الاحمر القرميدي . بكتيناتها  
صغيرة . بوبلتها شفافة ومستطيلة .

27721 - مَمِيَّة - Mammée (F).  
هي الجلباس ، اطلبه .

27722 - مَمِيَّة امْرِيكِيَّة - Mammée d'Amérique  
هي جيباس امريكية ، اطلبه .

27723 - مَمِيَّاق - Glaucière (F).  
جر . الماشيا ، اطلبه .



من قُطِي



منارة

٢٧٧٤٦ - مَنَازِلُ القمر (F). Nuciola (F). Nuculolus (E).

القرصة اللولية الرئيسية. وضو التنازل في الخليات .

٢٧٧٤٧ - مَنَازِلُ القمر (F). Monine, Guenon (F).

She-monkey (E).

لغة اثني القرد. ومن اسمائها القردة والدحية والالعة .

٢٧٧٤٨ - مَنَازِلُ القمر (F). Munna (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات العليا متساويات الارجل وبصيلية الدويبات . انواعها المرققة قليلة العدد منتشرة في البحار الشالية || اجسامها صغيرة مبطة ، مستعرضة الرؤوس ، كبيرة العين الجاحضة . قوائمها متساوية الشكل والظلل باستثناء الزوج الامامي الاول المتحول الى ملاقط فكية .

٢٧٧٤٩ - مَنَازِلُ القمر (F). Pâturage (F).

هو المنبع ، اي المرعى الطبيعي .

٢٧٧٥٠ - مَنَازِلُ القمر (F). Pore de la peau (F).

Pore of skin (E).

ج منافع . والمنافع هي المناظف المجهزة الطبيعية الموجودة في بشرة الجلد عند الانسان والحيوان .

٢٧٧٥١ - مَنَازِلُ القمر (F). Germler (F). Hot-bed (E).

اذاة وحائية توضع فيها البزور المطلوب انتاشها .

٢٧٧٥٢ - مَنَازِلُ القمر (F). Usufruitier (F).

Usufructuary (E).

هو الذي يملك حق الانتفاع .

٢٧٧٥٣ - مَنَازِلُ القمر (F). Faisances (F).

Dues (E).

ما يزداد من المنافع على حصة صاحب الارض .

٢٧٧٥٤ - مَنَازِلُ القمر (F). Chenopodium vulvaria (S).

Vulvaire, Anserine fétide, Arroche puante (F). Stinking goose-foot, Dog's orache (E). Stinkender Gäusefuss (D). Chenopodium fectidum, Atriplice puzzolana (I).

نبات كرهه الرائحة من فصيلة السرمقيات . اوراقه متعاقبة متفكة كاملة طلعها اللون . ازهارها عقدية التجميع تحوي مع اوراقه بعض المواد الصمغية والناصرم الفعالة ككربونات الامونيوك ونترات البوتاس التي تلتصق بها الرائحة الكريهة

٢٧٧٥٥ - مَنَازِلُ القمر (F). Prégermée (F).

صفة البزور التي دخلت في طور التصعد او البروز قبل وضعها في التربة .

٢٧٧٥٦ - مَنَازِلُ القمر (F). Coulard (F).

هو المرطاب ، راجه .

٢٧٧٥٧ - مَنَازِلُ القمر (F). Cheiranthus (S).

Giroflée (F). Gilliflowe (E).

الاسم العلمي من الربري . والحري جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الصليبيات . انواعها ١٢ منها الحولية والحرولة والممررة . سوقها عشية خشبية . اوراقها متعاقبة بسيطة سنائية . ازهارها عقدية التجميع صفراء اللون او حمراء || والمشتور اسم شامل يطلق أيضاً على المتبلا الشبيهة به .

٢٧٧٤٥ - مَنَازِلُ القمر (F). Etapes de la lune (F).

Stage of the moon (E).

منازل القمر ثمانية وعشرون . ينزل القمر كل ليلة بواحد منها من مستطيله الى ثمانية وعشرين ليلة من الشهر . ثم يكون الخاق . فان كان الشهر تسماً وعشرين يوماً استمر ليلة ثمان وعشرين وان كان ثلاثين استمر ليلة تسع وعشرين . والعرب تقسم هذه المنازل الى قسمين وتسعي اربعة عشر منها شامية واربعة عشر بمانية . فالشامية ، بترتيب قولها ، تجدد بالشهرين ثم بالطين والثرى والدبران والمهقة والحمنة والدبران والثرى والطرف والجبلة والزبرة والصرقة والمواء والساك || اما البانية فارها الغفر ثم الزبانا والاكليل والقلب والشولة والنعام والبلدة وسعد النايح وسعد بلع وسعد السعد وسعد الاخبية والفروع الاول والفروع الثاني وتنتهي ببطن الحوت المعروف ايضاً بالرشاء .

٢٧٧٤٥ - مَنَازِلُ القمر (F). Organes reproducteurs (F).

Reproductive organs, Sire organs (E).

هي الاعضاء التناسلية في الحيوان عامة .

٢٧٧٤٦ - مَنَازِلُ القمر (F). Immunité (F). Immunity (E).

سلامة الجسم من الامراض وقوته الدفاعية . والمناعة قد تكون طبيعية او اكتسابية . راجع حصانة .

٢٧٧٤٧ - مَنَازِلُ القمر (F). Résistance (F).

Resistance (E).

٢٧٧٤٨ - مَنَازِلُ القمر (F). Adjudication au rabais (F).

راجع مزاد الناقصة .

٢٧٧٤٩ - مَنَازِلُ القمر (F). Restrictive allocation (E).

نوع من المناقصات لا يكون باب انتافس فيها مفتوحاً لكل راغب بل يقتصر فيها على بعض المتنافسين من تتخيم الادارة بعد اعتماد الآخرين .

٢٧٧٤٠ - مَنَازِلُ القمر (F). Hélophyte (F). Helophyte (E).

نمت لمرعي يطلق على كل نبات يمش ويمنو في ارسال المستنقعات غير المالحة .

٢٧٧٤١ - مَنَازِلُ القمر (F). Réimés secondsaires, Favillons (F).

Wing secondaries (E).

من ديش جناح الطائر ما يتبع صف القوام ويتقدم الخواطي . الواحد منكب .

٢٧٧٤٢ - مَنَازِلُ القمر (F). Praticabilité (F).

Praticability (E).

هي التيسير في النج والعمل تسهلاً لثانية .

٢٧٧٤٣ - مَنَازِلُ القمر (F). Manoeuvres dolosives (F).

Swindling (E). اعمال خارجية مادية يخدع بها فاعلها شخصاً آخر . وهي من طرق النش والخداع التي ينص عليها القانون .

٢٧٧٤٤ - مَنَازِلُ القمر (F). Habitat (F).

المكانة او المكان الذي يلائم هذا النبات فيعيش فيه طويلاً او طويلاً .

٢٧٧٤٥ - مَنَازِلُ القمر (F). Source (F). Spring (E).

المكان الذي ينبع منه الشيء كالماء والنفط الخ...



مَنَازِلُ

27768 - منجل  
Faucille (F).  
Sickle, Reaping-hook (E).  
أداة يدوية تستعمل للحش .

27769 - منجل مائي  
Faucard (F).  
Long-handled scythe (E).  
منجل خاص مستطيل المقبض يستعمل في حش النباتات المائية .

27770 - منجلي  
Falciforme (F).  
Falcate, Falciform (E).  
نمت وصفي يطلق على ما كان شكله شكل المنجل .

27771 - منجم  
Glissement, Mine (F).  
Lie, Loyer, Mine (E).  
موقع المدن في جوف الأرض .

27772 - منجلكة  
Rucher (F).  
Stand or shed for bees (E).  
المنجلكة والصبرة والنحيتة هي مجموعة القفران أو الخلايا التي يتجمعها النحال .

27773 - منحنى ، أزور  
Courbe (F).  
Graph, Graphic curve (E).  
منحنى

27774 - منحنى الأفلاق  
Curviline (F).  
Curvilinear (E).

27775 - منحنىات الإرتفاع  
Courbes de niveau (F). Contour lines (E).  
هي خطوط الارتفاع ، وأجسامها .

27776 - منخاب  
Calibreur (F). Jiggerer (E).  
آلة تختب التار أي تفرقها وتوزعها بحسب أبعادها .

27777 - منخبر  
Naseau (F). Nostril (E).

27778 - منخربات  
Foraminifères (F).  
Foraminifera (E).  
رئية حيوانات دنيا من الجذريات .

27779 - منخس  
Aiguillon (F). Goad, Sting (E).  
عصا طويلة مسارية الطرف يخسف بها بقر الحراثة .

27780 - منخسيات  
Porte-aiguillons (F).  
هي المحويات ، وأجسامها .

27781 - منخضة الميفس  
Inférovaries (F).  
Inferovaries (E).  
نمت تعبرني توصف به ازهار النبات المنخفضة الميفس من فئة المتحدات القملات .

27782 - منخل ، منقطن  
Blutoir (F).  
Bolter (E).

27783 - منخدة  
Vaporisateur (F).  
Vaporizer, Sprayer (E).  
جهاز يستعمل لنفخ السوائل وذرها كالغنى .

27784 - منذال  
Conocephalus mandibularis (S). Conocéphale (F).  
حشرة من الجنادب وفصيلة القبطيات . ثوبها ثنائي اللون ،

أخضر الكوسل والبطن والظهران ، اسمر الرأس والشرج والسيقان . جسمها صغير القد يطول من ١٩ إلى ٢٢ م . جناحهاا ملحفاان الجسم والترك والحرز . ساقهاا طولان من ١٩ إلى ٢٠ م . مرزهاا وسرركهاا مستطيلان جالسان

27785 - منثور أصفر \* ، خيري أصفر  
Cheiranthus cheiri (S). Girofée commune, G. jaune, G. de muraille, Carafée, Violeur jaune, Ravenelle (F). Bleedingheart, Wall-flower, Yellow gillflower (E). Goldlack, Leucoje (D). Violacciocco giallo, Bastone d'oro, Ramo d'oro (I).  
نوع من المنثور الأتربي . يجمه سرورية ، وممرة ، فرعاء ، تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها كاملة منقطة ، نصلها بحري اللون ، سناني الشكل ، خلي البشرة حل صفحته . ازهارها عقودية التجميع ، تاجي الأينكاز . ازهارها عطرية العرف ، صفراء اللون || ازهارها يستمر طوال الربيع والصيف .

27786 - منثور بري \* ، شيمش  
Matthiola livida (S). Matthiola livida, Girofée livide (F). Gillflower (E). Levkoje (D). Violacciocco (I).  
نوع من المنثور البرية الملبلة يملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم . ازهارها عقودية ، طرفية ، منقرعة ، قليلة العدد ، لونها إلى الصفرة الزيتية اللامعة يملوها تليج شيق اسمر || ازهارها يستمر طوال الربيع .

27787 - منثور شتوي \*  
Cheiranthus incanus, Matthiola incana (S). Girofée quarantaine, G. d'hiver, Cocardeau, Violeur (F). Gillflower, Queen's stock, Stock (E). Gemelne Gartenlevkoje, Winterlevkoje (D). Viola, Fior barocco, Fior bono (I).  
نوع من المنثور المحولي والغول وهو بالحقيقة نوع من المنثورا . سروريه وأمرامه كثيرة العدد . نباتاته تملو من ٣٠ إلى ٨٠ سم . سوقها خشوية فرعاء . أوراقها منقطة أحليجية الشكل . نصلها بحري اللون ، الحبل المراج ، خلي البشرة حل صفحته . ازهارها عقودية التجميع يكثر فيها المكس وفي صارية العرف مختلفة الألوان منها الأحمر والبشجي والودي والأبيض والأصفر والمزرق والموشح . ازهارها يستمر من آذار إلى تموز .

27788 - منثور قشبي  
Girofée des jardins (F).  
هو المنثورا المكسبة ، أطليها .

27789 - منج  
منج : المنج : الماش الأخضر .

27790 - منجا ، منجر ، منكو ، منغا  
Manglier (F). Mango tree (E).  
هي شجرة الانج ، أطليها .

27791 - منجاة \* ، منكاية ، منكاية  
Mangue (F). Mango (E).  
هي ثمرة الانج ، تعتبر من أفيد ثمار البلاد الحارة ويقال أنها تفتط الدم وتفيد الامعاء .

27792 - منجبي  
Mangabey (F).  
هو الحودل ، من القردة الالباءة ، أطليها .

27793 - منججرات  
Orycteropidae (S).  
Orycteropidae (F).  
هي فصيلة الحافرات من رتبة الدود .

27794 - منجج  
Pâturage (F).  
Pasture, Grazing (E).  
هو المنتجع ، مرج طبيعي أقل حشبا من المرعى .



منثور اصفر



منثور بري



منثور شتوي



\* منجاة

## ٢٧٧٩٧ - مننوسة اليكسية \*

*Bruchus brachialis* (S). Bruche de la vèsc (F).  
Vetch weevil (E). Zottelwickenkäfer (D).



مننأل

أما السرك فسُن الحلاقة الداخلية || وهو من الجنادب التي تألف المراعي والأماكن المشبة . قوته المواد النباتية أخصها المصنف والأوراك .

## ٢٧٧٩٨ - مننوسة هـ

Appontement (F).

Flying-bridge (E).

صقالة بحرية تقوم على الركائز تستعمل لشد السفن ، بقلوبها ، إليها منه السفن أو التفرغ . ج . منذخ .

## ٢٧٧٩٩ - مننوسة خشبية

*Menodora scabra* (S).

*Ménodore scabre* (F).

جنبة ممررة وحيدة الجلس والنوع من فصيلة الزيتونيات . مهدا المكسيك والمناطق المجاورة من الولايات المتحدة الأمريكية تزود لتزين || ساقها قصيرة تملو من ٢٥ إلى ٤٠ سم . فرونها مزرالية أوارقها صغيرة خيطية النصل طولها نحو ٢٠ م . وضرها ٣ م . لونها إلى الخضار الأصفر أزهارها بوقية صفراء اللون قطرها نحو ٢ سم . || تنويزها يستمر طوال فصل الصيف .

## ٢٧٧٩٧ - مننوسة رين

*Mandarinier* (F).

*Mandarin orange trees, Tangerine orange tree* (E).

هي شجرة الليمون الاندي أي اليوسني ، أطيبها .

## ٢٧٧٩٨ - مننوسة رينكة

*Mandarine* (F).

*Mandarin, Tangerine* (E).

ثمرة المندرين أي اليوسني أو الليمون الاندي .

## ٢٧٧٩٩ - مننوسة حريم

*Adné* (F). *Adnate* (E).

*Zygomorpha* (F).

*Zygomorphous* (E).

نعت تعريفي يوصف به كل نبات زوائده الزهرية متشابهة متعددة .

## ٢٧٧٩٩ - مننوسة كع

*Protractile* (F). *Protractor* (E).

*Amarante tricolors* (F).

هو الظليقة الثلاثية الألوان ، أطيبها .

## ٢٧٧٩٢ - مننوسة دي

*Mendélien* (F). *Mendelian* (E).

نعت تعريفي يطلق على كل قاعدة أو عملية بنيت من مذهب مندل الوراثي .

## ٢٧٧٩٤ - مننوسة ليكية

*Mendélisme* (F). *Mendelism* (E).

هي مذهب مندل في الوراثة ، مخلصه أن النبات يتوارث صفات معينة دون غيرها وذلك ينسب بمعدودة مضطربة لا شذوذ فيها .

## ٢٧٧٩٥ - مننوسة رورة

*Monodora* (F).

ثمرة تسمى حيدان ، أطيبها .

## ٢٧٧٩٦ - مننوسة البازلاء هـ

*Bruchus pisorum* (S). *Bruche du pois* (F). *Pas beetle* (E). *Erbsenkäfer* (D).

حشرة من المننوسيات . طولها يراوح من ٤ إلى ٥ سم . ثوبها إلى اللسرة ، ظهرها مخطط بالأخضر ، زفها حستلي . جيلها الحولي واحد . تركيب البازلاء دون سواها فتشخر الحبة وتقيم فيها ولا يوجد في الحبة الواحدة سوى حشرة أو رقة .

حشرة وأشة خاضعة حابية من فصيلة المننوسيات ورتبة مفصلات الاجنحة . موطنها يشمل معظم أقاليم حوض البحر الأبيض المتوسط ويمتد إلى داخل الشرق الأدنى وأروية . تألف زبانات البقية أينا كانت والبراري التي تنبت فيها الانواع البرية . غلافها تميش على طلع الأزهار وتلتها . يرقاتها تميش على الحبوب فتشخرها || جسمها صغير القدر بطول من ٢ إلى ٤ م . ثوبها إلى الرعدة السوداء يملوها في كوسلها بقشة يفضاه فتأخر الجفانة وبقشة أخرى صغيرة في المقدم . رأسها صغير الحجم . عينها كبيرتان . زباناها صولجانيان . متنها مستطيل الشكل ، مزق الطرف . ظهرها لا يلحف كامل البطن . غلافها تساعيتا التزير القالب . فظايبها مجهزة بمناخس حادة || لها جيل واحد في الحول . تخرج الحشرة الجملانة من بيئات الشتوي في أواخر أيار . تسافد بعد ظهورها بنحو أربعة أسابيع . وينتف الكن بعد مته بنحو خمسة أيام || البرقة عند تمام ادراكها ، أي بعد النصف بنحو ثلاثة أسابيع ، تطول نحو ٧ م . ثوبها إلى الخشنى الاثير . رأسها اسمر . سكتها الشرجية بمجزة يسركين دقيقين || طور الاكمال يستمر نحو ستة أيام ويتقضي في الحبة حيث كانت البرقة . ثم تخرج الحشرة الجملانة من الحبة وتتوجه إلى حيث تنجس لقضاء بيئات الشتوي .

## ٢٧٧٩٨ - مننوسة العدس هـ

*Bruchus lentis*, *B. pallidicornis* (S). *Bruche des lentilles* (F). *Lentil weevil* (E). *Linsenkäfer* (D).

حشرة من المننوسيات . طولها نحو ٣ م . ثوبها إلى السرة تملوها زفية بنية ويقع غبار اللون قليلة الانقسام || جيلها الحولي واحد . تركيب العدس فتشخر الحبة وتقيم فيها .

## ٢٧٧٩٩ - مننوسة الفول هـ

*Bruchus rufimanus* (S). *Bruche de la fève* (F). *Bean beetle* (E). *Speisebohnenkäfer* (D).

حشرة من المننوسيات طولها يراوح من ٤ إلى ٥ م . ثوبها اسود اللون يملوه زفب خفي اطحل اللواج || جيلها الحولي واحد . تركيب الفول فتشخر الحبة وتقيم فيها مع يرقاتها .

## ٢٧٨٠٠ - مننوسة اللوبيا هـ

*Acanthoscelidus obsolatus* (S). *Bruche du haricot* (F). *Common bean weevil* (E). *Speisebohnenkäfer* (D).

حشرة من المننوسيات طولها يراوح من ٣ إلى ٤ م . ثوبها إلى الخشنى ، زفها اطحل اللون . زباناها مشفارية الشكل . جيلها الحولي واحد . تركيب اللوبيا فتشخرها وتقيم فيها مع يرقاتها .

## ٢٧٨٠١ - مننوسة النفل هـ

*Bruchidius trifolii* (S). *Bruche des trèfles* (F).

حشرة من المننوسيات طولها ٢ م . ثوبها اسود اللون ، ظهرها مخطط بالأخضر . قزائنها وزباناها سود || جيلها الحولي واحد . تركيب مع يرقاتها يملو النفل على انواعه .

## ٢٧٨٠٢ - مننوسة صينية هـ

*Callosobruchus sinensis* (S). *Bruche chinoise* (F). *Cowpea weevil* (E). *Chinesischer Bohnenkäfer*, *Kundekäfer* (D).

حشرة من المننوسيات طولها يراوح من ٢ إلى ٣ م . ثوبها



مننوسة البازلاء



مننوسة البقية



مننوسة العدس



مننوسة الفول



مننوسة اللوبيا

بحرية اللون. ازهارها غصي الشكل ، خاسية التجميع .  
ازهارها صغيرة المالحق بيضاء اللون ، صناعية الملوّج ،  
قطرها يراوح من ٢ الى ٣ سم. تنويرها يستمر طوال  
شهر ايار .

٢٧٨١٣ - مَنَزِيلِيَّةٌ \*  
Mentzelia (S). Mentzelie (F). Mentzelia (E).

جنس نباتات عشبية برية وتربوية من فصيلة المازويات .  
منها بعض مناطق امريكا ، الثانية ، بعضها فراء تملو  
من ٣٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها لاطنة ، خاسية ،  
التفريص ، مذبذبة الفلق . ازهارها خنثوية ، خاسية  
الفصل ، خاسية او عشارية البتلات ، عديدة الاسدية ،  
عطرية العرف ، عاجية اللون او صفراء ، تنبلج في الليل  
ابتداء من الغروب || انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها  
التالية :

٢٧٨١٤ - مَنَزِيلِيَّةٌ عَشْرَايَّةُ البَتَلَات \*  
Mentzelia decapetala (S). Mentzelie à 10 pétales (F).

نوع من المَزِيلِيَّة . عشبة محولة تملو من ٦٠ الى ١٠٠  
سم. ساقها وفروعها كثيفة الاهداب القصيرة . اوراقها  
تطول نحو ١٥ سم. ازهارها عاجية اللون ، كبيرة القد ،  
قطرها من ١٥ الى ١٢ سم. وهي عشارية البتلات تضم  
نحو ٣٠٠ سداة || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٧٨١٥ - مَنَزِيلِيَّةٌ لِيْنْدَلِي \*  
Mentzelia Lindleyi (S). Mentzelie de Lindley (F).

نوع من المَزِيلِيَّة . عشبة حولية تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم.  
ساقها فروعها ماسية السحاء . اوراقها تطول نحو ٧ سم.  
نصالحها خالية عن الصفحتين . ازهارها جوية الصفار  
الزاهي ، قطرها نحو ٨ سم. وهي خاسية البتلات ، عديدة  
الاسدية نحو ١٥٠ || تنويرها يستمر من تموز الى آب .

٢٧٨١٦ - مَنَس \*  
Méristème (F). Meristème (E).

هو النسيج الانشائي في النبات .

٢٧٨١٧ - مَنَسَاب \*  
Compas de proportion (F). Proportional compasses (E).

٢٧٨١٨ - مَنَسَاب \* ، بُولَنُور \*  
Bulldozer

جراة آلية يتسع بها التراب والصخور فتدفع بها جرفاً  
من مكان الى مكان .

٢٧٨١٩ - مَنَسَاخ \*  
Pantographe (F). Pantograph (E).

جهاز يستعمل في نقل الرسوم وتكبيرها وتصغيرها .

٢٧٨٢٠ - مَنَسَر \*  
Bec d'oiseau de proie (F). Bill of the prey (E).

هو منقار كواكس الطير ، يتميز بقوته وانفتاح جبهته للذرية  
احادة الطرف .

٢٧٨٢١ - مَنَسَكَة \*  
Lame (F). Scale (E).

٢٧٨٢٢ - مَنَسَف \* ، مَنَسَكَة \*  
Winnowing-basket, W.-machine (E).

جهاز يدوي او آلي يستعمل في نفس الحبوب . لتخليقها  
من الاجرام .

اسود اللون يطوى بقع بيض جلية الارتسام || جليها  
الحولي واحد . تركيب مع رقاتها القدس والحمص والفاصوليا  
فتنشر الحب وتعلبه .

٢٧٨٠٣ - مَنَدَوِّسِيَّات \*  
Bruchidae (S). Bruchidae (F). Bruchidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة عُمَدِيَّات الاجنحة . اجناسها  
وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد ، زيا الجسم ، خطمية  
الترك . قرونها الاستشعارية مركبة من ١١ فاصلة لكنها  
غخلقة الاشكال يكثر فيها اعطلي والشاري والشلطي  
والصولجاني . اتحادها لا تلتصق كمثل الجسم . ارسافها  
خاسية التكون ، رباعية المظهر الخارجي . مكنتها ذري  
القدر ، يقضي الشكل ، اصفر اللون ، تمتصه الانثى على  
الازهار والثمار والحبوب فينتفح عن رقات دقيقة غبراء  
اللون تمش على الثمار والحبوب فتنتشرها وتنسلخ فيها وتتمحو  
الى حوريات فحشرات كاملة .

٢٧٨٠٤ - مَنَدُول \*  
Maena (S). Mendole (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة المنبوليات . انواعها للمروقة  
اطعناها المتوسط . جميعها صغيرة القد تملو من ١٨ الى ٢٢ سم  
تتميز زعانفها الظهرية الفردية المستطيلة وزعانفها الشربية  
القارعة || اشهر انواعها المتوفرة المنبولة ، اطعنا .

٢٧٨٠٥ - مَنَدُولَةٌ مَنَدُولَةٌ \*  
Maena vulgaris (S). Mendole commune, Amendoula, Matasoudale (F).

نوع من المنبول وهي سمكة منبولة في المتوسط . جسمها  
اعطلي الشكل بطول نحو ٢٠ سم . قرونها فصي اللون ،  
ظهورها عابق التفتيض تملو غطوط سم .

٢٧٨٠٦ - مَنَدَوِّسِيَّات \*  
Maenidae (S). Ménides (F). Maenidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شالكانات الزعانف . اجناسها  
وانواعها عديدة . اشهرها المنبول والشقام .

٢٧٨٠٧ - مَنَدِي \*  
Sennipithèque (F).

نوع من القرد الملقمة يدعى هبار ، اطعنا .

٢٧٨٠٨ - مَنَدِيلِيَّة \* ، مِي قَرَصَان المَرُوج ، اطعنا .  
Drain (F).

٢٧٨٠٩ - مَنَدِيلِيَّة \* ، مَنَدِيلِيَّة \*  
Drain-pipe (E).

منزعة . ج منازح ، قناة تستعمل لتفويض التربة اي  
لصرف مياهها الزائدة .

٢٧٨١٠ - مَنَدِيل \* ، مَنَدِيل \*  
Tendance (F). Tendency (E).

٢٧٨١١ - مَنَدِيلُ المَلِكِيَّة \*  
Exproprié (F). Expropriate (E).

هو المَقَار التي زعمت ملكيته من يد صاحبه .

٢٧٨١٢ - مَنَدِيلِيَّة \*  
Menziésia (S). Menziésia (F). Menziésia (E).

نبات معقود التعريف على اسم العلامة الانكليزي (ارشيبلد  
منري) . جنس جنينات صغيرة معمرة من فصيلة الخنثويات  
مهددا امريكة الثانية . انواعها للمروقة قليلة البد ||  
سوقها فروعها تملو من ٥٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها عابطة  
متناقة . نصالحها اعطليجية مستطيلة . صفحاتها السفلى



منبولة



منبولة



منساج



منش



منشارية السوسن



منشارية الكشمش



منشارية اللث



منشارية الورد

## ٢٧٨٢٢ - منشَارية

Pristidae (S). Pristidae (F). Pristidae (E).

فصيلة اسماءك من رتبة الاشلاق .

## ٢٧٨٢٩ - منشَارية

Tenthredinidae (S). Tenthredinidae, Sawflies (E). Blattwespen, Sägewaspen (D).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، جميعها صغيرة القد طولا براوح من ٣ الى ١٥ سم . انواعها مختلفة الالوان . قربوا الاستعمارية خيطية || ريقاتها دودية عديدة الارجل تحمل عادة دون الثانية او اكثر من ١٦ وهي باكريتها خاشية ومنها الرائحة والثماره .

## ٢٧٨٤٠ - منشَارية و ذباب منشَاري

Tenthredo (S). Tenthrede, Mouche à scie (F).

جنس حشرات من فصيلة المنشاريات ، انواعه نحو ٢٠٠ اكثرها من الحشرات الضارة ، شذام مرزاها منشَ من كلنلشر عتقرو اصلب اللحاء . ريقاتها ناعمة لا تعف من شيء . اشهر انواعه المؤذية ما يتبع :

## ٢٧٨٤١ - منشَارية السوسن

Rhadinocera mians (S). Tenthrede des iris (F). نوع من المنشارية ، لها جيلان في الحول ، طولها براوح من ٧ الى ٩ سم . نوبها الى السواد اللامع . زباناها قصيرتان . تظهر في اوائل سيزون || ريقها اسطوانية الجسم المائل الاشهب الثوب . رأسها مستدير الشكل جوزي اللون . تركب اوراق السوسن فتؤذيها أشد الاذى .

## ٢٧٨٤٢ - منشَارية الكشمش

Pteronidea ribesii (S). Tenthrede du groseillier (F). Imported currantworm (E). Gelbe Stachelbeerblattwespe (D).

نوع من المنشارية ، اجيالها الحولية ثلاثة . طولها براوح من ٦ الى ٨ سم . ذكورها سود الانواب انثاهما صفر . ريقاتها غضر الاثواب المنشفة بكت سود . تركب الكشمش فتلهم كامل نصل الورقة وقد لا تعف من العروق.

## ٢٧٨٤٣ - منشَارية اللث

Athalia colibri (S). Tenthrede de la rave (F). Turnip sawfly (E). Kohlrübenblattwespe, Rübenblattwespe (D).

نوع من المنشارية ، اجيالها الحولية ثلاثة . طولها براوح من ٧ الى ٨ سم . نوبها الى الصفرة . رأسها والقمم الخلفي من جوشها الى البصرة . ريقها سمرا ، للون غيرة المولج تحمل ١٦ زوجا من الارجل . تركب غتلف اوراق السليبيات اخصها اللث .

## ٢٧٨٤٤ - منشَارية الورد

Arge rosae, Hylatomis rosae (S). Tenthrede du rosier (F). Arge rosae (E). Rosenbüschthornwespe (D).

نوع من المنشارية ، لها جيلان في الحول . طولها براوح من ٧ الى ١٠ سم . رأسها وزباناها سود . جوشها اسود واسفر ، بطنها وارجلها صفر . اجنتها شفافة ودية المولج . ريقها الى الخضرة الزاكية . تركب اوراق الورد فتخفي عليها .

## ٢٧٨٢٣ - منشَل ، عُدَّة منشَارية

Gonade (F). Gonad (E).

هي العدة التي تنتج البلمات وتفرز الهرمونات . لك فالخصية هي المنشَل الذكري والمبيض هو المنشَل الانثوي ج منسل .

Narina de poisson (F).

Nostril of the fish (E).

المنسل ج مناسم . هو منخر الاسماك خاصة .

Aspidium lonchitis (S).

Aspidia (F). Holly fern, Shield fern (E). Schilfarn (D). Capelvenara doppio (I).

نوع من السراخس السباحيات المصرة . غصوبه عديدة منها البرية والبرية . يرغب في الارربة الرملية وفي المواقع الرطبة . اروعته مدادة . اوراقه منتصبه ، مراحه مثله الزوايا ، تركامه عادمة للنشاء ، لونه الى الخضار الاصفر . يزرع في المراكن فيجود .

Mancenillier (F).

Manzanilla (E).

## ٢٧٨٢١ - منشَارية

هي الصابة و اطبا .

Homogène (F).

Homogenous (E).

Relativisme (F).

Relativism (E).

المنسوية مذهب فلسفي يقول بنسبية المعرفة حتى في الزمان والمكان .

Lézardé (F). Cracked (F).

Ma (F). Cracked (F).

## ٢٧٨٢٩ - منشَوح

ما كان الفساح فيه .

Méristématique (F).

Meristematic (E).

منطقة التكاثر الخليوي حيث التنج الانشائية .

Trucherau (F).

Trucherau (E).

## ٢٧٨٣١ - منشَية

هي الميرفاديقن الممرور ، اطليه .

Origine, Source (F).

Origin, Spring (E).

هو مصدر الشيء او منبه .

Amidonnerie (F).

Starch-works (E).

هي المصل الذي يصنع فيه النشا .

Pistototype

نمت تمريني يطلق على كل جزء التي يتأثر بالهيسد فيتنطور .

Scie (F).

Scie (F). Saw (E).

سمكة بحرية من الاشلاق ، مشهورة باسم ابر منشار .

Scie (F). Saw (E).

Scie (F). Saw (E).

اداة يدوية أو آلية تعمل في نشر الاعشاب والعمادان والحجارة الخ .

Serriforme, Serrulé (F).

Serriform (E).

نمت تمريني ومنى يطلق على كل ما كان تفريرض حالته يشبه استنار المنشار .

Clivé (F). Cleavat (E). ٢٧٨٥٥ - **مُنْطَقِر**

Phénomène (F). ٢٧٨٥٦ - **مُنْطَع**  
Phenomenon (E). هو الظاهرة . ج منافع .

Phénoménisme (F). ٢٧٨٥٧ - **مُنْطَقِيَّة**  
المنشمية مذهب فلسفي يدعى أيضاً الظاهرية والحوالية .  
اطلب ظاهرة .

Narine d'oiseau (F). ٢٧٨٥٨ - **مُنْطَق**  
Nostril of the bird (E). هو المنخر عامة ومنخر الطير خاصة وما مشقان .

Bisectrice (F). Bisecting (E). ٢٧٨٥٩ - **مُنْطَف**

Germandrée sauvage (F). ٢٧٨٦٠ - **مُنْطَار**  
هو الاسقرديون البري ، اظلمه .

٢٧٨٦١ - **مُنْطَقِيَّة** ، **مُنْطَقِيَّة**  
Pulvérisateur (F). Pulverisateur, Vaporizer (E).  
آلة تستعمل لنضح الادوية السائلة على النبات . ولما صنع  
مختلفة الاشكال والاحجام والتصاميم وقد تكون آلية أو  
يدوية .

Schiste (F). Schist, Slaty rock (E). ٢٧٨٦٢ - **مُنْطَش**  
هو حجر الشيست . رابع شيست .

Coercible ٢٧٨٦٣ - **مُنْطَظ**  
ما كان قابلاً لضبط كالخيار وغيره .

Megaderma (S). ٢٧٨٦٤ - **مُنْطَاب**  
Mégaderme (F).  
جنس حيوان من فصيلة الحوريات . انواعه اربعة تتميز  
بقراطينها الطويلة الذقنة ، بزوائدها المنخرية الشائرة ،  
بامتدادها وروحية بساطها الفشائي ويغطيها من الذنب الظهر .  
كما انها عادمة التنايا العلوية ، أما لتواجدها فخمس .  
اجسامها صغيرة القند طولها يراوح من ٨ الى ١١ سم .  
ويغطيها من ٣ الى ٤ سم . أنثراها ربادية اللون يعلوها  
مربح أصفر يمتد مع اقترابه من ثيج الظهر الى مؤنها  
الريقية الشريفة وسرنديب والهند . تألف الكهوف والمغاور  
والبيوت الحرية . تعيش سجمات قليلة العدد . قوتها الحشرات  
والديدانيات والصغار والأسماك الصغيرة .

Polyplote (F). Polyplote (E). ٢٧٨٦٥ - **مُنْطَاش**  
كل خلية تتألف مجموعة نشبة المتشابهة من عدة مناسط .

Aérostatique (F). ٢٧٨٦٦ - **مُنْطَاقَة**  
Aerostatics (E). هي علم توازن الهواء .

Gamme ٢٧٨٦٧ - **مُنْطَاس**  
هو سلم سياق الانغام المتتابعة المتناسقة ان صاعدة او  
هابطة . وهو مدرج تتابع الألوان والمذاقات الخ...

Génome, Haplome (F). ٢٧٨٦٨ - **مُنْطَاش**  
مجموعة نفاش او نشب العامة الواحدة .

Zone ٢٧٨٦٩ - **مُنْطَاقَة**  
مساحات من الارضين تخضع لنظام طبيعي واحد وموالم  
جوية واحدة .

٢٧٨٦٥ - **مُنْشَارِيَّة بَرَاقة**

Calliroa limacina (S). Tenthrède limace (F).  
Pear slug, Cherry slug (E). Schwarze Kirschiabst-  
wespe (D).

نوع من المنشارية ، طولها نحو ٥ سم . ثوبها الى السرة  
السوداء ، اجنحتها شفافة . مرزما مستطيل للشلام . اناتها  
أكثر حداً من ذكورها تمتد مكنها في بشرة الفصل فينتف  
عن رقات تشبه الزنابق ، لوها الى الخفيرة السوداء . تركيب  
اوراق معظم الانجسار الشرة قمرى النصل وتنف عن  
المرق .

٢٧٨٦٦ - **مُنْشَارِيَّة دَمِيْمَة**

Tenthrède difformis (S). Tenthrède difforme (F).  
نوع من المنشارية ، متوسطة القند ، غليظة الشكل . طولها  
يراح من ٦ الى ٧ سم . ثوبها الى السرة . اجيالها الحولية  
ثلاثة . رقاتها مؤذية تقضم اوراق الورديات والصليبيات .

٢٧٨٦٧ - **مُنْشَارِيَّة سَوْدَاة**

Tenthrède aethiops (S). Tenthrède noire (F).  
نوع من المنشارية ، صغيرة القند ، طولها يراوح من ٥ الى  
٦ سم . ثوبها الى السرة السوداء . اجيالها الحولية ثلاثة .  
رقاتها مؤذية تقضم غضيب النصل على صفحتها العليا .  
والبرقة تبدو صفراء اللون خضراء الملوحي ثم تتحول رويداً  
رويداً الى السرة الخفيفة فالداكنة .

٢٧٨٦٨ - **مُنْشَارِيَّة مُزْرَعَة**

Emphytus cinctus (S). Tenthrède à coinceure (F).  
نوع من المنشارية ، متوسطة القند ، طولها نحو ٨ سم . ثوبها  
الى السرة المزرة بالاسود . اجيالها الحولية تراوح من  
٢ الى ٣ . رقاتها سمراء اللون تمس في الانابيب المكنكة  
تندلها من مواضع القطع على اثر التشذيب والتقليم .

٢٧٨٦٩ - **مُنْشَارِيَّة مُنْطَقَة**

Tenthrède zonata (S). Tenthrède zonée (F).  
نوع من المنشارية ، صغيرة القند ، طولها نحو ٥ سم . ثوبها  
الى السرة الفاتحة المنطقة بالاسود . رقاتها مؤذية تقضم  
اوراق نباتات النسيعة الوردية اخصها الورد .

٢٧٨٧٠ - **مُنْشَاط** ، **مُنْشَاس المَوْكَة**

Dynamomètre (F). Dynamometer (E).  
جهاز تقاس به قوة الانسان والحيوان والآلات الميكانيكية .

٢٧٨٧١ - **مُنْشَاط كَهْرَبَائِي**

Electrodynamomètre (F). Electrodynamomètre (E).  
جهاز يرتكز على ما تمارسه الفطنة من تأثير في التيار  
الثابت والمتحرك .

Doseur (F). Dosimeter (E). ٢٧٨٧٢ - **مُنْشَاق**  
جهاز يستعمل في التفتيح او التركيز .

Séchoir (F). Drying-sun (E). ٢٧٨٧٣ - **مُنْشَر**  
المكان الملائم لتجفيف اوراق التبغ في الشمس وهو  
يعني ايضاً الاجهزة المختلفة التي تنشر عليها مشايك التبغ  
الاخضر رويداً تجف الاوراق اخصها المناثر الطليقة  
والملجوبة واللغالة .

Scierie (F). Saw-mill (E). ٢٧٨٧٤ - **مُنْشَرَة**  
هي معمل نشر الخشب وصناعتها .



منشارية بَرَاقة



منشارية سوداء




منشارية مؤذية



منشارية منطقة



منشفة يدوية



منشفة آلية



منطاب



Manglier (F).

٢٧٨٨٤ - منقاع

هي شجرة الانج ، اطلبها .

Manganate

٢٧٨٨٥ - منقاعات ، منقعات

المنقعات هي املاح المالح المنقي .

٢٧٨٨٦ - منقعيروا ، منقعيروا ، منقعيروا

Manganèse (F). Manganese (E).

معدن اشهب اللون شديد الصلابة ولللمعة قابل للصلق .  
وزنه (Mn - م) وزنه الانج ٤٩,٩٣ هـ ثقله النج ٧,٣  
يحلل الماء في ١٠٠ سم . ينصهر في ١٢٢٥ سم . ويحل  
في ١٩٠٠ سم . وهو يوجد في الطبيعة حل هيئة مركبات  
كهاوية انصهها الاوكسيدات والكربونات ، ويوجد أيضاً  
في معظم النج النباتية ولكن بمقادير ضئيلة كما يوجد في  
جميع الارربة . يذلت النج الضئيلة لا يستعمل ويستخدم  
صناعياً في عدة تراكيب انصهها الصلب .

٢٧٨٨٧ - منقعو هو الانج ، اطلبه .

Mangiferae (S).

٢٧٨٨٨ - منقيبات

Mangiférées (F). Mangiferae (E).

سبط من البطيات وسهم من جعلها فصيلة مستقلة .

Soufflet (F). Bellows (E).

٢٧٨٨٩ - منقفاخ

اداة يدوية تستعمل في ذر المساق الزراعية .

Soufreuse (F).

٢٧٨٩٠ - منقفاخ كبريت

Sulphurator (F).

اداة تستعمل في ذر مساق الكبريت .

Caillotte (F).

٢٧٨٩١ - منقحة ، فون

Rennet (E).

جزء من معدة الخبثات .

Prérens (F). Rennet (E).

٢٧٨٩٢ - منقحة

هي المسوة ، خيرة قابلة للذوبان ، تستخرج من سفحة الجدي  
الرضيع ، تستعمل في تجبن الحليب .

Exécuteur (F). Executor (E).

٢٧٨٩٣ - منقذ

هو من قام بالتفية .

Exécuteur testamentaire (F). Executor (E).

٢٧٨٩٤ - منقذ الوصية

هو الذي يمينه الوصي في الوصية لينفذ ما جاد فيها .

Déodactyles (F).

٢٧٨٩٥ - منقصلات الاصابع

احد قسم الطيور الجوارح ، يشل هذه رقبته والميدي  
من القنائل والجناس والافانج .

٢٧٨٩٦ - منقش

نمت تعريف توصف به البجاجة التي كفت عن البيض .

Egrenouse, Egreneur (F).

٢٧٨٩٧ - منقش

آلة تفصل حب الذرة وبزور مختلف نباتات الكلا عن  
مطرها وراثيتها وسابها وسفها .

Déhiscant (F). Dehiscant (E).

٢٧٨٩٨ - منقلى

نمت تعريف توصف به الاضواء النباتية التي يغلق درزها  
عند الادراك .

Bec (F). Beak, Bill (E).

٢٧٨٩٩ - منقار ، منقار

الجزء القرني الامامي البارز من رؤوس الطير .

Ressort (F).

٢٧٨٩٠ - منطقة الاختصاص

Province (E).

هي المنطقة التي يشغلها اختصاص اسدى الحاكم وهي  
ايضاً تبين درجة الاختصاص .

Baudrier d'Orion (F).

٢٧٨٩١ - منطقة الجوزاء

Orion's belt (E).

ثلاثة نجوم مستقيمة الصف مركزها في وسط كوكبة الجبار  
أي الجوزاء . وتسمى ايضاً النطاق وطاق الجوزاء وفار  
الجوزاء ويد الجوزاء .

Zone franche (F).

٢٧٨٩٢ - منطقة حرة

Franked zone (E).

منطقة اقليمية معينة لا تخضع لرسوم الجمرية .

Circonscription foncière (F). Ground circumscription (E).

٢٧٨٩٣ - منطقة عقارية

Castodes (F). Castoda (E).

٢٧٨٩٤ - منقليات

صف من الدود الرغبات .

Mniotiltidae (S).

٢٧٨٩٥ - منقليات

Mniotiltidés (F). Mniotiltidae (E).

فصيلة طير من الجوارح سيات المناقير . اجناسها وانواعها  
عديدة اعطتها نعت من الهند الى امريكا الجنوبية والشيالة ||  
اجسامها صغيرة قريبة الشبه بالقرقة . انواها ملونة  
تكثر فيها الطحلة والياض || ملجها الحياتي زوجي في  
ذن التساقط والحسن ثم جماعي || قربها الحشرات وكبها  
ويرقها والثار البانعة والبلور || تدن في تجايف الانجار  
من مرتين الى ثلاث مرات في الحول . حسنتها اربع  
بيضات .

Isotherme (F). Isotherm (E).

٢٧٨٩٦ - منقلام

منظام او ايزوترم . ج منظم : خطوط الحرارة الاقليمية  
او العالمية المتساوية التوزيع .

Détargent, Détersif (F).

٢٧٨٩٧ - منقظ

Detergent, Detersive (E).

Organisation (F).

٢٧٨٩٨ - منقظمة

Organization (E).

٢٧٨٩٩ - منقظور عظمي

Perspective linéaire (F). Linear perspective (E).

Crabe (F). Crab (E).

٢٧٨٩٠ - منق

حيوان مائي من القشريات يعرف بالسرطان .

Crabe à laine (F).

٢٧٨٩١ - منق مصوف

هو الخيل دويبة جمرية من القشريات ، اطلبه .

٢٧٨٩٢ - منقث

منقث النهر ثلاثة انجم ثيرة متتالية من كوكبة النهر  
المعروفة ايضاً بكوكبة اربدانوس . موقعها في المنقث  
الذي للنهر .

٢٧٨٩٣ - منقثات الاجنحة

راجع ملتويات الاجنحة .



منقفاخ



منقفاخ كبريت

مترابكة الألوان الساطعة. قوتها الثَّار والبذور وبعض الحشرات || اعرف انواعها وأشهرها المنكان الطويل الذنب والمنكان الزاهب .

٢٧٩١٤ - مَنَكَّان رَاهِب \* Pipra monacus (S).  
Manakin moine (F).

طائر من المنكان . موطنه بعض مناطق البرازيل . يألف الثَّبات . فوجه لا يتجاوز ٢٠ زوجاً || جسمه صغير القد ، ربة ، يطول نحو ١٥ سم . ثوبه الملوي الى السواد الاسفع الملاج . ثوبه السفلي الى البياض الاصفر . يتميز بقده عنه التي تتنفع وتنتفض عند الطلب فتبدو كاللَّقْن وهو ما دعي الى كنيته بالراهب . مقاده صغير الحجم ، ذلق الطرف المسن . حقدته عينه عسلية اللون . جناحه قصير وذنبه كذلك . رصاه دقيقان ، رفيهان ، احمران || اخلاقه رضية لكنه كثير الوجيل وشده الحذر . قوته الثَّار البانمة وبعض الحشرات || يذنب عنه في الاثمار القليلة الارتفاع . الاثنى تضع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو ١٥ يوما .

٢٧٩١٥ - مَنَكَّان طويل الذنب

Pipra candata (S). Manakin à longue queue (F).  
طائر من المنكان . موطنه بعض مناطق البرازيل . يألف الثَّبات الرطبة . فوجه لا يتجاوز ٢٠ زوجاً || جسمه صغير القد ، ربة ، يطول نحو ١٧ سم . ثوبه الى الزرقه البياوية . جبته وقه رأسه الى الحمرة الزاهرة . حمراء وصفه وجناحه وذنبه الى السواد الاسف اللامع . ذنبه مستطيل الشكل ، مستدير الطرف . حقدته عينه الى الحمرة القزوينية . مقاده صغير الحجم ، ذلق الطرف المسن . رصاه دقيقان رفيهان . حطبا اللون . ثوب الاثنى الى الخضار الزيتي السوي . ثوب الصغار حق التحسير الآول لا يختلف عن ثوب الاثنى || اخلاقه هنية لكنه كثير الوجيل والحذر . قوته الثَّار البرية والزراعية والحشرات . طيرانه قصير الشوط يكثر فيه السفيت والتصعيد والتبييط || يذنب عنه في الاثمار القليلة الارتفاع عند اطراف الاغصان . الاثنى تضع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو ١٥ يوما .

٢٧٩١٦ - مَنَكَّاب الجوزاء Bêteigeuse (F).  
Bêteigeuse (E).

منكب الجوزاء نجم ثَّار يرتقالي القرن من المرتبة الاول . مركزه على منكب الجبال اليسى اى الشرقية . يبعد عن الارض نحو ٣٠٠ سنة ضوئية .

٢٧٩١٧ - مَنَكَّاب القُرس

منكب القُرس نجم ثَّار من كوكبة نجوم القُرس الاعظم .

٢٧٩١٨ - مَنَكَّاب ذي العِثان

كوكب .

٢٧٩١٩ - مَنَكَّة

Brunfelsia hopeana, Franesca uniflora (S).  
Manaca (F). Manaca tree (E). Manakakraut (D).

الاسم العربي كانفرنسي والانكليزي والامالي ترميب الاسم البرازيلي . شجيرة طيبة برية وتربيتية من فصيلة الباذنجانيات . مهداها بعض مناطق امريكا الجنوبية اخصها البرازيل || ساقها فروعاء تملو نحو اربعة امتار . اوراقها متعاقبة ،

٢٧٩٠٠ - مَنَقَّار الدَّجَاجَةِ

منقار الدجاجة نجم ثَّار من كوكبة الدجاجة .

٢٧٩٠١ - مَنَقَّار الغُرَّاب

منقار الغراب نجم من كوكبة الغراب المعروفة ايضا بالغايه البالي .



منقاية

٢٧٩٠٢ - مَنَقَّاعِيَّات Limnanthaceae (S).

Limnanthaceae (F). Limnanthaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، جميعها احشاب متعمية . منظمها حولي . اوراقها مركبة مستطيلة الزناد . ازهارها فردية ، خاسية البتلات ، عشارية الاسدية . ثمارها حنينة صغيرة القد .

٢٧٩٠٣ - مَنَقَّاعِيَّة Limnanthes (S).

Limnanthe, Cresson fleuri (F). Meadow-foam (E).  
Rosenrote Sumpfbiume (D). Limnanto (I).  
جنس نباتات عشبية متعمية من فصيلة المنقاقيات . انواعها قليلة العدد ، جميعها برية ، سرقها تطول من ٢٠ الى ٧٠ سم . منظمها ينبت على الارض . اوراقها مركبة ورشية خمرية . ازهارها كثيرة العدد منها الاصفر والابيض والوردي .



منقل

٢٧٩٠٤ - مَنَقَّاب

المنقب نجم ثَّار من كوكبة قيطس مركزه في الرأس .

٢٧٩٠٥ - مَنَقَّاب Palmeria (F).

Palm-plantation (E).  
هي الحائش اى بستان النخل العامر .

٢٧٩٠٦ - مَنَقَّاسِم ، مَنَقَّادُور القِسْمَة Divisible

Déperditeur (F).

٢٧٩٠٧ - مَنَقَّاسِم  
نمت تعريفي يطلق على كل مادة او عنصر يسبب نقصاً في طاقة الجهد اى الطاقة الكامنة في الجسم .

٢٧٩٠٨ - مَنَقَّاطع Discontinuu (F).

Discontinuous (E).  
هو التقطع اى غير المستمر او المتواصل .



منكاش

٢٧٩٠٩ - مَنَقَّاع Marsh, Bog, Fen, Swamp, Morass (E).

ارض منخفضة يستنقع فيها الماء .

٢٧٩١٠ - مَنَقَّاعِيَّ Palustre (F). Paludal (E).

منقعي وندراتي ونديري : نمت تعريفي يطلق على النباتات التي تعيش في المناطق .

٢٧٩١١ - مَنَقَّاس ، مَنَقَّاس Gonlometre (F).

آلة لقيس ، تقاس بها زوايا الارض . Gonlometer (E).

٢٧٩١٢ - مَنَقَّاش Binette (F). Hoe (E).

اداة لعزق الخلفيت تستعمل باليد .



منكان راهب

٢٧٩١٣ - مَنَكَّان Pipra (S).

Manakin (F). Manakin (E).  
جنس طير من فصيلة البيريات . انواعها المعروفة عديدة . موطنها بعض مناطق امريكا الوسطى والجنوبية . تألف الرياض والذباب الرطبة . نظامها الحياتي جماعي . افواجها تمتد من ١٥ الى ٢٠ زوجاً || اجسامها صغيرة ، ربة ،



منورينة

Manorina (S). **مَنُورِينَة** ٢٧٩٣٣  
Manorina (F). Manorina (E).  
جنس طير من فصيلة المغريرات . انواعها المعروفة خمسة  
موطنها أستراليا وأجزاء القارية منها . ملجتها الهياطي  
جماعي قوتها رقيق الاذيال والذات الزائلة والهايلام || اجسامها  
صغيرة . اذنانها مستطيلة ، مستديرة الاطراف . مناقبها  
خروطية . السنتها خيطية منمطة . تجرس الزهر كالنمل .  
اثولها متراكبة الاالوان الزاهية || تدفن في الاذغال القليلة  
الارتفاع . اناتها تضع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة  
الذكور نحو ١٣ يوما .

Mannose **مَنُورُ** ٢٧٩٣٤  
سكر غلوكوزي ، بلوري التركيب ، سريع الذوبان في  
الماء ، ينتج خميرة البيرة ، ويوجد في بعض النباتات انحصا  
ثمار الحبوب وقشور البرتقال .

Monaul (F). **مَنُول** ٢٧٩٣٥  
هو الحنظل الهبي ، اطلبه .

Narcotique (F). **مَنُوم** ، **مُحَدَّر** ٢٧٩٣٦  
Narcotic (E).  
نمت تعريفي يطلق على المواد شبه خلوية الحنطرة الموجودة  
في بعض النباتات . وقد يطلق تسميا على كل نبات  
يسوي هذه المادة او المواد .

Sperme (F). Sperm (E). **مَنِي** ٢٧٩٣٧  
مادة مركبة مائنة لزجة تتوحد حيالة الحورن المنوي تقترنما  
خصيتا الذكر وتغزنها الحويصلات النوية عند وجودها  
ويضعها التخصيب عند الاندفاع .

Aphididae (S). **مَنِيَّات** ٢٧٩٣٨  
Aphididae (F). Aphididae (E).  
هي فصيلة الاقيات ، اطلها .

Sarcelle marbrée (F). **مَنِيَّية** ٢٧٩٣٩  
هي الخلف الجليل ، اطلبه .

Spermatisme (F). **مَنِيَّية** ٢٧٩٤٠  
Spermatism (E).  
المنية ملهه الذين يعتبرون ان مني الذكر يحوي جميع  
اجزاء الملقحة ، وان ما تقدمه الاثنى منوط بالنشوء والنوطة  
فقط .

Mania maura (S). **مَنِيَّية مَوْرَا** ٢٧٩٤١  
Mania maura, la Maura (F). Mania maura (E).  
حشرة من فصيلة الدقريات ورتبة حشرنيات الاجنحة .  
موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبا وافريقية الشمالية .  
قراشها جارية قوتها رقيق الاذيال . سرتها تميل على  
اوراق النباتات المرعوية والحولية والمهولة || جسمها  
كبير القف يطوي نحو ٢٣ سم . يسقط نحو ٦٢ سم . رأسها  
صغير الجسم حشلي اللون . عينها كبريتان . ذباانها  
عظيمان . جريشها ويطها الى الحنطلي الكسني المولج ||  
واشئها عند الشقن الى الحنطلي الاسمر المولج تملوه في  
الزواج الامامي زردكة كسنية وتشيخ وتبيض يرادح  
من الجؤوة الى السمرة الكسنية . وتلوه في الزوج الخلفي  
مشحان مشرعتان لونها الى السمرة الكسنية . حنارها

منمقة ، مستطيلة الزناد ، خلية العمل الانثاسي التخصيص  
خلية البهرة على صفحتها || ازعاها فردية ، عورية  
الارتكاز ، مستطيلة الحمايلق ، صغيرة الحجم ، ليلكية  
اللون || ثمارها عينية ، بجعالية المادة ، تلو خضراء  
وتنتهي ، عند النضج ، بالبنسجي العايق .

Hache fourrage (F). **مَنَكَّة** ٢٧٩٤٠  
Fodder-cutter (E).  
آلة تستعمل في فرم ورق التوت والكلكا وما اشبه .

Décalcifié (F). **مَنَكْسِيس** ٢٧٩٤١  
Dacalcified (E).  
فقد كله .

Serfouette (F). Small hoe (E). **مَنَكْسِفَة** ٢٧٩٤٢  
أداة تستعمل في حرق تربة حدائق الزهور والمباثل .

Masticable (F). **مَنَمَّصِع** ٢٧٩٤٣  
Fourmillière (F). **مَنَمَّكة** ٢٧٩٤٤  
Ant-hill, Ant's nest (E).  
هي قرية النمل .

Butyromètre (F). **مَنَمَّكة** ٢٧٩٤٥  
Butyrometer (E).  
هو ميزان الحليب ، جهاز يستعمل لمرقة مقدار السن  
في الحليب .

Méthode (F). **مَنَمَّج** ، **مَنَمَّج** ٢٧٩٤٦  
Method (E). **مَنَمَّج** ، **مَنَمَّج** ٢٧٩٤٦  
هو الاسلوب المتبع ، راجع طريقة .

Allergique (F). Allergic (E). **مَنَمَّج** ٢٧٩٤٧  
للهدف من كان جهازه العضوي عرضة لالتهاف .

Ebauche (F). Rough Shape (E). **مَنَمَّج** ٢٧٩٤٨  
الرسم الامجازي لشيء وبداية تكوين الشيء . ج مناهر .

Shénique (F). Schenic (E). **مَنَمَّج** ٢٧٩٤٩  
نمت تعريفي يطلق على كل مادة من عقاقير وغيرها تنشط  
فاعلية الاعضاء .

Menhir (F). Menhir (E). **مَنَمَّج** ٢٧٩٥٠  
المنهر حجر فخم مستطيل منتصب يمد الى عصور  
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى الفلوس المعبد  
كاشير الاستقام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المناهر  
كبيرة العدد ، متفاخرة الحجم والطول ، اطولها يبلغ  
نحو ٢١ مترا ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). **مَنَمَّج** ٢٧٩٥١  
المنهر حجر فخم مستطيل منتصب يمد الى عصور  
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى الفلوس المعبد  
كاشير الاستقام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المناهر  
كبيرة العدد ، متفاخرة الحجم والطول ، اطولها يبلغ  
نحو ٢١ مترا ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). **مَنَمَّج** ٢٧٩٥٢  
المنهر حجر فخم مستطيل منتصب يمد الى عصور  
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى الفلوس المعبد  
كاشير الاستقام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المناهر  
كبيرة العدد ، متفاخرة الحجم والطول ، اطولها يبلغ  
نحو ٢١ مترا ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). **مَنَمَّج** ٢٧٩٥٣  
المنهر حجر فخم مستطيل منتصب يمد الى عصور  
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى الفلوس المعبد  
كاشير الاستقام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المناهر  
كبيرة العدد ، متفاخرة الحجم والطول ، اطولها يبلغ  
نحو ٢١ مترا ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). **مَنَمَّج** ٢٧٩٥٤  
المنهر حجر فخم مستطيل منتصب يمد الى عصور  
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى الفلوس المعبد  
كاشير الاستقام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المناهر  
كبيرة العدد ، متفاخرة الحجم والطول ، اطولها يبلغ  
نحو ٢١ مترا ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). **مَنَمَّج** ٢٧٩٥٥  
المنهر حجر فخم مستطيل منتصب يمد الى عصور  
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى الفلوس المعبد  
كاشير الاستقام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المناهر  
كبيرة العدد ، متفاخرة الحجم والطول ، اطولها يبلغ  
نحو ٢١ مترا ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). **مَنَمَّج** ٢٧٩٥٦  
المنهر حجر فخم مستطيل منتصب يمد الى عصور  
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى الفلوس المعبد  
كاشير الاستقام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المناهر  
كبيرة العدد ، متفاخرة الحجم والطول ، اطولها يبلغ  
نحو ٢١ مترا ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). **مَنَمَّج** ٢٧٩٥٧  
المنهر حجر فخم مستطيل منتصب يمد الى عصور  
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى الفلوس المعبد  
كاشير الاستقام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المناهر  
كبيرة العدد ، متفاخرة الحجم والطول ، اطولها يبلغ  
نحو ٢١ مترا ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .



منية مورا

بعد التقع والغلي في الماء ، لاثنا غنية بالعناصر المرة السامة ، ليوب نشوي غذائي شائع الاستعمال يدهى تيبورا أو قساوا . ولبوبها هذا يحوى ما قدره نحو :

٣,٦٨ ٪ من المواد الازوتية

١,٩٨ ٪ من المواد الدهنية

٩١,٤٤ ٪ من المواد النشوية

وهو كالنبوت الحلوى يرغب في الارربة الخفيفة البدائية الغنية المروية ، يتكاثر بالقلع .

٢٧٩٤٩ - مَنِيَّتَة  
في المدينة ، أغلبها .  
Tannerie (F).

٢٧٩٥٠ - مَهَاة \* ، مَهَا

Addax nasomaculata (S). Addax, Antelope de Nubie, A. de Mendès (F). Addax (E).

الجسم موهات . والمهاة بقرة وحشية قوية جامسة رفيعة الحاروك وسيدة الجنس والنوع . ثوبها الى البياض الاغبر . رأسها حايق اللون مستطيل الشكل يحمل قرنين كبيرين لولبيين ، براوح طولي من ٥٠ الى ٧٠ سم . صيدها كبرتات مكملتان . عنقها اخضر من فوق الطلياء . طول جسدها نحو ٢١٠ سم . وارتفاعها ٩٠ سم . أنثاها رباعية الاعلاط || تبيض ادرات متوسطة العدد ، موطنها الصحاري والغياثي توجد في الجزيرة وصورة والنوبة وليبيا وتونس والجزائر ومراكش .

٢٧٩٥١ - مَهَاة سِيكَا  
نوع من الطيأ يدعى سِيكَا ، أغلبها .  
Antelope saiga (F).

٢٧٩٥٢ - مَهَبَاب \* ، مِعْطَاط \*  
Atomiseur (F).  
Atomizer, Spray (E).  
آلة خاصة بالمساحيق والسوائل تذرلها كالبخار .

٢٧٩٥٣ - مَهْطِط  
Cathode (F).  
٢٧٩٥٤ - مَهْطِط الطير  
Remise (F).  
Lighting-place (E).  
المكان الذي يأوى اليه الطير عند الجحوم أو الاستراحة .

٢٧٩٥٥ - مَهْطِل  
Vagin (F). Vagina (E).  
من أعضاء التناسل في الحيوان وهو القناة التي تصل الشفر بفتح الرسم .

٢٧٩٥٦ - مَهْطِلِي  
Vaginal

٢٧٩٥٧ - مَهْطَان \*  
Potomètre (F) Potometer (E).  
المهتان جهاز يستعمل في قياس ما يتنصه النبات من ماء .

٢٧٩٥٨ - مَهْطَرَات  
Turbellariés (F).  
Turbellaria (E).  
صف من الديدان العريضة .

٢٧٩٥٩ - مَهْطَجَة \*  
Tératologie (F).  
Teratology (E).  
علم غرائب الخلق والتماحيب .

٢٧٩٦٠ - مَهْطَجِي \*  
Tératologique (F).  
Teratologic (E).

٢٧٩٦١ - مَهْد  
Habitat (F).  
هي البلاد التي يعيش فيها الحيوان الممين منذ الاعتدال اليه .

الخارجي بمذيق الاطراف || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الفراشة في سوزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو خمسة أسابيع وتحت المكن لطحاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرعة عند يولفها الكلال تطول نحو ٤٥ م . جسمها شبه اسطواني الشكل مستطيل المقدم والمؤخر . ثوبها الى الخضار اللانس تعلو خطوط جانبية متفرعة بضاء اللون وسط ثبجي اسود غائب . مدنها ورواجها الى السرة || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في الآربة حيث تنفخ السرة ملتصقة بجلباب من العن .

٢٧٩٤٢ - مَنِيَّت  
Mannite (F).  
مادة سكرية قابلة للتبلور تستخرج من بعض النباتات والقطرور .

٢٧٩٤٣ - مَنِيَّرَا  
Magnésio (F).  
في المنيزا اي اكسيد المنيزيوم .

٢٧٩٤٤ - مَنِيَّع  
Résistant (F). Unyielding (E).

٢٧٩٤٥ - مَنِين  
Spermine (F). Spermin (E).  
شبه قلوي غير سام يكثر في الخي ويوجد في البصلان .

٢٧٩٤٦ - مَنِيَّهْرُوت  
Manihot (S).

Manihot, Manioc, Magnoc (F). Mandioc plant, Cassava plant (E). Bitter Manioka, Kassava-wurzel (D). Manioc, Mandiocca, Jatropha officinale (J).  
جنس نباتات معمرة من فصيلة القرينيات . أنواعه نحو ٤٠ جميعا جنبية منها البيرة والزراعية الغذائية : أصلها البلاد الاستوائية . سوقها تملو من ٢٠٠ الى ٥٠٠ سم . أوراقها متعاقبة ، معتمة ، اذينية ، كفية النصل ، خاسية او سباعية المصروس . انوارها فستقية اللون ، صغيرة القند ، عقدية التجميع ، محورية وطرفية الارتكاز . ثمارها جراح ثلاثية الاغنية تنفلو من ٦ صمايرم || تُرَدع من اجل جلورها السمكية الغليظة المستطيلة التي يستخرج منها ليوب نشوي غذائي يدعى تيبورا || اشهر انواعه الزراعية صايلي .

٢٧٩٤٧ - مَنِيَّهْرُوت حُلُو \*  
Manihot dulcis, M. aipi, M. palmata (S). Manioc doux, Camagoc, Cassave (F).

نوع من المنهوت الزراعي . ضروبه كثيرة البند . جلوره قليلة المواد المرة السامة . سوقه متصبة عادمة التضليل ، اوراقه مستطيلة الاذينات والاصناف الخضرة ، مستعرضة المصروس . جراحها عادية المنحاج . جلوره نشوية غذائية تحوي ما قدره نحو :

٣,٢٥ ٪ من المواد الازوتية

١,٥٦ ٪ من المواد الدهنية

٨٨,١٢ ٪ من المواد النشوية

يرغب في الارربة الخفيفة المروية ويتكاثر بالتعقل .

٢٧٩٤٨ - مَنِيَّهْرُوت مَر \*  
Manihot utilisima (S).

Manioc amer, Cassave amère (F).  
نوع من المنهوت الزراعي ، ضروبه كثيرة البند . جنباته كبيرة القند تملو من ٣ الى ٥ امتار . سوقها مصلصة . اوراقها مفصصة قصيرة الاصناف الجلوية اللون ، اذيناتها جلدة . قصور نصلها مستطيلة ضيقة . جراحها بمنجة || حصادها غليظة كبيرة تستعمل في صناعة الكحول ويستخرج منها



منهوت حلوى



منهوت مر



مهاة

أزهارها قنولية مغلوقة الكأس تبدو كالثآليل المنديبة الاطراف .

### ٢٧٩٧٦ - مَهْمَزِيَّة \*

Dicentra, Dielytra, Bicuella (S). Diélytra, Diélytra, Dicentra, Bicuclée (F). Seal flower, Bleeding heart, Locket flower (E). Flammendes, Fliegendes Harz, Tränendoppelsporn (D). Dielytra (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الخشخشيات . أزهارها المعروفة ١٢ معظما بري وبعضها طبي يشغل في علاجات السعال وبعضها تزييني . أوراقها متعاقبة ، مستطقة ، مفرصة . أزهارها جميلة الشكل مَهْمَزِيَّة ٥ أشهر أنواعها وأعرفها سالي .



مهرس المنب

Dicentra eximia (S). مَهْمَزِيَّة أنيقة

٢٧٩٧٧ - مَهْمَزِيَّة أنيقة  
Diélytra d'élite, D. distingué (F).  
بجلة تزيينية مثنونة معمرة تملو من ٢٥ إلى ٣٥ سم .  
أوراقها بحرية اللون . عناقيدها الزهرية هريئة الشكل  
منقصة . أزهارها حراء اللون قصيرة المهايز ٥ أزهارها  
يستمر من اواسط الربيع الى اواخر الصيف .

### ٢٧٩٧٨ - مَهْمَزِيَّة جميلة

Dicentra formosa (S). Diélytra gracieux, D. à belles fleurs (F).

بجلة معمرة طبية مثنونة تملو من ٢٥ إلى ٣٥ سم .  
أوراقها جميلة الخضار الزاهي . نصلها قدي التشرم .  
عناقيدها الزهرية مخروطية الشكل . أزهارها وريدية اللون ،  
قصيرة المهايز ٥ جلورها غنية بمادة الكوروندين  
الشائعة الاستعمال الطبي ٥ أزهارها يستمر من ايار الى  
اواسط الخريف .



مهلل

### ٢٧٩٧٩ - مَهْمَزِيَّة ذهبية

Dicentra chrysantha (S). Diélytra jaune d'or (F).

بجلة تزيينية معمرة تملو من ٦٥ إلى ١٠٠ سم . ساقها  
فراء موزقة . أوراقها كثيفة التجميع شبيهة التشرم .  
عناقيدها الزهرية منقصة . أزهارها صغيرة اللد والمهايز ،  
ذهبية اللون ٥ أزهارها يستمر طوال فصل الخريف .

### ٢٧٩٨٠ - مَهْمَزِيَّة رائعة

Dicentra spectabilis (S). Diélytra remarquable, Cœur du Maria, Cœur de Jeannette (F).

بجلة تزيينية معمرة تملو من ٦٥ إلى ٩٠ سم . ساقها  
فراء موزقة . عناقيدها الزهرية كبيرة اللد متدلية . أزهارها  
قلبية الشكل ، مستطيلة المهايز ، قرمزية اللون ٥ أزهارها  
يستمر من ايار الى تموز .

### ٢٧٩٨١ - مَهْمَزِيَّة عارشة

Dicentra torulosa (S). Diélytra grimant (F).

جنية تزيينية عارشة تملو من ٤٥ إلى ٨٠ سم . ساقها  
وفروها نحيلة . حوائقها بسيطة . أوراقها قدية التشرم .  
عناقيدها الزهرية كبيرة اللد متدلية . أزهارها قرنية الشكل ،  
صفراء اللون ، صطرة ٥ أزهارها يستمر طوال فصل الخريف .



مهزاية

٢٧٩٨٢ - مَهْمَزِيَّة  
Aristoloché (F).  
هو الزوائد ، من النباتات الطبية ، اطبخه .

### ٢٧٩٨٣ - مَهْمِي \*

Subdésertique (F).

Subdesertic (E).

هو البلقيي ، نمت تمرقي وصفي للاقليم شبه صحراوي .

### ٢٧٩٦٢ - مَهْد

Aplanir (F).

To level, To smooth (E).

اصلع وبسط للشر من الارض او ما انخفض منها في  
سهولة واستواء . ويقال مهد الارض وقدن التربة .

٢٧٩٦٣ - مَهْدَاج (F).  
Vent précurseur de pluie (F).  
الريح الخفيف تستبق المطر .

٢٧٩٦٤ - مَهْدَب (F). Ctenoid (E).

نعت تعريفي يطلق على الحراشف الابرية او المسنة الحار  
الطين . راجع مبراش .

٢٧٩٦٥ - مَهْر، فُلُو، فِلُو (F).

Poulain (F).

Foal, Yearling (E).

ولد الفرس قبل بروز ثنيته الثابتين . ج مهاز ومهاز  
ومهاز وفلاء واغلاء .

٢٧٩٦٦ - مَهْرَاجَة (F).

Iris orateur (F).  
حشرة من السرعويات تدعى قسطية ، اطبخا .

٢٧٩٦٧ - مَهْرَة، فُلُوَة، فِلُوَة (F).

Poulch (F).

Filly (E).

هي انثى الفلر والهر .

٢٧٩٦٨ - مَهْرَس العنَب \*

Fouloir (F).

Beater (E).

مهرس العنب او الماصرة ، آلة يسحق فيها العنب لاستخراج  
عصارته .

٢٧٩٦٩ - مَهْرَمَة (F).

Hachoir (F).

هي الخفخة ، اطبخا .

٢٧٩٧٠ - مَهْرِي (F).

Méhari (F). Hæiri (E).

سلالة من الابل الركائب العربية منسوبة الى امرى بن  
حيان . يقال ابل مهريه .

٢٧٩٧١ - مَهْشَرَة (F).

Trayeuse mécanique (F).

Milking machine (E).

هي الحامرة ، جهاز آلي يستخرج الحليب من الفرح .

٢٧٩٧٢ - مَهْشَاس (F).

Arracheuse (F).

Drawer, Spud (E).

٢٧٩٧٣ - مَهْشَل (S). Todirampus (S).  
جنس طير من المازوريات . انعام قليلة اللحم . موطنه  
البلاد الاسيوية ، يألف بجاري الماء والسطوط والقابات .  
اجسام هذه الطيور متوسطة اللد تقلد نحو ٢٧ سم . انواها  
مراكبة الاولان لها الابيض والاصفر والازرق والجلوي  
والاصفر والاسود ٥ قوتها الاسماك الصغيرة والحشرات .  
انها تبقي من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور  
نحو اسبوعين . (راجع مازوريات) .

٢٧٩٧٤ - مَهْشَل (F).

Dauphinelle des jardins (F).

نبات تزييني يعرف بمئات الحدائق ، اطبخه .

٢٧٩٧٥ - مَهْمَزِيَّات (S).

Dicranaceae (S).

Dicranacées (F). Dicranaceae (E).

سبط من فصيلة الطحليات ، اجسامه وانواعه نحو ١٠٠  
منها الغابات الظليلة . جلورها نحيلة قليلة العدد والانتداد .  
سوقها مستطقة . أوراقها غشبية كثيفة تكسو كامل الساق .

٢٧٩٩٩ - **مُؤَاد زَيْتِيَّة** (F). Matières huileuses (F).  
توجد في المادّن كالنُظ مُثَل . Oily material (E).

٢٨٠٠٠ - **مُؤَاد شَحِيحِيَّة** (F). Matières grasses (F).  
توجد في الحيوان . Greasy material (E).

٢٨٠٠١ - **مُؤَاد عَازِلِيَّة** (F). Matières enrobantes (F).  
Wrapping material (E).

٢٨٠٠٢ - **مُؤَاد عَضَوِيَّة** (F). Matières organiques (F).  
Organic material (E).  
هي المَاد البَسِطَة المُتَرَجِّمَة الّتي تُتَرَكَّب مِنهَا نَسِج الحيوان والنبات .

٢٨٠٠٣ - **مُؤَاد غِذَايِيَّة** (F). Matières alimentaires (F).  
Alimentary material (E).  
هي جَمِيع المَاد الصَالِحَة لِغِذَاء الحيوان . وقد وَضَعْنَا فِي ذَلِك جُلُودًا أَغْذَاءً مِن «كَلْبَر» ذَكَرَ فِيهِ تَرَكِيب الِاعْلَاف البَاطِنِي وَغَاوِيهَا مِن المَاد الْأَحْمَاء وَالْمُنْهَضَة مَعَ قِطْعِهَا الْغَالِيَةِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى النِّشَاء . اطْبَل عِلْف .

٢٨٠٠٤ - **مُؤَاد مَصَاعِي** (F). Substances hygroscopiques (F).  
Hygroscopic substances (E).  
هي المَاد الّتي تَمْتَص الرَطوبَة كَالنِّتْرَات الّذي يَمْتَص رَطوبَة الْمَاء وَالْهَالِج الّذي يَمْتَص رَطوبَة التَّرَبَة .

٢٨٠٠٥ - **مُؤَاد مُدْخَرَة ، مُؤَاد إِحْصِيَاطِيَّة** (F). Matières de réserve (F).  
Reservation material (E).  
مَاد غَذَايِيَّة يَحْتَرَبُهَا النِّبَات كَالْأَدْعَاء فِي النِّبَاتَات الزَّيْتِيَّة ، وَالسَّكَّر فِي الشُّوْبَر وَاللِّصَان ، وَالنِّشَاء فِي الْبَطَاخ .

٢٨٠٠٦ - **مُؤَاد مَعْدَنِيَّة** (F). Matières minérales (F).  
Mineral material (E).  
هي الْأَجْسَام غَيْر الْمُتَضَفِّة كَالْأَزُوت وَالْأَكْسِجِن وَالسُّفُور وَالْكَلس وَالْحَدِيد وَالْبَرَاز وَالصُّودِيوم الْخ .

٢٨٠٠٧ - **مُؤَاد مَعْدِيَّة** (F). Matières nutritives (F).  
Nutritive material (E).  
هي جَمِيع المَاد الصَالِحَة لِغَذَايَةِ النِّبَات .

٢٨٠٠٨ - **مُؤَاد لَشْوِيَّة** (F). Matières amylacées (F).  
Amylaceous material (E).  
أَصُول مَرَكَبَة ، أَسَاسُهَا النِّشَاء ، تَوَجَّد فِي أَغْضَاء النِّبَاتَات .

٢٨٠٠٩ - **مُؤَاد هَيْدُرُوكَرْبُونِيَّة ، هَيْدُرَات الكَرْبُون** (F). Matières hydrocarbonées ,  
الكَرْبُون Substances hydrocarbonées ,  
Hydrates de carbone (F).  
مَرَكَبَات عَضْوِيَّة مِن الْكَرْبُون وَالْأَكْسِجِن وَالْهَيْدُرُوجِن مِنهَا الْمِلَاصَات الْأَلَزُّوتِيَّة كَالنَّشَاء وَالسَّكَّر وَالصُّغ ... وَفِيهَا المَاد الدَّهْنِيَّة وَفِيهَا الْهَلْبُوس أَي السَّلْبُولُوس .

٢٨٠١٠ - **مُؤَار** (F). Tropomètre (F).  
Tropometer (E).  
المَوَار مِيقَت شَدِيد الْإِتْقَان وَالِدَقَّة يَسْتَعْمَل فِي تَحْدِيد دَائِرَة الْعُرْو فِي الْبَحْر .

٢٨٠١١ - **مُؤَاوِ ، مُتَوَاوِ** (F). Parallèle (F).  
Parallel (E).

٢٧٩٩٤ - **مَهْر ، تَارْمَهِنْدِي ، تَارْمَسَك** (F). Mesur (S).  
Mésur, Bois de fer (F). Iron wood, Indian rose chestnut (E). Eisenbaum, Kastanien Rose (D).  
Albero della ferro (I).

الوَاحِدَة مَهْوَة . جِنْس أَشْجَار حَرَبِيَّة وَزَوَاعِيَّة مِن فَصِيلَة الْكَلُوزِيَّات ، مَهْدَاهَا الْمَهْد . أَوْرَاقُهَا كَامِلَة مُتَقَابِلَة مَعْقَة مُسْتَطَلَّة الْبَصَل . أَزْهَارُهَا نَوْرِيَّة تَتَجَمَّع أَوْ فَرْدِيَّة . إِبْطِلَة الْإِزْتِكَاذ أَوْ تَاجِيَّة وَفِي ذِكَايَةِ الْعُرُفِ الْمُسْتَحَب . ثَمَارُهَا جَرَاء تَلْفَلُف زُرَّة كَبِيرَة لَقَدْ شَبِهَ الْكَسْتَنَاء طَبِيعَة الرَّاحَة ، مَأْكُولَة الْبَاب . لَمُتْعَاهَا شَدِيدَة الصَّلَابَة مَرْغُوب فِيهَا .

٢٧٩٩٥ - **مَهْوِي** (F). Périgée (F).  
Perigee (E).  
أَقْرَب عِلَل لِسِيرَةِ مَن الْأَرْض .

٢٧٩٩٦ - **مَهْيَات** (F). Multiforme (F).  
Multiform (E).  
كَثِير الْمَهْيَات وَالْأَشْكَال .

٢٧٩٩٧ - **مَهْبَة ، كَنْدُرِيوم** (F). Chondriome (F).

٢٧٩٩٨ - **مَهْبِدَة ، مَهْبِدَة** (F). Pionnière (F).  
Pioneer (E).

هو النِّبَات الطَّرِيق الّذي يَكْتَسِح التَّرَبَة الْحَدِيثَة لِإِصْطِلَاح وَهُوَ أَيْضًا كُل نَبَات يَزُر أَوْ غَرَس لِهَيْئَةِ الظُّرُوف الْمُنَاسِبَة لِنَبَات لِأَتَق .

٢٧٩٩٩ - **مَهْيَص** هو مَسْلَح الطَّيْر . ج مَهَايِص .

٢٧٩٩٠ - **مَهْيَك** هو النِّسْل الّذي إِذَا غُرِب لَمْ يَلْتَقِ .

٢٧٩٩١ - **مَهْيِم** (F). Asoiffé (F).  
Thirsting (E).  
نَمَت تَعْرِيبُ يَوْصَف بِهِ مَن كَانَ شَدِيد الْمَطْش .

٢٧٩٩٢ - **مُو** (F). Aneth sauvage (F).  
هو النِّبَات الْبَرِّي ، أَطْلَب .

٢٧٩٩٣ - **مُؤَاو** (F). Miaulement (F).  
Mewing (E).  
صَوْت الْهَر .

٢٧٩٩٤ - **مُؤَاد أَجِيَّة ، مُؤَاد أَلْبُومِينِيَّة** (F). Albuminoïdes ,  
Substances protéiques (F). Albuminoid ,  
Proteinic substances (E).  
مَاد تَرَكِيبُهَا يَتَوَاصَفُ بِكَتْرَ كَرِيب وَغِثَاوَسَ بِيَاضِ الْبَيْضَة .

٢٧٩٩٥ - **مُؤَاد إِسْتِخْرَاجِيَّة ، مُؤَاد إِسْتِخْلَاصِيَّة** (F).  
Matières extractives (F).  
Extractive material (E).

هي مَا يَمْكَنُ أَنْ يَبْقَى مَن مَاد بَعْدَ تَبْيَغِير سَوَالِهَا .

٢٧٩٩٦ - **مُؤَاد ثَلَاثِيَّة** (F). Substances ternaires (F).  
Ternary substances (E).

مَاد غَذَايِيَّة مَرَكَبَة مِن ثَلَاثَة عَنَاصِر وَفِي الْأَكْسِجِن وَالْهَيْدُرُوجِن وَالْكَرْبُون .

٢٧٩٩٧ - **مُؤَاد دَهْنِيَّة** (F). Matières sébacées (F).  
Sebaceous material (E).

٢٧٩٩٨ - **مُؤَاد رُبَاعِيَّة** (F). Matières quaternaires (F).  
Quaternary material (E).  
مَاد عَضْوِيَّة مَرَكَبَة مِن أَرْبَعَة عَنَاصِر وَفِي الْكَرْبُون وَالْهَيْدُرُوجِن وَالْأَكْسِجِن وَالْأَزُوت كَالنَّشَاء .

٢٨٠٢٠ - **مُوَافَقَة** \* Musophaga (S).

٢٨٠٢١ - **مُوَافَقَة** \* Musophaga (F). Musophaga (E).

٢٨٠٢٢ - **مَوَاقٍ** \* Grallaria (S).

Grallaria (F). Grallaria (E).

جنس طير من الجوارث سيات المنايير وفصيلة الجليثيات .  
انواع المرونة نحو ٣٠ جميعها من طيور أمريكا  
الجنوبية . تألف الرياض والغابات الرطبة . ملجئها الحياتي  
جماعي . جماعاتها قليلة العدد . قوتها الحشرات وأخصها  
التل السيار الذي تكثر قوافله الجمرات في معظم تلك  
الاصقاع || اجسامها صغيرة تقطع من ١٢ الى ١٨ سم .  
الوانها مختلفة الالوان تكثر فيها الشقمة والشفية . تحورها  
وصورها ويطورها صفراء اللون او براء تملؤها رقة  
سمراد او بياض وتنبج حنلي . رؤوسها ومناقيرها واجنحتها  
معتدلة الاجسام . اذنانها قصيرة مخروطية الشكل . قوائمها  
رفيعة تمكثها من العدو بسرعة || تدثن اعشاشها في الادغال  
عل ارتفاع قليل لا يتجاوز ثلاثة امتار . الاناث تحضن  
بمناوبة الذكور من ٤ الى ٦ بيضات على مرتين في الحبل .



مَوَاقٍ

٢٨٠٢٣ - **مُؤَاكِر** Métayer (F). Farmer (E).

٢٨٠٢٤ - **مُؤَاكِرَة** Métayage, Colonge (F).

هي للزراعة ، واجها .



مِوَاكِرَة

٢٨٠٢٥ - **مُؤَاكِسَة** Connivence (F).

Connivence (E).

شيء من التواطؤ او الاشتراك في عمل ما .

٢٨٠٢٦ - **مُؤَايِدِي** Naturaliste (F).

Naturalist (E).

المعلم المواليد .

٢٨٠٢٧ - **مُؤَاكِن ، وَمَا حَمَوَاتِي** Epizootie (F).

Murrain, Epizooty (E).

هو كل مرض يمد سريع الانتشار الشامل .



مَوَاقٍ

٢٨٠٢٨ - **مُؤَاكِرَة** Raidisseur (F). Wire-strainer (E).

اداة تستعمل لتفتير الاسلاك .

٢٨٠٢٩ - **مُؤَاكِر** Congrès (F). Congress (E).

٢٨٠٣٠ - **مُؤَاكِل** \* Mutilla (S).

Mutilla (F). Mutilla (E).

جنس حشرات من غشائيات الاجنحة المنحصرة وفصيلة  
الموتليات . انواعها المرونة كثيرة العدد ، نحو ١٦٠٠  
منتشرة في معظم انحاء العالم . تألف البرير والمناطق  
الجرداء . تتطفل في طورها البري على جميع انواع غشائيات  
الاجنحة الخشاعة || اجسامها صغيرة او متوسطة القد .  
الوانها مائلة . الوانها زاهية ، سقفاء الحواج || ذكورها  
مجسمة . اناثها عادية الجناح ، مستطيلة الحيات القدرية .



مُؤَاكِل

٢٨٠٣١ - **مُؤَاكِلَات** \* Mutillidae (S).

Mutillidae (F). Mutillidae (E).

فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة المنحصرة ومنه  
الحويوات . اجناسها وانواعها المرونة كثيرة العدد  
منتشرة في معظم انحاء العالم || جمع اجناسها مقليقة في

٢٨٠١٢ - **مُؤَاكِل** \* Musophaga (S).

Musophaga (F). Musophaga (E).

جنس طير من فصيلة الموزايات . اعطاه البلاد الافريقية  
اخصها افريقية النشائية || انواعه المرونة قليلة العدد  
تميز باستطالة الجسم وبكبر الذنب الاطليحي الشكل .  
مناقيرها مخروطية ، قوية ، مسننة الطفاة ، صفراء  
اللون . جباهها ملحوفة بصحيفة قرنية المادة ، صفراء ،  
تبدو كأنها امتداد المنقار نحو الرأس || طيرانها خفيف  
الحركة سريع . تدثن في تجاويف الاشجار القديمة العهد .  
اعرف انواعه ونشورها الموزا البنفسجي .

٢٨٠١٣ - **مُؤَاكِل مُنْقَسَجِي** \* Musophaga violacea (S).

Musophaga violet (F).

نوع من الموزا . اعطاه تمت من تونس والغرب الى اطراف  
ثنية الجنوبية . تألف الحراج ويقرب من المزارع والبساتين  
اخصها بساتين الموز || جسمه يطول نحو ٥٥ سم . قوته  
الى السواد البنفسجي تملو ماجة ارجوانية || قوته التار  
عل اختلاف انواعها واخصها الموز الذي يفضل على كل  
شيء || الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٥ الى ٦ بيضات  
الزخم ينشمر نحو ١٥ يوما .

٢٨٠١٤ - **مُؤَاكِلَة** Parallélisme (F). Parallelism (E).

هي توازي الخطوط او السطوح .

٢٨٠١٥ - **مُؤَاكِلَة** Balance (F).

٢٨٠١٦ - **مُؤَاكِلَة حِساب** Balance d'un compte (F). Balance of an account (E).

Balance d'un compte (F). Balance of an account (E).

٢٨٠١٧ - **مُؤَاكِلَات** \* Musophagidae (S).

Musophagidés (F). Musophagidae (E).

فصيلة طير من الجوارث سيات المنايير . اجناسها وانواعها  
المرونة قليلة العدد ، جميعها افريقية المهد || تتميز  
باستطالة الجسم ، بقصر العنق ، باضداد الاجنحة  
وبااستطالة الذنب . مناقيرها مخروطية الشكل ، مستعرضة  
الاشداد . اناثها حيلة الالوان المتراكبة الجماع || ملجئها  
الحياتي جماعي . سرها لا يقل عن ٥٠ ذوبا . تألف  
جماري لئاء والمواقع الرطبة . قوتها جميع المواد النباتية من  
البراعم والتواقي الى التار والحبوب || اعرف اجناسها  
الموزا والطورق .

٢٨٠١٨ - **مُؤَاكِلَة** \* Gymnaspilus (S).

Gymnaspilus (F). Gymnaspilus (E).

بعض صيادي سمك طرابلس يسمى بلشفيك وأبو شوكة .  
جنس اسماك بحرية يبروز من شقائق الزعانف وفصيلة  
الجواحيات || انواعها المرونة قليلة العدد منتشرة في معظم  
بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جميعها صغيرة الحجم ،  
شائكة الزعانف الظهرية السامة المؤذية || اناثها تختلف  
مع الالوان منها الاسمر والاطحل والوردي والاحمر المتالي  
اللون بالاسود || لحومها كاتمة الصف قتل من يرشب  
فيها .

٢٨٠١٩ - **مُؤَاكِلَة** \* Consanguinité (F).

Consanguinity (E).

الموصول من الدواب الذي لا يتر على امه غير ابيه . والمواصلة  
هي اشتراك الامور القرابة اي الصلة الدموية بين الارباد  
والاباد او الارباد . الناية منها استمرار تحسين النسل .

موتية. أوراقها مفصصة، نصلها رهل النسيج، خلى البشرة، مسن الحافة. أزهارها حمر الون متدلية مستطيلة. أزهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

### ٢٨٠٤٧ - موريتية متوترة

*Maurandia semperflorens* (S). *Maurandie toujours fleurie* (F).

جنية تريبتية عارشة تطول نحو ثلاثة أمتار. غروها وأصمها عديدة. أوراقها قلبية مزوانية، نصلها ملس البشرة متصبع الصفحة. أزهارها كبيرة القذ قطرها راوح من ٣ الى ٥ سم. الوأها تختلف باختلاف غروها، أشمها الأبيض والرمق والبفسجي || أزهارها يستمر من أيار الى تشرين.

### ٢٨٠٤٨ - موريتية مكسكية

*Maurandia grandiflora* (S). *كيرة الزهر*

*Maurandie du Mexique* (F).

جنية تريبتية عارشة تطول من ٣ الى ٤ أمتار. جلورها وساقها ليفية. أوراقها شبه قلبية. نصلها ملس الصفحة. أزهارها كبيرة القذ قطرها نحو ٥ سم. لوها الى الأرجواني يعلو ملح بفسجي || أزهارها يستمر من أيار الى أيلول.

### ٢٨٠٤٩ - موريتية

*Mauritia* (S). *Mauricie, Mauritie, Palmier bâche* (F). *Mauritia, Moriche palm, Carana palm* (E). *Mauritia-Palme, Moritz-Palme* (D). *Palma mirici, Palma ita* (I).

جنس أشجار نخلية، أعطائها المناطق الاستوائية الأمركية. أنواعها ثمانية، جلورها منتصب مستقيمة تملو من سبعة الى ثمانية أمتار. يستخرج من بعض أنواعها لوب نشوية غذائية ومن البعض الآخر عصارة سكوية قابلة التخمير تستعمل في صناعة الخمور والكحول.

### ٢٨٠٥٠ - موريتية

*Moricandie* (F). نبات يدعى الخم، اطله.

### ٢٨٠٥١ - موريتية

*Morine* (F). اطلب مريته، نبات تريبت في الأدبيات.

### ٢٨٠٥٢ - موريتية، عقاب البحر

*Mylobatis* (S). *Mylobate, Mourine, Aigle de mer* (F).

جنس أسماك مذبة بحرية من فصيلة الشفنيات. أنواعها المعروفة ٧ جميعها كبيرة القذ مبطلة مستعرضة تشبه العقاب الباسطة جناحها. أذناها مستطيلة كالسياط تحمها عند قواصها مناس مست حادة. قوتها الأسماك. تألف المياه الاقليمية العميقة الغور || أشهر أنواعها وأغرها ما يلي.

### ٢٨٠٥٣ - موريتية جودرية، عقاب البحر

*Mylobatis bovina* (S). *الغيمراة*

*Mylobate vachetta, Mourine vachetta* (F).

نوع من الموريتية متوسطة القذ والتبطط، قوتها اغبر اللون أشهل الموج. أعطائها البحر المتوسط والاسود والاحمر. وهي اقل مسلوقة من الجفاعة.

طورها البري. ذكورها جمحة. أئانها عادة الجناح مجهزة بمس ذربة متباينة الاطوال || أشهر أجناسها الموقيل.

### ٢٨٠٣٢ - موتة

جسم غدي التركيب يلف عند الذكور فح الثالثة وجزه من الحالب.

### ٢٨٠٣٣ - موتة

*Tissu lâche* (F). *Loose tissue* (E).

### ٢٨٠٣٤ - مؤجر

*Bailleur* (F). *Lessor* (E).

### ٢٨٠٣٥ - مؤجل

*Différé* (F). *Deffered* (E).

### ٢٨٠٣٦ - مؤجن

نعت ترميى يطلق، في علم النبات، عل الطحالب المهنزة باجنات اي اجرية لحفظ البويضات.

### ٢٨٠٣٧ - مؤجور

*Cuniculé* (F). *Cuniciate* (E).

الموجو ما حوى حفرة مستطيلة بعيدة الغور.

### ٢٨٠٣٨ - مؤخر الجوف

*Post-abdomen* (F). *Postabdomen* (E).

مؤخر الجوف عند الحشرات هو الخس حلقات الأخيرة من بطن الحشرة اي جوفها || وهو زوولوجياً ذنب القشريات ومؤخر جسم التريلوبيت.

### ٢٨٠٣٩ - مؤدكة

طورية صغيرة قصيرة المتى نحو القبرة (السان).

### ٢٨٠٤٠ - مؤرة

*Mora* (F). سمكة بحرية تدعى جسة المتوسط، اطلها.

### ٢٨٠٤١ - مؤرت

*De cujus* هو الذي مات من مال يورث من يمه.

### ٢٨٠٤٢ - مؤردكة

*Rosaria* (F). *Rosary, Rose garden* (E).

حديقة الورد وزراعتها الاستارية.

### ٢٨٠٤٣ - مؤرق

*Frondifère* (F). *Frondiferous* (E).

المروق ماكان يحمل ورقاً.

### ٢٨٠٤٤ - مؤرلية

*Lapinière* (F). *Hutch* (E).

هي الهزة، اطلها.

### ٢٨٠٤٥ - موريتية

*Maurandia* (S). *Maurandie* (F).

جنس نباتات عارشة معمرة من فصيلة الخنازريات. أنواعها المعروفة ١٢. سوقها متسلقة. أوراقها قلبية النصل. أزهارها كبيرة القذ محورية الاركانز. قوتها انبوي الشكل، خاصي الفصوص الاستوائية || أشهر أنواعها ما يلي.

### ٢٨٠٤٦ - موريتية حمر

*Maurandia erubescens* (S). *Maurandie rougeâtre* (F).

جنية تريبتية عارشة تطول نحو ٤ أمتار. ساقها وقروها



موريتية



موريتية



كباسة مجنحة متدلية. ثمارها صغيرة نفاثة لا تؤكل ، يزودها كروية كاملة صالحة لتكثاثر ٥ وهو يزرع من أجل لباب ساقه الذي يستعمل استعمال الخبثاق . زراعته تقوم ٤ سنوات تنتهي بكبح الساق لاستمرار لبابها وقد يجري ذلك قبل تبشير الانزراع بنحو ٥ أسابيع .

*Musa religiosa* (S).

٢٨٠٥٩ - موز السعد



مورينه مبدولة

*Bananier fétiche* (F).

نوع من الموز البري الاثري، مهدد المياض الاستوائية . اودته مقة . ساقه تملو ١٥ أمتار . اوراقها كبيرة القعد متدلية الاطراف . نصلها جامد الصفحة المائلة ، بحري الخضار . كباسة كبيرة القد ، نارية اللقبات ، ارجوانية الطرب . ثماره دقيقة ، مستطيلة ، نافثة لا تؤكل .

*Musa sinensis* (S).

٢٨٠٦٠ - موز الصين

*Bananier de Chine* (F).

ويسمى موز الهند ، ثماره مأكولة . غروب الزراعية المشهورة خسة . اودته مقة . ساقه تملو من ٤ الى ٨ أمتار . اوراقها اعليجية الشكل ، متوسطة القد ، منفردة الانتساب . نصلها فارش الصفحة المنبسطة المادية الالتواء ، لونه الال خضار الباهت . كباسة متدلية عديدة الاشاط . ثماره فسخة قصيرة مأكولة متوسطة الصنف .



موز الجنة

٢٨٠٦١ - موز اليابان

*Musa japonica*, *M. Basjoo* (S). *Bananier japonais* (F).

نوع من الموز الزراعي المأكول البار . مهد اليابان وقد انتشرت زراعته في معظم المناطق الحارة نظرا لقلة متطلباته المناخية وضلابة ما يلزمه من سرعات حرارية يستلزمها نمو ويتفشي ادراك ثماره ٥ اودته مقة . ساقه خرا للون تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقه تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . وترى من ٦٠ الى ٨٠ ، نصلها جامد الصفحة الناعمة ، حاب الخضار . كباسة منقطة متدلية عديدة الاشاط . قناباته ارجوانية . طربه غروفي الشكل بنفسي اللون . ثماره مأكولة مستحبة الطعم متدلة الغلاظة والعلو .

*Bananier textile*,

٢٨٠٦٢ - موز لينين

*B. d'Amboine*

هو الأبيض ، اطلبه .

٢٨٠٦٣ - موز مبدولة \* موز الرشد

*Musa sapientum* (S). *Bananier commun*, *B. des sages* (F).

نوع من الموز الزراعي المأكول البار . غروبه المعروفة زهاء ٨٠٠ منتشرة في جميع الاسواق الحارة . اودته مقة . ساقه تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقه كبيرة القد . نصلها جامد الصفحة الزاوية الخضار . كباسة مستطيلة متدلية كثيرة الاشاط في براوح جدها من ٩ الى ٢٥ ، ثماره مستطيلة ، مضطمة ، سكرية الطعم ، مستحبة اللذاق والبرف .



موز مبدولة

*Banane*, *Figue-banane* (F).

٢٨٠٦٤ - موزة

(E).

ثمرة الموز المأكولة وهي تحوي الناصر التالية :  
نحو ٧٢,٤٠ ٪ من الماء  
١,٤٤ ٪ من المواد الاوتوية  
٠,٠٩ ٪ من المواد البغنية  
٢٣,٩٣ ٪ من المواد الهيدروكربونية

٢٨٠٥٤ - مورينه مبدولة \* عقاب البحر

*Myliobatis aquila* (S).

*Myliobate commune*, *Mourine commune*, *Mourine glorieuse* (F).

نوع من المورينه كبيرة الجفة نوبها الى البني الاسود الموراج . اعطائها جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة . وهي شرمة بطانة شديدة السطوة .

*Myliobatidae* (S).

٢٨٠٥٥ - موريات

*Myliobatis* (F). *Myliobatidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية من السفقيات ورثة الاشلاق . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . قربها الاسماك والمار . اجناسها مغلطمة ، مبطلة ، ملتحمه الزعانف الصدرية الكبيرة المستعرضة تشبه العقاب الباسطة جناحها . رؤوسها غروية شارفة . اشداها متوسطة الانفراج اسنانها مسطحة ، سباعية الصفوف . هيوتا جانينية الاركانز . اذناها مستطيلة كالسياط صلبة ، عند قواعدها مناسخ كبيرة مسنة حادة ٥ اشهر اجناسها واعرفها المورينه .

*Musa* (S). *Bananier* (F).

٢٨٠٥٦ - موز

*Banana-tree* (E). *Echte Banane* (D). *Banano* (I).

جلس نباتات عشبية ليفة من فصيلة الموزيات . انواعها عديدة ، اعطائها البلاد الحارة والاستوائية . جميعها مادمة السروق الخشبية . اروبها ممرمة مقة . جلورها ليفة افقية الانبساط . سورها مجرمة من الاتحاد الليفية للفتة المتراكبة القرمزية الانتساب . تنتهي بنصال فارقة اعليجية الشكل جامدة الصفحة المائلة الجليظة الخضار . انزوارها سنبل التجميع ، عامي الارتكاز ، كبير القد . ثمارها لبية ، مستطيلة ، كثيرة العدد ، تؤلف كباسة مركبة من عدة اشاط متعاقبة ٥ والموزة اي ساق الموزة تشر مرة واحدة وتموت ، أما الأروبة التي تحفظ التسل فهي مصرة وتكثاثر بالفسائل حل مر الاغولام ٥ والموز يجود في جميع الارربة المتوسطة الانتماع الغنية بالمواد اللبالية والناصر الغذائية وهو من النباتات المروية التي تسلم من الاسقام المنظم ٥ أما انواعها المشهورة فهي ما يتبع .

*Musa paradisica* (S).

٢٨٠٥٧ - موز الجنة \*

*Bananier du Paradis*, *Figuer d'Adam*, *Bananier légume* (F).

نوع من الموز الزراعي . غروب المشهورة نحو ٥٠٠ ، اعطائها البلاد الاستوائية . اروبها مقة . سورها اسطوانية الشكل خضراء اللون تملو من ٣ الى ٥ أمتار . اوراقها كبيرة القد جامدة الصفحة . كباساتها متدلية عديدة الاشاط . ثمارها مستطيلة ، غليظة ، محجة الاطراف . لبابها غزير المادة اللشوية اللذائية يصنع منه بعد التجفيف والسق دقيق شائع الاستعمال يمدى دقيق الموز .

*Musa ensata* (S).

٢٨٠٥٨ - موز الحبشة

*Bananier d'Abyssinie* (F).

نوع من الموز ، يتكاثر بالبذر ، مهد الحبشة . اودته لا تق ، ساقه تملو من ٣ الى ٧ أمتار وهي فسخة الجذع حل حدود زانها الاول . اوراقها اعليجية الشكل تملو من ٤ الى ٦ أمتار وترى من ٨٠ الى ١٢٠ سم . نصلها نارية جامدة جيلة الخضار ، ضلوعها غليظة جلوية اللون . انزوارها سنبل التجميع . انزاعه بنفسجية كبيرة القد ،

**Canthus** ٢٨٠٨٠ - **مُوق**  
هو ملتقى الجفنتين وما اثنان: الموق الاكبر والموق الاصغر. فالأكبر ما كان من جهة الانثى والاصغر من جهة الذن .

**Réchaud (F), Chafing-dish (E).** ٢٨٠٨١ - **مُوقِد**

**Apogée (F), Apogee (E).** ٢٨٠٨٢ - **مُوقِل**  
البعد الأقصى لنجم عن الارض .

**Mandant (F), Employer (E).** ٢٨٠٨٣ - **مُوسِكِل**  
هو الذي يصدر منه التوكيل الى شخص يدهي وكيله .

**Eleveuse (F), Raiser (E).** ٢٨٠٨٤ - **مُوسِكِن \***  
دنية اصطفاية تستعمل لحض القوب .

**Mull** ٢٨٠٨٥ - **مُوَل**  
ساف من الطبقة الدنياية يرتكز على التربة المندنية، يتميز بحبيباته الرملية وبكثرة ديدانه وحشرات وبخاصيته النسبية وبوفرة مواده الغذائية .

**Financer (F), To finance (E).** ٢٨٠٨٦ - **مُوَل**

**Aralgnée (F), Spider (E).** ٢٨٠٨٧ - **مُوَلَة**  
المول اسم للمنكبوت . الواحدة مولة .

**Zeus (S).** ٢٨٠٨٨ - **مُوَلِك**  
**Zée, Dorée, Poisson de St Pierre (F).**

سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من شائكات الزعانف وفصيلة الموليكيات . اعطائها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || جسمها شبه بيضي الشكلون يعطى من ٤٠ الى ٥٠ سم. رأسها مستطيل الجرم ، كبير الشفق الرب . عينها ماحتان . زعنفتها الظهرية كبيرة مستطيلة ، منحنية القسم الامامي ، سرعة الخفاي . ويعطى في القسم الامامي نحو ١٢ حكة مستطيلة دقيقة غصروية التركيب . زعنفتها الشرجية ثلاثية المانحس الحادة . الذيلية شبه مربعة مقطوعة . ثوبها الى الصفار المذهب . يعطى في اعلى خوشها نقطة سوداء مستديرة || لحمها مأكول متوسط الصنف .

**Zeldae (S).** ٢٨٠٨٩ - **مُوَلِكِيَّات**  
**Zeldés (F), Zeldae (E).**

فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطائها بحار العالم || اجسامها متباينة القد ، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة . جميعها بيضية الشكلون او اهلبيجية . رؤوسها مستنقصة . زعانفها الظهرية كبيرة مزينة || لحمها مأكولة لكنها من الاصناف المبدلة .

**Molannidae (S).** ٢٨٠٩٠ - **مُوَلِكِيَّات**  
**Molannidae (F), Molannidae (E).**

فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض جبال البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد ، مراء اللون . يسط اجنحتها تراوح الى ١٨ سم . اجنحتها مستطيلة الشكل ، ضيقة . الامامية منها كثيفة الخمل ، الخلفية شفافة || تألف الجسريات والمنساق والفردان . اساريها تمشي في المياه الراكدة ضمن جلاييب ريلية

١,٥٢٢ ٪ من السليلوز  
٠,٩٢ ٪ رماد

**Mouzaubi (F).** ٢٨٠٩٥ - **مُوزَمْبِي**  
هو التليكة من النباتات البقلية ، اطليا .

**Equilibré (F), Balanced (E).** ٢٨٠٩٦ - **مُوزُون**  
نمت تعريفي يطلق على كل تبغ متدل العلم لا يتورده نفس .

**Musaceae (S).** ٢٨٠٩٧ - **مُوزِيَّات**  
**Musacées (F), Musaceae (E).**

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة . انواعها حديدية تجمعها ثلاثة اجناس : الموز والهيل والوشيج . اعطائها السيلاد الاستوائية والحارة . نباتاتها عشبية حادة الجذوع الخشبية . سوقها انحاء ليفية ، متراكبة ، قرصية الانتشاب ، ترتكز على ارومة .

**Muscardino (F).** ٢٨٠٩٨ - **مُوسِكِرْدِيْن**  
**Silkworm disease (E).**  
مرض يصيب دود القز يدهي الشلل الوردي ، اطليا .

**Thérophyte (F).** ٢٨٠٩٩ - **مُوسَمِي**  
**Therophyte (E).**  
كل نبات يزري المنشأ دورته الحياتية تطول موسمًا واحدًا لا يتعدى الخول .

**Prisme (F), Prism (E).** ٢٨٠٩٠ - **مُوسُور**  
جسم متوازي الحروف الجمانية المتساوية المصوبة على كل من قاعدتيه || والموسور قد يكون قائمًا ومزودبًا وثلاثيًا ورباعيًا وخماسيًا الخ... || يستخدم الموشور الزجاجي الثلاثي السطوح في علم الضوء وهو يتكون من وسط شفاف محصور بين سطحين مائلين تحدهما زاوية تدهي زاوية الانكسار .

**Prismatique (F).** ٢٨٠٩١ - **مُوسُورِي**  
**Prismatic (E).**  
نمت تعريفي يطلق على ما كان شكله كاللوشور .

**Paille (F), Straw (E).** ٢٨٠٩٢ - **مُوس ، قش**

**Commissure** ٢٨٠٩٣ - **مُوسِل**  
موضع اتصال بعض اجزاء الجسم .

**Efférent (F), Efferent (E).** ٢٨٠٩٤ - **مُوسِل**

**Inducteur (F).** ٢٨٠٩٥ - **مُوسِل كَهْرَبَائِي**  
**Inductor, Field-magnet (E).**

**Légataire (F), Legatee (E).** ٢٨٠٩٦ - **مُوسِي له**  
هو الذي يستحق له للموصي به .

**Hétérozygote (F).** ٢٨٠٩٧ - **مُوسُوت**  
**Heterozygote (E).**  
هو الاثيب ، راجمه .

**Mahong (F).** ٢٨٠٩٨ - **مُوسُون**  
هو الفلقة ، راجها .

**Fourmis allées (F).** ٢٨٠٩٩ - **مُوق**  
**Winged ants (E).**  
هو النمل الجنيح .



موسن

شبه مخروطية الشكل يطغى مجرى رقيق قلبى الشكل ، من التركيب ذاته يميناً على الانتفال . اشهر اجناسها :

مولنفة (S).

٢٨٠٩١ - مؤليات ٥ Laemobothronidae (S).

Laemobothronidae (F). Laemobothronidae (E).

فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلديات وطبقة التلبيات . انواعها عديدة يصممها جنس واحد . جميعها صغيرة القد مغطاة الجسم المنطلي ، ملوفاً بأرجح من ١٠ الى ١٠٠ . وهي تعيش على الطيور الكراسر فتفسيها . واحدها مولة والجمع مول .

٢٨٠٩٢ - مؤليات قرلثة Molyta (F).

هي خنفساء الجرز ، واجمها .

٢٨٠٩٣ - مؤليات Mulleria (S).

Mulleria (F). Mulleria (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات مصفيات الخياشيم وفصيلة النبادات . انواعها المعاصرة المروفة قليلة العدد اعطائها ابنر ومناع وغدران امريكة الاسرائلية ٥ اصنافها لانظمة الاشكال والاحجام ، لامتناهية المصارم ، ملحوفة بادمة سميكة باحة الخصار ٥ تعيش متنمفة في الاحمال . لحومها كاتنة الصنف .

٢٨٠٩٤ - مؤليات Mollie (F).

هي مخروطية الزرقاء ، اطلبها .

٢٨٠٩٥ - مؤليات Meum (F).

هو الشبث البري ، اطلبه .

٢٨٠٩٦ - مؤليات Bananeraie (F).

Banana-plantation (E).

هي بستان الموز .

٢٨٠٩٧ - مؤليات ٥ Monarda (S).

Monarde (F). Bee-balm (E). Etagenblume (D).

Monarda, Menta americana (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعها سبعة . سوقها فروع قصيرة . اوراقها كاملة مسننة متعاقبة . ازهارها غنية التجميع ، انبيلة الارتفاع او طرفية . اوراقها والبشرة مسنن الخفة . ازهارها الى الصفرة المرقطة بالجوقة . اشهر انواعها شاي بلسانغاني وتنعن الخليل والناسورية والمرقطة .

٢٨٠٩٨ - مؤليات مرقطة Monarda punctata (S).

Monarde (F). Bee-balm (E). Etagenblume (D).

نوع من المؤدية وهي بجلة ثرينية معمرة تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . ساقها فروع . اوراقها سنانية . نصلها خلى البشرة مسنن الخفة . ازهارها الى الصفرة المرقطة بالجوقة . ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٢٨٠٩٩ - مؤليات ناسورية ٥ Monarda punctata (S).

Monarde (F). Bee-balm (E). Etagenblume (D).

نوع من المؤدية وهي بجلة ثرينية معمرة تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . ساقها مسنن فروع . اوراقها بيضيه ذرية . نصلها خلى الصفرة مسنن الخفة . لون ازهارها يختلف

باختلاف الغروب . منها الابيض والبنى والاصفر والوردي والاحمر ٥ ازهارها يستمر من حزيران الى آب . اوراقها عطرية فواحة المرقة تستعمل في صناعة الملوو ويستخرج منها من الازهار ، بالتقطير ، زيت طيار له رائحة الكافور وهو منه ، طارد للرياح ، مضاد للتشنج ، مقو للاعصاب خافض للحرارة . اوراقها الجافة تستعمل استهلاك الشاي .

٢٨١٠٠ - مؤليات Acuminé (F). Acuminata (E).

نمت وصنى يطلق على الورقة او الشرة المدببة الطرف .

٢٨١٠١ - مؤليات ٥ Monilia (S).

جنس فطور مجهرية من الثويات وفصيلة الفوطيات . جربها الكنديدة واضحة الهيئة . كائناتها ليمونية الشكل ، سبعية التجميع ٥ انواعها عديدة معظمها طفيلي يشكل الطور الكندي في اللخن ٥ اعرف انواعها وانتهرها الثلاثة التالية .

٢٨١٠٢ - مؤليات بيضاء ٥ Monilia candida (S).

فطر من المؤليات يركب القش والاخشاب للتحلة والسائرة الى الاغلال والثمار السكرية المخمونة والمصير والهام . . . كائناته سبعية التجميع . قياس الكتيبة ٥×٧ سم .

٢٨١٠٣ - مؤليات ذهبية ٥ Monilia aurea (S).

فطر من المؤليات يركب فطر الجذوع والاصغان اليابسة . يبدو كالرسادة . كائناته ليمونية الشكل صفراء اللون مدببة المواج قياسها ١١×٢٢ سم .

٢٨١٠٤ - مؤليات صفراء ٥ Monilia fimbicula (S).

نوع من المؤليات فطرها يركب عرم الفطار فينتطعها ويضعها بمشبهه الامهق اللون ، البليد التجميع ، الذي يقضي على الفطور المرئية الناشئة ٥ يكافئ بنسخ الفورة الحاصبة بالمخلفات الخلى عيار ٣٣ ٪ المركز ١ على ٧ اي جزء واحد من المخلفات في سبعة اجزاء ماء .

٢٨١٠٥ - مؤليات مونيلوبسيس ٥ Moniliopsis (S).

جنس فطور مجهرية من الرنليات . مشبهه قدي الشكل ، ليد التجميع ، يسرح على الاعضاء النباتية عند سطح التربة . هيئة اسطواني الشكل ، دقيق الجول ، كثير الفروع ، سراكب القواميل ٥ انواعه قليلة المدد والاذى اعرفها سالي .

٢٨١٠٦ - مؤليات مونيلوبسيس ادرهولدي ٥ Moniliopsis aderholdi (S).

فطر من المونيلوبسيس يركب سوق واوراق الارنسية والعلية والكرزيت ويحور مرج والسراخس . . . اغصانه في الارواق عادية لا تستعجب المكائنة . اما اذا تمكن من السوق فانه يقضي على اللحاء عند سطح التربة . لذلك تحسن المكائنة .

٢٨١٠٧ - مؤليات مونيلوبسيس قاضي ٥ Moniliopsis fagi (S).

نوع من المونيلوبسيس فطره يركب اوراق الزان فيؤذيها لانه يسبب يباس النسيج .

٢٨١٠٨ - مؤليات مونيلوبسيس فوليكولا ٥ Moniliopsis follicola (S).

نوع من المونيلوبسيس فطره يركب اوراق الاكينسيا . وبالتف والاجاس فيشدها بسف الشاي دون ان يؤذيها .



مؤدية ناسورية



مؤدية



مُونِيْمَة



مُونِيْمَة غُوْطِيْمَة



مُوهر



مَآبِر غُفْلَة



مَنْتَل



مَنْتَل

## ٢٨١١٩ - مُونِيْمَة \*

جنس نباتات جنينة من فصيلة المونيميئات . أنواعها عديدة أعطائها البلاد الحارة اغصانها الخشنة والجذور . أوراقها متعقبة متقابلة بيضية . فصلها جاهد الصفحة اللامعة ، بارز الروق . انزاعها ثنائية المسكن . ثمارها كالتين شكلاً وقد يفي ما كوكبة سكرينة اللحم لا تخلو من الحوصلة . لحاء سوطها حامزة طيبة كانت ولا تزال تستعمل في الحليجات

## ٢٨١١٠ - مُونِيْمَة غُوْطِيْمَة \*

Monimia gothique (F). Monimia gothica (E). حشرة من القسيات حشرشيات الاجنحة . موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية المتاخمة . فراشها واسعة قوتها رحيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق السنديان وغيره من الاشجار العروة والمالة . جسمها متوسط القد يطول نحو ١٢ م . يستطاع نحو ٣٦ م . رأسها حنطي اللون . عينها ناشزتان . زباناها خيطيان . منشفها منسد الجرم ويطيرها الى الخيطي . جوشها منطوي الى الامام الى اليمين واليسار الى الخيطي الى الخيطي يطوى تهبسج وتقبسج وتبشسج وزورقة خضابها اسمر . ويملوه ايضا بقعة مربعة واخرى مستطيلة لونها الى الكسني القاتم . ورشناها الخلفيان الى الخيطي الاصفر يطويه حنار تبني يتنهي بالاعذاب . لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آذار ويثي حتى ايار . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتدح الممكن لطفاً مستطيلة على الصفحات السفلى من تصال الاوراق . للسرقة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٥ م . جسمها اسطواني الشكل ، واضح الحيد . قوتها الى اغصان الاطميل المواج يملوه غط لثبي اسود وثلاثة غطوط جانبية حراء سمر . رأسها اسود . مذهب الى الطحلة العراسية . وواجبها الى السرقة القاعة . طور الاكمال الذي يستمر من ١٥ الى ١٧ يوماً ينتفي في التربة حيث تنتمن السرقة ملتصقة بجلباب من الطين .

Monimia stablis (S). Monimia stablis (E).

حشرة من القسيات حشرشيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافرقيقة الشمالية . فراشها واسعة قوتها رحيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق السنديان وغيره من الاشجار العروة . جسمها متوسط القد يطول نحو ١٢ م . يستطاع نحو ٣٣ م . رأسها حنطي اللون . عينها كبرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، محيطيان عند الانثى . جوشها ويطيرها الى الخيطي الاشعث المواج . ورشناها الاماميان الى الخيطي الاشعث تملوه دائرتان مناشان وعط معترض وتقبسج حناري . جميعها الى الخيطي لشديد السرقة . ورشناها الخلفيان الى اليركة الغبراء تملوها ماجة فضية وعط اسمر يستيق الحنار الخارجي . لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آذار ويثي حتى ايار . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتدح الممكن لطفاً مستطيلة على الصفحات السفلى من تصال الاوراق . للسرقة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٥ م . جسمها اسطواني الشكل . قوتها الى السرقة الزينية المواج يملوه غط لثبي جزوي وثلاثة غطوط جانبية منها خيطان اسودان والخط الوسطي اصفر . رأسها اجر . معها الى الطحلة التبراء . وواجبها الى السرقة .

## ٢٨١١١ - مُونِيْمَة مُنْتِيْمَة \*

Monimia ambigua (F). Monimia ambigua (E). حشرة من القسيات حشرشيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافرقيقة الشمالية . فراشها واسعة قوتها رحيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق السنديان وغيره من الاشجار العروة . جسمها متوسط القد يطول نحو ١٢ م . يستطاع نحو ٣٣ م . رأسها حنطي اللون . عينها كبرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، محيطيان عند الانثى . جوشها ويطيرها الى الخيطي الاشعث المواج . ورشناها الاماميان الى الخيطي الاشعث تملوه دائرتان مناشان وعط معترض وتقبسج حناري . جميعها الى الخيطي لشديد السرقة . ورشناها الخلفيان الى اليركة الغبراء تملوها ماجة فضية وعط اسمر يستيق الحنار الخارجي . لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آذار ويثي حتى ايار . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتدح الممكن لطفاً مستطيلة على الصفحات السفلى من تصال الاوراق . للسرقة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٥ م . جسمها اسطواني الشكل . قوتها الى السرقة الزينية المواج يملوه غط لثبي جزوي وثلاثة غطوط جانبية منها خيطان اسودان والخط الوسطي اصفر . رأسها اجر . معها الى الطحلة التبراء . وواجبها الى السرقة .

طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ينتفي في التربة حيث تنتمن السرقة ملتصقة بجلباب من الطين .

## ٢٨١١٢ - مُونِيْمِيَّات \*

Monimiaceae (S). Monimiaceae (F). Monimiaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها واوضاعها عديدة . جميعها اشجار وجنبات . اوراقها متقابلة بسيطة . انزاعها وحيدة اللشق . اشهر اجناسها المونيمية .

## ٢٨١١٣ - مُوْهَو \*

Moho (S). Moho (F). Moho (E). جنس طير من الجوامق ريقات المناقير وفصيلة المغثرات . انواعه المعروفة ثلاثة موطنها جزر الهندونيش . ملجتها الحياتي جماعي . جماعتها قليلة العدد . قوتها رحيق الازهار والفاول ... . اجسامها صغيرة مستطيلة المناقير القليلة التفوق . اذنانها رتاجية مستطيلة . اثريها ثلاثية الاوران فيها الاسود والاصفر والابيض . رطبها دائماً صفراء اللون او بيضاء ويملوه في اياطها رطب دقيق ناعم . تدن في الادغال . انثاها تضع ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ١٣ يوماً .

## ٢٨١١٤ - مَوْهَوْب لِه \*

Donaire (F). Donee, Receiver (E). هو الذي يقبض الحية .

## ٢٨١١٥ - مَوْهَبَة \*

Provision (F). Anthère (F). Anthère (E). العضو الذكري في النبات وهو الجزء العلوي من السداة يرتكز على الحويطة . اليه تنهي جذرات الطلع وفيه تصبغ ومنه تنبت .

## ٢٨١١٧ - مِيْثَل \*

Manomètre (F). Manometer (E). جهاز خاص يستعمل في قياس ضغط الغازات والافرة .

## ٢٨١١٨ - مِيْثَب \*

Affluent (F). Falling into, Running into (E). الجدل الذي يصب في النهر . ج مآكب .

## ٢٨١١٩ - مِيْخَار ، لَقِيْس \*

Tardif (F). Tardy (E). هو ما طال زمن نموه ان في الحيات او في النبات .

## ٢٨١٢٠ - مِيْثَل \* ، مِيْصَرَب \*

Acidimètre (F). Acidimeter (E). مقياس الحموضة . يستعمل لمعرفة مقدار مسا في بعض السوائل كالخمر والحليب وما اشبه من حواض .

## ٢٨١٢١ - مِيْثَقَاق \*

Périscop (F). Periscope (E). Afférent (F). Afférent (E). ناقل السائل الى العضو او الى المركز .

## ٢٨١٢٣ - مِيْطَاق \*

Marée descendante (F). Falling-tide (E). هو ما يدعوه الجزر اي تباعد مياه البحر من الشط ورجوعها الى ما كانت عليه قبل الهياط .

## ٢٨١٢٤ - مِيْاع \*

Vasculose (F). مادة التسج الوعائية .



مير للك



ميشة الرنخس



ميشة مقنسة



ميشة نقية



ميشة وردية



مَيْح

٢٨١٣٣ - مَيْحَان ، مَيْحَان  
Méthane (F). Marsh gas (E).

٢٨١٣٤ - مَيْوَكُونْلَرِي  
Mitochondrie  
رَاجِع كُونْلَرِيوزوم .

٢٨١٣٥ - مَيْشَنَة  
Mycena (S). Mycène (F). Mycena (E).

جنس فطور من فصيلة الفاريقونيات ، أنواعه المعروفة قليلة العدد اصطناعا غابات مناطق البلاد المعتدلة الحرارة ، تتميز بتكافئها الصغيرة وبطرسها الحادة الاطراف الملتزمة ، بعض انواعها جيد الصنف مأكول والبعض الآخر كاعن الصنف غير مرغوب فيه || اعرف انواعها واشهرها الاربعة التالية .

٢٨١٣٦ - مَيْشَنَة السَّرْحَسْ \*

Mycena espipterygia (S). Mycène des fougères (F). توجد في المواقف الرطبة بين السرخس ، حاشية دقيقة ، رقيقة ، لزجة . نكتها قمية الشكل ، صغيرة اللد ، قطرها نحو ١ سم . لونها ال صفار البيوتي || لحيتها كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٨١٣٧ - مَيْشَنَة مَقْنَسَة \*

Mycena galericulata (S). Mycène à bonnet (F). توجد في الغابات على الجذوع النخرة القريبة من التربة ، ساقها دقيقة ، مستدلة الارتفاع ، تينة اللون . نكتها قلسوية الشكل ، قطرها نحو ٥ سم . لونها ال الكمية الصفراء . اطرسها وردية اللون || لحيتها مأكولة ، لذينة الطعم ، مرغوب فيها .

٢٨١٣٨ - مَيْشَنَة نَقِيَّة \*

Mycena pura (S). Mycène pur (F). توجد في المواقف الرطبة . تعيش على الببال . وانحتها راتحة القبل . ساقها مستدلة الارتفاع والانلاطف . نكتها راتحة الشكل ، صفراء اللون يطولها موج ليلكي عايق . اطرسها وردية اللون || لحيتها كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٨١٣٩ - مَيْشَنَة وَرْدِيَّة \*

Mycena rosella (S). Mycène rosé (F). توجد في المواقف الرطبة بين الصنوبر . ساقها رقيقة ، دقيقة ، وردية اللون . اوسرتها صاجية الشكل ، صغيرة اللد ، قطرها نحو ١ سم . لونها ال الوردي العايق || لحيتها كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٨١٤٠ - مَيْح \*

Dactylopterus volitans (S). Dactyloptère, Grondin rouge (F). Flying-fish (E). جنس اسماك بحرية طيارة زاحية الالوان من فصيلة الميجيات . ورتبة شالكات الزعانف الاصعية . انواعه قليلة العدد ، اشهرها ميج المتوسط الذي يبلغ طول نحو ٥٠ سم . له زعنفتان يجتمعتان طول الواحدة نحو ٣٠ سم . تمكثان من الارتفاع والسير فوق الماء فيطير نحو نصف دقيقة على ارتفاع متر .

٢٨١٤١ - مَيْح مَيْدُول ، مَيْح المَيْدُول

Dactylopterus volitans communis (S). Dactyloptère pirapède, D. commun, D. de la Méditerranée (F). Swallow-fish, Kite-fish, Common Flying-fish (E). نوع من الميج . سمكة بحرية يبيض من فصيلة الميجيات

٢٨١٤٥ - مَيْح \*  
Fluidista (F). Fluidista (E). المياع من شايح النظرية القائلة بان انطاطيس الحيواني يمود ال جاذبية خاصة .

٢٨١٤٦ - مَيْحَاكَة ، كَيْلَاكِيَّة  
Collectia (S). Collectie, Mayaca (F). Mayaka (E).

مياكة هو الاسم الشلي . جنس نباتات برية معمرة ، طيبة من فصيلة البقيات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ منهايا بعض مناطق امريكا الجنوبية اعصها الثقيل والبرو || جميع انواعها شجيرات ورتبات فرعاء . معطها شائك الاقناد والافان . اورلتها متعاقبة ، مستقة ، اهليلجية التصال الصغيرة . ازهارها فردية ، ابطية الارتكاز ، عطرية العرف ، يكثر فيها اللون الالبيس . ثمارها صانبة الشكل والقد ، مأكولة لكننا تسهل المدة .

٢٨١٤٧ - مِيَاه رَاكْدَة ، مِيَاهَا كَسِيَّة  
Eaux stagnantes (F). Stagnant water (E).

٢٨١٤٨ - مِيَاكَة \*  
Hydrométrie (F). Hydrometry (E). علم كل ما هو عنص بالماء كالكثافة والضغط والسرعة الخ .

٢٨١٤٩ - مِيْبَة  
Jus de coing (F). Juice of the quince (E). عصير السفرجل .

٢٨١٥٠ - مِيْبَر المَيْسَك \*  
Bledius littoralis (S). Bléide armé, Bléide du littoral (F). Bledius littoralis (E).

حشرة جاسة ناتجة من فصيلة الدنليات ورتبة غحديات الاجنحة . موطنها حوض البحر الالبيس المتوسط . تألف المواقف الرطبة واعصها البساتين . خنافسها ويرقاتها تعيش على المواد العضوية وكل ما تستطيع افتراسه من الحشرات الدنيا || جسمها صغير اللد ، نحيل ، يطول من ٦ الى ٧ سم . ثوبها ثنائي اللون ، اسود الجسم ، جؤوي القفدين والجرانز . رأسه صغير الحجم قصير الخطم ينتهي بفتكين ضليعين . ورأس الذكر مسلح بقرنين ذريين . زبانه مرفقتان عينا صغيرتان ، ظهرانه عادم التعزيز يلسف نحو خفي البطن || يدعي مير الميسك نسبة ال ما تفرز سكرته ابطنية الثامنة من مادة عطرية قريبة الشبه بعرف المسك || الذكر اميز قدام من الانثى وأع ثوبا منها واطول زبانا وادق بطنًا || لها جيل واحد في الحول : تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف ، تسرح في الليل وتبيت في النهار || البرقة بطية التو لا تتدك الكيال الجسودي قبل اواسط شباط . جسمها يطول من ١٢ الى ١٥ سم . وهو مستغلظ المقدم والرأس ، مستدق الطرف غير اللون ، اسر الرأس والشرج ، منقط الجانبين الامين والاييسر بعمول سود تتوسط السك || طور الاكمال يستمر من اواسط شباط الى اواخر آذار .

٢٨١٤١ - مِيْبَة  
Guenon (F). She-monkey (E). المبة القردة مربية وتدعي قيشة . اما التي بلغت الضبة فتدعي زئامة .

٢٨١٤٢ - مِيْبَاكِيَرِيك ، مَا وَكَالِيَّة  
Métaphysique (F). Metaphysic (E). علم ما وراء المادة او الطبيعية من المعتقدات .



مَيْجَة البَطَا



شائكات الزعانف الاصبىة || اصطناعها بحار البلاد الحارة وبها القوسط . يكثر وجودها في المياه التوتسية والبيية ويقف في المياه البينائية || جسمها شبه وشعي الشكل يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . رأسها معتدل الحجم ، غروي الشكل . فكها الاعلى يتقدم الاسفل قليلا . عينها كبريتان ، مستطبتان ، ناثرتان . وريعتا الارتيكاز . ثوبها يراوح بين الاحمر والوردي الزاهي يملوه موج اصفر وبمجمي || زعانفها متباينة الاشكال والاحجام . الظهرية مستطيلة الصدرية كبيرة جناحية الشكل يملوه عند قاعدتها شعاع مقوس الطرف || زعنفتها الصدرية متجانسان تمكناهما من الارتفاع فوق سطح الماء والطيران نحو نصف دقيقة واكثر || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٨١٤٢ - مَيْجَة \* (E). *Maja, Maia* (F). Spider crab. جنس منع من القشريات المعروفة بساتك البحر . انواها عديدة ، اصطناعها بحار البلاد الحارة . يكثر وجودها بين الخث وعل الصغور || اشهر انواها المأكولة الميجة المجلولة التي يراوح طولها من ١٨ الى ٢٢ سم .

٢٨١٤٣ - مَيْجَل \* (E). *Ameiva* (S). *Ameiva* (F). Ameiva (E). جنس حيوانات زحافة من الغطاء وفصيلة التيديات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ موطنها امريكة الوسطى والاكرادور . تألف البراري والقيافي الرملية . قوتها الحشرات واسارها والديدان || اجسامها تطول من ٢٥ الى ٣٧ سم . انواها تختلف مع الانواع تكثر فيها الركة السراء .

٢٨١٤٤ - مَيْجِيَّات (S). *Dactylopteridae* (S). *Dactylopteridae* (F). *Dactylopteridae* (E). فصيلة اسماك بحرية بيروسة من رتبة السطيات شائكات الزعانف الاصبىة || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . معظمها من اسماك المحيط الهادي والهندي والبحر الاحمر || اجسامها وشعي الشكل تطول من ١٥ الى ٧٠ سم . رؤسها كبيرة . غاظمها قصيرة . زعانفها الصدرية مستطيلة ، جناحية الشكل ، تمكناها من الطيران فوق سطح الماء || اشهر انواعها واعرفها الميج المجلول .

٢٨١٤٥ - مَيْج : مَيْج : مئي البط . ماحت تيج . ٢٨١٤٦ - مَيْجَكَة \* (E). *Isol* (F). *Isolate* (E). الشجرة او الاكة المنفردة البائنة عن اغصانها . ج موالحه .

٢٨١٤٧ - مَيْجَة \* (S). *Hypomyces* (S). جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة السطيات . انواعها عديدة معظمها من الفطور التي تنطلق على خبثا من الرزقات والدخاخات وبعضها يعيش على النباتات العليا . اصناسها وتكاثرها دقيقة ، نكاحها اروسية الشكل متراكبة . برتها متتابع الخلايا وودي اللون || انواعها المؤذية ثلاثة وهي :

٢٨١٤٨ - مَيْجَة البَطَا \* (E). *Hypomyces haematococcus*, *Nectria citri*, *Fusarium solani* *eamartii* (S). فطر مجهرى يصيب عدة نباتات انحصا البطاطا والخضيات والبن والكاكاو الخ ... || يركب جلود البطاطا ودندانها . مظهره الخارجى يقع سمر لا قياسية تنثى البشرة واللث يتسبب عنها دون ان تؤذي البيوت || ويركب سق

الاشجار من الحفصيات وفيها فيسب قروحا لونها الى السرة تبدو كالخوش المسنجة ثم تنتشر فتسب السواء والشكر والخشب وتقود الجذع الى الصرم || يكافح في الاشجار يكشط وتنظيف اعضاء الموصية ويظهرها بالكريزول المحلول ١٠ ٪ || ان يمد التطهير مرة ثانية بعد الاول بادعة او خمسة ايام .

٢٨١٤٩ - مَيْجَة النَّارِيْقُون \* (S). *Hypomyces rosellus*, *Dactylum dendroides* (S). فطر مجهرى يتطفل على الناريقون فيؤذيه . مظهره الخارجى يقع خلية ، لونها الى البياض الاخر ، قشرها يراوح من ١٠ الى ٣٠ سم . تملو الفطرة منسا ومنكها مركب الناريقون وقد تصيب نكمته فتقطعها وتشرها بد ان تمقطعها بمشبع خاص ، نواسه كندف الغطن لونه الى الصبىة الزرقاء || يكافح باستعمال الليزول المحلول ٢ ٪ او الفورول التجاري المحلول ايضا ٢ ٪ .

٢٨١٥٠ - مَيْجَة خَيْبِيَّة \* (S). *Hypomyces perniciosus*, *Mycogone perniciosus*, *Vorticillium*, *Cephalosporium* (S). *Môle du champignon de couche* (F). فطر مجهرى يتطفل على بعض انواع الفطور المأكولة واخصه الناريقون المرئ || مظهره الخارجى يقع خلية لونها الى الرماد تملو سطح الفطرة ثم تمتد الى انغطور فتقطعها وتشرها || يكافح باستعمال الليزول المحلول من ٢ الى ٢٥ ٪ .

٢٨١٥١ - مَيْجَة ي \* (F). *Unio* (F). تمت تعريفي يطلق على كل حشرة تبيض موسما وحادا متتابعا لاستطفا في دورتها الحياتية الحولية .

٢٨١٥٢ - مَيْجَة \* (F). *Style* (F). يقال ينو يروم على مياء واحد اي على طريقة واحدة .

٢٨١٥٣ - مَيْدَاس \* \* (S). *Midas* (S). *Tamarin* جنس قرود امريكية من فصيلة القردود اللدية . انواعها ٢١ . موطنها كستارياكا وبانايا وكوليبيا والبيرو والبرازيل والفريانا || اجسامها صغيرة القد ، جيلة الشكل ، مستطيلة الشعر الناعم الوثير . رؤسها مستدرة ، اذانها عادمة الور . اذانها مستطيلة جيلة . ثوبها سوية الالوان البينائية الموج || تميش بين الاغلال وفي المروج القريبة من النباتات . قوتها الحشرات والغطاء والصفادع والعصافير وبعض الثار والحويو .

٢٨١٥٤ - مَيْدَان ، مَيْدَان \* (F). *Hippodrome*, *Champ de courses* (F). *Hippodrome*, *Race-course*, *Race-ground* (E). مكان سباق الخيل .

٢٨١٥٥ - مَيْدَس \* (E). *Fluviographe*, *Fluviomètre* (F). *Fluviometer* (E). جهاز يستعمل في قياس مياه الانهار ونسبة انحطارها .

٢٨١٥٦ - مَيْدَع \* (F). *Pantapus* (S). *Pentapoda* (F). جنس اسماك بحرية من فصيلة القشريات . انواعها المعروفة قليلة ، جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة والمتدلة . اجسامها الهليجية الشكل متوسطة القد . زعانفها الظهرية مستطيلة شائكة . زعانفها الترجية فارة . ثوبها فضية اللون يملوه تخطيط مذهب قاطب .



ميروس



ميريد



ميرة



ميرين



ميرف



ميروس

## ٢٨١٦٧ - مِيرُوس \* مِسْطَرَّةُ الْإِرْتِفَاعِ

Mire (F). Sighting (E).  
مسطرة مرقعة تستعمل لمعرفة الارتفاعات في مسح الأرض.

## ٢٨١٦٤ - مِيرَا \* MIRA (F). MIRA (E).

ميرا نجم ثير من كوكبة قيطس مشهور باسم أصبوجة ،  
أطلقها .

## ٢٨١٦٥ - مِيرَاتُ

Héritage, Hoirie, Succession (F). Heritage, Inheritance, Succession (E).  
هو التركة ، أطلاق .

## ٢٨١٦٦ - مِيرَّة \* MIRA (S). MIRA (F).

جنس حشرات ناعمة من فصيلة اللشراقيات ورية غشائيات  
الاجنحة المخفضة . أنواعها عديدة موطنها بعض مناطق  
البلاد المحتلة الحارة . جميعها تطفل على الحشرات  
من الحشرات وذوات الجناحين || أجسامها صفراء الفد  
تطول نحو ١ سم . ولونها نصف دائرية الشكل . قوتها  
الاستعمارية مرفقة ، صهيبة ، كبيرة . جواشها مستطيلة .  
يعطونها قصيرة يرمية الشكل . مرزاتها قصيرة . اجنحتها  
بدلع عند الشقين . انبواها تراوح من الوردي إلى الصنابي  
الاصفر المحاج .

## ٢٨١٦٧ - مِيرْسِين \* قَتَم MYSRINA (S).

Myrsine (F). Mysrine (E). Trugmyrte (D). Mysrine (I).  
جنس نباتات شجيرة مسمرة من فصيلة الميرسينيات . انواعه  
عديدة ، اعطائها البلاد الحارة المنخفضة نحو الاستوائية  
جميعها تشبه الآس ، بعضها زراعي ثماره نوية صغيرة  
القد مأكولة .

## ٢٨١٦٨ - مِيرْسِينِيَّات \* قَتَمِيَّات ، جَنَاحِيَّات

Myrsinaceae (S). Myrsinacées (F). Myrsinaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها  
..... معظمها من نباتات المناطق الاستوائية ، فيها الاشجار  
والشجيرات والجنابات . اوراقها متعاقبة . ازهارها صفيرة  
القد ، منها الخشوية ومنها وحيدة السكن . ثمارها نوية  
مأكولة في بعض الانواع .

## ٢٨١٦٩ - مِيرُوق \* MYRAGE perlolié (F).

نبات عشبي بري حولي من فصيلة الميرليديات . منته  
البلاد المحتلة الحارة من الشرق الاوسط واروية . ساقه  
فراء . اوراقه متعاقبة ، ريمية النصل ، بحرية اللون .  
ازهاره تاجي الارتكاز عقديوي التجميع . ازهاره صفيرة  
القد صفراء اللون دقيقة المالحق . ينبت بين الزروع  
كثرتة مؤذية .

## ٢٨١٧٠ - مِيرُوس \* MYRUS (S).

Myra (F). Myrus (E).  
جنس اسماك بحرية من مفتوحات الحائنة وفصيلة الشقيبات . منته  
انواعه المروقة اثنا عشر . واحد منها الميروس الميزل يمشي  
في البحر الابيض المتوسط والثاني من اسماك بحار الصين  
واليابان || جسمه مستطيل الشكل كالانكليش ، طوله  
ايراوح من ٦٠ الى ١٢٠ سم . جلده امط عادم الحارشف .  
أسماك غروطي ، ذات الخطم ، واسع اللدق ، عيناها صفيرتان  
صاحتان . زعنفته الظهرية قاطبة ، فيقة تقابلها الشرجية  
التي تمتد من اواسط البطن إلى طرف الذيل . ثوبه إلى

## ٢٨١٧١ - مِيدَك \* MESSIER Pentapus vittatus (S).

Pentapode rayé (F). Sea rough (E).  
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الفرغيات ورية شاكيات  
الزعانف . اعطائها بحار البلاد الحارة والمحتلة الحارة ومنها  
البحر الابيض المتوسط . تنبت من اسماك الغنات المتوسطة  
الذوق || جسمها ابيض الشكل ، يطول من ١٥ الى  
٢٥ سم . ثوبها إلى الزرقاء الفضية المحاج يبق عند الرأس  
والظهر وبغير ويبيض عند البطن ويعلمها في جانبها ستة  
خطوط ذهبية قاطبة . زعانفها زرقاء اللون ، الصدريّة  
والحرشية والشرجية والذيلية حر القواعد . رأسها غروطي  
الشكل ، ذات الخطم . شفتها معتدل الانفرج . اسنانيا  
صفيرة ذرية . عيناها كبيرتان ، ناشزتان ، عسلتان .  
زعنفتها الظهرية واحدة مستطيلة . زعنفتها الذيلية قارعة ||  
لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

## ٢٨١٥٨ - مِيدَك \* Parefeu (F). Firebreak (E).

حاجز طبيعي او صناعي جردت منه جميع المواد القابلة  
للاشتعال منعا لانتداد الحريق في الغابات والاحراج .

## ٢٨١٥٩ - مِيدُوس \* MYDAUS (S).

Mydaus (F). Mydaus (E).  
حيوان لبون مفتاح من فصيلة السوريات . موطن الهند  
الصينية وبنجاليا . جسمه قريب الشبه بحم الغرير .  
رأسه غروطي الشكل ، ذات الخطم . قوائمه قصيرة .  
اغافيره مستطيلة ، شديدة الصلابة . عليه عش . ثوبه  
إلى السمرة الكستانية يعلمو خط ابيض يمتد من الفخذ إلى  
مفرز الذنب . ذنبه جذعة كستانية اللون بيضاء الطرف ||  
من ميزاته انه يرمي عدوه بسائل كاره كريه الرائحة قوتزه  
اللغد الشرجية ويسدده بفتقيبيه على ايمد من متر .

## ٢٨١٦٠ - مِيدِيَّات \* MYTILIDAE (S).

Mytilidae (F). Mytilidae (E).  
فصيلة من الرخويات صفحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها  
عديدة منتشرة في جميع بحار العالم . اشهرها الميديّة .

## ٢٨١٦١ - مِيدِيَّة \* ، بَلَحُ الْبَحْرِ MYTILUS (S). Moule (F). Mussel (E).

جنس بحار من فصيلة الميديّات . انواعه المروفة نحو ٧٠  
معظمها مأكول مستحب الطعم . يعيش على الصخور التي  
يفرما المادوقه ير في احواض بحرية خاصة صار تجهيزها  
في هذا السيل .

## ٢٨١٦٢ - مِيدَك \* HOMICENTECES (S).

Hámicentáta, Hámitanrec (F).  
جنس حيوانات لبنة حارشة من فصيلة اللاليات . انواعه  
المروفة قليلة العدد موطنها الساحل الشرقي من جزيرة  
مدغشقر . تألف السباب والاماكن التي يكثر فيها  
الاعشاب البرية . مسرعا دجوي . قوتها الحشرات  
والديدان || أجسامها صفيرة مكرومة تطول من ٢٠ إلى  
٢٥ سم . اعطائها مستطيلة . هليا معتدل الشخانة تتخلله  
سلا متباينة الطول تكثر في فيج الظهر . الوأها إلى  
السر السودة يعلمها تسنيج قالب اصفر . وثبا فوح  
اسود الرأس || انبائها ثورقة تضع في كل رصع من ١٠  
إلى ١٢ جرأ || يابها الثوري ينسمر نحو اربعة اشهر .

## ٢٨٣٠٠ - نارجيس \* ، نارجيس

Tragelaphus spekel (S). Tragelaphe de Speke (F). Nakong (E).

نوع من الجبل ، قدره قدر القنار ، له قرنان جالسان ثوبه إلى السرة يملوه بجمع أبيض . أعلامه أواسط أفريقية . يألف المصايب والفياقي ويرتاد المناطق وضفاف مجاري الماء . قرنه الأشايب . أجله يد من ه إلى ٢٠ نفراً .

Máua (F).

## ٢٨٣٠١ - نارجيس

هو المهر ، أظله .

Naranio (S).

## ٢٨٣٠٢ - نارجيس

Naranio (F). Naranio (E).

نارجيس هو الاسم الهندى . جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحت الخياشيم وفضيلة التقييات . أنواعها المعروفة قليلة العدد بعضها هندي والآخر استرالي || اجسامها صغيرة . مشعبا بارزة و طليقة . اصدها مبيوانية الشكل || تمثيل في اتفاق تنحيا في الصنوبر المغسورة بالماء قرب مصبات الأنهر || ليفها غزير المادة ، جيد الصنف .

Cocos (S).

## ٢٨٣٠٣ - نارجيس

Cocotier (F). Cocoa-nut palm (E).

جنس اشجار ليفية الجذع من فصيلة النخلات . أنواعها المعروفة ٣٠ ، اعطائها المناطق الاستوائية والحارة . معظما بري وتزيين وبعضها زراعي صناعي . اشهر أنواعها النارجيس المعروف (أظله) . أما الأنواع الأخرى التي تعيش في بعض المواقع الحارة من القارة المتعدلة فهي :

Cocos erythrospatha

Cocos eriospatha

Cocos australis

Cocos lapidea

Cocos leiospatha

Cocos datil

Cocos coronata

Cocos campestris

Cocos elegantissima

Cocos romanzoffiana

Cocos plumosa

Cocos flexuosa

Cocos capitata

Cocos weddeliana

Cocos ysay

Jubée (F).

## ٢٨٣٠٥ - نارجيس شيلي

هو الجوبة ، أظله .

٢٨٣٠٦ - نارجيس معزوف \* ، جوز الهند

## رائج ، شعفور ، حشرج

Cocos nucifera (S). Cocotier commun (F). Cocoa-nut palm (E). Kokospalme, Indischer Nussbaum (D). Cocco, Albero del cocco, Noco d'India (I).

نوع من النارجيس الزراعي . ساقه اسطوانية منتصبة تملو نحو ٢٥ م . اعطانه بعض المناطق الاستوائية . يعيش قرب الماء ويجرد على الشواطئ البحرية . ثماره بفسية الشكل طولها من ١٦ إلى ٢٢ سم . قشورها غشية تغلفها الااليان . لبها جامد الحمر ، حامي اللز ، مستحب الطعم ، شائع الاستهلاك الغذائي والصناعي .

٢٨٣٠٧ - نارجيسكة \* ، جوز الهند ، جوزة

## النارجيس

Coco, Nolz de coco (F).

Coco-nut (E).

ثمرة النارجيس ، لبها ينفع من البلمم والسوداء وضعف الكبد والكلى والمثانة وتروح الباطن . وزيل اوجاع الظهر والبدان واليسير ويهيج افقوا الجنبية ويمنع تقطير البول . صصارته مع السكر تنشط الدم وتقوي الذاكرة . رباد قشوره يحلج الانسان وزيل الكلف والتمش والحكة ويشد الشعر اذا استعمل مع الحناء .

٢٨٣٠٨ - نارددين \* ، سنبلي

Valeriana (S). Valériane (F). Valerian (E). Baldrian (D). Valeriana (I).

جنس نباتات طيبة برية وزراعية من فصيلة النارددينات . أنواعها زهاء ١٥٠ جميعها اشبايح حولية او معمرة . أوراقها متعاقبة مركبة وشبيهة . ازهارها نوري او عذوقية التجميع ، ابيض وتأتي الانكاز . ازهارها غشوية جميلة الشكل يكثر فيها الابيض والوردي || اشهر أنواعها الطيبة والزراعية والبرية ما يتبع .

٢٨٣٠٩ - نارددين أزرق \* ، سنبلي أزرق

Valeriana wallichii (S). Valériane indienne, Nard indien (F). Indian valerian (E). Indische Narde (D). Spiganardi (I).

نوع من النارددين البري والزراعي . جذاميره مفلطحة . ساقه عذقة . أوراقه عاقبة الخشار . ازهاره كثيفة التجميع ، زرقاء اللون ، مستحبة العرف . جذاميره طيبة و اذا استعمل مسحوقها مع الاستنتر والسندل لم يشتر ساجه يشبع من شدة تقويته المدة . ويظهر اللون وزيل البرقان والكبد والحصى . واذا طلى بالخل قطع العرق وطيب البدن وان طيخ بالحمض حتى يتقزم وظل به الشعر سوده وطوله ٥ .

٢٨٣١٠ - نارددين أفليطي \* ، سنبلي رؤمي ، عطارود

Valeriana celtica (S).

Valériane celtique, Nard celtique, Spic celtique (F). Celtic valerian, Celtic spikenard (E). Alpenbaldrian, Nardenbaldrian (D). Nardo celtico, Baldrica, Spiga celtica (I).

نوع من النارددين البري الطيب الممر . ينبت في الآربة الرملية الجبلية . جذاميره مستقيمة مستطيلة لوانة العرف . ساقه نحيلة تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم . أوراقها السفلى كاملة اطيالية . أوراقها الوسطى والعليا مركبة . ازهاره عذوقية التجميع بيضاء اللون . ثماره يفسية الشكل ، صغيرة القد



نارجيس ميشل



نارجيس معروف



نارجيسكة



نارددين أزرق



نارددين أفليطي

٢٨٣٠٤ - نارجيس سيشلي \* ، نارجيس بحري

Lodoicea (S). Lodoicée des Seychelles, Cocotier des Maldives (F). Double cocoa-nut palm (E). Maledivische Nuss (D). Coco di Moldiva (I).

نخلة وسيدة المجلس واللوح ، قريبة الشبه من النارجيس ، موطنها سيشل والهند وسرنديب وموريس . ساقها اسطوانية مستقيمة تملو نحو ٣٠ م . ثمارها كبيرة القد مستطيلة الشكل ثنائية التجميع ، ولحمها زرن من ١٠ إلى ١٢ كيلو يعي يستعمل على الشجرة ، من الثأبير الى الادراك ، نحو الحول . حبة الشجرة قرب الادراك تحوى مادة لبنية آحية للذلة الطعم ناعمة ومليدة .



Valeriana saluana (S). **ناردين عطر** ٢٨٣١٧  
Valérane odorante (F).

نوع من الناردین البري والزراعي المعمّر. ساقه مشوكة تملو من ٥ الى ١٥ سم. تحمل وريقتين صغيرتين ثلاثية التركيب. ازهاره نوري التجميع. ازهاره صغيرة القند، وردية اللون. جلوره فواحة العرف يستخرج منها دهن عطري فاخر الصنف || تنوره يستمر من محو الى آب.

٢٨٣١٨ - **ناردين مخزني\***، **حشيشة القط\***  
Valeriana officinalis (S). **بقلة الهر**

Valeriana officinale, Herbe aux chats (F). Common valerian, All-heal, Cat's valerian (E). Echter Baldrian (D). Valeriana minore, Amantilla (I).

نوع من الناردین الطبي البري المعمّر الجذول. ساقه محددة منتصبة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه مركبة وريقاتها سنائية التصل. سنفة الحافة، ورتبة التجميع تعد من ٥ الى ٢٢. ازهاره نوري. ازهاره صغيرة القند، وردية اللون. جلوره طيبة وعطرية يستخرج منها عطر الناردین وهي عذلة قوية للاصصاب، مفيدة لتهدئة والكلى والطحال، منبهة لقفزة الجلبية، مضادة للتشنج، تنظم الحضم وتزيل الانتفاخ. جرعة المسحوق منه تراوح من غرام الى خمسة.

٢٨٣١٩ - **ناردين نباتات**  
Valerianaceae (S). Valérienacées (F). Valerianaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متشعبة العائلات. ازهارها كثيرة تجتمع الى هذه اجناس، نباتاتها عشية وجنبية. اوراقها مركبة متعاقبة. ازهارها لا قياسي التجميع والارتكاز. ازهارها لا نظامية || اشهر اجناسها الناردین والوشمة والتركوك والكروثل.

٢٨٣٢٠ - **ناردين**  
Pavot blanc (F). هو رمان السالم أي الخشخاش الابيض.

٢٨٣٢١ - **ناردينك**، **ناردينك**  
|| النارسك والنارسك: رمانه صغيرة مفتحة كأنها وردة لونها الى البياض والحمرة والصفرة في وسطها نوار، لونه كذلك وسطه مفص ورائحته طيبة (أ. م.) || هو الرمان البري يحبس الزئفر والالهام. شربه دمان.

٢٨٣٢٢ - **ناردينك\***، **ناردينك\***، **أبر صفي**  
Citrus amara, C. vulgaris (S). Bigaradier, Oranger amer (F). Sour orange, Bitter orange (E). Bitter-orangenbaum (D). Arancio agro, Arancio amaro (I). نوع من الحمضيات والفصيلة النارجية. منبهة المقدر بلاد الصين او الهند الصينية ثم ادخل الى الهند فبلاد الهند والمغرب كانوا اول من ادخلوه الى افريقية الشالية واروبة (المسودي) || ثمره شاككة فناء ورائحة تملو من ٢ الى ٧ امتار. اوراقه متعاقبة. نصلها متنج العنق، اعليجي الصفحة الجامدة الجليسة الخضار. ازهاره خاسية البتلات البيض، شمارة الاسدية، فواحة العرف اللذي المستحب. ثماره مستديرة الشكل برتقالية القند واللون، وخليقة القشور المرة الحامزة. حصاره فصوصها شديدة الحاموضة والمرارة المستنكرة. قشور ثماره ترب السكر يمد معالجها بالملح والكلس وهي صعبة، ناعمة، غنية ببغض الفيتامينات، خافضة الحرارة، مضادة للتشنج. يستعطر من زهره المعروف بالقنداق دهن يضي السطر الليروي. ويستقطر ايضاً من زهره واوراقه ماء الزهر المشهور

حشيشة البثرة. || جلوره صناعية يستخرج منها عطر الناردین وتصل في الطب استعمال الناردین الحزني الا انها اقل فعالية منه.

٢٨٣١١ - **ناردين العجبل**  
Valeriana montana (S). Valériane de montagne (F).

نوع من الناردین البري المعمّر الجذول. ساقه تملو من ١٠ الى ٥٥ سم. اوراقه الجلمعة اعليجية التصل المنسن الحافة. اوراقه العليا مركبة ريشية. ازهاره حشوكي التجميع، مستطيل الشكل. ازهاره صغيرة القند خضر القنابات وردية البتلات || تنوره يستمر من نيسان الى تموز.

٢٨٣١٢ - **ناردين الحدائق\***، **سنبس**  
الحدائق، **فو**

Valeriana phu, V. discordis (S). Valériane phu, V. des jardins (F). Cretan spikenard, Garden valerian (E). Grosser Baldrian (D). Valeriana maggiore, Fu pontico, Nardo agresta (I).

نوع من الناردین الزراعي المعمّر. جلوره مدادة، اسطوانية، مشعشة. ساقه حالية منتصبة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه السفلى اعليجية كاملة. اوراقه الوسطى والعليا مركبة مشطية. ازهاره حشوكية التجميع، كبيرة القند، يبيضه اللون او وردية، فواحة العرف العطري المستحب. جلوره طيبة لكنها قليلة المواد الفعالة || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

٢٨٣١٣ - **ناردين الصخور**  
Valeriana saxatilis (S). Valériane des rochers (F).

نوع من الناردین البري المعمّر. يعيش بين الصخور ويرغب في الاثرية الكلسية. ساقه نحلة تملو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقه الجلمعة سنائية التصل. اوراقه العليا مركبة ريشية. ازهاره عذوقية التجميع. ازهاره يبيضه اللون || تنوره يستمر من حزيران الى تموز

٢٨٣١٤ - **ناردين الطيب\***، **ناردين هندي\***  
Valeriana spica (S). Valériane des Indes, Nard des Indes, Spicanard (F). Indian valerian, Nardus, Spikanard (D). Indische Narde, Echte Nardenshire (D). Spignardi (I).

نوع من الناردین البري الطبي المعمّر. اعطانه بلاد الهند. جلوره خليقة مغلقة رائحة المادة العطرية. ساقه منتصبة محددة تملو من ٢٥ الى ٦٠ سم. اوراقه مركبة. وريقاتها شبيقة التصل المنسن الحافة. ازهاره حشوكية التجميع، صغيرة القند، فواحة العرف. يستخرج من جلوره دهن عطري يستمر من اجود انواع الطيب.

٢٨٣١٥ - **ناردين المروج\***  
Nardus stricta (S). Nard des prés, Nard bâard (F). Nard, Mat-grass, Wire bent-grass (E). Straffes Bortengrass (D). Nardo, Cervino, Fiano dei monti, Spigo fitto (I). نبات عطري بري معمر من فصيلة النرجليات. ساقه نحلة منتصبة فراءه. اوراقه شبيقة مستطيلة. ازهاره صليبية التجميع، صغيرة القند، وردية اللون || وهو من النباتات المروحية التي تجود عليها الدرع ويطيب.

٢٨٣١٦ - **ناردين بري\***  
Nard sauvage (F). هو الاسارون، املبه.



ناردين الحدائق



ناردين الغلب



ناردين المروج



ناردين غزني



نارج

### ٢٨٣٢٩ - نَارِيَّة الحَمَار الجُفَكَّة هي نداسة النخ، أطلبها .



نارة

### ٢٨٣٣٠ - نَارِيَّة الخَنْطَلَة \* ، هُفَّ الشَّعِير

*Plodia interpunctella* (S). Teigne orientale des dattes (F). Indian meal moth, Meal worm moth (E). Dörrobstmotte (D).

حشرة من الناريات، صغيرة القد . وراشها مقلوبة فيها الابيض والخضلي والاسمر الاسفع المواج . ريقها دقيقة نحيلة تركب الجيوب المخزونة على اختلاف انواعها كالخنطة والشعير والذر والشرقان والسلت ...



نارية البرتقال

### ٢٨٣٣١ - نَارِيَّة الخَرْبُوب \*

*Myelois ceratonia* (S). Pyrale des caroubes, Teigne des caroubes et des figues (F). *Myelois ceratonia* (E).

حشرة ضفيفية من فصيلة الناريات وريقة حشرقيات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها نائرة قوتها لباب قرون الخروب وثمار النخين جسمها نحيل اهيف بطول نحو ٨ م . يسقطها نحو ٢١ م . رأسها معتدل الجرم . عينها صغرتان . زباناها خيطيان . مشرقها معتدل الطول . جوشها ويطها الى الشبهة . وراشها الاماميان الى الشبهة الحديدية يملوها بقيق ابيض وصف من النقط البيض يستبق الحمار الحاريجي . وراشها الخلفيان الى الشبهة السمر . اهدابها الى الشبهة الضفيفية . لها جبل واحد في الحول . تظهر القوارضة في حزيران . تسرح في النهار . تعاطل بعد ظهورها ينسو ثلاثة اسابيع ترزق لكن مباحداً في قرون الخروب . للسرقة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٩ م . جسمها اسطواني الشكل . وأنها شبيه السرة . ثوبها الى البياض اللثني تملوها ماجة وردية . وراجها الى السرة . طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقصي ضمن سلجة تحببها السرة تحت القشور او بين شقوق السماء .



نارية الخنطة



نارية الخروب

### ٢٨٣٣٢ - نَارِيَّة الدَّقِيق \* *Asopia farinalis* (S). *Asopia*, Teigne des farines (F). Meal snout moth (E). Mehlzünsler (D).

فراشة صغيرة القند من فصيلة الناريات ، ثوبها الى الصبغة الصنابية . وراشها مزركشة . زباناها غليظة مستطيلة . تطير من ايار الى تشرين . تألف البيوت والمطابخ والافران . ابيها الحولية ثلاثة . ريقها تلمي دودة الدقيق تعيش على الدقيق والكتب والبار الجافة النخ ...



نارية الدقيق

### ٢٨٣٣٣ - نَارِيَّة الدَّقِيق الغَرَاء هي نداسة النخ ، أطلبها .

### ٢٨٣٣٤ - نَارِيَّة الدَّرَّة \* *Pyrastus nubilalis* (S). *Pyrastus du mals* (F). Corn moth (E). Maiszünsler, Hirszünsler (D).

حشرة من الناريات ، ريقها غليظة الشكل تطول نحو ٢٥ م . ظهورها اسمر اللون يملوها خطوط قزوين . دعها الى السرة الحنطية . تحبل من جانيتها نسطر سمر داكنة يملوها هلب مستطيل . تركب سوق الدرة تنفخوها وتسبب قصها .



نارية الدرة

ويبقى الفص والمضف . نصوب الناريات تستعمل كعلم تختل أنواع الحفصيات وذلك لانها قوية المناحة الجلدية ولا تقش الاثرية المنجدة التي تنفر منها انواع الليمون المزدرة .

### ٢٨٣٣٣ - نَارَنْج مَرْسِيَنِي

Oranger à feuilles de myrte (F).

هو الليمون المرسي ، أطلب .

### ٢٨٣٣٤ - نَارِيَّة \*

*Acanthosicyos horrida* (S). *Nara* (F).

اسما الاثري نارا وهي جنين من فصيلة القرصيات منهاها صاري افريقية الشالية . ساقتها ليفية فراء تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فرومها افقية الانتشاب ، منبسطة ، متدلية ، تطول نحو ٤ امار وهي عادية الورق كثيرة النش . جلورها تنور في الرمال من ٢٠ الى ٤٠ م . انوارها كبيرة القند . ثمارها برتقالية الحبي والقرن ، قشورها خشكرة ، هريفة التمل . لها مسحب الطعم مأكول وهو ادم وأصل وألد من البليخ . بزورها مأكولة طازجة ويطبخة . لها مومنان في العام الواحد . وهي من نباتات الزينة الكثيرة النفع .

### ٢٨٣٣٥ - نَارِيَّات *Pyralidae*, *Pyralididae* (S). *Pyralidae*, *Pyralin moths*, *Snout moths* (E). *Zünsler* (D).

فصيلة حشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة . ابيها ١١١ اجناسها وانوارها زهاء ١٠٠٠٠ . جميعها فراشات ليلية صغيرة القند ، دقيقة الاجسام ، اثرية الاعظام ، واضحة التأثير . وراشها ضيقة ، مهدبة الاطراف ، متداخلة الالوان . ابيها الحولية لا تلياس . ريقاتها ملوكة . غدارها تلحف بأغشية حريرية النراس .

### ٢٨٣٣٦ - نَارِيَّة البَاذَنْجَان

هي ينظفورة الباذنجان ، أطلبها .

### ٢٨٣٣٧ - نَارِيَّة البَرْتَقَال \* *Prays cler* (S).

Teigne des fleurs d'oranger (F).

حشرة من الناريات ، صغيرة القند ، نحيلة الجسم ، قريبة اليه من قوينة الزيتون . يسقطها تراوح من ٩ الى ١٠ م . ريشها الاماميان الى الكعبة الضفيفية المواج تملوها رشفة رمداء لا متسوية الشعر . وراشها الخلفيان الى القردة الزاهية السوية يحفرها اطار من اهدب الكثيف المستعرض . ابيها الحولية تراوح من ٣ الى ٥ . تمتع الاثق مكها على الازهار والبار الغنية ينثف من ريقات دقيقة تراوح طولا عند اكثار نموها ، من ٥ الى ٦ م . ثوبها الى الكعبة الزاهية يملوها ثلاثة خطوط قاطبة واحد يكثف الظهور من الرأس الى الشرج واثنان جانبيان . رأسها الى السرة الباقية . دعها الى السرة الحنطية ريكتر كل حخة ازواج من الجرائز السمر . اصطانها القلم البرتقال الذي يعتد من الهند الى كابل حوض البحر المتوسط . اغزارها قد تكون مؤذية لبا كر عددها ذلك لانها تقضم بيلات الازهار واسديها واقلام مدققات وقد تمكب في ظروف خاصة قشور البار التي تقضم وتسردب لباها . تكلف بالوروتين الذي يقضي عليها .

### ٢٨٣٣٨ - نَارِيَّة الشَّعِير ، نَارِيَّة البَلَح

هي نداسة البسر ، أطلبها .

Salactite ٢٨٣٤٦ - نارية ٥  
نازلة ج نازل : واسب كلسية متحمجرة في سقوف  
الغاور الرطبة .

٢٨٣٤٧ - نازون قصير الزبان ٥

Nasonia brevicornis (S). Nasonie brévicorne (F).  
حشرة ناعمة من فصيلة الطليطيات ورتبة غشائيات الاجنحة  
المضمورة . موطنها بعض مناطق البلاد الحارة المنحرفة نحو  
المتدلة . تتطفل عل ذوات الجناحين اخصها الذباب ||  
جسمها صغير اللقد بطول نحو ١ سم . واربية غلوط .  
رأسها مستعرض الشكل . زباناها صولجانيان صغيران .  
جوشتها ضيق المخرن بعلتها شبه بيضى الشكل . مرتزها  
قصرية مستقيمة . اجنحتها وردية اللون . ثوبها الى الخضار  
الاليس .

Fistula (F). Fistula (E). ٢٨٣٤٨ - ناسور

٢٨٣٤٩ - ناسير هو الصل المصري ، اطلبه .

Diffuseur (F). Diffuser, ٢٨٣٥٠ - ناسيرة  
Mixing cone (E).

اداة الانتشار ، تستعمل في عدة صاعات اخصها صناعة  
السكر ، راجع انتشار .

Lymexylon (S). ٢٨٣٥١ - ناسيرة الخشب ٥  
Lyméxylon, Lime-bois (F).

جنس حشرات غاشية من مقدمات الاجنحة . انواعها  
ثلاثة ، جميعها صغيرة اللقد ، مستطيلة الشكل ، رنية الجسم .  
يرقاتها تنكث باخشاب الاشجار القائمة والمقطوعة فتسودها  
وتتعلبها .

Exsert ٢٨٣٥٢ - ناسير  
نعت تعريفي يوصف به الشي المرتفع عن سطح محيطه .

Assez fort (F). ٢٨٣٥٣ - ناسيط  
نعت تعريفي يطلق على التبرغ التي تتحمل بسورة ناشطة  
مركزها التصنيفي دون المانعة وفوق المعتدلة .

Oryx de Nubie (F). ٢٨٣٥٤ - ناسيط  
هو الارخ السوداني ، اطلبه .

٢٨٣٥٥ - ناسكة  
هي بجرى السيل الى الوادي . ج نواشع .

٢٨٣٥٦ - ناصيات ، وقنبرليات ٥ ، ناصيات

Buprestidae (S). Buprestidae, البقير  
«Richardson (F). Buprestidae, Flatheaded beetles (E).  
Prachtkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة حداثيات الاجنحة . اجناسها وانواعها  
كبيرة العدد . معظمها من حشرات المناطق المعتدلة والحارة .  
اشكالها مانوسة ، الانها عابكة زاوية ، ولوسها قصيرة ،  
قرونها الاستشعارية مركبة من ١١ فاعلة ، اراسها  
خامسة ، احمادها مستطيلة . جميعها تسرح في التار وهي  
سريعة الحركة والطاران . || رقاتها خاضعة تعيش على  
جنود وسوق واوراق مختلف النباتات . كثرتها على بعض  
اعشاب المراعي تسبب الحباط اي النفقة في الايقار التي  
تبتلعها مع الشب .

٢٨٣٥٥ - نارية السمين ٥  
Antigatra catalaunalis (S). Antigastre du  
Sésame (F).

حشرة من الناريات . رقتها صغيرة اللقد بطول نحو ١٢ سم .  
لونها الى الخضرة الرمداء المواجه تعلوها رقعة سوداء || تركب  
السم من ساقه الى ازهاره وماره .

٢٨٣٦٦ - نارية الشمع الصغيرة  
Alveicole, Teigne de la cire (F).

هي صمل النحل الصغير ، اطلبه .

٢٨٣٣٧ - نارية الشمع الكبيرة  
Gallérie de la cire (F). اطلبه .

Pionea forticalis (S). نارية الصليبيات  
Pyrale des crucifères (F).

حشرة من الناريات ، رقتها صغيرة ، دقيقة ، حمراء اللون ،  
سريعة الحركة . تركب اوراق الصليبيات على صفعاتها  
السطل .

Mecyna gilvata (S). ٢٨٣٣٩ - نارية الصبان ٥  
Pyrale des cannes à sucre (F).

حشرة من الباربات متوسطة اللقد غبراء اللون مزركشة  
الرواشن . رقتها بطول نحو ٢٢ سم . لونها الى الحمرة تحمل  
على ظهرها وجانبها خمسة غلوط ارجوانية || تركب  
الصبان فتتخر الساق وتذهب فيه صمدا حتى القصة .  
وتركب اللزده فتضل فيها ذات التي وتركب الارز فتتلف  
السوق والسنايل .

٢٨٣٤٠ - نارية اللوبياء ٥  
Etiella zinckenella (S). Etielle du haricot, Pyrale  
des haricots (F). Lima bean pod borer (E).

حشرة من الناريات ، رقتها بطول نحو ٢٥ سم . وهي  
ارجوانية الظهر غضراء المدب || تركب ازهار ومار  
وصوب لللوبياء تتطفلها .

Myelos cribrella (S). ٢٨٣٤١ - نارية الوزيم  
Myelos des fleurs (F).

حشرة من الناريات ، رقتها دقيقة نحيلة حنطية اللون  
تعيش داخل وزم وسوق نباتات الفصيلة المركبة .

٢٨٣٤٢ - نارية الياسمين ٥  
Glyphodes unionalis (S). Pyrale du jasmin (F).

حشرة من الناريات ، حنطية اللون سوداء الزواكش . رقتها  
صغيرة اللقد مستطيلة الجسم ، غضراء اللون ، حمراء المواجه .  
تركب برامع وازهار الياسمين وسنايل التزينن .

٢٨٣٤٣ - نارية البخضور ٥  
Pachyzancla licarescalis (S). Pyrale des gazons (F).

حشرة من الناريات ، رقتها مستطيلة بطول نحو ٢٥ سم .  
لونها الى السمرة يطلوها نقطيت اسود منتظم الترتيب وحيد  
الهيئة المستطيلة || تركب مختلف اوراق الاعشاب الفتية  
اخصها النجيلية فتتلفها .

Pyrausta surata (S). ٢٨٣٤٤ - نارية ذهبية  
Pyrale dorée (F).

حشرة من الناريات ، رواشها ذهبية اللون . رقتها صغيرة  
اللقد غبراء اللون . تركب برامع وازهار النباتات السطرية  
اخصها الننع .

Pyrale grise (F). ٢٨٣٤٥ - نارية شهباء  
فراشة مؤذية تسمى طينة الشنان ، اطلها .



نارية السمين



نارية الصبان



نارية اللوبياء



نارية الياسمين



نارية البخضور



نازون قصير الزبان



نارية الخشب

Maille (F). Stitch (E). **نَاطِيْبَة** ، **نَاطِيْبَة** ٢٨٣٦٨ -  
ج . ناطيب . والنَّاطِب هي غروق المصفاة .

### ٢٨٣٦٩ - نَاطِيْب

الناطِب نَجَمٌ نَرٌّ مِنْ كَوْكَبَةِ بَرَجِ الثَّوْرِ وَيَسْمَى قَرْنُ الثَّوْرِ الشَّامِلِ .

Eprouvette graduée (F). **نَاطِل** ٢٨٣٧٠ -  
عُجَارٌ مَدْرَجٌ تَكَلَّلَ بِهِ السَّوَالِثُ .  
Test-tube (E).

Aiguardier (F). **نَاطُورُ الْمَاءِ** ٢٨٣٧١ -  
Freshwater guardian (E).  
هو النَّوَارِي الَّذِي يَحْفَظُ عِلَاءَ الْمَاءِ الرَّيِّ وَيُوقِظُهُ عَلَى مَسْتَعْبِقِهَا بِالْقَلْبِ .

Tarbophis **نَاطِر** \* ، **وَقِيب** ٢٨٣٧٢ -  
جنس حيات سامّة من فصيلة الخشيشات ، أنواعه عديدة .  
أصلها البلاد الحارة الإفريقية والآسيوية . شكلها  
كالخنافس ، مستطيلة الجسم ، دقيقة الفتق ، سريعة الحركة .  
أثوابها إلى السمرة التبرأ المروثة .

### ٢٨٣٧٣ - نَاطِرٌ مَآكِرٌ ، وَقِيبٌ خَدَّاعٌ

Tarbophis fallax (S).  
Tarbophis trompeur, Serpent chat (F).

حية بيوض من البوغات وفصيلة الخشيشات غليظيات  
الاعنابد || جسمها متدلل الخناقة يطول نحو ١٠٠ سم .  
ثوبها إلى السمرة الخفيفة المواجه لمولها يتبعج ثلاثي الألوان  
لاتناسي التزاوج ، يكثر فيه الرمادي والجويرو والأصفر ،  
يمتد من الرأس إلى الذنب . رأسها بيض الثورون . عنقها  
متوسطة الطول . عينها كبرتان . عدد أسنانها ٥٥ منها  
٣٠ في الفك الاسفل ٢٤ في الفك الاعلى من أصلها  
أربعة عناق عديدة ، ثابتة ، شلغية الارتكاز تبغ السم  
في كل عضو تصبى عندما يرق حتى مسنوها الداخلي ||  
تألف البراري والأطلال . قوتها كل ما دب وطار . تنقبض  
على فريستها انتفضاض السنور على المفازة || تسرح في  
النهار وفي أوائل الليل . بيابها الشوي يستمر نحو خمسة  
أشهر . تبلغ كامل نموها بمر ١٥ سنة وتعيش نحو  
١٢٠ سنة || الأنثى تسافد بمر خمس سنوات وتبيض  
من ١٦ إلى ٣٢ بيضة مجموعة في سبحتين تطهرها في الرمل ||  
تعتبر من الثعابين المؤذية .

Pailonnier (F). Swing-bar, Pole (E). **نَاطِم** ٢٨٣٧٤ -  
هو المزان ، قطعة من خشب أو من حديد مركها في  
مقدمة آلة الحراث أو العربة ، تعلق بها السيور لجرح .

Culticvore (F). Culicivorous (E). **نَاعِير** ٢٨٣٧٥ -  
الناعر من الطير والخيران من كان قوته اللحم وما أشبه .

Aphrodisiaque (F). **نَاعِظ** ٢٨٣٧٦ -  
Aphrodisiac (E).

### ٢٨٣٧٧ - نَاعِقَان

الناعقان كوكبان من كواكب الجوزاء أي الجبار  
يتقدمان الرجل .

٢٨٣٧٨ - **نَاعِمَة** هي القوية ، اطلبا .

Bupreste (F). Buprestis (E). **نَاصِعَة** ٢٨٣٥٧ -  
هي الرقبتين ، اطلبا .

Bupreste du chêne (F). **نَاصِعَةُ الْبَلُوط** ٢٨٣٥٨ -  
اطلب رقتين السنديان .

٢٨٣٥٩ - **نَاصِعَةُ الْخَفُوح** \* ، **رَقَتْنِبُوتُ الْخَفُوح** ٥  
Ptosima undecimmaculata (S). Bupreste du  
prunier (F).  
حشرة من الناصعات ، طولها نحو ١٠ م . لوها إلى السواد  
الاسفع ، محدماها رباعية الخطوط المنعرجة النارية اللون .  
رقتها شديدة الأذى تسردب سوق معظم أشجار الفصيلة  
الوردية اغصها الخوخ والشمش .

٢٨٣٦٠ - **نَاصِعَةُ الدَّرَّالَيْنِ السَّوْدَاءِ** \* ، **رَقَتْنِبُوتُ**  
**الدَّرَّالَيْنِ** ٥  
Capnodis tenebrionis (S).  
Bupreste noir du pêcheur (F). Pesch capnodis (E).  
Capnodis tenebrionis (D).  
حشرة من الناصعات ، طولها نحو ١٨ م . لوها إلى السواد  
الفضي تعلو ماجة غبراء . رقتها تسردب سوق القوزيات  
اغصها الدراق تفسدها وتؤرق بها أشد الأذى .

Bupreste des pins (F). **نَاصِعَةُ الصَّنَوْبَرِ** ٢٨٣٦١ -  
اطلب رقتين الصنوبر .

٢٨٣٦٢ - **نَاصِعَةُ الْوَرْدِ** \* ، **رَقَتْنِبُوتُ الْوَرْدِ** ٥  
Coraeus rubi (S). Bupreste du rosier (F).  
حشرة من الناصعات ، طولها نحو ١٠ م . لوها إلى السواد  
الازرق المواجه . محدماها بجععتان بخطوط غبراء منعرجة .  
رقتها تنخر سوق الورد واغصانه .

Bupreste vert (F). **نَاصِعَةُ خَضِرَاءَ** ٢٨٣٦٣ -  
اطلب رقتين أخضر .

Spondylodactylus (S). **نَاصُورَة** ٢٨٣٦٤ -  
جنس فطور مجهرية من الريدانيات وفصيلة الطحليات ،  
جربه الكثيضية خطية ، ضمية التجميع . كئانه هليية  
أشكال ، مستندقة الاطراف ، ومنها حلزونية . || أنواعه  
قليلة أعرفها ناصورة البطاطا .

٢٨٣٦٥ - **نَاصُورَةُ الْبَطَاطَا** ٥ ، **جَرَبُ فِصِي** ٥  
Spondylodactylus atrovirens (S). Gale argentée de  
la pomme de terre (F).  
فطر مجهرية يتطفل على البطاطا في طور نموها الأخير ،  
قرب ادراك الدرن . || مظهره الخارجي يقع مستديرة ،  
غبراء اللون ، فضية المواجه ، تتخللها بنور ثؤليلية صغرة  
مصدوقة الثلاث الاسود الشق ، تركب الدرنه تصطب  
البشرة مع قليل من الياق || يكافح بتطهير البذار  
قبل الزرع ويؤكل بنقع الشفط مدة ٢٠ دقيقة بأحدى  
أطلاح الزئبق المذلول ٥ د . %

Toupet (F). Foretop (E). **نَاصِيَة** ٢٨٣٦٦ -  
عصلة الشعر المتدلية على حبة الفرس .

Trop mûr (F). Overmature (E). **نَاضِج** ٢٨٣٦٧ -  
نمت تمرين توصف به جميع المحاصيل الزراعية بعد اجتيازها  
دور الإنباع ودخلها في دور النضج .



ناصة الخوخ



ناصة الدراق السواد



ناصة الورد



ناطر

Vertex

٢٨٣٩١ - نَاعُورٌ

الناعور هو قرة الرأس في تشريح الحشرات .

Chamelle (F). She-camel (E).

٢٨٣٩٢ - نَاعُورٌ

الناقة هي الاثني من الابل . ج نوق . كنيها ام بغ وام حائل وام حوار وام السبق وام مسعود || يحلبها يستقيم سنة واملاج حوارها يستمر سنة .

Dugong (F).

٢٨٣٩٣ - نَاعُورٌ

هي الاطوم ، راجعه .

Acidiphile (F).

٢٨٣٩٤ - نَاعُورٌ

نمت تعريفي توصف به النباتات التي ترطب في الازربة الحامضية التي يراوح دالها من ٦٥ الى ١٥٠

Afférent (F).

٢٨٣٩٥ - نَاعُورٌ

Afferent (E).

مُرْسِل

Contage (F).

٢٨٣٩٦ - نَاعُورٌ

مادة تنقل ميكروب الرصم الممدي .

Conductibilité (F).

٢٨٣٩٧ - نَاعُورٌ

هي الايسالية ، اطلها .

Pic (F).

٢٨٣٩٨ - نَاعُورٌ

هي النكار ، اطلها .

Regressif (F).

٢٨٣٩٩ - نَاعُورٌ

الناقص من ارتد الى ما كان عليه . راجع اشم .

٢٨٤٠٠ - نَاعُورٌ

Atropis

حشرة من فصيلة النامسيات، طولها نحو ٢ م. قوتها الى التبرق. اصطناعها العالم. قوتها المواد السيلوزية، تفرس اوراق الكتب فتعطبها .

Atropidae (S).

٢٨٤٠١ - نَاعُورٌ

Atropidés (F). Atropidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة القهلبات، انواعها عديدة، جميعها صغيرة القد، طول اجسامها يراوح من ١ الى ٣ م. اقربها الى الصغرة البراء . قوتها المواد الصوية والشموية . نوع منها يلدس ناس الكتب يمتري اوراق الكتب والقرطاس فينخرها ويعطبها .

Formicivore (F).

٢٨٤٠٢ - نَاعُورٌ

Formicivorous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان او طائر قوته النمل .

Myrmecophagidae (S).

٢٨٤٠٣ - نَاعُورٌ

Myrmecophagidae (F). Myrmecophagidae (E).

فصيلة حيوانات من رتبة الدرد الحشرات . قوتها النمل . راجع آكلات النمل .

Culcín (F).

٢٨٤٠٤ - نَاعُورٌ

هو البومض ، اطلها .

Formicide

٢٨٤٠٥ - نَاعُورٌ

نمت تعريفي يطلق على جميع الادوية الموضوعة للقضاء على النمل .

Roue hydraulique (F). نَاعُورٌ (F). Water-wheel (E).

دولاب مائي مركب من قواديس تحركه مرصة جري الماء فيفرغ ما غرقته القواديس في جدول يأخذ الماء الى حيث الحاجة .

٢٨٣٨٠ - نَاعُورٌ

Eolienne (F). Aeolian (E).

آلة لرفع الماء تحركها الريح . وتدعى ايضا دولاب هوا .

Galliardie (F).

٢٨٣٨١ - نَاعُورٌ

هي النيرديا ، اطلها .

Noria (F).

٢٨٣٨٢ - نَاعُورٌ

Noria, Chain-pump (E).

آلة رافعة الماء تدور بوسطة الدواب او المحركات .

Nagana

٢٨٣٨٣ - نَاعُورٌ

وصم يصيب الحيوانات الداجنة سببه شقبة تغلقها الشدة اللازمة .

Naja indien (F).

٢٨٣٨٤ - نَاعُورٌ

هو الصل الهندي ويدعى ايضا افعى هندية وناسر هندي .

Vessie du musc (F).

٢٨٣٨٥ - نَاعُورٌ

Musk-bladder (E).

جراب المسك في الحيوانات التي تفرز هذه المادة .

٢٨٣٨٦ - نَاعُورٌ

Agrilus cinctus (S). Agrile des genêts, Bupreste vert (F).

حشرة من الناصمات، طولها نحو ٨ م. لونها الى الخضار الاسقم المواج . تعيش على ريشق ازهار الفصيلة القرنية . تمتع مكها على جذوع الزوال فينتف من رقات غاضلة تنفخى على التقصيان والافتان . || اما تسميتها بنافخة البقر فذلك لانها عندما تكثر في بطون البقر من جراء ابتلاعها مع العشب ، تسبب الحباط وهو نفخة في الخوئ قد تكون مؤذية .

٢٨٣٨٧ - نَاعُورٌ

Exécutoire (F). Executory (E).

ما كان يحصل الصيغة التنفيذية من احكام او اوامر او مفرد .

Céduque, Caducifolié (F).

٢٨٣٨٨ - نَاعُورٌ

Deciduous (E).

اسم حال يوصف به النبات الذي ينفض ورقه ككل سنة .

٢٨٣٨٩ - نَاعُورٌ

Vésicans (F). Vesicants (E).

فئة حشرات من ممدات الاجنحة تشتمل النواظف والذرايع والورقيات .

Mylabris (S). Mylabre (F).

جنس حشرات من النافطات الممدات الاجنحة . انواعها زهاء ٣٠٠ تعيش في المناطق الحارة والمعتدلة . جميعها من الحشرات الثنائية ، تمتع مكها في مغارز الجراد واشباهه فينتف من رقات همة تلهم السوء .



نافقة البقر



ناس الكتب

٢٨٤١٢ - **تَبَات** ، **تَبَّت** (F). **Végétal** (F). **Plant** (E).  
كلمة شاملة تعني العشب والنباتية والنباتية . الواحدة نبتة  
والجمع نباتات وأنبئة || والنبات هو إحدى المملكتين  
اللتين تنقسم اليها الكائنات الحية وهما الحيوان والنبات .  
ويقسم النبات إلى وسيدات الخلية وهي كائنات دنيا  
ترتكز على خلية واحدة تقوم بجميع الوظائف الحياتية .  
والى عديدات الخلايا وهي كائنات راقية تتكون من جنود  
وسوق وأوراق خضر وأزهار وثمار وبنور .

٢٨٤١٣ - **تَبَاتُ الْفَلْح** (F). **Plante salicole** (F).  
**Salt-producing plant** (E).  
كل نبات يعيش في الأترية المالحة .

٢٨٤١٤ - **تَبَاتُ الْفَاك** هو القرامس الكرسي ، اطليه .

٢٨٤١٥ - **تَبَاتُ بَرِّي** (F). **Plant** (E).  
**Uncultivated plant** (E).  
كل نبات تنبت الطبيعة في الاراضي غير المزروعة .

٢٨٤١٦ - **تَبَاتُ جَبِّي** ، **تَبَاتُ جَرْدِي** (F). **Alpine plant** (E).  
كل نبات يعيش طويلاً في الجبال العالية .

٢٨٤١٧ - **تَبَاتُ رُحَافِي** ، **تَبَاتُ رَحِيْقِي** ، **تَبَاتُ مِعْرِي** (F). **Plant** (E).  
**nectarifère** (F). **Melliferous plant** (E).  
النبات الرحافي كل نبات يفرز الرحيق من أزهاره أو  
ينضج الحنجر من مسام اوراقه فيجبره النحل ويحوه الى  
عسل || اشهر النباتات الرحافية ما جاء في الجملد التتابع .

٢٨٤١٦ - **تَابِكَة** (F). **Drageon, jet** (F).  
**Sucker, Shoot** (E).  
شُطْ أو قصب قبي ريان نشأ على جذع أو جذر النبات.  
٢٨٤١٧ - **تَاهَة** (F). **To vegetate** (E).  
ناه النبات نهما وارتفع .

٢٨٤١٨ - **تَاهِر** (F). **White grapes** (E). **Raisin blanc** (F).  
نمت تمرني يطلق على كل عنب ابيض من اي ضرب  
كان .

٢٨٤١٩ - **تَاهِيْس** (F). **Sommet de l'omoplate** (F).  
**Extremity of shoulder-blade** (E).  
رأس المنكب في الحيوان وهما لافضان . ج نواضس .

٢٨٤٢٠ - **تَاهِم** (F). **Polyphage** (F). **Polyphagous** (E).  
نمت توصف به كل حشرة أكولة تنلد بمواد شديدة  
الاختلاف .

٢٨٤٢١ - **تَاهُور** (S). **Ovibus nahoor** (S).  
**Mouflon bharal** (F). **Bharal** (E).  
نوع من الاراري موطنه جبال التيب وعضاهها . يألف  
المراعي المكشوفة البعيدة الاطراف . وهو ربع الجنة ،  
كبير القرن غليظه عند الذكور ، دقيقه عند الاناث .  
ثوبه الى الرية الشهداء يمين عند ثيغ الظهر ويبيض عند  
البطن . اجله رايوح من ٧ الى ١٠ انفار يقوده نيزب  
ماتع .

## جدول النباتات الرحافية

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
بَرَزَرَة ، بَرَبَرِس ، عُوْدُ الرِنَج	Barberry, Pipperidge	Berberis, Epine vinette
بَجَاص ، كَمَرِي	Pear tree	Poirier
أَعْدَرِيَة	Evening primrose	Aenothère, Enothère
أَحْيُون	Viper's bugloss	Vipérine
أَذْرِيُون المَاء ، سُرْعُوس	Water butter-cup	Populage, Calthe
أَرَلِيَة	Angelica tree	Angélique sauvage
أَرْطَلِيُون	Burdock	Bardane
أَرْسِيْمُون	Erysimum	Erysimon, Vêlar
أَسْطَر ، نَجِيَّة	Starwort	Aster
أَقَابِي ، دُنْدُرَان	Tufted vetch	Vesce craque
أَيْبَغُطَس	Epipactis	Epipactis, Héléborine
أَكُونِيَة ، يَشَر ، أَتَلَه	Aconite	Aconit
أَكُونِيَة ، مُشَلَلَة بَاكَايَة	Japan medlar	Néflier du Japon, Bibacrer
أَكِيلَاجَا ، كُولَمِين	Columbine	Ancolie, Colombine
أَبْرُوس ، كُرُوبَلَة	Coronilla	Coronille
أَنْشُورَة	Bugloss	Buglosse
بَاقِيَة ، يَغَة	Common vetch, Lints	Vesce, Pasquier
بُتُولَا ، سُدَر	Birch	Bouleau

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
بَرِيلَا ، نَرَلَة	Common pea	Petit pois, Pois vert
بَسَلَة بَرِيَة	Wild pea	Pois sauvage
بَسَل	Onion	Oignon
بَسْبَاط ، حَنَحَر ، شَبَط المُول	Knot-grass	Renouée des oiseaux
بَطِيخ ، خَسِي	Water-melon	Pastèque
بَقَس ، شَمَشَاد	Box tree	Buis
بُنْدُق ، جُنُور	Hazel-tree, Filbert	Noisetier, Coudrier
بُورِقِيصَا ، دُرْدَار ، غُرْغَاء	Elm-tree	Orme
بُرْمُس	Lupine	Lupin
بُرْمَحَان ، حَشِيصَة السَّحَل	Bee-balm	Mélisse
بُرْمَشَا ، بُرْمَشَان	Blue-bottle, Bachelor button	Bleuet, Aubroin
بُفَاح	Apple-tree	Pommier
بُتُوب	Fir-tree, Silver fir	Sapin
بُرْمَحِير ، رُمَّة ، بُهَان	Rocket	Roquette
بُرْمَحِير بُرِي ، أَبُهَان	Wild rocket	Roquette sauvage
بُجَلَان	Vetch	Gesse
بُجَل ، حَشِيصَة اللَّيْنَار	Hop, Bine	Houblon
بُجُولِيَانَا	Gilliflower	Julienne
بُجِيرَابِيم ، غُرْبُوق	Geranium, Shepherd's needle	Geranium, Gêranier
بُحُوف المَاء	Buck's horn	Sénébière
بُحَشِيصَة الرِّقَّة	Lung-wort	Pulmonaire
بُحَشِيصَة السَّعَال ، دُوسَة الحِجَار ، قُرْقَارَة	Cough-wort	Tussilage
بُحَشِيصَة المَلَاك	Angelica	Angélique
بُحَا الْبَان ، أَكْلِيل الجَبَل ، نَدَى البَحْر	Common rosemary, Oldman	Romarin, Encensier
بُحَضَض ، غُرْمَة ، أَطَد	Boxthorn	Lycet
بُحَلَاب	Hare's-ear	Buplèvre
بُحِجِم	Borage	Bourrache
بُحِصَص	Chuck-pea, Gram	Cicérole, Pois chiche
بُحِصَل ، قَاوُوبِيَاء	Kidney-bean	Haricot
بُحَقُوق	Sweet-clover	Méhilot
بُحُور (جميع الأنواع)	Poplar	Peuplier
بُحِي المَاء ، حِيرَان ، وَدَنَة	Orpine, Stonecrop.	Orpin, Sedum
بُحَايَ ، بُحَايَة	Mallow	Mauve
بُحَرَن	Hellebore	Hellébore, Eliébore
بُحَرْدَل	Mustard	Moutarde, Sênévè
بُحَرَام	Reseda	Réséda
بُحَرَامِي ، لَابُونَة	Lavander	Lavande
بُحَلْبَج ، شَمَطَلَف	Heath, Heather	Bruyère
بُحُلُود ، عَوِير	Jupiter's beard	Joubarbe
بُحَاذِيرِيَّة	Figwort	Scrofulaire
بُحُوج	Prune tree, Plum tree	Prunier
بُحِيَار ، قَنَد	Cucumber	Concombre
بُحِيرِي ، بُتُور	Stock, Gilliflower	Giroflée
بُحَاب ، بُعَم السَّحَل	Pudding grass	Pouliot
بُحِج	Scorzonera	Scorzonère

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
دَحْرَج	Spurred vetch	Vesce éperonnée
دُرَّالين ، دُرَّاق ، دُرْمِك	Peach tree	Pêcher
دَقَّة حُود الدَّار	Spurge laurel, Dwarf bay	Daphné lauréole
دِيحْيَان ، زَهْر الكَثَّابِين ، مُعْيِيَّة	Finger flower	Digitale, Gautelet
رَأْس دُبْن ، طَبَّاق ، طَبُون	Rock flea-bane	Inule conyze
زَيْتَان ، بَجَل المَصْفُور	Bird's-foot	Ornithope
زَعْرَاق	Common flea-bane	Pulicaire
يَرْعِي الحَنَام	Vervain	Verveine
رُوبِيَّة سَنِيَّة ، سَطَّ كَاذِب	Locust acacia, False acacia	Robinier faux-acacia
زَيَّاد ، زَيَّابِي ، سَحَاء	Starwort	Palléus, Petit mugue
زُفْرِين	Alaternus	Alaterne
زُفَّا ، جِسْنِي ، حَسَل ، زُفُون	Common Hyssop	Husope officinale
	Linden	Tilleul
بَيْت الحَسْن ، بِلَادُون	Dwale, Banewort	Atrope, Belladone
سَرْتَن ، (لِسَان الضُّفُور)	Hony wort	Cérinthe, Mélinet
سُرُ	Cypress tree	Cyprès
سَطَّاقِس ، سَطَّاقِس	Stachys	Epiaire
سَقَرَجَل	Quince tree	Cognassier
سَقَدَر لَاصِع	Knee holly	Fragon piquant
سَلْسِيل	Salsify	Salsifis
سَمَّارَة ، تَوْدُورِيح ، فِجَل الجِمَال	Hedge mustard	Sisymbre
سَمِيم	Common ling	Callune vulgaire
سِيدِيَّان	Oak tree	Chêne
سَطَّ	Acacia	Acacia
سَيَّسَاوُون	Skirret	Chervis
سَيَّسَم	Snapdragon	Muflier
سَيْت ، سَيْت	Anet, Dill-seed	Aneth, Fenouil bâtard
سِكَاغِي ، أَفْسُون	Scotch thistle	Onoporde
سَمَار ، سَمَرَة ، سَمَار	Fennel	Fenouil
سَمَام	Melon	Melon
سِنْدَاب	Eryngo	Panicaud, Erynge
سُرْك ، سَهْيَاء	Thistle	Chardon
سُرْك الجِمَال	Globe thistle	Cardère
سُونِيز ، شِينِيز	Black cumin	Nigelle
سَرِيْمَة الجَدَوِي	Caprifoly	Chèvrefeuille
سَعْتَر ، سَعْتَر (جميع الأنواع)	Thyme & Marjoram	Thym et Origan
سَعْتَسَاف ، سَعْتَر	Willow	Saule
سُفْرَاء	Sophora	Sophora
سُفْلَاب	Silk cotton	Asclépiade
سُؤْبَر	Pine-tree	Pin
سُفَّة	Echinops	Echinopse
سَمِيرَان ، نَعْنَعِ الِاه	Water mint	Menthe aquatique
سَرْمَقُون ، هِنْدَب	Blow-ball	Pissenlit officinal
طَوْنُون	Germander	Germandrée
طَبَّاق ، كُرَات البَر	Crow garlic	Porette



اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
طَيم ، بَهْدِيَّة الدِّينِي	Holly, Christmas	Houx commun
طَفْرَاء ، نَمْنَع بَرِّي	Wild mint	Menthe sauvage
عَالِق	Delphinium	Dauphinelle
عَرَاوَة	Spiraea	Spirée
عَرَن ، سَمُون ، سَلَّة زِدَانِيَّة	Holy clover	Sainfoin, Esparcette
عَسَلِيَّة ، زَهْرَةُ السَّل	Honey flower	Mélianthe
عَشَقَّة	Ivy	Lierre
عَصَا الرّاعي ، قَرْدَب	Persicaria	Persicaire
عِنَاز	Lily grass	Butome
عُوج	Bramble	Ronce
عُجْبَرَاء ، صَرْبَة	Service tree	Sorbier
عُقْث	Eupatorium	Eupatoire
فَاشِرَا ، فَاثِر ، فُس	Bryony	Bryone
فَرَاثِيُون ، بَاذَلُورْد	Horehound	Marrube
فَرِيُون ، يَتَوَع ، عُنْجَد	Spurge	Euphorbe
فَصَّة ، فُصْفَصَة ، قَصَب	Lucern	Luzerne
فَضِيَّة مَنِيْرِيَّة	Silver tree	Protée mellifère
فُودَنج	Wild marjoram	Fausse marjolaine
فُول ، بَاقْلِي ، جُمِي	Broad bean	Fève
فِينَتَمَة ، فُونُومَا	Rampion	Raiponce
فِيرُونِيكَا	Veronica	Veronique
قَتَا ، فَصَّة بَرِّيَّة	Sea hedgehog medick	Lazerne sauvage
قَرطَم ، إِسْرِيض ، بَهْرَم ، مَرْمِي	Safflower	Carthame
قَرَع	Gourd	Courge
قَرَاوِس ، قَرَايَا	Cornel-tree	Cornouiller
قُشْرَان	Horse-thistle	Cirse
قَصِيْب الدَّهَب ، عَصَا الدَّهَب	Golden-rod	Solidage, Verge d'or
قَلَاع	Self-heal	Brunelle
قَسِيْط ، قَرْتَبِيْط	Cauliflower	Chou-fleur
قَنْدَل	Horse-chestnut-tree	Marronnier
قَطْرِيُون ، قَطَارِيُون	Centaury	Centaurée
قَنْفُول	Canavalia	Canavale
قُوْبَسَة ، قُوْبَسَة ، نَاعِيَّة	Sage	Sauge
قَيْب ، اُسْتَنْدَان	Maple-tree	Erable
كَأَوْشِير ، جَرْد بَرِّي	Opopanax	Opopanax
كَرَاث مَعْرُوف	Leek	Poireau
كَرَر	Cherry tree	Cerisier
كَرْسَنَة	Ers, Ervil	Ers, Ervillier
كَرْلِيْن	Carlina	Carline
كَرْب	Kohl-rabi	Chou-rave
كَحْمَتَة ، قَسَلَّة ، شَاة بَلُوط	Chestnut-tree	Châtaignier
كَشِيْش	Currant-bush	Groseillier
كَشِي	Bitter vetch	Orobe
كَحْمَتَة مَنَادَة ، كِلَاب اَرُضِي	Ground ivy	Gléchoime hédéracé
كَنْطُس	Gypsophila	Gypsophile

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
كُوسَى	Vegetable marrow	Courgette
كُوسَى	Pibughman's spikenard	Conyza
لَارِيْس ، مَرْ	Common larch	Larix
لُرْآن	Broom	Cytise
لِسَانُ الْكَلْبِ ، آذَانُ الْاَرَبِ	Gipsy flower	Cynoglosse
لِفَتْ	Rape	Rave, Navet
لُثَامٌ ، نَعْنَعُ اخْضَر	Spearmint	Menthe verte
لُؤْيَاهُ	Black eyed delichos	Dolique
لُؤْزُ	Almond tree	Amandier
لُؤْلُؤُسُ ، لُؤْلُؤُس	Lotus	Lotier
لُيُون (جميع الانواع)	Citrus	Citrus
لِيْنَارِيَّة ، حَاجِب	Linaria	Linair
مَازَرُون ، اَتَم ، دَقَّة سَاة	Mezereon	Daphné mézérèton
مَحَلْب	Parfumed cherry	Mahaleb
مَرْن ، لِسَانُ الْعُصْفُور	Ash-tree	Frêne
مَرْغَابِيلَا ، رِجْمُ الْاِبِل	Echinops	Echinope
مُشَطُ الرَّاعِي ، شَرَكُ الْمَرَاة	Teazle	Cardère à foulon
مِشْمُوش	Apricot tree	Abricotier
مُشْمَلَّة	Medlar tree	Néflier, Merlier
مِشْكِيَّة	Melick	Mélique
مُطْلُوف ، كُرْتَب ، لَحْتَة	Cabbage	Chou
نَارُون ، سِيل	Valerian	Valériane
نُون	Alder	Nerprun
نَد ، حَبِيرَاه	Willow-herb	Epilobe
نَدَاف	Savory	Sarriette
نَعْنَع	Mint	Menthe
نَعْنَع الْبَر	Cat-mint	Calament
نَقْل	Clover	Trèfle
نَهْدَل	Common mistletoe	Gui
هَرْنِيَّة	Heracleum, Parsnip	Berce
هَلِيُون	Asparagus	Asperge
حَنْبَاء	Endive	Chicorée endive
وَبِيرَة	Phacelia	Phacélie
وَزَال ، جُنْدَح ، جُونُك	Furze	Ajone
وَسْمَةُ الصَّافِيْن	Woad	Guède, Pastel
وَسْمَةُ حَمْرَاء	Red spur-valerian	Centranthe rouge
يَاسَم ، فُوق ، وَتَاقِيَة	Privet, Privy	Troène, Prune
يَعْقِيد ، يَنْصِيض	Lion's tooth	Léontodon, Dent de lion
يَطْبِيْن اَقْرَع ، قَاوُون المِير	Squash	Pâtisson

٢٨٤١٨ - نَبَاتَاتٌ طَبِيَّةٌ Plante médicinale (F).  
 معظمها مشهور وبعضها لا يزال في دور التعميل  
 Medicinal plant (E).  
 النباتات الطبية كل نبات حوى بعض العناصر الفعالة  
 الاختباري || اشهر هذه النباتات ما جاء في الجدول التالي.

## جدول النباتات الطبية

النبات	التحليل
أبست، شبح رومي أبست بحري أخيليا أم آلف ورقة أدونيس ربيعي، عين الثور آذيرين عذري إرثد، سرساد أرضي شوكي، خرشوف أرطاة، ياسين اصفر أرطاسية جبليّة أرقطيون أرنكا جبليّة، زهرة العطاس أروم، تريباق ابيض أروم ثلاثي الورق أسارون، ناردين بري اشنة بحريّة اطريل نقل أقنى متوقوفة أقمقون حنين إكليل الجبل، حصا البان	عشب معمرّ فرعاء. اوراقها مركّبة ريشية. ازهارها عطريّة صفراء اللون عشب معمرّ مفصّلة الساق. اوراقها مفصّصة. ازهارها قليلة العرف باهتة الصفار عشب معمرّ فرعاء. اوراقها مركّبة مشطية. ازهارها الى البياض الوردية عشب معمرّ فرعاء. جذرها عشقولي. ازهارها فردية كبيرة صفراء اللون عشب حولية فرعاء. اوراقها ريشيّة عمليّة النصال. ازهارها صغيرة جنية معمرّة فرعاء. اوراقها كئيّة النصال. ازهارها عطريّة زرقاء. ثمارها صغيرة كاللؤلؤ عشب معمرّ، اوراقها كبيرة مفصّصة ومشرّمة، ازهارها رئيسية طرفيّة جنية معمرّة متسلّقة. اوراقها عروية سنانية. ازهارها بويّة عطرة صفراء عشب معمرّ غشوشية الساق. اوراقها سنانية. ازهارها رئيسية خضراء بجلة حولية. اوراقها كبيرة قلبية. ازهارها ارجوانيّة. تنبّز بيننا الغليظ عشب معمرّة مستغلطة الجذر. اوراقها سنانية. رؤسائها الزهرية الى الصفار البرتقالي عشب دوفصية. اوراقها قرصية الانتشاب سهميّة كبيرة. غصّنها صفراء المواج عشب دوفصية. اوراقها قرصية الانتشاب ثلاثيّة الوريقات. غصّنها موضحة عشب جنموريّة معمرّة. اوراقها لحميّة كلويّة الشكل. ازهارها صغيرة ارجوانيّة ضمة من الخيوط والحزم النفوسية سمراء اللون زيتيّة المواج عشب جنموريّة معمرّة. اوراقها قرصية الانتشاب مركّبة. ازهارها صغيرة بيضاء جنية معمرّة فرعاء غليظة الاموثة. اوراقها مركّبة. ازهارها الى الخضار الباهت عشب حوليّة. ساقها ضعيفة. اوراقها صغيرة مشرّمة. رؤسائها الزهرية صفراء جنية معمرّة فرعاء. اوراقها صغيرة لينة. ازهارها زرقاء اللون
أتاروف، انجبار أثورة عذريّة أثيون أثيون نحسي أوكالبتوس عريض الورق إيوجنة بايون عطري بايون عطري باروسه غوليّنا بياط زراعي، دباء الهند بتولا يبيضاء بريريس، حود الريح برقوق شاذك برنق عصبلي بزرطونه، عنب البراغيث بطباط، شبط الفول بطونيقا طبيّة بقدونس بفس، شمشاد اخضر بقلة الاوجاج بقلة الفريس بلاذون، سنّ الحسن بلاذر شرقيّ	عشب جنموريّة معمرّة. اوراقها قرصية الانتشاب. ازهارها صغيرة وردية عشب معمرّ او حولي. اوراقها لينة مستخشنة. ازهارها الى الزرقا البنفسجية عشب حوليّة فرعاء. اوراقها مركّبة. ازهارها بيضاء. ثمارها بزر عطريّة خضراء اللون شجيرة فرعاء. اوراقها ابيدة جامدة. ازهارها صفراء. ثمارها لوزيّة دهنيّة اللباب شجرة ضخمة باسقة. اوراقها سنانية جامدة، بحريّة الخضار جنية معمرّة فرعاء. اوراقها اهليجيّة. ازهارها بيضاء. ثمارها حنابل لثائيّة البلور عشب معمرّ متسلّقة فرعاء. اوراقها مركّبة عيطيّة. ازهارها رئيسية صفراء عشب حوليّة صغيرة. اوراقها ثنائيّة التطليق الريشي. ازهارها رئيسية صفراء جنية معمرّة فرعاء. اوراقها سنانية جامدة النصال. ازهارها بيضاء اللون شجرة عادمة الفروع. اوراقها قلبية كبيرة سباعيّة التفصيص. ثمارها قرصية شجرة فرعاء. اوراقها قلبية كبيرة. ازهارها غبراء. ثمارها جوزيّة جنية معمرّة فرعاء. اوراقها يفيشيّة جامدة. ازهارها صفراء. ثمارها صميّة شجيرة شاذكة فرعاء. اوراقها يفيشيّة مستنّة. ازهارها بيضاء. ثمارها خويّة جنية معمرّة فرعاء. اوراقها يفيشيّة جامدة. ازهارها حمراء. ثمارها نوويّة جويّة عشب صغيرة معمرّة. اوراقها قرصية الانتشاب. ازهارها شراخية. ثمارها بزر صغيرة عشب حوليّة فرعاء. اوراقها صغيرة. ازهارها بيضاء او وردية ثمارها بزر صغيرة عشب معمرّة. اوراقها سنانية مستنّة. ازهارها عطريّة حمراء اللون عشب حولي. اوراقها مركّبة. وريقاتها ثلاثيّة التفصيص. ازهارها خضراء اللون جنية معمرّة. اوراقها صغيرة ابيدة جامدة. ازهارها وردية. ثمارها صنيّة عشب جنموريّة معمرّة. اوراقها سنانية مزغية ومسنّة. ازهارها صغيرة ليليّة عشب جنموريّة شراخية. اوراقها مركّبة خماسيّة. ازهارها بيضاء. بزرها دقيقة جنية معمرّة فرعاء. اوراقها كبيرة متمشجة. ازهارها وردية. ثمارها صنيّة شجرة معجربة للساق. اوراقها سنانية جامدة. ازهارها بيضاء. ثمارها قلبية لحميّة مأكولة

الاجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الأوراق والأزهار	مغلي الأوراق والأزهار ينشط الهضم والابلاع والطمث ويدفع الحثيات
الأوراق والأزهار	يستعمل مغلي الأوراق والأزهار كطارد للبلدان. وينشط الهضم
الأوراق والأزهار	مستحباً مغز، منبّه، مضاد للتشنج، ويفيد للمعدة والأمعاء
العشبة برشتا	تنظم النبض، ترفع الضغط الدموي، تزيد ادرار البول
العشبة برشتا	تقيحها يسكن آلام الحوض. مستحب الأزهار يفيد العنة عند الذكور
الأزهار والثمار	الثمار عمدة للقوة الجنسية. الأزهار والثمار هاضمة، طاردة للغازات وتدر البول
الأوراق وصلوصها	عصيرها يفيد الحفر والاستسقاء والبرقان واحتقان الكبد ويتر البول
الأرومة والجذور	خفصة للضغط الشرياني، تدفع الحمى والأمراض الحموية. استعمالها خطر لأنها سامة
البزور والعشبة برشتا	مقوية تفيد الصدر والمعدة. مدرة للحيض
الجنت والأوراق النضّة	خارجياً تفيد الأمراض الجلدية والدمامل. داخلياً منعمة ومقوية للدم
الأزهار والجذر	مضادة للالتهابات والربو. تشفي جروح الأوعية الدموية
الدرن والأوراق النضّة	عصيرها مسهل، مفتح للحصى الكلوية. استعمالها خطر لأنها سامة
الدرن والأوراق النضّة	من الداخل تفيد الربو والزلات الزمنية والعلل العصبية. من الخارج مضطة
الجذامير والأوراق	تقيحها ارسحقها مسهل شديد الوقع. ويستعمل كمقيء
البات برشتا	يستعمل كطارد للدرور خاصة عند الأطفال
الأوراق	مقوية. تفيد المعدة. تدفع الحمى. تدرّ الطمث
الأروملة	مقوية للمعدة. تفيد الرقص الزنجي والروماتيزم المفصلي والقرص
العشبة برشتا	مضادة للتشنج. مطهرة. دافعة للحيمات. طاردة للدرور
الأوراق العليا والأزهار	تقيح الأزهار تاعوظ. تقيح الأوراق يقضي على الصفراء. الأوراق والأزهار تشط الأعصاب والذاكرة
الأوراق والأزهار والجذامير	قنبضة نشطة لا تضر الجهاز الهضمي
العشبة برشتا	مقوة وسقيّة للدم. تفيد الأمراض الصدرية والحلقية
البزور	مغلي البزور ينشط الهضم ويسكن للحص ويزيل الانتفاخ ويتر البول
الأوراق والثمار	تستعمل استعمال الأنيسون
الأوراق	منظفياً منبّه، معرق، مضاد للحمى ويفيد الطل الرئوية والسالك البولية
الأوراق والأزهار والثمار	مقوية للقلب، مسهلة، منبهة
العشبة برشتا	تفيد المعدة وتطرد الغازات وتغذي الأعصاب. مضادة للتشنج
الأزهار	مضادة للتشنج. تدفع الحمى والريح. تقوي الأعصاب
الأوراق	مقوية، هاضمة، هاضمة، مدرة للبول
الثمار	عصارة الثمار قبل الإدراك تخفف من سرعة خفقان القلب وتفيد الهضم والمعدة
الأوراق	أوراقها من الخارج تفيد الروماتيزم المفصلي والمفصلي والقرص. عصيرها يفيد الكل والكبد
الأوراق والثمار واللحاء	تفيد المعدة وأمراض الرئة والبرقان
الأزهار والثمار	مستحب الأزهار يفيد التهاب اللثانة وصعوبة التبول. عصير الثمار يفيد الرعاف وفروح الفم
الثمار	مستحب الثمار طاردة للدرور لاسيما المدودة الوحيدة
الأوراق والشرايح والبزور	منظفياً يقضي على الاسباك
العشبة برشتا	منظفياً يقطع الإسهال ويفيد الهضم والجهاز البول. التليخ بأوراقها المهروسة يفيد القروح
الأوراق	دافعة للحمى وتفيد ضعف الأعصاب والطحال والكبد
البزور والجذور والأوراق	تقيح البزور يقي الدم ويتر البول. الجذور منبهة. والأوراق منبهة
الأوراق واللحاء والجذور	مقوة، دافعة للحمى، تفيد الطل الحموية
الجذامير والأوراق	مقوية للقلب والمعدة. مضادة للتشنج. غباد أوراقها يزيل الأوجاع
الجذامير	منبهة، منشطة، هاضمة وتفيد الربو
الأوراق والأزهار والجذور	مضادة للتشنج والأفرازات. تحمّد حقة العين - مسحوق أو صبغة
الثمار القنبية	تتأصل الثمرات والقوية استعمالاً خارجياً

النبات	التحليل
بلدس ، شجرة الكبد	شجرة صغيرة فرعاء. أوراقها بيضية أبلدة جامدة. ثمارها كازروروسكرية مأكولة
بلسم مكنة	جنية معمرة فرعاء. أوراقها مركبة وثريّة. ورقاتها صميكة. ازهارها خيرة اللون
بنّ	شجيرة فرعاء. أوراقها متقابلة أبلدة. ازهارها بيضاء عطريّة. ثمارها نويّة ثنائية الحب
بنج اسود	بجلة حوليّة. أوراقها مفرّعة كرية الفرائحة. ازهارها كبيرة. يزورها مفلطحة
بندق هندي	جنية معمرة دائسة. أوراقها مركبة شفعية. ازهارها بيضاء. ثمارها حنابل. يزورها كروية
بنفسج عطر	عشبة رلدية معمرة. أوراقها قرصية الانتشاب معتقة. ازهارها بنفسجية عطرة
بشّية الدبق ، حود الخير	شجرة فرعاء. أوراقها جامدة أبلدة سنّة شاكّة. ازهارها صغيرة. ثمارها عنيّة
بشّية الشاي	شجرة كبيرة فرعاء. أوراقها بيضية. ازهارها صفراء اللون. ثمارها الى الحمرة
بوسير أبيض	عشبة ليفيّة هولة. أوراقها بيضية خملية البشرة. ازهارها عطريّة صفراء اللون
بولوطاني مرّ، حشيشة اللبن المرّة	عشبة حزيمة معمرة. أوراقها صغيرة رحيّة. ازهارها جلجلية زرقاء اللون
بيش ، أكويت هرمي	عشبة معمرة. أوراقها ريشيّة شديدة الخضار. ازهارها الى الزرقاء العاقبة
بيلسان اسود	شجيرة معمرة فرعاء. أوراقها مركبة خاسية. ازهارها صغيرة صفراء اللون
تاغنست ، ملكة الحشائش	عشبة جلمووية معمرة. أوراقها مركبة خاسية. ازهارها صغيرة بيضاء اللون
ترخان	بجلة معمرة. أوراقها بيضية بارزة المروق. ازهارها بيضاء فواسية العبير
ترنشا	عشبة حوليّة. أوراقها ضيّقة الاتصال لانطاوية. رؤسائها الزهرية زرقاء اللون
توت اسود ، توت شامي	شجرة دائحة. أوراقها قليّة خشنة عابلة. ثمارها حسلّة جؤوية للمليدة الطعم
ثلثان حلومرّ	جنية معمرة متسلّقة. أوراقها معتقة شديدة الخضار. ازهارها بيضاء بنفسجية المواج
ثوملا أكملّة	عشبة حوليّة فرعاء. أوراقها قليّة بحرية اللون. رؤسائها وردية
جرجير حقلي	عشبة حوليّة فرعاء. أوراقها شديدة التفريغ. ازهارها وردية. ثمارها يزور تحيلة
جرومية ترسيّة	شجرة دمناعة جؤولة الساق. أوراقها ترسيّة مفصّصة. ازهارها حامية صفراء
جزر الرعاء ، دوقس	عشبة معمرة جنيّة الجذر. أوراقها مركبة ريشيّة. ازهارها صغيرة خيرة اللون
جكرته بريوسيرا	شجرة فرعاء. أوراقها مركبة ريشية. ازهارها كبيرة زرقاء اللون. ثمارها لحية مأكولة
جلاب	عشبة صقولة متسلّقة معمرة. أوراقها قليّة. ازهارها كبيرة قرمزية.
جملج صنيّ	عشبة حوليّة مزغبة فرعاء. أوراقها سنائيّة سنّة. ازهارها بيضاء مستحبة العرف
جنبل شائع	عشبة معمرة عارشة. أوراقها مفصّصة. ازهارها وحيدة للسكن
جنس	جنية فرعاء مستغلطة الجذور. أوراقها مركبة حاسية. ازهارها وردية اللون
جوز عادي	شجرة كبيرة دائحة. أوراقها مركبة وثريّة. ازهارها قذية. ثمارها مأكولة اللباب
جينكو	شجرة ضخمة دائحة. أوراقها مروحية مشقوفة. ثمارها لوزية لحية السؤقي جمحالية
حبّ السلك	عشبة حوليّة زياء. أوراقها خاسية اوسباعية التفصوص. ازهارها كبريتية اللون. يزورها بلسيّة
حبّ معروف	عشبة حوليّة فرعاء. أوراقها لسنّة مدنيّة. ازهارها بيضاء. يزورها دقيقة كروية
حمرل	بجلة معمرة مدّادة. أوراقها مفرّعة ريشيّة التشميم. ازهارها بيضاء. يزورها صغيرة
حشيشة الحفر	عشبة معمرة فرعاء. أوراقها مستطيلة مفرّعة. ازهارها صفراء. يزورها دقيقة حمراء
حشيشة الحطاف	عشبة معمرة دريّة الجذور. أوراقها قرصية مزرقية. ازهارها صفراء
حشيشة اللة المخزنية	عشبة معمرة لحية زياء. أوراقها رحيّة مزغبة. ازهارها وردية لم بنفسجية
حشيشة الزواج	عشبة معمرة فرعاء. أوراقها لسنّة زياء. ازهارها خضراء اللون
حشيشة السمال ، فراقرة	عشبة جلمووية معمرة. أوراقها قليّة مزغبة. ازهارها صفراء اللون
حشيشة الفراز	عشبة حوليّة فرعاء زياء. أوراقها بيضيّة مزغبة. ازهارها بيضاء اللون
حشيشة الملايح	عشبة حوليّة صغيرة. أوراقها ملحنيّة الشكل درماء الاتصال. ازهارها بيضاء
حشيشة الملاك	عشبة معمرة فرعاء. أوراقها مركبة وثريّة. ازهارها بيضاء اللون. يزورها بنجحة
حشيشة مباركة	عشبة جلمووية معمرة. أوراقها القرصية ريشيّة اما العليا مفصّصة. ازهارها برغالية اللون
حلبة رويّة	عشبة حوليّة. أوراقها مركبة لثالية الورقات. ثمارها حنابل. يزورها شبه كروية
حليب حولي	عشبة حوليّة صغيرة. أوراقها سنائيّة. ازهارها خضراء اللون
حمحم عزني	عشبة حوليّة زياء. أوراقها سنائيّة خشنة. ازهارها زرقاء اللون
حشيشة الحقل	عشبة معمرة فرعاء. أوراقها سنائيّة مستطيلة داكنة الخضار
حشيشة زراعي	عشبة معمرة فرعاء. أوراقها رحيّة فائمة الخضار. ازهارها خضراء اللون

الأجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الأوراق	تستعمل في علاجات الكبد، مقوية، هاضمة
صمغ يستخرج بالحرق من الساق	يسكن السعال، يقوي اللثة
الحطب	مسحوق الحطب المحمص ويغلي ينضج الاعصاب
الأوراق والبرزور	مسحوقها أو صيتها منومة، مضادة للتشنج، تنيد للمعدة الكلوي، تذهب حدة العين
الأوراق والبرزور	مغليها مغق، مضاد لتهابات الحصى المتقطعة
الأزهار والأوراق والبرواكب	تفيد الأزهار الجافة لماني وينفع الصدر والسعال، الأوراق والبرواكب مقوية
الأوراق	تفيد الأوراق أو مغليها يفيد الرشح المستعصي
الأوراق	مغلي الأوراق الجافة ينضج وعاضم
الأزهار	مستحلب الأزهار يقطع السعال الجاف والتهاب الحنجرة، صيتها تنفع التهاب الجفون
الجذور والأوراق والأزهار	مغليها ينشط دُر اللبن عند المرضع، مضادة للسعال، تنيد الحضم
الأوراق والأزهار والجذور	العصبة والمستحلب المثبر مسكن نشيط، يدر البول، مضاد للاحتقان
الأوراق واللحاء	مغليها يفيد التلات الصدرية والتهاب اللوزتين والصداع
الجذور	مسحوقها منضج، معرق، يساعد الحضم، يدفع الريح ويدر البول
الأوراق	مغليها مته، يفيد الآلام العصبية والصداع
الأزهار	تفيدها يقوي المبرن ويغني على الرمد
ثمار	عصيرها قابض، يفيد للعدة والأمعاء
الفروع المحولة	مسحوقها الجاف يفيد الأمراض الرئوية والعصبية والقرص
الأوراق	عصيرها ينشط افراز اللعاب ويفيد للثة ونساق الدم
الأوراق والبلور	عصير الأوراق منضج ومضاد للحفر، مسحوق البذور نافذ وينشط الباه
الأوراق والجذور	مغليها يفيد الريو والاستقاء وامراض الكبد
الجذور والبرزور	مغليها منضج نشيط، يفيد الاستهزاء، يدر البول
الأوراق واللحاء	اوراقها تنيد الأمراض الجلدية، اللحاء مرققة ومدرّة للبول
العصافيل	مسحوق العصافيل سهل فكال
العصبة يرستها	مغليها يفيد التدرن الرئوي ويفيد الريو والتهاب الحنجرة
للمخاطرة الانثوية	مغليها يسكن الاعصاب والاضطرابات، مضاد للحفر والامراض الجلدية
الجذور	مسحوقها منضج نشيط أو شاي حسب الاستعمال، لا يسيء الى الجهاز العصبي.
الأوراق وقرفة اثمار الخضراء	مغلي الأوراق يفيد الآفات الجلدية، صبة قرفة اثمار منهضة
البرزور	طاردة للدود
البرزور	مستحلبها مضاد للتشنج
الأوراق والأزهار	مغليها مغق، مته، هاضم، يزيل الصداع، مضاد للتشنج
البرزور	مسحوقها ومغليها يدر الطلث ويغني عن استعمالها عطر يوجب الحفر
الأوراق والأزهار	مغليها دواء للحفر ومضاد للسعال، تقيمها يفيد البحة والتهاب الحنجرة
العصبة يرستها مع الجذور	تستعمل في معالجة البراسير مجزوجة ببعض المساحق أو الررام
الساق والأوراق	مغليها يفيد الصدر والتهابات الشمية والرئوية
العصبة يرستها	مغليها ملين ويدر البول
الأوراق والأزهار	مستحلبها مضاد للسعال والتهاب الحنجرة
العصبة القصة يرستها	مستحلبها يفيد ضعف القلب ويغني عن التلات الصدرية الخفيفة
العصبة يرستها	شرابها أو صيتها منشطة، هارضة، مضادة للحفر، مغنية للدم، تدر البول
الجذور	مغليها يفيد الجهاز التنفسي والمعدة ويقطع للنفس
الجذور	مغلي المسحوق يفيد القلب والذاكرة والاعضاء التناسلية
البرزور	مغليها يفيد التهابات الرئوية والاسماك والبراسير وينشط السمة
الأوراق	مغليها ملين وسهل
الأوراق والأزهار	مغليها معرق، يدر البول، مضاد للسعال والامراض الصدرية وألمعصية
الجذور والأوراق	مغليها مغق، يقي الدم، يفيد الامراض الجلدية
الأوراق	عصاريتها منهضة، تنفي الدم، تنفي على الاسماك

النبات	التعليق
حنطوق حقل	عشب حولي فراء. اوراقها مركبة ثلاثية. ازهارها صفراء اللون كثيرة العدد
حنظل	عشب حولي مدادة. اوراقها كبيرة خشنة مزخجة. ازهارها صفراء. ثمارها قرعبة
عنب الرمال	عشب جذموريه معمرة. اوراقها عصفية حشوية البشرة مهدبة الحار
خيارزة بريّة	عشب ليفيّة حولي او محولة. اوراقها مفصصة. ازهارها بتنجسية كبيرة
خيزرة مخزّنة	عشب ليفيّة معمرة. اوراقها ثلاثية او خاسية القصوص. ازهارها وريثة
خدرية، وجل اللب	عشب معمرة. اوراقها خيطية متراكبة. ازهارها خيرا سنبلة التجميع
خريف اسود	عشب صغيرة معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب مركبة وريثة. ازهارها بوقية بيضاء اللون
خريق ابيض	عشب جذموريه معمرة. اوراقها سنائية زياء. ازهارها بيضاء يعلوها موج اخضر
خردل اسود	عشب حولي فراء. اوراقها كبيرة زياء. ازهارها صغيرة صفراء. يزورها دققة
خرد الصخور	من النباتات الدنيا. جامد البشرة. يعيش في المواد المضوية على الصخور الرطبة
خروب هندي	شجرة دائمة. اوراقها مركبة وريثة ابيدة. ازهارها خضراء اللون. ثمارها قرنية كثيرة البذور
خزامى غريبة	عشب معمرة فراء. اوراقها لسنة خفيفة خملية. ازهارها زرقاء اللون
خشخاش ابيض	عشب حولي عشوشية الساق. اوراقها جذعية مقرضة. ازهارها كبيرة. ثمارها جراء
خشخاش اعصى	عشب حولي صغيرة حشفة. اوراقها مقرضة. ازهارها كبيرة حمراء. ثمارها جراء
خلّة	عشب حولي فراء. اوراقها مركبة مقرّنة. ازهارها عطرية بيضاء اللون
خلود السطوح	عشب لحمية معمرة عادية الفروع. اوراقها لحمية قرصية الانتشاب. ازهارها الى الحمرة الوردية
خلوحان غربي	عشب جذموريه معمرة. اوراقها سنائية. ازهارها بيضاء اللون
دازي رومي	عشب معمرة. اوراقها اليلجية كثيرة الجيوب المدعّية. ازهارها صفراء. ثمارها حواء
دكمون ابيض	عشب معمرة فراء. اوراقها مركبة وريثة. ازهارها بيضاء مفصصة بالارجواني
دند اللوك	جنية معمرة. اوراقها اصبعية مقرضة. ازهارها خيرا. يزورها شبيهة يزور الخروع
دعيتال ارجواني	عشب حولي ليفيّة سرحة. اوراقها يصبية. ازهارها قعبة ارجوانية
دبش مشوك	شجرة صغيرة فراء. اوراقها مركبة وريثة عطرية. ازهارها خضراء اللون
ذرة صفراء	عشب حولي متصبية. اوراقها عصفية سنائية مستطيلة
ذرقه، زنب الوادي	عشب جذموريه معمرة. اوراقها سنائية. ازهارها جلجلية بيضاء
راسن طبي	عشب معمرة فراء. اوراقها ظلية كبيرة. رؤسيتها الزهرية صفراء اللون
راوند غربي	عشب جذموريه معمرة. اوراقها كبيرة مفصصة. ازهارها كثيرة خضراء اللون
ريرق	جنية معمرة. ساقها شائكة فراء. اوراقها كبيرة مفصصة. ازهارها بتنجسية او بيضاء
رجل القطّ الشائع	عشب معمرة جنتية الجذر. اوراقها ملوطة. ازهارها رؤسية
رصاصية اوروبية	بجلة فراء. اوراقها ملقطة مسنة. ازهارها بوقية بتنجسية
رعي الحام الغربي	عشب معمرة فراء. اوراقها يصبية مقرّنة الحواشي. ازهارها عطرية وردية اللون
روكان	شجرة معمرة فراء. اوراقها رعيّة. ازهارها ارجوانية. ثمارها كروية
زداع شاين	جنية معمرة فراء. اوراقها جامدة. ازهارها بيضاء. ثمارها حشفة. يزورها مستطيلة
زراوند لباني	عشب عارشة معمرة. اوراقها كبيرة رعيّة. ازهارها بوقية خيرا اللون
زراوند طبيّاني	عشب معمرة فراء. اوراقها ظلية. ازهارها قعبة صفراء. ثمارها تكابر
زربوك فيرجينية	شجيرة دائمة. اوراقها سنائية النصال الجامدة. ازهارها صفراء اللون عطرية
زعرور شالك	شجرة فراء شائكة. اوراقها مفصصة مسنة. ازهارها بيضاء. ثمارها كروية
زعفران غربي	نبات دوفضي حولي. اوراقه خيطية خضبة. ازهاره عطرية
زغدة غربيّة	عشب لحمية معمرة. اوراقها سنائية قرصية الانتشاب. ازهارها جرسية. ثمارها حشفة
زنجبيل غربي	عشب جذموريه عقده. اوراقها كبيرة سنائية. ازهارها صفراء برتقالية البتلات
زوقا	عشب معمرة فراء. اوراقها عطرية سنائية. ازهارها عطرية عديدة الالوان
زيزوفون	شجرة كبيرة. اوراقها متقنة ظلية. ازهارها عطرية تبتية اللون
ستريكوس ايباس	جنية عارشة معمرة. اوراقها يصبية. ازهارها بيضاء. ثمارها كروية
سذاب غربي	عشب معمرة فراء. اوراقها مركبة مقرّنة. ازهارها فسفوية اللون
سرخس ذكر	عشب جذموريه معمرة. اوراقها كبيرة مستطيلة. مرجنتها حرشية
سرفل بغلي	عشب حولي فراء. اوراقها مركبة شديدة التفريغ. ازهارها بيضاء يزورها صغيرة

الأجزاء الصالحة	التأثير والاستعمال
الأوراق العليا والأزهار	منظفيا قابض، مضاد للسعال. مرهم العشبة القنصة يحل الروم الجماد
لب الثمار	سهل شديد الريح. لا يستعمل إلا بأمر الطبيب
الجذور	منظف مرقق ويدّر البول ويفيد الروماتيزم
لساق والأوراق والأزهار	منظفيا مضاد للسعال ويفيد التلذات الصدرية والتهاب اللوزتين
الأزهار والجذور	منظفيا سكن للسعال والأمراض الصدرية وسرقة البول. غرغرة في التهاب اللوزتين
الطلع	مضاد لداء الفواصل والصرع والتفتة. يفيد الاكتئاب الرطبة عند الأطفال
الجذور	منظفيا سهل هنيئ، مطهئ، طارد للدم
العشبة برشتا	منظفيا يفيد القروح وسكن الآلام العصبية
البزور	منظفيا حريف، ناضج، مرقق، يهّئ الحضم والقلب
النبات برشته	مسحوقه ومنظفيا مضاد للقيء، منقه، يفيد الصدر
لباب البزور	تقيحها ومستحلبا ملين يناسب الأطفال
الأوراق والأزهار	منظفيا يسكن الأعصاب ويفيد اضطرابات المعدة
مصاراة الساق والجذام	منظفيا يخفف الأعصاب أو يسكنها
عصاراة الساق	مسكنة، مرققة، تقيد السعال الديكي. متونة
البزور	منظفيا مقو، مضاد لداء الفواصل، يفيد الحضم ويدّر البول
عصير الأوراق	يفيد القروح والمسامير والتآليل والتهاب اللثدي
الجذور	مسحوقه منقح شائق إذا قمع في الحليب. معلى يفيد المعدة والمغص ويطرد الغازات
الأوراق والأزهار	ثائم الجروح وتنشئ الحروق وتوقف بصر الدم وتقيد الصرع العصبي
الجذور	منظفيا مضاد للصرع، مرقق، طارد للدم
لساق والأوراق والبزور	القليل منها مفلي ملين عمود
الأوراق	منظفيا يقوي القلب وينظم خفقانه. استعمالها خطر لأنها سامة
النحاء والأوراق	مسحوقها ومنظفيا منبه، يفيد داء الفواصل ووجع الأسنان
شوشة الغرغرين	منظفيا يفيد التهابات الكلى والمثانة
الأزهار	منظفيا ينشط القلب ويخفف سرعة النبض ويفيد الغدة الدرقية
الجذور	منظفيا مقو، منبه، مرقق. منظفيا يشفي الجروح والقروح
الجذور	الجرعة الصغيرة من التقيح تقوي المعدة وتفيد الحضم. الجرعة الكبيرة مسهلة
الأوراق	منظفيا مسكن وملين
الأزهار	منظفيا مضاد للسعال وملين
الجذور	مسحوقها ومنظفيا انتيبيرتيك. يفيد وجع الأسنان والجرب والقروح
الأوراق والأزهار	منظفيا يفيد الرين والصفى واحتقان الكبد. منظفيا يفيد التهاب اللوزتين
الأزهار ولحاء الجذور	منظفيا طارد للدم. استعمالها حذر
الأوراق والأزهار	القليل مقو الكثير سهل. تستعمل منقحة
الجذور	مسحوقها ومستحلبا وتقيحها مقو، منبه، مرقق. وتفيد الربو
الجذور	مسحوقها مطهئ. تقيحها ومنظفيا مقو، يفيد القروح والدمامل
لحاء الجذور والساق	منظفيا يفيد الحرارة ويدّر الصفراء والبول
الأزهار والثمار وساق الساق	منظفيا الأزهار وصبيتها مسكنة للقلب وعققة لضغط الدم
الأزهار والبصلة	منظفيا يفيد المعدة، مطهئ ومنبه نشيط
الأزهار والجذور	منظفيا مضاد للسعال والتشنج. يفيد الآلام العصبية
الجذور	مسحوقها ومنظفيا محرّض، منقح، مقو، حاضم، طارد للغازات
الأوراق والأزهار	منظفيا منمنش، يفيد الصدر، يقطع السعال
الثمار والبزور	منظفيا يقيد الزكام الحفّز والتلذات الشبيهة والسعال
الأوراق	القليل القليل من مسحوقها منشط ناهض. استعمالها خطر لأنها سامة
العشبة برشتا	تقيحها ومنظفيا ناضج، خافض للحرارة، مضاد للتشنج، يدّر الحث
الأوراق	منظفيا يفيد آلام الظهر والعلل العصبية والصداع ويقضي على الدودة الوحيدة
الجذور	منظفيا حاضم، يقوي الدم، يلين المعدة، يدّر البول



النبات	التعليق
سرو شائع	شجرة معتدلة ريشة. اوراقها نسيجة عابكة الخضار. ثمارها اكواز كروية
سمن البر	عشبة معمرة. اوراقها اهلججية خملية النصال. ازهارها وردية
سفنبل	عشبة دوفسية معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب عصفية. ازهارها ارجوانية
سفرجل	شجرة قارئة الاضخان. اوراقها شمعية النصال. ازهارها وردية. ثمارها كروية صفراء
سفندر لاسع	جنية معمرة فرعاء. اوراقها رقائق جلدية النصل. ازهارها خضراء. ثمارها عنبية
سكب الغرب	عشبة جلديورية معمرة. اوراقها كنفية مفصصة. ازهارها وردية
سكك	عشبة صغولية حصيدية معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب قلبية. ازهارها زائدية عطرية
سقطون غزلي	بجلة معمرة فرعاء. اوراقها سنانية خشنة. ازهارها انبوية ملونة
سمسم	جنية معمرة. اوراقها صغرية ابيدة. ازهارها ليلكية اللون
سنا سوري	جنية معمرة. اوراقها مركبة شغمية ريشة. ازهارها صفراء. ثمارها سنن مبططة
سنا مكسي	جنية معمرة. اوراقها مركبة شغمية ريشة. ازهارها صفراء. ثمارها سنن مبططة
سنبان مزند، دور	شجرة كبيرة هرمية الشكل. اوراقها معتدلة مفصصة. ثمراتها محبب الحراشيف الصغيرة
سورنجان الخريف	عشبة دوفسية معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب ضيقة مستطيلة. ازهارها ليلكية كبيرة
سوس غزلي	جنية جلديورية معمرة. اوراقها مركبة وثرة. ازهارها زرقاء. يزورها مستديرة مفلطحة
سوسن ابيض	عشبة ارمولية معمرة. اوراقها مستطيلة منجلية. ازهارها كبيرة فيا الالبيض والازرق والاصفر
سولع غزلي، آوة	عشبة ارمولية لحمية معمرة. اوراقها لحمية ليفية معتدلة سنن الخنار
شاهنرج غزلي	عشبة حولية خملية فرعاء. اوراقها مركبة مغرسة. ازهارها عقودية وردية
شالوا، كسر	شجرة كبيرة. اوراقها مركبة. ورقاتها سنانية. ازهارها صفراء اللون
شبت	عشبة حولية معتدلة. اوراقها مركبة غليظة. ازهارها بيضاء. يزورها صغرية محددة
شرعطل مقمي	عشبة معمرة. اوراقها مركبة مشرحة النصال. ازهارها بيضاء. يزورها دقيقة خضراء
شقيق النعناع اللبلول	عشبة صغرية معمرة. اوراقها مركبة غليظة. ازهارها كبيرة قرزية. يزورها كروية
شار حلز	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة ريشة. ازهارها صفراء. يزورها صغرية
شعرة بحرية	عشبة صغرية معمرة. اوراقها لحمية مركبة. ازهارها بيضاء ثمارها بيضية محددة
شعرخاض عارض	عشبة عارشة معمرة. اوراقها معتدلة اهلججية. ازهارها ارجوانية اللون
شنتجار غزلي	عشبة غشوشية معمرة. اوراقها صغرية ضيقة مزغبة. ازهارها بيضاء. يزورها كروية صلبة
شوكة مباركة	عشبة حولية فرعاء. اوراقها كبيرة مضلمة حالية الزغب. ازهارها صفراء
شوكران	عشبة حولية ليمية الساق. اوراقها مركبة. ازهارها بيضاء. ثمارها كروية صغرية
شولاه	عشبة غشوشية معمرة. اوراقها ثلاثية التفصيص. ازهارها عطرية صفراء
شيلك	عشبة راتنية معمرة. اوراقها مركبة ثلاثية خشنة. ثمارها شولية مأكولة
شيار معروف	نبات لحمي معمر. الساق وقروعا الواح كبيرة بيضية. ازهارها كبيرة نارية اللون
صنتر شائع	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها يفسية خملية النصال. ازهارها وردية
صفصاف ابيض	شجرة منبسطة الفروع. اوراقها سنانية النصال. ازهارها شريفة صفراء
صنوبر بري، برز	شجرة كبيرة. اوراقها هدية شغمية. اكوازها مردية. يزورها دقيقة مجنحة
طوفرون غزلي	عشبة معمرة ليفية. اوراقها اهلججية سنن. ازهارها حمراء
ظهيرة بلورية	عشبة لحمية حولية. اوراقها لحمية كبيرة. ازهارها بيضاء. يزورها دقيقة موداء
عافر قرعا	عشبة حولية فرعاء اوراقها ريشة ثنائية التفلين. ازهارها صفراء. يزورها مجنحة
نهاد الشمس السنوي	عشبة حولية. اوراقها معتدلة قلبية خشنة. ازهارها كبيرة صفراء. يزورها وثنية
عراوة ملكة المروج	جنية معمرة فرعاء. اوراقها مركبة سنانية وثرة. ازهارها الى الخضار الباهت
عرعر شائع	جنية معمرة فرعاء. اوراقها ابيدة هدية. ثمارها عنبية حلوة المذاق عطرية
عرعر كادي	شجيرة فرعاء. اوراقها ابيدة هدية. ثمارها نوية حصيدية لينة والشكل
عرق الذهب المغزلي	جنية حولية معمرة. جلديورها غليظة. اوراقها معتدلة صغرية. ازهارها فردية
عرق الجيار	عشبة مدادة معمرة. اوراقها مركبة خماسية. ازهارها كبريتية اللون
عرون غزلي	عشبة حولية فرعاء. اوراقها صغرية منشارة الحافة. ازهارها وردية
عروق الصباغين	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة مغرسة. ازهارها صفراء اللون

الأجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الأكزاز والخشب	صحبته قابضة ، مضادة للتزيف وتفيد البراسير
الأوراق والأزهار	ستحلبا يقوي القلب وللمعدة ، مغليا يفيد السعال الديكي والزلة الوافدة
البزور	مسحوقها مسهل خفيف ، معطس ، يدرّ اللعاب ، استعمالها خطر
ثمار	عصيرها مضادّ للاسهال
البزور والأوراق	مسحوقها وتقيها هاضم ويدرّ البول
الأوراق	ستحلبا يفيد التهاب اللوزتين غرغرة . ويشق الجروح
الحصبة	صحبته يفيد طين الأذنين . مهورها يقضي على الأورام والمسامل لصفاً
الارومة والأوراق	مهوس الأوراق لبناً يفيد التهاب الاعصاب وعرق النساء والدوالي . مسحوق الارومة للتزيف المهبلي
الزهار والأوراق	ستحلبا يدرّ البول ويفيد التهابات الكلى والمجاري البولية
الأوراق	تقيها مسهل شائع الاستعمال
الأوراق	تقيها مسهل شائع الاستعمال
الدواء	مغلي المسحوق أو نقيحه قابض
الدوخة والبزور	مستحضراتها تفيد داء الفطحة وتقضي على القرص
الجذور	تقيها مسهل خفيف . مغليا يفيد التهابات الكلى والثانة والحنجرة
الارومة	مغليا منقح ويفيد الملل الصدرية
الأوراق	القليل من عصيرها مسهل . الكثير منه ماسط
العشبة يرستها	مغليا معقرو ويقي الدم ويفيد البرقان والأمراض الجلدية
الأزهار	مغليا طارد للديد من أي نوع كان
الأوراق والبذور	تقيها يفيد الملدة والامعاء ويمنع الارق ويدرّ البول
البذور	مغليا يفيد الأمراض الصدرية ويبلغ الحصى ويدرّ البول ويسخّر الاعصاب
العشبة يرستها	عصيرها أو مسحوقها الجفاف مضاد للزلة . مسكّن ومطعم
الجذور والبذور والأوراق	مغلي الجذور والأوراق يدرّ البول . مغلي البزور منه ، يدرّ الحليب والطمث
الأوراق وثمار	عصارة الأوراق وتقيع ثمار طارد للديد
للدواء	مسحوقها يفيد الملل العصبية ويسكّن ويغيد للمعدة
البذور	مغليا يفيد علل السالك البولية وقد يلبس الحصى ويفيد في الزنطاري
الأوراق والأزهار	مغليا معقرو ، دافع للحصى ، ورضيعها دامل للجرح
الأوراق وثمار	تقيها مضادّ للتشنج ويفيد الربو والسعال الديكي . استعمالها خطر لأنها سامة
الأوراق والأزهار والجذور	الجذور مضادة للتشنج والصرع والرقص الزنجي
الارومة والجذور	تقيها يدرّ البول وقابض ، مغليا يفيد القرص وسلب الرمل
الألواح	عصارتها مقوية للقلب . تقطع الزحار والاسهال
الأوراق والأزهار	مغليا يسكّن تشنجات العصبية . مسحوقها ينشط الشهية ويدرّ البول
للدواء	مغليا مضاد لالتهاب والحصى ، يبرق ، يسكّن الآلام ، يدرّ البول
البئاتق	مغليا يدرّ البول ويفيد التزلات الشعبية
الأوراق والأزهار	مغليا معقرو ، هاضم ، يفيد علل الطفحال
الأوراق	مغليا يفيد حصر البول والسعال التشنجي . مهوسها يفيد الحروق والجروح
الجذور	مسحوقها يدخل في حدة تركيب طيبة اخضها معجونات الانسان
بتلات الأزهار	مغلي البتلات مضاد للحيمات والملازيا . ولعابجة توشحات لقصبة الهوائية
الجذور والأزهار	الجذور قابضة ، تدرّ البول ، تقطع التزيف . نقيع الأزهار يفيد الاستسقاء والالتهابات
ثمار	تقيها يقي الدم ، يدرّ البول ، يفيد الملل الكبدية والسالك البولية وتنشأف الشرياني
الأوراق	تقيها مسهل وطارد للديد
الجذور	مسحوقها معقرو ، منقح ، مضاد للاسهال . استعمالها خطر يوجب الحذر الكلي
الجذور	التكيد بمجملته يقضي على الأكزما ، المضغطة تفيد تزيف اللثة
العشبة يرستها	ستحلبا يفيد الرشح والتزلات الشعبية ، ويقوي المبرن ، ويفيد الرمد
العشبة يرستها	عصارتها تقضي على التاول . خلاصتها المائمة تفيد المعدة والامعاء والتهاب المرارة

النبات	التحلية
صم سندي	جبة معمرة فرعاء. اوراقها بيضيّة أزهارها وردية. يزورها دهنية
عشب القوي الرّويّة	عشب مدّادة معمرة. اوراقها مركّبة ثنائيّة الصفّ. أزهارها كبريتيّة اللون
عُش جبار	شجيرة متباعدة الفروع. اوراقها ابيدة سنائيّة بارزة العروق. أزهارها وردية
عققة مبدولة	جبة متسلّقة معمرة. اوراقها ابيدة جلديّة النصال. أزهارها بيضاء. ثمارها نوويّة
علّد مذروج السنايل	جبة معمرة فرعاء. اوراقها كالخراشف. ثمارها عنية
عنب الدب، عيران	جبة معمرة فرعاء. اوراقها ابيدة صغيرة. أزهارها جلجلية وردية. ثمارها عنية
عود الانبياء	شجرة متوسطة الحجم. اوراقها مركبة شفعية. أزهارها زرقاء. يزورها صفراء اللون
عود الرج	عشب جلدمورية معمرة. اوراقها عصفيّة فرسيّة الانتشاب. أزهارها صفراء اللون
صنّج شائع	جبة شالكة معمرة فرعاء. اوراقها مركّبة وثريّة. أزهارها وردية. ثمارها شاميل كرويّة
مينون عطر	بجلة ليفيّة معمرة. اوراقها ابيدة ملمعيّة جامدة. أزهارها عطريّة زرقاء اللون
خافث خولاني	عشب معمرة شالكة الساق. اوراقها مركّبة وثريّة. أزهارها عطريّة صفراء اللون
غاليلون حقيقي	عشب فرعاء مضلمة الساق. اوراقها ضميّة صغيرة خضليّة. أزهارها الى الصفرة الزاهية
غاليلون صليبي	عشب فرعاء مضلمة الساق والفروع. اوراقها بيضاء ضميّة. أزهارها صفراء اللون
شيراء الحابلين	شجرة فرعاء. اوراقها مركّبة وثريّة. أزهارها كبريّة الرائحة. ثمارها صغيرة كرويّة
غراسيولة غزيرة	عشب جلدمورية معمرة. اوراقها ضميّة مسنّنة. أزهارها بويّة وردية
غرندلية ضليعة	جبة معمرة فرعاء. اوراقها سنائيّة جامدة. رؤسائها الزهرية صفراء اللون
غروق عطر	عشب معمرة فرعاء. اوراقها مقصّصة مشرّمة. أزهارها الى البياض الليليكي المواج
غفت ابن سينا	عشب ليفيّة معمرة. اوراقها مركّبة سنائيّة النصال. أزهارها وردية. يزورها دقيقة
غلقة	جبة معمرة دماعة. اوراقها اهليلجيّة شديدة الخضار. أزهارها بيضاء. ثمارها كعابير
فاشا زياء	جبة متسلّقة معمرة. اوراقها كنيّة مقرّصة. ثمارها عنية. ثمارها زيتيّة اللباب
فاغية الخنان	بجلة معمرة فرعاء. اوراقها ضميّة النصال. رؤسائها الزهرية بيض اللسينات
فجل حارّ	عشب حوليّة غليظة الجذور. اوراقها مستطيلة مقرّصة ومسنّنة. يزورها كرويّة
فراسيون ابيض	عشب معمرة فرعاء. اوراقها بيضيّة خشنة مسنّنة أزهارها بيضاء
فراسيون ازغب	عشب عموّلة زياء. اوراقها خشنة مزغبية ومسنّنة. أزهارها حمراء مرقوشة بالابيض
فراسيون اسود	عشب معمرة فرعاء. اوراقها عمليّة النصال للسنّة. أزهارها جزؤيّة منفردة
فراسيواز، صنّج ابيد	جبة ارويّلة معمرة فرعاء. اوراقها مركّبة مزغبية مسنّنة. ثمارها شاميل مأكولة
فريون لحيوس	عشب ليفيّة عموّلة دماعة. اوراقها متصالية سنائيّة. أزهارها وردية
فريون مخزي	جبة معمرة فرعاء. اوراقها اهليلجيّة جامدة النصال. أزهارها بيضاء اللون
فشاغ مخزي	جبة ليفيّة معمرة. اوراقها قلبية جامدة النصال. أزهارها صغيرة صبرائيّة
فلفل كبابة	شجيرة سريعة الفروع. اوراقها اهليلجيّة جامدة. أزهارها مرجانيّة. ثمارها كرويّة
فزة	عشب جلدمورية معمرة. اوراقها ضميّة متقلّبة سنائيّة مزغبية. أزهارها صفراء
فوقس حويصل	نبات مجري قلدي الجذور والسوق والاوراق. لونه الى الخضار الاخضر
فول	عشب حرويّة. اوراقها شفعية. أزهارها بيضاء حويصليّة
فول كلابار	جبة عارشة معمرة. اوراقها مركّبة ثلاثيّة. أزهارها ارجوانيّة. ثمارها قرون تغلف الحبوب
قات	جبة معمرة فرعاء. اوراقها ابيدة اهليلجيّة بارزة الضلع مسنّنة. أزهارها صفراء اللون
قبطيس يته، عجل ذهبي	عشب حوليّة صغيرة. اوراقها صغيرة مقرّصة. أزهارها فردية بيضاء اللون
قنوابه	جبة معمرة فرعاء فناء. اوراقها سنائيّة جامدة. أزهارها وردية مرقوشة
قنّاء برّي	عشب حوليّة مدّادة. اوراقها ممّقة كبيرة. أزهارها صفراء. ثمارها رنيّة صفراء
قراض يحرّق	عشب حوليّة فرعاء زياء. اوراقها ناشرة العروق مسنّنة كنيّة الملبس. أزهارها خضراء
قزة	عشب مائيّة معمرة. اوراقها مركّبة ثلاثيّة. أزهارها برتقالية اللون
قرطم الصباغين	عشب حوليّة سرحة. اوراقها سنائيّة بارزة العروق. أزهارها برتقالية اللون
زقفة سرنديب	شجرة منتصبّة فرعاء. اوراقها ابيدة جامدة. أزهارها عقودية خضراء. ثمارها عنية
قرنغول	شجرة فرعاء فناء. اوراقها ابيدة جامدة. أزهارها عقودية صغيرة حمراء. ثمارها نوويّة
قسرة راحية	جبة عارشة. ارويّتها معمرة. ساقها حوليّة. اوراقها كنيّة خاسية النقصيص. أزهارها ثنيّة
قطرم الحرق، خشيشة الحرق	عشب معمرة فرعاء. اوراقها سنائيّة مسنّنة. أزهارها عطريّة بيضاء

الاجزاء الصالحة	التألف والاستعمال
اللحاء	مسحوقها يذيب الحصى الصفراوية
العشب يرتبها	نقيها او مغليا يفيد جميع انواع التشنجات ويوقف النزيف
الجذور واللحاء	اللحاء نقيد الاسهال والزطاري. الجذور لمعالجة الامراض الجلدية. قلبها مقو، كثيرا مقيء
الاوراق والتخار واللحاء	التخار مسهل خفيف، الاوراق واللحاء نقيد السفلس والقولاء
الانفاد المزهرة	مغليا يفيد داء الفواصل
الاوراق	مغليا قابض، يدر البول، يطهر الكلي ويفيد مجاري البول ويسهل الطاق
الخشب	صيتة نقيد اضطرابات الحليس والنقرس. مسحوقه يفيد السفلس
الجذور	صيتة او مغلية تقوي الجهاز العصبي وتساعد الحضم ونقيد التزلات الصدرية
التخار والاوراق والجذور	عصير التخار متعش ومضاد للحميات. مغلي الاوراق يفيد للعدة. مغلي الجذور لومل الكلي
الاوراق والازهار	مغليا يفيد الحميات للتقطعة والنقيض المستعصي. استعمالها حذر
الاوراق	مهلوسا او نقيها يفيد الامراض الجلدية وغشاة العين والتهاب الحجرة
العشب يرتبها	مغليا قابض خفيف، مضاد للتشنجات والاسهال، مرقق
العشب يرتبها	مغليا مقو ويفيد للعدة
التخار	عصيرها او مستحليا مقو، منفض، مضاد للمحر والزرخار، يدر البول.
الجذور	مسحوقها مسهل خفيف، مقيء، يدر البول. استعمالها خطر يوجب شدة الحذر
الاوراق والازهار	مغليا متعش، يفيد الريو والعلل الرومية والسعال الديكي
العشب وازهارها	يستعمل مستحلب الاوراق والازهار ضد المغم. الوراق للهروسة تنفي القروح
الاوراق	مغليا يفيد الكبد والتهابات الميلة وقد يغسل الرمل
الجذور	نقيها منبه، مرقق، موهج ويذر البول
الجذور	عصارتها مسهل خفيف. استعمالها شديد الخطر. يقال انها تحرق الشعر
الاوراق والازهار	مغليا مضاد للتشنج، طارد للغازات، يدر الطمث والبول
الجذر	مستحلبه يدر الصفراء ويفيد احتقان الكبد والريو والسعال
الاوراق	مغليا منفض، يفيد السعال، خافض للحرارة ويذر الطمث
الاوراق	مغليا يفيد الامراض العصبية والاستسقاء ويذر البول وينيب الحامض البولي
الاوراق والازهار	مغليا يفيد للنقص والسعال الديكي، مضاد للتشنج
التخار	عصيرها يدر البول، مرطب، ملين
الاوراق والجذور	عصير الاوراق يحرق الشعر. الجذور منعة ومقيئة، استعمالها خطر
عصارة الساق	استعمالها خارجي ولا يجرز الا بمصرعة الطيب
الجذور	مغليا يفيد الرشحات والامراض الجلدية
التخار	زيتها يفيد للمالك البولية والسيلان والتهاب الحجرة والتزلات الشمية
الجذور	مغلية يفيد الكساح، مقو، حافض، يدر الحليس والصفراء. يفتت الحصاة التوسفاتية
النباتات كما هو	مغلية يزيل السممة وتضخم الفدة الدرقية ويفيد تصلب الشرايين
الازهار	مغليا يدر البول، يفيد الرشح والمسالك البولية، يذيب الرمل
الحبيب	مستحضراتها عديدة توصف بأمر الطبيب
الاوراق	القليل من مغليا يقوي الدماغ. استعمالها خطر
الجذور	مغليا مقو
الاوراق واللحاء	خلاصتها السائلة تاخوظ مشهور. مضادة للسفلس وعفشة للفضخ
التخار	عصارتها او مغليا مسهل خفيف يستعمل في الاستسقاء والشلل واستحقان الملح
العشبة الزهرة يرتبها	مستحلبا ينقي الدم ويحصد الشباب. بلورها مثيرة للرغبة الجنسية
القروح والاوراق والازهار	عصيرها مضاد للمحر، يفيد العلل العصبية وداء الخنازير. منبت ويذر العلاب
البزور	مغليا مسهل ويفيد العلل العصبية
اللحاء	مسحوقها يبه الاغصان وينشطها، يقوي القلب، مضاد للتشنج
الازهار	صيتتها ومغليا متعشة، محرقة، مضادة للغازات
الجذور	نقيها مقو نشيط ويفيد للعدة
الازهار	نقيها يفيد للعدة، طارد للريح، مطحش

النبات	التعليق
قام آسي	جنية معمرة فرعاء فناء. اوراقها آسنة جامدة. ازهارها وردية، ثمارها عنبية مأكولة
قنب	عشب حولي. اوراقها كغصية مركبة وثرية. ازهارها ثنائية للسكن. يزورها مكورة
قنة مهجونة	عشب معمرة. اوراقها مركبة لثوية الوريقات. ازهارها ثنائية
قندلي بلبول	شجرة كبيرة فارشة. اوراقها مركبة وثرية. ازهارها عشقونية. ثمارها كستنية الشكل والقد
قنصور شائع	جنية معمرة. اوراقها مركبة وثرية. ازهارها بترقالية اللون، ثمارها سفلية
قنطريون صغير	عشب معمرة فرعاء. اوراقها رحيمة صغيرة. ازهارها وردية اللون
قوسية مخزنية	عشب معمرة زياء فرعاء. اوراقها صغيرة عملية النصال كالفورية العرف. ازهارها عظمية بنفسجية
قيصوم، ومان الأرض	جنية لينة فرعاء. اوراقها بسيطة خطية. ازهارها ذهبية اللون، ثمارها لينة كحب الآس
كانور	شجرة كبيرة دائمة. اوراقها اهليلجية جامدة. ثمارها زغبية نورية
كائن شائع	عشب حولي صناعية. اوراقها سنائية. ازهارها زرقاء اللون. ثمارها جراه. يزورها زنبية
كراويا	عشب عمو. اوراقها ريشية مغلوقة. ازهارها صغيرة بيضاء. يزورها زنبية
كرفس	عشب حولي ضخمة الجشت. اوراقها قرصية الانشباب مركبة. ازهارها بيضاء ممتحة بالاخضر
كرفس الماء	عشب معمرة غليظة الجذر. اوراقها مركبة وثرية. ازهارها بيضاء. ثمارها ككامير. يزورها دقيقة
كركم صباغي	عشب صفولية معمرة. اوراقها سنائية مستطيلة. ازهارها سنائية صفراء اللون
كروتن الزيت	جنية فرعاء. اوراقها رحيمة جامدة. ازهارها جميلة. ثمارها حبوب شبيهة بالخروع
كزبرة البير	عشب جلوسية معمرة. زناد اوراقها ثنائي الانشباب راعي القروع المروحة صغير الوريقات
كزبرة مزروعة	عشب حولي فرعاء. اوراقها مركبة مقرحة مشرقة. ازهارها وردية. ثمارها يزور دقيقة
كستة	شجرة ضخمة دائمة. اوراقها ناشرة العروق منشارة الحافة. ثمارها مأكولة اللباب
كشمش أحمر	جنية فرعاء فناء. اوراقها خلية مفككة ومسننة. ازهارها موشحة بالاحمر. ثمارها مأكولة
كشمش اسود	جنية فرعاء فناء. اوراقها خلية مفككة ومسننة. ازهارها حمراء. ثمارها مأكولة
كشوث السعز	نبات طقيلي غطي ملتف. اوراقه حرشية دقيقة. ازهاره وردية
كائلة المروج	عشب معمرة فرعاء. اوراقها خلية مقرحة ناشرة العروق. ازهارها صفراء اللون
كشون	عشب حولي فرعاء. اوراقها مهذلة. ازهارها بيضاء. ثمارها ككامير. يزورها صغيرة
كنكلييه، عسم ربيع	شجرة صلبة فرعاء. اوراقها مائلة النصال عاقبة الخضار. ازهارها وردية. ثمارها يزور
كنكينيا	شجرة فرعاء حمراء اللحاء. اوراقها كبيرة النصال. ازهارها خضوية. ثمارها جراه يزورها دقيقة
كهنة	شجيرة متسلقة فرعاء. اوراقها جامدة النصال. ازهارها وردية. ثمارها لحسية عافصة
كوشاد اصفر	جنية سرحة مستطيلة الجذور. اوراقها كبيرة. ازهارها صفراء اللون
كوكا	جنية معمرة فرعاء. اوراقها اهليلجية ناشرة العروق. ازهارها صفراء. ثمارها نوية حمراء
كولا، كوله	شجرة فارشة. اوراقها ابيدة جامدة. ثمارها قرون بيضلة تختلف من لوزتين الى عشر لوزات
كبس فرامي	عشب حولي. اوراقها لاقياسية. ازهارها زرقاء اللون. ثمارها خربيات. يزورها خردلية
لايرون ابيض	عشب معمرة فرعاء. اوراقها سنائية منشارة الحافة. ازهارها عطرية بيضاء اللون
لئين شائكة	جنية معمرة شائكة. اوراقها سنائية مسننة. ازهارها وردية
لسان الحمل الساني	عشب معمرة مقرة. اوراقها قرصية جامدة النصال. ازهارها ثنائية
لسان الحمل الكبير	عشب معمرة مقرة. اوراقها قرصية ملطية جامدة النصال. ازهارها صفراء اللون
لسان الكلب المخزني	بجلة معمرة فرعاء. اوراقها سنائية عملية النصال. ازهارها حمراء اللون
لوشيا ناعمة، حشيشة الجرح	عشب مستطيلة الساق. اوراقها مركبة وثرية. ازهارها صفراء. يزورها صغيرة
مازريون، دفنة سامة	جنية صغيرة معمرة فرعاء. اوراقها جلدية النصال. ازهارها انبوية عطرية. ثمارها حنية
مثنان، دفنة لاحقة	جنية معمرة فرعاء. اوراقها عروسة مستطيلة. ازهارها عطرية بيضاء. ثمارها حنية
مرآن شامخ	شجرة باسقة فرعاء. اوراقها وثرية. ازهارها بيضاء خضراء المواج. ثمارها جناحية
مشركة فيرجينية	جنية معمرة فرعاء. اوراقها يغبية مسننة الحافة. ازهارها صفراء اللون
مضاض أسود	شجيرة فرعاء. اوراقها اهليلجية مسننة الحافة. ازهارها جؤجؤة. يزورها صغيرة
مئل	جنية فرعاء شائكة. اوراقها مركبة ثلاثية. ازهارها فردية. ثمارها جراه
مكثانة مخزنية، مذاب الماعز	بجلة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة وثرية. ازهارها الى الزرقعة
ممتة، فساد الكلب	عشب حولي فرعاء. اوراقها اهليلجية غزبية. ازهارها بيضاء كريمة الرائحة

الأجزاء الصالحة	الطالع والاستعمال
الثمار	عصيرها يشفي الأمراض الجلدية الرطبة . مغليا يقطع الإسهال
البزور	مغليا يسكن تشنجات الأطفال ويغيد الربو والسعال
عصارة الساق	محرّضة ، مطهرة ، منبهة ، مضادة للتشنج ، منقحة وتدرّ الطمث
قشور الثمار	مغليا مضاد لتجلط الدم ، يبدى في معالجة الدوالي والبروسير واحتقان الكبد
البزور	مغليا ملين أو مسهل
العشبة باستثناء الجذور	تقيها أو مسحوقة يبدى ضعف المعدة ويشط الشبهة ويغيد فقر الدم
الأوراق	مسحولها يقوى الأعصاب ويكالفح النقم عند النساء . يبدى السعال الناشف والتزيف الرحمي
الأزهار والثمار	مغليا مقو، منبه ، مضاد للحمّيات ، يزيل الطلغ الأحمر من الجلد
زيت الكافور	جاف ومضاد للتشنج
البزور	اللبخة الساخنة تسكن آلام المعدة ويغيد التهاب الغدد التكفية وللمفاوية
البزور	مسحوقة مقو، هاضم ، يفتح الشهية ، يدرّ اللعاب ، ينشط العصائر المعدية
الجفت والأوراق	تنفث الصدر وتحلل الورم وتدفع الحصى وتفتح الشهية
الجذر والأوراق والبزور	الجذر والأوراق مضادة للحرق وتدرّ البول . البزور مهيجة للقوة الجنسية
المساق	تقيها ومغليا متمش ويدرّ البول
الحبوب	مسحوقة منقطة ، مسهل شديد الرفع . تستعمل بمعرفة الطبيب
العشبة برمتها	مغليا مضاد للسعال
البزور	مسحوقة ومغليا عرّض ، هاضم ، يغيد القلب والضغط الهوي
الأوراق	مغليا مضاد للسعال الديكي
الثمار	عصيرها يدرّ البول ويغيد من العلال المصيبة والقرس والشلل
الثمار والأوراق	عصيرها مرطب ، هاضم ، يفتح الشهية . مغلي الأوراق يبدى في التهاب المفاصل
الساق برمتها	مغلي يقوى على القبض للتعصي ويدرّ الصفراء
الأوراق	مغليا شاق ويوتر اغشية الكارة . يقيد الإفرازات للهيلية وينظم الحيض
البزور	مسحوقة تاعظ اذا مزج مع التفلفل والعسل . منبه للإعلاء ، طارد للغازات
الأوراق	تقيها بلنب الحصى الصفراوية ويغيد في بعض الحثيات
القشور	مسحوقة مقو، دافع للحثيات
الأوراق والثمار	عصارتها مقوية
الجذور	عصيرها مثير للشهوة ، متمش ، مقو، مخفض للحثيات
الأوراق	تقيها ومغليا مقو، مضاد للأوجاع المصيبة
اللوزة	مأكولة منبهة مقوية ، منقطة ، تدرّ البول
العشبة برمتها	مستحب للأوراق والأزهار يقيد الاساك الزمن ، مرقق ، مضاد للسعال ويدرّ البول
الأزهار	مسحولها ينظم الحيض ويمن اضطرابه ويمن السيلائ الأبيض
البتة برمتها	تقيها يقيد الأمراض الكلوية والعلل المصيبة ويدرّ البول
الأوراق والأزهار	عصيرها دافع للحصى ومضاد لتجلط الدم والإسهال
العشبة قبل التبدير	عصيرها دافع للحصى ومضاد لتجلط الدم والإسهال
الجذور	مغليا مخدر ، مسكن ، مضاد لوصق الدم والإسهال
الأوراق والأزهار	مهروسها يطهر الجرح ويغوى على الالتئام
للحاء	تقيها او مغليا منقطة ، مرقق ، مهيج ، يدرّ البول . الاستعمال عطر يوجب الحذر
للحاء	منقعة كاثرة
الأوراق والحاء	للحاء دافعة للحثيات . الأوراق ملينة ، مرققة ، مقوية ، تدرّ البول
الأوراق والحاء	مسحوقة ومغليا قابض ، مضاد للتزيف . يبدى العلال الشرايية والاحتقانات
للحاء	مسحوقة مسهل ، يفرز الصفراء . يقيد الكبد والحاراة
عصارة الساق	منقعة ، مقوية ، مضادة للتشنج
الأزهار	تقيها يدرّ الحليب ويغيد السلس . خلاصتها او مغليا علاج للسكزي
الأوراق والأزهار	تقيها ومغليا مضاد للتشنج ويدرّ الطمث







٢٨٤٢٧ - نباتات دهنية ، نباتات زيتية  
Plantes oléagineuses (F). Oleaginous plants (E).  
هي النباتات الممكن استهلاك ثمارها او بذورها لاستخراج  
الدهن او الزيت .

٢٨٤٢٨ - نباتات سكرية  
Plantes saccharifères (F). Sacchariferous plants (E).  
هي النباتات التي يستخرج منها السكر ، اشهرها قصب  
السكر والشوندر .

٢٨٤٢٩ - نباتات صبغية  
Plantes tinctoriales (F). Tinctorial plants (E).  
هي النباتات التي يستخرج منها مواد صبغية .

٢٨٤٣٠ - نباتات صناعية  
Plantes industrielles (F). Industrial plants (E).  
هي النباتات التي تزرع لاستعمالها الصناعي كالتبغ والقنب  
والكتان الخ ...

٢٨٤٣١ - نباتات ضارة  
Plantes nuisibles (F). Hurtful plants (E).  
هي النباتات الطوعية او الدخيلة التي تكثر بين الزروع  
وفي الميائل والحدائق فتستنزف خصب التربة وتسيء الى  
النباتات المزروعة || النباتات الضارة كثيرة المدد تقتصر ،  
في الجدول التالي ، على ذكر اضرارها واشهرها :


اسم النبات	اسم النبات
سراخس	انجيليا ام الف ورقة
سمادي	اروم ، لوف ميقع
سمد مستدير ، صلب الفجر	اريدارون ، شيخ الربيع
سورجان الغريف ، قاتل الكلب	اسل
شقار	اكوزيت هرمي ، بيش
شقيق ، عى الدجاج	اسوخ
شمر الكلب	انجبار ، اناروف
شوك	تغاف
شوكران	ثوم بري
طحالب	ثيل
حراوة	جمنقيل ، حامول ، سبع
عشبة القوي	حرميل
عوسج ، طليق	حشيشة القمل
غيشل	سليوب
فريون ، عنجد ، يتوع	حميص
قرطب	حميص المنافع
قصوان	سودان
قطريون	عريطل فترا
كرسة	خرم
كرنس بطني	خان
كشوث	دنفة
لبسان ، عرول بري	دوسة الحمار ، فرفارة
لباب	دوسر
لبن	ديجتاتين ، زهر الكشاثين
لسان الحمل	ذيل الثعلب
نجيل	رازيانة ، مشفيل
هدال	ريخاخ
هيسان ، فجل الخيل	زوان مسكر

نوع النبات	الاعضاء الجارية
شقار	جميع الاعضاء وتقدها بعد التجفيف
شقيق ، عى الدجاج	جميع الاعضاء
شوكران	جميع الاعضاء
صريمة الجدي	الازهار والثمار
مقلاب سوري	عصارة الساق
مقلوس ، ذنب	الاوراق
منفنية	عصارة الساق ولباب البزور
عائق	جميع الاعضاء اخصها البزور
عبر	جميع الاعضاء
عمرق فريجييه	الاوراق
عروق الصباغين	جميع الاعضاء
عشقة	الثمار
عسل	الاوراق والازهار
عنب الثعلب ، فناء	جميع الاعضاء
غفو	جميع الاعضاء
فاشرا	الجذور والنبوي والثمار
فاشرشين	الثمار
فريون ، عنجد ، يتوع	الاوراق والازهار والثمار
قناه بري	جميع الاعضاء اخصها لباب الثمر
قرطب الزروع	البزور
قنة مقلولة ، كلخ	الاوراق حتى الازهار
كرز غاري	الاوراق
كريدان ، مشان	جميع الاعضاء
كلاجة	اللحاء والتجيب
لبين المروج ، زغيلة	جميع الاعضاء
لفاح ، يروح	جميع الاعضاء
لكية مشارية الالدية	الاوراق تؤذي النواپ
لويليه	عصارة الساق
ليتارويه ، حياجب	جميع الاعضاء
ماميا صفراء	الاوراق والازهار
مذيذ	عصارة الساق
مضاض	اللحاء والاوراق والثمار
مزمرون	جميع الاعضاء
ملعى سامة	الاوراق بعد اكتمال نموها
لبق	الاوراق والثمار
هدال	الثمار
هورة	عصارة الساق والبزور
هيسان	الاوراق بعد ازهار النبات
هينوت تن	جميع الاعضاء


٢٨٤٢٤ - نباتات حولية  
Plantes annuelles (F). Annual plants (E).  
هي النباتات العشبية التي تعيش سنة او دون السنة .

٢٨٤٢٥ - نباتات عكولية  
Thaliophytes  
صف نباتات نظرية الجرم خالية من الجذور والسوق  
والاوراق والازهار . اغلب مشريات .

٢٨٤٢٦ - نباتات دنيا  
Végétaux inférieurs (F). Inferior plants (E).  
هي النباتات الوحيدة الخلية .



مخطط تسلسل أنساب المملكة الباقية



## ٢٨٤٣٢ - نباتات طوعية

Plantes spontanées, Végétation spontanée (F).  
Spontaneous plants (E).  
هي النباتات التي تعيش وتكاثرون تلقاء ذاتها .

## ٢٨٤٣٣ - نباتات عطرية ، ريحان

Plantes aromatiques (F). Aromatic plants (E).  
هي التي يستخرج منها العطر .

## ٢٨٤٣٤ - نباتات علفية ، نباتات الكلاء

Plantes fourragères (F). Fodder plants (E).  
هي التي تستعمل كغذاء للحيوان .

## ٢٨٤٣٥ - نباتات علبة ، Végétaux supérieurs (F). Upper plants (E).

هي النباتات العديدة الخلايا الكاملة التركيب، فيها الجذور والسوق والاوراق والازهار .

## ٢٨٤٣٦ - نباتات لحمية ، Plantes grasses (F). Thick-leaved plants, Succulent plants (E).

هي نباتات مخفية الازهار المكسدة بالمعاصرة .

## ٢٨٤٣٧ - نباتات معنولة

Plantes bisannuelles (F). Biennial plants (E).  
هي التي تعيش نحو عامين .

## ٢٨٤٣٨ - نباتات مصلحة ، Plantes amélorantes (F). Ameliorating-plants (E).

هي النباتات التي تفيد التربة وتصلحها ، اشهرها الباقية والترمس .

## ٢٨٤٣٩ - نباتات معزوقة ، Plantes sarciées (F). Weeding-plants (E).

هي النباتات التي تستوجب الزق .

## ٢٨٤٤٠ - نباتات معمرة

Plantes vivaces, P. pérennes (F). Perennial-plants (E).  
هي النباتات التي تعيش أكثر من سنتين .

## ٢٨٤٤١ - نباتات مفترسة

Plantes carnivores (F). Carnivorous plants (E).  
نباتات تخلفة الفضائل والاجناس بعضها قاص مشترك واحد اقتراس الحشرات || الاقتراس يتم بواسطة الازهار التي تشتمل كل حشرة تقرب منها ، اغصانها للذباب والبعوض والحمام || اشهر هذه النباتات المذكورة في موطنها ، هي :

Céphalote (F).

الاجنية

Sarracénie (F).

البوقية

Grassetto (F).

حشيشة الدهن

Dionée (F).

حائق الذباب

Népenthe (F).

السلوس

Drosophylla (F).

النقاص

Drosère (F).

التيدمان

## ٢٨٤٤٢ - نباتات منبهة

Plantes épuisantes (F). Tiring-plants (E).  
هي النباتات التي تستنزف خواص التربة .

Plantes textiles (F). Textile-plants (E).  
هي النباتات الصناعية للنسجية ، اشهرها القطن والكتان .

## ٢٨٤٤٣ - نباتات وعائية

Plantes vasculaires (F). Vascular-plants (E).  
هي النباتات التي يشمل نسيجها اوعية يجري فيها النسج .

## ٢٨٤٤٥ - نباتة ، Plante (F). Plant (E).

هي البنية واحدة النبات .

## ٢٨٤٤٦ - نباتي ، Végétal (F). Vegetable (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة مباشرة بالنبات .

## ٢٨٤٤٧ - نباتح ، Abollement (F). Barking (E).

هو صوت الكلب . وانبع الكلب واستنبح حله على النبات . قال الشاعر :

قوم اذا استنبح الاضباب كلهم

قالوا لأهم يولي على النار

فتمسك البول بجلا أو تجود به

وما تبول لهم إلا بمقدار

## ٢٨٤٤٨ - نباتح ، Guib

هو البرج ، نوع من الجبل ، اطلبه .

## ٢٨٤٤٩ - نباتح \* ، Scaire (F). Wantieap (E).

جنس حيوانات بحرية مغرقة من الرضويات المديات الاجل . انواعه المروفة نحو ١٥٠ صنفها بيض صفراء ، هياكلها غرويطية الشكل ، حلزونية ، ناشرة التخيد المستطيل . يكثر وجودها في بحار البلاد الحارة .

## ٢٨٤٥٠ - نباتح \* ، Albugo, Cystopus (S). Cystope (F).

جنس فطور مجهرية من عارة النباتات وفصيلة الصناتيات . انواعه المنزوية قليلة اشهرها النباتح الابيض الذي يذوي البع والصليبيات .

## ٢٨٤٥١ - نباتح الدبب الأبيض \*

Albugo tragopogonis, Cystopus tragopogonis (S). Rouille blanche des scoronères, Cystope blanc des scoronères (F). White rust of salsify (E). Weibler rost der schwarzwurzel (D).

وصم يصيب الدبب وغيره من نباتات فصيلة المركبات . سببه فطر مجهرى من النباتات يركب نسج الازهار في طورهما التثوي فيمرل عليها اللدائي والحياتي ما يسي الى نمو النبات وانجابه || مظهره الخارجى بثور بيض لا يباينة الترتيب والحجم تلو نصل الازهار تقشرها وتمنحها عن القيام بعملها الجسودى على الوجه الاكل . يكلف باستعمال احد مركبات النحاس .

## ٢٨٤٥٢ - نباتح الصليبيات الأبيض \* ، فطر

الصدء الأبيض

Albugo candida, Cystopus candidus (S). Rouille blanche des crucifères, Cystope blanc des crucifères (F). White blister of crucifers (E). Weibler Rost der Kreuzblütler (D).

وصم يصيب بعض نباتات الفصيلة الصليبية اغصانها الكرنب واللفت والملفوف والفجل والرشاد || سببه فطر مجهرى من النباتات يركب السوق والازهار في طورهما التثوي . مظهره الخارجى بثور بيض تلو نسج السوق والازهار والثمار تقشرها وتمنحها || يكلف كسائر الصناتيات باستعمال مركبات النحاس .

## ٢٨٤٥٣ - نباتة \* ، Epilmedium (S). Epimède (F).

جنس نباتات عشبية جذمورية من فصيلة البرباريسيات .



نباتح



نباتح الدبب الابيض



نباتح الصليبيات الابيض



نباتة

Remugle (F). ٢٨٤٦٣ - **نبته**  
Mustiness, Musty smell (E).  
النبتة : الرائحة الكريهة التي تكتسبها الاشياء المخزونة في  
اماكن لا تصلح .

Plante (F), Plant (E). ٢٨٤٦٤ - **نبته**  
واحدة النباتات تطلق على المشبه والفرسه .

Nemopteridae (S). ٢٨٤٦٥ - **نبثوريات** ٥  
Nemopteridés (F), Nemopteridae (E).  
فصيلة حشرات من رتبة شاربقات الاجنحة . اجناسها  
وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض اقطار البلاد  
الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة  
مستطيلة الاعناق . رؤوسها محرسمة . عينها صغيرة ،  
ناشرة . قرونها الاستعارية خيطية ، قصيرة . ملابسها  
الفكية مستطيلة ، منجلية الشكل . بطونها مستعرضة  
معتدلة التبطيط . اجنحتها لامشايوة ، الزوج الامامي  
صغير القد ، الزوج الخلفي مستطيل ، مجلدي الشكل .  
يسطه تراوح من ٣٢ الى ٥٢ سم . تألف البراري والادغال .  
يرقاتها مفترسة ، سريعة الحركة والانتهاز في التربة ||  
اشهر اجناسها النبتور .

٢٨٤٦٦ - **نبثوس اذنب**  
حشرة تدعى هبون المساحف . اطلسها .

Neptune (F), Neptune (E). ٢٨٤٦٧ - **نبثون**  
كوكب سيار يقع النظام الشمسي . اكتشف عام ١٨٤٦ .  
قطر دائرته يعادل ضعف قطر الارض وحجمه يبلغ ١٦  
مرة حجمها اما وزنه النسبي فثلاث مرات أقل من وزن  
الارض . دورته حول الشمس تستمر نحو ١٦٤ سنة  
٢٨٥٠ يوماً . سرعة انطلاقه في الفضاء نحو ١٩٥٤٨  
كيلومتر بالساعة . يدور في فلكه قران : تريتون ونيريد .

Curage, Curement (F). ٢٨٤٦٨ - **نبث**  
Cleansing, Water-pepper (E).  
هو تنظيف الجارير والاقنية والانابيب ...

Platyodon (S), Platycodone (F). ٢٨٤٦٩ - **نبثج**  
جلس لياتات عشية حويولة برية وريينية من فصيلة  
الجرسيات . انواعها المعروفة خمسة ، بعضها جامدة منتصبة  
تعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها متقابلية او عمية ،  
تصلها يضيي الشكل ، جامد الصلصة ، مسن الحافة .  
ازهارها فردية التنجيم ، ابطية وطرفية الارتكاز ، عديدة  
الالوان يكثر فيها الازرق والابيض ؛ ازهارها يستمر  
من تموز الى تشرين .

Haut perchis (F). ٢٨٤٧٠ - **نبثجة**  
هي الاجة المستطيلة النبت العالمي ج نباح .

Clavelés, Variole ovine (F). ٢٨٤٧١ - **نبثج**  
Sheep-pox (E).  
النبتج او جدري الضأن مرض معد يصيب النمل .

Advection (F), Advection (E). ٢٨٤٧٢ - **نبثد** ٥  
النبتد محرك الریح الاقنية الانتشار .

انواعها وضروبها البرية والريينية عديدة . جذاميرها  
مدادة ممرة . سورها منتصبة حويولة . اوراقها مركبة .  
وريقاتها مسنة الحافة || اشهر انواعها ما يتبع .

Epimedium sinense (S). ٢٨٤٥٤ - **نبثالة الصين**  
Epimède de China (F).  
نوع من النباق التريبي . ساقها مورقة تعلو من ٣٠ الى  
٤٠ سم . ازهارها عنقودي لبد التجميع . ازهارها صفيرة  
القد يضيء اللون . ثمرها يستمر من نيسان الى ايار .

Epimedium alpinum (S). ٢٨٤٥٥ - **نبثالة جبليكة**  
Epimède alpin, Chapeau d'évêque (F).  
نوع من النباق التريبي . ساقها مورقة تعلو من ١٥ الى  
٣٠ سم . وريقاتها يضيئة الشكل تعلو من ٤ الى ٦ سم .  
وتعرض من ٢ الى ٤ سم . ازهارها عنقودي التجميع ،  
هامي الارتكاز . ازهارها صفيرة القد ، صفر البتلات ،  
حر الفصل . ثمرها يستمر من اذار الى ايار .

٢٨٤٥٦ - **نبثالة ريشية الورق**  
Epimedium pinnatum (S), Epimède à feuilles pen-  
nées (F).  
نوع من النباق التريبي . ساقها عريضة تعلو من ٢٠  
الى ٦٠ سم . اوراقها جذعية الانتشاب ، ريشية الشكل ،  
مستطيلة الاسنان الشائكة . ازهارها عنقودي ، رطل التجميع .  
ازهارها صفيرة القد صفراء اللون . ثمرها يستمر من  
نيسان الى ايار .

٢٨٤٥٧ - **نبثالة كبيرة الزهر**  
Epimedium macranthum (S), Epimède à grandes  
fleurs (F).  
نوع من النباق التريبي . ساقها مورقة تعلو من ٢٥ الى  
٥٠ سم . وريقاتها دوقية الشكل مستطيلة الزناد . تصلها  
جلولي الصلصة ، ذلق الزام الاخير . ازهارها كبيرة  
القد ، عديدة الالوان التي تختلف باختلاف الضرب ، منها  
الايض والاصفر والاحمر والبفسجي . ثمرها يستمر  
من نيسان الى حزيران .

٢٨٤٥٨ - **نبثاكة** ٥  
Enation  
عارض يصيب اوراق النبات فيحجبها ويثو نصلها  
بتريدات وثنية تعلو الاضلاع والرواق .

٢٨٤٥٩ - **نبثالة**  
Toxotes (S).  
Toxote, Archer (F), Archer, Dartar (E).  
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة السمكيات .  
انواعها المعروفة ثلاثة موطنها المحيط الهندي والبحر الاحمر  
والخليج || يدعونها ببثالة لانها تقذف الحشرات والحوام  
الحامئة فوق سطح الماء بنقله ماء من فيها تجعل الطريدة  
تقتد توازنها وتسقط في الماء تنبتلها البثالة .

٢٨٤٦٠ - **نبثت**  
Végétal (F).  
هو النبات ، اطلسه .

٢٨٤٦١ - **نبثت الحراج**  
Sous-bols (F).  
Underwood (E).  
كل نبات عشبي او مجلي او جنبي يعيش في ظل الاشجار  
الحرجية .

٢٨٤٦٢ - **نبثت**  
يقال لبث الشجر اذا غرسه ورياه . ونبت المحبوب اذا  
بذرنا للاستنبات .

## ٢٨٤٧٣ - نَبَد

هو الإنياز ، اطباء .

## Centrifugation

## ٢٨٤٧٩ - نِيرَبَاسُورِي \*

*Gastrophilus haemorrhoidalis* (S). *Estre hémorroidal* (F).

نوع من النير ، ذبابته تطول نحو ١٠ م. ثوبها الى السرة السوداء ، صدرها الى الكفية الصفراء غط مشرب اسود .  
 بطنها ابيض المقدم ، اسود الوسط ، انهب المؤخر .  
 رواشها شفافة عادمة التشويش . رقاتها حمراء اللون طولها يراوح من ١٣ الى ١٦ م. تمر بالمدقة وتقيم فيها بعض الوقت وينتهي بها المطاف الى السرم حيث تعلق بعض الوقت فتسبب الحكة وكزف الدم || تركيب الدواب على اختلافها وانحصار الخيل .



نير الأبل

## ٢٨٤٧٤ - نِير ، شَعْرَانِكَة

*Estrus* (S).*Estrus* (F). *Botfly, Gadfly* (S).

جنس حشرات من فصيلة النيريات . انواعه قليلة العدد جميعها غليظة الشكل ، هليئة الجسم ، صتيرة الخلف ، دقيقة الذيل القصير ، مزركشة الثوب ، شفافة الجناح .  
 انثاها تلتقي المكن دون ان تمسح لانها عادمة المراتز الذخيرة || افترارها تحصل من رقاتها التي تدعى ننفذ والتي تعيش في معدة الحيوان وتحت جلده . ج نبار وانبار .

## ٢٨٤٧٥ - نِير\_الْإِبِل \* ، شَعْرَانِكَة الْبَعِير

*Cephalomyia maculata* (S). *Céphalomyle du chameau* (F). *Botfly of the camel* (E).

نوع من النير يركب الأبل والجلوبيس ، ذبابته تطول من ١٠ الى ١٢ م. ثوبها الى الخلفي يعلو تجتمع اصفر .  
 تهرق مكنها بين الورير بل ظهورها وياطل الأبل فينتف عن رقات خيطية هليئة تغلقها الأبل بالنسبا من جلودها الى حلقها فيطونها حيث تفسل وترقي سى السح الجلدية فتنب الجند مع انهاء طورها البرقي وتقسق على الارض وتحول الى كزود ثم الى حشرة تنيد سيرتها الاولى .



نير الضأن

## ٢٨٤٧٦ - نِير\_الْبَقَر

*Hypoderma bovis* (S).

هو لقاعة البقر ، اطباء .

## ٢٨٤٧٧ - نِير\_الضَّان \* ، شَعْرَانِكَة الضَّان

*Estrus ovis* (S). *Estre du mouton* (F). *Botfly of the sheep* (E).

نوع من النير يؤدي النعم ويهزط . ذبابته تطول ١٠ م. ثوبها الى الكفية الصفراء الواج . صدرها اسود النقيض ، بطنها اسود التقيج . رواشها شفافة يعلوها عند قواعدها ثلاث نقط سود . تظهر من ايار الى ايلول .  
 انثاها تصير المكن بين الحب الذي يحف بالأنف فينتف عن وضعه او يده بضع ساعات عن رقات دقيقة تسمى الى داخل الأنف فتصل في مجاريه وتجاوبه وتبقى حتى اكمال طورها البرقي الذي يدوم من ١٠ الى ١٦ شهرا .  
 والبرقة عند نهاية تطورها تطول من ٢ الى ٣ سم . وتعرض نحو ١٠ م. ثوبها الى البياض الاصفر يعلو حيد اسمر .  
 يتكاثم بطني جباه الضأن بزيت السمك الذي يمنع اقتراب النير .

## ٢٨٤٧٨ - نِير\_الْفَرَس \* ، شَعْرَانِكَة الْفَرَس

*Estrus equi, Gastrophilus equi* (S). *Estre du cheval* (F). *Botfly of the horse* (E).

نوع من النير ، ذبابته تطول من ١٣ الى ١٤ م. الانثى اكبر قدما من الذكر . ثوبها الى الصفراء الاخير تملو مزركشة سمراء . رواشها شفافة . يتوسطها تديش اطبل .  
 تظهر في اواخر الصيف ثم تلي مكنها على اجسام الخيل والابقان والامير . مكنها اسطواني الشكل ابيض اللون داكن اللون يلفق بالسر الى ان ينفق عن رقات وشية الشكل هليئة الخدي غراء اللون ، هليئة ينشب في الجلد فينبه ما يدنو الدابة الى لحمه تعلق البرقة بالسان الذي يتلقاها الى الحلق ومنه تسير الى المعدة حيث تقترق بين طياتها الحاطية الى ان تم اسلاكها والتي تدوم نحو عشرة اشهر فتخرج مع الروث وتتحول الى كزود صلبة اللاد مجيها من ٣٠ الى ٤٠ يوما ثم تنشق الصلبة عن الحشرة الكاملة فتطير وتعيد سيرة حياتها المذكورة .

## ٢٨٤٨٠ - نِيرِيَّات ، شَعْرَانِيَّات

*Estridae* (S). *Estridae, Bot-flies* (E).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها متوسطة الحجم ، هليئة الجسم ، اشرها الى الخلفي للزركش بالاسمر والاسود . عظمها قريب الشبه من عظم النمل . اشرها قايمة لكنها خالية من جهاز الوخر والرز . رقاتها طفيلية . بعضها يتطفل على الدوابين وانحصار الخيل .

## ٢٨٤٨١ - نِيرِيَّة \*

*Nebria* (S).*Nébrie* (F). *Nébrie* (E).

جنس حشرات نافعة مقترمة من فصيلة النيريدات . انواعها عديدة جميعها صغيرة القد ، طولها يراوح من ١٠ الى ٢٠ م. ألوانها زاهية ، انحدارها حنطية اللون . تعيش على المحيط البحرية تحت الحجارة والانتفاش والاختباب . اشهر انواعها :

*Eurynebria complanata* (S).

نيرية الرمال

*Nébrie des sables* (F).*Nebria brevicollis* (S).

نيرية لصيرة العنق

*Nébrie à cou court* (F).

## ٢٨٤٨٢ - نِيرِيَّة قَصِيرَة الْعُنُق \*

*Nebria brevicollis* (S). *Nébrie à cou court* (F).*Nebria brevicollis* (E).

حشرة قانصة من فصيلة النيريدات وربة مضفات الاجنحة . تألف الاراضي المزروعة والبساتين والغابات . قوتها ما تيسر لها من الحشرات والديدان والحوام || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٤ م. ثوبها الى السوداء الخديني اللامع . رأسها مستعرض الجسم ، قصير العنق ، فكها سليمان . زباناها خيطيان . عيناها صغيرتان .  
 ثماني التميزر القندي النظامي الخطوط . ارساها خابية المقل || الانثى اصغر قدما من الذكر ورايت قويا منه واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواخر الخريف . تسرح في النهار . تساند في آب . تمتع المكن تحت الجحالة والابل || البرقة عند بلوغها اكبال الجسمودي تطول من ١٨ الى ٢٠ م. جسمها اسطواني الشكل ، سداسي الروطب ، اسمر اللون ، اسود الرأس والشرج والرواجبه || طور الاكمال الذي يستمر من ٥٠ الى ٩٠ يوما ينقضي في بيث عمودي الفود تحفره البرقة على عمق ٥ الى ٦ م.



نير باسوري



نيرية قصيرة العنق

## ٢٨٤٨٣ - نِيرِيدِيَّات

*Nebriidae* (S).*Nébridae* (F). *Nébridae* (E).

فصيلة حشرات نافعة مقترمة من ربة عديدة الاجنحة .

Faulbaum, Pulverfaulbaum, Schwarzholtz (D). Frangola, Ontano nero, Alno nero, Frangolo (I).

نوع من النبق، شجرته صغيرة القند تملو من ٣ الى ٧ أمتار . فروعه سرسة لونها الى الاسود الازرق المواج تعلوه ريشة ريداء . براعمه خمرانية . اوراقه متعاقبة عابلة ، تصلها سباعي او تساعي المروق البارزة . ازهاره خاسية الاجزاء ، ابطية الاذنكاز ، لا قياسية التجميع . ثماره طيبة . مشبو خفيف الوزن يستخرج منه بحد التخمير نوع من البارد شائع الاستعمال . ازهاره يستمر من نيسان الى تموز .

٢٨٤٩٤ - نَبَقُ الصَّبَاغِين \* ، شَوْكَةُ الصَّبَاغِين Rhamnus tinctoria, R. utilis (S). Nerprun tinctorial, N. des teinturiers (F). Dyer's buckthorn (E). Immergrün (D). Ramno del tintori (I).

نوع من النبق وهو جنبة شالكة تملو نحو ثلاثة أمتار . فروعهما زيتية اللون ، اغناها جزوية . اوراقها تطول من ١٢ الى ١٤ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ ، لصلها الى الخضار الاصفر المواج . فروعهما بارزة ملتفة قليلة العدد . ازهارها خشوية خاسية الاجزاء . ثمارها صناعية اللون يستخرج منها صباغ اصفر || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٢٨٤٩٥ - نَبَقُ الْمَسِيح Nabka (F). هو الصدر ، اطليه .

٢٨٤٩٦ - نَبَقُ جَرْدِي Rhamnus alpina (S). Nerprun alpin (F).

نوع من النبق وهو جنبة كبيرة تملو من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم . ساقه عرياء ، فروعه سرسة منتصبة . براعمه حرشلية الخمار . اوراقه عابلة ، تصلها سنن الحافة عروقه بارزة عددها يراوح من ٩ الى ١٢ زوجاً . ازهاره خاسية الاجزاء . ثماره صغيرة القند يقال انها طيبة || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٨٤٩٧ - نَبَقُ كَلِفُولِيَّة Rhamnus californica (S). Nerprun de Californie (F).

نوع من النبق ، شجرته صغيرة القند تملو من مترين الى خمسة أمتار . ساقه كهباء . فروعه خلية اللحاء شالكة . اوراقه ابيدة ، تصلها جانبد الصفحة ، سنن الحافة . قسني اللون ، بارز المروق . ازهاره خلية الاجزاء الخارجية . ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٢٨٤٩٨ - نَبَقُ لُبْنَانِي Nerprun du Liban (F). هو الزفرين اللبناني ، اطليه .

٢٨٤٩٩ - نَبَقُ مَتَرَدَاف Alatern (F). هو الزفرين الجردى ، اطليه .

٢٨٥٠٠ - نَبَقُ مَتَدُون Rhamnus pumila (S). Nerprun nain (F).

نوع من النبق وهو بجملة صغيرة مثقولة تعيش بين الصخور تملو نحو ٢٥ سم . ساقها وفروعهما متعقبة سرسة . اوراقها . تطول من ٣ الى ٦ سم . تصلها سنن الحافة بارز المروق التي يراوح عددها من ٥ الى ٧ أزواج . ازهارها خشوية خاسية الاجزاء . ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٢٨٥٠١ - نَبَقُ مُسْهِل \* ، شَجَرَةُ الدَّمَكِن Rhamnus cathartica (S). Nerprun purgatif, Bourguépine, Noirprun, Epine de cerf (F). Common buckthorn, Purging buckthorn (E). Echter Kreuzdorn, Purgidorn (D). Ramno purgativo, Prognolino, Spina servina (I).

نوع من النبق وهو شجرة شالكة ، ترطب في الارتر به الجصية ، اجناسها واانواعها عديدة ، جميعها صغيرة القند او متوسطة . قرونها الاستثمارية ثمانية الفواصل . اناؤها مختلفة وكثيرة . تعيش على السواحل قرب الشواطئ البحرية . اشهر اجناسها النبرية .

٢٨٤٩٤ - نيريس \* Nebris microps (S).

Nebris (F).

سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من شالكات الزعانف وفضيلة البهاريات . اعطائها بحار بعض المناطق الحارة . يكثر وجودها قرب شواطئ القويان || جسمها اهليجي الشكل مشتل الحميم والتطيط يطول نحو ٣٥ سم . ثوبها الى الشبهة الغصية يمتد في الرأس والظهر . تتميز برحابة شفها وبصفر عينيها || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٨٤٩٥ - نيش Nish (F).

شجر ورقه كدروق السنور اوزن من الانبوس خشبه احر تمل منه خماسر الجناذب . وهو اصغر من شجر السنور واشد اجاماً (اللسان) .

٢٨٤٩٦ - نبض Poulis (F). Pulse (E).

هو الصوت الذي يحدثه اندفاع الدم من القلب الى الشرايين .

٢٨٤٩٧ - نَبَقُ Extrapoler (F).

استخلص من سلسلة معلومات او وقائع مفروضة معلومات او وقائع جديدة تسمح باطلاة السلسلة .

٢٨٤٩٨ - نَبَقُ Nibba (F).

نبط الير : استخرج ماها .

٢٨٤٩٩ - نَبَقُ Nibba (F).

النَبَق : شجر تتخذ منه النبي ومن اغصانه السهام يثبت في قلة الجبل والنايات منه في السفع الشريان وفي الخفيض الشوط . قال مرة : النَبَق شجر اصفر البود وزيتيه ثعلبه في اليد واذا تقادم اجر . الواحدة نَبَق . وفي الحديث ذكر النَبَق ، قيل : « كان شجراً يطول ويعلو فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اطاك الله من عود فلم يطل به » (اللسان) .

٢٨٤٩٠ - نَبَقُ ، قَطْع Polliniser (F).

To polliniste (E).

نَبَق : نوع من النبق ، نقل غبار الطلع من متك زهرة الى مياسها او مياس غيرها من الازهار .

٢٨٤٩١ - نَبَقِيَّات Albugés, Cystopées (F).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الصناتيات ، تتميز بمشع غليزي يبي مجهز بمخاريف حوصلية . تكاثرها خيطي ، خارجي ، مستقيم الانشعاب ، سبيقي الرصد البولي . اناؤها قليلة العدد يجمعها جنس واحد يدعى النباغ .

٢٨٤٩٢ - نَبَقِي Rhamnus (S). Nerprun (F).

جنس اشجار وجنات سرعية من فصيلة النبقيات . اناؤها نحو ٦٠ مشطها شالك الاغصان والافان . اوراقها متعاقبة ، منقطة ، بسيطة . ازهارها خشوية او ثنائية المسكن . ثمارها كروية خوخية صغيرة القند || اشهر اناؤها ما يتبع .

٢٨٤٩٣ - نَبَقُ اسود \* ، جَلْهَر ، عَوْسَج اسود Rhamnus frangula (S). Bourdaine, Bourguène, Aune noir, Bois à poudre, Bois de zhen (F). Alder buckthorn, Black alder, Glossy buckthorn (E). Gemeiner



نيريس



نبق اسود



نبق الصباغين



نبق مسهل

## ٢٨٥١١ - نبتة

صوت التيس في زمن السفاد . يقال بـ " التيس " .

## ٢٨٥١٢ - نبتة

Plantule (F). Small plant (E). هي البتة الصغيرة لا تزال في طور النشوء البدائي .

## ٢٨٥١٣ - نبتة

Curure (F).

Dirt, Muck, Sewage (E).

هي الاشباة والاسمال والخال والأوساخ التي تستخرج من البئر والحرس والقناة عند تنظيفها .

## ٢٨٥١٤ - نبتة

Monodonta (S).

Monodonta, Labio (F). Monodonta (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مغذيات الارسل وفصيلة المديريات . انواعها المروقة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصداؤها شبه قمية الشكل ، صغيرة القد ، بجلة الألوان الزاهية المرقشة او المنطجة بالاسود والابيض . فوطاتها نصف دائرية الانفراج ، حمزة النار الداخلي ، مجهزة بنتوء صغير شبيه بالنس او بالنبت || اجسامها حلزونية . رؤوسها صغيرة ثنائية القواسم الغرومية المعينة . ارجلها مهدبة الحمار . اسفلها قرنية المادة .

## ٢٨٥١٥ - نبتة

Dothidella (S). جنس فطور مجهرية من البياضات وفصيلة المشويات . اجسامها ميمية لا قياسية ، تتكاثر بركوة على ساقه الرقيقة الجلية الجلول ، بعضها يبيضي الشكل شفاف || اعرف انواعه الثلاثة التالية .

## ٢٨٥١٦ - نبتة الكشمش

Dothidella ribesia, Plowrightia ribesia (S).

فطر مجهري يركب سوق الكشمش فيطغها ويسبب بيلها . مظهره الخارجي غضين مستطيلة حنطة اللون تملو حاء الفروع قشيب تنقيدها وتنقيتها ثم بيلها . || يكاتح بقطع وصرق الفروع المرودة وينفخ الاشجار بسائل يورده المحلول ١٪ .

## ٢٨٥١٧ - نبتة المطاط

Dothidella ulei, Scolectotrichum heveae, Fusicidium macrosporum, Passalora heveae (S).

فطر مجهري يصيب المطاط ليفي انتاجه يد ان يؤذي جميع اجسامه الخوائية || مظهره الخارجي يقع زينة تبتدئ صغيرة ثم تكبر وتسبب بياض التسنج المطرب فيبدو للنصل كالنربال . وقد يركب الانتاز والثار فيؤذيها ويكتنف الاغصان فيلطنها يقع قرصية سود || اضراره تمتد الى نسبة عطب الاوراق والاغصان لانها تترك في انتاج المطاط . يكثر في الاراضي الرطبة الرطبة في الاقاليم الحارة . يكاتح بتعفيض الآفة وباستعمال احد الفواطير القديمة .

## ٢٨٥١٨ - نبتة النمل

Dothidella trifolii, Sphaeria trifolii, Polytetrinidium trifolii (S).

فطر مجهري يصيب اوراق النمل ، حل اختلات انواعه ، يطغها ويسبب بيلها || مظهره الخارجي نكت سود مستديرة الشكل قطرها نحو ١ م . تركب النمل على سطحه السفلي . تظهر وتكاثف في الربيع قبل حلول الصيف . اضراره تمتد الى نسبة عطب الاوراق .

تتلو من تروين الى سجة انتار . فروصها وانفاتها شاذكة الاطراف . اوراقها وانفاتها متقابلة . نصال اوراقها فضية الشكل مقطوعة طولاً من ٥ الى ٩ سم . وتعرض من ٢ الى ٦ ، حرقتها باردة ملققة . اضرارها خشوية ، خاصة الاجزاء ثامرها طيبة تستعمل في عدة علاجات يطرية وهي سوداء اللون ، بتسجسية اللباب الحوضي || اضراره يستمر من ايار الى حزيران .

## ٢٨٥١٢ - نبتة

Rhamnaceae (S).

Rhamnaceae (F). Rhamnaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة . الفصائل اجناسها وانواعها زهاء ٤٥٠ اعطائها جبال وهضاب البلاد المعتدلة والحارة والحارة . اشهر اجناسها اللبق والصاب . نباتات شجيرات وسبنيات . اوراقها لا قياسية التشكيل ، منسبة البسيطة والمركبة . انواعها ابطية خشوية او ثنائية السكن . ثامرها لحية منها المأكولة وبعضها طبي وصناعي .

## ٢٨٥١٣ - نبتة

Souche (F). Stump (E).

النبتة هي الجرثومة كقوك نبتة الشجرة اي جرثومتها . ج نياك وليوك .

## ٢٨٥١٤ - نبتة

Nebalia (S).

Nébalie (F). Nebalia (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات العليا وبقيات الصف . انواعها قليلة العدد تعيش في المواق التي تكثر فيها الرخول البحرية والاسمال || اجسامها صغيرة قريبة الشبه بالقديس . ميرتها مزنة . قوامها الصدرية متساوية القد ، ثنائية الخادف .

## ٢٨٥١٥ - نبتة

Sagitta (S).

Flèche (F). Sagitta (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدييات الارجل وفصيلة الرميانات . انواعها المروقة قليلة العدد . جميعا مية . اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . اسرارها متوسطة العدد . تظهر على سطح الماء بعد غروب الشمس || اجسامها عريانة مستطيلة شبه وشمية الشكل ، حلزونية المادة ، شفافة . افواها غطسية مهدبة الحافة . زعانفها مستطيلة الشكل ، الليلية منها ملفوفة .

## ٢٨٥١٦ - نبتة

Népanthe (F).

نبات يعرف بالوس ، اطلبه .

## ٢٨٥١٧ - نبتة

Flora (F). Flora (E).

جراج النباتات في قطر او بلاد . يقال نبت لبنان ونبت الشرق الادق و... .

## ٢٨٥١٨ - نبتة مائية

Flora aquatique (F).

Aquatic flora (E).

النباتات التي تعيش في الماء او في الخائق .

## ٢٨٥١٩ - نبتة

Végétatif (F). Vegetative (E).

نعت تربوي يدل على المقدور الانباتي .

## ٢٨٥٢٠ - نبتة

Forjet, Forjetura (F).

Projection (E).

النور تنو غير عمودي يحصل في البناء . او تنو غير مستقيم يحصل في التنظيط .



نبلة



نبتة



نبتة الكشمش



نبتة النمل



Portée (F). Bearing (E).

٢٨٥٢٩ - نتاج

النتاج مجموع ما تقسمه اثنى الحيوان البون من جراء في ولادة واحدة . راجع حمل .

Produit (F). Produce (E).

٢٨٥٣٠ - نتاج

اسم يشمل وضع جميع البهائم .

Exsudat (F).

٢٨٥٣١ - نِتَاح ، نُتُوح ، نَتَى

Exudate (E).

Vis-à-vis (F). Opposite (E).

٢٨٥٣٢ - نِتَاق ، حِيَال

بني داره تتأق داري أي قبالها .

Apogamie (F).

٢٨٥٣٣ - نِتَالَة ، نَتَل

Apogamy (E).

مجموعة الوسائل التي يمكن بعض النباتات الدنيا من التكاثر في حالة فقدانها الشقية .

Transpiration (F).

٢٨٥٣٤ - نَتَح

Transpiring (E).

رشح الإفرازات المائية الزائدة عن حاجة النسيج الحيواني والنباتية في بعض الظروف الخاصة .

Nitrification

٢٨٥٣٥ - نَتْرَجة

تفاعل جزيئي كيميائي يحول الازوت العضوي إلى أمونيا في فنتري فينترالي ولا يتم إلا عن طريق الجراثيم التي تغير الحالة . لذلك فجراثيم النتجة حل ثلاثة أنواع لثلاث حالات .

Nectostoma (S).

٢٨٥٣٦ - نَتَسْتُوم

Nectostoma (F). Nectostoma (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الشبقيات مفعومات المئانة . انواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة كاجسام الانقليس . رؤوسها واعناقها اسطوانية . عظامها مستطيلة ، مقطوعة الاطراف الفنتلية الشكل . اشدافها كبيرة . زعانفها الظهرية والشرجية تتقابل وتلتحم عند طرف الذنب || اعرف انواعها واشهرها نتستوم المتوسط .

٢٨٥٣٧ - نَتَسْتُوم أُرْبَد ، رَصَاصِي \* ، نَتَسْتُوم

Nectostoma melanura (S). المَتَسُود

Nectostoma gris plomb, N. de la Méditerranée (F).

Nectostoma melanura (E).

سمكة بحرية بيوض من النتستوم . اعطائها البحر الأبيض المتوسط . تتميز من اسماك الجاهج والتناف . مسرورها المادي في الطبقة التي يراوح عمقها من ١٥ الى ٣٥ مترًا || جسمها شبه انقليسي الشكل ، اسطوانية العنق والرأس والحلق ، يطول نحو ٨٥ سم . مسكها حاد الحراشف تشبه مادة مخاطية لزجة || ثوبها في اليردة الرصاصية الفضية المزاج || زعنفتها الظهرية تلتقي بالشرجية عند طرف الذنب || لحمها متوسط الصنف ، اجود من لحم الانقليس .

Radicle (F). Radicle (E). نَتَش ، نَتِيش

٢٨٥٣٨ - جذر البزرة الجنيني .

Perspiration (F). Perspiration (E).

٢٨٥٣٩ - نَتْع

التع صدور النتج من السام الجلدية على شكل بخار لا يشاهد بالعين المجردة ولا ينشأ منه الجلد كما في الرق .

٢٨٥١٩ - نَبِيد ، نَبَات ، نَبِيدَات

Nabidae (S). Nabidés (F). Nabidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في جميع اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، معتدلة البنية ، ملونة . رؤوسها صغيرة مدققة . اعطائها رباعية الاجزاء . عيونها جانبية الارتكاز . قرونها الاستشعارية مستطيلة ، رباعية الفصل . كواسلها يرمية الشوزن ، ترتكز على قواعد شبه مستديرة . حجانها صغيرة مخرمة . حناجيبها متباينة الحجم ، يكثر فيها الصغر والقصر . رواشها لاحفة . قوائمها نشيطة || جميع انواعها غاشلة تعيش على اوراق النباتات البرية .

Vin (F). Wine (E).

٢٨٥٢٠ - نَبِيد ، خَمَر

شراب كحول يحصل من اختار عصير الثمار اغصها العنب .

٢٨٥٢١ - نَبِيد الإِجْاص ، نَبِيد الكَمْثَرِي

Poiré (F). Perry (E).

شراب يتخلص من عصير الاجاص .

٢٨٥٢٢ - نَبِيد العَسَل

شراب يستحصل عليه من تخمير العسل مع عصير العنب .

Fromage (F). Cheese (E).

٢٨٥٢٣ - نَبِير

هو اللبن ، تقول اكلت النبير .

٢٨٥٢٤ - نَبِيس الخَلْتَج

Nabis ericetorum (S). Nabis des bruyères (F).

حشرة غاشلة من فصيلة النبديات . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٨ م . رأسها صغير الحجم ، بني اللون ، احمر الحاج . عظمها مستطيل الطول ، طليق . عيناها صغيرتان ، بارزتان . ذواتها مدققتان مستطيلتان . كواسلها بني مزركش بالاسود . حجبتيها صغيرة سوداء . ظهورها لاحف ، وردي اللون . بطنها اسمر الملب . قوائمها مستطيلة || تألف الحراج . قوتها اوراق الخلتج والقطلب ...

٢٨٥٢٥ - نَبِيس لَقَرِي

Nabis ferus (S).

Nabis sauvege (F).

حشرة غاشلة من فصيلة النبديات . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٩ م . رأسها صغير ، حنطي اللون ، اسمر الحاج . عظمها طليق ، معتدل الطول . عيناها صغيرتان ، زباناها مستطيلتان . كواسلها الى الحنطي الاسمر . حجبتيها صغيرة سوداء . ظهورها لاحف ، حنطي اللون ، وردي المزاج . اسود المرقق والاحصاف . بطنها اسمر . كثيف الحنط والزغب . قوائمها مستطيلة . حنطية || تألف البرامح والمراعي . قوتها اوراق الاعشاب على اختلاف فصائلها .

٢٨٥٢٦ - نَبِيفَة

النبيقة زيمة للكرة اذا هطلت . ج نباق .

٢٨٥٢٧ - نَبِيكَة

هي الورقة التي اعترتها النباكة .

Ombo, Protubérance (F). نُتُوء

Umbo, Protuberance (E).



نَسَم المتوسط

## ٢٨٥٥٣ - نَشْرَة

النشرة منزل من منازل القعر الشامية ، يقال لها أيضاً انث الأسد . وهما كوكبان بينهما رقعة قدر شبر يملوها تلطوئهم أكبر كأنه قطع بحباب || وقيب النشرة يدعى سعد الفايح .



نوم اشهب

٢٨٥٥٤ - نَشَطُ  
Levée (F). Gathering (E).  
هو أول ظهور النبات بعدما يصعد القربة ويقل أن يملأها .

٢٨٥٥٥ - نَكُورُ  
Prolifique, Multipare (F).  
Multiparous (E).  
صفة الحيوان الكثير التناج || أنثى الحيوان تلد عدة أولاد معاً .

٢٨٥٥٦ - نَشِيرُ  
Ebrouement (F). Snorting (E).  
النشير هو عطاس الدواب . تقول نثرت الدابة : عطست .

٢٨٥٥٧ - نَشِيْطُ  
Embryon (F). Embryo (E).  
هو الملقحة النباتية .

٢٨٥٥٨ - نَجَا  
Naja (F).  
في الصل ، جنس حيات خبيثة من اميات الاخاذية .



نجر

٢٨٥٥٩ - نَجَابُ  
Corticole (F). Bark miner (E).  
النجاية هي الحشرة التي تقضي الدورة اليرقية من حياتها داخل لحاء الأشجار .

٢٨٥٦٠ - نَجَارُ  
Lactarius lactarius (S).  
Lactaire, Lactaire pêche-laie (F).  
سكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الاسقمريات . موطنها البحر الاحمر والخليج وبحار الهند . جسمها يطول من ٢٥ إلى ٣٠ سم . رأسها مقطوم ، وضغتها الشرجية فارقة . ثوبها الالحصار القضي المراج . لحمها لذيذ الطعم جيد الصنف .

٢٨٥٦١ - نَجَافَة \*  
Pelamis (S).  
Pélamis (F). Pelamis (E).  
جنس حيات خبيثة سامة من اميات الاخاذية وفصيلة الهيدروفيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار مناطق المحيط الهادي || اجسامها مستطيلة شبه مزاوية الشكل . رؤوسها صلبة مخروطية الشوذن . اذنانها مبطلة محيطية . انوارها ثنائية اللون ، النصف العلوي عايد الخضار الالسي او الازرق الاسود والنصف السفلي الالبردة . اذنانها مرقوشة .



نَجَافَة

٢٨٥٦٢ - نَجَالُ  
Dactyloctenium (S).  
Dactylocténion (F).  
جنس نباتات عشبية ، برية و مداعة ، معمرة من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة سامة . متبها بعض اقاليم البلاد الحارة من الشرق الاطل و افرريقية الشرقية || جميع انواعها شظينة . عصفها ضيق مستطيل ، يكتر فيه التسنين الدقيق الحاد . انزاعها طري مكنل ، ليد الزغب .

٢٨٥٦٣ - نَجَالَة  
Agrostologie (F).  
Agrostology (E).  
درس يبحث في نباتات الفصيلة النجيلية .

## ٢٨٥١٠ - نَتَل

النتل والنشل بيض النمام الفارغ .

٢٨٥٤١ - نَشَلَة  
Bourse (F). Purse (E).  
هي الاينة النسيمة استكملت جرمها المعيز .

٢٨٥٤٢ - نَشُوجُ  
Pleine (F). Full part (E).  
النشوج : الحامل من الدواب وجميع الحافر .

٢٨٥٤٣ - نَشُومُ  
Neotoma (S).  
Néotome (F). Neotoma (E).  
جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة الفأريات . انواعها المعروفة بملاية العدد اعطائها بعض المناطق الامريكية . تأتت الموامق القريبة من الماء . قوتها المواد النباتية والصفادع وبعض الفشريات اعصها السرطان || اجسامها ريمة مستوية القد تطول من ٣٠ إلى ٣٥ سم . بما فيها الذنب . وهي شبيهة بالجرذون وبالقداد في آن واحد . انوارها تختلف مع الانواع || تحلل اجسامها في الهوم وهي مؤلفة من اثناف مستطيلة وحجر وسطى فسيحة وتعرض الانفاق من البين واليسار عدة دعاليز تحزن فيها مؤنة الشتاء || الاثاف تضع من ٤ الى ٨ ادراع ترصنها نحو اربعة اسابيع || اعرف انواعها واشهرها :

٢٨٥٤٤ - نَشُومُ اشْهَبُ \*  
Neotoma cinerea (S).  
Néotome gris (F).  
طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الشبهة يسمر بعض النشوم في الرأس والظهر ويغير في البطن . وبره متدل الطول . ذنبه جيشل يشبه ذنب السنجاب الا أنه أقصر منه .

٢٨٥٤٥ - نَشُومُ لَثُورِيْدَا \*  
Neotoma floridana (S).  
Néotome de la Floride (F).  
طوله نحو ٣٥ سم . ثوبه الى البردة السوداء . بطنه الى البردة البغراء و بره نام قصير . ذنبه حشفي لششار عادم الدير .

٢٨٥٤٦ - نَشِيْجَة  
Conclusion

٢٨٥٤٧ - نَشَاثُ  
Onguent (F). Unguent (E).  
المرم يش به الجرح .

٢٨٥٤٨ - نَشَارُ ، نَشَرُ  
Fécondité (F). Fécondity (E).  
كثرة التناج في البهايم .

٢٨٥٤٩ - نَشَالَة  
Débail (F). Clearing, Cutting (E).  
تراب الركبة يستخرج منها وكل تراب يستخرج من حفرة او ردم .

٢٨٥٥٠ - نَشَدُ  
Pointer (F). To point (E).  
نشد : نبت . يقال نشد الفطر ونشدت الكمامة : خرجت من الارض .

٢٨٥٥١ - نَشَرُ  
Epandre (F).  
نثر الشيء : ذره بالساري .

٢٨٥٥٢ - نَشَرُ الْأَسْمِدَة (F).  
Epandage des engrais (F).  
Scattering of fertilizer (E).  
هو ذر الاسمدة على التربة وقد يتم أيا باليد او بواسطة آلات خاصة تقوم بهذا العمل .

Etoile polaire (F). **٢٨٥٨٠ - نجمة القطب**  
Pole-Star (E).  
نجمة القطب أو القطب نجم نير بين الجدي والفردين  
تبني عليه القبلة .

Ostracnionidae (S). **٢٨٥٨١ - نجميات**  
Ostracnionidae (F). Ostracnionidae (E).  
فصيلة اسماك بحرية من قبلة ملحويات الفكوك اجناسها  
وانواعها عديدة ، اشهرها أبو صندوق .

Aster (F). **٢٨٥٨٢ - نجمة**  
هي الأسطر ، اطلبه .

Nutrition (F). **٢٨٥٨٣ - تئوج**  
راجع مادة اخذاه .

Stelleridae (S). **٢٨٥٨٤ - نجميات**  
Stelleridae (F). Stelleridae (E).  
شعبة حيوانات من صف الثوكيات يشمل نجوم البهر .

Agropyrum junceum (S). Agropyrum, Froment des  
Jones (F). Sea wheat grass (E). Binsenquecke, Binsen-  
weizen (D). Agropiro (I). **٢٨٥٨٥ - تيجير \* سيقون**  
نبات عشبي بري مرعوي من الفتيات وفصيلة النجيليات.  
يكثر بين الزروع وفي الاراضي المذساة وصل جوانب  
الطرقات الريفية .

Agropyrum repens, Triticum repens (S). Agram,  
Chilendent rampant (F). Couch grass, Quitch grass,  
Twitch grass (E). Echte quecke, Grasquecken (D).  
Gramigna, Caprinalla (I). **٢٨٥٨٦ - تيجير زاحيف \***  
نبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات . ساقه عقدية  
مدادة نشطة كثيرة الانشباب والاذى لانها تثب التربة  
وتعين الاعمال الزراعية وتسيء الى النباتات المزدرة ان لم  
يقض عليها .

Agrostis (S). Agrostide (F). **٢٨٥٨٧ - نجيرة**  
سقية من خشب ليس فيها قصب ولا غيره .

Agrostis (S). Agrostide (F). **٢٨٥٨٨ - تجيل**  
جنس نباتات عشبية مرجية معمرة من فصيلة النجيليات .  
بعضها يزدهر في المروج ، اكثرا ينبت عرضاً ويسوء  
الى الزروع وسائر النباتات || اشهر انواعه ما يلي .

Agrostis alba (S). Agrostide blanche, Florin, Trainle,  
Pavine (F). White bent grass, Florin grass (E).  
Velisses Straussgras, Floringras (D). Agrostide  
blanca, Pennacchini (I). **٢٨٥٨٩ - تجيل أبيض \* ، أروا أبيض**  
نوع من النجيل وهو نبات مرعوي بري معمر يملو من  
٢٠ الى ٥٠ سم . صفه ضيق النصل جميل الخضار .  
سنبلاطة صغرة اللد ، متباعدة النصب ، يضاء اللون .

Agrostis rubra (S). Agrostide d'Amérique, Foin  
rouge (F). Herd grass, Red top grass (E). Herden-  
gras (D). Fieno rosso (I). **٢٨٥٩٠ - تجيل أحمر \* ، أروا أحمر**  
نوع من النجيل المرجي المرعوي المعمر يملو من ١٠ الى  
٦٠ سم . صفه مستطيل النصل الجامد . اتحاد غليظة  
جزوية اللون . سنباله مستطيلة ، سنبلاطة متفرقة .

Liber **٢٨٥٦٤ - تجب**  
الطبقة السفلى من اللحاء تكون بين القشرة والخشب في  
سوق وجذور النباتات الرمالية .

**٢٨٥٦٥ - تجبة**  
هي قرصة النمل اي ضمن قريته المد لحسن المأازن .

Péricarde (F). **٢٨٥٦٦ - ثبث ، ثبث**  
Pericardium (E). هو الشف ، خلاف القلب .

Coteau, Plateau (F). Slope (E). **٢٨٥٦٧ - تجد**  
النجد ما اشرف من الارض وارتفع . ج أجد وأجد وأجد  
ونجد . والنجد المكان لا يجر فيه .

**٢٨٥٦٨ - تجد \* ، نجلدة ، زهرة العمد**  
Coleus (S). Coleus (F). French nettle (E). Buntlippe,  
Buntblättrigenessell (D). Coleus (I).  
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعه  
المعروفة نحو ١٢ معظما بري طبي وبعضها زينة .  
سوقها رفاه ، تملو من ٢٠ الى ١٠٠ سم . اورانها متعاقبة  
معتقة كاملة ، فصالحا قلبية الشكل ، خلية ابشرة ،  
مسنة الحافة . ازهارها صغرة اللد ، ضمية التجميع ، عديدة  
الالوان ، يكثر فيها الازرق .

Dolsage (F). Planing (E). **٢٨٥٦٩ - تجر**  
نحت الخشب وفسه وتركبه .

Simulie (F). Simallium (E). **٢٨٥٧٠ - نيجرس \***  
النجرس والنجرس والقرس : بوض صغير اجزم الأنف  
يشبه السكت ، لسه مؤلم .

Transhumance (F). **٢٨٥٧١ - نجة**  
طلب الكلا في موضعه ، راجع انتجاع .

Pastoral **٢٨٥٧٢ - تجمي**

Déboisement (F). **٢٨٥٧٣ - تجف**  
Deforestation (E). التجف هو قطع الاشجار من اصولا وابادتها .

**٢٨٥٧٤ - تجفة** القليل من الشيء .

Bloquer (F). **٢٨٥٧٥ - تجكل**  
نجل التربة : شفها للزراعة .

Etoile (F). Star (E). **٢٨٥٧٦ - نجم**  
بوجه عام كل كوكب سماوي ثابت او سيار يدعى نجما ،  
ما عدا الشمس والقمر . وبوجه خاص كل كوكب  
نير يتلألأ في السماء ويبدو ثابتاً في مركزه الفضائي .

Acaule (F). **٢٨٥٧٧ - نجم ، نجمة ، مكر**  
Acaulous, Stemless (E). اسم تعريبي وصني يطلق عل كل نبات لا ساق له .

Ostracion cornu (F). **٢٨٥٧٨ - نجم أعظم**  
سكة بحرية مشهورة باسم ابوصندوق اعظم ، اطلها .

Aléris (F). **٢٨٥٧٩ - نجم لامع**  
هو حشيشة الآخ ، اطلها



نجد



نجرس



تجير



تجير زاحيف



تجيل ابيض



تجيل احمر

وهو لا يتأثر بألوانه النافث التي إنما يتأثر بألوان الربط وبالانزلات الحامضية التي تتلفه ببطء من الاصلاح المختلفة الألوان والتركيب اشبهها الزنجار الاخضر السام ، وهو ما يدعو الى « تبيض » أي طلاء الاواني النحاسية بالمطبقة بالتقدير .



نَجِيلُ أَرْزَقٍ

٢٨٩٠٠ - نَحَّالٌ (F), Bee-keeper (E).  
من نشاطي تربية النحل .

٢٨٩٠١ - نَحَّالَةٌ (F), Bee-keeping (E).  
هي من تربية النحل . وهي تتركز على اصول وواعد لا بد من الالام بها للوصول الى اجود النتائج ولاجتناب اوهم المولب || لا نذكر شيئاً مما يجب معرفته عن النحلة ونظام حياتها وسلبيتها او فقيرها إنما نرشد الذين يتباطون هذه التربية الى افضل السبل التي تزود استرداد النجاح .  
اخصها : درس المتفحة لمرفة الموائع التي تكثر فيها التباينات المختلطة و تركيز للنسل في الاماكن الصالحة ضمن المنطقة المستعينة و المحافظة على التوالق قوية ، كثيرة العدد ، آراءها ملكات فتية و منع الانزاغ قدر المستطاع و الإبقاء على ما يلزم من صل في كل غلية او فقير كذلك لفصل الشتاء و اجتناب زيارة القفران وتدخينها في شتى المناسبات والظروف المادية .



نَجِيلُ اسود

٢٨٩٠٢ - نَحَّامٌ \* ، بَسْرُوشٌ ، سَرْخَابٌ ، مِرْزَمٌ ،  
Phœnicopterus (S).



نَجِيلُ عَائِقٍ

Flammant, Flamant (F), Flamingo (E).  
واحدة نخامة ، والنحام جنس طيور مائية من فصيلة النحاميات . انواعه ستة جميعها طويلة الاعناق والسيقان الى حد الفراخية و ارتفاعها متصبة يراوح من ١٥٠ الى ١٧٠ سم . مناقيرها غليظة منقعة صفر الاجسام سود اللامط . انواطها الى الحشرة البرودية الزاوية قوادم سواقطها سود . اناتها يبيض الريش حر القوادم || اعطاه السواحل البحرية . يألف دقار الماء ومضبات الأهر . يجمعت مصائب يراوح عدد افرادها من ٥٠ الى ٥٠٠ اناتها تحفن من ٢ الى ٣ بيضات في عش رفيع تركزه على الحفص تحتل عليه طوال مدة الترخيم كما يحتمي الفارس القرس .



نَحَامٌ

٢٨٩٠٣ - نَحَّامِيَّاتٌ  
Phœnicopteridae (S).  
Phénicoptéridés (F). Phœnicopteridae (E).  
فصيلة طير وحيدة الجنس من صفيحات المنائر وربة كفيات القدم .

٢٨٩٠٤ - نَحْبُوبُ الْعَابِ \* ، تَطَّاطُ الْعَابِ  
Nemobius sylvestris (S). Grillon des bois, Némobie (F).  
حشرة من الجهديات صغيرة القدر ريمة الشكل سوداؤ الرأس صفراء الدرز مبراه الجسم المذهب والمنقط بالاسود والافير . ظنايبها ملسمة بالذهب الشائك الثلاثي التجميع . ظهران ذكوريا اسمر اللون يلحف نصف الاذن من البطن . ظهران اناثا صغير القدر يكاد لا يلحف نصف الزا من الاذن من البطن || يظهر في اوائل الصيف . يألف النابات والارحاج . مسرعه يستمر من الشروق الى فحة الليل . يعيش على المواد العضوية . يستكن تحت الجلالة والبليل .



نَحْبُوبُ النَابِ

٢٨٩٠٥ - نَحْبُوسٌ شَفَّافٌ \* ، تَطَّاطُ إِيْطَالِيّ  
Ecanthus pellicens (S). Grillon d'Italie, Ecanthe diaphane (F).  
حشرة من الجهديات متوسطة القدر ، نحلة الجسم ، مظلوة الرأس ، خفراء الثوب الاصفر المواج . طولها يراوح من

٢٨٥٩١ - نَجِيلُ أَرْزَقٍ \* ، نَجِيلُ كَوَكَبِيّ \*  
سَبِيلَةٌ  
Agrostis verticillata (S).

Agrostide verticillée, Trainasse (F), Switch grass (E). Haargras (D). Granacchio (I).  
نوع من النجيل المرجي المزوي الممر . يعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم . صفه عريض النصل المستطيل . اعماه جامدة ، مابقة الخضار . سنباله كبيرة القصد ، شديدة الإضرار البتفسي المواج .

٢٨٥٩٢ - نَجِيلُ اسود \*  
Agrostis vulgaris (S). Agrostide commune (F).

Bent grass, Black quitch grass (E). Rotes Straussgras (D). Agrostide vulgare (I).  
اشهر انواع النجيل واشبهها وهو من النباتات المعمرة الجذمورية المادة المؤذية التي تميش وتكتثر في جميع الاربة اخصها المروية . اضراره تشمل التربة وما عليها من نبات . || استصاها من التربة واجب رغم صموده تحفيقه .

٢٨٥٩٣ - نَجِيلُ عَائِقٍ \*  
Agrostis nebulosa, A. capillaris (S). Agrostide nébuleuse, Foin capillaire (F). Cloud grass, Bird grass (E). Prachtvögel (D). Agrostide capillaire, Erba d'uccello (I).

نوع من النجيل المرجي المزوي يعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم . صفه عايق الخضار . اعماه جامدة . سنباله كثيفة التجميع فسخة .  
٢٨٥٩٤ - نَجِيلُ عَطَرٍ  
Flouve odorante (F).

هو الانترسكات ، اطبا .

٢٨٥٩٥ - نَجِيلِيَّاتٌ  
Graminées (F). Graminaceae (E).

فصيلة نباتية من وسيدات النقلة . اجناسها ٣٠٠ وانواعها ٣٠٠٠ ، معظمها اعشاب حولية وبعضها جذموري ممر . سرتها قصية جوفاء السلايات . اوراقها شرفانية صفية مستقيمة المروق . انزاها ما يكثر فيها سلبية التجميع . فمارها جروب غنية بالمواد النشوية ، واليها تنتمي اهم النباتات الغذائية والمغذية كالقمح والذرة والارز والشعير والخرمال الخ ...

٢٨٥٩٦ - نَجِينٌ  
Néogène (F).

ماكان حديث العهد من طبقات الارض السطحية ، اطلب نوبين .

٢٨٥٩٧ - نَحَّارٌ  
Embryogénie (F).

Embryogeny (E).  
علم يبحث في غثل المراحل التي يمر بها الجسم الحيواني او النباتي من حين تكوينه الى تمام كاله .

٢٨٥٩٨ - نَحَّازَةٌ \*  
Embryogénèse (F).

Embryogenesis (E).  
التحازة علم يبحث في اصل الملقحة وفي الاجزاء التي تتكون منها .

٢٨٥٩٩ - نَحَّاسٌ  
Cuivre (F). Copper (E).

معدن جزوي اللون اسف المواج يشتر بقباليه للطر والسحب وبابصاليته الكهربائية || يندو (نح - نح) ٦٣,٥٧ وزنه الأتوني ٦٣,٥٧ ، ثقله النوعي يراوح من ٨,٨٥ الى ٨,٩٥ ، صلابته من ٥,٣ الى ٥,٤ ينصهر في ١٠٧٥ س .

- Apis fasciata (S). نحلة مصرية  
Abeille égyptienne (F).  
Apis Indica, A. dorsata (S). نحلة هندية  
Abeille indienne (F).  
Apis cocopria (S). /  
Abeille grecque (F). نحلة يونانية

٢٨٦١٠ - **نَحْلَة**  
النحلة كوكبية نجوم موهبا الجنوب مركزها تحت قدمي قنطريون بين كوكبة الحرباء وكوكبة الصليب . عدد نجومها ١٣ منها نجم واحد من المرتبة الرابعة .

٢٨٦١١ - **نَحْلِيَّات**  
Apidae (S).  
Apidés (F). Apidae (E).  
فصيلة النحل من رتبة غشائيات الاجنحة .

٢٨٦١٢ - **نَحْوَر**  
Divercation  
هو الاتحاد الانقباضي من الشكل الجسوري المعروف . اسبابه كثيرة تعود الى عوامل شتى اخصها الاوصام وفعالية الادوية وبنى تأثيرها في النسخ المنسية .

٢٨٦١٣ - **نَحْوَص**  
Anesse pleine (F).  
النحوص هي الاثان الوشعية الحامل . ج تحص ونحاص .

٢٨٦١٤ - **نَحْصِي** ، **شَكْوَة** ، **سِقَاء**  
Baratte (F).  
Churn (E).  
وعاء تخمض فيه الكثانة لاستخراج الزبدة .

٢٨٦١٥ - **نَحْصِيَّة** \*  
Cadre (aplc.) (F). Section (E).  
لوح من الشمع المصنوع يحمى اطار من خشب يوضع في القفاز فيشيد النحل عليه تخاريه ويمر اقراصه . ج تحت .

٢٨٦١٦ - **نَحْصِيَّة**  
Substratum  
ركيزة الصفات المميزة في الشيء .

٢٨٦١٧ - **نَحْصِيص** \*  
Amorphe (F).  
عديم التبلور ، غير محدد الشكل .

٢٨٦١٨ - **نَحْصِيَّة**  
Abre petit (F).  
هي الاربوس العطر ، اطليه .

٢٨٦١٩ - **نَحْصَانِيَّة**  
Sélectivité (F). Selectivity (E).

٢٨٦٢٠ - **نَحْصَاس** ، **جَنْبَل**  
Maquignon (F).  
Horse-dealer, Horse-coper (E).  
هو تاجر الخيل . وتجارة الخيل تدعى نخاسة وجنيرة .

٢٨٦٢١ - **نَحْصَاشِيص**  
Oües (des poissons) (F). Gillis (of fish) (E).  
هي في الاسماك الخروق الفرجية التركيب القائمة عند موضع جانبي الرأس . . وظيفتها صرف الماء الذي ترتشفه الاسماك بمقاطعتها عند التنفس . الواحد نخشوش .

٢٨٦٢٢ - **نَحْصَاع** ، **نَحْصَاع**  
Moelle (F). Marrow (E).  
يقسم النَحْصَاع الى ثلاثة اقسام : النَحْصَاع الطلي او رَمّ العظم والنَحْصَاع الشوكي او الحبل الشوكي والنَحْصَاع المستطيل . فالنَحْصَاع الطلي نسيج دني يحمى العظام المحيطة بالباطن . ويريد في تجاريف العظام وفي ثياهاها الاسفنجية وهو على نوعين ، ابيض اغبر مركزه في تجاريف العظام الطويلة واسمر احمر للمواج مركزه في فجوات الثياها الاسفنجية || اما

٩ الى ١٥ م . ظهورها شفاف يطول عند الذكر من ١٠ الى ١٥ م . وعند الانثى من ٩ الى ١١ م . زباناها خيطية الشكل مجنحة الطرف . سيقانها الخلفية تطول من ٨ الى ٩ م . مراز الانثى جالس الانتصاب يطول من ٦ الى ٨ م . يظهر النحوص الشفاف عند اوائل الصيف . يأنفالا ذغال والاصشاب الرقيقة . اناله ترز السرء في سوق ووروع النباتات المختلفة اعصها الاقسن والحرفث والشنداب والبرواق والخبيات على اختلاف انواعها والتبع وسرورع الكريمة || دباهه ونيفاته وحشراته الكاملة تعيش على اوراق النبات والمواد العضوية || مسرعه جديري يستمر من الغروب الى الفجر .

٢٨٦٢٦ - **نَحْص** \*  
Piedmont (F).  
اصل الجبل وصفه .

٢٨٦٢٧ - **نَحْص**  
Asepsia (F).  
Aseptic methods, A. treatment (E).  
مجردة الطرائق العلاجية التي تستصلح الميكروبات دون الاستعانة بالمواد المضادة لها .

٢٨٦٢٨ - **نَحْصَة**  
هي اللهجة ، اطلبها .

٢٨٦٢٩ - **نَحْل** \*  
Apis (S). Abeillas (F). Bees (E).  
جنس حشرات مفيدة من فصيلة النحلويات ورثة غشائيات الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة ، اعطائها العالم . قربها الكبير ورسوق الازهار . اجسامها اسطوانية الشكل . عينها مركبة ، اعطائها قارضة لاصقة . صدورها نشطة تحمل ثلاثة ازواج من الاجنحة الشفافة . بطونها مركبة من عدة حلقات وربجات تقضي بسلام لامع عند المعاملات . والنحل يعيش عيشة اشتراكية تعاونية في مستعمرات مستقلة مؤلفة من ثول توامه ملكة او اثني كاملة تعيش نحو ٥ سنوات وظيفتها منح السرء . جسمها مستطيل الشكل عديم الخمل للاذن مما يمنحها عن تناول الغذاء لتلقاها وما يدعو وسيفاتها الى زرعها المستمر . ثم البيخور وهو الذكر الذي يكوم الملكة مرة واحدة في حياتها يموت حل اثرها . والياخبر لا يقل عددها في الثول الواحد عن بضع مئات ، وفي اكبر حيجا واغلظ جيسا من المعاملات وفي عادمة الشفام اللامع . حياتها تطول من ٨ الى ١٠ اسابيع وتعيش ما تحية المعاملات . ثم العاملة وهي اثني ناقصة التركيب ، عادمة الشوار الجنسي ، وظيفتها جني الرقيق والطلم وصنع الدنج والشمع والعسل وسراسة الخلية وتغيير شاتها وشان الخفية والسعي . وفي مجوزة بشلام لامع تستعمله للدفاع عن النفس . والمعاملات التي يبلغ عددها عدة آلاف تشكل اكثر من ٩٩ ٪ من مجموع افراد الخلية او الثول . وفي تعيش من ٣ الى ٥ اسابيع باستثناء فصل الشتاء حيث تعيش نحو عشرة اسابيع . || اما اشهر انواع النحل فهي ما يلي :

- نحلة اطالية  
Apis ligustica (S).  
Abeille italienne, A. ligurienne (F).  
نحلة سوداء ، نحلة مدغسقر  
Apis unicolor (S).  
Abeille noire, A. de Madagascar (F).  
نحلة صيفانية ، نحلة عربية  
Apis arabica (S).  
Abeille arabe (F).  
نحلة خالصة  
Apis mellifica (S).  
Abeille commune (F).  
نحلة صينية  
Apis socialis (S).  
Abeille de Chine (F).



نحوص شفاف



مخور

نحل



نحية

وأورقه حازمة مطعومة واسعة عند الاكثار منها || تنورة يستمر طوال شهر تموز .

٢٨١٣٣ - **نَخْرُوط الصَّايغين ، عَظِيم ، عَظِيم**  
*Baptisia tinctoria* (S). *Baptisia tinctorialis* (F).  
 نوع من النخروط الزراعي الصناعي . جذوره غليظة مستطيلة . ساقه منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم . أوراقه معتقة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات . وريقاته فضية متعكسة متساوية ؛ نصلها مائل البشرة ، طابق الفخار . أزهاره فردية التجميع ، محورية الانكناز ، متوسطة القد ، صفراء اللون || يملو صبغية ، غصنها أزرق اللون كالكثيرة || تنورة يستمر من تموز الى آب .



نخرط

٢٨١٣٤ - **نَخْرُوط مَكْشُوب** (S). *Baptisia perfoliata* (F).  
*Baptisia perfoliata* (F).  
 نوع من النخروط التزييني للممر . ساقه منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم . أوراقه بسيطة ، مقنوعة ، مستديرة الشكل ، مائلة البشرة . أزهاره فردية التجميع ، محورية الانكناز ، صغيرة القد ، صفراء اللون . || تنورة يستمر طوال شهر آب .

٢٨١٣٥ - **نُخْرُوب** (F). *Alvéole, Cellule* (F).  
*Alveolus, Cell* (E).  
 هو عين الشهاد المسماة الاصلع التي يصنعها النحل ويمتد فيها سره او يضع فيها عمله . ج تخاريب .



نخرة الارز

٢٨١٣٦ - **نَخْرِيَّات ، وُهَيْوِيَّات** (S). *Tilletiaceae* (S). *Tilletiácees* (F). *Tilletiaceae* (L).  
 فصيلة فطور مجهرية من وبة الدعاميات تتميز بطايلها اللاتيلية التركيب والانتظام . دعاميات بسيطة لا وريقة ، بونياتها عديدة فردية التجميع او مدفوعة || اشهر اجناسها : الانتوريز ، اللاتيليه ، النقيطة ، الطاعول ، الميلاوتوزيوم ، النخريه ، النويوسيه .

٢٨١٣٧ - **نَخْرِيَّة ، وُهَيْوْن** (S). *Tilletia* (S).  
 جنس فطور مجهرية من فصيلة النخريات يركب عدة نباتات اخصها نباتات الفصيلة النجيلية . || جرمة وتلد يتميزان بدعاميات قصيرة غليظة مدفوعة البويبات . بوطه اصغر اللون كزهر الخنثى غير مملأ كما ان يمتل فيصبح كالحباب || اشهر انواعه ما يلي .

٢٨١٣٨ - **نَخْرِيَّة الأُرْدَة ، وُهَيْوْن الأُرْدَة**  
*Tilletia horrida* (S). *Carle du riz* (F).  
 فطر مجهرى يصيب الارز فيؤذيه . اعطاه فسيحة الارجاء قتل البلاد الاسوية والامريكية . || يركب بعض اثمار الشكول فيسوط الى بؤرة بولية تنفجر من غبار لزج كثيف لونه الى السرة الفضيحة يتدل كالخيوط المشرقة من الزهرة الى الماء قبل ان يجف ويطار . اضراره زهيدة لا تتسبب الكائنة النباتية كما يحسن مداركة البذار باحد العلاجات الواقية كتنظيف الثالب في بعض مركبات الزئبق او الفرمول .



نخريه الخنثى

٢٨١٣٩ - **نَخْرِيَّة الخنثى ، وُهَيْوْن الخنثى**  
*Tilletia tritici*, *T. caries*, *Uredo caries*, *Lycoperdon tritici* (S). *Carie du blé*, *C. du froment* (F). *Stinking smut* (E). *Stinkbrand des weizens*, *Steinbrand* (D).  
 فطر مجهرى يصيب الخنثى من اختلاف انواعها . يكثر في البلاد المعتدلة المناخ والباردة . يركب الحب فيحول

النخاع الشوكي فهو جزء من الجهاز العصبي يمتد في القناة الفقرية من النخاع المستطيل الى الفقرة القطنية الاولى . وهو ضفيرة من الالياف العصبية وظيفته نقل الاحساس بين اطراف الجسم والمراكز العليا منها والىها || واغبر النخاع المستطيل الذي يقع بين مؤخر المخ والنخاع الشوكي فهو احد اجزاء الدماغ الذي يحسن على الجهاز العصبي ويسيطر على تنقل حركات القلب والتنفس والضغط الخ . وهو يشبه الحبل الشوكي من حيث تركيز المادة السمره في القسم الباطن وللمادة البيضاء في المحيط الخارج .

٢٨١٣٣ - **نُخَالَة** (F). *Son* (F). *Bran* (E).  
 هي الفصائل الخاتمة من نخل الحبوب بعد طحنها لا سببا الخنثى .

٢٨١٣٤ - **نَخْمَاة** (F). *Pruina visqueuse* (F).  
 مادة عضوية طليسية التركيب لزجة تغطي بشرة سوق واوراق بعض النباتات .

٢٨١٣٥ - **نَخْبِيَّة** (F). *Select* (F). *Select* (E).

٢٨١٣٦ - **نَخْتَة** (F). *Picoter* (F). *Peck at* (E).  
 نخت الطائر الشرة : تقرها .

٢٨١٣٧ - **نُخْجَة** (F). *Bœufs de travail* (F). *Oxen* (E).  
 النخعة هي البقر الموامل دون تمجيز .

٢٨١٣٨ - **نَخْر ، دَهَب** (F). *Nécrose* (F). *Canker* (E).  
 داء في نسج النبات سببه فطور طليسية مختلفة .

٢٨١٣٩ - **نَخْر الحَبُوب** (F). *Carie* (F).  
 مرض فطري يمتري الحبوب لا سببا الخنثى . سببه بعض الفطور النخريه المجهرية . احطاب نخريه .

٢٨١٣٠ - **نَخْرُوط ، بَاطِسِيَا** (S). *Baptisia* (S). *Baptiste* (F).  
*False indigo* (E). *Farfærhülse* (D). *Baptista* (L).  
 جنس نباتات طبية من البذراريات وفصيلة القرنيات الفراقية . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها صباغي او طبي . اربابها مدادة . سوقها منتصبة . اوراقها لا قياسية الشكل منها المركبة والمنقطة والمخاضة . ازهارها لا نظامية التجميع . ثمارها حنابل اهليلجية قصيرة القد . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٨١٣١ - **نَخْرُوط اَبْيَض** (S). *Baptisia alba* (S).  
*Baptisia blanche* (F).  
 نوع من النخروط التزييني . ساقه منتصبة تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه مركبة ثلاثية . وريقاته اهليلجية الشكل مقطوعة الطرف . أزهاره فردية التجميع ، محورية الانكناز واطيلة ، كبيرة القد ، لونها الى البياض الماجي . تنورة يستمر طوال شهر سبتمبر .

٢٨١٣٢ - **نَخْرُوط البَر ، فَيْلَكَة بَرِّيَّة**  
*Baptisia australis* (S). *Baptisia australis* (F).  
 نوع من النخروط الطبي والتزييني . جذوره غليظة . ساقه منتصبة تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه مركبة ثلاثية الوريقات . وريقاته اهليلجية مقطوعة ، نصلها مائل البشرة ، جميل الفخار الزاهي . أزهاره عتقودي التجميع هامي الانكناز . أزهاره ضفيرة القد زرقاء اللون || جذوره

سولية أيضاً وثلاثية التنسيت كما في الذكر، لكن توجيها ثلاثي البتلات المرصصة وأسدتها شقية حشرقية ومغاثا ثلاث وهي بنسية الشكل نجمة منفصلة وسامها لائفة وشارها وسيدة الزهرة. || أشهر أنواعه على الإطلاق هو النخل المعروف أي النخيل .

#### ٢٨٦٤٦ - نَخْلُ الدَّقِيقِ \*

Phoenix farinifera, Ph. pusilla (S). Dattier à farine (F). نوع من النخل غليظ القصر . ساقه تملو نحو ٢٠٠ سم. بينما لا يقل قطرها عن ١٠٠ سم. سفعه كسفت النخيل وأشد أخضراراً . جريده يتصحن عند زامه الأخير . مهده منخفضة سهل الهند الشرقية . يرغب في الأثرية الدبالية المروية . ثماره صغيرة القند صفراء اللون لا تتوكل يستخرج من جماره ساقه الضخم لبوب نشوي المادة مأكول يقال أنه كثير الفوائد الصحية. || يزرع خارج مهد البحرين فقط .

٢٨٦٤٧ - نَخْلُ الدُّهْنِ \* ، نَخْلَةُ الزَّيْتِ ، إلْوَيْس Elaeis guineensis (S). Eléide, Eléis, Avolra, Palmier à huile (F). Oil palm (E). Olpalme, Guineische Palme (D). Palma avoira, P. da olio, Aouara di Guinea (I).

نوع من النخل ، مهده بلاد إفريقية الاستوائية أخضها غليظاً ، ساقه حلقة اللحم مرطاه . سفعه ريشي التركيب . ثماره نووية الشكل ، جوزية اللحم ، صفراء اللون ، تحضن ثلاث عبات يستخرج من لها دهن أصفر طر يستعمل في صناعة الصابون . ويستخرج من صلام عباتها سمن نباتي أبيض اللون يستعمل للأكل .

#### ٢٨٦٤٨ - نَخْلُ الشَّعْرِ \* ، سِيرُوكِيلِ

Ceroxylon (S). Céroxyle, Palmier à cire, Arbre à cire (F). Wax palm (E). Andenwachspalme (D). Palma della cera (I).

جنس نخل أمريكي. أنواعه المروفة قليلة. سوقها رقيقة تملو نحو ٤٠ إلى ٥٠ سم. سفعها يشبه سفع النخيل لكنه يطول نحو ٦ أمتار. يتكرر وجودها في بلاد البربر عند جبال الاندل مع مقربة من الثلج الدائم . ثمارها نووية ، كبيرة ، بنفسجية اللون ، سكرية الطعم . عصارتها شمية تستعمل في عدة صناعات .

#### ٢٨٦٤٩ - نَخْلُ القَطَبِ \* ، نَخْلُ لَنَاتَالِ

Phoenix natalensis (S). Dattier du Natal, D. du Cap (F).

نوع من النخل الصغير القد . جدده جالس مستقيم يملو نحو ٣ أمتار . ساقه غروطية الشكل غليظة القاعدة دقيقة القرس السفلي . جريده سفعه يطول نحو ٣ أمتار . خوصه بحري اللون تملو مشعة غبراء || مهده بلاد رأس الرجاء الصالح ولناتال . يزرع الزين . يحود في جميع الأثرية ويميل على منظر شواطئ البحر المتوسط || ثماره حامزة صلبة صفراء اللون .

٢٨٦٥٠ - نَخْلُ النَّصَا \* Sagoutier (F). هو السافوتية ، أطباها .

٢٨٦٥١ - نَخْلُ بَرِّي Phoenix sylvestris (S). Dattier sauvage (F). Wild palm (E). Wilder Dattelpalm, Tannenpalme (D). Palma salvatica (I). نوع من النخل الكبير القد . جدده يرتفع من ١٠ إلى ١٢ م. سفعه كسفت النخيل ، بزم خوصه مستند الطرف طويل الهدبة ، لونه إلى الخضار الأزاعي . || مهده بلاد

كامل البر أو بعضه إلى كتلة من البرغ || وهو لا يعطب السوق لكنه يسبب قصر السلايات والشرانف ثم عقر القسم الأعلى من السنايل . || أضراره قد تكون فادحة إذا لامته المومل الجوية وأخصها امتداد الحرارة أو تدنيها || يكافح باستعمال ابد الفواطير الغدالة منها زريخات النحاس أو املاح الزئبق أو مركبات الفرميل .

#### ٢٨٦٥٠ - نَخْرِيَّةُ الشَّعِيرِ \* ، رُهْبُونُ الشَّعِيرِ Tilletia panicis (S). Cario de l'orge (F).

فطر مجهري يركب جميع أنواع الشعير . يكثر وجوده في أروبة الوسطى . || طياله مستدرة الشكل أو بيضية لوئها إلى السرة تملوها مشعة بنفسجية عابطة . أضراره محدودة لا تتجاوز . في أشد الإصابة ، ثلاث حبات في السلة الواحدة . || يكافح مكافحة سائر النخريات .

#### ٢٨٦٥١ - نَخْرِيَّةُ الشَّيْثَمِ \* ، رُهْبُونُ الشَّيْثَمِ

Tilletia secalis, Uredo secalis (S). Cario du seigle (F). فطر مجهري يصيب الشيلم فيؤذيه . يكثر وجوده في المناطق الباردة أخضها بلاد الاتحاد السوفياتي . وهو حل السنايل الملوقة مشعة من الزرقاء البحرية بينما يكون البر أصفر قداً من المعتاد وأغلظ قطراً . || طياله كروية الشكل أو بيضية . يوهه لبد التصبيب ، كرية الرائحة ، أسود اللون ، أزرق المواج ، دقيق اللينار . || أضراره فادحة تراوح بالنسبة إلى المواق والمومل الجوية من ٢٠ إلى ٧٠ ٪ . || يكافح مكافحة نخرية الخطة ومن الأجالبج اجتباب زراعة الشيلم في الاماكن الرطبة .

#### ٢٨٦٥٢ - نَخْرِيَّةُ مُنْتَبَهَةِ \* ، رُهْبُونُ مُنْتَبَهَةِ

Tilletia foetida, T. levis, Ustilago foetens (S). Carie fétide (F). فطر مجهري يركب بر الخطة في جميع المناطق الحارة والمتندلة المناخ . || طياله كروية الشكل أو بيضية ، بقرتها مائلة السطح موجحة بالأسود . بوهها كرية الرائحة . || أضراره شبيهة بأضرار نخرية الخطة تزداد مع ازدياد وطفه الحر . || يكافح مكافحة نخرية الخطة .

#### ٢٨٦٥٣ - نَخْرُ Térébror (F). To torabrato (E).

#### ٢٨٦٥٤ - نَخْشُوشِ Oules des poissons (F). Gills of fish (E).

نخشوش ج غثاشوش . هي أداة الصنع عند الأسماك وهي تقرب فلبية متصلة بالغياشيم من هن بين الرأس ويساره .

#### ٢٨٦٥٥ - نَخْل Phoenix (S).

Dattier (F). Palm tree (E). جنس اشجار لبينة من فصيلة النخلات عديد الأنواع والفروبو جميعها من نباتات المناطق الحارة . || جددها متصببة رقيقة أو نجمة وألوان عند وجوده يكون اسطواني الشكل وسيد الساق المستقيمة الكعرة الكرفافية وغير المتفرعة . أو رافها صفيحة طويلة الجريد غليظة الكرب وريشة الشكل . خوصها تجزل التركيب ، ثنائي البزم الجفي التصل المستطيل المذهب الهدبة . || والنخل من النباتات الثنائية المسكن التي يتبين ازدهارها بظلمة فناء وكافور بسيط . اما ازدهارها فلامطة وقد يختلف تركيبها بالنسبة إلى كرتها ذكرية أو أنثوية . فالازهار الذكرية تتميز بكأس سولية الشكل ثلاثية التنسيت مع تويج ثلاثي البتلات واسدية شقية وبآبر خيطية متصببة . || اما الازهار الانثوية فكأسها



نخرية الشعير نخرية الشيلم



نخل الدقيق




نخل الدهن



نخل الشمع



نخل القصب



- 1 من 2 - لئاک، خم مریوز 3 - خم منکش 4 - من مینج 5 - لئاک 6 - غیل 7 - من مشال، پرتکوب 8 - لریس، منک بمری 9 - لئاک 10 - منک 11 - منک 12 - کوه بمری 13 - زوزم 14 - منک 15 - راکیت 16 - منک 17 - پاور 18 - پاور لئاک 19 - منک 20 - منک 21 - منک 22 - منک 23 - منک 24 - منک 25 - منک 26 - منک 27 - منک 28 - منک 29 - منک 30 - منک 31 - منک 32 - منک 33 - منک 34 - منک 35 - منک 36 - منک 37 - منک 38 - منک 39 - منک 40 - منک






نباتات حربیة وصاله : 1 قلبه حبیبہ - 2 طبلہ مرہ لکھت - 3 بیا ، حبیبہ - 4 کرہنس - 5 خالہ قلیہ - 6 عسکار - 7 حبیبہ شصہ - 8 حبیبہ حبیبہ - 9 قلیہ - 10 زہنیہ - 11 لب قلیہ - 12 لب قلیہ - 13 ستور شری - 14 ستور اصغر ، خیرق - 15 خیر مرہ ، ادلیہ مرہ - 16 حبیبہ لبی - 17 حبیبہ اللک - 18 حبیبہ وریہ - 19 حبیبہ کالیوہ - 20 حبیبہ - 21 قلیہ - 22 زہر لکھتین - 23 لسان الزہر - 24 دالورہ مصریہ - 25 حبیبہ - 26 حبیبہ - 27 حبیبہ - 28 حبیبہ - 29 حبیبہ - 30 حبیبہ - 31 حبیبہ - 32 حبیبہ - 33 حبیبہ - 34 حبیبہ - 35 حبیبہ - 36 حبیبہ - 37 حبیبہ - 38 حبیبہ - 39 حبیبہ - 40 حبیبہ - 41 حبیبہ - 42 حبیبہ - 43 حبیبہ - 44 حبیبہ - 45 حبیبہ - 46 حبیبہ - 47 حبیبہ - 48 حبیبہ - 49 حبیبہ - 50 حبیبہ - 51 حبیبہ - 52 حبیبہ - 53 حبیبہ - 54 حبیبہ - 55 حبیبہ - 56 حبیبہ - 57 حبیبہ - 58 حبیبہ - 59 حبیبہ - 60 حبیبہ - 61 حبیبہ




نباتات معصومہ: 1 اورم، 2 اریق، 3 جریہ ہریک، 4 جریہ کیرہ، 5 نفیس، 6 گولڈی گشام، 7 زنگل ایشاک، 8 زنگل صبی، 9 اسطری صبی، 10 اسطری میل، 11 کریمت صبت، 12 کریمت لولی، 13 کریمت بخوشی، 14 کریمت مزب، 15 کریمت اعف، 16 کریمت مسطح الزمر، 17 کریمت صبی، 18 کریمت کدن، 19 دیر کشیری، 20 فرات، 21 خردوب رودی، 22 دیرک کشی، 23 رسی، 24 افسانہ جیری، 25 جازایہ، 26 صیون کبر الزمر، 27 صیون عسلط، 28 صیون ریح، 29 صیون مشیل، 30 قریہ، 31 جیلان خریض اروق، 32 فالت صابیک، 33 زرنیا، 34 یوکا، 35 خلی، 36 لیلی اسفر، 37 لیلار، 38 غشطان شابی، 39 شریک، 40 شریک، 41 زلفہ نیمک، 42 زلفہ اذان اللہ، 43 زلفہ پانیانک، 44 زلفہ قشمر، 45 رصاسیہ، 46 اکلیڈیا بیلزہ، 47 اکلیڈیا ذہیک، 48 شکر الیابان، 49 روح صلی الزمر، 50 روح صبی، 51 دهل، 52 سم، 53 سمک، 54 دافنور مشترہ، 55 دافنور مشترہ، 56 دافنور مشترہ، 57 دافنور مشترہ، 58 دافنور مشترہ، 59 دافنور مشترہ، 60 دافنور مشترہ، 61 دافنور مشترہ، 62 دافنور مشترہ، 63 دافنور مشترہ، 64 دافنور مشترہ، 65 دافنور مشترہ، 66 دافنور مشترہ، 67 دافنور مشترہ، 68 دافنور مشترہ، 69 دافنور مشترہ، 70 دافنور مشترہ، 71 دافنور مشترہ، 72 دافنور مشترہ، 73 دافنور مشترہ، 74 دافنور مشترہ، 75 دافنور مشترہ، 76 دافنور مشترہ، 77 دافنور مشترہ، 78 دافنور مشترہ، 79 دافنور مشترہ، 80 دافنور مشترہ، 81 دافنور مشترہ، 82 دافنور مشترہ، 83 دافنور مشترہ، 84 دافنور مشترہ، 85 دافنور مشترہ، 86 دافنور مشترہ، 87 دافنور مشترہ، 88 دافنور مشترہ، 89 دافنور مشترہ، 90 دافنور مشترہ، 91 دافنور مشترہ، 92 دافنور مشترہ، 93 دافنور مشترہ، 94 دافنور مشترہ، 95 دافنور مشترہ، 96 دافنور مشترہ، 97 دافنور مشترہ، 98 دافنور مشترہ، 99 دافنور مشترہ، 100 دافنور مشترہ




- النباتات والحيوانات : 1 كوكبية - 2 كوكبية - 3 أطلس للبي - 4 صريرة الخدي - 5 دورية - 6 بلسان هرياق الزهر - 7 كبر - 8 صعل - 9 زراكن - 10 بلسن - 11 دويهميه وردية - 12 مدوله  
 كبريا الزهر - 13 مدوله حبيبة - 14 حليبي حليبي - 15 حليبي افرنجي - 16 ليك ، ليك - 17 ليك حبيبي - 18 حريجة - 19 ملي - 20 دوح الجري - 21 كرز الزماني - 22 كرز -  
 23 شنبلي ليليان - 24 ورد ليلي - 25 ورد غلي - 26 ورد جا كبر - 27 ورد المارشايل ليال - 28 ورد ديمرون - 29 ورد فرسي - 30 ورد فليرون - 31 ورد فسي - 32 ورد كبير الزهر - 33 ورد  
 ملوني - 34 نيب - 35 قمل - 36 سمينة - 37 بلسان حدي - 38 ريسان - 39 سمون - 40 اريترينا - 41 جيكوس - 42 كالسيوم - 43 عشب حبي - 44 فريشا حبيبي - 45 فريشا حبيبة -  
 46 الليمية - 47 اريشيا بدولة - 48 اريشيا حنكرية - 49 كاميليا يانانية - 50 كاميليا كبرية الزهر - 51 فسي - 52 طرخون ، عود الليمية - 53 انكوس - 54 صردا المرجبان




- نباتات کهنی ایران : 1. لعلر الانارون - 2. زردانه سبزر - 3. انزودوم شرزد - 4. انزودوم لوردي - 5. پلهرجه برديا - 6. پلهرجه کنبر - 7. تيلاسيا سطله - 8. تيلاسيا لرد - 9. فرجه سبت - 10. اخون ، فرجه - 11. خلیج - 12. تپه - 13. اسکندنه - 14. فلورکنديه ، سلطان - 15. نوسک - 16. آئند ، جريانه - 17. لپاجري - 18. اپر تيارون ، فرجه فران - 19. پورغلیه ، جهسک - 20. سکن ، پلور حرم - 21. زنده الصين - 22. فرديه سکل - 23. برور - 24. مشالیه - 25. براساوا - 26. قلعه دوشانا - 27. قلعه شفریت - 28. کوروش غزل - 29. باروسک بکال - 30. باروسک برورد - 31. باروسک لیر - 32. بابوریکه صخر - 33. باروسک دوشنیل - 34. ددورپ لردیت - 35. ددورپ فرجه - 36. دیز کبره لرد - 37. جیل اصغر - 38. لپه مشقه - 39. لپه لرجوانیک - 40. لیکاسی - 41. لیکزه ساطقه - 42. مکيله صخر - 43. میلویه صلیک - 44. میلویه نر - 45. شات کبره لرد - 46. زاندا شلقه - 47. صخر لوانی - 48. صلیک کبره لرد - 49. سلویه طرا - 50. سلویه - 51. لاء صبروت - 52. لاء صخر - 53. زانده حرم - 54. صبریا طلیک



1 كبريت طبيعي - 2 بريت (كبريترو الحديد) غشس قزانيا - 3 بريت (مكشبات واحدة) - 4 بريت (مكشبات طابق) - 5 أجد - 6 حرو حاسر بعض الذهب - 7 تبر ذهب طبيعي - 8 تبر يلاتين طبيعي - 9 نمتة طوبية - 10 زلنج البريت (ميكال) - 11 حديد أوليبيتي - 12 ساروز أو حديد ماسم - 13 زلك مكبرت - 14 زلك ماسم - 15 وصاس مكبرت - 16 تصدير مأكسد - 17 بريت القحاسي (كنكو بريت) - 18 منليت - 19 نحاس طبيعي - 20 دنج - 21 زنجفر - 22 لآزورد قش - 23 حبر أو كوبران أصفر - 24 أنرب ، غزالوت



1 - مرور شفاف - 2 - كرواين رودي - 3 - كرواين أسود - 4 - من الحجر الأسترالي - 5 - ماس أسود - 6 - ماس أبيض - 7 - ماس أزرق - 8 - سفير - 9 - زبرجد - 10 - كبريت - 11 - باقوت احمر ، لعل - 12 - من الحجر - 13 - زبرجد - 14 - جيتار - 15 - مرور جيتار - 16 - زبرجد طبيعي - 17 - ياقوت - 18 - طباق ، طباق - 19 - شيشوليت - 20 - شيشوليت - 21 - سكران - 22 - سكران - 23 - دية من الفايبريت - 24 - ميلون فريقي - 25 - كاسيت فلي - 26 - كاسيت ميسي - 27 - جيتار - 28 - جيتار - 29 - لافيت بلنسي - 30 - ملح لؤلؤ



1. بوق البحر - 2. عشاء البحر - 3. بردن بحري - 4. صبرة - 5. أم - 6. قديم - 7. براني - 8. موطنة - 9. موطنة - 10. سماء - 11. صبرة - 12. خربة البحر - 13. ترس البحر - 14. أبو جربون - 15. رصا - 16. بنانة - 17. قبة - 18. طسرة - 19. قبة - 20. نيشان (في أبو جربون) - 21. علية - 22. زب البحر العسلي - 24. زب البحر الطلياني - 25. زب البحر الجبل - 26. دودة - 27. دودة البحر - 28. دودة البحر الحمراء - 29. دودة البحر المشيكة - 30. كوكبة - 31. نجمة القاع - 32. بنكرين - 33. كرمات مسيل - 34. عتوب - 35. رصيلة - 36. لصة - 37. قاء البحر - 38. عرطن الرل - 39. كركانة - 40. أم كالكاب - 41. اشارة - 42. قاقوس - 43. أبو مبر - 44. بطريل



نخل بوتان



نخل شائك



نخل كرنبي



نخل كناري



نخل معروف

جارة قلبه للأكل. ويزرع لزينة في المراكب وفي المواقع التي لا تحصى الصنوع. ساقه قصيرة. كرهه عادم الذرك. سفعه مستطيل الخوص جميل الخصار.

### ٢٨٦٥٨ - نخل كناري\* ، نخل الجزر والحملة

Phoenix canariensis, P. tennisi (S). Dattier des Canaries (F).

نوع من النخل المتوسط القد، جلده يملو من ٨ إلى ٨ أمتار. ساقه اسطوانية غليظة يبلغ قطرها نحو ١٠٠ سم. سفعه مستطيل القد، كثيف الخوص، متدلل التحنيب الذي يتوسط الزمام الثالث || مهده جبر كرنبي ونهبا انتقل الى معظم مناطق حوض البحر المتوسط. خسرويه عديدة مظهرها ترابي سريع النمو يعيش في جميع الأترية وبعضها زراعي يفرس بلبي ثماره المأكولة الحمر اللون.

### ٢٨٦٥٩ - نخل معروف\* ، نخيل

Phoenix dactylifera, P. excelsior (S). Dattier fruitier (F). Date palm (E). Dattelpalme, Palmbaum (D). Palme, Dattier, Palmzino (I).

نوع من النخل، كبير القد، كثير الكرب، جلده متصببة السوق المستقيمة تملو من ١٢ إلى ٢٥ مترًا. جريد سفعه يطلو من ٣ إلى ٤ أمتار وهو شائك الكرب غليظ الكرناف. خسرويه مستطيل اليزم اللدب الهدي، لونه الى الخصار الاريه || ازهاره عكولي التجميع عند الذكر والاني، عكوكيه يدي افرضا، يدي عند ظهوره محامًا بقاية كبيرة تدعى الفتو. اما الشكل الانثوي الذي يعمل الشر فيدي حرجوًا. || ثمره النخيل مستطيلة الشكل، لية السوكة، سكرية الطعم، مأكولة. نواتها برة خشية قاسية يقطها شق طولي عميق يدعى الثغير. وله الثرة اسماء تعريفية عديدة تختلف مع تطورات مراحلها الحياتية من الارام الى الانتاع. فهي بعد الارام سبابة ثم خلالة فيلسة نجدالة فيسرة فطيلة واخرًا ثمرة. || اعطانه فحوض البحر الاحمر لفسر فليبا فلووس فالجازر فراكش. يعيش ايتا زرع غير انه يفضل الأترية الربلية البدالية بالمواد العضوية والناصر الغذائية كلما ازداد حل النخيل المعية الفور المسجسة الربوية. وكلما ازداد غناء الأترية الحولي وانقطع من المساهة. || اقليمه الافضل هو الاقليم الذي تشتد فيه الحرارة من اربائل ايار الى اواخر تشرين الاول حيث يبلغ مجموع السعرات الحرارية، وخلال هذه المدة، نحو ٥٠٠٠ ساعة وعل ان يكون متوسط الربوية الجولية التسية نحو ٤٠ ٪. || اشهر خسرويه وأجودها ما يبع.

— إيريجي — ثمرته تطول نحو ٥ سم. حراء اللون تسهلك جافة.  
— إيهات — ثمرته تطول نحو ٣ سم. شديدة الحلاوة تؤكل رطبة وجافة.  
— برتامو — ثمرته تطول نحو ٤ سم. تسهلك رطبة وجافة.  
— بنت عيشه — ثمرته تطول نحو ٤ سم. تؤكل رطبة وجافة.  
— فوي — ثمرته تطول نحو ٦ سم. قليلة الاليات تؤكل جافة.  
— جندلا — ثمرته تطول نحو ٤ سم. تسهلك جافة.  
— حلاوه — ثمرته تطول نحو ٤ سم. سحلية اللون تصد بكرة.  
— حياي — ثمرته تطول نحو ٥ سم. تسهلك رطبة وجافة.

الهند الشرقية ونهبا النشتر في معظم بلدان حوض البحر المتوسط. يزرع للزينة. ثماره صلبة حامزة.

### ٢٨٦٥٩ - نخل بوتان\* ، نخل سيكيم، نخيل

Phoenix rupicola (S).

Dattier des rochers (F).

نوع من النخل المتوسط القد، يتميز بجلو جريده من الكرناف الثام بين الساق والكرب، جلده يرتفع من ٧ الى ٨ أمتار. سفعه رشيق الشكل يطول نحو ٤ أمتار. خسرويه مريض اليزم اللدب الطوف || مهده مناطق بوتان وسيكيم من اعمال الهند. وهو من اجل انواع النخل شكرا وإرفا لذلك يزرع للزينة ويوجد منه حل بعض شرائط البحر المتوسط || ثماره سحلية اللون مأكولة يجمعها قتر كبير القد لا يقل طوله من ١٢٠ سم.

### ٢٨٦٥٣ - نخل زكوتيبار ، نخل مقوس

Phoenix reclinata (S). Dattier de Zanzibar (F).

نوع من النخل المتوسط القد. جلده رشيق القوام يرتفع من ٤ الى ٦ أمتار وكثيرا ما يتقوس عند زامه الثالث. سفعه مستطيل القد محجن الجريه. كرهه حاد الشوك. خسرويه جميل الخصار اللامع || مهده زكوتيبار وما قاليها من القارة الافريقية. وهو من الانواع السريعة النمو يفضل الأترية الحصية ولا يتأذى من غيرها. يزرع للزينة. ثماره صلبة القد. صفراء اللون لا تؤكل.

### ٢٨٦٥٤ - نخل سرتديب ، نخل سيلان

Phoenix ceylanica (S). Dattier de Ceylan (F).

نوع من النخل المتوسط القد. جلده يرتفع نحو ٥ أمتار. سفعه يطلو نحو ٤ أمتار. كرهه شائك. خسرويه مستطيل اليزم اللدب، لونه الى الخصار اللامع || مهده جزيرة سرتديب يعيش في حصص ورفوح هضابها الناحلة. يزرع للزينة.

### ٢٨٦٥٥ - نخل سيام

Phoenix siamensis (S).

Dattier de Siam (F).

نوع من النخل المقر المدام الساق. جريده سفعه يطلو نحو ٣ أمتار. خسرويه كثيف التجميع جميل الخصار الزاهي. يزعمه مذهب المقصة، طويل الهدي || مهده سهل سيام الربلية. متطلباته الزراعية قليلة لانه من النباتات العالدة وقد رغب في الأترية الربلية التي لا تخلو من اللدباب. ثماره ارجوانية اللون مأكولة.

### ٢٨٦٥٦ - نخل شائك\*

Phoenix spinosa, P. leonensis, P. senegalensis (S). Dattier épineux (F).

نوع من النخل المتوسط القد. جلده متصبب الساق يملو من ٤ الى ٦ أمتار. جريد سفعه يطلو نحو ٣ أمتار. خسرويه جميل الخصار السابق، يزعمه مذهب شائك، مهده افريقية الاستوائية. رغب في الأترية الطيفية الكنسية ولا يحنى الرياح البحرية. يعيش حل شرائط البحر المتوسط || ثماره متوسطة القد، نخيلة الجرم، سبها مرجاني اللون. رطبها احمر خري. ثمرها كسني اللون. سكري الطعم مأكول.

### ٢٨٦٥٧ - نخل كرتوبي\*

Oreodoxa oleracea (S). Oreodoxa oléracé, Palmiste franc, Chou-palmiste (F). Cabbage palm (E). Kohlpalme, Kohlrangende, Arekapalme (D). Palmisto, Palma cavolo (I).

نوع من نخل البلاد الحارة الاسيوية والافريقية. يزرع لحي



royal, Palmier royal (F), Royal wine palm (E), Königspalme (D), Palma regia (I).

نوع من النخل الزراعي التريتي. جذعه رفيع الساق المنتصب. ثمرة تاجية الشكل جميلة القالب. صفه متوسط الطول قليل التحميص. غوصه جميل الأخضر الزاهي. طمته كبيرة القذ فاشرة، ثماره صغيرة الحجم. ارجوانية اللون، ناعمة السوط، لا تؤكل، جارة ثقله ما كولة مستحبة الطعم.

Phoenix paludosa (S). **نخل متقيعي**  
Dattier des marécages (F).

نوع من النخل المتوسط القذ. جذعه الساق المنتصبه يعلو من ٨ الى ١٠ أمتار. جريد صفه يعلو نحو ٣ أمتار وهو شائك الكرب يحين الزمام الأخير. غوصه جميل الأخضر الفسقي. يزرعه مذهب الطوف || مهدد مناع أخذ القرية وقد يعيش في جميع الأتربة الدبالية الرطبة، ثماره لا تخلو من الحلاوة لونها إلى الصفار القاتم.

Phoenix aculis (S). **نخل تجسبي**  
Dattier acule (F).

نوع من النخل العادم الساق. صفه كبير القذ ريشي الخوص. يزرعه صلب النصل، مذهب الطوف، جميل الخضار الزاهي || مهدد مرتقات سهل الهند شرقي بحر الكنج || ثماره خيرية اللون حامزة الطعم لا تؤكل. يزرع للتزين وقد يعيش على الشواطئ اللبنانية ويعود في الأتربة الرملية القليلة الرطوبة.

Palmicole (F). **نخلاني**

نعت تعريفي يطلق على كل ما يعيش على النخيل أو ينمو عليه.

٢٨٦٥ - **نخله الجوز** هي الكريوت، اطلبها.

٢٨٦٦ - **نخله السكر**، أرتما

Arenga saccharifera, Borassus gomutus (S), Areng, Palmier areng, P. à sucre (F), Gomuti palm (E), Gomutepalme, Zuckerpalme (D), Palma arenga, P. dello zucchero (I).

نوع من النخل الهندي المنبت، تكثر زراعته في الهند والكويتشين وباروا وملقه حيث يستخرجون السكر من ثماره. ساقه منتصبه رفيعة تملو من ١٥ الى ٢٠ م. صفه كبير القذ متعادم الخوص. يزرعه مقطوم الطوف، نصله عابق الخضار || ثماره لينة التجميع حلوة المذاق يستخرج منها هصاره سكرية شائعة الاستعمال.

Palmaceae (S). **نخلاني**

Palmacées, Palmiers (F), Palmae, Palm-trees (E). فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة. اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠ أعطائها البلاد الحارة والاستوائية من المالمين القدم والجديد. جلودها وحيدة السوق الرقيقة المنتصبه. اوراقها سفلية التركيب حامية الازتكار. ازهارها وحيدة أو ثنائية المسكن. ثمارها لا قياسية الشكل والحجم لينة السوط.

٢٨٦٨ - **نخلين**  
Palmatine (F), Palmistein (E). مادة بلورية توجد في الدهن ويكثر وجودها في حافس النخل وقد تستحضر بتألف الحامض النخلي مع الفليسرين.

٢٨٦٩ - **نخوس** هو الناعس، اطلبها.

٢٨٧٠ - **نخيب**  
Sélectif (F), Selective (E).

— خد'لوي — ثمرة تطول نحو ٤ سم. صفراء اللون. جيدة الصنف.

— خلاص — ثمرة تطول نحو ٤ سم. تعتبر من اجود الاصناف وانفخها.

— داجانا — ثمرة تطول نحو ٤ سم. تسهل جافة.

— دجلة النور — ثمرة تطول نحو ٤ سم. تعتبر من اجود الاصناف وانفخها.

— زاهدي — ثمرة ذهبية اللب متوسطة القذ جيدة الصنف.

— زغلولي — ثمرة كبيرة القذ شديدة الحمرة فاخرة الصنف تؤكل رطبة.

— سلطاني — ثمرة كبيرة القذ حنطية اللون فاخرة الصنف تؤكل جافة.

— صمائي — ثمرة بيضيه الشكل صفراء اللون تؤكل رطبة ورطب.

— سيدي — ثمرة صغيرة القذ شديدة الحلاوة كثيرة الالياف.

— ترابي — ثمرة صغيرة القذ تؤكل رطبة وجافة.

— طبرزي — ثمرة متوسطة القذ فاخرة الصنف تؤكل رطبة.

— عجلاني — ثمرة متوسطة القذ جيدة الصنف تسهل رطبة وجافة.

— حمري — ثمرة تطول نحو ٧ سم. جيدة الصنف تؤكل رطبة وتصدر.

— قسطاوي — ثمرة متوسطة القذ فاخرة الصنف تؤكل رطبة.

— كسيه — ثمرة متوسطة القذ مشخارة جيدة الصنف تؤكل رطبة وجافة.

— عجيل — ثمرة كبيرة القذ فاخرة الصنف تؤكل رطبة.

— مقطوم — ثمرة متوسطة القذ مشخارة جيدة الصنف تؤكل رطبة.

— ترسياني — ثمرة كبيرة غليظة صفراء اللون جيدة الصنف رطب.

وتمر النخل ان رطبة أو جافة، أي تمر، غنية بالاملاح المعدنية القلوية التي تعادل حموضة الحوام والبيض والحيز وهي غنية بالفيتامين (١) ومتوسطة البني بالفيتامين (ب) و (د)، اما متوسط العناصر المختلفة الموجودة في ١٠٠ غ. من لب التمر فهو :

- ٣٠ ٪ من الماء
- ٩٥ ٪ من السكر
- ٣ ٪ من البروتين
- ١ ٪ من الحامض

هذا مع العلم ان القيمة الغذائية للمواد السكرية الموجودة في التمر توازي نصف قيمة السكر العادي.

٢٨٦٦٠ - **نخل معلاقي**

Phoenix pedunculata (S), Dattier pédonculé (F).

نوع من النخل الصغير القذ. جذعه اسطواني الساق يعلو نحو ١٠٠ سم. جريد صفه يعلو نحو اربعة أمتار. غوصه مستعرض كبير يعلو نحو ٣٠ سم. يزرعه جميل الخضار الزاهي ينضج عنه زامه الأخير. || مهدد جبال الهند الشرقية حتى ارتفاع ٢٠٠٠ م. يعيش في جميع مناطق ساحل البحر المتوسط. يزرع للتزين. ثماره صفراء اللون حنطية المذاق غير مأكولة.

٢٨٦٦١ - **نخل ملكي**

Oreodoxa regia, Roystonea regia (S), Oréodoxe



## ٢٨٦٧١ - نَحِيرَة

Branchiostome (F).

النَحِيرَة فَوْعَة مَبِيقَة تَمَكَّنُ الْخَاشِيشَ مِنَ الْإِتِّصَالِ بِالخَارجِ .

٢٨٦٧٢ - نَحِيرَة \* وَغُرْبَة النَبِيغِ ، تَزْيِيدُ رَمَهٗ  
Lasioderma serricorne (S). Lasioderma (F). Cigarette Beetle (D). Tabakkäfer (D).

حشرة من غديات الأجنبية وفضيلة الغفريات . جسمها اسطواني الشكل ، صغير القد ، يطول نحو ٣ سم . قريبا إلى ألبي الكستانلي المروج يطوى خل الحبل . رقبته مقوية الجسم ، غبراء اللون ، غشائية الرأس ، مهدبة الظهر والجنايب والأطراف ، تطول نحو ٤ سم || أجيالها الحولية عديدة تراوح من ٣ إلى ٦ ، جيلها يمر من ٤٤ إلى ٧٢ يوما . الحشرة الكاملة تعيش من ٣ إلى ٦ أسابيع تنجح مكثها أفرادها على التبن فيضف خلال مدة ادناها ٥ أيام وأقسامها ١٠ . أما البرقة فتعيش من ٣٠ إلى ٥٠ يوما || تنحدر بعد انسلاخها الثاني إلى عذارى ثم إلى حشرة كاملة . وهي من حشرات البيلاد الحارة والمعتدلة تسرح في الليل وتألف الأمانكن الأهلة . رقاتها تركب التبن ولغائف التي تقتحم بها الاضرار الجسيمة لأنها تنخرها وتنطشها . تتكاثر بواسطة مصائد النور أو المصائد الكهربائية .

## ٢٨٦٧٣ - نَحِيرَة

Beurre (F). Butter (E).

من أسماء الزبدة ولعلها الزبدة الرقيقة كالزبد .

## ٢٨٦٧٤ - نَحِيرَة

هو النخل المروث ، اطلبه .

## ٢٨٦٧٥ - نَد \* وَغُرْبَة

Epilobium (S). Epilobe (F). Willow-herb (E). Weidenröschen (D). Epilobio (I).

جنس نباتات عشبية عشوية معمرة من فصيلة الإخدرليات . أنواعه المعروفة نحو ٦٠ معظمها بري ومنها الطبي وينبضها تزيي . منها الإصفاة المفصلة في جميع البلاد . سوقها قروا . أوراقها كاملة مستطيلة متعاقبة ، أزهارها رباعية النصل والبتلات ، ثمانية الأسدية ، سلبية التجميع ، عوربة الإزكاكاز أو هامة || أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

## ٢٨٦٧٦ - نَد وَتَبَاعِي الزَوَاكَا ، أَذُنَاب الْقَطْطَة

Epilobium tetragonum (S). Epilobe angulare (F). نوع من الد البري الميزول . ساقه صلبة صموية كثيرة الغروع مفصلة رباعية الزوايا . أوراقه متعاقبة ، رخية النصل ، منشارية الحافة ، ناشرة المروق . أزهاره سنبل التجميع . أزدهر اجنوبانية اللون وريدة المروج . يوجد في الأمانكن الربطية من الساحل إلى الجرد حتى ارتفاع ٢٠٠٠ م . || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

## ٢٨٦٧٧ - نَد سُبُكِي

Epilobium angustifolium, E. spatulatum (S). Epilobe en épi, Laurier de St. Antoine (F). Rose-bag willow-herb, Blood vine (E). Waldweidenröschen, Weidherb, Antonskraut (D). Epilobio a spighe, Lauro roseo, L. di St. Antonio (I).

نوع من الد الزواهي التزيي الميزول . أرومته مدادة . ساقه قروا تملو من ٨٠ إلى ١٢٥ سم . أوراقه متعاقبة متضخمة ، نصلها سناني الشكل ناشز المروق حل صفحتها السفلى . أزهاره سنبل التجميع هامي الإزكاكاز . أزهاره قززية اللون قطرها نحو ٣ م . ومنه غروب يفيض الأزهار وموجبة || تنوره يستمر من تموز إلى آب .

## ٢٨٦٧٨ - نَد صَبِير الزَّهْر

Epilobium parviflorum (S). Epilobe à petites fleurs (F).

نوع من الد البري الطبي الميزول . ساقه قروا تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم . أوراقه زنبية متعاقبة ، نصلها رخي الصفحة مسن الحافة . أزهاره سنبل التجميع . أزهاره صغيرة القد وريدة اللون || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

## ٢٨٦٧٩ - نَد عَفَالِي ، نَد قَشْدِي ، عَقِص ، قَرَلُور

Epilobium hirsutum (S). Epilobe hérissé, Nériette (F). Great willow-herb, Apple-ple (E). Zottiges Weidenröschen (D). Epilobio amplicaulo, Peleso (I).

نوع من الد البري الطبي الميزول . ساقه قروا تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم . أوراقه حاشية متعاقبة نصلها كبير القد منشاري الحافة خالي البشرة على صفحته . أزهاره سنبل التجميع . أزهاره قززية اللون قطرها نحو ٢ سم . || تنوره يستمر من تموز إلى آب .

## ٢٨٦٨٠ - نَد قَسْوسِي

Epilobium rosmarinifolium (S). Epilobe à feuilles de rosmarin (F).

نوع من الد الجيلي الميزول . ساقه قروا تملو من ٤٠ إلى ١٢٠ سم . أوراقه متعاقبة تشبه أوراق القسوس . نصلها ضيق الصفحة الجامدة المورقة الناشرة . أزهاره عنقودي التجميع ، تأتي الإزكاكاز . أزهاره صغيرة القد حراء اللون || تنوره يستمر من حزيران إلى آب .

## ٢٨٦٨١ - نَد مَسْجِي

Epilobium palustre (S). Epilobe des marais (F). Marsh epilobium, M. willow-herb (E). Sumpfweidenröschen (D). Epilobio palustre, Garolanini di padule (I).

نوع من الد البري الطبي يكثر في الملتق والمروج الرطبة . ساقه صموية قروا تملو نحو ١٥٠ سم . أوراقه متعاقبة متناوبة مستطيلة . نصلها جامد الصفحة مسن الحافة . أزهاره سنبل التجميع . أزهاره وريدة اللون صغيرة القد . تنوره يستمر من حزيران إلى آب .

## ٢٨٦٨٢ - نَد لَسْنِي

Epilobium menthoides (S). Epilobe menthoide (F). نوع من الد البري الطبي الميزول يكثر في بعض الجرد البنيانية . ساقه قروا تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . أوراقه تمنية للامحة لا قياسية الترتيب والشكل مسنة الحافة ناشرة المروق . أزهاره سنبل التجميع . أزهاره صغيرة القد وريدة اللون يضاء المروج || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

## ٢٨٦٨٣ - نَدَاة

Couronne solaire (F). Solar corona (E).

الدَّاءِي دَارَة الشَّمْسِ .

## ٢٨٦٨٤ - نَدَاخَة

Taxonomie, Taxinomie (F). Taxonomy (E).

هي علم سن وقواعد فن التصنيف أو التفسير .

## ٢٨٦٨٥ - نَدَاخَة \* ، صَدَاخَة الْعَاب

Luscinola melanopogon (S). Lusciniole à moustaches (F). Moustaches Warbler (E). عصافير من المرازج وفضيلة الغفليات . موطنه يستل معظم مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط . أعطاه اللبناني تحت من السواحل إلى الجرد والبلخ إلى جسمه رشيق القوام يطول نحو ١٣ سم . وبسطه نحو ١٥ سم .



نَحِيرَة (البرقة والاكنة)



نَحِيرَة (الحشرة)



نَد



نَدَاخَة

والكوليت والنزك... لا وجودها إلزامي إن من الوجهة الانشائية أو من الوجهة الغذائية.

2٨٦٩٢ - ندبة Bourrelet, Bourlet (F).  
Pad, Cushion (E).

إثر الجرح بعد التآلم في النسيج الحيواني والنباتي.

2٨٦٩٣ - ندحة ٥، ندحة ٥ Barème, Barrème (F). Printed table, Schedule (E).

2٨٦٩٤ - ندحة الأسعار Barème des prix (F).  
Price table (E).

2٨٦٩٥ - ندحة الجعائيل

Barème des salaires (F). Wage table (E).

2٨٦٩٦ - ندخ Apponter (F). To land (E).  
شد المركب بالصقالة المخصصة لربطه.

2٨٦٩٨ - ندخ Phototropisme (F).  
Phototropism (E).

الندد وتدعى جاذية النور، خاصة تتميز بها بعض أعضاء النبات في توجيه أطرافها نحو النور.

2٨٦٩٩ - ندغ Satureia (S). Sarriette (F).  
جنس نباتات برية مخشوشة قابلة من فصيلة الشفويات. أنواعه نباتات متفارقة الأشكال والأحجام منها المشبة بالبليلة والبنية. أوراقها طرية لا تقياسه أقد متقابلة أو ضعية. أزهارها أبغلة الارتكاز أو تاجية يكثر فيها اللون الأبيض والبنفسجي والآخر. جميعها مغرية يجرها النحل. أعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع.

2٨٧٠٠ - ندغ إكرويتي\*، ندغ صغرتي Satureia thymbra (S). Sarriette de Crète (F). Savory of Crete (E). Kretisches Bohnenkraut (D). Santoreggia verticillata, Tragorigano (I).

نوع من الندغ الطبي الممر. عشته نجمة صغيرة الحجم. أوراقه ضمية التجميع صغيرة القد، نصلها سناني الشكل خلى البشرة الرضاء اللون. أزهاره ثلاثية التجميع بنفسجية اللون وريدة الموانج. أزهاره يستمر من تموز إلى أيلول.

2٨٧٠١ - ندغ الجبيل\*، زوباع البر، صغتر الجبيل Satureia montana (S).  
Sarriette montagnarde (F).

نوع من الندغ الطبي الممر. مجلته تملو من ٤ إلى ٨٠ سم. ساقه مخشوشة فراءه. أوراقه سنائية مستطيلة مدببة النقص. نصلها جامد الصفحة اللامعة مهدب المختار. أزهاره وريدة اللون أو بنفسجية. تنوره يستمر من تموز إلى أيلول.

2٨٧٠٢ - ندغ بُستاني\*، زوباع، صغتر البر Satureia hortensis (S). Sarriette des jardins (F). Summer savory (E). Gartenbohnenkraut (D). Santoreggia, Timbra, Cunilla (I).

نوع من الندغ الحويل المبدول يكثر من النباتات الطبية الجزيلة النفع المديدة الفوائد الصحية وهو من التوابل المستحبة العلم والمرف. أوراقه سنائية النصل، رطلة

ثوبه إلى التي الأسفل. رأسه كسني اللون اسود الموانج. محسره إلى الكسني يطرده خط أبيض يملو العين. رذائله وظهوره وجناحه صغيره وذنبه إلى التي الأسفل يملو مشج عائق. زوره أخضر أبيض. صدره إلى الذرة البنية. ساقه بنية. سباله وأفر الحلب وهو ما دعى إلى تلقيبه «بأي شوارب» || الأثني أصغر قدماً من الذكر وأبش ثوباً منه || يألف للمقاصب والمسال والآجام وضفاف مجاري الماء. تغريده صمداح لطيف متباين الانظام القصيرة. يذثر عشه في الآجام والمقاصب على ارتفاع من عن سطح المنقع أو التربة || الأثني تحضن ثلاث مرات في السنة. حضنتها من ٣ إلى ٥ بيضات ترزفها بمناوية الذكر نحو ١٢ يوماً || قوته الحشرات المجنة أخمصها الفرائش والذباب والحوام ثم الديدان والزق || يعتبر من الصافير النافعة.

2٨٦٩٦ - ندكاد Photophile (F).  
Photophilous (E).  
نمت ترمقي يطلق على كل حيوان أو نبات لا يعيش إلا في النور.

2٨٦٩٧ - نداسك البُسر\*، نكارية البُسر Ephestia caddella (S). Pyralis des dattes (F).  
فراشة من النادريات صغيرة القد غبراء اللون مجلدة بالأسود. ريقها دقيقة نحيلة جثوية الثوب تقرض البسر وتطبه.

2٨٦٩٨ - نداسك التبغ\*، نكارية التبغ Ephestia elutella (S).  
Pyrale des tabacs, Pyrale des fruits secs, Teigne du cacao (F). Tobacco moth, Cacao moth, Currant moth (E). Dürrobstzünsler, Kakaomotte, Henmotte (D).

فراشة صغيرة القد من فصيلة النادريات، بسطها نحو ١٧ م. ورشناها الإسماني إلى الكهبة الزرقاء الموانج، ورشناها الخلفيان إلى الربعة. ريقها صغيرة دقيقة رضاء اللون تميش على غثفل الثمار المجففة والمجوز والبسكوت وأوراق التبغ الجافة المخرقة || أجيالها الحولية وهي مرتبطة بموالم الموانج تراوح من ٣ إلى ٥.

2٨٦٩٩ - نداسك الدقيق\*، نكارية الدقيق Ephestia kuehnelia (S).  
Pyrale de la farine (F). Mediterranean flour moth (E). Mehlmotte (D).

فراشة صغيرة القد من فصيلة النادريات. بسطها نحو ١٠ م. ورشناها الإسماني إلى السرة الخطية يطردها تجلدهس وتبيج. ورشناها الخلفيان مهدبا المختار ثوبها إلى الأبيض الاغبر يملو شماع اشقر. أجيالها الحولية ضعية، تكثر في الاماكن الحارة وتقتل في الباردة. ريقها دقيقة الجسم، حنطية اللون سواد الرأس، تميش على مختلف أنواع الدقيق.

2٨٦٩٠ - نداسك ٥، ندغ ٥ Blochimie (F). Blochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء يبحث في تفاعلات المادة الحية.

2٨٦٩١ - ندالير Oligo-éléments (F).  
Trace elements (E).

نادر ج دائر. اسم يطلق على العناصر التي تدخل في المركبات الضوية والنباتية بكيمات متناهية الصغر كما هي الحال في اليود والتيتان والزنك والنيكل والحديد



نداسك البسر



نكارية



نداسك التبغ



نداسك الدقيق



ندغ إكرويتي



ندغ الجبيل



ندغ بُستاني



قدرة



## ندیازة مبدولة



تَرْتِیْن



زوجیں اٹھیں



ترجمہ اُسلی



زُجَّسَ الشَّعْرَاءُ

تطول من ٤ الى ٧ مم. أزهارها صغيرة الكبد خضراء اللون تنور خلال شهر حزيران . ثمارها هنية قدرها قدر الحمصة الصغيرة لونها الى الحمرة البرتقالية الموانح .

Neritina (S). نيرتينا - ٢٨٧١  
Nérítine (F). Neritina (E).

جنس حيوانات مائية من الرعديات مديات الاجرل وفضية  
تريفيكات. انواعها الحرةة نحو ١٥٠ منتشرة في معظم  
مناطق البلاد الحارة . معظمها نهرى ومنتقى و بعضها بحري.  
يكثر فيها اصداها شبيهة الاشكال ، يكثر فيها  
الشكل البيضي المنحرف القليل الحلزنة المحصورة في الاعقاب.  
جميعها ملونة ، كل فيها اللون السوي و كثر التفتيح  
والتجذيع والرسجة والزخرفة .

٢٨٧١٥ - ليرنيبي °  
Nérétique (F),  
سمت تعريفني يطلق على كل منطقة رسوبية ثمرها المياه  
ولا يتجاوز غورها ٢٠٠ م.

Narcissus (S).      نَرْجِس ، قَهْد  
Narcisse (F).

جنس نباتات بصلية حولية سرية من فصيلة النرجسيات. أزهاره وفواكهها وضروبه وأصماغه كلها الكبريتية. البند. أجزائه فواكهها والبرق والرياحية خضراء الشامية. وفي تركمنيا شراخ الجوف يعطو شرفات قصير بسيط يحضن تويج لاقياس الشكل مستقيم القمي والبرقي والجري والتلاقي. أزهاره قرصية الانتساب، قدية الفصل، مستطيلة || يعيش ويوجد في جميع الأثرية الزراعية ولا يخشى سوى قروح الانتساج وكثرة الرطوبة.

٢٨٧١٧ - نَرْجِسٌ أَخْضَرٌ \*  
Narcissus viridiflorus (S). Narcisse vert (F).

نوع من الجنس الجادح . أوراقه قلبية الانتساب ،  
 استوائية التصل الخلد . شراخه الزمري دقيق  
 ومخيل . أزهاره عطرية الرائحة ، وحبية البتلات المدببة  
 المخضراء اللون . وهي لاقية التجميع بأزوح عددها  
 من ١ إلى ٤ . تويجها دولابية الشكل || ينور في  
 تشرين الثاني .

٢٨٧١١ - تَرْجِسْ أَسْكِي \*، جَنْكِيل °  
Narcissus jonquilla (5), jonquilla (F), jonquil (E),  
Jonquilla (D), Giunchiglia, Narciso d'Oriente (I),  
نوع من التّرجيس البريّ. عُشْبَةٌ وَاصِلَةٌ  
الْعُود. أَوْرَاقُهُ الشَّجَرَةِ الْإِشْتَبَابُ نَاصِلَةٌ اسْطَوْنِي  
الشَّكْلِ. عِنْدَ الصَّفَةِ: يَطُولُ ١٥ إلى ٣٠ س.  
شَرَاهَا الزَّهْرِي دَقِيقُ النَّصْبَةِ يَلَوُّ عُو ٣٠ س.  
يَسْتَهَي بِضَمَّةٍ مِنَ الزَّهَارِ بِرَأْسِ عُدَدِهَا مِنْ ٢ إلى  
١٠ تَوْجِيحًا كَوْنِي الشَّكْلِ، وَحَتَّى قَوَاعِدَ الْبُرْفِ الْبَرَقَالِ،  
لَوْنُهَا أَلْيَسَ الْخَالِد. يَزِدُّ فِي تَيْمَان.

٢٨٧١٩ - تَرْجِيْسُ الْأَمَارُونِ  
مِنْ نَفْسِ الْأَمَارُونِ، وَالْأَمَارُونِ

٢٨٧٢ - ثَرَجِيسُ الشُّعْرَاءِ \* ، غَفُؤُ  
Narcissus poeticus (S). Narcisse des poètes. Herbe

نوع من التريسي السروقي . شروبه كثيرة العدد . أوراقه

الصفحة ، قائمة الخضار . ازهاره صغيرة القد يضاء اللون  
او وردية || تنوره يستمر من تموز الى تشرين الاول .

٢٨٧٠٣ - نقدية هي البروفيلم ، اطلبه .

Cressa (S), Cresse (F), \* نَدَوَة - ٢٨٧٠٤  
Rosin weed (E), Harakraut (D), Cressa (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة السبقوقيات. أنواعها المعروفة ثمانية منها سواحل البلاد الحارة من العالمين القديم والجديد. أزهارها عديدة الألوان عديمة العرف.

Comice agricole (F). **لُذْوَة زِرَاعِيَّة** - ٢٨٧٠٥  
Agricultural committee or show (E).

كل جمعية زراعية تعمل على انتشار الزراعة العملية  
الصحيحة .

٢٨٧٠٦ - نَدْرَة عَسْكَية هي الارق ، اطلبه .

Phototropique (F).                      ٢٨٧٠٧ - نَسْتَدُودُ  
Phototropic (E).                        مَا هُوَ مُنَوِّطٌ بِالنَّوْدِ .

٢٨٧٠٨ - قدي  
Rosée (F). Dew (E).  
رذاذ يتكاثف بسبب الوضاء على النباتات والأشياء الموحدة  
في الفلا || وفي التخصيص يطلق الندى على ما سقط  
من بلا آخر الليل وأما الندى يسقط أوله فهو السدى .

Romarin (F). ٢٨٧٠٩ - نَدَى الْبَحْرِ  
هو حصا البان ، اطلبه .

٢٨٧١٠ - فِدْيَا زَة مَبْدُولَة \* ، دُودَة السَّنْط  
الصفحة Nadia's obsolete (S)

فراشة من فصيلة البحيبات، صغيرة، صفراء، على طرفيها ٩ م.  
نومها إلى الحنطي البني. اجنحتها موشية بثلاثة خطوط  
معرفة متباعدة لها إلى السمة الداكنة. زياتها مشطية  
الشكل، الأخرى حبيبية من الزاكن واضح لوناً، تتج  
بكتها الأضراسيون على فروع الأغصان والنباتات تنبت  
عن رقات تلثم الأوراق وتعمل الأثمار من تسع شراش،  
أسطوانية الشكل، مستديرة الطرفين، دقيقة البوصلة، عظمها  
حريري، رمي، تبيت تحت وتعمل على حذاراً إلى  
قشر شمراة اللون، هلبة الشراش يعلقان بفصان علويان  
لونها إلى البرتقالي وتحمل في كل من سلفهاثا الثانية والثالثة  
والرابعة والخامسة والسابعة وأحادية عشرة عدد جرابية عشرة  
بالميل الأسود الدقيق تسعملته لدفاع عن النفس فيلهم  
بذلك الجسم إلى يلقى به.

٢٨٧١١ - نَدِيَّانُ      هو النديمان ، اطلبه .

Cicatrice (F). ٢٨٧١٢ - فند يسيكه  
Cicatrice, Tread (E).

النديبة علامة بيضاء تشاهد على هرقيل البيضة ، أي صغارها ، يتكون منها الجزء البروتوبلازمي حيث تنشأ الحromosome الحية مذكومة كانت أو غير مذكومة .

٢٨٧١٣ - فورتيرا  
Nertera (S), Nertera (F).  
جنس نباتات عشية معمرة وحولية من فصيلة الفويوات.

النوعان المعروفين فيله. مهندا بلاد ويلندا الجديدة. سوفيا  
مشفونة تملو من ٥ الى ١٠ سم. اوراقها بيضية النصل

الصفار البرتقالي. شروبه وأصممه الزراعية عديدة  
فأوراقها استطالة الشراخ ولون الزهر.

٢٨٧٢٧ - نرجس لسييمي \* هو الزئير، اطلبه.

٢٨٧٢٨ - نرجس بيقلوب \*

*Sprekelia formosissima* (S). *Sprékélie magnifiqua*,  
*Lis St. Jacques*, *Amaryllis à fleur en croix* (F). *Jacobe*  
*anilly*, *St. Jame's-cross lily* (E). *Echte Jakobille*  
(D). *Giglio di St. Giacomo*, *Croce di St. Giacomo* (I).  
نبات يصل من فصيلة النرجسيات يزدهر للزئير. أوراقه  
مزودة التصفيف، قرصية الانتشاب، عصفية الشكل  
تظهر بعد الأزهار. أزهاره مركب من زهرة كبيرة واحدة  
ترتكز على شراخ يملو نحو ٦٠ سم. بتلاتها متدلية تعلو  
نحو ١٠ سم. لونها إلى الحمرة القرمزية المائلة، زراعت  
لا تتطلب حناية خاصة إنما يرغب في الأتربة القليلة  
الانتماج.

٢٨٧٢٩ - نرجسيات  
*Amaryllidaceae* (S). *Amaryllidacées* (F).

فصيلة نباتية من وحدات الفلقة، أجناسها وأنواعها كثيرة  
العدد منتشرة في جميع اصقاع العالم. أشهر أجناسها  
النرجس والنرجوس والأماريليس والباهرة.

٢٨٧٣٠ - نرجس \*  
*Hippeastrum* (S). *Hippéastre* (F).

جنس نباتات بصلية عشبية من فصيلة النرجسيات. أنواعه  
وشروبه عديدة. أوراقها قرصية الانتشاب، قدية الشكل.  
شماريتها الزهرية مجوفة. أزهارها عذبة وبخورية متدلية،  
قبة القالب، سداسية البتلات، عديدة الألوان المختلفة  
التي تراوح من الأبيض إلى الأحمر القرمزي || اعرف  
أنواعه وأشهرها ما يتبع.

٢٨٧٣١ - نرجس أرجواني

*Hippeastrum rutilum* (S). *Hippéastre écarlate* (F).  
نوع من النرجس السروتي. صمته رندية الجذور. أوراقه  
مستعرضة جميلة الخضار الأزاهي تعلو نحو ٣٠ سم. شراخه  
الزهرى يملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أزهاره ثنائية التجميع،  
متقاربة الارتكاز، عادمة العرف، أرجوانية اللون.  
تنوره يستمر طوله فصل الربيع.

٢٨٧٣٢ - نرجس أميري

*Hippeastrum sulcum* (S). *Hippéastre princier* (F).  
نوع من النرجس السروتي. هذه البرازيل، أوراقه  
عديدة جميلة الخضار تعلو نحو ٤٠ سم. شراخه الزهرى  
يملو نحو ٥٠ سم. ينتهي زهرتين كبيرتين لونهما إلى الأحمر  
المغلف بالجوي أما التويج فأخضر اللون، مذهب التهديد.  
تنوره يستمر طوله شهر كانون.

٢٨٧٣٣ - نرجس الملكة كارولين

*Hippeastrum reginae* (S). *Hippéastre de la reine*  
*Caroline* (F).  
نوع من النرجس الجادح. أوراقه عديدة مستطيلة النصل  
الضيق. شراخه الزهرى يملو من ٥٠ إلى ٦٠ سم. أزهاره  
وردية التجميع كبيرة اللد أرجوانية اللون يتوسط تويجها  
نجوم خضراء تنوره يستمر من أيار إلى تموز.

٢٨٧٣٤ - نرجس بيماني

*Hippeastrum psittacium* (S). *Hippéastre perro-*  
*quet* (F).  
نوع من النرجس السروتي الشائع الزراعة. أوراقه خضراء

قدية مستطيلة. شراخه الزهرى يملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم.  
ينتهي زهرة وسيدة، كبيرة القند، عطرية الرائحة،  
بيضاء اللون، ترتكز على تويج أسفر القالب، أحر الإطراف.  
ينور في الربيع.

٢٨٧٣١ - نرجس برّي \*، نرجس جبلي،

سيراس

*Narcissus pseudonarcissus*, *N. sylvestris* (S). *Nar-*  
*cisse sauvage*, *N. trompette*, *N. des prés*, *Porion*,  
*Clochette des bois*, *Coucou*, *Jeannette* (F). *Wild*  
*narcissus*, *Daffodil*, *Lent lily* (E). *Gemeine Narzisse*  
(D). *Narciso del boschi*, *N. falso*, *Tromboncino* (I).  
نوع من النرجس السروتي الملهول. أوراقه قرصية  
الانتشاب، خماسية أو سداسية المدد. نصلها منتصب  
الصفيحة للنسيلة. شراخه الزهرى يملو نحو ٣٠ سم.  
ينتهي زهرتين كبيرتين بوية التويج لونهما إلى الصفار  
الكثيري || ينور في آذار. يعيش في جميع المواع  
والأتربة.

٢٨٧٣٢ - نرجس شرقي \*، مصحف

*Narcissus orientalis*, *N. tazetta* (S). *Narcisse taz-*  
*zette*, *N. à bouquet*, *N. de Constantinople* (F). *Tazetten-*  
*narcisse*, *Polyanthus narcissus* (E). *Tazetten-*  
*Narzisse* (D). *Narciso a mazzetto*, *Tazetta* (I).  
نوع من النرجس السروتي الملهول. شروبه وأصممه  
لا تقل من ١٢٠ سم. جميعها من نباتات سوفس البحر المتوسط.  
أوراقه قرصية الانتشاب قدية النصل البحري الخضار  
الغليل التخديد. شراخه الزهرى قوي القصبة يملو من  
٣٠ إلى ٥٠ سم. ينتهي بضمة من الزهر. أزهاره مستطيلة  
الان، متدلية، متوصلة الخج، لونها إلى الأبيض الأصفر  
المواج، هرفها ذكي الرائحة ألفيلا || ينور في الربيع.

٢٨٧٣٣ - نرجس عطر \*، جرناء

*Narcissus odoratus* (S). *Narcisse odorant*, *Camper-*  
*nelle*, *jonquille campernelle* (F). *Campernelle jon-*  
*quille* (E). *Wohriechende Narzisse* (D). *Giracapo*,  
*Giracoli* (I).  
نوع من النرجس السروتي الشائع الاستهلاك الزاهي.  
أوراقه متزاوية الشكل، جميلة الخضار الزاهي. أزهاره  
ثنائية أو رباعية التجميع، ذكية العرف، صفراء اللون، ترتكز  
على تويج قسي الشكل يكمل حامة الشراخ الذي يملو  
نحو ٣٥ سم. || ينور من آذار إلى نيسان.

٢٨٧٣٤ - نرجس عنكبوتي  
*Pancratium* (F).  
هي حلانة، من النرجسيات، أطلبها.

٢٨٧٣٥ - نرجس مبخار

*Narcissus serotinus* (S). *Narcisse tardif* (F).  
نوع من النرجس الجادح المشخار. أوراقه خيطية الشكل  
راوح عددها من ١ إلى ٢، شراخه الزهرى دقيق ونحيل  
يملو من ١٠ إلى ٢٥ سم. ينتهي زهرة وسيدة كبيرة  
القد، عطرية الرائحة، بيضاء اللون، صفراء التويج. ينور  
في تشرين.

٢٨٧٣٦ - نرجس مدوسي \*

*Narcissus bulbocodium*, *Corbularia bulbocodium*  
(S). *Narcisse bulbocode*, *Trompette de méduse* (F).  
نوع من النرجس السروتي. أوراقه قرصية السروتي.  
قدية النصل الضيق المستطيل. شراخه يملو نحو ٣٠ سم.  
ينتهي زهرتين كبيرتين. تويجها بوقي الشكل لونها إلى



نرجس برّي



نرجس عطر



نرجس مدوسي



نرجس بيقلوب



نرجس

## ٢٨٧١١ - نُرّاق

النّار: داه يأخذ النّمْ تَنْزُو مَه حَتَّى تَمُوت .

## ٢٨٧١٢ - نُرّاق ، نُرّاق (F). Conflict (E).

هو التّعارض بين مؤقنين . وهو في القانون الإداري خلاف بين محكّمين على اختصاصهما في النّظر بدمى واحدة .



نرّاق مبلول

## ٢٨٧١٣ - نُرّاق (F). Litige (E).

خصومة تقضي إلى رفع دعوى .

## ٢٨٧١٤ - نُرّاق (F). Vampyrus (S).

Vampire (F). Vampire (E).

جنس خفافيش من فصيلة الوريثات . أزعاره عديدة ؛ موطنها البلاد المتتلة للمسفرة نحو الحارة؛ تكثر في أربكة الجنوبية || أجسامها مستطبة اللّقد . رؤوسها ضخمة ، مستطبة . فرائسها بارزة . ورائدتها المنخرية سنانية الشكل ، كبيرة ، ضيقة ، أظانها لا أثر لها || تأثف الأجرع الكثيفة والأجبار الغضة . تدمش مفردة . ذكورها تقرب أظانها عند الكرم فقط . مسرحها من الفسق إلى التّجبر . قوتها الحشرات والآبار والدم تستنزف من مختلف الحيوانات أعصها الخيل والبقر || أعرّف أنواسه وأشهرها النّزّاق الميزول .

## ٢٨٧١٥ - نُرّاق مبلول \* ، نُرّاق شحبيّ

Vampyrus spectrum (S). Vampire spectre, V. commun (F). Great vampire, False vampire (E).

نوع من النّزّاق ، طوله نحو ١٤ سم . وبسطة ٣٥ سم . ثوبه خفيّ للملّس كسنيّ الرأس والظهر ، انشب البطن والحواشي . موطنه فسيح الأرياء يم أربكة الجنوبية ، يكثر في الفريسان . يأثف الأجرع الكثيفة . قوته الحشرات والآبار والدم .



نرّاق

## ٢٨٧١٦ - نُرّاق \* ، أبو عصفن

Antidorcas anachore (S).

Gazelle à bourse, Sprinbok (F). Sprinbok (E).

نوع من الغزلان . حيوان لبون مجرّ أجوف القرن ثنائي الإخلاف . موطنه أفريقية الجنوبية . تأثف السباب . ملجته الحياطي جامعي . إجله يمد بعض الحماث || جسمه ربع القامة ويثيق القوائم كسائر الغزلان . ثوبه إلى السمرة الخطّية . عنقه وصدره وبطنه وقفاء إلى الأبيض ألبنيّ المواج . قرنه متتابع الخيد ، ضرب الطرف المنحط || يتشيز بالحفّة وبسرعة المدوم ويتتابع أنقز البيهه الجبال .



نرّاق

## ٢٨٧١٧ - نُرّاقه \*

Pilea (S).

Pilea, Herbe au feu d'artifice (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الانجريات . أزعارها المعروفة عديدة جميعها من نباتات المناطق الاستوائية والحارة . معطشها مصر وبسطة حوالي || سوقها قرءا ، أرواقها متطابقة ، ضيقة ، سنانية الشكل ، مستطبة التّتيب . تصالها كثيرة المروق والاعصاب ، خلية البشرة ، مسنة الحواشي . أزعارها وحيدة للمسكن ، متقوية التّجميع ، أبطية الارتكاز . مآبر أزعارها الذّكورية تنفجر عند أدراك الطّلع وتقلّد به بيهة || منها أنوار تزريق نرّاق . المصاري أعصها الزّاقة النّخامية (Pilea mucosa) .

الزّين طول نحو ٤٥ سم . شراخه الزّهري يعلو من ١٥ إلى ١٠٥ سم . أزعاره محورية الارتكاز ونامية ، ثنائية التّجميع ، نرّاقا إلى الخفسار المصاع والمجذع بالأجرع القرمزي . تنويره يستمر من الربيع إلى الخريف .

## ٢٨٧٣٥ - نُرّاق جزل

Hippeastrum bifidum (S). Hippeastrum bifide (F).

نوع من النّرجس السبروي . أرواقه بحرية القرن طول نحو ٣٥ سم . شراخه الزّهري يتقدم الأوراق ويعلو من ٢٥ إلى ٣٥ سم . ضسته الزّهرية تجمّع من ٤ إلى ٦ أزعار . تزيينها مهذب اختار ، أزعاره جزلة طول نحو ٥ سم . بلانها قرنية الزّين يتوسطها خط أخضر || تنويره يستمر من حزيران إلى أيلول .

## ٢٨٧٣٦ - نُرّاق فهدّي

Hippeastrum pardinum (S). Hippeastrum leopard (F).

نوع من النّرجس الجالنج . أرواقه شديدة الخفسار طول نحو ٦٥ سم . شراخه الزّهري يعلو نحو ٥٥ سم . أزعاره كبيرة اللّقد ، حابية الزّين ، موطّقة بالأجرع الجوّي || تنويره يستمر طوال شهر شباط .

## ٢٨٧٣٧ - نُرّاق موشّح

Hippeastrum vittatum (S). Hippeastrum à bandes, Amaryllis à bandes, A. de Rouen (F). Banded amaryllis (E). Bandirre Amaryllis (D). Amarellistricia (I).

نوع من النّرجس السبروي الشائع الزّراعة . أرواقه حابطة الخفسار طول من ٦٥ إلى ٧٥ سم . وتعرض نحو ٥ سم . شراخه الزّهري غليظ القصبية الخبئية يعلو من ٩٥ إلى ١٠٥ سم . أزعاره لا يقابلية التّجميع تراوح ضحّا من ٤ إلى ٩ أزعار ، تكثر في أرباط الشراخ وتقلّ مع اقترابها من الغامة . والزّهرة كبيرة اللّقد مدبة البلات المحبّة وفي مطرقة الزّانة حابية يعلوها توضيح وودي كامل المخطوط . تنويره يستمر من حزيران إلى تموز .

## ٢٨٧٣٨ - نُرّاقين \*

Narcissus (S).

Narcine (F). Narcinus (E).

جنس املاك بحرية من السفديات وفصيلة الرمادات . أنواعها المعروفة خمسة ، أعطائها عمار المناطق الاستوائية والحارة || أجسامها متتلة الطول ، يرصية الشكل ، مبططة اللّقد ، مستطبة الإذئاب || من ميزاتها الغامة إطلاق ساهها الخيشوشة من أربع فجوات مستطبة مركزها في مقدم الرأس ، فميوتان تحت كل عين || لحومها مأكولة ، متتلة الصنف .

## ٢٨٧٣٩ - نُرّاقية

Polythriss sinensis (S).

Polythriss de Chine (F).

خبيزة برية وتزيينية من فصيلة النّفسيات . مهدا الصين . ساقها منتصبة لفرام تعلو من ٣ إلى ٥ أمتار . قرورها حجر السّماء . أرواقها حابطة منقطة متعاقبة . نصلها قلمي الشكل مالمس الصفحة العليا خلي السفلى . أزعارها وحيدة المسكن ، عادمة التّزيين ، صفيرة اللّقد ، يفسد أيلول . أزعارها شوكولي التّجميع ، طرفي الارتكاز . شاموها حقبة الشكل ، رباعية المصاريح || تنويرها يستمر طوال شهر تموز .

## ٢٨٧٤٠ - نُرّاق ، نُرّاق

Saillie, Monte, Coite (F).

Covering, Serving, Cotion (E).

النّزّاء والنّزّو هو جاع الحيوان الماسن كالحيل والبقر .

٢٨٧٦٣ - نَزُونِيَّة \*  
Nasonia brevicornis (S).

Nasonia brevicornis (F).  
حشرة نافقة من الصفريات الفشائية الاجنحة، تستغل  
على معظم حشرات ذوات الجناحين اخصها الذباب المنزلي.  
طولها يراوح من ٢ الى ٣ سم. ثوبها الى اخضر الاس  
الاسفح المواجه. زباناها قصيرة القذ صولجانية الشكل.

٢٨٧٦٤ - نَزُونِيَّة  
Bramée, Bramement (F).  
Belling (E).  
صوت الايائل والظباء.٢٨٧٦٥ - نَزُونِيَّة  
هو النَزْر، اطليه.٢٨٧٦٦ - نَزُونِيَّة \*  
Amphipore (F).  
جنس ديدان خموسية مبوللة في معظم بحار العالم.٢٨٧٦٧ - نَزُونِيَّة \* ، كَاكُو  
Narvalis (S).  
Nasique Kakau (F). Nore-ape (E).

قرد وحيد الجنس والنوع من فصيلة الهباريات. موطنه جزر  
الزنجبار. يأنف الغابات القائمة على ضفاف المنابع ويجاري  
الماء. طوله نحو ٧٦ سم. وذنبه ٧٠ سم. يتميز بانفه  
المستطيل الارضية. ثوبه كثيف الشعر الناعم للمس،  
لونه الى الكهية الصفراء يبقى عند الظهر ويحمر عند الصدر  
والبلطن.

٢٨٧٦٨ - نَزُونِيَّة الشَّرُونِيَّة \*  
Nysius senecionis (S). Nysius des seneçons (F).

حشرة خاضعة من فصيلة الطغريات ورتبة غنطفات الاجنحة.  
صغير القذ، وطول نحو ٤ مم. رأسها شبه مزواني  
الشوزن، مذهب اللون. غطلمها صغير. عينها صغيرتان،  
ناشرتان. زباناها مستطيلتان. كسولها والصفحة العليا  
من بطنها الى الصغار المذهب. الصفحة السفلى الى السرة  
السوداء. حجبها صغيرة بحمرية، قشرانها شفافة ||  
مسرهما البراري. تركب نباتات فصيلة المركبات واعصها  
الشرونيات.

٢٨٧٦٩ - نَزُونِيَّة \*  
Nisionades (S).

حشرة من المسيريات. فراشها صغيرة القذ، مردنية  
الجم. حنطية الثوب، طول نحو ٢٦ مم. في الذكور  
والاناث. رواشها كستنية اللون سفع المواجه، حنطية التصليج  
والزركشة في الاناث، بيض التنقيط في الذكور.  
يكثر وجودها من نيسان الى حزيران. يرقاها تركب معظم  
النباتات التريينية دون ان تؤذيها شديد الاذى.

٢٨٧٧٠ - نَزُونِيَّة تاج \*  
Nisionades tages (S).

Nisionades tages, Thanaos tages (F).  
Nisionades tages (E).

حشرة من فصيلة المسيريات ورتبة حشرقيات الاجنحة.  
موطنها معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الاقصى  
واروبه. فراشها واثمة قوتها رقيق الاضرار. سرقتها تمش  
على اوراق الشنداب والاروس واكثر نباتات القرنيات  
القراضية || جسمها متوسط القذ يطول نحو ١٣ مم. بسطها  
نحو ٢٧ مم. رأسها كستنية اللون. عينها كبيرتان. زباناها  
صولجانان. جوشها وبطنها الى الكستني الاسمر الازفح  
المواجه || رواشها الذكر الى الكهية البهراء تملوها في الربيع  
الاسامي اربع جندات متعقلة كستنية اللون ويملؤها في  
الزواج الخلفي تخضيب كستني متفاوت السرة || رواشها

## ٢٨٧٤٨ - نَزْر

النزردوم في فرع البقرة. يقال بقرة مزورة اي واردة  
الفرع.

## ٢٨٧٤٩ - نَزْر البَرَامِ

Ebourgeonnage, Ebourgeonnement (F). Nipping of  
buds, Dis budding (E).  
هو التثقيب اي انتزاع البرام الزائفة او القذارة لتحويل  
ما تستهلكه من نضج الى سائر ما تبقى من اعضاء النبات  
الهوائية.

## ٢٨٧٥٠ - نَزْر المَلَكِيَّة ، اِسْتِمْلَاك

Expropriation  
هو سلب المالك ملكه قانونياً لنفع العام على ان يدفع عنه  
المقدم اليه.

## ٢٨٧٥١ - نَزْرَة ، نَزْرُوع

Atavisme (F).  
Atavism (E).  
هي البنج والبنج اي نزع الاحياء في الرجوع الى الاصل  
الذي اجتمعت عنه اقسامها السابقة او السالفة.

## ٢٨٧٥٢ - نَزْرَة

|| بقلة كالخضرة تكون بالمرض وليس لها زهر ولا ثمرة ،  
تأكلها الابل اذا لم يجد غيرها « (ابو حنيفة) .

## ٢٨٧٥٣ - نَزْر ، نَزْرِيَّة

Hémorragie (F).  
Haemorrhage (E).  
خروج الدم من مجاريه الطبيعية .

## ٢٨٧٥٤ - نَزْر الرَحْمِ

Métrorragie (F).  
Metrorrhagia (E).  
نزف رمحي يحصل اثناء الحمل يؤدي الى الاجهاض .

## ٢٨٧٥٥ - نَزْرِيَّة

Hemipenis (F). Hemipenis (E).  
النزك تقصيب الذكر عند الزحافات كالحيات والسلاحف  
والعظاء. وهو يتميز بانزواجيته وباشكاله المختلفة وبنماليه  
المديدة الاطراف او المسنة التي تمكنه عند انتشارها من  
الالتحام وعدم الافلات.

## ٢٨٧٥٦ - نَزْر

Produit (F). Produce (E).  
النزق والنلة من محاصيل الارض الزراعية .

## ٢٨٧٥٧ - نَزْرِيَّة

Catarrhe (F). Catarrh (E).  
التهاب الغشاء المخاطي وسيلانه .

## ٢٨٧٥٨ - نَزْرَة والِنْدَة

Grippe (F). Influenza (E).  
هي الوفاة والانفلونزا والنزلة الصدرية الوبائية، مرض معد  
يصيب الانسان والحيوان .

## ٢٨٧٥٩ - نَزْرَة وَنُونِيَّة ، نَزْرَة صُدُونِيَّة

Broncho-pneumonie (F). Broncho-pneumonia (E).  
مرض التهاب الشعب الرئوية يصيب الانسان والحيوان .

## ٢٨٧٦٠ - نَزْرَة شَعْبِيَّة ، بَرُونِيَّة

Bronchite (F). Bronchitis (E).  
مرض التهاب الشعب يصيب معظم الحيوانات الداجنة لا سيما  
الخليل والضأن .

## ٢٨٧٦١ - نَزْرُوع

هو النزاء، اطليه  
٢٨٧٦٢ - نَزْرُوع  
Atavisme (F). Atavism (E).  
هي نزع الاحياء في الرجوع الى الاصل الذي اجتمعت عنه  
انسابها السالفة. اطلب نزع .



نَزُونِيَّة



نَزْر



نَزُون



نَزُون تاج

٢٨٧٨١ - نِسْبِيَّة (F).  
Proportionnalité (F).  
Proportionality (E).  
حالة الأعداد أو الأشياء المناسبة فيما بينها .

٢٨٧٨٢ - نِسْء \* و نِسْء (F).  
Nyssa (S).  
Nyssa, Tupéio (F). Tupéio tree (E). Tupelobaum (D). Niss (I).  
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة النسيات . أنواعها المعروفة قليلة، جميعها أشجار ونجيليات عابلة . جلورها حشة تستعمل استعمال الفلين . سوقها رقيقة منتصبة الأصناف . اشفاها لينة المادة يضاء اللون . أوراقها متعاقبة جامدة التصل للاعم . أزهارها لا نظامية التركيب منها المخشوية الخماسية الاسدية ومنها الذكرية المشارة الاسدية المتعدودة التجميع ومنها الانثوية الثلاثية التورة . ثمارها عجمية النواة ، لينة السودق || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .



نِسْء

٢٨٧٨٣ - نِسْء بَيْضَاء (F).  
Nyssa candicans, N. ogeche (S). Tupéio blanchâtre (F).  
نوع من النسة ، شجرتها متصلة اللد سرية اثنو تملو من ٦ الى ١٦ م . أوراقها قصيرة الاثاق تطول نحو ١٥ سم . نصلها اسفلي الشكل مائل الصمعة العليا خلى السفلى التي تيلو كأنها مطلية بالرماد الأبيض || عناقيد أزهارها الذكرية صغيرة الحجم . أزهارها الانثوية فردية التجميع مزينة الاعضاء . ثمارها بيضيه الشكل حمراء اللون تطول من ٢ الى ٤ سم . سوقها حاتم العلم . صمغها عريقة التخثيد الطولي .

٢٨٧٨٤ - نِسْء جَبَّارَة (F).  
Nyssa aquatica, N. uniflora (S). Grand tupéio (F).  
نوع من النسة ، شجرتها كبيرة الحجم سريعة النمو ترُغب في المناطق والمواقع الرطبة . تملو نحو ٣٠ م . أوراقها كبيرة القد ، أهليلجية الشكل ، مديبة المقص ، مجهرة بثلاثة اسنان كبيرة القد مستندة الاطراف . نصلها مائل الصمعة العليا ، خلى السفلى . خله قفي التجميع اخير اللون . أزهارها الانثوية فردية التجميع . ثمارها بيضيه الشكل تطول نحو ٣ سم . لونها الى الزرقه المايقة .



نُسْر

٢٨٧٨٥ - نِسْء جَبَّارَة (F).  
Nyssa sylvatica (S).  
Tupéio de montagne (F).  
نوع من النسة ، شجرتها كبيرة الحجم سريعة النمو تملو من ١٢ الى ٣٦ متراً . أوراقها مسطيلة الاثاق تطول نحو ١٢ سم . نصلها أهليلجي الشكل لامع البشرة على صمغته . عناقيد أزهارها الذكرية مسطيلة . أزهارها الانثوية شفعية التجميع براوح مدعما من ٢ الى ٨ . ثمارها حمية القد والشكل لونها الى الزرقه المايقة .

٢٨٧٨٦ - نُسْتَر (F).  
Amorpha (S). Amorpha (F).  
جنس نباتات برية وريينية من فصيلة القرقيبات . انواعه المعروفة قليلة جميعها جنبات ونجيليات لاقياسية القباب والبهمة . أوراقها ريشية ، وريية التركيب ، عابلة . أزهارها مستحبة الرائحة ، متبلبة التجميع ، بنفسجية اللون || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٨٧٨٧ - نُسْتَر أَيْض (F).  
Amorpha canescens (S).  
Amorpha blanchâtre (F).  
نوع من النُسْر البوروي التريفي . جنته صغيرة القد تملو نحو ٩٠ سم . أوراقها تطول نحو ١٠ سم . ورقها

الائى قريبة الشبه برواشن الذكر الا انها اجهت مابة || لها جيلان في الخوط . تظهر فرائشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فرائشة الجبل الثاني في تموز . تسرح في التبار . تماثل بند ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتحتج الممكن مباحدياً على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٢ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مستصفي الوسط ، مائل القشار ، اسمر اللون ، تملو مابة خضراء زرقاء . رأسها اسود . مدنها ورواجها الى السرة القائمة || طول الكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ١٥ يدا ، يستمر في الجيل الثاني نحو ١٨ اسبوعاً وينقضي ضمن صلجة تحجبها السرة بين الاوراق الابيدة .

٢٨٧٧١ - نُسْح \* و نُسْح (F).  
Lézarde (F).  
Crack (E).  
انصداع في جدار البناء سببه مرور الزمن أو هيب في البليان أو خلل في الهيكل نتج عن ظرف قاهر .

٢٨٧٧٢ - نُسْاس (F).  
Déluscent (F).  
Déluscent (E).  
نمت تعريفي يطلق على الاجسام التي تتأخ من تشربها رطوبة الهواء .

٢٨٧٧٣ - نُسْاسَة (F).  
Déluscent (E).  
صفة الأجسام التي تتأخ من الرطوبة التي تمتصها أو تشربها من الهواء .

٢٨٧٧٤ - نُسَاف (F).  
طائر له مغار كبير (ابن سيده) ج . نسايف .

٢٨٧٧٥ - نُسَاف و نُسَافَة (F).  
Tarare, Vanneuse (F). Winnowing-machine (E).  
آلة تنظف الحبوب بواسطة تيار هواء يتسلط على غرابيلها المازنة .

٢٨٧٧٦ - نُسَافَة (F).  
Taxologie (F). Taxology (E).  
النساقه علم يبحث في تنسيق جميع معارف البشر .

٢٨٧٧٧ - نُسَب و نُسَب (F).  
Lignage (F). Lineage (E).  
هو القرابة في الآباء خاصة . وهو نومان نسب مستقيم وهو ما كان بين الآباء والأبناء . ونسب عرشي وهو . ما كان بين الاخوة وبني الاخوة وبني الامام . ج . انساب

٢٨٧٧٨ - نُسَب (F).  
Généalogie (F). Genealogy (E).  
هو سلسلة تتابع الانسال في الاسرة الواحدة أو العرق الواحد .

٢٨٧٧٩ - نُسْبَة هَذَلِيَّة و نُسْبَة هَذَلِيَّة (F).  
Relation nutritive (F). Nutritive relation (E).  
هي نسبة للمواد الأتروية الى غيرها من المواد الغذائية القابلة للمضم في كل علف أو لحم .

٢٨٧٨٠ - نُسْبِي و نُسْبِي (F).  
Proportional (F). Proportional (E).  
نمت تعريفي توصف به مناسبات الأشياء المختلفة .



وهو من القواطع يحوي اجزاء اسيا الوسطى وافريقية الشرقية والهندية واروپة الجنوبية . سربه يتألف من ثلاثة الى ستة أزواج || قوته الجيف على اختلاف انواعها واذا جاع تعدى على النعم والماعز والغنم || الذكر لا يفارق انثاه مدى الحياة . يذبح وكه بين فروع شجرة داسية على ارتفاع بضعة اقدام من الارض || انثاه تبيض رقتين كبيرتين لونها الى الرماد الاطلح تملو رقة حمراء . الحفن يستمر نحو ستة اسابيع تقارب عليه الاثنى والذكر .

٢٨٧٩١ - نَسْرٌ امْرِيكِي Condor (F).  
هو الكنتور ، اطلبه .

٢٨٧٩٥ - نَسْرٌ طَائِر Altaïr (F). Altaïr (E).  
النسر الطائر ويدعى الطير ، نجم نيز من كوكبة العقاب . راجع طير .

٢٨٧٩٦ - نَسْرٌ قَتَّاح Condor (F).  
هو الكنتور ويدعى النسر الامريكي ، اطلبه .

٢٨٧٩٧ - نَسْرٌ قُبْرَانِي \* ، نَسْرُون Vultur occipitalis (S). Vautour huppé (F). White headed vulture (E).  
نوع من النسر ، كبير الهامة قدرة قدر نسر الجواء . ثوبه الى البياض الاغبر ازراي المايح . قرص رأسه متفرع بقشرة صغيرة زفية الريش ناصعة البياض . عنقه منحرف الريش الاغبر ، برائله اصفر باهت || موطنه افريقية الوسطى . يألّف الاحراج ويجاري الماء . اخلاقه وطباعه لا تختلف عن اخلاق وطباع نسر الجواء .

٢٨٧٩٨ - نَسْرٌ وَاقِع Vêga (F). Vega, Wega (E).

النسر الوراق نجم نيز لامع من كوكبة القيثارة . يعتبر من ألمع نجوم السماء . يجد من الارض نحو ٢٦ سنة ضوئية . يبدو ان النظام الشمسي بكامله يسير باتجاهه اي انه يجذبه نحوه .

٢٨٧٩٩ - نَسْرِيَّات Vulturidae (S).  
Vulturidés (F). Vulturidae (E).

فصيلة من لمة النسور وفئة كواس النهار وربة الجوارح ، تشمل النسر والرخة والآنوق والقشام والبيات والسفل ، جميعها كبيرة الجثة والسفط . رأسها اصلع او اغفر . برائلها كبيرة ، عنقها اغفر الريش الناعم . ارساغها عارية غلاف ارساغ العقبان الكاسية السمرلة . غالبا فريقة لذلك فهي لا تقوى على حمل فريستها كما تفعل العقاب وهذا مما يجعلها تقع على الجيف وتلقا تصيد .

٢٨٨٠٠ - نَسْرِين \* ، جَلْنِسْرِين ، وَرْدَبَرْتِي \* وَرْد السِيَّاح

Rosa canina (S). Eglantier, Eglantine, Rose sauvage, Ros des chiens (F). Canker flower, Dog-rose, Dog-briar, Heprrose (E). Hundrose, Hundrose (D). Rosa canina, R. delle siepi, Cinorrodo (I).  
نوع من ورد البري . ساقه تملو من مقر الى ثلاثة امتار . شوكه متناهي الدرز ، حاد الطرف المحجن . وريقاته ورية الشجيع ، مستطيلة الاعناق ، ناشرة المروق والاعصاب . مستنة الخالقة . ازهاره خرداء اللون ، ووردية المراح ، مستحبة العرف الذي الراحمة ، بتلاتها وسيدة الصف . حمراء نووية

كثيرة المدد البري الذي يراوح من ٢١ الى ٤٩ ، نصلها خيل البشرة على صفحتي السفلى . سنباله الزهرية مستطيلة . ازهاره يستمر طوال شهر تموز .

٢٨٧٩٨ - نَسْرٌ مُشْبِرٌ Amorpha fruticosa (S). Amorpha arbusif, Indigo bâlard, Faux indigo (F). Bastard indigo (E). Bastard-indigo, Strauchige Uniform (D). Amorfa, Indaco bastardo, Falso Indaco, Amorosa (I).  
نوع من النسر السبروتي الشائع الزراعة . شجيرة كبيرة لقد تملو من ٣ الى ٤ امتار . اوراقه مستطيلة الاعناق طولها نحو ٢٥ سم . وريقاتها تد من ١١ الى ٢١ نصلها يبغي الشكل يطلو من ٢ الى ٣ سم . سنباله الزهرية غنية لينة تملو نحو ٢٠ سم . || ازهاره يستمر طوال شهر حزيران .

٢٨٧٩٩ - نَسْرُون \* Agonostoma (S). Nestis (F).  
جنس اسماك نهيرة من شالكاك الزعانيف وفصيلة البوريات . انواعه المعروفة نحو ١٥ اعطائها انهر افريقية الاستوائية || اجسامها احليلية الشكل ، مستدلة التيطيد ، تطلو من ١٥ الى ٢٢ سم . رؤوسها صغيرة مغلطة كركؤوس البوري . زعانفها الظهرية ثنائية ، الخلفية منها تقابل الشرجية . زعانفها الذيلية كبيرة مقطوعة الاطراف او قليلة التقدير . اثوابها تراوح من الرمكة المتفاوتة السمرلة الى الشبهة . غصاب رؤوسها وظهورها اصعب من غصاب بطونها الذي يدر عند بعض الانواع || لحمها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٢٨٧٩٠ - نَسْرٌ عَظَمَ Epandré (F). To scatter (E).  
نوح السباد والقراب والقتش ... اذخاها .

٢٨٧٩١ - نَسْرٌ Fourchette (F). Frog (E).  
من اجزاء حافر الخيل وهو القسم البارز من باطن الحافر .

٢٨٧٩٢ - نَسْرٌ Vultur (S).  
Vautour (F). Vulture (E).

جنس طير من الكواس ينتمي الى فصيلة النسريرات . انواعه قليلة المدد كبيرة الجثة الضخمة . رؤوسها صلح غفر . مناسره مستطيلة جالسة تنتهي بهرة منمنقة حادة . اعناقها زفية الريش الاغبر . قواعد اعناقها مطوقة ببرائل مهدلة الزئب . سوافعها مستطيلة منفرجة . اذنانها قصيرة مستديرة . ارساغها قوية عارية || والنسر شره نهم رقيق ، اذا وقع على جيفة واصل منها لم يستطع الطيران حتى يشب وبيات متتالية يرتفع على اثرها شيئا فشيئا || ويقال للنسر عريف الطير . كنيته ابو الاربد وابو الاصم وابو مارك وابو المنبال وابو يحيى . والاثى يقال لما تم قضم . ويحي لسرا لانه ينسر الثي . ويستهلم . جمه في القلة النسر وفي الكثرة نسور || اعرف انواعه واشهرها نسر الجواء والنسر القنبراني .

٢٨٧٩٣ - نَسْرٌ الْجَوَاء \* Vultur monachus (S). Vautour moine, V. cendré, V. arrian, Grand vautour (F). Hooded vulture (E).  
نوع من النسر ، طولها نحو ١٢٥ سم . وفتحة مقطبي نحو ٢٥٠ سم . ثوبه الى السمرلة الخفيفة النبراء . رأسه اصلع . عنقه اغفر الريش الاطلح . برائله مستطيلة اللون . منسره كبير القد ، حاد الهرة الزرقاء الشديدة الانعقاد .



نيسر



نسر الجواء



نسر قنبراني



نسرين

٢٨٨١١ - نِسْفَكَة ، نِسْفَكَة ، نِسْفَكَة ، نِسْفَكَة ،  
نِسْفَكَة ، نِسْفَكَة ، نِسْفَكَة ، نِسْفَكَة ،  
Basalte (F), Basalt (E).  
وقد ترد بالثنى بدلا من البين، هي ججارة الحجرة المرداء  
ذات النخاريب .

٢٨٨١٢ - نِسْفَكَة Moulière (F), Millstone grit (E).  
صخور صوانية نخرة تستعمل كإرسية .

٢٨٨١٣ - نِسْق شَامِيّ  
النسق الشامي مجموعة كواكب مصطفة على رأس الحية  
في كوكبة حور وسية .

٢٨٨١٤ - نِسْق يَمَانِيّ  
النسق اليماني مجموعة كواكب مصطفة تحت حتى الحية في  
كوكبة حور وسية .

٢٨٨١٥ - نِسْك Cinnryis albiventris (F).  
هو الثبر الأبيض البطن ، اطلبه .

٢٨٨١٦ - نِسْكَة Nestla (S), Nestle (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة الصليبيات ،  
أنواعها المعروفة قليلة البلد منها يمتد من الشرق الأوسط  
الى اوروبا || سوقها متعصبة فرعاء . أوزانها كاملة .  
ازهارها عنقودي أو عنكولي التجميع . ازهارها صغيرة  
يكثر فيها اللون الاصفر || اعرف أنواعها واشهرها النسلة  
العنكولية .

٢٨٨١٧ - نِسْكَة عُنْكَوْلِيَّة Nestla paniculata (S), Nestle paniculée (F).  
نوع من النسلة . عشبة برية ، حولية ، منها بعض  
الاصناف الليانية ، اخصها الجلية || ساقها فرعاء .  
أوزانها متناقية ، منقطة ، رعية الشمال المستطيلة .  
ازهارها عنكولي التجميع . ازهارها صغيرة ، صفراء اللون ||  
تؤثرها ويبي .

٢٨٨١٨ - نِسْكَاس Ninas (F).  
هو هجرس الناب ، اطلبه .

٢٨٨١٩ - نِسْكَاسَة هي الطيطري الاخضر ، اطلبه .

٢٨٨٢٠ - نِسْكَوس هو النسر القنبراني ، اطلبه .

٢٨٨٢١ - نِسْكَوْجَة Poliste (F).  
هي الزنبور الصغير ، اطلبه .

٢٨٨٢٢ - نِسْكَات Nysracées (F), Nysraceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها والوانها قليلة  
العدد اشهرها النسة .

٢٨٨٢٣ - نِسْج Tiszu (F), Tissue, Web (E).  
الانسجة هي الخامات التي تتكون منها اعضاء الاجسام الحية .  
وهي عديدة الانواع المختلفة التركيب والخصائص تتألف  
من غلايا مائلة شكلها رصبا . || اشهر انواع النسيج  
ما يتبع .

٢٨٨٢٤ - نِسْج دُعَامِيّ Tissu palisadique (F).  
Palisadic tissue (E).

اسم يطلق على النسيج الخفيضي القائم الخلايا المتماكة  
المشودة كما هي الحال في نصال الازراق .

جزوية اللد ، ارجوانية اللون ، نائفة اليب ، غنية بالخاص  
الاستقربوطي الذي يستعمل ضد الحفر .

٢٨٨٠١ - نِسْطَرَار  
سمكة تعرف بِلَوْت المتوسط ، اطلها .

٢٨٨٠٢ - نِسْطُور Nestors (S).  
Nestor (F), Nestor (E).

جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات . انواعه  
المعروفة اربعة مولها زيلدة الجديدة والجزر الجاوية .  
ملحنها الحياقي جامي . افواجها قليلة العدد . تألفت  
الغابات والمواقع التي تكثر فيها الصخور المتراكبة لانها  
تدثر احشاشها في تخاليفها قوتها المواد النباتية واخصها  
الثار العننية والعسائل والنواهي وبعض الحشرات واساريمها ||  
اجسامها معتدلة القد تطول من ٤٥ الى ٥٠ سم . اذنانها  
متوسطة الحجم ، مستديرة الاطراف . اذنانها قائمة الاالوان  
تكثر فيها الشبه السمراء والحمرية الجذوية || الاثني قطع  
اربع يبيضات تحضنها نحو ١٩ يوما بينا الذكر يزين  
لها الغذاء .

٢٨٨٠٣ - نِسْطُورَة Nostoc (F).  
ألف مأكول يكثر وجوده في بعض مناطق الصين . يلقى  
رقعة القمر .

٢٨٨٠٤ - نِسْطُوم Neostoma (S).  
Néostome (F), Neostoma (E).

جنس اسماك بحرية من مقترحات المائنة ، عذبات السهف،  
كبريات الشفق . انواعه المعروفة قليلة العدد تعيش في  
المناطق الجبلية البعيدة انور ولا تشاهد الا نادرا قرب  
الجبال والشلوط || اجسامها متعصبة المقدم ، مستطقة  
المؤخر ، تطول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اشداقها كبيرة  
غنية . جلودها عادمة السهف . لحومها مأكولة متوسطة  
الصفه .

٢٨٨٠٥ - نِسْغ Vent du Nord (F), North wind (E).  
النسغ اسم ريح الشمال . ويقال ريح نسعية اي شمالية .

٢٨٨٠٦ - نِسْغ Poignet (F), Wrist (E).  
النسغ : المفصل بين الكف والساعد .

٢٨٨٠٧ - نِسْغ Sève (F), Sap (E).  
سائل غذائي يؤمن حاجة مختلف اعضاء ونسج النبات . وهو  
على نوعين : نسغ باهل او صاعد او ناقص او واردة ونسغ  
كامل او هابط وهو المصادر المنهية .

٢٨٨٠٨ - نِسْغ بِاهِل ، نِسْغ نَاقِص ، نِسْغ  
صاعد Sève brute (F), Inorganic sap (E).

هو ما يمتصه النبات من مواد قابلة التمثيل فيوردها الى  
الاوراق لتضميرها وتحولها الى غذاء .

٢٨٨٠٩ - نِسْغ كَامِل ، نِسْغ هَاطِط Sève élaborée (F), Elaborate sap (E).

هو ما حفرته الاوراق من النسغ الباهل فاصبح كاملا  
صالحا لتصدريه الى الجلود التي توزعه على مختلف اجزاء  
النبات .

٢٨٨١٠ - نِسْف Vannage (F), Winnowing (E).  
نفض الحب ورفلته بالنسف .



نسطور

Crédit (F). **٢٨٨٤٠ - تسيغَة ، إئشيمكان**  
Credite (E).  
الزمام يقطعه مصرف أو شخص لمن يطلب منه أن يميز له استعمال مال معين نظراً للغة التي يشتر بها نحوه . وقد تطلق اللفظة أيضاً على المال نفسه .

Amidon (F). Starch (E). **٢٨٨٤١ - نُشْجَا ، نُشْجَاء**  
النشامدة عضوية لا متبلورة ، يضاف اللون ، مأمدة العلم والرائحة ، ناعمة للمس ، تلون في الماء الغالي . وهو يتسبي كإبريا إلى فئة مركبات هيدرات الكربون ويتكون مجهرياً من حبيبات ذرية يختلف شكلها وحجمها باختلاف مصدرها || يوجد النشا في معظم أجزاء النبات وأخصها الأوراق الخضر وكثير في بعض الحبوب والنباتات كالحنطة والارز والشعير والقرطم والحمص والفاصوليا والبطاطا والانيام الخ ...

فصية الحنطة تحوي نحو ٧٠ ٪ من النشا  
وحبة الارز تحوي نحو ٨٠ ٪ من النشا  
ولبوب البطاطا تحوي نحو ٢٥ ٪ من النشا

Méteorite (F). Meteorite (E). **٢٨٨٤٢ - نُشَاب**  
شذرة معدنية التركيب مصدرها الاجرام السماوية . يقال انها من سحابة النيازك التي تحترق الاجزاء الارضية . راجع نيزك .

Serpent volant (F). **٢٨٨٤٣ - نُشَاب**  
نوع من الثعابين يدعى السف ، اعطيه .

**٢٨٨٤٤ - نُشَادِر ، نُشَادِر**  
هو الامونياك ، اعطيه .

Vermoulure (F). Worm-hole (E). **٢٨٨٤٥ - نُشَارَكَا**  
حميق الخشب الذي يخرج من الثغوب والانفاق التي تخلدها الحشرات في الاخشاب والاعشاب || وهي أيضاً حميق الخشب الناتج من النشر .

Osyris blanc (F). **٢٨٨٤٦ - نُشَاس**  
نبات تزييني يعرف بأبي ليله ، اعطيه .

Cirro-cumulus **٢٨٨٤٧ - نُشَاص ، نُشَرَكَا**  
نوع من الغيوم البعيدة السحابة ، مظهرها كتل صغيرة تشبه الفطن المنثوق || يقال مصاب نشاص وغيوم نمر .

Dynamique (F). **٢٨٨٤٨ - نُشَاطَة ، دِينَمِيَك**  
Dynamica (E).  
هي علم القوى .

**٢٨٨٤٩ - نُشَاتَان** هو كركدن سويترا ، اعطيه .

Chromosome **٢٨٨٥٠ - نُشَبَة ، نُشَبَة**  
مواد جبرية شكلية لونية معدودة تكون في الخلية أثناء انقسامها . اما عند النش فغير لوني لا يتغير .

**٢٨٨٥١ - نُشَج** النشج هو مجرى الماء الطبيعي .

Phototactisme (F). **٢٨٨٥٢ - نُشَج**  
Phototactism (E).  
النشج مدى تأثير النور باعضاء النبات .

Plasmon **٢٨٨٥٣ - نُشَجَة**  
التراث الوراثي الخارج عن نطاق النشج .

Tissu adipeux (F). **٢٨٨٥٥ - تسيغ شحمي**  
Adipose tissue (E).  
كل نسيج في الحيوان تحولت لخلايا وحتوت شحما من جراء التسيغ .

Tissu conjonctif (F). **٢٨٨٥٦ - تسيغ ضام**  
Conjunctive tissue (E).  
هو في النبات نسيج الرن الذي يتكون من خلايا عادية التمييز تصنف بمقدورها الانسيابي الذي يؤهلها الى الدورق في تركيب مختلف النشج .

Tissu nerveux (F). **٢٨٨٥٧ - تسيغ عَصَبِي**  
Nervous tissue (E).

Tissu de soutien (F). **٢٨٨٥٨ - تسيغ عَصَدِي**  
Support tissue (E).  
هو النسيج الدعامي الذي يمد النبات بالصلاية النوعية اللازمة .

Tissu musculaire (F). **٢٨٨٥٩ - تسيغ عَصَلِي**  
Muscular tissue (E).

Tissu osseux (F). **٢٨٨٦٠ - تسيغ عَصَلِي**  
Osseous tissue (E).

Tissu cartilagineux (F). **٢٨٨٦١ - تسيغ عُفْرُونِي**  
Cartilaginous tissue (E).

Tissu de revêtement (F). **٢٨٨٦٢ - تسيغ كِسَاكِي**  
Revetment tissue (E).  
هو النسيج الذي يغلظ الاعضاء النباتية الهوائية فيحميها من الجلل والنشاث ويختلف المواضع الخارجية .

Tissu méristématique (F). **٢٨٨٦٣ - تسيغ مُتَسَيِّ**  
Meristematic tissue (E).  
كل نبات وراثي يحوي مجموعة من الخلايا غير الممتعة تتكاثر في مناطق معينة ، توجه تخصيصها النسيجي ، تدعى المناطق المنسية . وهي تقسم الى قسمين قسم النشج المنسية الاولى او احمية وقسم النشج المنسية الثانوية او القلبية .

Tissu conducteur (F). **٢٨٨٦٤ - تسيغ مُوَصِّل**  
Conducting tissue (E).  
هو النسيج الرعالي والابنوبي الذي يؤمن النقل السريع بين مختلف اعضاء الجسم النباتي .

Textile **٢٨٨٦٥ - تسيغ شَجِي**  
نعت تعريفي توصف به كل مادة يمكن حلها الى خيوط صالحة للحياكة .

Humidité normale (F). **٢٨٨٦٦ - تسيغ**  
Normal humidity (E).  
الرطاب الطبيعي المألوف الذي يكون في سائر المواد الاستهلاكية وهو ما يميز عنه بالرطوبة النوعية .

Nucelle (F). **٢٨٨٦٧ - نُشَيْكَة**  
هي نقرية اطلها .

**٢٨٨٦٨ - نُشَيْكَة** هي الزوان للممر ، اعطيه .  
**٢٨٨٦٩ - نُشَيْم ، رِيْدَكَا**  
Breeze, Very weak (F). Breeze, Weak wind (E).  
كل ريح ضعيفة لا تحرك مجرأ ولا تمنى أراً . ج. نسام .

## ٢٨٨٧٢ - نضج الزرع \*

Helminthosporium gramineum, Pleospora graminea, Pyrenophora graminea (S). Helminthosporiose des graminées, Maladie des stries de l'orge (F). Stripe disease of barley (E). Streifenkrankheit der gerste (D).

نظر مجهرى يصيب النجيليات اغصانها الشبر والحنطة والشيلم والدخن والذرة || مظهره الخارجى يقع مستطيلة قديمة الشكل تملو العصف فتبدو عابئة اللون ثم شاحبة وتنتهى بالسمرة || يركب الزرع بعد اذياه بارية او خمسة اسابيع وينتقل من صفة الى اخرى اعمل منها حتى السيلة فيمتلئ من الفتحة او يسبب اعلاص مقعدا . يكافح اما باستئصال بذار جديد خال من فطر المرض او بتطهير البذار الموجود بواسطة الاملاح النحاسية او مركبات الزئبق .

## ٢٨٨٧٣ - نضج الشعير \*

Helminthosporium teres, Pleospora teres, Pyrenophora teres (S). Helminthosporiose de l'orge (F). Net blotch of barley (E). Blattfleckenkrankheit der gerste (D).

نظر مجهرى يركب القلت وجميع انواع الشعير الزراعية والبرية . مظهره الخارجى ، في اول صيده ، يقع حائمة لا تقياسية الشكل والحجم تملو نصل العصف وتنتشر بين الاغصان ، لونها الى الخلفى الزيتونى اللامع ، ثم تتسبب وتعاخذ شكل المستطيلات || اضراره في الغالب محبودة وقد تبلغ في بعض المراتع الربطة والظروف الخاصة نحو ٥٠ ٪ . يكافح بتطهير البذار بالاملاح الزئبقية او غيرها .

## ٢٨٨٧٤ - نضج الشوفان \*

Helminthosporium avenae, Pyrenophora avenae (S). Helminthosporiose de l'avoine (F).

نظر مجهرى يصيب الشوفان قيطه . مظهره الخارجى يقع صفيحة مستديرة شاحبة اللون ثم حنطية زاهية قديمة تترك اواسط نصل العصف ثم تمه قسب ذبوله ويابه . اضراره في غالب الاحيان زغبية || يكافح بتطهير البذار كغيره من تطور النضج .

## ٢٨٨٧٥ - نضج

Plantation (F). Plating (E). النصب هو زرع الفراس في التربة . وقد يتم على عدة اشكال اعماها الزدقة والتخصيب .

## ٢٨٨٧٦ - نضجة

Plant (F). Young plant, Slip (E). النضجة والفرسة والغريسة هي كل نبات صغير تم تكته جلدوه من استمرار الحياة متفردا .

## ٢٨٨٧٧ - نضج

Chloroleucite, Chloroplaste, Chloroplastide جسم مشرب الخضيب يوجد في ذقة الخلية النباتية . ج . صاخب .

## ٢٨٨٧٨ - نضج

Oiseau femelle (F). She-bird (E). النضج في الصفورة ، انثى الصفور .

## ٢٨٨٧٩ - نضجيات الجناح

Hemiptera, Hemiptères (S). Hémiptères (F). Hémiptars (E). طبقة حشرات من شعبة المليات ، فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تجتمع الى ريتين : متجاسنة الاجنحة ومختلفة الاجنحة .

## Slage (F). Sawing (E).

٢٨٨٥٤ - نضج

هو قطع الخشب بالمشار .

## Bulletin (F).

٢٨٨٥٥ - نضجة

٢٨٨٥٦ - نضجة جوية

Bulletin météorologique (F). Weather forecast (E). موزن الاحوال الجوية وعواملها التي حصلت في فترة معينة . وقد تبحث ايضا في الاحوال الجوية المرتبطة .

## Doser (F). To proportion (E).

٢٨٨٥٧ - نضج

نضج وركز وصاير : حدد مقادير المواد المختلفة بالنسبة الى بعضها . او عين مقدار المادة الفعالة بالنسبة الى كمية محدودة من الماء او غيره .

## Dose

٢٨٨٥٨ - نضجة

هي المقدار الكافي من المادة الفعالة .

## Dose létale (F).

٢٨٨٥٩ - نضجة ذاعفة

Lethal dose (E).

هي الكمية اللازمة من كل مادة سامة لقتل كل كائن بين موصوف .

## Déterrage (F).

٢٨٨٦٠ - نضج

هو استخراج المحراث من التراب في آخر التلم .

## Micocoulier (F).

٢٨٨٦١ - نضج

هو الميس ، اطليه .

## Micocoulier oriental (F).

٢٨٨٦٢ - نضج ابيض

هو ميس الجبل ، اطليه .

## Micocoulier de Chine (F).

٢٨٨٦٣ - نضج شرقي

هو ميس الشرق ، اطليه .

## Micocoulier de Chine (F).

٢٨٨٦٤ - نضج صيني

هو ميس الصين ، اطليه .

## Anabase (F).

٢٨٨٦٥ - نضجة

هي الاناباز ، اطليه .

## Affleurement (F).

٢٨٨٦٦ - نضج

ضرب من السلك (السان) .

## Odeur naturelle (F).

٢٨٨٦٧ - نضج


Natural odour (E).

هي الرائحة الطبيعية تفوح من الشيء دون واسطة . ج . نشايب .

## Pyrenophora (S).

٢٨٨٧٠ - نضج

جس فلور مجهرية من البغائيات وفصيلة المشويات . تتميز باصاها السود الحليمة المسام . تكاثرها دويوية الشكل مرسومة . بلوغها شفي التجميع ، ثمالي الانكثار ، وتيري الخلية || انواعها الاقتصادية قليلة اشهرها :



نضج الزرع



نضج الشوفان

## ٢٨٨٩١ - نُصَار ، كَامَلِينَة

Camelina (S).

Caméline (F).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الصليبيات . أنواعه عديدة معظمها بري ، يكثر بين الزروع فيؤذيها || أشهر أنواعه النصار المزروع .

## ٢٨٨٩٢ - نُصَار مَزْرُوع \* ، كَامَلِينَة مَزْرُوعَة

Camelina sativa, Myagrum sativum (S). Caméline cultivée, Sésame d'Allemagne (F). Camellina, Gold of pleasure (S). Echter Dotter, Leindotter (D). Camellina, Sesamo di Germania, Dardella (I).

نوع من النصار الاستثنائي يزوره لزيتة الشامة الاستعمال الصناعي || عشبته فراء . أوراقه صغيرة أفند ، سنانة النصل الأخضر . أزهاره عقودي التجميع . أزهاره صغيرة ، صفراء اللون ، تنور في أوائل الصيف . ثماره غردلية ، يزورها دقيقة يغيية الشكل برتقالية اللون . تحوي نحو ٣٥ ٪ من الزيت الصناعي الذهبي اللون .

## ٢٨٨٩٣ - نُصَار

Requin-marteau (F).

هو مطراق البحر ، سمكة من القرشيات ، أطبله .

## ٢٨٨٩٤ - نُصَارِيَّات

Chrysomelidae (S).

Chrysomélidés (F). Chrysomelidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة عذبات الأجنحة . اجتماعها وأنواعها بضعة آلاف . معظمها حشرات صغيرة القد . اجسامها مائلة للبشرة ، زاهية الألوان . قرونها الاستثنائية عديدة الاشكال فيها الخيطي والحلبي والصولجاني والمشاري . ارسافها خماسية التكوين ، رباعية المظهر الخارجي . قوتها أوراق واليابس وأزهار النبات . مكثا تبني اللون ، تختلف الاشكال تكثر فيه الاستطالة ، تمتص النبات على التبات المائل أو تلتقي في التربة قرب العرائل || ريقاتها خاضعة ، سداسية الارباع ، عديدة الألوان ، تركب النبات فتفضم الأوراق وتنخر السوق عند جفاف التربة وبعضها يركب الجلود || سواريها صغيرة القد تلتحف بشرقة تصنعها من الطين والمواد العضوية .

## ٢٨٨٩٥ - نُصَارِيَّةُ الْحَمَاضِ \*

Gastrophysa raphani (S). Chrysomée de l'oselle (F).

حشرة من النصاريات . طولها نحو ٥ سم . قوتها على الخضار الزرجدي الزاهي المالح . تظهر في أواخر الربيع وتنتج لطخ مكثا على الصفحات السفلى من أوراق الحماض فينتفخ خلال شهر أيار عن رقات سمراء اللون نهمة تقضم الأوراق وتؤذيها .

## ٢٨٨٩٦ - نُصَارِيَّةُ الْحَوَرِ \* ، لِينَا الْحَوَرِ

Lina populi, Melasoma populi, Chrysomela populi (S). Lina du peuplier (F).

حشرة من النصاريات طولها نحو ١١ سم . رأسها ودورها إلى الخضار الأزرق للمالح . تمددتها إلى الحشرة يملونها عند طرفها بقيق أسود . أجسامها الحولية ثلاثة . ريقها صغيرة القد ، وريدي الجسم ، سوداء الرأس ، تركب أوراق الحور فتقطع الخشب ولا تترك سوى الاغصان والشرائين . وقد تمتد على النواحي وعلى الأبرام اللينة فتقضي عليها .

## ٢٨٨٩٧ - نُصَارِيَّةُ الزُّوَاقِ

تعرف بأديما مرجناتا ، أطبلها .

## ٢٨٨٩٠ - نُصْفِيَّةُ الْأَجْنَحَةِ

Hémiptère (F). نصفيّة تعري يطلق على جميع الحشرات التي تنتمي الى طبقة نصفيات الجناح .

## ٢٨٨٩١ - نُصْل ، حَافِيَّة ، شَكْرَة ، صَفِيحَة

Limbe (F). Limb (E).

هو الجزء المنبسط المستطيل العريض من ورقة النبات .

## ٢٨٨٩٢ - نُصْلِيّ

Limbalre (F). Limbate (E). نصليّ تعري يوصف به الاضلاع التي تولد النصل كقنوك خلايا نصلية .

## ٢٨٨٩٣ - نُصْلُ الْحَافِرِ

Avalure (F). Sloughing of the horny part of the hoof (E). عارض يصيب الحافر فيسبب جوده في الخيل .

## ٢٨٨٩٤ - نُصِيّ \*

Sasa (S).

Bambou (F). Bambou (E).

جنس نباتات قصبية برية وزراعية من عائلة الخيزرانيات وفصيلة النجيليات . أنواعه عديدة ترغب في المواقع الرطبة والأثرية قليلة الاندماج الغنية بالمواد العضوية || أشهر أنواعه ما يتبع .

## ٢٨٨٩٥ - نُصِيّ أُلْبَقِ

Sasa variegata (S).

Bambou bandé (F).

نوع من النصي يملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم . أوراقه مزدوجة التصنيف ، نصلها مائل الصفحة العليا الخضراء اللون ، خلي السفلى المبلقة بالابيض || يرغب في الأثرية الرطبة المتوسطة الاندماج .

## ٢٨٨٩٦ - نُصِيّ مَذْهَب

Sasa auricoma (S).

Bambou à chevelure dorée (F).

نوع من النصي يملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . سلامياته ينتسجة اللون . أوراقه تطول من ١٢ إلى ١٧ سم . نصلها خلي للبشرة على صفحتيه ، يملو توشيح ذهبي || يرغب في الأثرية الرملية الدبالية الرطبة .

## ٢٨٨٩٧ - نُصِيّ مَزْدُوجُ التَّصْنِيفِ

Sasa disticha, Bambusa nana (S). Bambou distique (F).

نوع من النصي يملو من ٣٠ إلى ٩٠ سم . أوراقه ضيقة مستطيلة مزدوجة التصنيف تطول من ٤٥ إلى ٦٠ سم . وتعرض من ١٠ سم . نصلها أخضر الصفحة السفلى مخضب إلىبا ، خضبا أرجواني يقيق عند الازراباب . يرغب في الأثرية العميقة الرطبة المتوسطة الاندماج .

## ٢٨٨٩٨ - نُصِيّ يَابَانِيّ

Sasa japonica (S).

Bambou japonais (F).

نوع من النصي يملو من للترين إلى الخمسة أمتار . سلامياته إلى الخضار الأصفر . أوراقه تطول من ١٠ إلى ٢٥ سم . وتعرض من ٣ إلى ٥ سم . نصلها مسن الحانة ، مائل الصفحة العليا المائلة الخضار . خلي السفلى الزرقاء اللون . يرغب في الأثرية الخفيفة الغنية الرطبة .

## ٢٨٨٩٩ - نُصِيْب

Part, Quote-part (F).

Share, Part, Portion (E).

هو جزء من ذمة مالية يخص شخص أحد المتقاعين . وهو حصه المرء في شيء أو مال مشاع .

## ٢٨٨٩٠ - نُصْ ، وَشَل

Suint (F).

Greaze of wool, Yolk (E).

هو نفضي الصفوف اخضره صوف النعم .



نصي



نصار مزروع



نصارية الحماض



نصارية الحور

٢٨٨٩٨ - **نُضَارِيَّةُ الصَّفَصَاتِ الْخَضِرَاءِ \***  
*Phyllocteta vitellina* (S). Chrysomèle verte de l'osier (F).  
 حشرة من النضاريات، طولها براوح من ٤ إلى ٥ سم. ثوبها إلى الخضار الزبرجدي. تركيب مع رقاتها أوراق، وبراعم الصفصاف فتؤذيها أشد الأذى.



نضارية الصفصاف الخضراء

٢٨٩٠٥ - **نُضَارِيَّةٌ مُتَبَرِّجَةٌ**  
*Chrysomela fastuosa* (S). Chrysomèle guindée (F). *Chrysomela fastuosa* (E).  
 حشرة خاضعة من فصيلة النضاريات ورتبة مفصليات الاجنحة. تألف البراري التي تكثر فيها نباتات الفصيلة الشفوية وأغصانها الصنوبر. خنافسها تمشي على الزهور والتواشي، يرقاتها تركب الأوراق || جسمها صغير القد يطول من ٦ إلى ٧ سم. ثوبها إلى الخضار الاسفع الموراج يعلوه في الظهران تمشيع طولي ارجواني وازرق، رأسها كبير الجرم، عنينا صغيران بارقتان. زباناها غبيطيان، دقيقان، ظهرانها مستدير الزوايا والطرز الاصح. غمداهما متناهتة التفتيط الخفيف، ارساغها رباعية المقل الظاهرة || الاثنى ابيض قدماً من الذكر وابنت ثوباً حمره واقتصر زبانا || لها جبل واحد في الحبل. تظهر ارجوانية الجلانة في اولال خزيان وتبقى حتى اواسط ايلول، تحرج في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند تمام نموا تطول نحو ١٢ سم. جسمها ورشي الشكل، قليل التقويس، مستطيل المقدم، مستدق الخصر، سداسي الرواجب. ثوبها الى العلملة الخنطية الموراج. رأسها وشربها ودرابجها الى السرة || طول الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي في القرية تحت الجلانة او تحت الحماوة.



نضارية الصفصاف الزرقاء

٢٨٩٩٩ - **نُضَارِيَّةُ الصَّفَصَاتِ الزَّرْقَاءِ \***  
*Phyllocteta vulgarissima* (S). Chrysomèle bleue de l'osier (F).  
 حشرة من النضاريات، طولها نحو ٥ سم. ثوبها الى الزرق الفاتحة. تركيب مع رقاتها أوراق الصفصاف فتخربها وتقتسم الزوايا وبراعمها فتؤذيها أشد الأذى.

٢٨٩٠٠ - **نُضَارِيَّةُ الصَّلِيصِيَّاتِ**  
 هي الخدوش، اعطيه.

٢٨٩٠١ - **نُضَارِيَّةُ الْقُرَّةِ \***

*Phaedon cochleariae* (S). Chrysomèle du cresson (F).  
 حشرة من النضاريات يضيء الشكل عمودية، طولها نحو ٤ سم. ثوبها الى الزبرجدي يعلوه موراج ازرق. زباناها الى السواد الصمعي، تركيب مع رقاتها أوراق القرقة فتجعلها كالسدر وتتدى على أوراق العجل واللفت والمفوف فتضل فيها فعلها بالقرقة.

٢٨٩٠٢ - **نُضَارِيَّةُ الْقَرَعِيَّاتِ \*** ، **رَلِيدٌ** ، **عَلْرُوقُ الشَّمَامِ** ، **نُضَارِيَّةٌ قَرْمَرِيَّةٌ**

*Raphide*, *Galérucque du melon* (F).  
 حشرة من النضاريات، طولها نحو ٧ سم. ثوبها الى الحمرة البرتقالية. تمشي على اشباب المرابي الطبية والقصة والبرسيم. اناتها تلقي مكنها على التربة قرب عوائلها، اغصان القرعيات، فينتف المكن عن رقات صغيرة تبتية اللون تركيب وتخرس سوق الشمام والطبخ والخيار والكوسى وسائر نباتات الفصيلة القرعية.



نضارية القرعة

٢٨٩٠٦ - **نُضْبٌ**  
*Tarir* (F).  
 نضب التبع: انقطع ملوه. ونضب الله: غار في الارض.

٢٨٩٠٧ - **نُضُجٌ**  
*Pleine maturité* (F).  
 Full maturity (E).  
 هو بلوغ الثمرة كالها الجسوري ويصورها آخر دور من ادوار حياتها. والنضج يأتي بعد الادراك والابناغ.

٢٨٩٠٨ - **نُضُجٌ**  
*Bassinage* (F). *Sprinkling* (E).  
 هو الاسقاء بالرشاد اي الاسقاء الخفيف.

٢٨٩٠٩ - **نُضُجٌ**  
*Pulvérisation* (F).  
 Pulverization (E).  
 هو رش الماء اري سائل آخر بواسطة جهاز ضاغط خاص يدفعه بمضخ.

٢٨٩١٠ - **نُضْدٌ**  
*Stratifier* (F). *To stratify* (E).  
 نضد البذور = جعل بعضها فوق بعض صفيقاً مرصافة متناهية.

٢٨٩١١ - **نُضَفٌ** = هو الصنوبر البري، اعطيه.

٢٨٩١٢ - **نُضَكَةٌ**  
*Naucleus* (S).  
*Naucière*, *Milan-hirondelle*, *Epervier à serpent* (F).  
 جنس طير من حمارة الحناء وفصيلة الصقريات. انواعه المعروفة قليلة العدد، تتميز باجسامها الجاهدا. دروسها صغيرة. اصنافها قصيرة، سواثلها مستطيلة ذلقة الاطراف. انماها شديدة الطول فائقة مناسرها قوية، منقعة البهرة الحادة. ارساغها قصيرة، مخالبها قوية ذرية. || تألف الحياة الجاهية سربها براوح من ١٥ الى ١٠٠ زوج. قوتها الحشرات والورغ والقطا والحيات، تفتن اركانها في تفتن الاشجار اغصانها السديان والصنوبر. انماها تقع



نضارية انيقة

٢٨٩٠٤ - **نُضَارِيَّةٌ أُنَيْقَةٌ \*** *Chrysomela polita* (S). *Chrysomèle élégante* (F). *Chrysomela polita* (E).  
 حشرة خاضعة من فصيلة النضاريات ورتبة مفصليات الاجنحة. تألف الموراج الرطبة وضفاف مجاري الماء، خنافسها ويرقاتها تمشي على جميع انواع الصنوبر البري والزراعي فتغضم الأوراق وتؤذيها || جسمها صغير القد يطول من ٦ إلى ٨ سم. ثوبها متراكب الالوان كوسلها الى الشقطة النحاسية الخضراء الموراج، ظهرانها الى الشقطة الصنابية الملاحية الموراج، رأسها معتدل الجرم، حينها صغيران. زباناها غبيطيان دقيقان، غمداهما معتدلان الاحاديذاب مستدير المؤخر الاصح. ارساغها رباعية الصلابة، نظاميتها التفتيط الخفيف. ارساغها رباعية المقل الظاهرة || الاثنى ابيض قدماً من الذكر واكد ثوباً حمره واقتصر زبانا || لها جبل واحد في الحبل. تظهر ارجوانية الجلانة في اواخر الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف. تحرج في النهار || والبرقة عند ادراكها للكمال الجسوري تطول نحو ١٥ سم. جسمها ورشي الشكل، قليل التقويس، امحل اللون. رأسها غليظ الجرم اسمر اللون. رواجبها الى السرة. تحمل في ظهرها ويانبيها

وهو سريع النمو والادراك يحد في الاثرية الكلسية التي لا تصلح للزراعات الاخرى .

### ٢٨٩١٨ - نَهْشَاش \* قَنْشُدُ التَّمَل

Echidna (S), Echidné (F), Echidna (E).

جنس حيوانات لبونة حاشرة جاسنة من وحدات المسلك .  
انواعه المعروفة قليلة ، اعطاهما جبال استراليا وفيها الجديدة .  
اجسامها مكورة تطول من ٣٠ الى ٣٥ سم . يغطيها شوك  
دقيق كثيف ذرب الاطراف كشوك الكند . رؤوسها  
صغيرة مخروطية الشكل تنتهي بخيط مستطيل كالنفاخ .  
جرايمها مسلسلة باطراف قوية سادة تمكئها من الحفر .  
السننبا مستطيلة ديفة احادة اندفاعية تمكئها من ارتشاف  
الحشرات والندل . تألف الموائل القليلة الادغال . تروح  
في الليل . حاجرها دهاليز مستطيلة عديدة التناوب وسيدة  
المنفذ .

٢٨٩١٩ - نَهْشَوَّة Fer à cheval (F), Horseshoe (E).  
سعيدة تمتل بها حوافر الدواب .

٢٨٩٢٠ - نَهْشِي Verge des équidés (F).  
Penis of the equidae (E).  
النهي قضيب ذكر الخيل وجر الوحش .

٢٨٩٢١ - نَهْشِي Couche (F), Layer, Stratum (E).  
كل صاف مرصوف من الشيء المنضود .

٢٨٩٢٢ - نَهْشِي Eucharis  
جنس نباتات بصلية من فصيلة النرجسيات منها المقدر  
بلاد امريكا الجنوبية . انواعه المعروفة قليلة ، بعضها بري  
وبعضها تربيتي . اوراقه قدية الشكل مخددة النصل .  
شمارجه بمجوة تنتهي بفسمة من الازهار عطرية العرف  
الفروع ، جميلة الشكل ، مختلفة الالوان . || اشهر  
انواعه النرجسية نضير الامازون .

٢٨٩٢٣ - نَهْشِي الامازون \* نَهْشِي الامازون Eucharis amazonica (S), Eucharis de l'Amazone (F).  
Amazon lily (E), Amazonische Lilie (D), Eucaris (I).  
نوع من النضير النرجسي السروتي . اوراقه قرصية الانتشاب  
مستطيلة النصل القدي الشكل المتحد الصفحة . شراخه  
الزهري يحمل فسم من الازهار الماجية العطرية العرف .  
يحد في جميع الموائل والاربية ولا يخفى سوى الرطوبة  
المستحكة .

٢٨٩٢٤ - نَهْشِي Cupule  
هي قمع الزهرة والثمرة . ج . أنطاه .

٢٨٩٢٥ - نَهْشِي \* أبو حَرَبَة Monacanthus (S).  
Monacanthé (F), Monacanthus (E).

جنس اسماك بحرية من ملحوبات الفك ، قاصيات الجلود ،  
تتمني الى مجموعة النضير اي عن الماء . انواعه المعروفة  
خسة اعطاهما بحار البلاد الحارة || اجسامها ربة تطول  
نحو ٤٠ سم . رؤوسها كبيرة القد ، مخروطية الشكل ،  
متوجة بقرن كالخرقة ينشرب في القعة . زفافها الصادرة  
والبطنية والطهرية شائكة . اثنائها الى الطحلة السراء  
المبجبة والمزوجة بالابيض والاصفر والافضر . زفافها  
صفراء اللون || لحومها متوسطة الصنف ، مأكلية .

٢٨٩٢٦ - نَهْشِي Epouvantail (F), Scarecrow (E).  
هو الجدار ، ينصب في الزرع والمجالز مزجرة لطير والوحش .

من رفعت الى اربع رفقات تحضنها بمناباة الذكور .  
اصرف انواعه واشهرها ما يتبع .

### ٢٨٩١٣ - نَهْشِي افْرِيقِيَّة

Nauclerus nauclore (S), Nauclère d'Afrique (F).

نوع من النضفة ، موطنها يشمل اقطار افريقية الجنوبية  
والشرقية والوسطى . جسمها يطول نحو ٥٥ سم . رأسها  
ورفعها وصدرها وبطنها الى البياض الماجي . سقاها  
وطورها وذنبا الى السواد اللامع تملوه ماجة غفراء .  
نصرها اسود اللون . حقة فيها كاليقوت . ارساها  
كاسية . || تألف الاجراع بحاري للماء . تحجب البلاد  
في طلب الرزق . سرها يمد من ١٠ الى ٥٠ زوجا .

### ٢٨٩١٤ - نَهْشِي امْرِيْكِيَّة

Nauclerus furcatus (S), Nauclère-martinet, Nauclère d'Amérique (F).

نوع من النضفة ، موطنها فصح الاجزاء يشمل امريكا  
الجنوبية والشمالية . جسمها يطول نحو ٥٧ سم . رأسها  
ورفعها وبرشها وبطنها الى البياض الثلجي وما تبقى اسود  
اللون ازرق المراج تملوه غفيرة سفراء . مشرقا عابق السرعة .  
حقة فيها جزوية . ارساها الى الصفراء الاخضر المراج .  
تألف الاجراع . تحجب البلاد الامريكية في طلب الرزق  
والصيف والمشي . سرها يمد من ٢٠ الى ١٠٠ زوج .

٢٨٩١٥ - نَهْشِي \* سَرَّازَان Fagopyrum (S), Sarrasin  
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة البطيانيات .  
سوقها متصبة قليلة الصلابة . اوراقها متعاقبة ممثلة .  
نصافها قليلة الشكل اوسمية ، خماسية العروق ، عابقة  
الضهار . انزهارها عتودي التجميع . انزهارها خشوية ،  
صغيرة القد ، خماسية البتلات ، عادمة التويج . ثمارها  
حقاق لا قياسية الشكل والحجم يكثر فيها الخروطي .  
بلورها حبة المادة ، دقيقها غذائي شائع الاستعمال في صناعة  
الماجين و علف الدوابن . || اصرف انواعه واشهرها  
مايتع .

### ٢٨٩١٦ - نَهْشِي شائع \* سَرَّازَان شائع ، حنطة سوداء ، قمح البقر


Fagopyrum esculentum, Polygonum fagopyrum (S).  
Sarrasin commun, S. manger, Blé noir, Bucail, Carabin (F). Buck wheat, Sarrasin corn (E). Buckenweide, Echter Buchweizen (D). Saraceno, Fagopiro, Grano nero, Fraina (I).

نوع من النضير ازراعي ، ساقه متصبة فراء . اوراقه مهمة  
النصل ، مستطيلة المثلق ، لاسعة القد . انزهاره بيفاء  
اللون . حقاها مخروطية الشكل حادة الزوايا . بلوره سيد .  
وهو سريع النمو والادراك دورته الحياتية تستلزم من ١٨٠٠  
الى ١٩٠٠ مرة توتها ينمو ١٠٠ يوم . وهو يحد  
في جميع الاثرية باستثناء القويصة الاندماج الرطبة .

### ٢٨٩١٧ - نَهْشِي هندي \* سَرَّازَان تَحْرِي ، حنطة تَحْرِي ، قمح البقر الهندي

Fagopyrum tataricum (S), Sarrasin de Tartarie, S. de Sibérie, S. galeux, Blé de Tartarie (F), Indian wheat, Tatarian buckwheat (E). Grüner Buchweizen (D). Saraceno di Siberia (I).

نوع من النضير ازراعي العلفي . ساقه متصبة فراء .  
اوراقه قليلة النصل ، امحاده مجنسة لا حاضنة . انزهاره الى  
الخضراء الاصفر . سقاها رباعية الحروف مستطيلة الشكل .  
بلوره صغرة سروة سماء اللون ملغية خزيمة المادة الغذائية .



## ٢٨٩٢٧ - نَظَاشُ الكُورِيل °

## ٢٨٩٢٧ - نَظَاشُ مِصْرِيّ

*Crotalaria segyptica* (S). *Crotalaire d'Egypte* (F).

*Rattle-box* (E). *Klapperhölse* (D). *Nacchera* (I).

نوع من النطاش المعمّر. جنبته مشدودة القند، فراءه الساق، صغيرة الأوراق السنانية الزردية. أعطانه فيسحة الأرجاء تحت من صمراء سينا الى الصحاري المصرية.

Chromosome ٢٨٩٢٨ - نَظَاشَةُ °

هي النشبة والكرموزوم.

## ٢٨٩٢٩ - قَظَل ، عَظَم المُرْدَرَع

*Goût de terroir* (F). *Native tang*, *Raciness* (E).

علم خاص يعلو علم بعض المحاصيل الزراعية كالنخيل والتينغ فوشيبها بعض الثني وهو يعود الى بعض عناصر التربة اللامتجانسة الدائمة.

## ٢٨٩٣٠ - نَظَل

*Vin de presse* (F).

ما يسيل من عصر النخيل وقد تكون خمر اذا حسن صنعها فاعطرة الصنف.

Nothura (S). ٢٨٩٣١ - نَظُورَةُ ° ، نَظُور

*Nothure* (F).

جنس طير من الدجاجيات وفصيلة الزرقويات. انواعه المعروفة سبعة منتشرة في جميع بلاد امريكا الجنوبية. شكلها قريب الشبه من الزعفران. اجسامها متوسطة القند. اذناها جدعة. الارباع الى الصبهة المشقة والمخدعة بالاسود. اعناقها وصدرها وبطنها الى الصبهة السنانية الزاهرة. قوتها الحشرات والبذور البرية. تألف حواشي الغابات. صيدها مرغوب فيه لانها من الطرائق السنية المستحقة العلم.

Natica (S). ٢٨٩٣٢ - نَظِيشَةُ °

*Natic* (F). *Natica* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل وفصيلة النطيشيات. انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم. جميعها مفترسة قوتها الرخويات والديدان. اصدافها مائلة، شبه كروية الشكل، صغرة القعب المحزن المذهب. اجسامها فضية الشكل، مستعرة الازدية، عريضة القرون المبطلة، ثنائية الاواس المبيضة، كبيرة الارجل. تعيش في الاسمال وعلى رمال الشواطئ المضمورة بالمال.

Naticidae (S). ٢٨٩٣٣ - نَظِيشِيَّات °

*Naticidae* (F). *Naticidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل وحيئات الاجهزة. اجناسها وانواعها المعروفة صديرة بعضها من متحجرات الاراضي الطباشيرية والجوردة وبعضها معاصر منتشر في معظم بحار العالم. اصدافها شبه كروية الشكل، صغرة القعب، قصرة القلوب، فسيحة الفروعة. اسفلها كبيرة، قرنية للمادة او كلسية، توصد الفروعة عند الحاجة. جميع انواعها مفترسة تقضي على الديدان والرخويات الصغيرة. اعراف اجناسها واشهرها النطيشة.

Alnitam ٢٨٩٣٤ - نِظَام

النظام نجم ثير من كوكبية قيطس مركزة على اصل النخيل.

Statut (F). *Status* (E). ٢٨٩٣٥ - نِظَام ، قَانُون

هو اتفاق او قانون يضمن حسن انتظام العمل.

*Lestoteuthis Kamtschatka* (S).

*Lestoteuthis de Kamtschat* (F).

حوران بحري مفترس يسجد الجنس والنوع من الرخويات رأسيات الارجل، مزدوجات الخياشيم، هشاريات الجرامز وفصيلة الطردوسيات. اعطانه جيزر الكوريل. جسمه مخروطي الشكل، كبير القند، يطول نحو خسة اناث. زعنفته طرزيان، كبيرتان، مزوانيتان. جرامزه هجعة، طليقة، لامساوية الطول ونها زوج لثيف شديد الطول ينتهي برسي سنانية الشكل تملوها حناجر وكلايب.

## ٢٨٩٢٨ - نَظَاشُ اخْضَر

هو القبط الاخضر، اعطيه.

## ٢٨٩٢٩ - نَظَاشَات

*Elateridae*

فصيلة حشرات من مخديات الاجنحة تعرف بالساوليات، راجعها.

## ٢٨٩٣٠ - نِظَاق ، نِظَاقُ الجَزْوَء

*Baudrier d'Orion* (F). *Alnitak* (E).

النطاق او نطاق الجوزاء ثلاثة انجم مستعرة وباصة في وسط الجوزاء تسحبها العرب النظم وهي مثل في الانتظام والانتظام.

## ٢٨٩٣١ - نَظَح

النطح نجم ثير من كوكبة برج الحمل.

*Notornis* (S). ٢٨٩٣٢ - نَظَرُونِس °

*Notornis* (F). *Notornis* (E).

جنس طير من طراك الساق وفصيلة النطليقات. انواعه المعروفة ستة انقرض خسة منها وبقي نوع واحد يسير في طريق رفاقة. موطنه غابات نيوزيلندا واوراجها. جسمه يضاهي اجسام الخيشيات لكنه صغير الجناح، عادم الذنب، ضليع النقاد القصير المخروطي الشكل. قوته الاغشاب والبذور والحبوب البرية. صمره عند الصباح وتبل الغروب. يبدو بسرعة فائقة ولا يستطيع الطيران. لحمه جيد الصنف مرغوب فيه.

*Nitra* (F). ٢٨٩٣٣ - نَظَرُون

هو ملح البارود، اعطيه.

*Nitreux* (F). *Nitrous* (E). ٢٨٩٣٤ - نَظَرُونِيّ

نعت ترميني يدل على وجود النطرون، كقولك حامض نطروني وارب نطروني.

*Crotalaria* (S). *Crotalaire* (F). ٢٨٩٣٥ - نَظَاشُ °

جنس نباتات حولية ومعمرة من فصيلة القرنيات الفراسية. انواعه زهاء ٢٠٠. جميعها جنبات واعشاب برية. منها البلاد الحارة من المابين القدم والجديدة. اوراقها واغصانها مرصوة متعلقة بالماشية. ازهارها مفترسة تجرستها النحل.

*Crotalaria Juncea* (S). ٢٨٩٣٦ - نَظَاشُ البَنَغَال

*Crotalaire du Bengale*, *Chanvrier du Bengale* (F).

*Bengal hemp plant*, *Sunn hemp plant* (E). *Bengalischer Hanf* (D). *Nacchera del Bengala* (I).

نوع من النطاش يكثر في بعض مناطق الهند اعطاه النخيل. ساقه اسلية الشكل يستعملون لابلها استعمال القنب.



نطرون



نطش



نظورة



نطيشة



Paranucléines (F). **٢٨٩٦٢ - تَظْيِرَةُ النَّوَاتِين**

Zygomycètes (F). **٢٨٩٦٣ - تَظْيِيرَات**  
مربّبة من رتبة الفطور البيفية، أجناسها وأنواعها كثيرة المدد تنقسم إلى فصيلتين: المجفبات والمغنيات.

Corbillat, Corbillot (F). **٢٨٩٦٤ - نَعَاب**  
فرخ الغراب.

Serinus syriacus (S). Serin de Syrie (F). Syrian canary (E). **٢٨٩٦٥ - نَعَار \*** ، نَعَر سُوْرِي

نوع من النعر حسن الصوت يكثر وجوده في البلاد اللبنانية السورية. طوله نحو ١٢ سم. ثوبه ترنجبي اللون يملو في ظهرو وجانبه شمشج أسمر. زوره وبيوضه وربطه إلى الصغار البرتقالي الموانج تملو بقشة مستطيلة سمراء. مقار صدقة عينه ورسفاه سمير. || يألف الحداثق والجشاش والنباتات القريبة من الممران. يذيق عشه في الأشجار النفاة. اثناء قضع من ٤ إلى ٥ بيضات تحفنها وسحدا نحو ١٣ يوما.

Embryologia (F). **٢٨٩٦٦ - نَعَارَة \***  
Embryologie (E).

Embryologie végétale (F). **٢٨٩٦٧ - نَعَارَة نَبَاتِيَّة \***  
Vegetable embryologie (E).

النعار النباتية علم يبحث في التكوين النباتي وفي المراحل المتتابعة التي يمر بها كل نبات.

**٢٨٩٦٨ - نَعَاسَة النِّع \***

Dicyphus minimus (S). Dicyphe minime, Punaise du tabac (F). Suck-fly (E).

حشرة ثاقبة ماصة كربية الرائحة صغيرة القد مستطيلة الشكل من فصيلة خامسات الفواصل. طولها بأرواح من ٨ إلى ١٠ سم. رأسها أسود اللون. زباناها خيطية مستطيلة منتقفة إلى الوراء. ظهرها ملون وموشح بالخطوط والوردية والأسمر والأخضر والأسود. يطنها إلى السورة المابقة. اناتها تمتع الممكن أفرادياً في وثن التصل فينقبط بحد متحه بنحو ٧ أيام عن يرقات دقيقة مرقالة تركيب التصل وتمصص خلايا نسيجها || الحشرة الكاملة تمتص عصارة قة الساق وصلوع الأوراق الحامية قسبب لها الذبول والالتواء نحو الأرض فتبدو كأنها عادمة الحيل لا تقوى على متابعة شمانها ودورتها الحياتية || أضرارها قد تكون جسيمة إذا أعترت الشجر في زمن الشايع. تكافح عند الحاجة باستعمال احد الحواشير النافعة الذي يؤثر في أعصاب الحفم.

**٢٨٩٦٩ - نَعَاعَة** بقلة ناعمة كاللحمة. ج ناع.

**٢٨٩٧٠ - نَعَام ، نَعَام**

النعام أو النعام منزل من منازل القمر الباهية. وهي ثمان كوكب كل اثر الشولة. اربعة منها في الهجرة وهي النعام الواردة لانها شرعت في الهجرة كأنها تشرب. و اربعة هاربة عن الهجرة وهي النعام الصادرة كأنها شربت ثم صدرت || رقيب النعام يدعى الحنة.

**٢٨٩٧١ - نَعَامَات**

النعامات خمسة نجوم من كوكبية يقبس مركزها في أواسط البدن.

Régime (F). **٢٨٩٦٩ - نِظَام ، أَسْئُوب**  
Rules, Regulation (E). مجموعة القواعد المفروضة أو المنبعة.

Système (F). System (E). **٢٨٩٦٧ - نِظَام**  
مجموعة مقائل أو مبادئ مرتبطة بشكل مذهب أو اعتقاد خاص.

**٢٨٩٦٨ - نِظَام الاستِغْلال ، طريقة الاستِغْلال**  
Système de culture (F). Cultivation system (E). الطريقة التي يتبعها المزارع في استغلال ارضه.

**٢٨٩٦٩ - نِظَام الاستِغْراق**  
Exploitation patronale (F). Sweating system (E). هي المضاربة التي ترمي الى خفض اجور العمال حتى الحد الأدنى.

**٢٨٩٥٠ - نِظَام الأملاك العامة**  
Domainalité publique (F). Public property (E). نظام قضائي خاص سنّ للاطلاع العامة.

**٢٨٩٥١ - نِظَام الحِصْر**  
Régie (F). Stewardship (E). ادارة الاموال وحصرها وتوجيهها توجيهاً اقتصادياً محمياً.

**٢٨٩٥٢ - نِظَام المطر ، مَنَجَن الأمطار**  
Régime des pluies (F). Rain regulations (E). كية الامطار المحلية وكيفية توزيعها على مختلف شهور السنة.

**٢٨٩٥٣ - نِظَام النَقَابَات**  
Syndicalisme (F). Syndicalism (E).

**٢٨٩٥٤ - نِظَام دَوْرِي**  
Système circulaire (F). Circulation systemic (E).

نظام دورة الدم في المجموعة الرئوية الجسدية.

**٢٨٩٥٥ - نِظَام عَيْشِي**  
Statut réel (F). Real status (E). صيغة تقليدية تدل على القانون الذي يعالج موضوع الاموال المنقولة منفردة.

**٢٨٩٥٦ - نِظَام وَرْكِي**  
Foliation النظام الورقي هو الشكل الترتيبي الذي يتخله الورق على الفئسن. ويدعى الارياق.

**٢٨٩٥٧ - نَظَرِيَّة**  
Théorie (F). Theory (E). مذهب علمي او علم نظري لا علمي.

**٢٨٩٥٨ - نَظَرِيَّة**  
Théorème (F). Theorem (E). قضية يطلب برهانها.

**٢٨٩٥٩ - نَظَرِيَّة الطَّوَرِي**  
Théorie de l'imprévision (F).

**٢٨٩٦٠ - نَظَم**  
النظم ثلاثة انجم من الجوزاء تدعى النطاق ، راجع نطاق.

**٢٨٩٦١ - نَظِير ، نَظِير السَّيْت ، سَمَت السَّيْت**  
Nadir نقطة السماء التي تحت قدمي الراصد وهي تقابل سمت الرأس.



نعار



نعامة النبع



نعام



نمبول باشا



نمرة البقر



نمرة المائي



نمرة المزن



نمرة سوداء



نمرة مزعجة

## ٢٨٩٧٩ - نعام \* - هودعة

Brebis (F). Ewe (E).  
أنثى القبان منذ اجتيازها الشهر الخامس عشر من عمرها  
أي من وقت صلاحها للسداد .

## ٢٨٩٨٠ - نمر

Tabanus (S).  
Taons (F). Gadflies (E).  
جنس حشرات من النمرات. أنواعها عديدة ، ذكورها  
تمتص على ريق الإزهار ، أنثاها تمتص على ما تمتصه من  
دم وهي تلص الحيوان ولا تمتص من الإنسان . وبعضها  
ينتقل مرض الدباب من الأيل إلى الخيل فينبأ .  
الواحدة منها تدعى نمر . أعرفها وأعرفها ما يلي .

## ٢٨٩٨١ - نمرة

Embryon d'animal (F).  
Animal embryo (E).  
هي الملقحة الحيوانية .

## ٢٨٩٨٢ - نمرة البقر

Tabanus bovinus (S).  
Taon des boeufs (F). Ox-fly (E).  
ذباب من النمرات ، طولها يراوح من ١٨ إلى ٢٥ سم .  
ثوبها إلى النمرة . صديرا وسيقانها صفر . أرسافها سود .  
يكثر وجودها في فصل الصيف والخريف . أنثاها تمتص  
على البقر والخيل والحمار .

## ٢٨٩٨٣ - نمرة المائي

Chrysops caecutiens (S). Taon aveuglant (F). Horse-fly, Breeze fly (E).  
ذباب صغيرة من للنمرات ، طولها يراوح من ٦ إلى ١٠ سم .  
عظمها قصير القد . هويتها خضر يعلوها موج ذهبي  
لاصع . أنثاها تمتص على الخيل والحمار والبقير ولا ترتد  
عن مائها .

## ٢٨٩٨٤ - نمرة المزن

Chrysosona pluvialis (S). Taon pluvial (F). Cleg (E).  
ذباب صغيرة من للنمرات ، طولها يراوح من ٨ إلى ١٢ سم .  
هويتها خضر النصف الاعل ، زرق النصف الاسفل .  
يكثر وجودها من حزيران إلى أواخر أيلول . أنثاها تمتص  
على جميع الدواب وتقتصم الإنسان .

## ٢٨٩٨٥ - نمرة سوداء

Tabanus morio, Pangonius micans (S). Taon noir (F).  
ذباب من النمرات ، طولها يراوح من ١٥ إلى ٢٥ سم .  
ثوبها أسود اللون ، زبانهاتها إلى الصلبة ، عظمها مستطيل  
المك . يكثر وجودها من حزيران إلى تموز .

## ٢٨٩٨٦ - نمرة مزعجة \* - نمرة الربيع

Tabanus bromius (S). Taon bryant (F). Gadfly (E).  
ذباب من النمرات ، طولها يراوح من ١١ إلى ١٥ سم . ثوبها  
اسمر اللون مبعث بالاسود . مقدمها غير . هويتها إلى  
الخضار المشع بالاجمر . يكثر وجودها من أيار إلى  
حزيران . ذكورها لا تشارك إزهار النيمات . أنثاها تقتصم  
جميع الحيوانات ولا تمتص من الإنسان .

## ٢٨٩٨٧ - نمرة

Tabanidae (S).  
Tabanidae (F). Tabanidae, Gadflies (E).  
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وأنواعها  
كثيرة العدد معظمها من الدباب الكبير . أعطاشها مستطيلة ،  
انثاها ثاقبة ماصة ولاعة . قرونها الاستعمارية ثلاثية  
الفراسل . هويتها كبيرة القد ، متصلة في الذكور ،  
مفترقة متباعدة في الاناث . اجنسها غشائية التركيب  
شقاقة . ذكورها تمتص على مشر الإزهار وداعة الانجبار

## ٢٨٩٧٩ - نعام \* - هودعة

Struthio camelus (S). Austruche (F). Ostrich (E).  
طائر من البوادي وحيد الجنس والنوع من فصيلة النعاميات .  
اسم الجنس نعام والذكر ظلم والآنثى ربداء وقولوس والصغير  
رأى والجماة بنات الحق ويودع . وكنتها أم البيض .  
صباح الظلم يدعى عراد وصباح القولوس زبادا . || تعتبر  
النعام الأكبر وأضخم الطيور المعاصرة . تملو نحو ٢٦٠ سم .  
والذكر أنثى من الأنثى . ريشها ناعم مبدل مثلك .  
لونه يراوح من الاسود القاتم إلى الرمادي فالأبيض ثم البني .  
عظمها منتصب مستطيل ، عادم الريش ، كثيف الزغب  
الافقر ، ينشي رأس صغير القد وسنار مفلطح . ساقاها  
قويتان رفيعتان متساويتا على المدو السريع . يعضها كبير  
القد ، حاجي اللون ، اصفر المراج ، زن الواحدة سنة ١٤٥٠ غ .  
قوتها الاشباب والبقول والصبان والبلور والحجوب والتاب  
والخمرات والمعاهد الخ ... || تدن في أنصوس من الرمل  
تقود ١٥٠ سم . ومقه ٣٠ تضع فيه من ١٢ إلى ١٨  
بيضة تحضنها بمناودة الذكر من ٤٢ إلى ٤٨ يوما .

## ٢٨٩٧٣ - نعام أمريكية

Nandou (F).  
هي الرساء ، اطباها .

## ٢٨٩٧٤ - نعامي

Vent du sud (F).  
South wind (E).  
النعامي ريح الجنوب لانها ابلّ الرياح واطباها .

## ٢٨٩٧٥ - نعاميات

Struthionidae (S).  
Struthionidae (F). Struthionidae (E).  
فصيلة طير من رتبة البوادي ، اجناسها المعروفة ثلاثة النعام  
والرحا والأمو . جميعها سريعة العدو ، كبيرة القد ، مستطيلة  
المنق الذيق الانثب الريش . أرسافها رفيعة قوية تنشي  
باصمين او بثلاثة اصابع . اجنسها صغيرة ضيقة لا  
تمكها من الطيران . أرسافها رطلة متبدلة لا ميسكة .  
تمش من ٢٥ إلى ٣٥ سنة . موطنها المناطق الحارة من  
افريقية واريسيا وأستراليا .

## ٢٨٩٧٦ - نمبول

Spilornis (S). Buse huppée (F).  
جنس طير من السقاوت وفصيلة الصقريات . أنواعها  
عديدة جميعها من أوباد المناطق الحارة . اجسامها ريمة ،  
ثوبها مختلفة الألوان التركية . تتميز برؤوسها المخترقة  
بكشفة تقنية الايتكانز . || تمتص في الجبان الجرداء وفي  
القيافي الشقاسة . قوتها القوام والزحافات والانامي والحشرات .  
انشر أنواعها نمبول باشا .

## ٢٨٩٧٧ - نمبول باشا

Spilornis bacha (S).  
Buse huppée bacha, Bacha (F).  
طائر من النمبول ، طولها نحو ٦٥ سم . ويطه ١٥٠ سم .  
ثوبه اطمل اللون ، حاجي الظهر والسقط ، غير البطن ،  
يعلو ثوبه ابيض مستدير . كشفه يبيض الانتشاب سودا .  
الطرف ، صدقة عينه جزوية اللون . خاله صفر ، منمره  
ازرق اللون غير المولج || موطنه فصح الارباء بين  
من افريقية الجنوبية إلى الشرقية فاهند فالصين .  
يدن وكته في شخايف الصغور النانتة ، انشاء تقص من  
رفنة إلى ثلاث رفنات تحضنها وسدا نحو خمسة أسابيع .

## ٢٨٩٧٨ - نمبول

النمبول هو الذئب : الذكر من الصبيان .

٢٨٩٩٥ - **نَعْمَلُول** *Otiorynchus* (S).  
*Otiorynchus* (F). Weevil, Broad-nosed weevil (E).  
 Schwarzer Rüsselkäfer, Dickmaulrüssler (D).

جنس حشرات رابطة من فصيلة البسويات. أنواع عديدة، أعطانها العالم أجسامها صغيرة القد، رؤوسها وأنتاجها مستطيلة. قرونها الاستشعارية مكشوفة متفرجة الزوايا تتلشب في مقدمة المنالك، اتحادها صلبة، سيقانها مسنة، أرسافها رباعية، أطوارها تراوح من الخنطلي إلى الأسود. قشائرها دقيق السهف والغلب تملؤ احاديث وزوايق مختلفة. جميعها تسرح في الليل وترقد في النهار. رفاقها تعيش في التربة على الحواد العضوية ونسبا تقضم الجذور كما هو الحال في نملول السكك. || أعراف أنواعه وأشهرها ما يلي .

٢٨٩٩٦ - **نَعْمَلُول أَحْمَرُ السَّاقِ** \*  
*Otiorynchus lugdunensis* (S). *Otiorynchus à pattes rouges* (F).

نوع من النملول، مرثمه الانجبار المشجرة ومشاظها. يكثر في المناطق الجبلية، طوله يراوح من ١٥ إلى ١٤ سم، ثوبه إلى السوداء اللامع. سيقانه حمراء اللون. قشار ظهرانه عديم السهف، عشاري الاخاديد. || يسرح في الليل. قوته الأوراق الفتية والبراعم.

٢٨٩٩٧ - **نَعْمَلُول الزَيْتُون** \*  
*Otiorynchus cribricollis* (S). *Otiorynchus de l'olivier* (F).

نوع من النملول، مرثمه الاول نجمة الزيتون ثم الدراق والوز. طوله يراوح من ٧ إلى ٨ سم، جسمه يضيي الشكل. ثوبه إلى السرة السوداء، متكع مخروطي قصير. زبانه مستطيلان متفرجا الزواوية. سكبته رافضة الطرف. مقدم جوشه بالغ التحصين. قشار ظهرانه عشاري التخفيف. اخاديد مبهدة الحروف، منتظمة التتبع. || يسرح في الليل. قوته الأوراق الفتية بلتهمها بشراة.

٢٨٩٩٨ - **نَعْمَلُول السَّكِك** \*  
*Otiorynchus rugosostriatus* (S). *Otiorynchus des cyclamens* (F).

نوع من النملول. مرثمه الوردة وبعض نباتات الزينة. طوله يراوح من ٦ إلى ٧ سم، ثوبه إلى السرة السوداء. زبانه إلى الجؤوة، متكع يبدو كأنه استطالة الرأس. ظهرانه كثير التخفيف الطولي، كثيف الركيات السفلية، صمير الهلب || يسرح في الليل. قوته الأوراق الفتية. اذام الاكريل يأتي عن رفاقته التي تعيش في التربة وتلتهم جلود السكك تنفضي عليه.

٢٨٩٩٩ - **نَعْمَلُول الكاشن** \*  
*Otiorynchus ligustici* (S). *Otiorynchus de la livèche* (F). *Lovage weevil* (E). *Liebstöckelrübler* (D).

نوع من النملول، مرثمه الكاشن والنفل ومعظم القرليات وبعض الانجبار المشجرة. طوله يراوح من ١٥ إلى ١٢ سم، ثوبه إلى السرة الريداء. متكع أسطواني الشكل. مقدم جوشته منتظم التحصين. ظهرانه سهبي القشار، متبق الخبوط || يسرح في الليل. قوته الأوراق الفتية.

٢٩٠٠٠ - **نَعْمَلُول الكرمة** \*  
*Otiorynchus sulcatus* (S). *Otiorynchus de la vigne* (F). *Vine weevil* (E). *Gefurchter Lappendrübler* (D).

نوع من النملول، مرثمه الكرمة ولا ينف عن الانجبار المشجرة والخرجية. طوله يراوح من ٨ إلى ١٠ سم، جسمه

الحدودية والثار الناجية المطلوبة. اما انثاها فقوتها قوت الذكور يضاف اليه الدم الذي تنصه من الحيوان لانها لا تستغي عنه في تكوين المكن. مكشبا وشعي الشكل تنصه الاثاث صفوفا متتابة متراصة فينتج بهد متصه بدة وجيزة تراوح من ٢٤ إلى ١٢٠ ساعة || رفاقها دودية الشكل، غبراء اللون او صفراء يعلوها تجذيم اسود رمي تعيش في الماء والزبل والرسل والرمال الرطبة والاصبال الكثيفة المنصلة.

٢٨٩٩٨ - **نَعَصَة** *Fagne* (F). *Upland moss-hug* (E).  
 هي الاراض الرطبة كثرات اعشائها الطوعية التي ترثادها الجهم.

٢٨٩٩٩ - **نَعَص** *Flacourtia* (S). *Flacourtie* (F).

الواحدة نعضة. جنس اشجار ومجترات برية وزراعية من فصيلة النضفيات. أنواعه المعروفة ١٢ مهدا الهند وسائر بلاد الشرق. جلدها معتدلة السوق. اغصانها فارشة. اوراقها متعاقبة. انزعارها ثنائية المسكن. انزعارها سنبل التجميع، ناجي الارتكاز. ثمارها مأكولة، كرزية الشكل صغيرة القد، كثيرة العدد، تتناول نحو ثلاثة اشهر. اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

٢٨٩٩٠ - **نَعَصَة سَرَحَة** *Flacourtia inermis* (S). *Flacourtie inermis* (F). *Lovliovi* (E).

نوع من النعض، شجرته تملو من ٤ إلى ٥ أمتار. ساقها اغصانها سرحة. ثمارها كرزية الشكل ولقد تتناول من ٨ إلى ٩ اشهر، لونها إلى الحمرة الزاهية. سوقيتها قليل الحوصلة. غزير الحوصلة، يؤكل ويربب.

٢٨٩٩١ - **نَعَصَة مَدَغَسْكَر**  
*Flacourtia ramontschii* (S). *Prunier de Madagascar*, *Ramontschii*, *Marionne* (F). *Governor's plum*, *Madagascar plum* (E). *Achte Flacourtia* (D). *Pruno del Madagascar* (I).

نوع من النعض، جنبته تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم. ساقها سرحة. اغصانها فناء قليلة الشوك. ثمارها كروية الشكل قطرها نحو ٣ سم، لونها إلى الجؤوة اللامعة، سوقيتها مستحب الحوصلة يكثر استعمالها في المربيات. لحاء ساقها حولي القلادة، قلعة دباغي المادة شائع الاستعمال.

٢٨٩٩٢ - **نَعَصَة هِنْدِيَّة**  
*Flacourtia astaphracta* (S). *Flacourtie de l'Inde*, *Prunier malgache*, *P. de l'Inde* (F). *Indian plum*, *Runeala plum* (E). *Flacourtie* (D). *Pruno d'Indie* (I).

نوع من النعض شجرته تملو من ٥ إلى ٦ أمتار. ساقها اغصانها شائكة. انزعارها صغيرة القد تستغية اللون. ثمارها غرضية الشكل، كشمشة القد، كرزية اللون، جامدة السوق، ظاهرة الحوصلة، تستعمل قريبايب. قلافة لحاء سوقيتها اغصانها دباغية المادة.

٢٨٩٩٣ - **نَعَصِيَّات** *Flacourtiaceae* (S). *Flacourtiacées* (E).

فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة مستقلة القائلات. اجناسها وانواعها عديدة، منها الانجبار والشجيرات، معظمها بري وبعضها زراعي مأكول الثمار. || اشهر اجناسها النعض والايريير واللمظر والمرجانية والرتية.

٢٨٩٩٤ - **نَعَصَة** هي المقدة الفاسدة في اللحم.



نملول احمر الساق



نملول الزيتون



نملول السكك



نملول الكاشن



نملول الكرمة



منها يضيئة والوسطى قلبية والعليا رديحة مدببة او مقطوعة الطرف . نصلها ناضج الاصاب ، قليل الخمل ، ازهاره سنبل التجميع ، طرفي الازهار متركبة ، لبدية ، حرارة اللون || اوراقه وازهاره ليملوية الغرف ، تقريبا يطهر المدة ويلهب بالمفس || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

### ٢٩٠١٩ - نَعْنَعَ مُسْتَدِيرُ الْوَرَقِ

*Mentha rotundifolia* (S). *Mentha à feuilles rondes* (F).

نوع من النعنع البري المبدول . ساقه منتصبه زباد متقاربة الفروع تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه شبه مستديرة . نصلها ناضج الاصاب ، رافع للسبح المنصع ، خلي الصفحة السفلى || ازهاره سنبل التجميع ، طرفي الازهار . ازهاره كثيرة العدد غيرا اللون صفراء المواج || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

### ٢٩٠٢٠ - نُعْنَعَةُ

*Jabot* (F). النعنة هي الحوصلة ، اطلها .

### ٢٩٠٢١ - نَعُورُ

النور هي الريح التي تقايلك ببرد ورائت في حر او بحر ورائت في برد .

### ٢٩٠٢٢ - نَعِيبُ ، نَعِيقُ

*Croasement* (F). *Croaking, Cawing* (E). هو صوت الغربا ويدهى ايضا زغب .

### ٢٩٠٢٣ - نَعِيمُ

نعم وصليب الجنوب اسمان لكوكبية نجوم واحدة مركزها الجنوب . اطلب صليب الجنوب .

### ٢٩٠٢٤ - نَعِيمُ

هو الاخيرانتوس ، اطلبه .

### ٢٩٠٢٥ - نَعِيمَةُ

هي الساج ، اطلبه .

### ٢٩٠٢٦ - نَعَاشُ

*Pedionomus* (S). *Pédionome* (F). طائر وسيد الجلس والنوع من فصيلة التروبيقات ، واحده نغاشة . وهي صغيرة الجثة طولها نحو ١٧ سم . ثوبها الى الصبغة بملوها تأذير وتوشم اسفر واجر واسود . راسها مضطرب بالاخر || قوتها الحبوب والحشرات . تألف الاساكن القليلة الاجمار ، الكثرة الشب العالي || تدن في الخوص تدهر بين الاشباب . ثيبس من ٨ الى ١٠ فيبيضات يحفظها وسدها نحو ثلاثة اسابيع .

### ٢٩٠٢٧ - نَعَاشُ \*

*Meconopsis* (S). *Méconopside, Méconopsis* (F). *Flaming poppy, Wind poppy* (E). *Mohling, Mohn-gescht* (D). *Papavero cimbrico, Meconopsis* (I). جنس نباتات حشوية من فصيلة البقوليات . انواعه مدبة ، اعطائها العالم ، مضطرب بري وبهضبا تريبي . سوتها منتصبه . اوراقها كاملة او مفردة . ازهارها منتصبه . منها الاصفر والازرق والبني . حصارها لينة دقة صفراء اللون جصالية المادة || اعرف انواعه واهمها ما يتبع .

### ٢٩٠٢٨ - نَعَاشُ رَعِيع

*Meconopsis grandis* (S). *Méconopside élevée* (F). نوع من النعناض المعمر . ساقه مزينة منتصبه تملو نحو ١٠٠ سم . اوراقه ضمية التجميع طرفية الازهار

### ٢٩٠١٣ - نَعْنَعَ بَرِّي \* ، ظَمِيرَكَة ، ظَمِيرَا

*Mentha sylvestris* (S). *Menthe sauvage, M. sylvestre* (F). *Wild mint* (E). *Wilde Minze* (D). *Mentastro, Menta salvatica* (I).

نوع من النعنع البري الشائع الاستعمال الطبي . ساقه فروع تملو من ٢٥ الى ٥٠ سم . اوراقه اهلجية ذرية نصلها ناضج الاصاب عابق الخضر يطول من ٢ الى ٣ سم . ازهاره ضمية التجميع ابلية الازهار فواحة الغرف الاخاذ .

### ٢٩٠١٤ - نَعْنَعَ جَعْدِي

*Mentha crispata* (S). *Menthe crépue* (F). *Curled mint* (E). *Krause Minze* (D). *Menta crespata, Mentone* (I).

نوع من النعنع البري المبدول . ساقه منتصبه متباعدة الفروع الزيادة تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم . اوراقه اهلجية الشكل ، نصلها ناضج الاصاب متجمع الصفحة المشارة الحافة || ازهاره سنبل التجميع طرفي الازهار . صغرة ، دقيقة ، غيرا اللون بملوها مواج ليكي || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

### ٢٩٠١٥ - نَعْنَعَ زُرَاعِي \* ، نَعْنَعَ بَسْتَانِي

*Mentha piperita* (S). *Menthe poivrée* (F). *Peppermint, White mint* (E). *Pefferminze, Pfeffer-Wassermünze* (D). *Menta prima, M. peperina, M. pepe, M. piperita* (I).

نوع من النعنع الزراعي البقي الشائع الاستعمال . فروعها المشجرة ثلاثة : الحزني والابيض والاسود . سوتها متوسطة الانتصاب فروع تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقها معتقة . اذنية ، لاطلة الاذنيات . نصلها سنائية الشكل ، مدبة المقصعة ، ازهاره الاصاب ، مبقرة الزغب ، حافة الخضر ، غشنة للمرس . ازهارها سنبل التجميع طرفي الازهار . ازهارها وردية اللون او بيضاء || مدقة الفمالة تبه المدة وتقدر الاصاب وتنع الانتفاخ وتفيد الصدر وتقضي على البلغم .

### ٢٩٠١٦ - نَعْنَعَ صَعْتَرِي ، نَعْنَعَ يَابَانِي

*Mentha arvensis* (S). *Menthe des champs, M. du Japon, Pouliot thym* (F). *Corn mint, Field mint* (E). *Feldminze* (D). *Menta campestris, M. coltivist* (I).

نوع من النعنع الزراعي المشهور هذه اليابان . ساقه منتصبه فروع تملو من ٦٠ الى ٩٠ سم . فروع متركبة جلفة . اوراقه اهلجية الشكل تطول من ٤ الى ٩ سم . نصلها خلي الصفحة ، ناضج الاصاب ، سنن الحافة . ازهاره وردية اللون ، ابلية الازهار ، ضمية التركيب ، صويانية الشكل || يزود لاستفاد المتول .

### ٢٩٠١٧ - نَعْنَعَ كَنَدِي

*Mentha canadensis* (S). *Mentha du Canada* (F).

نوع من النعنع الصناعي يزود لاستفاد طهر . مهده كندا وهو يزود في جميع الاقاليم المعتدلة المنحرفة نحو الباردة . ساقه فروع تملو من ٢٥ الى ٧٥ سم . اوراقه معتقة سنائية الشكل . نصلها ازغب البشرة ، ناضج الاصاب ، سنن الحافة ، يطول من ٥ الى ٨ سم . ويعرض من ١٢ الى ٢٥ سم . || ازهاره وردية اللون ، ضمية التجميع ، ابلية الازهار || يزود ويحمي في جميع الاربية الفنية الرطبة المتوسطة الانفاج . يستفاد طهر من الازراق والازهار .

### ٢٩٠١٨ - نَعْنَعَ لَيْسَرِي

*Mentha citrata* (S). *Menthe citronnée* (F).

نوع من النعنع الازيني . ساقه فروع متطانية تطول من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقه معتقة لا نظامية الشكل ، السفلى



نعنع بري



نعنع زراعي



نعناض

### ٢٩٠٣٥ - نفاض واليش (S). Meconopsis wallichii (F).

نوع من النفاض المحلى . ساقه فراء متشعبة تملو من ٨٠ الى ١٨٠ سم . اوراقه ملتصقة ويشية غمرية . ازهاره زرقاء اللون متدلية ، قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم . ثماره جراء مستطيلة رباعية الحروف النافرة المحددة الجانب || ساقه وفروعها مزينة البهاء ، زغبها حلبي الشكل اسمر اللون ، عديم الصلابة || تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

### ٢٩٠٣٦ - نفاضات (F). Amiboides (E).

رتبة كائنات حيوانية دينا من الجنويات .

### ٢٩٠٣٧ - نفاض (F). Amibe

هي الاميب ، اطليه .

### ٢٩٠٣٨ - نفاض (F). Hypodermose

مرض يحدثه نفث النمر في الخيل والبقر والضان .

### ٢٩٠٣٩ - نفاض \* ، أم شقوركة (F). Buphaga (S).

Buphage, Pique-boeuf (F). Beefeater, Ox-pecker (E). جنس طير من فصيلة الزروريات ، انواحه قليلة . طوله يراوح من ٢٤ الى ٢٧ سم . راسه وعنقه وصدره وبطنه وظهوره الى الجوزة . سقاطه وذنبه الى السرعة المايقة . نكاه الى الصهبة . متقاربه غليظ الشكل والقند ، اسفر القاعدة والجسم ، احر للثقل . عياله الى الحرة الجوزية ، رساه وغالبا سحر || يمشي برقة الحمر والمخبرات من ابتكار وابل وشترها يلتقط ما عليها من قراد وذباب ويستأصل من جلودها النمر والتف وراشبه .

### ٢٩٠٤٠ - نفاض (F). Turnix (S).

نصف الطائر : حسا من الماء ما يكفيه .

### ٢٩٠٤١ - نفاض \* (F). Turnix (S).

Turnix (F). Hemipode (E). جنس طير من فصيلة النقيبات . انواعه قليلة العدد ، جميعا صغيرة القند طويلا يراوح من ١٦ الى ١٨ سم . انوثها الى الصهبة المايقة الموشة والمزودة بالاسفر والاسود . وورسها موشة بثلاثة خطوط صفر || اناته تدن بين الاشباب والادغال ترصع افسيسها بالحلبيش . يبيض من ٦ الى ١٠ بيضات مخضها وحدها نحو ثلاثة اسابيع || قوته الحبوب والخراش حل لاختلاف انواعها واعصها النسل . يألف الليالي والاراضي الموحاة || اعرف انواعه واشهرها النبقوق الاقربى والنبقوق القتال .

### ٢٩٠٤٢ - نفاضات (F). Turnicidae (S).

Turnicidae (F). Turnicidae (E). فصيلة طير من رتبة الدجاجيات . اجناسها خمسة ، شكلها بين الحجل والحبارى . تتميز بفتحة المختار والسان . باستطاعة قراود السقوط وبفصر الانثى || اجناسها خمسة : النبقوق والتنبوق والحقم والشونس والنفاش .

### ٢٩٠٤٣ - نفاض (F). Trachycarpus (S).

Palmer de Chine (F). جنس نباتات برية وزيينية من فصيلة النخلات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، جلودها اسطوانية مستقيمة تملو من ٥٠ سم . الى عشرة امتار . اوراقها مستطيلة الزناد درية الشكل او موشية قطرها يراوح من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . لونها الى الخضار اللامس الازرق المولج يملو تمسح فضي .

يملوها ازهار مركب من ثلاثة ازهار جزوية اللون سباعية او ثنائية البتلات قطرها يراوح من ٨ الى ١٠ سم . تنوره يستمر من تموز الى آب .

### ٢٩٠٤٤ - نفاض شايك (S). Meconopsis aculeata (F).

Meconopsis aculeata (F). نوع من النفاض الممر . ساقه شائكة منتصبة تملو نحو ٦٠ سم . شوكها هربي الشكل ذرب الحمة . اوراقه قليلة الشكل ، كبيرة القند ، خاسية التفصيص ، ازهاره ارجوانية اللون ، صفر الاسدية ، متوسطة القند ، قطرها نحو ٥ سم . || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

### ٢٩٠٤٥ - نفاض عشقودي (F). Maconopsis racemosa (S).

Maconopsis racemosa (S). نوع من النفاض الممر . ساقه شائكة منتصبة تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقه كاملة عادمة التشريح . تصلها الى الخضار الاصفر المولج . ازهاره عشقودي التجميع . ازهاره بنفسجية اللون قطرها يراوح من ٢ الى ٤ سم . بتلاتها لا نظامية التركيب والتد الذي يراوح من ٥ الى ٨ || تنوره يستمر من تموز الى آب .

### ٢٩٠٤٦ - نفاض كامل الورق (F). Meconopsis integrifolia (S).

Meconopsis integrifolia (S). نوع من النفاض المحلى . ساقه منتصبة تملو من ٥٠ الى ٩٠ سم . فروعها متبادعة لا منتصبة . زغبها حلبي الشكل ، اسمر اللون ، متوسط الصلابة . اوراقه سنانة الصل مستطيلة . ازهاره صفراء اللون ، مزدوجة البتلات ، كبيرة القند ، قطرها يراوح من ٧ الى ١٥ سم || تنوره يستمر من تموز الى آب .

### ٢٩٠٤٧ - نفاض كميري (F). Meconopsis cambrica (S).

Meconopsis cambrica (S). نوع من النفاض الممر . ساقه فراء متشعبة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقه ملتصقة ويشية غمرية ، ازهاره متوسطة القند تعرض من ٣ الى ٤ سم . تبدو كبريتية الصفار ثم تتحول نحو البرتقالي . ثماره حفية الشكل . سقاها صفة ، مستطيلة ، رباعية الحروف المحددة وبها سداسية . تنوره يستمر من حزيران الى آب .

### ٢٩٠٤٨ - نفاض مشعر (F). Meconopsis sinuata (S).

Meconopsis sinuata (S). نوع من النفاض المحلى . ساقه شائكة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . فروعها متبادعة لا منتصبة . اوراقه لا قياسية التفصيص والتشريح ، تصلها كبير القند عابق الخضار . ازهاره عشقودي التجميع ، زرقاء اللون ، رباعية البتلات ، قطرها يراوح من ٥ الى ٧ سم || تنوره يستمر من تموز الى آب .

### ٢٩٠٤٩ - نفاض هاتيك (F). Meconopsis heterophylla (S).

Meconopsis heterophylla (S). نوع من النفاض المحلى . ساقه فراء متشعبة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه لا قياسية التشريح والتشريح . ازهاره حرار اللون ، قطرها يراوح من ٤ الى ٥ سم . ثماره جراء مستطيلة سداسية الحروف النافرة || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .



نفاض



نبقوق

قليلة المدد، جميعها وسيدة الجبل الحولي. تظهر في أوائل الربيع ثم تمتع مكثها الذي على نصال ومبايق بعض النباتات المرصوة فينتفج عن رقات تقعي على الأوراق. أشهرها لغريل الفصية.

### ٢٩٠٥٣ - نُغِيرِيلُ الْفَصَّةِ

هو سويد الفَصَّةِ، الحَلْبَةِ. (F). *Négril de la luzerne*

**٢٩٠٥٤ - نُغِيصِيَات**  
(S). *Gymnosaccae*  
(F). *Gymnosaccae* (F). مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزيات تتميز بانزاعها المرطلة، اجناسها وانواعها كثيرة المدد تجسمها ثلاث فصائل: الخثرات والحجيدات والوكسيات.

**٢٩٠٥٥ - نَغَفَة**  
(F). *Veron* (F). Bot, Bott (E). رقة النبر أي دعوومه. ج. نف. تنفج حل ظهور الخيل والأبال واليقر التي تلمسها وتقلعها بالنسبها إلى افولها فحلوقها فاسماها حيث تستقر بعض الوقت ثم ترق مع النسج إلى الجلد أو تمكث بين طيات الجلد إلى أن تخرج مع الرؤث.

**٢٩٠٥٦ - نَغَل**  
(F). *Hybride* (F). Hybrid (E). هو في الحيوان من كان أبوه من غير جنس أمه كالبغل الذي يتولد من الحمار والفرس.

**٢٩٠٥٧ - نَغْنَع**  
(F). *Crétillon* (F). Comb (E). سن. حرف الديك.

**٢٩٠٥٨ - نَغِيظَةُ**، سَبِيثُورِيَّة  
(S). *Septoria* (S). جنس فطور مجهرية من فصيلة السبثيات. يكتسبها كروية أو بيضية تنشأ محصورة في الطبقة الادمية. منها شارف الايزكاز. جولا مثل النسج دقيقة. يوريفتها مستطيلة أو عيطية، مستقيمة أو منقعة، شفافة، شفعية الانقسام المرضي، بحيلة الزيرة || انواعه عديدة. قدرها نحو ٩٠٠ منها سييدة لا حصر فيها ومنها مؤذية وبعضها شديد الادي. أشهرها ما يلي.

### ٢٩٠٥٩ - نَغِيظَةُ الْأَزَالِيَّةِ، نَغِيظَةُ الْجُسْكَانِ

(F). *Septoria azalae* (S). *Septorioses de l'azalée* (F). Leaf scorch (E). فطر مجهرى يركب الأوراق الفتية عند قاعدة عروقها الأولى فيسبب احمرار النسج واسمرار ثم ييبس، وتفسط الأوراق ويثوبو النبات. وقد يكون آذاه شديدا فيوز على النمو ويمنع الانزراع || يكافح حته ظهوره بمركبات النحاس أو الزنك ومجرق الأوراق الساقطة لأنها تحافظ على بوح الفطر.

### ٢٩٠٦٠ - نَغِيظَةُ الْأَحْمَرَانِ

(S). *Septoria callisephi* (S). فطر مجهرى يصيب أوراق معظم انواع الاصوان الزراعي فيعطب النبات ويؤثر في نموه وازهاره || مظهره الخارجي يقع لإقايمة الشكل والحجم تركب نصل الأوراق بين الاعصاب والعروق. تبدو حنطية، غبراء اللون ثم يحل نحو البسرة التي يقبها الياس والاضحات. يكافح بقتلاح النباتات المرصوة وبطبخة التربة بالكلس أو بسلقات النحاس.

### ٢٩٠٦١ - نَغِيظَةُ الْبُرْتَقَالِ

(S). *Septoria tibia* (S). فطر مجهرى حادم الاذى يركب البرتقال والحامض واليوسني

كرها شالك الحافة، شوكه صلب النسج، ساد الحمة. ثماره مثقبة التصبج، حنية الشكل والقند، ليغية القباب الناشف اللاماكل || والنترول يعيش ابنا ذروح وفي اي ربة كانت شرط لا تنخفض الحرارة الدنيا عن ثلاث درجات مئوية. || اعرف انواعه وأشهرها ما يتبع.

### ٢٩٠٤٤ - نُتُولُ أَزْعَب

(S). *Trachycarpus nana* (S). Palmier à tige rudimentaire (F). نوع من النترول الزيتي السبروتي الشائع الزراعة. ساقه اسطوانية رفيعة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراقه دقيقة الشكل لامعة النصل الاخضر اللامس. ثماره جوية اللون، حنية الشكل والقند || وهو يعطي النمو، يحيل الشكل، يذرع في المراكب والحدائق.

### ٢٩٠٤٥ - نُتُولُ الْغَنَبِ

(S). *Trachycarpus excelsa* (S). Palmier à fibre, Palmier-chamvre (F). Fibre palm (E). Faserpalm (D). Palma de fibra (I). نوع من النترول السبروتي الصناعي الشائع الزراعة. ساقه اسطوانية رفيعة تملو نحو ١٠ أمتار طولها شيك من الياف متراكبة الحية حنطية اللون. أوراقه مروحية الشكل قطرها يراوح من ٤٠ إلى ٦٠ سم. وزنادها يطول نحو ٥٠ سم. || ثماره حنية الشكل والقند لونها إلى الزرق المايقة || البافه مرغوب فيها تستعمل في صناعة الاكياس والحبال.

### ٢٩٠٤٦ - نُتُولُ حَزْرَيَاتَا

(S). *Trachycarpus khasiana, T. martiana* (S). Palmier de Marcins (F). نوع من النترول السبروتي الزيتي. ساقه ناشرة الحيد، مبرعة الالياف الرطلة، تملو من ٣ إلى ٥ أمتار. أوراقه مروحية الشكل قطرها يراوح من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. وزنادها يطول من ٦٠ إلى ٧٠ سم. نصلها عائق الخضار اللامس يملو تمشيع فضي. ثماره حنية الشكل والقند لونها إلى الصفار البرتقالي.

### ٢٩٠٤٧ - نَغْت

(F). *Aune* (F). هو المثلث، الحلبه.

### ٢٩٠٤٨ - نَغَر

(F). *Pycnonota* (F). هو البليل، الحلبه.

### ٢٩٠٤٩ - نَغَر

(S). *Serinus* (S). Serin (F). Canary (E). نفرج. نفران. جنس عصافير خريسة من فصيلة الشرشوريات. انواعه عديدة جميعها صغيرة القند. انثاها إلى الصفرة والصفرة الزرقية والورشة. جميعها تألف النفس وتقنيس ادب التنريد || أشهر انواعه النفر الكناري المعروف بالكناز.

### ٢٩٠٥٠ - نَغَر سُوْرِي

(F). *Serin de Syrie* (F). هو النمار ونوع من النفر تنجي اللون حسن التنريد يأنف البلاد اللبنانية السورية.

### ٢٩٠٥١ - نَغَرَة

(F). *Serine* (F). She canary (E). انثى النفر. جسمها اصفر قدأ من جسم الذكر ورأسها اقل استدارة وثوبها اقل لمة ونضيبا.

### ٢٩٠٥٢ - نُغِيرِيلُ

(S). *Colaspidea* (S). Colaspide, Négril (F). جنس خنافس صغيرة القند من فصيلة النضاريات. انواعه



نغريل



نغيلة البرتقال



نفل ابيض

ويستمر النفل في الوقت الحاضر من أهم وسائل التودد التي تستخدم في تحريك الآليات المختلفة من قطارات والسفن إلى السيارات وأجهزة المصانع. || أهم البلاد المنتجة للنفل هي الولايات المتحدة وروسيا وأمريكا الجنوبية والبلاد العربية وإيران.

٢٩١٠٣ - **نُفُطُور** \*  
Micro-organisms (F).  
Microorganism (E).

اسم يطلق على كل عضو مجهرى نباتي أو حيواني، ج. فطماير. ومنهم من قال فمضكري. ج. فمضكريات.

٢٩١٠٤ - **نُفُتِيَّة** \*  
Utilitarisme (F).  
Utilitarianism (E).

الفنعية مذهب فلسفي يقول بأن المنفعة إن خاصة أو عامة هي سمة المثل البشري.

٢٩١٠٥ - **نُفُتَات** \*  
Impenses (F). Expenses (E).  
هو ما يتفقه المرء على حين ثابته قابلة للاسترداد والنقثات قد تكون:

نفقات ترفيه  
Impenses voluptuaires (F).  
Voluntary expenses (E).  
نفقات ضرورية  
Impenses nécessaires (F).  
Necessary expenses (E).

نفقات مفيدة  
Impenses utiles (F).  
Useful expenses (E).

٢٩١٠٦ - **نُفُتَاة ، مَعَاش** \*  
Pension (F).  
Pension, Allowance (E).  
النفقة أو المعاش دين يؤتى بصفتها دورية وقد تكون عمرية لقوام المعيشة أو التقاعد أو بسبب زمانة.

٢٩١٠٧ - **نُفُكَل ، شَبَدَر** \*  
Trifolium (S).  
Trèfle (F). Clover (E).

جنس نباتات عشبية من القرنيات القفرافية. أنواعه البرقية زهاء ١٥٠ منظرها بري مرعوي وبعضها زراعي على جنبها الحولي وأغزل والممر. جلورها شجيرة تنمو في الأرض. سوقها فراء. أوراقها مركبة ثلاثية اللويحات مستطيلة الزناد. أزهارها رُؤْيِي التجميع أو سنبل. أزهارها مدثرية مختلفة الألوان، ثمارها سفية. بزورها كلوية الشكل، صغيرة القد، سمرار اللون. || أعراف أنواعه وأشهرها ما يتبع.

٢٩١٠٨ - **نُفُكَل أَيْبُش** \*  
Trifolium repens (S).  
Trèfle blanc, T. rampant, T. d'agneau (F).  
نوع من النفل المرعوي. تكثر زراعته في الأرض الرطبة. ساقه مدادة فراء. وريقاته بيضيه مستطيلة. أزهاره رُؤْيِي التجميع. أزهاره أبيض. بذوره كلوية الشكل سنطية. || يوجد في جميع الأرضة أخصها المندجة ولا يخفى الكلسية. علفه جيد الصنف مرغوب فيه بكثر استعماله لبقير الحلوب.

٢٩١٠٩ - **نُفُكَل إسْكَنْدَرَانِي** هو البرسيم، أطله.

٢٩١١٠ - **نُفُكَل البَرِّ** \* **وَجَلُّ الأَرَبِي** \*  
Trifolium arvense (S). Trèfle des champs, Pied de lièvre (F). Field clover, Hare's foot clover, Stone clover (E). Feldklee, Hasenpötchenklee (D). Mosci-maggiore, Erba lepre, Pie di lepre (I).  
نوع من النفل البري المرعوي الممر. ساقه وفروعه زباء



نفل البر

٢٩١٩٢ - **نُفُث الدَّم** \*  
Hemoptysie (F).  
هو يسق الدم، أطله.

٢٩١٩٣ - **نُفُج** \*  
Eclosion (F). Hatching (E).  
هو التفنن والتفقيص. تفنن نفج القلوب أو الصوص أو الكتكتوت أي خرج من البيضة.

٢٩١٩٤ - **نُفُجِيَّة** \*  
Pneumatologie (F).  
Pneumatology (E).

الفنعية مذهب فلسفي لاهوتي يبحث في كل ما هو خاص أو منوط بالكانات الوسيطة بين البشر والاله أو الآلة.

٢٩١٩٥ - **نُفُروِيْب** \*  
Néphrops (F).  
دوية من التفشريات تدعى برغوث البحر، أطله.

٢٩١٩٦ - **نُفُروْد** \*  
Nephrodium (S).  
Néphrodie (F). Nephrodium (E).

جنس نباتات جذمورية مصرية من السراخس وفصيلة السباجيات. أنواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم أصقاع العالم || أوراقها مستطيلة، مركبة، وثرية التجميع، جميلة الخضار اللامس. مزاجها ريشية أو مفرشة. سدابها كلوية الشكل. زكاتها شبه ملحونة || بعض أنواع النفرود يزرع في المراكب لتزيين.

٢٩١٩٧ - **نُفُروِيْد** \*  
Néphridies (F).

تفريج تفاريد أعضاء الإفراز عند بعض الحيوانات الدنيا كاللوازات وضفديات الأربيل والديدان. وهي عبارة عن أنابيب مسككة، مهددة الجدران الداخلية تحترق الجسم وتنتهي إلى الخارج.

٢٩١٩٨ - **نُفُص** \*  
النفس: ما تساقط من الورق والثر.

٢٩١٩٩ - **نُفُص** \*  
Gaulge (F). Beating (E).  
هو الفوط أو المطاط أي جني الثار بواسطة الضرب بالمصا.

٢٩١٠٠ - **نُفُص** \*  
Egronage (F). Picking (E).  
فصل الحبوب أو البلور عن السنابل والمطر وما أشبه.

٢٩١٠١ - **نُفُصَة** \*  
المطرعة تصيب بقعة من الأرض وتغطي بقعة.

٢٩١٠٢ - **نُفُط ، نَظُول** \*  
Pétrole, Naphte (F).  
Petroleum, Naphtha (E).

زيت معدني يوجد في جوف الأرض مركب من عنصرى الكربون والهيدروجين الأصليين. أنواعه عديدة ومختلفة الأغراض من لون ورائحة وصفاء ولزوجة. ومنه ما يكون مصفراً قابل المتأخر الثانوية وهو أجوده ومنه ما يكون مغسراً كدلاً ومنه ما يفسر إلى الحمرة أو السوداء ويكون بعضه شفافاً وبعضه الآخر كدراً كثيفاً. قلته النوصي يراوح من ٧٨٠° إلى ٨٣٠°، || يستخلص منه بالتقطير المواد التالية:

سحق ٧٠°  
إثر البترول  
من ٧٠° إلى ١٢٠°  
من ١٢٠° إلى ١٥٠°  
من ١٥٠° إلى ٢٨٠°  
من ٢٨٠° إلى ٤٠٠°  
من ٤٠٠° وما فوق  
وآخرها المازوت الذي يعتبر رأسب التقطير



## ٢٩١١٦ - نَقْلُ بَنَفْجَانِيٍّ ، نَقْلُ دُكْمَاسِيٍّ

*Trifolium pannonicum* (S). Tréfle pannonien, T. de Dalmatie (F).

نوع من النفل المرعوي الممر . ساقه زباه منتصبه فراءه تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . ازهاره وريسي التجميع غروي الشكل . ازهاره كبيرة القذ عاجية اللون يملعها مواج اصفر . وريقاته اهلالية تملو من ٤ الى ٥ سم . تصلها ازغب البشرية باثت الخفصار || وهو من النباتات السبروتية التي تديش حتى ارتفاع ١٨٠٠ م . ويجود في جميع الاربة المصقبة الفور .

٢٩١١٧ - نَقْلُ ثُرُفُسيٍّ \*  
*Trifolium lupinaster* (S). Tréfle à feuilles de lupin, T. faux-lupin (F).

نوع من النفل التريبي الممر . ساقه منتصبه قليلة الفروع تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه خاسية او سباعية الورقات ، نصلها سنانية ذرية تملو نحو ٤ سم . ازهاره مستطيل الشكل . ازهاره ارجوانية اللون تملو نحو ٢ سم . تنوره يستمر من حزيران الى آب .

## ٢٩١١٨ - نَقْلُ قِرْمَزيٍّ \*

*Trifolium incarnatum* (S). Tréfle incarnat, T. anglais, T. du Roussillon (F). Scarlet clover (E). Incarnat-Klee (D). Trifoglio incarnato (I).

نوع من النفل المرعوي الزراعي الممر : ساقه فراءه زباه تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم . وريقاته ملوكة الشكل . ازهاره سنبل التجميع . ازهاره قرنبزية اللون . يزود الى الصفار المنقب المواج || يجود في جميع الاربة الصالحة . يكثر استعماله كنبات حولي لانه سريع النمو وجيد الانتاج في ازل عهده . ضروده المشهورة حسة فوارقها التماوت بسرعة الادراك وصلاحيها الى اربة معينة .

## ٢٩١١٩ - نَقْلُ قُحْ

صفة الصرع الذي لا يجبس لبته . فتقول صرع نفوح . والبقرة النفوح تلك التي يخرج لبها من غير سلب .

## ٢٩١٢٠ - نَقِيد ٥

Usable (F).  
Liable to wear out (E).

صفة ما يمكن استفادته او ما يمكن ان ينفق .

٢٩١٢١ - نَقِيدَك \*  
*Tarebratula* (S).

*Térébratule* (F). *Tarebratulida* (E).

جنس حيوانات من الرخويات عضديات الارجل وفضيلة النفيديات . انواعه المعروفة عديدة ؛ بعضها من متحجرات الطبقة الديفونية والبعض الآخر ، اي الماصر ، منتشر في جميع بحار العالم || اصداها صغيرة القذ ، شبه غروي الشكل ، الشرنق ، لامتناهية المصارع المائلة || تديش لاصقة بالصفور المسمورة .

٢٩١٢٢ - نَقِيدَات ٥  
*Terebratulidae* (S).

*Térébratulidés* (F). *Terebratulidae* (E).

فصيلة من الرخويات المصقبة عضديات الارجل . اجناسها وانواعها عديدة ، معظمها من اجافير الاباج القديم والحديثة الديفونية . اما اجناسها المعاصرة فتنشر في معظم بحار العالم || اصداها صغيرة القذ ، شينانية الاشكال والارنان || اعراف اجناسها واشهرها النفيدة والتقيشة والملاس والغبيث والدليلة .

## ٢٩١٢٣ - نَقِير

*Stramoine* (F).

هو اللاتوره الشائكة ، الحلبا .

تملو من ١٠ الى ٢٠ سم . وريقاته ثلاثية التركيب قليلة الشكل . ازهاره سنبل التجميع . ازهاره وردية اللون .

## ٢٩١١١ - نَقْلُ الْمَاء \*

*Menyanthes trifoliata* (S). Ménélanthe, Ménéyanthe, Tréfle d'eau, T. des marais (F). Bog-bean, Buckbean, Marsh trefoil (D). Bockbohne Fleharklee, Sumpffleharklee (D). Scarfano, Trifoglio d'acqua, T. caprino (I).

نبات عشبي جلمودي منقي معمر من فصيلة الجنطيانيات . اوراقه مركبة ثلاثية تشبه اوراق النفل وهي متعاقبة ، معنفة ، خاسنة . ازهاره عنقودي التجميع . ازهاره صغيرة القذ يضاء اللون موشحة بالوردي || اوراقه طيبة عديدة المنافع الصحية وقد تستعمل استعمال الجنجل . راجع الطريف .

## ٢٩١١٢ - نَقْلُ الْمُرُوجِ \* ، نَقْلُ بَنَفْجَسيٍّ ، بَرَسِيمٍ أَحْمَرٍ ، رَطْبَةٍ

*Trifolium pratense* (S). Tréfle commun, T. des prés, T. violet, T. rouge, Tramène, Trioliet, Lucotte (F). Red clover, Purple clover, Meadow clover (E). Klee, Rotarklee, Wiesenklee (D). Trifoglio rosso, T. dei prati, Moschino (I).

نوع من النفل المرعوي السنبل السبروتي الممر الشائع الزراعة . ساقه منتصبه فراءه تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . اوراقه ثلاثية الورقات البيضية الشكل . تصلها مالس المستعصم يملو عند قاعدته تجذيع ابيض حل شكل ٨ . ازهاره وريسي التجميع . ازهاره بنفسجية اللون تعلوها ماجة ارجوانية . يزود بنفسجية القطن اللطيف ، صفر القطن النقي || يجود في جميع الاربة الوافرة الموضوية اخصها المتدنية ، المصقبة الفور ، الرقاب || متطلباته الخاصة الكلس والبوتاس .

## ٢٩١١٣ - نَقْلُ أَيْثِيٍّ

*Trifolium elegans* (S).

*Tréfle élégant* (F).

نوع من النفل المرعوي الممر . ساقه كثيرة الفروع ، متوسطة الطلو ، زباه . وريقاته ملوكة النصل ، عابقة الخفصار . رؤيساته الزهرية متوسطة القذ ، كثيرة العدد . ازهاره الى الحخرة الوردية السوية || يجود في جميع الاربة ولا يخش التفجرة والخفينة والرملية .

## ٢٩١١٤ - نَقْلُ أَهْجَنْجَنِ \*

*Trifolium hybridum* (S). Tréfle hybride, T. de Suède, T. d'Alsike, T. bätard (F).

نوع من النفل المرعوي الشائع الزراعة في المناطق الباردة الرطبة . ساقه دقيقة فراءه تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم . وريقاته بيضية مستطيلة رؤيساته الزهرية كبيرة القذ . ازهاره وردية اللون مختلفة المواج الذي يراوح من الابيض الشاحب الى الاحمر الزاهي || علفه جيد الصنّف مرغوب فيه .

## ٢٩١١٥ - نَقْلُ بَرَسِيمِيٍّ

*Trifolium aurantiacum* (S). Tréfle orangé (F).

نوع من النفل التريبي الحولي . ساقه فراءه مشمية تملو من ١٥ الى ٢٥ سم . وريقاته سنانية النصل المسن . ازهاره وريسي التجميع ، يبيض الشكل ، يملو من ٥ الى ٧ سم . ازهاره صغيرة القذ يرتقالية اللون || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .



نفل الماء



نفل المروج



نفل اهنج



نفل قرنزي



نعيدة

## ٢٩١٢٩ - نقيضة الأرز \*

*Mycosphaerella oryzae* (S).

فطر مجهرى يركب حصف الارز في شهري تموز وآب  
فيؤذي ويهيئ الى اسبالة || مظهره الخارجي يقع بمسيرة  
لاقياسية الشكل والترتيب تملو نصال المصف تسبب  
ذوبها ويهاجم الباكر مما يؤدي الى سوء الاسبال وتدني  
الانتاج || اعصابه لودلية الشكل . بويغاته ثنائية الخلية  
تطول من ١٤ الى ١٥ م. وتعرض نحو ٤ م. || افرازها  
الحفظة حتى الآن لا تسبب المكافئة لانها لم تتجاوز  
٢٪ .



نقيضة الاجاص



نقيضة الاراشيد



نقيضة الاراز



نقيضة البزيلة



نقيضة البطيخ



نقيضة التفاح

٢٩١٢٤ - نقيضة Labile, Caduc (F). Deciduous (E). قابل الابعال أي السقوط .

٢٩١٢٥ - نقيضة \*  
جنس فطور مجهرية من النخاميات وتصلية المشقيات .  
اعصابها بسيطة ، كنهتها مديمة النكاسة ، بويغها خفاف  
او زيتوني اللون يحمل وثيره معتزلة تقصه الى خيلتين  
متقابلتين القدر . منها هامي الاكثاز في انتفاخ شبه  
لعلولي ، انواعه الفارة عديدة اعربها ما يتبع .

٢٩١٢٦ - نقيضة الاجاص \*  
*Mycosphaerella sentina, Sphaerella sentina, Sphaerella pyri, Septoria pyri, Septoria piricola, Septoria nigririma (S). Septoriosa du porier (F). Leaf spot of pears (E). Weibfleckenkrankheit der birne (D).*  
فطر مجهرى يمتري اوراق الاجاص وقد يصيب الثآر .  
مظهره الخارجي يقع معتزلة بمسيرة ، قطرها من ١  
م. لونها الى الخفي يحويها اطوار احمر اللون ينسجي  
المواج ، تركب نصل الاوراق فتؤذيها وتمتحنها من القيام  
بوظيفها الى الوجه الاكل || يكتبداته نائكة نودلية تطول  
من ١٥ الى ١٨ م. بويغاته اسطوانية مقوسة شفاقة  
مستفة الاطراف ثنائية الانقسام ثلاثية الخلايا تطول من  
٢٣ الى ٤٣ م. وتعرض نحو ٣ م. || تكاثره مشروط  
بالمولم الجوية الموافقة || يكافح كسائر فطور بنفسه.

٢٩١٢٧ - نقيضة الاراشيد \* نقيضة الفستق السوداني \*

*Mycosphaerella arachidicola, Cercospora arachidicola, C. arachidis (S).*  
فطر مجهرى يركب اوراق الثبات وسوقها . مظهره الخارجي  
يقع زيتية ثم حنطية لجووية فطرها براوح من ١ الى ١٠ م  
تطو نصال الاوراق لعل صفحتها السفلى ثم تنتشر على  
السوق والمدايق فتؤذيها وتمتحنها من القيام بوظيفها على الوجه  
الاكل || كوابه ربادية اللون ملتوية الاطراف . كئاده  
صفيقة الشكل مستقيمة الجسم او مقوسة ، طولها براوح  
من ٣ الى ١٠ م. وعرضها من ٣ الى ٥ م. انقسامها  
شدية الثبات براوح من صف من ٣ اعضاء || يكافح  
بانتقال الادوية الفاطورية التي لا يثنى من تراكم  
عناصرها الفعالة . ومن المستحسن تطهير البذار قبل  
استعماله بمحلول سلفات النحاس المركز ٥ ٪ مدة ساعة  
من الزمن .

٢٩١٢٨ - نقيضة الاراشيد المستديرة \* نقيضة يرسكي \*

*Mycosphaerella berkeleyi, Cercospora personata, Cladosporium personatum, Septogloeum arachidis (S).*  
فطر مجهرى يركب سوق الاراشيد واوراته فيؤذيها وقد  
يسبب ذوبها ويهاجم || مظهره الخارجي يقع معتزلة  
تبدو حنطية اللون ثم تسمر وتنتهي بالبياس والانفثات .  
كوابه نودلية الشكل جووية اللون . كئاده اسطوانية  
الجسم ، مستفة الاطراف ، حنطية ، تطول من ١٨  
الى ٦٠ م. وتعرض من ٥ الى ١١ م. انقسامها فطرها  
بنسبة صفين الى ٩ اعضاء . اعصابها وازقاقها برمية  
الشكل . بويغاتها ثنائية الخلايا لا متساوية الشكل والجسم .  
يكافح مكانة نقيضة الاراشيد .

## ٢٩١٣٠ - نقيضة البزيلة \*

*Mycosphaerella pinodes, Ascochyta glai (S). Anthracnose des pois (F). Blight of peas, Leaf spot of peas (E). Brannfleckenkrankheit der bohnen und erbsen (D).*

فطر مجهرى يمتري اوراق وصف البزيلة والبيقية والجلبان  
والخمر والترمس || مظهره الخارجي يقع لاقياسية الشكل  
والترتيب لونها الى العلطة يحويها حنط اسمر ، تركب الاوراق  
والسنت والسوق فتسوقها وقد تسبب ذبول القرون ويهاجم  
قبل اكمال الحب || وهو من الفطور الزهية التي لا تتكاثر  
الا في ظروف بيئية محدودة تسامحها حوامل مناعية خاصة  
قوامها تدني الحرارة وثقل الضح وكثرة الرطوبة الجوية  
النسبية .

## ٢٩١٣١ - نقيضة البطيخ \*

*Mycosphaerella citrullina, Dipodina citrullina, Ascochyta cucumis (S).*

فطر مجهرى يركب البطيخ والتام والخيار والكوس وغيرها  
من القرعيات فيؤذيها اشد الاذى || مظهره الخارجي يقع  
سحر لاقياسية الحجم والتجميع تعيب نصل الاوراق تسبب  
بياس التثج ثم تصيب السوق فتسقطها فيثور قرعية  
تحول دون وصول كامل التسفع الى الفروع والاوراق  
تتسبب اسودادها ويهاجم || يكتبداته نودلية الشكل ،  
حنطية اللون ، ميمة اللق ، تطول نحو ١٦٥ م. بويغاته  
شفاقة ، ثنائية الخلية ، شبه اسطوانية الشكل تطول من  
١٠ الى ١٨ م. وتعرض من ٣ الى ٥ م. يكافح عند  
ظهوره باستعمال احد الادوية الفاطورية الفعالة متغيرا على  
الثبات والرتبة .

## ٢٩١٣٢ - نقيضة التفاح \*

*Mycosphaerella pomae, Cylindrosporium pomae, Phoma pomae (S). Fruit spot, Brooks' fruit spot (E).*

فطر مجهرى يركب ثمار التفاح . مظهره الخارجي يقع  
دقيقة فطرها نحو ٥ م. تصيب بشرة الثمرة اقبو حنطية  
اللون او خضراء حابطة او سمراء . يركب التفاح في آب  
ويستمر في نشاطه حتى الخزن بالبراد حيث يتوقف ويركن  
الى ثبات البنيات || اعصابه تملو نصل الاوراق الباسطة  
والتي براوح قطرها من ٧٠ الى ١٠٠ م. تحسن بعض  
الاتفاق التي لا يقل عددا من ٣ . بويغاته شبه اسطوانية  
طولا ١٩ م. وعرضها ٣ م. || ما يكتبداته التي  
تركب الثآر فهي تلتف المليلد من الكئاده الخيطية  
المستقيمة او الموضوعة التي تطول من ٥ الى ٨ م. وتعرض  
البشرة لانها قلما تملو السوق اذ لا تدغل فيه اكثر من  
ملليمترين || يكافح مكانة التسفع .

بقع حنطية تركب العصف فتسبب ذبوله ثم تصيب مصغيات الجذع فتزهرها بنقطة سود. وقد يركب البرية في نطيلها فينبو كنقطة سوداء داكنة || كوابنه بسيطة التركيب لانياسية الجسم والاستطالة لونها إلى السمر. كئانده طرية الإزكانار. بويئاته بيضية الشكل، حنطية اللون، فردية أو ثنائية الخلية تطول من ١٨ إلى ٢٤ م. وتعرض من ٧ إلى ١٠ م. || أضراره قليلة لا تستوجب المكافحة المكثفة.

#### ٢٩١٣٩ - نَيْطَلَةُ الزَّرْبَقُونِ

*Mycosphaerella millegrana*, *M. microscira* (S).  
نظر مجهرى يصيب الزربقون في أوراقه فيؤذيها وفي قضبانها الفتية فيقرسها ويعطها. || مظهره الخارجي بقع كبيرة سمراء اللون، مستديرة الشكل، قطرها يراوح من ٣ إلى ٤ م. تركب فصل الأوراق فتسبب يباس النسيج وانفجابه. وهو حل القضيبان بقع مستطيلة لا قياسية الشكل والحجم تركب بشرة السام قرب أبط الورقة فتقرسها وتحرقها بإطار رافق جزوي اللون. || كوابنه خسية التجميع متتصية، كئانده سطوية صفراء اللون تطول من ٣٠ إلى ٤٦ م. وتعرض من ٣ إلى ٥ م. || أضراره كروية الشكل لقطرها يراوح من ٥٥ إلى ١٠٠ م. || إزاقها وشية تحضن أربعة أزواج من البويئات الشفافة التي يراوح طولها من ١٦ إلى ٢٠ م. وعرضها من ٣ إلى ٤ م.

#### ٢٩١٤٠ - نَيْطَلَةُ السُّوسَنِ

*Mycosphaerella macrospora*, *Didymella macrospora*, *Heterosporium gracile*, *Scolecotrichum cladosporioides* (S).  
نظر مجهرى يصيب أوراق السوسن واللوبث فيؤذيها ويؤذيها ويبسب يباسها || مظهره الخارجي بقع صغيرة كثيرة مبعثرة تبدو بيضاء اللون ثم يدهاء وتنتهي بالسمرة واليباس || أضراره تتكاثر على صفحتي النصل. إزاقه تطول من ٥٥ إلى ٦٠ م. وتعرض نحو ١٤ م. بويئاته ثنائية الخلية تطول من ١٦ إلى ٢٠ م. وتعرض نحو ٥ م. أضراره لا تمتد إلى الأوراق.

#### ٢٩١٤١ - نَيْطَلَةُ الشَّوْثَرِ

*Mycosphaerella tabifica*, *Sphaerella tabifica* (S).  
*Pourriture du cœur de la betterave*, *Pied noir de la betterave* (F). *Dry heart rot of beets* (E). *Herz-fäule der Runkelröbe* (D).  
نظر مجهرى يصيب أوراق الشوثر وجذوره فيعطبها. مظهره الخارجي بقع مستديرة تبدو مخطاة اللون ثم سمراء تركب الأوراق، في أواسط الصيف، حل صفحات نساها العليا فتسبب أضرارها وذبولها ثم تنتقل بواسطة الأوعية الشبكية إلى داخل الجذور فتعطبها وتوقع بها اشد الإلادى || يكافح باستعمال الحلل بردود حل مرتين أو ثلاث مرات ابتداء من أول تموز.

#### ٢٩١٤٢ - نَيْطَلَةُ الشَّيْثَانِ

*Mycosphaerella fragariae*, *Sphaerella fragariae*, *Stigmatae fragariae*, *Septoria fragariae*, *Ascochyta fragariae*, *Cylindrosporium fragariae*, *Ramularia tulasnei* (S). *Maladie des taches rouges du fraisier*, *Taches brunes des feuilles du fraisier* (F). *Leaf spot of strawberry* (E). *Weißfleckenkrankheit der Erdbeerblätter* (D).  
نظر مجهرى يصيب الشيكال بأوراقه فيؤذيها. مظهره

#### ٢٩١٣٢ - نَيْطَلَةُ الثَّوْتِ

*Mycosphaerella morifolia*, *Cylindrosporium mori*, *Septoria mori*, *Septogloeum mori*, *Cheilaria mori*, *Phleospora mori* (S). *Fausse-rouille du mûrier* (F).  
نظر مجهرى يركب أوراق الثوت. مظهره الخارجي بقع مزوانية صفراء اللون، سمراء الاطار، وتترى نصل الأوراق وتسبب جفاف النسيج || أضراره محصورة بمنى النصل الذي يحل بالنسيج وقد يحل في بعض المراتق انطالية والظروف المتناحية الملامعة إلى نحو ٥٪ من مساحة النصل. هذا مع العلم ان قدر الفتر يضر أكل النسيج الشالية. يكافح بنسخ الأشجار قبل إزاقها بإسد المركبات النحاسية.

#### ٢٩١٣٤ - نَيْطَلَةُ التَّيْنِ

*Mycosphaerella bolleana* (S).  
نظر مجهرى يركب التين في أوراقه فيؤذيها. مظهره الخارجي بقع مزوانية تملو النصل حل صفحته السفلى ضمن حدود العروق والأعصاب، تبدو مابقة اللون إلى ان يكتملها الحمل الاكمل فتتألفها اذ ذاك حل الصلصة العليا بقع سمراء مرقوسة || كئانده وشية الشكل زيتونية اللون تطول من ٣٥ إلى ٤٥ م. وتعرض من ٧ إلى ٨ م. انفاسها يراوح من ضعفين إلى ٦ أضعاف. أضراره تأنله لا تستوجب المكافحة.

#### ٢٩١٣٥ - نَيْطَلَةُ الثَّوْمِ

*Mycosphaerella alliecia* (D).  
نظر مجهرى يركب أوراق الثوم والكراث فيؤشوها وقد يؤذيها ويبسب يباسها || مظهره الخارجي بقع صغيرة كثيرة مبعثرة تبدو بيضاء اللون ثم يدهاء وتنتهي بالسمرة واليباس || أضراره تتكاثر على صفحتي النصل. إزاقه تطول من ٥٥ إلى ٦٠ م. وتعرض نحو ١٤ م. بويئاته ثنائية الخلية تطول من ١٦ إلى ٢٠ م. وتعرض نحو ٥ م. أضراره لا تمتد إلى الأوراق.

#### ٢٩١٣٦ - نَيْطَلَةُ الْخَمِصِ

*Mycosphaerella rabiei*, *Ascochyta rabiei*, *Phyllosticta rabiei* (S). *Anthraxose du pois chiche* (F).  
نظر مجهرى يصيب الحمص في جميع أعضائه الهوائية. مظهره الخارجي بقع بيضية الشكل أو مستديرة تركب السرق والأوراق والسلف. تبدو حنطية اللون ثم تنحرف إلى البترة البيضاء يحرقها إطار آخر. وعند اشتداد اذاها تفرح السرق وتذبل الأوراق وتسبب انحلال السلف. بويئاته اسطوانية الشكل تطول من ١٢ إلى ١٤ م. وتعرض نحو ٤ م. || يكافح أما بتطهير الحمص قبل بذر ذلك بقمته نحو خمس دقائق في حلولل سلفات النحاس المركز ٥ ٪ أو بتفخ زراعته قواً بعد أزهارها بحلولل بوردو المركز ١ ٪.

#### ٢٩١٣٧ - نَيْطَلَةُ الْخَوْزِ

*Mycosphaerella populicola*, *M. populi* (S).  
نظر مجهرى يركب الخور في أوراقه فيؤشوها. مظهره الخارجي بقع مزوانية صغيرة أفتح حنطية اللون تملو النصل فتقرسها || تشوبه لا يستوجب المكافحة.

#### ٢٩١٣٨ - نَيْطَلَةُ الزَّرْعِ

*Mycosphaerella tulasnei*, *Cladosporium herbarum*, *Hormodendron cladosporioides* (S). *Noir des céréales*, *Mouchetage*, *Moucheture* (F). *Black point*, *Dark*, *Brown-tip* (E). *Schwarz des Getreides* (D).  
نظر مجهرى يترى عصف الزرع وعصيات السنايل في الخطة والشعر والشوفا والنطيل || مظهره الخارجي



نَيْطَلَةُ الثَّوْتِ



نَيْطَلَةُ الزَّرْعِ



نَيْطَلَةُ السُّوسَنِ



نَيْطَلَةُ الشَّوْثَرِ



نَيْطَلَةُ الشَّيْثَانِ

مستطيلة لا قياسية الانقسام الذي يراوح من ٣ الى ١٢ .  
بويضاته ثنائية الخلية . || اخراره زجيدة لا تستوجب  
المكافحة .



نقطة الفرتل

#### ٢٩١١٧ - نَقِيطَةُ الْكُتْمَةِ \*

*Mycosphaerella maculiformis*, *Phyllosticta maculiformis*, *Cylindrosporium castaneicolum* (S).

فطر مجهري يركب اوراق الكشمش والبنق وبعض الانجار  
الحرجية كالاسفندان والشت والبيلا والشم والسنديان .  
مظهره الخارجي يقع صغيرة مزوانية تصيب نصل الاوراق  
على صفحات السفلى فتبدو يضاء اللون ثم سرور  
بكثيداته مبيضة التجميع لا قياسية الترتيب لونها الى السرة .  
بوه اسطواني الشكل رباعي الانقسام او خماسي . بويضاته  
تطول نحو ٥ مي . وتعرض نحو ١ مي . || اخراره تنحصر  
بما يلحقه من اذى الاوراق وما يجنب من نقص في الغذاء  
يؤدى الى الاحبال الباكرك .



نقطة القطن

#### ٢٩١١٨ - نَقِيطَةُ الْكُشْمِشِ \*

*Mycosphaerella ribis*, *M. grossularia*, *Septoria ribis*, *Phyllosticta grossularis* (S), *Septorioides du grossierii* (F), *Septoria leaf spot* (E).

فطر مجهري يركب اوراق الكشمش . مظهره الخارجي  
يقع فسيحة مزوانية الشكل تظهر في عموز واب لونها الى  
الصبيحة الحمراء المراج ثم تيل الى البيرة وتستقر على اللون  
الاسحلم يطولو قوشم اسود . || بويضاته خيطية مستطيلة  
شائعة لا قياسية الانقسام الذي يراوح من ٢ الى ٥ .  
اخراره زجيدة . يكالغ كسائر فطوره جنسه .



نقطة الكرز

#### ٢٩١١٩ - نَقِيطَةُ الْمُرْأَةِ \*

*Mycosphaerella fraxini* (S).

فطر مجهري يركب المران في اوراقه فيسب بياضا .  
شبيهه بتكارر مستوى الخليا بين النسيج الحايكة واللجوية  
مظهره الخارجي يقع مستديرة حطية اللون ابروانية الختام .  
كثائده خيطية الشكل ، مستقيمة او مقومة الاطراف  
تطول من ٣٠ الى ٤٠ مي . وتعرض من ١ الى ٢ مي .  
اخراره لا تستوجب المكافحة .



نقطة الكشمشة

#### ٢٩١٢٠ - نَقِيطَةُ الْمُرْأَةِ \*

*Mycosphaerella brassicicola*, *Sphaeria brassicicola*, *Dothidea brassicae*, *Phyllosticta brassicae*, *Asteroma brassicae*, *Phoma oleracea* (S), *Ring-spot* (E).

فطر مجهري يصيب الملفوف في اوراقه الخارجية فيقطعها  
ويهي الى التسو فيؤخره وقد يؤذي . مظهره الخارجي  
يقع مستديرة رداء اللون سود اخضر طرها يراوح من ٥  
الى ١٥ سم . تركب النصل تقسب اصفرار وذيوله  
اعصانه وبكثيداته تراكب وتتشابك في البقعة الواحدة  
فتصغروا الى بؤرة سوداء تطاير من مقامها اللون البوينات  
الذبيقة الشفافة التي تطول نحو ٥ مي . وتعرض نحو ١ مي .  
اخراره التي تجين عليها هويل المرطبة تاراج من ١ الى  
٢٥ % يكالغ بتطهر البذار وتطهر ربة المشائل او  
بامتثال مشائل جديدة .



نقطة الملفوف

#### ٢٩١٢١ - نَقِيطَةُ الْمَيْهَوْتِ \*

*Mycosphaerella manihoti*, *Cercospora cassavae*, *C. manihoti*, *C. henningii*, *Septogloeum manihoti* (S).

فطر مجهري يصيب المنيوت في اوراقه فيشوها ويؤذيها .  
مظهره الخارجي يقع لا قياسية الخلية ، رداء اللون  
تركب نصل الاوراق تقسب يباس النسيج وانفثاته .  
كثائده تطول من ٢٠ الى ٧٥ مي . وتعرض من ٥

الخارجي يقع صغيرة لا قياسية الترتيب والشكل والحلم  
تركب نصل الاوراق على صفحاتها العليا ولا تمتد من  
المعاليق . تبدو صغيرة اللون بنفسجية المراج ثم تنحرف  
الى السرة وتستقر على البيرة يحرقها اطار اخر داكن .  
كوابه فارشة ، كثائده مستقيمة او مقومة وهي شائعة  
اسطوانية مستندة الاطراف . بويضاته لا قياسية الانقسام  
تطول من ٢٥ الى ٥٥ مي . وتعرض من ٢ الى ٣ مي .  
اخراره محصورة بحطب التجميع وحرمانه من التياه يملء  
الجسموري الى الوجه الاكل . || يكالغ قبل الانزهار  
وبعد العظم . وقد ينسج تملطس جذور الشيك قبل زرعها  
يحلول الحامض الكبريتي المركز ٢ % الذي يقضي على  
هذا القطر وغيره من القطوره الفسارة .

#### ٢٩١٤٣ - نَقِيطَةُ الْعَلِيقِ \*

*Mycosphaerella rubi*, *Septoria rubi* (S).

فطر مجهري يركب اوراق العليق والموسح البري والجبوي .  
مظهره الخارجي يقع مزوانية صغيرة اللغ فصلها يطول من  
٢ الى ٣ مي . لونها الى الحطلة تملوها شمة سمره تركب  
نصل الاوراق منذ انشباب المروق تسب يباس النسيج  
ثم انثاته وسقطه . || ككثارة يحصل عادة بعد جني الثار  
وهو اذا لامت اللوالب الجرية يحمش الاوراق الفنية  
فيحسبها ويلوحها . || يكالغ كسائر فطوره جنسه .

#### ٢٩١٤٤ - نَقِيطَةُ الْقَرْفَلِ \*

*Mycosphaerella dianthi*, *Didymella dianthi*, *Heterosporium echinulatum*, *Helminthosporium echinulatum* (S).

فطر مجهري يصيب القرفل بجميع اعصانه الهوائية .  
مظهره الخارجي يقع مستديرة الشكل او يضيبة ، حطية  
اللون ، مهدية باطار احمر او بنفسجي تركب الاوراق ثم  
السيق وتعد الى تويج الزهرة وبتلاتها . || كوابه فسيحة  
التجميع ، موسوعة القوام ملتوية . كثائده اسطوانية الشكل  
لا قياسية الانقسام الذي يراوح من ضعف الى اربعة  
اعصان . بويضاته تطول من ٣٥ الى ٤٥ مي . وتعرض  
من ١٢ الى ١٦ مي . || يكالغ بامتثال سائل بودور  
المركز ١ % قبل الانزهار .

#### ٢٩١٤٥ - نَقِيطَةُ الْقُطْنِ \*

*Mycosphaerella gossypina*, *Cercospora gossypina* (S), *Cercosporiosis du cotonnier* (F).

فطر مجهري يركب اوراق القطن فيؤذيها دون ان يهي  
الى التسو والانتاج . || مظهره الخارجي يقع صغيرة سمره  
اللون مهدية بالاحمر تملو اوراق القطن القريبة من الربة  
التي لا تملوها اشعة الشمس . || كوابه هريبة الشكل  
تطول من ١٢٠ الى ١٥٠ مي . كثائده شائعة تطول من  
٧٠ الى ١٠٠ مي . وتعرض نحو ٣ مي . وهي سداسية او  
سباعية الاجزاء . اعصانه حطية الشكل طرها يراوح من  
٦٠ الى ٩٠ مي . انثاتها اسطوانية تطول من ٤٥ الى  
٥٠ مي . وتعرض من ٨ الى ١٠ مي . بويضاتها وشية ،  
ثنائية الخلية تطول من ١٥ الى ١٨ مي . وتعرض من ٣  
الى ٤ مي . || اذاه لا يستوجب المكافحة .

#### ٢٩١٤٦ - نَقِيطَةُ الْكَرْزَةِ \*

*Mycosphaerella cerasella*, *Cercospora cerasella* (S).

فطر مجهري يركب اوراق الكرز والحلب . مظهره الخارجي  
يقع صغيرة مستديرة حطية اللون مهدية بالاحمر تنصل  
نصل الاوراق ثم تيبس . وقد ينفضها الريح فيبدو السطح  
كالفرابك الجبوس الغروب . || كثائده صقية الشكل

والاثنى تمتع المكن مباحداً في بطون الاثنا || البرقة عنه بلوغها الادراك التام تقطع نحو ٦ م. ثوبها في اول مدها الى الجذوة ثم ينصرف الى البنفسجي الفاتح تملو خطوط قاطبة من النقط السود .

Humerus

٢٩١٥٦ - نَقَّاذ

النقا هو عظم المَعْدِ .

Purété (F). Purité (E).

٢٩١٥٧ - نَقَّاء و طَهْر

هو غلر الشئ من العناصر الغريبة عنه .

Picolée tridactylus (S).

Picolée tridactyle (F).

٢٩١٥٨ - نَقَّاب

طائر من فصيلة النقاريات ورتبة المشققات . موته يشمل المناطق الجبلية من الشرق الادلى واروية || جسمه معتدل القد يطول نحو ٢٥ سم . يسقط نحو ٣٥ سم . ثوبه الى السواد الفضي الملبق بالابيض في الصق والابرار . صدره وبطنه الى البياض المشتر بالابيض . جبهة رفته وصدره الى السواد اللامع . قبة رأسه ذهبية اللون يطولها تزيين قصي . صدقة عينه زرقاء اللون . منقاده وساقه الذكر السمرة السوداء . ثوب الاثنى لا يختلف من ثوب الذكر الا بخضاب الفتة الغليظ المشتر بالاصفر || ويتميز النَقَّاب بكونه ثلاثي الاصابع خلسلداً لسانه اجناس النقاريات الرباعية الاصابع || قوته الحشرات واساريمها وبعض البذور البرية || يفتن عنه في تجاوبف الاشجار . الاثنى تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها دون الذكر الذي يؤذن لها الغذاء .

Syndicat (F). Syndicate (E).

٢٩١٥٩ - نَقَّابَة

هي جمية أشخاص يتصلون الى مهنة واحدة او من متشابهة للفرع الشروع عن مصالحهم المهنية .

٢٩١٦٠ - نَقَّابَة

Charrue, défonceuse, Défonceuse (F). Trenching plough (E). سكة خضفة مقنطرة تستعمل لفلج التربة او سحرها وانتراع حباتها على اعماق تراوح من ٦٥ الى ١٢٠ سم .

Coccothraustes (S).

٢٩١٦١ - نَقَّاذ و نَقَّاذ

Gros-bec (F). Hawfinch (E). جنس طير من فصيلة الشرشوريات . انواعه المعروفة ١٢ جميعها من صافير المناطق الحارة والمعتدلة . مسرهما العالم القديم والجديد . تتميز بمنقدها الضخمة التي تتجكس من كسر حبة الموز والخلوخ والكرو . قوتها الباز والحروب والخرط . تدن في الاجتار الفناء انماها تنقع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها متناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً . اعرف انواعه واشهرها النَقَّاذ المبدول .

٢٩١٦٢ - نَقَّاذ مَبْدُول

Coccothraustes vulgaris (S). Gros-bec vulgaire, Gros-bec commun (F). Common hawfinch (E).

طائر من النَقَّاذ وهو اشيع انواع جنسه واكبرها واضخمها قدراً ومنقداً . طوله نحو ١٩ سم . رأسه كشي اللون . قفته الى الصبهة الزبداء . زفاده وزرور سود . ظهره وصدره الى الصبهة الخمرية . بطنه ابيض . جناحه سود القاطدة ومظم الاطراف . بيض الريس وبعض الاطراف . ذنب اسود اللون ينتهي ببقعة بيضاء . منقاره الى الزرق العائقة . صدقة عينه وردية . ساقه الى الحمرة الطللاء . يألف

الى ٦ م . انقسامها لا نظالي الترتيب براوح من ٢ الى ٩ . اصابتها سطحية الاوتكاز . كروية الشكل تقطرها براوح من ٩٠ الى ١١٠ م . انزاقها ريمية تحضن اربعة ازواج من البويضات الشفافة الثانية الخلية .

٢٩١٥٢ - نَفِثَةُ الْمَوْزِ \*

Mycosphaerella musicola, Cercospora musae (S). Cercosporiose du bananier (F). Sigetoka disease (E). فطر مجهرى يركب الموز في اوراقه فيعطها ويسبب ذبولاً ويهيء الى الكليسات ان لم يندمها . || مظهره الخارجي نقاط دقيقة زيتية اللون تظهر في اوائل الصيف على الاوراق الجديدة ثم تقسم وتستقر نهائياً على شكل مستطيلات براوح طولاً من ٣ الى ١٥ م . وقد تصل ببعضها فتصبح بقعاً فسيمة مستطيلة لا قياسية الحجم . اما لونها فيسقط على الصبهة الخلية يحرقها اطار اسمر اللون . الحبل التهديد . كوابه ضمية التجميع . كنانته سطوية الشكل تقطع من براوح من ٢ الى ٨٠ م . وتعرض من ٢ الى ٦ م . انقسامها الخلية تقطع من ١٤ الى ١٨ م . وتعرض من ٣ الى ٤ م . اغزاره منطوية بمدى انتشاره لانه يسبب بياض الاوراق وتثخن الكليسة او اخذاجها وعدم تكونها . يكلف يستأهل سائل يورده المركز ٢ ٪ . يضاف اليه ١ ٪ من الدبس و ٥ ٪ من الفشا .

٢٩١٥٣ - نَفِثِي

Nephila (S).

Néphile (F). Nephila (E).

جنس ريلات من العناكب الكبيرة القد . انواعها المعروفة نحو ٦٥ منتشرة في معظم المناطق الحارة من المالحين القديم والجديد || ذكورها اصفر قدماً من اناتها . انواعها متراكبة الا لوان يطلب فيها الاصفر والاحمر والاسود . جرازها سم الاطراف || يربونها في بعض البلاد الاميرية والامريكية لاستخراج نواصها الحريري الاصفر اللون || اشهر انواعها الصالفة للترية :

N. chrysogaster (S).

نَفِثَة ذهبية اللون

N. clavipes (S).

نَفِثَة لوزيانه

N. madagascariensis (S).

نَفِثَة مدغسقر


٢٩١٥٥ - نَفِثُوس كَرْدُونِيَّي \* و فِيدَالِيَّة

كَرْدُونِيَّيَّة \*

Novius (Macronovius) cardinalis, Vedula cardinalis (S).

Novius cardinal (F). Vedula cardinalis (E).

حشرة عاتلة من فصيلة الدفصيات ورتبة مبدعات الاجنحة تألف بساتين الحشويات والمياقل والحدائق . خنافسها ويرثها تيش على الاثار الذي يفتك بالحشويات والورد والليمونزا ... || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م . ثوبها احمر يطول تقيج اسود . رأسها صغير الجرم . اسود . عينها صغيرتان . زباناها صقيان . صغيران . فكهاا نضيجان . ظهرها شديد الاحدياب . مستدير المؤخر اللاحت . غداها كلفتها الحبل . ارساغها رباعية العقول || احيائها الحولية سة . تخرج الحشرة الجملة من بيئاتها الشتوي في اوائل الربيع . تسرح في التار . جبلها يستمر من ٣٥ الى ٤٥ يوماً باستثناء الجيل السادس . اي الشتوي . الذي يستمر نحو ٦٥ يوماً || تتألف بد ظهورها بابسوح



نَفِثَةُ الْمَوْزِ (١)



نَفِثَة



نَفِثُوس كَرْدُونِيَّي



نَقَّاب



نَقَّاذ مَبْدُول



نقار احمر الرأس

٢٩١١٩ - **نقار كبير** \* ، **نقار كبيرة**  
*Picus major* (S). *Pic épéche* (F). Great spotted woodpecker (E).

نوع من النقار موطنه صوب الإرياء يمتد من أوطاس الشرق إلى الطرف اوروبية الغربية. || جسمه يطول نحو ٢٤ سم. ثوبه متباين الألوان الزاهية. ظهره وأعلى جسمه إلى السواد اللامع. عنقه وخصره وجناحه مبقعة بالابيض. رأسه أسود. قنقه ومخبره يلمع إلى الحمرة. صدره وبطنه إلى البياض الأغبر. حذقة عينه جزئية اللون. منقده وربطه إلى الكهبة الرصاصية. انشاء سرع القنق. يألف احرار الصنوبريات ولا يقرب من الحدائق والجائن إلا عند سبب الحاجة إلى الطعام.



نقار اسود

٢٩١٢٠ - **نقاريات**  
*Picidae* (S). *Picidae* (F). *Picidae* (E).

فصيلة طير من رتبة المقلقات اجناسها وأنواعها عديدة تبمسها ثلاث عمارات. أشهر طيورها النقار والواو.



نقار صغير

٢٩١٢١ - **نقار** \*  
*Penelope* (S). *Pénéllope* (F).

جنس طير من فصيلة الترناسيات. انواعها قليلة، جميعها مستطيلة الشكل الرشيق. قوة المنقار الاجنح. رؤسها قزمية الريش المستطيل اللتان، عمارها ملط. اجنحتها مستديرة، اذياها طويلة. ألوانها إلى السمر الداكنة يعلوها وتوشم وتوشح || تألف احرار. تميش أسراب كبيرة قوتها الثار والحبوب والخشرات. || تدش اعشاشها في الاشجار. اناتها يبيض نحو ٤ بيضات تحضنها بعدها اربعة اسابيع.



نقار كبير

٢٩١٢٢ - **نقاص** \*  
*Drosophylla* (S). *Drosophylla* (F).

نبات معمر مقترن وسيد الجنس والوع من فصيلة النيمانيات. ساقه مقرية. اوراقه عصفية مستطيلة متصبغة تحفة النصل للندوز بالزغب اللاباق الشكل الذي يشمر كل حشرة تقرب منه ليقضي عليها ويضمصها. ازهاره صفراء اللون. حلقية التجميع. حلبة الاكراكز، تقوم على شراخ مودق قومي الانتساب.

٢٩١٢٣ - **نقاص** \* ، **سحاحة** (E). *Burretta* (F). *Curet* (E).

٢٩١٢٤ - **نقار**  
*Bombina*, *Bombinator* (S). *Bombinator*, *Sonneur* (F). *Bombinator* (E).

جنس صفادح من فصيلة الصفاحيات. انواعها المروعة قليلة العدد، مهدا البلاد المحلة الحرارة من العالم للقدم || اجسامها صغيرة القد. ألوانها تراوح من السمر الغامق إلى ٧ سم. جلودها مثاقلة تقرز عند القس رفة يضاء تير العناس والتدعيم. ألوانها السلوة إلى السمر تملوها سرجنة قائمة. ألوانها السلفية تراوح من الصفرة الباهتة إلى الحمرة تملوها رقة طحلاء زرقاء الموالج || تعيش في المناقع ويجاري الماء تتركها في الليل وتعيد إليها عند الفجر || اجرية دملها وشية الشكل تحوي من ٢٠ إلى ٤٠ دملة مغطاة تنقف بعد القشرة بنحو ثلاثة اسابيع || أشهر انواعها النفاق الاصفر البطن والنفاق القناري البطن.



نقار



نقاص

٢٩١٢٥ - **نقاق أصغر البطن**  
*Bombina salsa* (S). *Bombinator* à ventre jaune, *Sonneur* à ventre jaune (F). *Bombinator* (E).

نوع من الصفادح السقاة ينتمي إلى فصيلة الصفاحيات. موطنه يمتد من الشرق الأدنى إلى الطرف اوروبية. يألف

الاحراج والغابات انحصا احرار الصنوبر والتنوب ولا يقرب من الحدائق والجائن الا في فصل الشتاء وعند الحاجة القاهرة إلى القوت.

٢٩١٢٦ - **نقار** ، **نقار** ، **نقار**  
*Picus* (S). *Pic* (F). *Woodpecker* (E).

جنس طير من فصيلة النقاريات. انواعها عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء استراليا. جميعها متسلقة تركب جذوع الاشجار فتقرعها وتقرق قشورها وتقبب شكيرها لاستخراج ما فيها من اساريع وديدان. اجسامها متوسطة القد، ألوانها ملونة. منقارها قوية، مستطيلة، محددة. اجنحتها متفرجة الاطراف. اذناها متوسطة الطول. ارباغها قصيرة. جزئية التسرول. قوتها الخشرات ورقاتها واساربيها وديدانها من النسل إلى المناكب والجنادب ولا تمت من الثار والجلوز والصنوبر عند الحاجة. || تدش في تجاويف الاشجار اناتها تقع من ٤ إلى ٥ بيضات تحضنها بعدها من ١٤ إلى ١٧ يوما. تختبر من الطيور النافذة التي تستحق الحماية. || أشهر انواعها واعرضها ما يتبع.

٢٩١٢٤ - **نقار أحمر الرأس** \*  
*Picus medius* (S). *Pic mar*, *Pic à tête rouge* (F). *Mittlerer Buntspecht* (D).

نوع من النقار. موطنه الشرق الاوسط واروبه. جسمه يطول نحو ١٨ سم. ثوبه ثوب النقار الكبير الا انه احر الرأس. || يألف احرار الصنوبريات دون سواها. انشاء تحضن بمناوبة الذكر من ٥ إلى ٧ بيضات.

٢٩١٢٥ - **نقار أخضر**  
*Pivert* (F). هو النسبة الخضراء، اطلابه.

٢٩١٢٦ - **نقار أسود** \* ، **نقار سوداء** ، **نقار**  
*Dryocopus martius* (S). *Dryocope noir*, *Dryopie noir*, *Pic noir* (F). *Black woodpecker* (E). *Schwarzspecht* (D).

طائر من النقاريات. موطنه جبال الشرق واروبه. جسمه يطول نحو ٤٧ سم. وبطنه ٧٧ سم. ثوبه إلى السواد السوي القائم الداكن يستثنى منه قة الرأس القرمزية. جناحه متوسط القد، ذئق الطرف. حذقة عينه صفراء اللون. يألف الغابات والاحراج. قوته الخشرات والذناير والثار العنية ويغض الحبوب والصنوبر. || الاثني تحضن بمناوبة الذكر من ٣ إلى ٤ بيضات نحو ١٥ يوما.

٢٩١٢٧ - **نقار الشوك** هو الحسون، اطلابه.

٢٩١٢٨ - **نقار صغير** \* ، **نقار كبيرة**  
*Picus minor* (S). *Pic épéchette* (F). *Lesser spotted woodpecker* (E).

نوع من النقار. موطنه يشمل الشرق الاوسط واروبه باستثناء المناطق النائية. || جسمه يطول نحو ١٥ سم. ثوبه إلى السواد الغائب اللامع يعلوه تجميع ابيض مقترن ومستطيل. جبهة وخصره إلى البياض الأغبر. قة رأسه قزمية اللون، يتوسط صدره سيالة سوداء تمتد من قاعدة المنقار إلى اوسط الجرش. حذقة عينه حمراء اللون. منقاره وربطه إلى السمر الرصاصية. انشاء لا حرة في رأسها. يألف احرار على اختلاف انواع اعجازها اما يغفل احرار الصنوبر والزان. || قوته الخشرات واساربيها ورقاتها ويكبها. انشاء تقع من ٥ إلى ٧ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر ١٤ يوما.

ه. يبيضات لونها إلى البياض الناصع تملوه رقشة جزئية .  
أعرف أنواعه وأشهرها ما يبيع :

نقشارة الحدائق Phyl. trochilus (S). Pouillot flets (F).  
نقشارة الشمال Phyl. borealis (S). Pouillot boréal (F).  
نقشارة زرقالة Phyl. sibilatrix (S). Pouillot affleur (F).  
نقشارة صنايية Phyl. rufa, Phyl. collybita (S).  
Pouillot vélocé (F).

٢٩١٨٥ - **نَقْص**  
Déficiency (F).  
Deficiency (E).  
على بعض العناصر الغذائية أو صغر في عيها الأدنى يؤدي إلى خلل ملموس .

٢٩١٨٦ - **نَقْصُ الْقِيَمَةِ**  
Moins-value (F).  
Decrease in value (E).  
نقص القيمة أو النقص هو انخفاض قيمة الشيء بين زمني .

٢٩١٨٧ - **نَقْطَةٌ**  
Point

٢٩١٨٨ - **نَقْطَةُ الإِرْتِكَاز**  
Point d'appui (F).  
Support-Point (E).

٢٩١٨٩ - **نَقْطَةُ الإِسْتَصْرَاد** ، **نَقْطَةُ الْجَلِيد**  
Point de congélation (F). Congélation-Point (E).

٢٩١٩٠ - **نَقْطَةُ الإِنْتِهَاب**  
Point de fusion (F).  
Fusion-Point (E).

٢٩١٩١ - **نَقْطَةُ الإِنْتِطَاق**  
Point de départ (F).  
Starting-Point (E).

٢٩١٩٢ - **نَقْطَةُ الإِنْتِيَاب**  
Point d'inflexion (F).  
Inflexion-Point (E).

٢٩١٩٣ - **نَقْطَةُ الْبُخَار**  
Point d'ébullition (F).  
Boiling-Point (E).

٢٩١٩٤ - **نَقْطَةُ الْبُرُوز**  
Point d'émergence (F).  
Emergence-Point (E).

٢٩١٩٥ - **نَقْطَةُ الْجَذْم** ، **نَقْطَةُ النِّقَاط**  
Point de section (F). Section-Point (E).

٢٩١٩٦ - **نَقْطُور** \*  
Necturus (S). Necture (F).

جنس حيوانات قازية من السرفقيات وفصيلة القطرسيات .  
أنواعه المعروفة قليلة البدن موطنها أمريكا الشمالية . تألف  
المنافع وضغاف بجاري الماء || أجسامها شبه أسطوانية  
الشكل ، تطول من ٣٠ إلى ٤٠ سم . رؤوسها شبه  
مخروطية الشكل . عيونها شفيدة الصفر . قوائمها قصيرة ،  
رباعية الأصابع || أنفها إلى السرة المرقشة بالأسود ||  
قوتها الديدان والدويبات الصغيرة .

٢٩١٩٧ - **نَقْطُول** \*  
Noctule (F).

نوع من الخفافيش المفيدة يضيء غُشَّافُ السَّق ، أطلبه .

٢٩١٩٨ - **نَقْف** ، **نَقْفِيص**  
Ecllosion (F).  
Hatching (E).

هو في الطير زمن انفلاق البيض عند اكتمال الخلقة وهو  
في السمك زمن انبجاص السرة اما في الحشرات فهو زمن  
نقب المكن .

٢٩١٩٩ - **نَقْلُ الْحَقِّ**  
Transfert (F).  
Transfer, Conveyance (E).

هو أن ينقل المرء سقاً له إلى غيره . وفي القانون التجاري

المائع وتجاري الماء . مسرعه دجوي . يعيش نحو عشر  
سنوات . قوته الحشرات الصغيرة والديدان والذباب || جسمه  
صغير القد يطول نحو ٥ سم . عند الذكر ونحو ٦ سم .  
عند الانثى . رأسه صغير الحجم : عيناه جاحظتان . حنكه  
مستعرضة الشوك ، مسن الفك العلوي . قاتمها الاياميات  
قصيرات ، ورباعيتها الاصابع الطويلة ، اما الخلفيات  
فمستديرات ، خاصيتها الاصابع المفيدة بحطاب كامل .  
جلده ممتلئ القشار يقرض عنه لحمه رقوة بياض نافطة  
تثير العطاس والدسوع . ثوبه العلوي إلى السرة الخفيفة  
الصفراء المراج تملوها نمشة قائمة وبرتجة خضراء . بطه  
وسائر صفحاته السفلى إلى السرة الناعمة تملوها مشحة  
صفراء ورقشة زرقاء خفيفة || بياتها الشتوي يستمر نحو  
اربعة اشهر . يتميز بيلته الصفوية الرائحة الجزوية  
الشكل والقد . نقيقه قصير النغمة ، متتابع الارتفاع ،  
شديد الانزعاج .

٢٩١٧٦ - **نَقَّالَةٌ**  
Brouette (F). Wheelbarrow (E).  
عجلة يدوية بمجرة بدولاب واحد يستعملها الانسان لنقل  
الاياع الخفيفة .

٢٩١٧٧ - **نَقْش**  
Défonçage, Défoncement (F).  
Subsoil ploughing (E).  
كري التربة الزراعية لقلبها وتفتيت مدرها وتنظيفها  
واعاداعا لزراعة القابلة .

٢٩١٧٨ - **نَقْش**  
Silice pure (F). Pure flint (E).  
الخالص من الريل .

٢٩١٧٩ - **نَقْدًا** ، **عَدًا**  
Comptant (F).  
Spot cash, Ready (E).  
طريقة دفع ثمن مبيع عند تسلمه او اجرة عمل عند تهايته .

٢٩١٨٠ - **نَقْدَةٌ** هي النصفه ، اطلها .

٢٩١٨١ - **نَقْدَةٌ**  
هي الكروياً (الانصري) والكزبرة (ابن الاعرابي) .

٢٩١٨٢ - **نَقْرَةٌ مَرَّةً**  
Taches amères (F).  
Bitter pit or stippen (E).

عارض يصيب ثمار التفاح المغزونة في البراد ، اسبابه المعروفة  
حتى الآن تعود إلى الشرط في التغذية والرّي وإلى مناخ بعض  
المناطق || مظهره الخارجي بقع مستديرة منتفضة السطح  
قطرها من ٣ إلى ٦ مم . وهيها الداخلي يغور من ٢ إلى  
١٠ مم . فيسبب تدمير لون الجلب المطوب ويكسبه مرارة  
المذاق .

٢٩١٨٣ - **نَقْرُوس**  
Simulie (F).  
هو النجوس والقرس ، اطلها .

٢٩١٨٤ - **نَقْشَارَةٌ**  
Phyllopeuste, Phylloscopus (S). Pouillot (F). Wil-  
low warbler (E).

جنس طير من فصيلة الدسليات . انواعه المعروفة عديدة ،  
اعطاهن ائام القديم ، منها الارباب والقرواع التي تجوب الثرق  
والثرب . وهيها صغيرة القد ، متراكبة الالوان بكث  
فيها الاصفر والاشقر . قوتها الحشرات والحوام . تألف  
الحادق والجئاتن القريين من السران . تدن في الشجيرات  
والاشجار المنقوعة . اعشاشها مخروطية الشكل جانبية المدخل .  
تحضن من مرتين إلى ثلاث مرات في العام . حستبتها نحو



نقشارة

أرجح من ٨ إلى ١٢ م. ثوبها رصاصي اللون لامع اللوح.  
يكثر وجودها في الصيف. تمتص مكباتها على دود القطن  
فينتفخ عن رقات ذرية دقيقة تكمل وتنتقل في جسم  
المائل وتبعته.



نقوس

٢٩٢١٠ - **تغيير فني** \*  
*Gonia capitata* (S).  
ذبابة نافعة من التغيرات طويلة أرجح من ١١ إلى ١٣  
م. رأسها فني اللون، جسمها رصاصي اللون، تملأه خلة  
فنية وعطوط صحر. تمتص مكباتها على البودة المتأخرة فينتفخ  
عن رقات نمة تنتقل في جسم المائل وتبعته.



نقر أصفر الجناح



نقر أظلم

٢٩٢١١ - **تغيير هبّوّل** \*  
*Phryxe vulgaris* (S).  
*Phryxe vulgaire* (F).  
حشرة ذبابة من ذوات الجناحين وفصيلة التغيرات.  
جسمها يطول من ٦ إلى ٩ م. قشورها متكاثف الحمل  
والهلب. ثوبها إلى الطحلة الموشجة بالأصفر، رأسها كبير  
أظلم اللون، خطمها مستد الطول، زباناها صخريان،  
تحويلان. عينهاا ناضرتان، أرجوانيتان، ورشاهها كيرتان،  
أصفر القاعدة، قوائمها إلى السرة السوداء تظهر  
الحشرة الجملانة من نيسان إلى تشرين الثاني. وهي ملبولة  
في كل مكان تكثر فيه الأزهار || يرقاتها تتطفل على  
أساريع الحشرات من مختلف الفصائل.



نقر رصاصي



نقر فني

٢٩٢١٢ - **تغيير مدّملك** \*  
*Gymnosoma rotundatum* (S). *Gymnosoma arrondi* (F).  
حشرة ذبابة من ذوات الجناحين وفصيلة التغيرات.  
جسمها صغير القد، متكاثف الحمل، يطول من ٥ إلى  
٧ م. رأسها كبير الجرم، أصفر اللون، خطمها  
أصفر اللون، زباناها دقيقان، صخريان، عينها  
كيرتان، أرجوانيتان، صدرها إلى الصفار المذهب.  
بطنها شبه مكور الشكل، أصفر اللون، صناعي اللوح  
تملأه، في قمه، ثلاث نقط سود. ورشاهها موشجان  
بالأصفر، قوائمها إلى السرة السوداء || تظهر الحشرة  
الجملانة من أيار إلى آب. سرسوها البراري حيث تكثر  
النباتات الصيوانية الأزهار || يرقاتها تتطفل على نصفيات  
الاجنحة.



نقر ملرل

٢٩٢١٣ - **تغيير ريات** \*  
*Tachinidae* (S). *Tachinidae* (F).  
فصيلة حشرات ذبابة نافعة من ربة ذوات الجناحين.  
اجناسها وأنواعها كثيرة المند مختلفة الألوان والأحجام.  
تحمّل على بطونها مستوى سطحها الطرية بعض الهلب  
الناثك القاسي، قوتها مدّر الأضرار وأضرارها || يرقاتها  
طفيلية تركب أكثر الحشرات انحصا مستنبات الجناح  
ونصفيات الاجنحة والنشائيات والحشويات والمندسات.  
وهي لا تفرق بين الحشرة والأسروع والمخادعة.



نقر مدملك

٢٩٢١٤ - **تغييرات** \*  
*Bothriocephalus* (F).  
فصيلة دود من المنطقيات الرغبات تتميز بجلقاتها المسرقة  
المعادة الحبيرات التناسلية.

٢٩٢١٥ - **تغييرية** \*، **تغييرية رشماء** \*  
*Bothriocephalus* (S). *Bothrioccephale* (F).  
*Bothriocephalus* (E).  
جسد ديدان قدية مستطيلة من نصية التغيرات. الأنواعها  
معددة جميعها مؤذية تتطفل على الحيوانات الفقارية.

هو نقل ملكية السند الاسمي من اسم البائع إلى اسم  
المشتري.

٢٩٢٠٠ - **نقل الملكية** \*  
*Mutation* (F). *Transfer* (E).  
هو كل عمل قانوني ينتقل من شخص إلى آخر ديناً أو حقاً  
صينياً.

٢٩٢٠١ - **نقّص** \*  
*Point de pivot*  
النقّص هو وسط الشيء أو النقطة المحورية التي ترتكز عليها  
قياسات المدار.

٢٩٢٠٢ - **نقّصوس** \*  
*Copernicia* (S).  
*Copernicia* (F). *Wax palm* (E). *Carnaubapalma* (D).  
*Copernicia* (I).  
شجرة من فصيلة النخلات، أعطائها الإقليم الحارة الرطبة.  
يصلحها مالمس اللحاء يملأ نحو ٨ أمتار. أوراقها مامية  
الأزهار موشجة الشكل مستطيلة الزنار المدام الشوك.  
تصلحها جامد الصفحة، مالمس البشرة، جميل الخصار  
الزراعي. نسيجه مرغوب فيه يستعمل في صناعة القمصان  
ثمارة زيتية المادة يستخرج منها دهن النقّصوس الناتج  
الاستعمال.

٢٩٢٠٣ - **نقّوي، عَصْدِي** \*  
*Huméral* (F).  
*Humeral* (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالنقا.

٢٩٢٠٤ - **نقّبيّة** \*  
*Lacunelle* (F). *Lacuna* (E).  
٢٩٢٠٥ - **نقّير** \*  
هو الانقود، أظلمه.

٢٩٢٠٦ - **نقّير** \*  
*Auge* (F). *Trough* (E).  
جرن مستطيل يستعمل لإطعام الماشية أو لاسقاطها.

٢٩٢٠٧ - **نقّير أصفّق الجناح** \*  
*Phsia crassipennis* (S). *Phsie crassipenne* (F).  
حشرة ذبابة من ذوات الجناحين وفصيلة التغيرات.  
جسمها متوسط القد، متكاثف الحمل وأظلم القصير،  
يطول من ٨ إلى ١١ م. رأسها كبير، أظلم، أصفر  
اللون، خطمها مستد الطول، زباناها تحويلان، صخريان،  
عينهاا كيرتان، أرجوانيتان. صدرها قصي الشكل،  
أصفر اللون، يتفسي الحمار والقاعدة والتدليع. بطنها  
بنيوي الشكل. أصفر اللون و تملأه بقعة بنفسية.  
ورشاهها كيرتان، متساكان، أبيضان، أصفر الحمار  
الاسمي. قوائمها إلى الخنطي الصناعي. أرباعها سود ||  
تظهر الحشرة الجملانة من حزيران إلى أيلول. سرسوها  
البراري وكل مكان تكثر فيه الأزهار || يرقاتها تتطفل  
على مستنقات الجناح ولا تمف عنه الحاجة عن نصفيات  
الاجنحة.

٢٩٢٠٨ - **نقّير أظلم** \*  
*Mimtho lais* (S).  
ذبابة نافعة من التغيرات. طولها نحو ١٠ م. رأسها  
وصدرها إلى الزرقعة الالامّة، بطنها أظلم اللون يملأه حلب.  
كتيف اسمر || يرقاتها تمثيل على مكن غدييات الاجنحة.  
ج. أنقرة.

٢٩٢٠٩ - **نقّير رصاصي** \*  
*Eutachinus larvarum* (S).  
ويدعى تاكينتا كبيرة. ذبابة نافعة من التغيرات. طولها



انها تبيض من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور من ١٧ الى ١٨ يوماً || اعرف انواعه واشهرها النكات الاسود الذليل .

### ٢٩٢٢٥ - نَكَاتُ اسُودَ الدَّيْلِ \*

*Recurvirostra avocetta* (S). *Récurvirostre avocette*, *Avocetta* (F). *Avocet* (E).

طائر من النكات طوله براوح من ٤٧ الى ٥٠ سم. قو به الى الباهس الناصع باستثناء منقاره ورأسه وظهوره وذنبه وكل جناحيه وأبهرهما السود || يحوب العالم القديم في طلب المصيف والمشق . يرتاد الشطوط والأغوار والمناقع ويجاري الماء || يعيش أسراباً كبيرة براوح عددها من ٥٠ الى ٥٠٠ .

### ٢٩٢٢٦ - نَكَاتِيَّاتُ

*Récurvirostridae* (F). *Recurvirostridae* (E).

عارة طير من فصيلة دجاجيات الارض وسيدة الجنس قليلة الانواع تتميز ببساطة ودقة منقبيدها المديبة للمناطق المنعقدة الى البلاد . اجنبها مستطيلة ذلقة تلمت الشب ارساغها رفيعة ، مستنقة ، سرديبة البشرة . اصابعها كفيّة ، سحابها كامل موصل .

### ٢٩٢٢٧ - نَكَاسُ

النكاس والأنكاس نوع من السلك عظم جداً (التاج) .

### ٢٩٢٢٨ - نَكَافُ

*Parotidite* (F). *Parotitis* (E). النكاف ويدعى التهاب الكففة هو التهاب الغدة الكففية .

### ٢٩٢٢٩ - نَكْبَاءُ

هي الريح التي تلوذ دون ان يتعين لها مهب .

### ٢٩٢٣٠ - نَكْبِيبُ جَبَّارُ \*

*Nyctibius grandis* (S). *Ibijau géant* (F).

طائر رأس من فصيلة السبديات . موطنه بعض مناطق أمريكا الجنوبية . يألف الاجراع الكثيفة البعيدة عن كل عران . يسرح في الليل ويبعث طول النهار جاثماً على غصن شجرة لا يتحرك البتة || جسمه كبير القند يطول نحو ٥٥ سم. بسطه نحو ١٣٠ سم. ريشه شديد النعومة متوسط اللون . قو به الى الطحلة الصفراء المزاج يعلوها تجنّيع اسمر وتشيز اشقق ورقيقة ريداء . رأسه مستعرض الجرم . عيناه كبيرتان كسنتان . رموش عينية طويلة . سباله كثيف مستطيل . منقاده قليل الاستعداد الخارجي . عجنن البهرة ، عريض القاعدة ، عظيم الشدق . عتفه بالغ القصر . جناحه رجب مستطيل . ذنبه مستدير الطرف . رسفاً قصيران . اصابعه مستطيلة قوية || طيرانه خفيف الحركة ، سريعها . سمي على الارض اخرق . قوته الحشرات في جميع الفصائل والترتب ومن جميع الاحجام || يلدن عشه في تجاريف الاشجار . الانثى تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ثلاثة اسابيع .

### ٢٩٢٣١ - نَكْبِيلُ \*

*Noctilio* (S). *Noctillon* (F). جنس غفاقيش من عارة الارمات يتبين ببساطة رأسه وفريظته ، بانشرام شفته العليا المنعقدة يطول جناحه . له نوعان موطنها جزر الانتيل || يعيش جماعات قليلة العدد . يسرح من النسق الى القصر . قوته الحشرات على اختلافها والاسماك الصغيرة . يألف المألوف وأقارب الفصوف البحرية .

تميش حياتها البدائية في الماء حيث تستقل على بعض الاسماك وتنتقل معها الى مدة الانسان || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

### ٢٩٢١٦ - نُقْرِيرَةُ عَرَبِيَّةٌ

*Bothriocephalus latus* (S).

اكبر انواع الديدان النقرية القديرة التي تستقل على الانسان طولها نحو ١٠ امتار . رأسها ثنائي الرافض ، عادم الكلايب ، مغزولي الشكل ، مقطوم للمقدم ، جسمها عديد السكم المستعرضة الضيقة . يعتقد ان مفرجحاتها المهدية التي تميش في الماء وتستقل على بعض الاسماك منها السلمون والثرثرة ، تستقل بذات الاسلوب على بعض الناس الذي يتسبحون في بعض المياه المديبة .

### ٢٩٢١٧ - نُقْرِيشَةُ \* ، قُبْعَةُ الْأَمِيرَاطُورِ

*Spirifer* (S). *Spirifera*, *Chapeau de l'Empereur* (F). *Spirifer* (E).

جنس حيوانات من الرخويات عصفيات الازبل وفصيلة النقيديات . انواعها المعروفة عديدة مظهرها من متحجرات الطبقة القديرة . انواعها الماصرة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || اصداها صغيرة القند ، حوزنها قريب الشبه بالقيمة التي كان يرتديها الامبراطور نابوليون . جميعها نظائرية التركيب ، متساوية المصارع الا ان اليسارية منها أقل احداً من اليمينية || تعيش لاصقة بالصخور المنقورة .

### ٢٩٢١٨ - نُقْرِيشُ \*

*Imperfecti* تمت قريتي توصف به الفطور الناقصة التركيب او الشاذة الخروسة من بعض مراحل التطور .

### ٢٩٢١٩ - نُقْرِيشِيَّاتُ ، نُقْرِيشَاتُ

*Infusorios* (F). *Infusoria* (E). صف حيوانات دنيا من الاوالي تشمل السوطيات والمديديات وعدة رتب وفصائل .

### ٢٩٢٢٠ - نُقْرِيشَةُ \*

*Néonate* (F). *Neonata* (E). تمت تعريفها يطلق على الحفرة المستعدة التقف .

### ٢٩٢٢١ - نُقْرِيشُ

*Coassement* (F). صوت الضفدع . نق الضفدع : صات .

*Croaking* (E). *Ligne médiane de la route* (F). *نقِمُ* خط وسط الطريق .

### ٢٩٢٢٢ - نُقِمُ

*Paraphyse* (F). *نَكَاتُ* الخلية المستطيلة في نكة الفطور الزقية والدعامية .

### ٢٩٢٢٣ - نَكَاتُ \*

*Recurvirostra* (S). *Récurvirostre* (F).

جنس طير من النكاتيات . انواعه اربعة جميعها كبيرة القند طولها براوح من ٤٠ الى ٥٠ سم . منقبيدها مستطيلة ، منعقدة الى العاد ، شبه السيف . ألوانها بقاء اللون يكثر فيها الابيض || تجوب السبلاد الاسيوية والاروية والافريقية . ترتاد غصاف الانهار وشطوط البحار والمناقع والاغوار . قوتها القشرييات والرخويات والديدان والدعاميس والحشرات . تنكت الحسا والخضر والزراعي في طلبها || تدن اشائها في التراب ، اناحيها مستطيلة الشكل قليلة السمق .



نقرية



نقشة



نكات اسود الذليل



نكيب جبار

٢٩٢٣٢ - نَكْدَة قلة عشب المرعى أو البرية .

٢٩٢٣٣ - نَكْرُوبَة \* Necrobia (S),  
Nécrobie (F), Necrobia (E).

جنس حشرات خنفسية من فصيلة الزرعيات. ورتبة  
مخديات الاجنحة. انواعها المعروفة قليلة العدد || اجسامها  
صغيرة اللد. اطرافها تراوح من ٤ الى ٧ م. اوتابها وصيدة  
البن او ثنائيته. الوحيدة اللون زرقاء. اما الثانية فزرقاء  
وجراء || مسرعا دجوي. تعيش على المواد العضوية  
والجلود الجافة والفراء .

٢٩٢٣٤ - نَكْرُور الشَّطِّ

حشرة تدعى ذقة الشواطئ \* اطلها .

٢٩٢٣٥ - نَكَشْ ، نِكاش

Plochage (F).  
Digging (E).  
اصلاح التربة بزرعها واقتلاع الفحل منها او اصلاح التربة  
للمرعى وتفتيت مدمرها وتنظيفها من الاعشاب .

٢٩٢٣٦ - نَكَمَة

Hyménium, Chapeau (F).  
Hymenium, Pileus (E).  
هي غلفة الفطر اي قمته التي تحوي جهاز الاخصاب  
والتكثير .

٢٩٢٣٧ - نَكَمِي

Hyménial (F).  
نمت ترميني يطلق على كل ما له صلة خاصة بالنكمة .

٢٩٢٣٨ - نَكْفَة

Parotide (F), Parotid gland (E).  
هي البدة الكفية اي بنت الاذن .

٢٩٢٣٩ - نَكْلُون

Nucléon (F), Nucleon (E).  
التكلون حاتمة تؤلف نواة اللدوية (يوجد نكلونات ايجابية  
تدعى بروتون ونكلونات سلبية تدعى نوترون) .

٢٩٢٤٠ - نَكْلُونِي

Nucléonique (F).  
Nucleonic (E).  
نمت تعريفي يطلق على ما هو خاص بالتكلون .

٢٩٢٤١ - نَكْمِي

Nécomien (F).  
ساف حشليبي يعتبر قاعدة سانات الطبقة الطباشيرية السفلى .

٢٩٢٤٢ - نَكِيب

التكيب : دائرة الحافر والخلف .

٢٩٢٤٣ - نَكْ

Aubépine azérolier (F).  
هو الزعرور البادي ، اطلها . الواحدة نكفة .

٢٩٢٤٤ - نَلْمِبُو

Nelumbo (S).  
Nélumbo (F), Nelumbo (E).  
جنس نباتات عشبية جذمورية مائية من فصيلة النيلوفرديات.  
الأنواع المعروفة قليلة العدد اطلها مياه البلاد الحارة.  
جذاميرها مفادة. اوراقها مستطيلة الاغناق مستديرة التصل.  
ازهارها كبيرة اللد. ثمارها كروية الشكل مغموسة في طست  
مستعرض الاطار . بزورها نشوية للمادة المأكولة || اشهر  
انواعها ما يتبع .

٢٩٢٤٥ - نَلْمِبُو أَصْفَر \* ، نَلْمِبُو أَصْفَر

Nelumbo lutea (S), Nélumbo jaune (F), Yellow  
nelumbo (E).  
نوع من النلبو السبروتي . مهد البلاد الامريكية .

اوراته كبيرة فارشة قطر فصلها يراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم.  
ازهارها صفراء اللون قطرها يراوح من ١٠ الى ٢٥ سم.  
مخاليقها تطول من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. || جذاميره  
نشوية للمادة ، سكرية الطعم ، مأكولة . تنوره يستمر  
من تموز الى آب .

٢٩٢٤٦ - نَلْمِبُو الشَّرْقِي \* ، نَلْمِبُو الشَّرْقِي  
بَقْلِي قَبْطِي \* ، جَمَاسَة

Nelumbo nucifera, Nelumbium speciosum (S), Né-  
lombo d'Orient, Fève d'Egypte, Lis rose des Egyptes,  
Rose du Nil (F), Nelumbo, Egyptian bean (E).  
Nelumbo, Nussmummel (D), Nelumbo (I).

نوع من النلبو السبروتي الميزل . مهد مياه الهند وافريقية  
الشرقية . يكثر في مياه النيل. اوراقه كبيرة اللد مستديرة  
التصل قطرها يراوح من ٣٠ الى ١٠٠ سم. اعتاقها  
شائكة . ازهاره وردية اللون او عاجية ، مستحبة العرف  
الفرع . كبيرة اللد ، قطرها يراوح من ٢٠ الى ٣٥ سم.  
مخاليقها تطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. || ثماره نشوية  
للمادة ، مأكولة . تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٢٤٧ - نَمَاشَة  
Philoptère (F).  
هو القردوس جنس حشرات جلدية ذرية اللد من التمنيات.  
انواع عديدة منها \* البط والجوام والحمام والزنج والتسود .

٢٩٢٤٨ - نَمَاشَة  
Trichodectes (F).  
هي النمة ، من الحشرات الجلدية التي ترتب الحيوانات  
الناجسة .

٢٩٢٤٩ - نَمَاسَة  
Platystoma (S).  
Platystome (F), Platystoma (E).

جنس حشرات من فصيلة الناميات ورتبة ذوات الاجنحين .  
انواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض اقطار العالم  
اغصها البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول  
من ٥ الى ٨ م. رؤوسها مستديرة . عيونها كبيرة ،  
فاقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية  
الفصل ، تنتهي بنسيلة دقيقة . اغصانها معتدلة الطول .  
ملاسها صغيرة . كواسلها شبه يضيئة الشكل . بطونها  
يريمية تنتهي بمزرات ذرية . رواشها مبقجة . قوائمها  
نشطية بطولها في اخذاها حلب دقيق || جميعها واسعة  
تألف الحراج والغابات وكل مكان تكثر فيه الازهار .  
يرقاتها خاضعة او دامتة .

٢٩٢٥٠ - نَمَاسِيَّات \*  
Platystomidae (S).  
Platystomidae (F), Platystomidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الاجنحين . اجناسها وانواعها  
المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع العالم ||  
اجسامها متفارقة اللد ، تطول من ٤ الى ١٢ م. رؤوسها  
مستديرة . عيونها كبيرة ، فاقة عند الشقين . قرونها  
الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل . كواسلها شبه  
يضيئة للشكل . بطونها يريمية . رواشها مبقجة . قوائمها  
قياسية || الحشرة الجملانة واسعة اما البرقة خاضعة وبمضا  
دامن وبها التي تمسح على الجبل وفي دقوس الزنايق ||  
اشهر اجناسها النامشة .

٢٩٢٥١ - نَمَاشَة  
Odontoglossum (S).  
Odontoglosse (F), Odontoglossum (E).

جنس نباتات امية برية وتربيتية من فصيلة السحليات .  
انواعها المعروفة تقارب السنتين جميعها من نبات جبال



نكروب



نلبو اصفر



نلبو الشرق



نماشة كبيرة الزهر



نمت النعم



نمة البقر



نمة الخيل



نمة الضأن



نمة النمر



نمة الكلب



نمة الكلب

أمركة الاستوائية . بعضها جميل الزهور كبيرها شائع  
الزراعة التريبتية المركبة في المصاري والمنازل || أوراقها  
قرصية الانتشاب ، مستطيلة ، قليلة المدد . أزهارها  
عقدية الجميع ، تتركز على شرايين ليفية مصعنة ||  
أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي :

### ٢٩٢٥٢ - نماشة كبيرة الزهر \*

*Odontoglossum grande* (S).

*Odontoglossum à grandes fleurs* (F).

نوع من النفاة . أوراقها سنانية النصل ، مستطيلة ،  
قليلة المدد ، تطلو من ١٥ إلى ٢٥ سم . شرايعها يحمل  
من ٤ إلى ٩ أزهار . قطر الزهرة يراوح من ١٠ إلى  
١٨ سم . لونها إلى الصفرة البرتقالية يعلوها تنميش جزوي .  
شيفات لأزهار تبتية اللون صفر الحواج || تنويرها  
يستمر طوال فصلي الخريف والشتاء .

### ٢٩٢٥٣ - نماشة مشججة

*Odontoglossum crispum* (S).

*Odontoglossum crispé* (F).

نوع من النفاة . أوراقها صفنية الشكل تطلو نحو ٤٠ سم .  
شرايعها يحمل من ١٥ إلى ٢٥ زهرة . قطر الزهرة يراوح  
من ٨ إلى ١٢ سم . بتلاتها وفصلها متواجبة النصال لونها  
إلى البياض الماجي تلوو نفة كستنية صفراء لظافية  
التركيب . شيفات لأزهار صفراء اللون ، أهليجية  
الشكل ، مدبة الأطراف || تنويرها يستمر من أوائل  
شباط إلى أواخر نيسان .

*Fil fin* (F). *Fine thread* (E).

نميط الابر من أي مادة كان .

*Vertex*

النفاة : أعلى الرأس وتعرف بالنافوخ .

*Myrmecophile* (F).

نمت تمرين يطلق على النبات الذي يأوي النمل ويعوله .

*Thym glabre* (F).

هو الستر الأبرط ، أطلبه .

*Pigamon* (F).

هي التلب ، أطلبه .

*Anabolisme* (F). *Anabolism* (E).

علم يبحث في دور شيوخ الكائنات الحية .

*Hippocrepis* (S). *Hippocrépidé* (F).

جنس نباتات برية من فصيلة القرنيات الفرنسية . أنواعه  
المعروفة ١٢ منها الجنيات والجنيات والأعشاب . أوراقها  
مركبة مشطية مستطيلة الأعناني . أزهارها صفراء اللون ،  
سيروانية التجميع طويلة المالحق . ثمارها قرن مفلطحة  
وريفة غمره الأطراف || أشهر أنواعه وأكثرها انتشاراً  
نمت النعم .

### ٢٩٢٦١ - نمت النعم \*

*Hippocrepis cornosa* (S). *Hippocrépidé à toupet*.

*Hippocrépe à toupet*, Fer à cheval (F). *Tufted horse-shoe vetch* (E). *Schopffueisenklee* (D). *Ferro di cavallo*, *Mandorio dei boschi* (I).

نوع من النمت الطلي البري المعروف . تمتلئه النعم بشهوة

ويجود عليه درعا . عيشته مصرة فراء . أوراقه مركبة  
وريشية ورتية التجميع . وريقاته يضيئة النصل ، داكنة  
الخضار . أزهاره طرفي ، سيولاني ، دهاجي التركيب أو  
خاسيه . ثمار قرن مفلطحة ، مقبوسة ، غمره الخاض .  
أوراقه وأزهاره وبلوره طيبة ، مرة المذاق ، قابضة ، تغيد  
المعدة وتقويها ، تدمل الجراح وتغني أثرها .

*Trichodectes scalaris* (S).

*Trichodecte du bœuf*, *Petit pou du bœuf* (F).

حشرة من النيمات . تركيب الانقباض وتعيش على فوف  
وأوساخ جلودها . طولها يراوح من ١ إلى ٢ سم . لونها إلى  
الصفرة رأسها وصدرها مكساويا الغرض . تمحل في وسط  
كل سكة من سكم بطنها نقطة صفراء بيضاء . تكثر على الظفر  
والأظفار والفخذ . تنسب تمقيصاً يقود إلى الحكاك .

### ٢٩٢٦٣ - نمة الخيل \*

*Trichodectes vestitus* (S). *Trichodecte du cheval*.

*Petit pou du cheval* (F).

حشرة من النيمات تركيب الخيل وسائر الدواب . طولها  
نحو ٢ سم . ثوبها إلى الصفرة رأسها قصير مستعرض . تمحل  
في أوساط السج سكم الاول من بطنها تجذيع مترسب اسم .  
تعيش على فوف الاكشاف والمعا في فضائق الدواب وتمحلها  
على الحكاك .

### ٢٩٢٦٤ - نمة الضأن \*

*Trichodectes spharoccephalus* (S). *Trichodecte du mouton*, *Pou du mouton* (F).

حشرة من النيمات تركيب الأختام فتؤذيها . طولها نحو  
١ سم . وخمسة خطوط . لونها إلى البياض الاغمي يعلو مواع  
اسقم . تعيش على فوف الجلد وتقرض الصفوف وتقلق راحة  
النعم وترعبها .

### ٢٩٢٦٥ - نمة العنز \*

*Trichodectes climax* (S). *Trichodecte de la chèvre*, *Pou de la chèvre* (F).

حشرة من النيمات تركيب الماعز . طولها نحو ١ سم وأربعة  
خطوط . لونها إلى الصفار . الخططي يعلو تجذيع اسود .  
تعيش على فوف الجلد وتقرض الشعر فتؤذي وتنبس سكاكا  
مزعجاً يبيح الجلد وقد يدميه .

### ٢٩٢٦٦ - نمة الكلب \*

*Trichodectes latus*, *T. canis* (S). *Trichodecte du chien*, *Gros pou du chien* (F).

حشرة من النيمات تركيب الكلاب الفتية والحرة . طولها  
يراوح من ١ إلى ٢ سم . لونها إلى الصفار القاتع الباهت  
يعلو توشع اسم . تعيش على الغوف وتقرض الرب . وتنسب  
الحكاك الدامي .

*Felis pardus* (S).

*Panthère*, *Léopard* (F). *Panther*, *Leopard* (E).

حيوان مفترس من فصيلة السنوريات ورتية الغرام .  
يقال انه وحيد النوع عديد الضروب فوارق ضروره  
تقوم على قدر الجسم ولون الثوب ونقطة || جسمه منسوب  
الانطباع ، أهيف القد ، مستدير الرأس ، جميل الشكل ،  
مرقط الثوب ، مائع اللسة . يطول من ١٥٠ إلى ٢٤٥ سم .  
بما في ذلك الذنب الذي يراوح طوله من ٩٥ إلى ٩٠ سم .  
مزاجه كراج الأسد إلا انه أقر وأعيب وأصف ، لا ترويه  
سلطة احد رغم ضعف سزبه وشديد حرمة || كنيته  
أبو الابر وأبو الاسود وأبو جمدة وأبو جهل وأبو خطاف



نمر اسود



نمر الاطلس



نمر الحبشة



نمر الشرق



نمر الحد



نمر ملطخ



نمرود صومرا

٢٩٢٧٨ - **نَمْرُود** Cirro-cumulus  
هي النشاص ، نوع من النجوم العالية .

٢٩٢٧٩ - **نَمْرُود** Nemorrhæus (S).  
Némorrhéde (F). Nemorrhæus (E).

جنس حيوانات لبونة عاشية بجرة من فصيلة الإبلات . أنواعه المعروفة ستة موطنها يمتد من الهند إلى الصين وصومرا واليابان . تألفت غابات الحشاب والجبال ، ملجأها الجباني جماعي . جاعاتها إجمال قليلة العدد || أجسامها متوسطة القد . قرنها قصيرة ، غروطة الشكل ، متتامة الحد . منطفعة إلى الوراء . ضروغ أثنائها ثمانية الإصلاخ . عجل الأثنى يدم نحو ستة أشهر تنضج في تمامه يدفوا واحداً || أشهر أنواعه التالية :

٢٩٢٨٠ - **نَمْرُودُ حَمَلِيَان** Nemorrhæus bubalinus (S).  
Némorrhéde bubalin, Chamois de l'Himalaya (F).

نوع من النمرود . موطنه يمتد من كشمير إلى حلايا وشان . يسرح من ارتفاع ١٨٠٠ إلى ٣٦٠٠ م . عن سطح البحر || جسمه ردية يطول نحو ١٦٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٠٠ سم . ارتفاعه ٩٣ سم . وزنه نحو ١٠٠ كيلو . قرنه يطول نحو ٢٣ سم . عند الذكر نحو ١٧ سم . عند الأنثى . رأسه مستدل الجرم . عيانه أذناه كبيرتان . قوائمه شديدة اللطش ، ثوبه إلى الكهبة السوداء رأسه وشيخ ظهره إلى السرة السابقة . عنقه وصدره إلى الشقعة . ذقه ويطع إلى البياض الأغر || أجله يد سبعه انقار ، ذكر مانع وثلاث وثلاثه شواذن .

٢٩٢٨١ - **نَمْرُودُ صُومَرَا** Nemorrhæus sumatrensis (S).  
Némorrhéde de Sumatra (F).

نوع من النمرود . موطنه يمتد من شرق حلايا إلى بيرمانيه والسيام وصومرا . يسرح من ارتفاع ١٣٠٠ إلى ٣٠٠٠ م . عن سطح البحر || جسمه يطول نحو ١٥٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٨٠ سم . ارتفاعه ٨٥ سم . وزنه نحو ٨٥ كيلو . قرنه يطول نحو ٢٠ سم . عند الذكر ونحو ١٥ سم . عند الأنثى . رأسه مستدل الجرم . عيانه كبيرتان مكحلتان . أذناه مستطيلتان . ثوبه إلى الشقعة السوداء يبق في الرأس والظهر ويخبر في البطن || أجله يمد سبعة انقار .

٢٩٢٨٢ - **نَمْس** Rancissement (F). Rancidity (E).  
فساد في المواد اللعنية يهي إلى ملاتها ورائحتها .

٢٩٢٨٣ - **نَمْس** Herpestes (S).  
Mongoose (F). Mongoose (E).

جنس حيوانات لبونة لامة من فصيلة الزباديات . أنواعه المعروفة ٢٠ جميعها مستطيلة الجسم والذنب ، قصيرة الثورم ، حادة الأطراف . رؤوسها صغيرة مخروطية الشكل . أذناها صغيرة مستديرة . عيونها حمراء . أقرانها إلى الكدة . موطنها يشمل العالم القديم . تألف المناطق الحارة . تعيش قرب مجاري الماء في القنابر والتلال والقياس . قربها الإقاضي والجردان والمظا وكل ما استطاعت إليه سبيلا من الحيوانات والطيور . تدجن بسهولة تربى للقتل من أغار والجردان والحيات || أثنائها تنضج من جروين إلى أربعة جراء . جاعها أذناخ منخفضة ، ضيقة ، مستطيلة ، فردية الدهايز || أعرف أنواعه وأشهرها ما يلي .

وأبو الصهب وأبو رقاس وأبو سهل وأبو عمرو وأبو المرسال والأثنى نمره والجمع آثار ونمور ونغار || موطنه شبح الإرجاء يشمل معظم البلاد الآسيوية والأفريقية || يعيش منفردا إلا في زين الكوم وقد يستمر على الفة الأثنى إلى ما بعد وضعها بثلاثة أسابيع . يقال أن عجل الأثنى لا يفوق ٩٠ يوما تنضج عند تمامه ثلاثة جراء أو أربعة تبصر بعد وضعها بأربعين وتعيش برقة أمها نحو ٦ أشهر . أعرف غروبها وأشهرها ما يتبع .

٢٩٢٦٨ - **نَمِرْ أَيْبَيْس** Irbis (F).  
هو البريبس ، أطليه .

٢٩٢٦٩ - **نَمِرْ أَسْوَد** Felis pardus melas (S).  
Panthère noire (F). Black leopard (E).

ضرب من النمر ، متوسط الجثة أسود الثوب كشي القرطة الكاملة . يكثر في جنوب الهند وفي جزر الزابج .

٢٩٢٧٠ - **نَمِرْ الْإِجَاصِ** Tigre du poirier (F).  
حشرة مؤذية تدعى ببر الإجاص ، أطله .

٢٩٢٧١ - **نَمِرْ الْأَطْلَس** Felis panthera (S).  
Panthère de l'Algérie, Grande panthère (F).

ضرب من النمر ، يقال أنه أكبر النمرود شدة ، صبر القرطة ، كابل الحفنة التي تنضج مع ابتعادها عن شبح الظهر واقترابها من البطن . موطنه يشمل كامل أفريقيا الشمالية انحصا جبال الأطلس .

٢٩٢٧٢ - **نَمِرْ الْحَبَشَةِ** Felis pardus nimr (S).  
Panthère de l'Afrique (F).

ضرب من النمر ، كبير الجثة أسود القرطة أنمر الحفنة الناقصة . موطنه الحبشة والصومال .

٢٩٢٧٣ - **نَمِرْ الشَّرْق** Felis pardus orientalis (S).  
Panthère de l'Amour (F).

ضرب من النمر ، كبير الجثة مؤوي القرطة أصبانية الخمار . موطنه حوض نهر الأمور وجباله .

٢٩٢٧٤ - **نَمِرْ الصِّين** Felis pardus chinensis (S).  
Panthère de la Chine (F).

ضرب من النمر . متوسط الجثة أسود القرطة الكبيرة والمنطفعة . موطنه الصين والمنديل .

٢٩٢٧٥ - **نَمِرْ الْهِنْدُ** Felis pardus antiquorum (S).  
Panthère de l'Inde (F). Leopard (E).

ضرب من النمر ، كبير الجثة أنمر القرطة الصغيرة اللقائية الشكل . موطن الهند .

٢٩٢٧٦ - **نَمِرْ سُورِيّ** و **نَمِرْ الْفُرْس** و **بَمَلَسْكَ** ، **قَبْطَان** Felis pardus taillens (S).  
Panthère de Syrie, P. de la Perse (F).

ضرب من النمر متوسط الجثة ، أسود القرطة ، أصب الخمار ، مثلث الحلفاء المخترة . موطنه يشمل القرس وسوريا وركيا .

٢٩٢٧٧ - **نَمِرْ مَلَطُخ** Felis nebulosa (S).  
Panthère longibande, Diardi (F). Clouded leopard (E).

ضرب من النمر ، يتميز باستطالة قرطه وخطاته اللقائية الجسم . موطن جبال الهند وبرمانيا وبلغه وجزر الزابج .

### ٢٩٢٩١ - نمشة الزيتون \* *Aonideia maleti* (S). *Cochenille vermillon de l'olivier* (F).

حشرة دسبوسية من القرميزات تمرى الزيتون في أورانته قصبه إلى حله. موطنها بلاد المغرب. يكثر وجودها في مراكن الجزائر وجليها الرسي عند الاثنى مستدير الشكل، قمرى اللون، نودى السرة المركزية السقم، ظهره براون من ٢ م. إلى ٢ م. وثلاثة خطوط. وهو عند الذكر يضيء الشكل، قطبي السرة، قمرى اللون، يطول نحو ١ م. وأربعة خطوط || لها جيلان في الحول. أناتها تضع من ٤٠ إلى ٦٠ مكنة يظفر ثلاثة أسابيع. اضطرابها لاقصية لأنها منطبة بكثرة وجودها على الأوراق. وهي تركب اتصل على صفحتيه تتخصص عصارة الخلايا وتسبب بالنتيجة يباس الأوراق || تكافح باستعمال أحد الحواشير الفعالة مزوجاً بالزيت المعدني الأبيض أو بالزيت النباتي.

### ٢٩٢٩٢ - نمشة الليمون الحامض \* *Chrysomphalus dictyospermi* (S). *Pou rouge des oranges* (F).

حشرة ناعمة من القرميزات، تركب الكثير من النباتات الشجرة والتزيينية اغصانها الحشيشات || يقال ان موطنها الاصل كان الشرق الاقصى وقد انتشرت في معظم اقطار العالم واصبحت من آفات حوض البحر المتوسط وبلاد القرم بهد الصين واليابان وزيلندا الجديدة وأستراليا والانتيل وجاباكا والبرازيل والمكسيك والولايات المتحدة ... جليها الرسي يضيء الشكل ثلاثي التحديد نودى الطرف القطبي الاوسط لونه الى الحمرة المفرط القاعة يحيطها اطراف احمر. الاثنى يطول نحو ٢ م. والذكر ١ م. وثلاثة خطوط. والحشرة عند تجميدها عن رسمها ذكر كانت او انثى تلبو برمية الشكل صفراء اللون خضراء المواج اللاصع || اجيالها الحولية براون من ٢ م. إلى ٤ م. وهي تتصلج الحرارة القصوى المطلقة حتى ٤٥ م.غ. والحاراة الدنيا المطلقة حتى ١٠ درجات تحت الصفر || اضطرابها في الحشيشات شديدة الاثنى لها تركب الاوراق والاناث الفتية تتخصص العساة وتسبب الذبول وتركب الثمار فتعيق نموها وقد توفقه وتسبب جفاف الالباب وتضع الحصوص || تكافح باستعمال التبخير السيانيدريكي وسهم من استعمل الزيوت البيضاء مع أحد الحواشير الفعالة غير ان نتائج التبضع لا توازي التبخير || وهناك عدة حشرات غائلة تقضي على هذه النمسة اغصانها من الصفريات اي بنات النقا ومن الدسوقيات اي بنات العيد.

### ٢٩٢٩٣ - نمشة فلوريدا *Chrysomphalus aonidum*, *C. ficus*, *Aspidiotus ficus* (S). *Pou de Floride* (F). *Black scale* (E).

حشرة ناعمة من القرميزات تركب الكثير من النبات اغصانها الحشيشات والنخل والاوهكاويه والنفوط والخروع والغار والدفل واللباب والمضاسف || يقال ان موطنها الاصل كان فلوريدا وقد انتشرت في معظم مناطق القرم من اليابان الى الصين وفروموزا والمند وبرتديب والى الانتيل وكوبا والمكسيك والبرازيل وبلاد افريقيه. وهي شديدة الاثنى يركب جليها الرسي وهو عند الاناث مستدير الشكل ظهره براون من ٢ م. إلى ٤ م. لونه الى السرة الصفحية المواج تتوسطه سرة مركزية جقوية اللون ثلاثية الخطوط الدائرية. وهو عند الذكور يضيء الشكل يطول من ١ م. وستين الى ١ م. وأربعة خطوط. والحشرة عند

### ٢٩٢٩٤ - نمس أشعل \* *Herpestes albicaudus* (S). *Mangousté à queue blanche* (F).

نوع من النمس كبير القد طوله نحو ٥٠ سم. وذنبه ٤٥ وهو اقرب قائمة من المصري وأقل منه. ثوبه الى التبرية يملوا ناذير حطلي. ذنبه ابيض اللون الاشمل، جمل الور. موطنه الحبشة والتاتال وغينيا والسنغال.



نمس اشعل

### ٢٩٢٩٥ - نمس بني \* *Herpestes fuscus* (S). *Mongoose brune* (F). *Brown mongoose* (E).

نوع من النمس متوسط القد والارتفاع طوله نحو ٤٢ سم. وذنبه ٤٥. ثوبه الى البني يملو تجلج معترض اسمر. رأسه حالك السرة. قوامه سيد.



نمس فارسي

### ٢٩٢٩٦ - نمس فارسي \* *Herpestes auripunctatus*, *H. persicus* (S). *Mongoose à points dorés*, *M. de Perse* (F). *Persian mongoose* (E).

نوع من النمس صغير القد جيل الثوب المرقط بالابيض والاصفر الذهبي. موطنه العراق وبلاد فارس وجوارها يكثر وجوده في احوال النخل وقرب شفاف الآخر.



نمس مصري

### ٢٩٢٩٧ - نمس مصري \* *Herpestes ichneumon* (S). *Mongoose ichneumon*, *ichneumon*, *Rat des Pharaons* (F). *Egyptian mongoose*, *Ichneumon* (E).

نوع من النمس موطنه حوض البحر المتوسط. يكثر في البلاد المصرية حيث كانوا يملونه في زمن الفرادة. جسمه مستطيل الشكل، قصير القوائم، طوله نحو ٥٥ سم. وذنبه ٤٠. ثوبه الى الصفار الاثهب يملو توشم احمر. رأسه وظهروا امين لونا من سائر جسمه. قوامه سيد.

### ٢٩٢٩٨ - نمس هندي \* *Herpestes griseus*, *H. mongo* (S). *Mongoose mongo* (F). *Indian Mongoose* (E).

نوع من النمس متوسط القد والعلو طوله نحو ٤٠ سم. وذنبه ٣٥. ثوبه الى الصفار الخفي المواج يملو توشم احمر ونمسة يضاء. رأسه عايق اللون. قوامه الى السرة. موطنه الهند والافغان.



نمس هندي

### ٢٩٢٩٩ - نمسيات \* *Ichneumonidae* (S). *Ichneumonidae* (F). *Ichneumonidae* (E).

فصيلة حشرات من حشائيات الاجنحة المحصورة. اجناسها وانواعها زهاء ٣٠٠٠٠ جميعها مستنقة الاجسام. اطولها تراوح من ٥ الى ٢٠ م. ألوانها عابكة يكثر فيها الاسود وبعضها يحز باللين بالاسود والاصفر || رقاتها طفيلية توشم يكثر يثا على حوائطها من حششيات الاجنحة والنفديات.



نمسية

### ٢٩٢٩٠ - نمسية \* *Ichneumon* (S). *Mouche vibrante* (F).

جنس حشرات صغيرة من النمسيات انواعها المروفة زهاء ٥٠٠ جميعها مستنقة الاجسام المستطيلة. أطولها تراوح من ١٥ الى ١٦ م. ألوانها مختلفة الالوان يكثر فيها التحزير بالاصفر والاسود. وأدائها ثنائية الزوج شفاة تلعبوا نمشة خفيفة من الالوان الزاهية || رقاتها تتطفل على الكثير من الحشرات اغصانها النامية الى حششيات الاجنحة ومنها المذفوف والكزبي والانتونوم والصلمل الخ ...



نمسة الزيتون

٢٩٢٩٩ - نَمَعة ، نَمَعة (F). *Jonc des nattiers* (F).  
هو الأسل العربي ابن المود تصنع من الخشب والفلت .

٢٩٣٠٠ - نَمَعة (F). *Apex, Sommet* (F).

٢٩٣٠١ - نَمَعة (E). *Apex, Sommit* (E).

النمعة هي ذروة كل عضو من الأعضاء في الحيوان أو في النبات . والنمعة من كل شيء أعلاه .

٢٩٣٠١ - نَمَعة البَشِين \* (F).

*Nymphula nymphæata* (S).

*Nymphule du nénuphar, Teigne du nénuphar* (F).

*Nymphula nymphæata* (E).

حشرة من فصيلة الباريات حشرغيات الاجنحة . موطنها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . فراشها واحة قربها رحيق الانهار وظلها . رقبها خاضعة تدش على اوراق البشينة وعرائس الماء وكلوت الماء . جسمها يطول نحو ١٢ سم . بسطها تراوح من ٢٦ الى ٣٠ سم . رأسها مستدل الجرم ، قصير الحنجر . عينها صغيرتان . زباناها غيطيان . ملاسها قصيرة . رشفها مستدل الطول . جوفها وبطنها في الزوج الامامي زراكل بنية وصنابية ويلعوا ويلعوا في الزوج الخلفي تجذع معترض وتقيع بني صنابي .

اهدائها قفصية . لها جيل واحد في الحول . قفصها القرائنة في ايار وتبقى حتى آب . تسرح في النهار . تعاظم بعد ظهورها بنحو عشرة ايام وتضع المكن مبيدات على الصفحات السفلى من نصال الاوراق . الطول البرقي يستمر نحو ٢٨ اسبوعا والسرعة عند بلوغها الكمال الجسدي تطول نحو ١٥ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، واضح التقسيم السحكي ، مستدق للمقدم والمؤخر ، اسمر اللون ، تبي المزاج ، تملوه خامة غطوط طافية من الملب القصير .

رأسها اسود اللون . مذهبها وواجبا الى الحللة . طول الاكامل الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتفشي ضمن صلبة تسجها للرقعة تحت الجفلة او بين شقوق لاه الانجار .

٢٩٣٠٢ - نَمَعة (F). *Fourmis* (F). *Ants* (E).

جنس حشرات من فصيلة النمليات . انواعه عديدة منتشرة في اكثر اصقاع العالم . معظمها صغير القند . تألف الحياة الجاعية ، مجوسها تلحق جالية ودية تقم في زبية او قرية مؤلفة من عدة سراديب وانفاق ودعايز وسرير ورداء . والنمل كالنمل يقسم الى ثلاثة اقسام : الذكور والاناث والخنات . الذكور لاهل لما سوى كرم الاناث وهي تاكل ما تجنيه العاملات . والاناث بعد كويها ويرجعها الى القرية تستقبلها العاملات بالترحاب فتصلها من اجنحتها ثم تنقلها وتقودها الى الخاض من تحت المائز . اما العاملات اي الخنات فهي التي تقوم بجميع الاعمال ، تشيد القروية وتربي الطعام وتربي الدبا والكلر وتشر على ساحة القرية تقودها خزيمة ابقاء والحياة الجاعية المنتظمة في سبل مصلحة عامة لا تتصرف الى غيرها . ذكورها واناثها مجنحة باصرة . عاملاتها عادة الجناح والرأس تترنح على نظراتها وصل الاشياء بواسطة قربونها الاستشعارية المرفعة الاحساس . ورؤسها مسلحة بفكين حادين قاضمين . قوائمها دقيقة رشيقة مستطيلة تمكها من السير السريع . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٩٣٠٣ - نَمَعة أَخْمَر \* ، نَمَعة جَمَعي (F). *Myrmica rubra* (S). *Fourmi rouge* (F). *Red ant* (E).

نجمريدا من ترسها ذكراً كانت او انثى تبدو صفراء اللون زاهية المارح . اما ذكورها المجنحة فبرتقالية اللون ، ثنائية الجناح الابيض . اجيالها الحولية تراوح من ٤ الى ٥ اناثها تبض نحو ٥٠ مكنة متحمها يستمر نحو اسبوع . اضارها في الحشويات شديدة الوقع والاذى لانها تركب الارواق فتتصم صمارة خلاياها وتسبب اصفرارها وذوبانها وتركب الثمار فتتصم من النمو وقد تسبب جفاف لياها وتضمص حصونها . تتكافح بشق الحلوشر الفعالة المزروجة بالزيت البضاء وقد يحسن استعمال التبخير السيانيدريكي لانه افضل من النضغ اذ يدخل في جميع غياها الانجار .

٢٩٢٩٩ - نَمَعة نَارَية ، نَمَعة نَضَوِيَّة (F).

*Chrysomphalus aurantii, Aspidiotus aurantii, Aonidiella aurantii, A. taxus* (S). *Pou fer à cheval* (F). *Citrus yellow scale* (E).

حشرة نائمة ماربة من القرمزيات تركب الكثير من النباتات اخضها الحشويات وقد تغفل الليمون الحامض على البرتقال وتركب السلق والخرفوب والياسمين والتوت والموز والرزين والنخل والورد والصفصاف والال و الخروع . موطنها قسح الارباب يشمل جميع اقاليم الليمون الاسيوية والافريقية والامريكية والاروبية . جلهاها الترسية عند الاثني مستدر الشكل قليل الاحديداب مركزي السرة لونه الى السمرة النارية الباهة يحوقها اطراف ضيق اختار اكبه اللون قطر براوح من ٢ م .

٢ م . وعطيل . وهو عند الذكر يضي الشكل يطول نحو ٢ م . وثلاثة غطوط . والحشرة عند نجمريدا من ترسها ذكراً كانت او انثى تبدو نضوية الشكل متعرجة اللون . اجيالها الحولية تراوح من ٢ الى ٥ . اناثها تبض نحو ٥٠ مكنة متحمها بمدة تراوح من شهر الى شهرين . اضارها شديدة الاذى لانها تركب كامل اعضاء النبات الحولية اخضها الاثنا التي تجمها الارواق التي تذهبها والثار التي تعطها وتصلب لياها ، تتكافح مكافضة النمسة اخمرها .

٢٩٢٩٥ - نَمَعة (F). *Sporotrichum* (S).

جنس فطور مجهرية من الطليبات وفصيلة البولجيات . انواعه قليلة العدد والاذى . هيغه مداد زنف على سطح العائل . جرابه الكتيدي بسيط التركيب قصير القند . كسائده يضيض الشكل تتركز على اطراف الشغيرات وهي شغافة او ملونة ونشها القريدة للجميع والقصية . اعرف انواعه الثلاثة التالية :

٢٩٢٩٦ - نَمَعة الفُخَّاح (F). *Sporotrichum malorum* (S).

فطر مجهرية مركب الثبار المحفوظة او المخروسة ، ليفن البشرة دون ان يتبدى حدود اللب .

٢٩٢٩٧ - نَمَعة الحُمُفِيَّات \* (F). *Sporotrichum citri* (S).

فطر مجهرية مادم الاذى يركب اوراق الحشويات على اختلاف اجنسها وانواعها فيوشها ببقع خلية صغيرة لا قياسية الشكل لونها كالرصاص .

٢٩٢٩٨ - نَمَعة الصُوفَان (F). *Sporotrichum mycophilum* (S).

فطر مجهرية يركب الصوفان فيمسطقه يوشح من الخلد اللبد البرتقالي القرن يقضي على نمو .



نَمَعة الحشويات



نَمَعة البَشِين



نمل احمر

ومصباتها || كلالها قوية ، سوقها واوراقها شبه مستديرة  
حلاطية المادة حمراء اللون .

### ٢٩٣١٨ - نَمْلَامُ البَطِّ \*

*Dacophorus icterosus* (S). *Dacophore bilieux* (F).  
حشرة جلدية من النملانيات . طولها نحو ١ سم . ثوبها الى  
الحمرة الجلوية . رأسها مثلث الزوايا . بطنها يضيئ الشكل  
مبهر الحلب اللينق القصير || تركيب البط . تكافح  
بمستحضرات الفريدب .

### ٢٩٣١٩ - نَمْلَامُ التَنَدُجِ \*

*Goniodes distimilis* (S). *Goniodes dissemblable* (F).  
حشرة جلدية من النملانيات طولها يراوح من ٢  
م . الى ٢ م . وخمسة خطوط . جسمها يرمي الشكل .  
عرض رأسها يفوق طولها . حلقها غصي التجميع . ثوبها الى  
البياض الاخير يملو بتقيع اصفر . || تركيب التندرج  
والحمل والدجاج . تكافح بالفريدب .

### ٢٩٣٢٠ - نَمْلَامُ الحَمَامِ \*

*Gonlocotes compar* (S). *Gonlocote companson* (F).  
حشرة جلدية من النملانيات طولها يراوح من مليتر واحد  
الى مليتر وخمسة خطوط . ثوبها حنطلي اللون اصفر المراح .  
بطنها يضيئ الشكل مبهر الحلب اللينق المستطيل .  
تركيب الحام فتضيمه . تكافح بمستحضرات الفريدب .

### ٢٩٣٢١ - نَمْلَامُ الدَجَاجِ \*

*Gonlocotes gigas* (S). *Gonlocote géant* (F).  
حشرة جلدية من النملانيات طولها يراوح من ٣ الى ٤ سم .  
ثوبها الى الصفار الحنطلي المراح . بطنها يضيئ الشكل  
قصير الحلب الغصي التجميع || تركيب الدجاج فتؤذيه .  
تكافح بالفريدب .

### ٢٩٣٢٢ - نَمْلَامُ الغُرَيْرِ \*

*Goniodes stylifer* (S). *Goniodes stylifère* (F).  
حشرة جلدية من النملانيات طولها يراوح من ٣ الى ٤ سم .  
جسمها اجاصي الشكل . رأسها كالقبة الثانية القرون .  
حلقها كثيف التجميع . ثوبها الى السمرة السفاه || تركيب  
الفرغ والحلبش . تكافح بالفريدب .

### ٢٩٣٢٣ - لَمَنَامِيَّاتِ \*

*Phloopteridae* (S). *Phlopteridés* (F). *Phlopteridae* (E).  
فصيلة حشرات جلدية من رتبة القملانيات . احسانها وانواعها  
عديدة جميعها صغيرة القد ، مفلطحة الجسم ، كثرة  
الحلب ، واخمسة القرون الاستمرارية الحامشية العقل . اوضاعها  
خادشة ثمانية المائل . تعيش حل اوضاع جلود الطير  
وديشه . اشهر اجناسها النمام والقرود والقرود .

### ٢٩٣٢٤ - نَمْلَامُ الرِّبِّ \*

*Ride* (F). *Ripple* (E).  
هو الاثر الذي تحمله الريح على القرب والماء .

### ٢٩٣٢٥ - نَمْلَامُ النَمْلِ \*

هو النملوك ، اطلبه .

### ٢٩٣٢٦ - نَمْلَامُ الشَّجَرِ \*

*Accroissement, Végétation* (F). *Increase, Vegetation* (E).  
هو استمرار دور النشوء والنضارة وازدياد الحجم في النبات .

### ٢٩٣٢٧ - نَمْلَامُ النَمْرِ \*

*Nemura* (S). *Némura* (F). *Nemura* (E).  
جنس طير من الجوامئ سنيا المنابر وفصيلة الدخليات .

*Lasius niger* (S). **نَمْلُ اسْمَر**

*Fourmi brune* (F). *Dun ant* (E).

*Formica rufa* (S). **نَمْلُ اكْفُف**

*Fourmi fauve* (F). *Drab ant* (E).

*Lasius flavus* (S). **نَمْلُ امْفَر**

*Fourmi rousse, F. jaune* (F). *Yellow ant* (E).

*Formica cinerea* (S). **نَمْلُ جَسُور** \* ، **قَمَص**

*Formica animosa* (S). *Fourmi féroce* (F). *Bold ant* (E).

*Formica nigra* (S). **نَمْلُ حَبِيصِي** ، **جَفَل** ، **دُعَابَة** ، **دُعُوب**

*Formica nigra* (S). *Fourmi noire* (F). *Black ant* (E).

*Atta structor* (S). **نَمْلُ حَصَاد** \* ، **جَفَلَة**

*Atta structor* (S). *Fourmi moissonneuse* (F).

*Fourmis de Salomon* (F). **نَمْلُ سُلَيْبَان**

هو الحق ، نمل احمر صغير ، اطلبه .

*Formica flava* (S). **نَمْلُ فَلَاسِي**

*Formica blonde* (F). *Golden ant* (E).

*Formica sanguinea* (S). **نَمْلُ مَدَمِي** \* ، **جَفَلَة**

*Formica sanguinea* (S). *Fourmi sanguine* (F). *Robber ant* (E).

*Formica* (S). **نَمْلَة** ، **نَمْلَة**

*Formica* (S). *Ant* (E).

النملة واحدة النمل الذكر والانثى ج . نمل ونمل ونمل .  
وارض نملة ذات نمل بطعام منبسط اذا اصابه النمل . ويض  
النمل يضي ماژنا وبينما وصغيره يضي ذرا وكنته ابيضفول  
وكنته النملة ام ماژن وام نورية . وصحت النملة نملة لتنتله  
وهو كثره سركبها رجلة قواجمها || وين شر الامام تاج الدين  
البيهي في منزل فيه نمل قوله :

حالي ادرى منزل المولى الاديب به

نمل تجمع في اربابته زرا

فقال لا تجبن من نمل منزلنا

فالنمل من شأنها ان تتبع الشرا

### ٢٩٣٢٤ - نَمْلَة الْأُرَجِيْنِيْنِ \*

*Fourmi de l'Argentine* (F).

هي النزق ، نملة مهلهذا بلاد الارجنتين وقد انتشرت في  
جميع انطار العالم .

*Fourmi de Pharon* (F). **نَمْلَة فِرْعَوْن**

نوع من النمل يدهي حذال ، اطلبه .

*Formicidae* (S). **نَمْلِيَّاتِ**

*Formicidae* (F). *Formicidae* (E).

فصيلة حشرات . من رتبة خفاشيات الاجنحة . انواعها  
المعروفة زهاء ١٢٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم .  
اعتادوا وكبرها قد الانواع التي تعيش في المناطق الاستوائية .

*Nemalion* (S). **نَمْلِيَّوْنِ \***

*Némale, Némalion* (F). *Nemalion* (E).

جنس نباتات مائية من الخليات الحمر . انواعها المعروفة  
عديدة . يكثر وجودها عند شلالات الانهر ومداسق الاسداد



نمل جسر



نمل حصاد



نمل مدسي



نملون



نمام البط



نمام الحام



نمام الدجاج

منها في أواسط العصر البلياسي، وقد تطور القسم الآخر الذي اختلف، على ما يبدو، إلى الأجناس المعاصرة.

#### ٢٩٢٣٤ - نَمُوزِيَّات (S). Nummulitidae

Nummulitidae (F). Nummulitidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من المنخربات المجذريات. أجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد، معظمها الساقط من متحجرات الحقبة الجورجية. أما المعاصر منها فيعيش في بحار البلاد الحارة. اعرف أجناسها النموزة.



نموزة

#### ٢٩٢٣٥ - لَمِيزَات (S). Trichodectidae

Trichodectidae (F). Trichodectidae (E).  
فصيلة حشرات جليدية من رتبة القملليات. أجناسها وأنواعها عديدة جميعها صغيرة القد، بيضبة الشكل، مفصلحة البطن، كثيرة الحلب. قربها الاستثنائية لثلاثة العقول. أرباعها عادية، تركيب المفصل. تركيب الحيوانات البزعة كالتليل والبقير والعنبر والنم والكلاب والسراريب والتاليد والأيايل...

#### ٢٩٢٣٦ - لَمِيزَة (S). Oogone

على نباتية تخمض وترتي الاجرام الانثوية. ج تخليا.



نموزة

#### ٢٩٢٣٧ - نَمِيزَة مَلَطَحَة (S). Venilia macularia

Pseudopantthera macularia (S). Vénillite maculée, Pseudopantthera maculée, Pantthera (F). Venilia macularia, Pseudopantthera macularia (E).

حشرة من اللافيات حشرغيات الاجنحة. موطنها الاصقاع المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط الى اربوة. فراشها واضحة قوتها مغفر الزهار. قرفها تميش على اوراق الشقيويات وازهارها. جسمها خفيف ابيض بطول نحو ٩ سم. بسطها نحو ٣٠ سم. رأسها اسمر. عيناها صغيرتان. زانباها مشطيان عند الذكر، عظيماني عند الانثى. مرشفها مشط الجرم والطول. جوشها ويطن الى السمرة. يعلوها وراج اكلف. ريشانها الاماميان الى الصفار الباهت تملو رشفة كستنية. ريشانها الخلفيان الى الصفار الاكلف المواجه تملو حمرة كستنية تمتد حتى الخنار. اهدابها الى الشفة. لها جيل واحد في الجيل. تظهر القدرات في ايار وتبقى حتى تموز. تسرح في الليل. تماثل بعد ظهورها بنموسه اسابيع وتتبع الممكن لطفاً على الماء الباردة وتسال الاوراق. السرفة بعد بلوغها الكمال تطول نحو ٢١ سم. جسمها اسطواني الشكل، داس القشار، يملو ثلاثة ازواج من التملو الصغيرة المتعاقبة. قوتها يمتان اليه التي تميش فيها لذلك فهو غالباً يلون الارواق. رأسها وقلوبها وشرجها الى الكستني. شرجها ينتهي بزوجتين صغيرتين. طول الاكامل الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلبة تحميها السرفة بين الاوراق التي تلتاس التربة.



نموش الصمغ

#### ٢٩٢٣٨ - نَمِيزَة (S). Nemesia

Némésia (F). Nemesia (E).

جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الخنازيريات. مهدها بعض المناطق الافريقية الحارة والمعتدلة الحارة. سوقها هزيلة. اوراقها متعاقبة. ازهارها ليلية. مزدوجة. مجهزة بمهائم قصيرة. تزرع التربين في الماكن والحدائق. انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.



نميرة ملطحة

انواعها المعروفة سبعة، ستة منها اسيوية وواحد افريقي. جميعها مصافير صغيرة القد، ريشية الحركة، ثنائية العين. يكثر فيها الرداء الاطلل والبيض الذي يمتد المواجه. قربها الحشرات الصغيرة والذباب والحوام. تكثر في الادغال الباردة. حشفتها من ٤ الى ٥ بيضات يتناوب عليها الذكر والانثى نحو ١٣ يوماً.

#### ٢٩٢٣٨ - نَمُوزَة (S). Nemosia

جنس طير من الجوامح غرويات المناخير وفصيلة الترنثيات. انواعها المعروفة نحو ١٠ موطنها المناطق الاستوائية الاسريقية. تألف الذابات وصفات مجاري الماء. ملجنها الحيالي جامي. جامعاتها متوسطة العدد الذي يراوح من ٢٠ الى ٧٠ زوجاً. قوتها الحشرات والبذور والثمار العنقية البرية. اجناسها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٥ سم. مناقرها غروية الشكل. الواجها متباينة الالوان جميعها زاهية الخضاب عند الذكور باهتة عند الاناث. تكثر اعشاشها في الادغال. اناتها تخضع بنموية الذكور من ٣ الى ٥ بيضات. الترخيم يستمر نحو ١٣ يوماً.

#### ٢٩٢٣٩ - نَمُوس (S). Nomeus

Noméus (F). Nomeus (E).

جنس اسماك بحرية من شائكسات الزعانف وفصيلة الاسقمريات. انواعها المعروفة قليلة العدد اصطناعها مجار البلاد الحارة. اجسامها اهليلجية الشكل تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. زعانفها الظهرية غارقة. زعانفها الصدرية تنتشر وتنتفي. عند الانقباض، في تجايف خاصة. التواها الى الرتبة القفصية يملوها تتبع اسمر لاقلامي التوزيع انما يكثر ويقيم عند الرأس والظهر. حولها متوسطة الصفت، مأكولة.

#### ٢٩٢٣٠ - نَمُوش الصمغ (S). Turanana baton

حشرة فراشية من فصيلة القفصيات. جسمها يطول نحو ٢٢ سم. وراش ذكورها الى الزرة الرمادية المواجه يملوها حنار اسود اطار ابيض الحذب تقطعه الاصاب السود. وراش اناتها حنطية اللون اسمر المواجه يملوها تمشيش بنفسجي ويملونها اطار ابيض الحذب تفرقه الاصاب السود. يرقاتها تركيب اوراق الصمغ فتقضيها.

#### ٢٩٢٣١ - نَمُوش (S). Némus

نبات يدمى لقعة الحمل، اطلها.

#### ٢٩٢٣٢ - نَمُوزَة (S). Nummulites

Nummulites (F). Nummulites (E).

جنس حيوانات بحرية من المنخربات المجذريات وفصيلة النموليات. انواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الاحصاف الجوروية والطباشيرية. أما المعاصر منها فيعيش في بحار البلاد الحارة. اصدانها كبيرة، مستديرة، قرفسية الشكل، عديدة الحجيرات الثنائية او الثلاثية التجويل الانقي.

#### ٢٩٢٣٣ - نَمُوزِيَّة (S). Nummulitique

Nummulitique (F). Nummulitique (E).

نمت ترميفي يطلق على الحقبة الاولى من الاباج الثاني المعروف ايضاً بالاباج الحديث. وهو يشل العصر الباليوسيني والعصر الاسياني والعصر الاوليغوسيني. تتميز هذه الحقبة بويود الكثير من اسافير النملوة في جرابها الرئيسية. ويظهر بعض الثدييات التي انقرضت قسم



## ٢٩٣٤٦ - تَمِيْزَةُ عَصِيْبَةِ الْوَرَقِ

Moltkia graminifolia (S).

Moltkie à feuilles de graminées (F).

نوع من التميّة. ساقها زبّاه فروعاً تعلو من ٢٥ سم. أوراقها متعاقبة عصفية اتصال المسنة الحافة. أزهارها عنقوديّ متبدّل. أزهارها إلى الزرقاة البنفسجية || تنويرها يستمر من أيار إلى حزيران.

Nandou (F).

٢٩٣٤٧ - تَسْدُوْ

في الروساء، أطبا.

Nandus (S).

٢٩٣٤٨ - تَسْدُوْس

Nandus (F). Nandus (E).

جنس اسماك نهريّة من شائكات الزعانف. أنواعه المعروفة قليلة العدد، جميعها من اسماك المناطق الاسيوية الحارة والاستوائية || اجسامها متوسطة القد. شكلها قريب الشبه بالفرخ. ظهورها محدودة. زعانفها الظهرية مستطيلة شائكة. زعانفها الشرجية مقبولة || أنثاها إلى السمرة السفاه المواجه يملؤها يتجيج اسود متباين الرخابة || لحمها متوسطة الصنف، مأكولة.

Nandina (S). Nandine (F).

٢٩٣٤٩ - تَسْدِيْنَا

جنية مشرة معمرة أبيدة الاوراق من فصيلة البرابرسيات. مهدها الشرق الاقصى. تميش وتكثر في الاقاليم المعتدلة المتحررة نحو الحارة. جنيها قليلة الفروع تعلو من متر إلى مترين. أوراقها متعاقبة مركبة. وريقاتها اهليلجية النصل ويزرة التجميع. ازهارها عنقوليّ تتجيج طرفي الاوتكار. ازهارها عابجة اللون فواحة العرف المطري. ثمارها عنبية حراء اللون مأكولة.

Paraffine (F). Paraffin (E).

٢٩٣٥٠ - نَهَاة

هو البرافين، نوع من الشمع الابيض الجاهد المكسرى يستخرج من النفط. راجع نفط.

٢٩٣٥١ - نَهَاة نوع من الودع

Méthodologie (F).

٢٩٣٥٢ - نَهَاةَة

Methodologie (E).

النهاجة قسم من علم المنطق يبحث في مقدمات ونتائج المناهج المختلفة.

Ouardeau (F). Young bustard (E).

٢٩٣٥٣ - نَهَاك

فرخ الجبارى. قالت العرب احق من نهار. وقد اختلف القويون في النهار فقال قوم هو فرخ الغطاء وقال قوم انه ذكر اليوم والاثنى صيف. وقيل انه ذكر الجبارى والاثنى ليل. ج. أنهرة وبهر.

٢٩٣٥٤ - نَهَاكِي، هَوَكِي، هِيَاكِي

Diurne (F). Diurnal (E).

نعت تمرينيّ يستعمل دلالة على الشيء الخاص بالنهار او الذي لا يحصل الا في الضياء اي النهار.

Rapaces diurnes, ٢٩٣٥٥ - نَهَاكِيَّة، نَهَاكِيَّة

Diurnes (F). Diurnal birds of prey (E).

اسد قسي جوارح الطير المعروفة بمجوارح او كواسر النهار يقابلها جوارح او كواسر الليل.

٢٩٣٥٦ - نَمِيْزَةُ حَدِيْة (S).

Némésie gibbeuse (F).

نوع من التميّة. عشب زينة حولية. ساقها خلية البهاء تعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها اهليلجية مسطوية، الجذعية منها لاطة، منشارية الحاد. ازهارها حراء اللون، منها شروب يضاء اللون وزرقاء ووردية || تنويرها يستمر من أيار إلى حزيران.

٢٩٣٥٧ - نَمِيْزَةُ كَثِيْرَةُ الزَهْر

Nemesia floribunda (S). Némésie floribonde (F).

نوع من التميّة. عشب زينة حولية. ساقها تعلو من ٢٥ إلى ٣٥ سم. أوراقها الدليا لاطة، سنانية. أوراقها السفلى منقطة، بيضيه. ازهارها عابجة اللون يطرها موج بنفسجي. عرلها عطر فواح || تنويرها يستمر من أيار إلى آب.

٢٩٣٥٨ - نَمِيْزَةُ قَانَمَة \*

Nemesia suffisa (S). Némésie (E).

دوبية من الناكب القانصة السابعة رباعية الرايا والمشتان تنتمي إلى فصيلة الخدقيات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ سم. عند النكب ونحو ١٨ سم. عند النكبة. صدرها اسكوب اللون يملو تسنج وتزويق سود. عينها زنجيتان. شيفها ضليمان. فكها منقش. سرانها شطية، مستطيلة الزوج الخلفي. بطنها اهليلجي الشكل ينثني برأفتين تحيلين، ثوبه إلى الكهية الخطية يملوها خط طائر اسود وسببه عطلوط منقرضة || تألف البراري والمزارع. مسرحها دجوي. قوتها الحشرات واسارها ويراقها || عكبتها يوش في التربة انبوي الشكل، عودي الفور، متوسطة القعر، روفي القعر، تحفر تحت حجر كبير || ملجأها الخالي، كلين سائر الناكب. تميش نحو ثلاث سنوات. لسنتها مؤذية وقد تكون مبيته في بعض الظروف الخاصة || تعتبر من الدويات المؤذية الفارة.

٢٩٣٥٩ - نَمِيْزِيْن اول ما يبدو من النبات.

٢٩٣٦٢ - نَمِيْزَة

Moltkia (S). Moltkie (F).

جنس نباتات جنية معمرة من فصيلة الحسنيات. انواعها المعروفة قليلة العدد مهدها الشرق الاوسط || سوتها زبّاه فروعاً تعلو من ١٥ إلى ٦٠ سم. أوراقها متعاقبة عصفية الشكل أو ابرية. ازهارها عنقوديّ تتجيج ابطي الاوتكار || احرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية.

٢٩٣٦٤ - نَمِيْزَة الصُّخُور \*

Moltkia petraea (S). Moltkie des rochers (F).

نوع من التميّة. ساقها زبّاه تعلو من ١٥ إلى ٣٠ سم. أوراقها ابرية الشكل تعلو نحو ٤٠ سم. وتعرض نحو ٤ سم. ازهارها عنقوديّ منتصب. ازهارها ابريوانية اللون في اول مهدها ثم تنحرف إلى الزرقاة البنفسجية فانزرة الباهتة || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

٢٩٣٦٥ - نَمِيْزَة زَوْقَاء

Moltkia caerulea (S).

Moltkie bleue (F).

نوع من التميّة. ساقها زبّاه قليلة الفروع تعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها متعاقبة سنانية اتصال البتقة السنين. ازهارها عنقوديّ. ازهارها زرقاء اللون || تنويرها يستمر من نيسان إلى حزيران.



نَمِيْزَة قَانَمَة



نَمِيْزَة الصُّخُور

## ٢٩٣٥٦ - نَهَّاس

هو الاسد ، الطيه .

Lion (F).

## ٢٩٣٥٧ - نَهَّام \*

Nyctala funerea (S).

Nyctale, Chouette pattue (F).

طائر من البويات ورمزة الغداديات . جسمه صغير القد يطول نحو ٢٦ سم . رأسه مستدلل الحجم . عنقه نازل انقروص . منقسه شديد الانحناف اسود اللون تملوه مشحة صفراء . ذنبه مستطيل الريش تفرسه خمسة خطوط بيض . ارساغه كاسية لبدية || موطنه فسيح الارياض يشمل البلاد الاسيوية والارادية والامريكية . يأنف الاسراج الصبور والتنبوب والمزلولا يقترب ابدًا من الاساجح الالهة . يلتبس قوته في الليل ، يصيد الجرذ والقنصار والزباب والخشرات . يثنى عنه في صدمع الانجار وبين فروعها . انقاء نغم من ٤ الى ٥ ييضات تحفها بمنارة الذكر من ١٧ الى ٢٥ يومًا .

## ٢٩٣٥٨ - نُهْبُورُ ، زَقْرَاقُ مُسْتَح

Hoplopterus (S), Hoploptère (F).

Hoplopterus (E).

جنس طير من طوال اساق وفصيلة الزرقانيات . انزاعه المعروفة ١٠ واحد .ها امريكي موطنه يمتد من الابستين الى البرازيل وتسعة اسبوية وافريقية || جميعها قريبة الشبه من الزقراق المنقوش . اجسامها صغيرة . اذنانها قصيرة . اجنتها مسلمة بتناخس قرنية المادة ، مدية ، ناعسة . ارساغها دقيقة مستطيلة . اصابعها ثلاثة || قربها الحشرات والديدان والحمار || انثاها تدث في افاحيص تحفرها في رمال شفاف الانهر والبحيرات . وفي تحفن وسعها من ٣ الى ٤ ييضات || اعرف انزاعه واشهرها التبرجج التناخس .

## ٢٩٣٥٩ - نُهْبُورُ نَاحِيسُ \* ، زَقْرَاقُ نَاحِيسُ

Hoplopterus spinosus (S).

Hoploptère épineux, Vaneau à éperon (F).

Hoplopterus spinosus (E).

طائر من التبرجج الضارب القرايط . اعطانه تمتد من الحيشة الى السودان وبعصر الجزيرة العربية والقرق وسائر انطار الشرق الاوسط حتى تركيا والبرقان يحوب بعض اصقاعها كل عام في طلب الرزق والمصيف والمشق || جسمه متوسط القد . طوله نحو ٣٠ سم . ظهره وجناحاه الى الصبغة السمر . رأسه وجيشته الى السواد الفحشي . عنبراه وعنقه وكفاه وبلنقه وانتيكه واراسط جناحيه الى البياض الناصع . اطراف قوادمه سود || يأنف الاخوان وصفات الانهر والبحيرات ، سره متوسط البد . قوته الحشرات والديدان والحمار .

## ٢٩٣٦٠ - نَهْدَكَة ، نَهْدَكَة ، نَهْدَكَة

Beurre (F), Butter (E).

من اسماء الزبدة . وقد تستعمل للدلالة على مقدار خي الابان يالزبد فتقول نهدة هذه الابان ... نهدية هذا اللبن .

Fleuve (F), River (E).

## ٢٩٣٦١ - نَهْرٌ

يجرى من المياه العذبة ينساب على الارض ويسب مياهه في بحر او بحيرة . يمتد النهر على التناييع والامطار والثلوج الذائبة وهو يتألف عادة من مجرى رئيسي تغذيه السواعد والفرج . وان صغر وكثرت مياهه فهو النهر (Rivière) . ج اطباع وساعده يدمي جملرا ج . جداوله . وان كبر فهو النهر وساعده يدعى رافداً ج . ورافد .

## ٢٩٣٦٢ - نَهْرٌ ، اُريدَانُوسُ

Eridan (F).

Eridani, Eridanus (E).

النهر او اريدانوس كوكبة نجوم جنوبية الموضع . مجريها اربعة وثلاثون . شكلها كالنهر ، يتنهد عنه قدم الجزء فتر في المغرب على تبرجج الى قرب صدر قيطس ثم تمر في الجنوب على ثلاثة اجير ثم تنطف الى الشرق فتمر على ثلاثة اجير ايضا ثم تنطف الى الجنوب فالنهر فالجزر فتمر على كواكب مدينة وتنتهي بنجم نير يدهي آخر النهر || اشهر نجوم هذه الكوكبة : الثلاثة التي في المنطف الثاني وتدعى « منطف النهر » ، والكوكبة التي في المنطف الرابع وتدعى « ادسي النعام » . والكواكب التي حولها تدعى « البيض » ، ثم « نير الزروق » ، ثم « القربة » ، ثم « الظلم » ، وهو اشهرها ، ويدعى ايضا « آخر النهر » . وبين هذا النظم والظلم الذي حل في الحوت كواكب كثيرة تدعى « الرئال » .

## ٢٩٣٦٣ - نَهْرَةٌ اِقْصَادِيَّةٌ

Conjoncture économique (F).

Economic situation, Trend (E).

النهضة اتفاق الظروف في وقت ما .

## ٢٩٣٦٤ - نَهْسٌ

Pie-grèliche écorcheuse (F).

Red-backed shrike (E). ج نهسان .

## ٢٩٣٦٥ - نَهْسُورٌ \*

Enneoctonus (S).

Ennéoctone (F).

طائر من القرب يتنحى الى فصيلة القريدات . يأنف الثنايات والبرج والمراعي . قوته الحشرات والبيوت والظاء والمقارب والمناكب ... || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٢ سم . رأسه مستفخم الجرم . متقاده غليظ وصلبي . ثوبه الملوي الى التشفة السمر يملعها تشبيح اسود . سبته وعنبره الى البنية . عيناه مسكتان بالاسود الذي يمتد حتى القفن . زوره وصدره وبلنقه الى الصبغة التبراه . جناحاه متدلا الطول . ذنبه مستطيل الشكل مقنوم الطرف || يثنى عنه في الانجار الرمية . الاتي تحفن وسعها من ٤ الى ٥ ييضات بينا الذكر يثنى لها النفاذ .

## ٢٩٣٦٦ - نَهْنٌ \*

Cathetus (S).

Cathète, Tâlégalie, Dindon des bulsons (F).

جنس طير من فصيلة الثقانيات . انزاعه قليلة العدد جميعها كبيرة القد طولا يراوح من ٧٥ الى ٩٠ سم . تميز برووسها الصلواء القليلة الزغب . متاقدها قوية سادة . اعاقها سرحة ، هادة الريش ، حواء الجلود الجمدة المسترسية . اجنتها مستدرة ضميعة . اذنانها متوسطة القد . ارساغها قوية . مخالبها كبيرة . انزاعها الى السرة يملعها مراح سحتي وتأثير فني . || تألف الاسراج . تميز ذكرا وأثي كالهام . سرها يمد من ١٥ الى ٢٥ زوبا . قربها الحبوب والخشرات . انثاها لا تحفن البيض بل تقسم في مخاض خاصة تشبهها بالتراب والقنبيسب والافغان والقش والورق تجعلها هرية الشكل مستدرة للقاعدة فلها يراوح من ٢٨٠ الى ٤٢٠ سم . وارتفاعها من ١٨٠ الى ٢٥٠ سم . || والاثنى تنقع في مومها الحولي من ١٢ الى ١٥ يضة بين الواحدة والواحدة ١٢ او ١٤ يوما . اما البيضة فتتفق بد وضعها باسويين من فرخ نشيط انقب الريش يدر امر نفسه بدلن عنه .



نهام



نبيح ناحس



نهر



نهن

## ٢٩٣٦٧ - نَهْمَةٌ

Roquette sauvage (F).

نحو ١ م. ثوبها الى الخنطي الاسمر. وأساها سود. نمداهما الى الصلبة الزاهية. || تميش تحت الحجارة والاعشاب في البراري وقرب البيوت وبينها. قوتها المواد العضوية ويرقات الحشرات وتلات الازهار.



نَهْمِك أَزْبَق

## ٢٩٣٦٨ - نَهْمَةٌ

النَهْمَةُ وطار طويل المتعار والرجلين والرقة، اغبر اللون (السان).

## ٢٩٣٦٩ - نَهْمَةٌ

Troque (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مشهورة باسم عتيل، اطلبه.



نَهْمِك الايجار

## ٢٩٣٧٠ - نَهْمِيَّات

Trochidae (S).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات تدعى أيضاً هتيليات، اطلها.

## ٢٩٣٧١ - نَهْمِيَّي

Blairnet (F). Bray of an ass (E). صوت الحمار. والنهاق كذلك.

## ٢٩٣٧٢ - نَهْمِك، قَالِبِ الْأَذْن، أَبُو مَقْصَم

Forficula (S). Forficula, Perce-oreille, Pince-oreille (F). Ear wig (E). Ohrwurm (D).

جنس حشرات مباشرة صغيرة من فصيلة الهيكيات. أنواعه عديدة منتشرة في معظم أقطار العالم. اجسامها مغلطعة مستطيلة سداسية القوائم. قوتها الاستعمارية غيطة الشكل لا قياسية الطول والتركيب يراوح عدد مقلها من ١٠ الى ٣٤. كواسها مختلفة الزاوية مهمة الحمار الخارجي. انعامها قصيرة مغلطعة. رواشها متباينة الاشكال والاحجام. جالسة الاوتكان. تحمل في مؤخر بطونها ملاط لا نظامية الشكل، مقوسة كلابية في الذكور، مستقيمة في الاناث. يزعم اهل الغرب انها تنقب الاذن وزعم غيرهم انها تمض اطر الرقيق وقوف الجوارى. || اعرف أنواعه واشهرها ما يلي.



نَهْمِك المقل الصغير

## ٢٩٣٧٣ - نَهْمِك أَزْعَب

Forficula pubescens (S). Forficula pubescens (F). نوع من الهيك، حشرته دقيقة الجسم الازنب تطول من ٦ الى ١٢ م. قوتها الاستعمارية مركبة من ١٢ عقلة.

ثوبها الى الخنطي الاسف المبرج. ملاط ذكورها كلابية الشكل دائرية التفوق. ملاط انثاه مستقيمة. تميش على الاعشاب والنبات الصغيرة. قوتها مكن الحشرات ويرقاتها وسيق الازهار وتلاتها.

نَهْمِك الحقل الكبير

## ٢٩٣٧٤ - نَهْمِك الْأَشْجَار

Forficula decipiens (S). Forficula des arbres (F). نوع من الهيك، حشرته تطول من ٧ الى ١٣ م. قوتها الاستعمارية مركبة من ١٣ عقلة. كواسها ونمداهما الى الصفار الخنطي. ثوبها الى السرة الخنطية المبرج. وأساها اصهب. ملاط ذكورها كلابية الشكل تطول نحو ٣ م. تميش على الاشجار. ملاط انثاه مستقيمة تطول نحو ٣ م. تميش على الاشجار. قوتها مكن الحشرات وبرقاتها والافرازات النباتية السكرية.



نَهْمِك مبدول

## ٢٩٣٧٥ - نَهْمِك الحقل الصغير

Labia minor (S). Labie (F). نوع من الهيك، حشرته تطول من ٦ الى ١٠ م. قوتها الاستعمارية دقيقة مركبة من ١٠ الى ١٢ عقلة. نمداهما رواشها مستطيلة. ملاط ذكورها كلابية الشكل قليلة التفوق، تطول نحو ٣ م. ملاط انثاه مستقيمة تطول نحو ٣ م.



نؤ

## ٢٩٣٧٦ - نَهْمِك الحقل الكبير \*

Labidura riparia (S). Labidure (F).

نوع من الهيك الكبير، لقد، حشرته تطول نحو ٢٥ م. زيانها مستطيلة عجينة كثيرة العقل التي يراوح عددها من ٢٧ الى ٣٠ احماها ذقنة. اجنحتها بارزة. ملاط ذكورها منجلية الشكل متراكبة الاطراف تطول نحو ١٢ م. ملاط انثاه مستقيمة تطول نحو ١٠ م. || ثوبها الى الخنطي الاصهب المبرج. تميش تحت الحجارة في الحقول وفي الرمال وقرب مجاري الماء. قوتها برقات الحشرات وبعض المواد النباتية || جصرها نفق بعد الفور طوله يراوح من ٢٠ الى ٣٠ سم. وعقد نحو ١٢ سم.

## ٢٩٣٧٧ - نَهْمِك مبدول \*

Forficula auricularia (S). Forficula commune (F). Common earwig (E). Gemeine Ohrwurm (D).

نوع من الهيك المبدول الشائع في معظم أقطار العالم. حشرته مستطيلة الجسم المبرج. طوله يراوح من ١٠ الى ١٥ م. زيانها مركبة من ١٥ عقلة. ظهرها قصيرة مغلطعة سفدية التركيب. رواشها بارزة. ملاط ذكورها كلابية الشكل مسننة الاطراف تطول من ٣ الى ٥ م. ملاط انثاه شبه مستقيمة تطول من ٤ الى ٧ م. ثوبها كسني اللون اسف المبرج اصهب الطرف والجوانب. وهو يالغ الامكان الالفة. يعيش تحت الحجارة والاعشاب. يسرح في الليل ويبيت في النهار. انشاء قنص نحو ٦٠ مكنة تحتها عند اوائل الربيع في قروص مستطيل تدبره في التراب تحت الحجارة. مكنها يضي الشكل ايض اللون يطول نحو ١ م. ويتفد من مكنه بنحو ١٠ ايام عن رقات نهمه تلهم ما وصلت اليه من بوادر النباتات المشية. اما الحشرة الكاملة فقوتها المواد العضوية والحيوانية والنباتية اغصها بوادر البلور الناتجة والتأثر السكرية. افرازها زبدية الا في بعض الظروف. تتكاثر كثيرا من الحشرات التربة الدجوية المسرح.

## ٢٩٣٧٨ - نَهْمِيَّات، قَالِبَاتِ الْأَذْن

Forficulidae (S). Forficulides (F). Forficulidae (E). فصيلة حشرات من رتبة جلدنيات الاجنحة الرواكس. اجناسها وأنواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم أقطار العالم اغصها الاقطار الاستوائية. جميعها من حاملات الملاط الشرجية المتباينة الاشكال والاحجام || اشهر اجناسها الهيك.

## ٢٩٣٧٩ - نَهْمِيَّي

Barrisement (F). Trumpeting (E).

هو صوت الفيل في جميع ظروفه.

## ٢٩٣٨٠ - نؤ \*

Connochaetes (S).

Gnou (F). Gnu, Wildebeest (E).

جنس حيوانات لبونة من بقرة الوحش ذوات الطلف. انواعه ثلاثة. اشكالها مزيج من عخلقة الماهة والثور والحسان. اجسامها كبيرة القند شديدة النشط. سواركها رفيعة. رؤوسها غليظة مستقيمة. مداخلها مستقيمة السبيبة. القيد. بلادها رعية. اذنانها كاسية مستطيلة السبيبة كا في الخيل. قوتها غليظة، مستعرضة القواعد، قوية التحصين، مننقة الى اللداء || انثاه تقصع ارباً واحداً

٢٩٣٩١ - نَوَارُ أَبَيْصَ هو الياسم ، اطليه .  
٢٩٣٩٢ - نَوَارُ الْكَيْلِ هو شب الليل ، اطليه .

٢٩٣٩٣ - نَوَارُ حَيْبِي ، كَيْرِيَه Carriera (S).  
Carrière (F).

شجرة برية وريسية من فصيلة النسيات . مهددا الصين .  
ساقها منتصبه زرقاء تمل من ه الى م . اثمارها واثانها  
حمر اللحاء . اوراقها عابله متعاقبة . نصلها اعليجي  
الشكل لامع البشرة على صفحتيه . ازهارها صندرة اللد ،  
عامة القعالات ، خاسية الفصل البيض ، كثيرة الاسدية .  
ثمادها جرداء وشمية الشكل ، ثلثية المصاريح || ثنورها  
يشتر طولك شهر حزيران .



نَوَارة

٢٩٣٩٤ - نَوَارُكَة Eutoca (F). Eutoca (E).

جنس نباتات عشبية حولية وبعمرة من فصيلة النسيات .  
انواعها المعروفة ١٢ جميعها امريكية العهد ، بعضها شائع  
الاستعمال التريزي || سرقها عفائية . اوراقها صندرة ،  
متعاقبة زياء المتصل . اثمارها جيلة ، خافضة السرف ،  
ملونة ، منها الازرق والاريجاني والايص || اشهر انواعها  
الزراعية التريزية نَوَارُكَة يورنجليانا (Eutoca Wrangeliana)

٢٩٣٩٥ - نَوَارُكَة ٥ Anthophora (S).  
Anthophore (F). Anthophora (E).

جنس شحرات جارسه لافعة من غشائيات الاجنحة  
الحبوبيات وفصيلة النواريات . انواعها المعروفة قليلة العدد  
منتشرة في جميع مناطق البلاد المعتدلة الحارة والحارة .  
قوتها رقيق الازهار وطلوها . ملجها الحياتي انمالي ||  
جسمها متوصل اللد قريب الشبه بحجم ذكر النحل .  
تتميز بكثافة الزغب الذي يكتنفها من قة الرأس الى طرف  
الطن || عثها عشاء تينبه بالعين في المواقع المهيورة  
اغصها الحيطان الخربة .

٢٩٣٩٦ - نَوَارُكُوس هو اسطرغالوس نواريس ، اطليه .

٢٩٣٩٧ - نَوَارُكِيَات ٥ Anthophoridae (S).  
Anthophoridés (F). Anthophoridae (E).

فصيلة شحرات جارسه لافعة من غشائيات الاجنحة  
الحبوبيات . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع  
اصقاع العالم باستثناء المناطق الباردة || ملاجها الحياتي  
تختلف مع اختلاف الاجناس ، بعضها جامعي والبيض  
الاخر انمالي . واجلها منها قليل المديد . الذكور  
والاناث تعمل في سبيل الحياة والبقاء اذ لا يوجد علامات  
كا في النحل || اشهر اجناسها النواركة والثائرة .

٢٩٣٩٨ - نَوَاس Fil d'araignée (F).

عيط المنكبوت ونسجه . وفي المثل اربي من نواس المنكبوت .

٢٩٣٩٩ - نَوَاسِجُ جَوِّيَة Perturbations atmosphériques (F).

هي التقلبات الجوية العارضة غير المألوفة . والنزعة هي  
الزوبعة من الرياح . ج نوج .

٢٩٤٠٠ - نَوَيرُ مُسَلِّح ٥ Neoborus ornatus (S). Néobore armé (F).

سمكة نهريه يبيض من مفتوحات الماء . موطنها بحيرات  
ومستطانات نهر الكنفو . تعيش بين الاعشاب المائية

ترضع نحو ٦ اشهر || موطنها فسح الارياض يشل كامل  
افريقية الشرقية والجنوبية وبعض البلاد الاسيوية .

٢٩٣٨١ - نَوَ اشْئَلُ الدَّبِّ Connochaetes gnou (S). Gnou à queue blanche, Antelope gnou (F).

نوع من النَوَ كير ابلجة طولها نحو ٢٥٠ سم . وارتفاعه  
١٣٥ ثوبه الى السرة الكستنية . ذنبه ابيض اللون .  
الانثى اصغر قدماً وقرناً من الذكر . ابلجه يد من ١٥ الى  
٥٠ نفراً || موطنه يشل ضفاف الوردج وسهوله .

٢٩٣٨٢ - نَوَ اشْئَلُ الْحَبِيحَة Connochaetes albojubatus (S). Gnou à barbe blanche (F).

اكبر انواع النَوَ جثة واقنها غلاظة واطيها عفرة ولحية .  
جسمه طويل نحو ٢٨٠ سم . ويرتفع نحو ١٤٥ قرنه  
انثى الالتشاب مدب الطرف الاحيجن . ثوبه الى السرة  
الحطية الصهباء المواج . عفرته شديدة السرة وتحللها  
سبب ابيض . طيته يضاء اللون ومنه غرب اسود الحية .  
ابلجه يد من ٨ الى ٤٠ نفراً . موطنه افريقية الشرقية حتى  
بحيرة فيكتوريا ليناوا .

٢٩٣٨٣ - نَوَ وسَج Connochaetes taurinus, C. gorgon (S). Gnou taurin, G. rayé (F).

نوع من النَوَ كير ابلجة غليظها ، طولها نحو ٢٢٠ سم .  
وارتفاعه ١٢٥ . ثوبه الى السرة الحطية يعلها تسليج  
الشب . ابلجه يد من ١٥ الى ٩٥ نفراً . يعيش برقعة  
النعام وجير الزرد || موطنه يشل معظم اقطار افريقية  
الجنوبية .

٢٩٣٨٤ - نَوَكة Noyau (F). Nucleus (E).

هي عضو الاستمرار في الخلية تركب من شبكة مكونة

في النشب الساعية في السائل النووي .

٢٩٣٨٥ - نَوَكة Noyau (F). Stone (E).

هي الصخرة ، اطنها .

٢٩٣٨٦ - نَوَكة النِقْل ٥ Barysphère (F). Barysphere (E).

نواة النخل اسم يطلق على كتلة الارض المركزية ذك

لان جميع مركباتها من الحادون الثقيلة الماتمة .

٢٩٣٨٧ - نَوَاكِين Nucléine (F). Nuclein (E).

هي عناصر نواة الخلية قد تكون ازوتية ودهنية وسفورية  
وكبريتية .... ويصنع منها دعاما تكلين .

٢٩٣٨٨ - نَوَاجِد أقصى الاضرار وهي اربعة في اقصى الانسان بعد الاضار .

وتسمى غرس الحلم لانه ينبت بعد البلوغ وكال العقل .

وقيل النواجد التي تلي الاثياب . وقيل هي الاضرار كلها  
نواجد . قال الجوهري : وقد تكون النواجد لغرس .

وهي الاثياب من الخلف والسوالغ من الظلف .

٢٩٣٨٩ - نَوَاسِخ Eperon (F). Spurs (E).

حلب مؤلفة تملر سوي بعض الحشرات .

٢٩٣٩٠ - نَوَار Anthophore (F).

نمت وصفي يطلق على كل عضو نباتي يعمل زهرة او  
عدة زهور .



نَوَيرُ مُسَلِّح

## ٢٩٤٠٦ - نُوتِيرِيَات \* Noteridae (S).

Notérídes (F). Noterídes (E).

فصيلة حشرات مائية من عُمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحارة || اجناسها صغيرة ، اعليجية الشكل ، مبدية ، تطول من ٦ الى ١٢ سم. رؤوسها قصيرة ، مستعرضة ، حيزتها صغيرة ، تأتقيرها وفكوكها قياسية. قرونها الاستشعارية شبه وشمية الشكل ، مركبة من ١١ فصلة. كواسلها مبدية و مستعرضة ، احادها لاسفة ، حادة للتخديد. قوائمها نشيطة ، الخلفية منها مجهزة لـهوم || جميعها مفترسة. تعيش في المياه الراكدة او الجارية البطيئة الانسياب || اشهر اجناسها النوتيرة ،

## ٢٩٤٠٧ - نُوتِدْ Calodon (S). Calodon (F).

جنس فطور من فصيلة الابريرات ، انواعه الحارة قليلة العدد اصطناعيا بعض اقاليم مناطق البلاد المعتدلة الحارة. جميع انواعه كاعنة الصفات لاماكولة. تتميز ببوطها الشفوي المتجميع المثلث ، وبسوطها القصيرة النصفية ، وينكاتها الخلودية المجددة الشبه ليلية المادة || اعراف انواعه واشهرها الاربدية التالية .

## ٢٩٤٠٨ - نُوتِدْ بُرْتَقَالِيّ اللون \* Calodon aurantiacum (S). Calodon orangé (F).

نوع من التوتد. يعيش في ظلال الصنوبريات. ساقه غليظة ، قصيرة ، صفراء اللون ، بترقالية الموج. نكته غذروفية الشكل ، كثيرة الحاداب الاستشعارية ، قطرها نحو ٨ سم. سطحها خمل بترقالي اللون. لحمية كالفلين ، صفراء اللون ، كاعنة الصفن ، غير مرغوب فيها .

## ٢٩٤٠٩ - نُوتِدْ حَدِيدِيّ اللون \* Calodon ferrugineum (S). Calodon ferrugineux (F).

نوع من التوتد. يعيش في ظلال الصنوبريات. ساقه قصيرة شبه غروطية الشكل ، لامتناهية السطح الخشن ، لونها الى الكستني الاسمر. نكته ريمية الشكل قطرها نحو ٨ سم. سطحها خمل البشرة ، متتابع الحاداب ، لونه الى الشقمة السمراء يعلوها تنقيط احمر يطقه الابيض || لحمية قاسية كالجلد ، كاعنة الصفن ، لا تؤكل .

## ٢٩٤١٠ - نُوتِدْ رَعَشِيّ \* Calodon geogenium (S). Calodon terrestre (F).

نوع من التوتد. يوجد في الغابات. يعيش في الموامق الرملية المشاة بالطحالب. ساقه شديدة القصر تؤلف مع النكته شكلًا شبيهًا بالقعر الثلاثي الاحاديد. قطر النكته نحو ٢ سم. لونها كالكاس الى الصفار الكبريتي || لحمية كاعنة الصفن ، لا تؤكل .

## ٢٩٤١١ - نُوتِدْ عَدَبْ \* Calodon suaveolens (S). Calodon suave (F).

نوع من التوتد. يعيش في ظلال الصنوبريات. ساقه قصيرة ، غروطية الشكل ، رباعية الحاداب المستطيلة ، لونها الى الزرقعة السمراء. نكته قمية الشكل ، كثيرة الحاداب الجانبيه والبطيحية ، قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصبغة يعلوها تشبيح ازرق ومواج اسف || لحمية جلدية المادة ، كاعنة الصفن ، غزامية الرائحة العذبة ، لا تؤكل .

قوتها الاسماك والدوابات والذماميس والديدان || جسمها مسطد الجرم ، مستطيل الشكل ، يطول نحو ٣٥ سم. رأسها غروطي. عظمها مستطيل كالجلد. فكاهما مسلحان بامتان قوية ذرية. صيادها صامتان. زعنفتها الظهيرية الاولى كبيرة لقد شراعية الشكل. التالية جدعة. زعنفتها الصدرية والغروصية والشريعية معتدلة القد. الذيلية كبيرة ، فارقة. ثوبها الى الشبهة البنفسجية الموج. جانبها الى الخضار الزيتي الموشح بالفضي. يلقها الى النبرة المنجية || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

## ٢٩٤١٢ - نُوتوسِيرَة Notoceras (S). Notocère (F).

جنس نباتات عشبية برية ، حولية ومحولة وبمعمة من فصيلة الصليبيات ، انواعها المعروفة عديدة اصطناعيا فصيحة الاربعة تمتد من البلاد الحارة الى الباردة || سرقها زهاب متعبية او سلتقية ، فراءه او قليلة الفروع ، اوراقها كاملة ، متعاقبة ، سناينة الاتصال . ازهارها صغيرة يضاء اللون او تينية او صفراء .

## ٢٩٤١٣ - نُوتِيلِيَات \* Nautilidae (S).

Nautilides (F). Nautilides (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات واسيات الاريل ورياحيات الخياشيم. اجناسها وانواعها المنقرضة القادرة كثيرة المدد ، اما المعاصر منها فجنس واحد موثق المحيط الهندي والبحار المجاورة. يدعى نوتية .

## ٢٩٤١٣ - نُوتِيلِيَة \* Nautilus (S).

Nautilé (F). Nautilus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات واسيات الاريل ، رياحات الخياشيم وفصيلة النوتيات || انواعها المعاصرة المعروفة ثلاثة اصطناعيا المحيط الهندي والبحر الاحمر || اصداها كبيرة ، شبه قروصية الشكل ، معتدلة التبليط. اجسامها غروطية ، صغيرة الرءاء. رؤوسها صغيرة. حيزتها كبيرة جاسطة ، لولاسها عديدة ، فسيحة ، ونسها اثنتان مجهزتان بما يشبه الهامج. اصطناعيا نشيطة وقوية || اشهر انواعها واكثرها انتشارًا النوتية الباعة .

## ٢٩٤١٤ - نُوتِيلِيَة لَمَاعَة \* Nautilus pompilius (S). Nautilé flamé (F).

نوع من النوتية يكثر وجودها في بحار الهند. اصداها لامعة ، لؤلؤية الصفحات الداخلية ، لونها الى البياض المزدج بالصنابي || لحمها مأكولة . اصداها مرغوب فيها شائعة الاستعمال الصناعي .

## ٢٩٤١٥ - نُوتِيرَة \* Noterus (S).

Notère (F). Noterus (S).

جنس حشرات مائية مفترمة من فصيلة النوتيريات ووتية غديات الاجنحة. انواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة من اليابان الى اوروبا. تألف المناطق ولواء الراكدة || اجسامها صغيرة ، اعليجية الشكل ، مبدية ، تطول من ٧ الى ١٠ سم. رؤوسها مستعرضة ، قليلة التشوثر. حيزتها صغيرة بارزة. تأتقيرها وفكوكها ولامسها قياسية. قرونها الاستشعارية وشمية الشكل. كواسلها مستعرضة ، احادها لاسفة ، عديمة التخديد. قوائمها نشيطة ، الخلفية منها مجهزة لـهوم. ألوانها سوية الخضاب الكستني او الجلوي || الجملانة قانصة والبرقة ايضا .



نوتية لَمَاعَة



نوتية



نوتد بترقالي اللون



نوتد حديدِيّ اللون



نوتد رمل



نوتد عَدَبْ



نوري



نوسة الاجاص



نوسة الاجاص



نوسة الحفصيات



نوسة

مظهره الخارجي يقع رادية اللون أو يضاف لا قياسية الشكل والحجم تركيب نصل الاوراق وسفحات الحاء الادبية تحطبا بعد ان تقضي على النسيج والخلايا. وقد يتركب كالأوراق الناجية فيشبه البشرة ببقعه أسمر دون أن يؤدي لياب السورق. يكالكت كثير من الفطور التي تتصلب الكبريت والنحاس .

### ٢٩٤٢٣ - نَوْسَة الحُمْصِيَّات \*

*Oospora citri-aurantii* (S).  
فطر مجهرى صمم الانتشار يركب ثمار الحفصيات المدركة وأخفوفة على اختلاف انواعها || يصيب الفطور فيفسدها بعد ان يغطي النسيج والخلايا التي تنمل وتنفذ خاصة الألباك || يكالكت بتغير الثمار المدة للحفظ او للتصدير وابتجاب الاماكن الحارة الشبه الرطوبه .

### ٢٩٤٢٤ - نَوْسَة \* *Nasiteria* (S). *Nasiteria* (F).

جنس طير من السلقفات وفسيلة الببهارات. انواعها المروفة ١٢ موطنها غينية الجديدة وجزر سليمان. تألفت الفايات الكثيفة الاشجار والمواقع القريبة من الماء. ملجئها الحياني جماعي. قوتها الثمار واسارع الحشرات. تنسل الاشجار كالنفاار وتغير بصفة الدورى || اجسامها صغيرة و ربة، تطول من ٨ الى ١٢ سم. اجتمعتا لاسفة، اذناها قصيرة مستنيرة الاطراف. الثوايا تختلف مع الانواع، جميعها زامرة الالوان || اشهرها النوسة الفترية.

### ٢٩٤٢٥ - نَوْسَة قَرَمَة \* *Nasiteria pygmaea* (S).

*Nasiteria pygmaea* (F).  
طائر من النوسة. جسمها صغير القد يطول نحو ٨ سم. ثوبا الى الخضار المتفاوت المجات. رأسها ومقنعا صفر. رفاك ذئبا الجانيية الى السواد اللامع باستثناء الزايم الاخير فانه اصفر، اما الرقار السواد فزرقاء اللون.

### ٢٩٤٢٦ - نَوْسَل \* *Métamère* (F). *Metamere* (E).

### ٢٩٤٢٧ - نَوْسَكَة \* *Métamérie* (F). *Metamerism* (E).

*Oosporées* (F). *Oosporae* (E).  
نوسة الحفصيات من فصيلة النوسيات. اجناسها ستة : الابداد والنسج والسداع والسيلنديوم والمونليه ونوسية .

### ٢٩٤٢٩ - نَوْسَادِير \* هو الامونيك ، اطلبه .

### ٢٩٤٣٠ - نَوْشَان \* *Rhinocéros de Sumatra* (F).

هو كركدن سومترا ، اطلبه .

### ٢٩٤٣١ - نَوْص \* النوص هو الحمار الوحشي .

### ٢٩٤٣٢ - نَوْص ، بَتَل \* *Imbiber* (F).

ربط الشيء بالماء أو بأي سائل آخر . *To imbibe* (E).

### ٢٩٤٣٣ - نَوْصَرَة \* *Diopsis* (S).

*Diopsis* (F). *Diopsis* (E).

جنس حشرات من فصيلة النوصريات ورتبة ذوات الجناحين انواعها المروفة ستة اعطائها البلاد الحارة || اجسامها مضمورة ، هيفاء ، تطول من ٨ الى ١٢ سم. رؤوسها مكورة تملوها زائلك متفرجة الانشعاب تحمل في الحارها الزباني واليون . حينها بارزة صغيرة . قرونها الاستشعارية صغيرة، تحيلة ، تستيق العين . اعطائها ولباسها صغيرة . كولها

### ٢٩٤١٢ - نَوْجَل \* *Heteropogon* (S).

*Hétéropogon* (F). *Heteropogon* (E).

جنس نباتات عشبية حولية وركوبية من فصيلة النجيليات انواعها المروفة نحو ٢٥ اعطائها البلاد الحارة والمتندة الحارة . سوقها جامدة تحيلة عاصمة الفروع . اورتها صلبة . انزهارها سنبل التجميع سنابلها فردية . بعضها ينبت طويلا في بعض مواقع الساحل البناني والوسط .

### ٢٩٤١٣ - نَوْجَة \* *Ecade*

نتيجة البنية الوضعية في التكيف او التبدل . كترك نوسة الظل والشمس والجفاف والرطوبة ...

### ٢٩٤١٤ - نَوْر \* هو الفص ، اطلبه .

### ٢٩٤١٥ - نَوْرَة \* *Corymb* (F). *Corymb* (E).

النورة والعدق شكل من اشكال الانزهار صيولا التركيب عديد الانزهار المتشابهة الجعد من المخور الرئسي . يترك في القصيلة الوردية || والنورة هي الزهرة .

### ٢٩٤١٦ - نَوْرَج \* هو الجرجس والحال ، اطلبها .

### ٢٩٤١٧ - نَوْرَس \* *Mouette* (F).

هو نرج الماء ، اطلبه .

### ٢٩٤١٨ - نَوْرَسِيَّات \* *Laridae* (S).

*Laridés* (F). *Laridae* (E).

فصيلة طير من كفيات القدم و طويولات الرئش . اجناسها وانواعها المروفة عديدة || اجسامها متباينة الحجم . اجتمعتا مستطيلة ذقعة الاطراف . متاقدها عاصمة الزفد . اصابعها نصفية الخطاب . قصاصها جهاز يزويجن من الفراض الجانيية || زوج اين وزوج ايسر || اشهر اجناسها النورس وزنج الماء والنجموم .

### ٢٩٤١٩ - نَوْرِي \* *Nuris* (S).

*Nurie* (F). *Nuris* (E).

سمكة نورية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الشبوطيات . موطنها انهر الهند || جسمها وشي الشكل يطول من ٤٥ الى ٥٥ سم. رأسها مثلث الجرم ، مقطوع الخلف . شفتها معتدل الانفراج ، رباعي الذبابت المستطيلة . عينها ماحتان . زعنفتها الظهرية غشائية الازنكاز تقابل الشرة . الذيلية مقعرة الطرف . ثوبا الى الخضار البحري ينير وتعلو ساحة وردية في البطن ويسمر ويبقى في الظفر || لحمها متوسط الصفت ، مأكول .

### ٢٩٤٢٠ - نَوْرِيَّة \* *Pétale* (F). *Petal* (E).

هي بتلة الزهرة عامة وقد تستعمل تخصيصا للدلالة على البتلة المستقلة .

### ٢٩٤٢١ - نَوْسَة \* *Oospora* (S).

جنس فطور مجهرية من النوسيات وفصيلة النوسيات تتميز بحشيشها النجيل النراس المتشابه للتركيب الذي يضمن النسخ المشاهدة ويتكاثر خارجيا . جرابها الكندي متدالي الشكل . كتانه سببية التجميع || انواعها عديدة ، معظمها دمي يعيش على المواد الغذائية المخففة وعلى الاخشاب اليابسة وفي التربة || اعرف انواعها المؤذية ما يلي .

### ٢٩٤٢٢ - نَوْسَة الاجاص \* *Oospora piricola* (S).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق الاجاص وانفاده وثماره .

**٢٩٤٤٢ - نُؤُفَرُ أَزْعَب** (S). *Nuphar pumilum* (S).  
*Nufar nain* (F).  
 نوع من النوفر المبلول . أعطاه مياه البلاد المحتلة الحارة .  
 أوراقها تطلو من ٥ الى ١٥ سم . وتعرض من ٤ الى ١١ سم .  
 أزهاره صفراء اللون صغيرة القد ، قطرها يراوح  
 من ٢ الى ٣ سم . || تنوره يستمر من حزيران الى آب .

**٢٩٤٤٣ - نُؤُفَرُ أَصْفَر**  
*Nuphar luteum* (S). *Nufar jaune*, *Lis jaune des étangs*, *Plateau* (F). *Yellow water-lily*, *Brandy-bottle* (E). *Gelbe mummel*, *G. wasserrose* (D). *Ninfes gialla*, *Ercules gialla* (I).  
 نوع من النوفر المبلول في مياه البلاد الحارة . أوراقه كبيرة  
 النصل الاخضر الباهت ، تطلو من ١٥ الى ٣٠ سم .  
 وتعرض من ١٥ الى ٢٠ سم . أزهاره صفراء اللون متراكبة  
 الثلاث المدينة الصفون قطرها يراوح من ٥ الى ٧ سم .  
 ثماره اجاصية الشكل . بلوره ويذاويه مأكولة || ينور  
 من حزيران الى ايلول .

**٢٩٤٤٤ - نُؤُفَرُ سَهْمِي**  
*Nuphar sagittaeifolium* (S). *Nufar sagittal* (F).  
 نوع من النوفر الامريكي ، أوراقه سهمية الشكل تطلو  
 من ٢٠ الى ٤٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ . أزهاره صفراء  
 اللون متوسطة القد قطرها يراوح من ٤ الى ٦ سم . || تنوره  
 يستمر من حزيران الى آب .

**٢٩٤٤٥ - نُؤُفَرُ يَابَانِي**  
*Nuphar japonicum* (S). *Nufar japonais* (F).  
 نوع من النوفر البحري في الأوفر النشط والنبو . مهد  
 اليابان ، أوراقه اهلجية الشكل . نصلها اخضر الصفحة  
 العليا ، احر السفلى يطول نحو ٣٠ سم . أزهاره كبيرة  
 القد صفراء اللون تملوها نجمة حمراء . اسديها وبأربها  
 ارجوانية || تنوره يستمر طوله فصل الصيف .

**٢٩٤٤٦ - نُؤُفَس**  
*Bronze*  
 سبيكة ، متضادة اللبس ، من النحاس والتصدير والزنك .

**٢٩٤٤٧ - نُؤُفَصِيَّات**  
*Dibamidae* (S). *Dibamidés* (F). *Dibamidae* (E).  
 فصيلة حيوانات زساق من العظائيات قصيرات الالسن .  
 انواعها المعروفة ثلاثة يصممها جنس واحد . اعطائها بعض  
 اقالم افريقية الاستوائية || جميعها جاسة تسرح في الليل  
 وببيت في النهار || اجسامها دودية الشكل تطلو من ٢٠  
 الى ٢٨ سم . وهي عادمة القوائم الامامية ، ماصحة الخلفية .  
 عيونها طامسة تلحفها اغشية غبيشة .

**٢٩٤٤٨ - نُؤُكَّة**  
*Nucula* (S). *Nucule* (F). *Nucula* (E).  
 جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الخياشيم  
 وفضيلة التوكليات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد  
 منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || اصداها  
 شبه مخروطية الشكل ، متساوية المصاريح ، لاشاوية  
 الاصلح . الوانها عديدة ينفذ فيها الاخير ثم انبي الفاتح .  
 اصفاها للؤلؤية الماددة من الداخل || تمشي منعزلة في  
 الرمال المتوسطة الغور .

**٢٩٤٤٩ - نُؤُكِّيَّات**  
*Nuculidae* (S). *Nuculidés* (F). *Nuculidae* (E).  
 فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الخياشيم .

شبه اهلجية ، مجهزة باربعة منخاس ذرية . بطونها شبه  
 مدقية الشكل . رواشتها شغافة يملوها بعض البقع السمر .  
 قوامها مستطيلة || الجملانة واشمة اما البرقة فخاخلة  
 ترقيب في عصف التجليات .

**٢٩٤٤٤ - نُؤُصْرِيَّات**  
*Diopsidae* (S). *Diopsidés* (F). *Diopsidae* (E).  
 فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها  
 المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة ||  
 اجسامها صغيرة تطلو من ٥ الى ٨ سم . رؤوسها مستدلة  
 الجرم مجهزة بزوائد سننية الارتكاز ، منفرجة ، مستطيلة ،  
 تحمل الميون في اطرافها ، عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية  
 صغيرة تنشب في الزوائد قرب محيط العين . كراسلها شبه  
 يغبية . بطونها مستعرضة المؤخر . اجنحتها شغافة يملوها  
 بعض البقع السمر . قوامها مستطيلة || يرقاتها خاخلة  
 تتركب عصف التجليات || اشهر اجناسها النوصرة .

**٢٩٤٤٥ - نُؤُصَلَة**  
*Venericula succenturié* (F).  
 احد اجزاء جهاز الهضم عند الطير . اوها الحوصلة ثم  
 النومة ثم القاذصة ثم الامعاء || فالخوصلة هي الجراب الاول  
 الذي يلي المريء . يجتمع فيه الطعام بعض الوقت ثم ينتقل  
 الى النومة (البطين العصاري) وفي جراب مستطيل يفرز  
 العصارة الخاصة حل الاطعمة من حب وغيره التي صار  
 تليينها بالخوصلة ثم ينتقل الطعام من النومة الى القاذصة  
 حيث يسحق مع الحصى والرمول ويدخل في الامعاء حيث  
 يتم الهضم والنبذ .

**٢٩٤٤٦ - نُؤُطُور**  
*Nothure* (F).  
 طائر يدعى نظوره ، اطلبه .

**٢٩٤٤٧ - نُؤُوع**  
*Espèce* (F). *Species* (E).  
 النوع هو جاع الفروبو اي جملة الافراد المتشابهة التي  
 تعددت من اصل واحد او جديدا مشتركة .

**٢٩٤٤٨ - نُؤُوعَم**  
*Cystoseira* (S). *Cystoseire* (F). *Cystoseira* (E).  
 جنس نباتات بحرية من الخياشيم السمر . انواعها المعروفة  
 نحو ٣٠ اعطائها معظم بحار العالم || كلالها قصيرة .  
 سويها فزها . أوراقها خيطية ، صغيرة . كثيرة العدد ،  
 متراكبة . تتميز بمحوصلاتها الشبه بضيصة الشكل ،  
 السبيعية التجميع .

**٢٩٤٤٩ - نُؤُوعِي**  
*Spécifique* (F). *Specific* (E).

**٢٩٤٤٠ - نُؤُوكَة**  
*Cardiosperme* (F).  
 هي البكت ، اطلبه .

**٢٩٤٤١ - نُؤُؤَر**  
*Nuphar* (S). *Nufar*, *Nuphar* (F).  
 جنس نباتات عشبية جيمورية مائية من فصيلة النوفريات .  
 انواعها المعروفة ١٥ اعطائها مياه انهار واحوار وبعض  
 بحيرات البلاد الحارة والمعتدلة . جملامير مدادة . أوراقها  
 مستطيلة الاعناق طافية . أزهارها عديدة الثلاث المتتامة  
 الصفون . ثماره جراه ريمعية الشكل ، بزورها نشوية  
 الماددة || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .



نوعم



نوفر



نوكلة

اما انواعها فكثيرة . اعطائها بلاد امريكا الجنوبية . نباتاتها عشية وبينية ، معظمها بري وبعضها ترابي . اشهر اجناسها النولان .

٢٩٤٥٦ - **نُولِيْنَا** ٥  
Nolina (S), Nolina (F).  
جلس نباتات من فصيلة الزنبقيات معروفة بالتعرف على اسم البوتاني الفرنسي ونولان . انواعها المعروفة قليلة ، منها بلاد المكسيك . سورها ليفية التركيب ، لفتية الجذع ، والقاعدة ، دقيقة الجذع . اوراقها خيشة النصل ، مستطيلة متعقبة . ازهارها جرسية الشكل ، حنطية التجميع ، هامة الانكاز || ترطب في الازرة الفنية المتوسطة الانساج والمادة الكلسية . تحشى الموانع الباردة والرطوبة المستحكمة . اشهر انواعها الزنبينة ما يتبع .



نولان

٢٩٤٥٧ - **نُولِيْنَا مُعْتَبِتَة** ٥  
Nolina recurvata (S), Nolina arquata (F).  
نوع من النولان الزنبينة ، ساقها تعلو من ٤ الى ٦ أمتار . اوراقها جميلة الخضار تعلو نحو ١٠٠ سم . وتعرض ٢ سم . ازهارها هامة بشكل الساق بمقدوره للتشعب الكبير الحجم . ازهارها بيضاء اللون . تنموها يستمر طوال الصيف .

٢٩٤٥٨ - **نُولِيْنَا مُسْتَطِيلَة الورق** ٥  
Nolina longifolia (S), Noline à longues feuilles (F).  
نوع من النولان الزنبينة ، ساقها تعلو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها شديدة الخضار السابق تعلو من ١٥٠ الى ١٥٠ سم . وتعرض نحو ٢ سم . ازهارها هامة الانكاز يتوج الساق بمقدوره للتشعب الكبير القد . ازهارها بيضاء اللون ، غبراء الموالج . تنموها يستمر طوال الصيف .

٢٩٤٥٩ - **نُولَمَان ، حَشِيْشَة الحثق**  
Herniaria (S), Herniaire (F).  
جلس نباتات عشية بريّة من فصيلة النولانيات . انواعها المعروفة ثمانية تكثر في الاماكن الرملية الجافة . سورها فراء اوراقها متعاقبة لائحة صغيرة القد . ازهارها ابطية الانكاز او تاجية . ثمارها بدور نشوية المادة || اشهر انواعها النولان امرد .

٢٩٤٦٠ - **نُولَمَان اَمْرَد \* حَشِيْشَة الحثق المزدكاه ، ثَبَات الخبيخ**  
Herniaria glabra (S), Herniaire glabre, Herniole, Herbe au cancer, Turquette (F), Rupture-wort, Turk's herb (E), Glattes bruchkraut (D), Ernliaria, Erba turchesta, Erniola (I).  
نوع من النولان العشبي البري الطبي المعمر . ساقه فراء مرطاه ، اوراقه صغيرة القد ، متعاقبة ، لائحة ، يضيء النصل ، مائلة البشرة . ازهارها ابطية وتاجية الانكاز ، نورية التجميع ، صغيرة الحجم || كان شائع الاستعمال في علاج الحثق .



نولان امرد

٢٩٤٦١ - **نُولَمَانِيَات**  
Illecebracae (S), Illecebracae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة القنالات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . نباتاتها اشباب حولية وعمرة تعيش في الماراض الحارة وفي الازرة الخفيفة الرطوبية . اوراقها كاملة . ازهارها غسية التجميع لا تقياسية الانكاز . ثمارها بدور نشوية المادة . || اشهر اجناسها النولان والحربط والشعير وحشيشة القنبازيل .

اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . انواعها النابرة من متحجرات اقدم التكاوين الجيولوجية . اما المحاصرة فمتشرة في معظم بحار العالم || اصنافها شبه غرطية الشكل ، متساوية المضارب ، لامتناهية الاصلح . اصنافها خشفة ملوثة من الخارج ، مائلة للزئونة من الداخل . حيواناتها ماصة اللثاع ، كبيرة الاصلح الاحليلية المستطيلة || اعرف اجناسها المحاصرة واشهرها النوكلة .

٢٩٤٥٠ - **نُولَان** \*  
Nolans (S), Nolane (F).  
Nolans, Chilian bell-flower (E), Glockenwinde (D), Nolans (I).  
جلس نباتات بريّة وزراعية تربينية من فصيلة النولانيات . انواعها عديدة منها العشبي والجبلي والحولي والحول والممر . سورها لا نظامية الجلوس منها المتصصة والمستطيلة والمندادة . اوراقها كاملة معتقة متعاقبة او توبلية . ازهارها فردية التجميع ، محورية الانكاز ، جرسية الشكل ، فائقة الاطراف كالبرق . ثمارها نورية لا تقياسية الشكل والحجم . بلورها غشبية المادة . شديدة الصلابة || اعرف انواعها الزنبينة واشهرها ما يتبع .

٢٩٤٥١ - **نُولَان مِرْمِيْهِ لَوْرَق**  
Nolana aspicifolia (S), Nolane à feuilles d'archoche (F).  
نوع من النولان الزنبيني الحولي . موطنه الاصل بلاد كولومبيا . ساقه مستطيلة مدادة زياء اللحم . اوراقه الجلفية كبيرة القد مرمية الشكل . ازهاره زرق الايقاق ، صفر الانابيب والفجاج || تنموه يستمر من حزيران الى تموز .

٢٩٤٥٢ - **نُولَان صِنَائِي الورق**  
Nolana lanceolata (S), Nolane lancéolée (F).  
نوع من النولان الزنبيني الحولي . موطنه بلاد الشيلي . جلعه جني الجذر . ساقه مفصلة زياء . اوراقه لائحة ، ساعدة ، صنيابة النصل ، خلية البشرة ، الجلفية منها ضمية التجميع والاخرى توبلية . ازهاره كبيرة القد صانجوية الايقاق ، صفر الفجاج والانابيب المسجلة بالنفسي . تنموه يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٩٤٥٣ - **نُولَان مُتَنَاقِض**  
Nolana paradoxa (S), Nolane paradoxale (F).  
نوع من النولان الزنبيني الحولي السبروتي . موطنه الاصل بلاد البرازيل . ساقه متصصة فراء . زياء اللحم ، تعلو نحو ٣٥ سم . اوراقه توبلية ساعدة ، نصلها مسوية الشكل ، خلي البشرة . ازهاره بنفسجية الايقاق ، صفر الانابيب ، حر الفجاج || تنموه صيني يستمر نحو ٥٤ يوماً .

٢٩٤٥٤ - **نُولَان مُسْطَح**  
Nolana prostrata (S), Nolane couchée (F).  
نوع من النولان الزنبيني الحولي السبروتي . موطنه الاصل بلاد البرو . ساقه مستطيلة مدادة . اوراقه معتقة متعاقبة ، نصلها اهليلجي الشكل ، مائل الصفحة ، جبل الخضار الزاهي . ازهاره زرقاء اللون ، مستنقة بالنفسي كورسها هرمية الشكل ، حاسية الفصوص المتساوية الزخبة الاطراف . تنموه يستمر من حزيران الى تموز .

٢٩٤٥٥ - **نُولَمَانِيَات**  
Nolanaceae (S), Nolanacées (F), Nolanaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها ثلثة العدد .



2٩٤٧٤ - نِيْسَالَة ٥ Orogenèse, Orogénie (F).

النياقة فرع من الجيولوجية والجغرافية الحكيمة يبحث في تكوين الجبال انطلاقاً من السدانة والكثافة .

2٩٤٧٥ - نِيْسَاهَة ٥ Zoogenie (F), Zoogeny (E).

النياقة فرع من الزولوجية يبحث في نشوء الانواع الحيوانية وفي مدارج نموها .

2٩٤٧٦ - نِيْسَة Animus (F).

هي الدافع الباطني الحقيقي للعمل .

2٩٤٧٧ - نِيْسَة التَدَلِيْس ، نِيْسَة الدُش ٥

Conallum fraudis (F). هي قوة اجرامية يستدل عليها من معرفة المدين مدى الضرر الذي يلحق بهدائه عند قيامه بعمل يحمله مغمراً او يزيد في افساره .

2٩٤٧٨ - نِيْسَة التَمَلُّك Animus domini (F).

هي ان يتصرف المرء في المال كتصرف المالك له سواء كانت ملكيته صحيحة ام غير صحيحة .

2٩٤٧٩ - نِيْتَرَات Nitrace (F).

النترات ، كبريتات ، ملح يحصل من تآكسد الحامض النيتريكي مع احد الاجسام . وهو من الاسمدة الازوتية المشهورة الشائعة للاستعمال نظراً لسرعة انفعاله في التربة وقرب متناوله من النبات الذي يمتلأ به دون جهد او عناء . النترات او الاسمدة النيتراتية عديدة غثلة التراكيب والمصادر اعرفها واشهرها استعمالا ما يتبع .

2٩٤٨٠ - نِيْتَرَات الامُونِيَاك ، نِيْتَرَات الشُكَار ٥

Nitrace d'ammoniaque (F). احيدت الاسمدة الازوتية التركيبية يستحضر من تفاعل الحامض النيتريكي مع الامونياك . يحوي نحو ٣٥٪ من الازوت الصافي منها ١٧.٥٪ ازوت نيتريكي و ١٧.٥٪ ازوت امونياكي . لذلك فهو يجمع بين سرعة انفعال وتحميل النترات وبين بقاء انفعال وتحميل الامونياك الذي يوافق القسم الاكبر من دورة النبات الشولية او الحولية .

2٩٤٨١ - نِيْتَرَات البوتَاس Nitrace de potasse (F).

سماد ازوتي بوتاسي يستحضر من تكرير ملح الباريوم وتصنيعه مع البوتاس . يتميز بفائدة لسية رزقه اي لا تفوق ٤٪ وهو يحوي من ١٢ الى ١٤٪ من الازوت النيتريكي ومن ٤١ الى ٤٦٪ من البوتاس . اظهره الخارجي ملح متبلور ابيض اللون . ارتفاع نمته يجعل استعماله محصوراً بزيادة الارزاق .

2٩٤٨٢ - نِيْتَرَات الجير ، نِيْتَرَات الكِلْس ٥

Nitrace de chaux (F). سماد كبريتي مركب من تآكسد الحامض النيتريكي مع الكلس . وهذا الحامض النيتريكي يستحضر اما مباشرة بتسليط القوس الكهربائي على الازوت الجوي او باكسدت الغاز الامونياكي . يسهل استعماله من ازوت الجو . وهو يحوي ١٥.٥٪ من الازوت النيتريكي ونحو ٢٨٪ من الكلس . تألفه مع الكلس يجعله اسرع الاسمدة انفعالا وتحميلاً واكثرها ملائمة لجميع الارزاق . اما محاذيره فهي سرعة تحمله وتقلصه من التربة ، ارتفاع نسبة رزقه التي تبلغ ٥٥٪ . عدم قابليته للزج مع الاسمدة الاخرى

2٩٤٧٢ - نُؤُون الدن هو الحوت . ج نينان وأنون .

2٩٤٧٣ - نُؤُون بَحْرِيّ Anguille de mer (F).

سمكة بحرية تدعى زرقونية مبنولة ، اطلبها .

2٩٤٧٤ - نُؤُونَة ٥ ، أَفِيَا Aphya pellucida (S).

Athérine naine, Nounat (F). Atherine (E).

سمكة وصيدة الجنس والنوع من فصيلة القويبيات . جسمها عادم السيف ، صنبر القد ، دقيق الشكل ، يطول نحو ٥ سم . اكثر وجودها في بعض الانواع قرب الشطوط اللبنانية . وهي من الاسماك المأكولة المتوسطة الصنف .

2٩٤٧٥ - نُؤُونَة ٥ Phytogénésie (F).

Phytogenesy (E). النوعة نمو النبات وشماحه .

2٩٤٧٦ - نُؤُونِيَات Pleosporaceae (S).

Pleosporaceae (E). فصيلة الفطور النورية من رتبة الزقيات .

2٩٤٧٧ - نُؤُونِيّ Nocléaire, Nocléal (F).

2٩٤٧٨ - نُؤُونِيّ Drupe (F). Any stone-fruit (E). كل ثمرة لحية ذات نواة اي عصبة كالشمشة والوزة يكون فيها السويق اي الجزء المتوسط الكائن بين القشرة والعصبة لحس التركيب ، ويكون الجزء الداخلي الذي يحيط بالبررة قاسياً صلباً كما في عصبة الزيتون والخوخة ...

2٩٤٧٩ - نُؤُونِيّة Oospore (F). Oospore (E).

النوية بويضة غقيات الوليج .

2٩٤٨٠ - نُؤُونِيّ ٥

هو النسيج اي صوت اليوم . قال الاعشى يصف نلاة :  
ولا يسمع المرء فيها ما يؤنس  
بالليل الا نعيم اليوم والوضا ٥

2٩٤٨١ - نُؤُونِيَات ٥ Unionidae (S).

Unionides (F). Unionides (E).

فصيلة حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحيرات وانهار العالم اصادفها نظامية ، متساوية المصارع ، لامتساوية الاصلع ، ملونة ، ينشأ ادمه غشراً . اجناسها صاحبة المناسيب ، مستطيلة الاربعيل الصفيحية الشكل ا اعرف اجناسها واشهرها النيسادة والندرية والمربنة والمربنة والوثينة والمربنة .

2٩٤٨٢ - نُؤُونِيَادَة ٥ Unio (S).

Mulette (F). Unio (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة النياتدات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠٠ منتشرة في جميع انهر العالم ونهراته اصادفها كبيرة القد او متوسطة ، بيضية الشكل ، متساوية المصارع ، ينشأ من الخارج ادمه يكثر فيها اللون الاخضر وينشأ من الداخل طبقة صميكة لزولية المادة شائعة الاستعمال الصناعي ا تعيش منعمة في الاسمال والارمال .

2٩٤٨٣ - نُؤُونِيَادَة ٥

النباط نجمان نيران من كوكبة برج العقرب موقعها قدام القلب وحلفه .



نِيَادَة

٢٩٤٩١ - نَيْثُون شير متن .

٢٩٤٩٢ - نَيْثَة Curure (F), Dirt, Muck (E).

وسل مستخرج من قنّاء أو خندق .

٢٩٤٩٣ - نَيْثِدِيَّات Phrynomeridae (S).

Phrynomeridae (F), Phrynomeridae (E).

نفسلة حيوانات درداء قاربة شاجرة من لة الخديجات وبرتية السفينات وبرتية البتروات أي عديمات الذنب || اجناسها وانواعها قليلة العدد مهدها بلاد افريقية الشرقية والجنوبية . جميعها من الصفاد الصغيرة القذ . تتميز بمساوات سطح ظلي قوسها الصدري في مركز تلاقيها وينتد التتوات العظمية الجانبية في فقرة العجز . وروسها صلبة . فكوكها العليا مسننة . اصابع قوائمها الامامية والخلفية طويلة من كل صطاب تحمل في اطرافها طباب محمية تمكّنها من لسق سطح اللثة . جلودها مائسة ، عادية الثقل ولكنها تفرز من عند القبط عليها ، مادة كاثوية تعمل في اليد ما يفسله نبات القراص المحرق || انواعها مختلفة الالوان يكثر فيها الاسمر الداكن والرقشة الصفراء وبعض الخطوط القاطبة || مسلم انواعها يعيش على النباتات والاشجار القريبة من الماء .

٢٩٤٩٤ - نَيْثَر Propagule (F).

النّثر جهاز التناسل عند الطعالب . وهو مركب من عدة حبيرات زبدية ، وشية الشكل اكر علمية . يسقط عند الادراك اتمام فينش في التربة ويميد البورة الحياتية .

٢٩٤٩٥ - نَيْدِيَّة Melanargia galathea (S).

Mélargie galatée, Demi-douil (F).

Melanargia galathea (E).  
حشرة من فصيلة الهانبات وبرتية حرشيفيات الاجنحة . موطنها يحد من الشرق الاوسط الى معظم الاقطار الاروية . قوائمها واثمة قوتها مشر الاثراء . سرقتها تعيش على عصف الذكيتل والرفول والصوية والنت جسمها متورس القذ يعطو نحو ١٨ م . يسطها نحو ٤٨ م . واسها الى الربعة . حينها كبيرتان . زبانا صويلانيان اسودان . جوشها الى الربعة السوداء . يعطها الى الربعة ، وراشها ، عند الشقين ، الى البياض الاثير يطلو تبيج وتزويق وتتميز اسود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح من النفوس الى قضة الجبل . تماثل بعد ظهورها بنحو ثمة اسابع وتمتد المكان لطخا على الصفحات السفلى من لصال الصف || السرعة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٢ م . جسمها اسطواني الشكل . قشارها نام الحمل القصير . قوتها الى الربعة الخضراء يطلوها غطان جانبيا اصفران وسط نجسي اسود . واسها اسود . شريحها ينتهي بزايدة مغلقة . مدها ودواجها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي في التربة ضمن غلاف عضوي المادة .

٢٩٤٩٦ - نَيْدَة Neda (S), Neda (F), Neda (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدهيات الابريل خلفيات الخياشيم وفصيلة الكتيقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط . تعيش لاصقة بالصخور القريبة من الشواطئ || اصداها داخلية ، مستديرة ، رقيقة ، شديدة الصغر . اجسادها نحيلة ، مستطيلة ، مدهية المقدم والمؤخر . اعطائها



نيل



نيدة

اجناسها السورفوفغات ونثرات الصودا وسلفات الامونيكا والاسمدة العضوية .

٢٩٤٩٣ - نَيْثَرَات الشيلي ، نَيْثَرَات الصودا الطبيعي

Nitrate de soude de Chili, Nitrate de soude naturel (F).

سماد ازوتي يستخرج من كلش مناجم الشيلي بعد تلويبه وترسيبه ويخبر مائه . مظهره الحاربي ملح ابيض الزن يحوي من ١٥ الى ١٦ ٪ من الازوت النيتريكي وبعض التي تزيد من عناصر اليود والبروم والبورق والميزا يضاف اليها بعض لوانه الاكدار الثانوية . || وهو سريع الانفعال في التربة قريب التمثيل من النبات غير انه ينشط تماسك ذرات التربة الذي يحد من رفايتها . لذلك ينصح باستعماله في الاتربة الخفيفة القليلة الانسجام ويعد استعماله في الاتربة المنسجمة أو الحامضية الدالفت لانه يحدد تفاعليها نتيجة لتكسك ذراتها .

٢٩٤٩٤ - نَيْثَرَات الصودا التركيبية

Nitrate de soude synthétique (F).

سماد كبري ازوتي سريع الانحلال والتسليق ، يستخرج من ازوت ابلر ، يحوي من ١٥ الى ١٦ ٪ من الازوت النيتريكي . يقال فيه ما قيل بنثرات الشيل من حيث نتائجها الحكيمة والكفارية على ذرات التربة وانفعالاتها .

٢٩٤٩٥ - نَيْثَرَجِين Nitragine (F).

مستحضر ازوتي سائل المادة ينتج من تكثير جرثائم التربة صناعيا . || يستعمل حشا يالترية لمدها بجرثائم النيتروجين .

٢٩٤٩٦ - نَيْثَرُوبَتَان Nitropotasse (F).

سماد كبري يستخرج من تفاعل الحامض النيتريكي مع البوتاس . تركيبة ٢٥ ٪ بوتاس و ١٦,٥ ٪ ازوت نصفه تماما نيتريكي والنصف الاخر امونيكي . يستعمل من الاسمدة الجلييلة النفع والفائدة غير انه يشكو من ارتفاع نسبة وزفه الى تبلغ ٢٤ ٪ .

٢٩٤٩٧ - نَيْثَرُوجِين Nitrogène (F).

Nitrogen (E).

هو الازوت ، الحلي .

٢٩٤٩٨ - نَيْثَرُوسُلفَات Nitrophosphate

سماد كبري يستخرج من تفاعل الحامض النيتريكي مع السلفات المهدني . تركيبة ١٤ ٪ من الحامض الفسفوري الذي يلوي في الماء و ٧,٥ ٪ من الازوت النيتريكي السريع الانفعال . يستعمل من الاسمدة النشطة التي تحسن النبات على الازهار .

٢٩٤٩٩ - نَيْثَرُوفِيل Nitrophile (F).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات يرغب في الاتربة الغنية بالنثرات وقد يطلق على التربة ايضا فتقول تربة نيتروفيلية .

٢٩٤٩٠ - نَيْثَل Nitela (S), Nitèle (F).

جلس حشرات نافعة من الصفريات الغشائية الاجنحة المخصورة . انواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . جميعها صغيرة القذ طولا مراوح من ٢ الى ٥ م . اولها مختلفة الالوان يكثر فيها الاسود والاسمر والاصفر الصنان . قوتها الاستعمارية غيطة منفرجة الاطراف . مرانها شاذية الجسم الحادة . || قوتها التزويبات من اي نوع كانت تعطها بشذائها فتصرد اعصابها وتنقلها الى حيث تلتهمها .

غروبية متوسطة الطول ، لوانسا ثنائية ، انبوية مغلوقة السطوح الخارجية .

### ٢٩٥٠٤ - نيريمبرجية الرأس

نيريمبرجية الرأس نجم نير من كوكبة المرأة المسلسلة .

### ٢٩٥٠٥ - نيريمبرجية الزورق

نيريمبرجية الزورق نجم نير من كوكبة النهر .

### ٢٩٥٠٦ - نيريمبرجية السرة

نير السرة نجم نير من كوكبة المرأة المسلسلة .

### ٢٩٥٠٧ - نيريمبرجية السرطان

نير السرطان نجم نير من كوكبة السرطان .

### ٢٩٥٠٨ - نيريمبرجية الفكة

نير الفكة نجم من كوكبة الاكليل الشمالي ، يوجد خلف الهالك الرابع ويدهونه قطعة المساكين .

### ٢٩٥٠٩ - نيريمبرجية القدم

نير القدم نجم نير من كوكبة المرأة المسلسلة .

### ٢٩٥١٠ - نيريمبرجية قنطورس

نير قنطورس نجم من كوكبة قنطورس يدعى حصار ، اطله .

### ٢٩٥١١ - نيريمبرجية نعيم

Alpha de la Croix du Sud (F). Crux (E). نير نعيم نجم نير من كوكبة صليب الجنوب المرفوعة ايضا بنجم . يبعد عن الارض نحو ١٠٠ سنة ضوئية .

### ٢٩٥١٢ - نيريمبرجية نيرة

Nereia (S). Nérée (F). Neres (E). جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهديات الارجل غلافيات احياش وفصيلة السليبات . انواعها المرفوعة قليلة العدد اطلها تمتد من المحيط الهندي الى البحر الاحمر الى اجسامها حراطة حلالية مستطيلة محدبة الظهور الثنائية الاخاذيد ، رباعية الزوائد الجناحية الشكل ، رؤوسها صغيرة مكورة ، ثنائية القوائم الدبوسية . عياشيعها انوبية الشكل تطلق الزوائد .

### ٢٩٥١٣ - نيريمبرجية سوي جنس

للكل زهرة او ثمرة او مادة ضوئية او جسم حيواني رافعة خاصة فارقة مميزة . فالنيرج هو تلك الرائحة الخاصة المميزة

### ٢٩٥١٤ - نيريمبرجية نيريمبرجية

Nierembergia (S). Nierembergia (F). جنس نباتات عشبية مدادة معمرة من فصيلة الباذنجانيات . صنفودا التعريف على اسم العلامة "نيريمبرج" . صنفها تطلق من ٢٥ الى ٩٠ سم . اوراقها مختلفة الاشكال والاحجام ، ازهارها بيضاء اللون او ليلية ، انايبها مستطيلة ، بتلاتها فارقة . منبتها بعض مناطق اريكة الجنوبية الى انواعها المرفوعة ، متوسطة المدد اشهرها التالية .

### ٢٩٥١٥ - نيريمبرجية كدنة

Nierembergia frutescens (S). Nierembergia frutescens (E).

منبتها الشيلي . سابقا كدنة خلية اللحاء تطلق من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقها صغيرة معتدلة العرض . نصلها خلية

### ٢٩٤٩٧ - نيريمبرجية قشعرية

Neldes tipularius (S). Nélde tipulaire (F).

حشرة خاملة من فصيلة البرتوسيات ورتبة غشائيات الاجنحة . جسمها صغير اقله يطول نحو ١٠ م . شكلها وحركاتها في انقلها شبيهة بشكل القمص وحركاتها الى ثوبها الى الخطي الاسمر . رأسها مكورة ، مستطيل الخط . صنفها جانيبتان ، صنفان . زباناها دقيقان ، مستطيلان كوسلها شبه غروبي الشكل . حجبها ضيقة ، صغيرة . ظواهرها ضيق لاحت . قوائمها مستطيلة . الصفحة السفلى من بطنها وصدرها الى السرة السوداء الى تألف الجبراري والمواقع التي تكثر فيها الاحشاب اخضاها الجراب . قوتها الاوراق .

### ٢٩٤٩٨ - نيريمبرجية ، نيريمبرجية ، ورد الشمس

Drosara (S). Drosara, Rosée du soleil, Rosella (F). Sundew, Lustwort (E). Runder Sonnentau, Rosékrut (D). Drosara, Rosella, Erba da gottai (I).

جنس نباتات عشبية مفترسة معمرة من فصيلة النيريمبرجيات . انواعها المرفوعة زهاء ١٠٠ جميعها مياضنة تعيش في المنافع والمطارب والمواقع الرطبة . سوقها مقررة . اوراقها قرصية الانتساب مستطيلة الاعناق . ازهارها خماسية الاجزاء تقوم على شاربين دقيقة منتصبة توسط الاوراق . الى افسارها الحشرات يتم بواسطتها اوراقها المستترة ، الممتدة النصل للموروز بالوانس الدافقة التي تشع كل حشرة تقرب سها تم تقضي عليها وتمتصها بعد ان تفرز لوانسا الصادرة الحامضية الخاصة اللازلة . وعند نهاية عملية الامتصاص يعود النصل الى ما كان عليه وتعود القوامس الى الانتساب وفرز المواد الدافقة بانتظار فريسة جديدة .



نيريمبرجية

### ٢٩٤٩٩ - نيريمبرجية قشعرية

Drosaraceae (S). Drosaraceae (F). Drosaraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القامات مرفوعات المبيض . انواعها المرفوعة عديدة تجتمع الى ستة اجناس اشهرها النيريمبرجية والنقاص والديونه . جميعها احشاب مقررة معمرة ترطب في المنافع وفي الارربة الطرية الرطبة . اوراقها قرصية الانتساب . ازهارها خماسية الاجزاء . ثمارها جراد بيضية الشكل . بزورها آسية الصلام . معظم انواعها من النباتات المفترسة التي تحول اجسام الحشرات الى مواد منضمة تمتصها بلوانساها .

### ٢٩٥٠٠ - نيريمبرجية

Joug (F). Yoke (E). عشبة مختلفة الاشكال والاحجام توضع في حقن الثور او على راسه يستطيع بواسطتها من جر الاثقال والحشرات وما اشبه .

### ٢٩٥٠١ - نيريمبرجية

Lucicole (F). نمت تعريتي يقلل على الحشرات التي تبس في الظلام .

### ٢٩٥٠٢ - نيريمبرجية التوامين

نجم نير من برج الثورين . مركزه قبالة رأس الثور المأخوذ . يبعد عن الارض نحو ٢٨ سنة ضوئية .

### ٢٩٥٠٣ - نيريمبرجية الحماة

نجم نير مزدوج من كوكبة الحماة ، يدعى الفاختة ، اطلها .

٢٩٥٢٤ - نيسان (F) April (E).

يعرف أيضاً بأبريل. الشهر الرابع من السنة الشمسية وهو من شهور الربيع التي تنتفج فيها بنشاط طاقة النشو الطبيعية. مدته ثلاثون يوماً.

تقوم به الزراعي : الاعمال الزراعية الراجب تتمتها في هذا الشهر أو الممكن إنجازها فيه منوعة ومعدة اخصها .

في الزراعات العامة للموسم

— بلر القطن بعد تحضير التربة وتوزيع الاسمدة الكيماوية اللازمة لانه من النباتات المهيكة التي تستنزف غواص التربة والتي تتطلب الكثير من المواد الغذائية .

— متابعة تحضير التربة ونثر الاسمدة الكيماوية المدة لزراعة التبغ قبل انقضاء التوتيرة الاولى من هذا الشهر .

— متابعة الاعتناء بمشاكل التبغ وراقبها من الحشرات والامراض الفطرية .

— توزيع آخر وجبة من الاسمدة الازوتية النيتروجينية على زروع القمح المتناغرة .

— الاسراع في زرع البصل المتأخر قبل حلول التوتيرة الثانية من الشهر .

— مباشرة زرع الشولدر السكري بعد تحضير التربة ومدا بالاسمدة اللازمة مع العلم ان الشولدر يرغب في التربة الغنية بالمواد العضوية .

في الاشجار المثمرة

— متابعة التعليم في المناطق المتأخرة .

— السهر على حياة الاشجار المثمرة من صقع بعض القالي الصافية الايام وقد يتم ذلك باستهلاك غيوم اصطناعية من النسخان الكثير .

— متابعة جمع امكان مكافحة الحشرات والاصنام النباتية .

— مباشرة مكافحة وديان الشر في التفاح والاجاص والخوخ .. على اثر سقوط ثمرات الزهرية .

— الابتداء بحرق التربة او ركاها مع طمر الاشباب التي كانت فيها شرط ان يكون العقد قد جاوز حجم حبة الحمص .

في الحفصيات

— حرق تربة البساتين واتقاع جميع الاشباب وطمرها .

— تشذيب الاشجار واتقاع الفروع الزائدة او الانحسانية .

— متابعة توزيع الاسمدة الكيماوية اللازمة .

— حضن المطاعم الجديدة عرقاً عليها من لفحة الشمس .

— عدم تأخير قطف الاشجار التي بشرت بالانزهار .

— مباشرة مكافحة ذبابة البحر لمنشوط .

في الحوز

— اتقاع جميع الشتول الغتية الضعيفة او الزائدة عن الحاجة .

— توزيع النصب القريبة من الاكياس بتقيل من الاسمدة السريعة التشيل .

في الزيتون والكرية

— متابعة حراثة الزيتون وانجازها قبل ابتداء الثل .

— حرق الكريمة حفظاً على رطوبة تربتها ولقصاء على الاغصان الضعيفة .

— تغدير اوراق الكرية بالكبريت الميكروبي على سبيل الحيلة ، في المواعظ المعرضة للزيادة .

البشرة لونها الى اخضر الباهت . انهارها ليلكية اللون نظرها نحو ٢٥ م. || تنويرها يستمر من الصبغ الى الحريف .

## ٢٩٥١٦ - نيرمبرجية نهريّة

*Nierembergia rivularis* (S).

*Nierembergia des ruisseaux* (F).

منبتها سفاف نهر البلاتا . ساقها مسطحة تطول نحو ٤ م. اوراقها مسطحة الشكل . فصالحا عادية الخمل ، حيلة اخضر المايق ، تطول نحو ٣ م. انهارها عاجية اللون ، فواحة اللون . نظرها نحو ٤ م. طولها من ٣ الى ٥ م. || تنويرها يستمر طولك شهر تموز .

## ٢٩٥١٧ - نيرمبرجية نهريّة

*Nierembergia gracilis* (S).

*Nierembergia grêle* (F).

منبتها الاربعين . ساقها هزيلة مسطحة تطول نحو ٥ م. اوراقها ضيقة ، شبه حطية الشكل . ساقها واوراقها كثيفة الخمل والزغب . انهارها ليلكية اللون يطولها موج بنسجي . توجمها الى البياض الارزق الموج || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٥١٨ - نيرولي

هو عطر القنداح او دهن القنداح المستقطر من زهر النارج المعروف بالقنداح .

## ٢٩٥١٩ - نيرون الزيتون \*

*Phloeotribus olea* (S). *Néroun, Rongeur de l'olivier, Scolyte de l'olivier* (F). *Phloeotribus olea* (E). *Ölbaumborkenkäfer* (D).

حشرة من الكرشيات القدييات الاجنحة . طولها نحو ٧ م. قوفا الى السواد اللامع يطولها تجذع خلي اغبر . زيانها دقيقة صفة الاطراف . || تركب الزيتون واليالك والمان . انماها تنجح الممكن في العماء وقد تفلج الانان عند انتشاب السابل الزهرية . ينقذ الممكن عن مرقاة خاشية تفلج الشكر تضطبه . || يكافح باتقاع وحرق الاجزاء الصافية في غضون شهر نيسان .

## ٢٩٥٢٠ - نيرينة \*

*Nerinea* (S).

*Nérinée* (F). *Nerines* (E).

جنس حيوانات من الرضويات مبديات الارجل وفضيلة البرينيات . األواها المرفوقة قليلة العدد جميعها من متحيرات الاحقاب الثانوية || اصداها مردنية مستطيلة قريبة الشبه بالبرينيات .

## ٢٩٥٢١ - نيريليات \*

*Neriniidae* (S).

*Neriniés* (F). *Neriniidae* (E).

فصيلة من الرضويات مبديات الارجل . اجناسها وانواعها المرفوقة قليلة العدد جميعها من متحيرات الاحقاب الثانوية || اعرف اجناسها البرينة .

## ٢٩٥٢٢ - نيرزوب

النيرزوب هو قصب ذكور الاغنام والظباء .

## ٢٩٥٢٣ - نيروك

جسم صلب اللد شاردي في القفاص يعبر الاجواء الارضية وله يستقر على الارض .



نيرون الزيتون



نيرينة

Désinsectisation (F). ٢٩٥٣٣ - نَيْسَبَة

Arête d'une montagne ٢٩٥٣٤ - نَيْسَب  
Ridge, Crest (E).  
أعلى نقطة أو موقع في قمة جبل . ج. نَيْسَبَات و نَيْسَبَات و نَيْسَبَات .

Petricola (S). ٢٩٥٣٥ - نَيْسَبَة  
Pétricola (F). Petricola (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم  
وفصيلة النيكيات. أنواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في  
معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || أجسامها صغيرة القد .  
منشأها بارزة طليقة . أصدانها شبه مظلية الشكل . تعيش  
في أنفاق تنقبها في الصخور المعصورة بالماء . ليفتها غزير  
المادة .

Petricolidae (S). ٢٩٥٣٦ - نَيْسَبَات  
Pétricolidés (F). Petricolidés (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم ،  
تنتمي إلى مرتبة النوتيات . أجناسها وأنواعها الغالبة عديدة  
أما الممارسة فقليلة جميعها مصفدة رباعية الأضواء  
كانشاشيم والمنشأ والاذنات . أعطانها معظم بحار العالم .  
تعيش في أنفاق تنقبها في الصخور المعصورة بالماء ||  
أعرف أجناسها وأشهرها النيكب والتاناريس .

Nika (S). Nika (F). ٢٩٥٣٧ - نَيْسَكَة  
جنس دويبات بحرية من القشريات عشاريات الأرجل  
وفصيلة النيكيات . أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في  
معظم بحار العالم || ملجأتها الحياتي جماعي . تسرح قرب  
الجبال والشعوط جميعها جيدة الصنف مأكله كالغبار .

Nickel ٢٩٥٣٨ - نَيْكَل  
معدن أكهب ألون الفاتح اللامع ، شديد الصلابة والمانعة ،  
يزنه (ني- Ni) وزنه الذري ٥٨,٩٩ ثقله الذري ٩  
ينصهر في ١٤٥٠ °س . || وهو قليل التأثير بالهواء  
الجوي ، قابل للتلفظ والطور والسحب . يدخل في تركيب  
أكثر السبائك لانه يكسبها من صلابة ومتانة ويزيدها  
من قابليته للسحب . وهو يستخدم أيضاً بكثرة في عملية  
طلاء المادن .

Nicotine (F). ٢٩٥٣٩ - نَيْكوتين  
ويهم من قائل تبين . مادة قلوية جسمية شديدة النقط  
والفعالية تستخرج من التبغ . || وهي تستعمل تحت شكل  
سلفات النيكوتين في القضاء على بعض الحشرات الزراعية

Nicotianées (F). ٢٩٥٤٠ - نَيْكوتِينِيَّات  
Nicotianae (E). هي النباتات ، راجعها .

Nikidae (S). ٢٩٥٤١ - نَيْكِيَّات  
Nikidés (F). Nikidés (E).  
فصيلة دويبات بحرية من القشريات عشاريات الأرجل ،  
طويلا الذيل . أجناسها وأنواعها عديدة منتشرة في جميع  
بحار العالم || أجسامها صغيرة قريبة الشكل ، بالغمبار .  
مناكمها قصيرة . الزوج الامامي من قوائمها مجهز بملاصق  
صغيرة . الزوج الثاني مجهز بملاصق ذرية || أوتابها جميلة  
اللون القسطنطينية الزاهية || أشهر أجناسها النيككة .

في الزهور  
- بلز الأنواع المتخارة ونقل الشغل الصالحة إلى مستقراتها  
- الحافنة على التناثبات والوريد من عبث الحشرات  
- مختلفة والأوصام القفارية .  
- الاعتناء بالتسديد والتقليم .

في الحجاج والنحل  
- متابعة سفن وترعيم البيض والنأية بالصيصان .  
- تحضير القفران أو الخلاصا اللازمة لتقبل الاثوال  
الجديدة .  
- اليد بنقل الناحل إلى الاماكن الموصوفة بمجدة مرتعها  
المفتري .

٢٩٥٢٥ - نَيْسَب ، نَيْسَبَان  
طريق النمل إلى زيت .

٢٩٥٢٦ - نَيْسَم  
Event (F). Blow-hole (E).  
مخرج بخار الماء منة الحيتان وبعض الاسماك . ج. نَيْسَم .

Nysson (S). ٢٩٥٢٧ - نَيْسُون  
Nysson (F). Nysson (E).  
جنس حشرات قانصة مفترسة من غشائيات الاجنحة  
الحمريات . وفصيلة النيسونيات . أنواعه المعروفة نحو ٩٠  
منتشرة في جميع اقطار العالم القديم || أجسامها صغيرة  
محصورة . رؤوسها مستديرة . تكشورها نشطة ، حادة .  
عينها كبيرة ، ناشرة . قرونها الاستشعارية عيطية ،  
مستطيلة . أجنحتها شفافة . بطونها اهليلجية . أثوابها  
إلى السرة المتفاوتة السود يعطونها في بطونها تجذيع طوي  
يراحون من التبي إلى الاصفر الذهبي .

Nyssonidae (S). ٢٩٥٢٨ - نَيْسُونِيَّات  
Nyssonidés (F). Nyssonidés (E).  
فصيلة حشرات قانصة مفترسة من غشائيات الاجنحة  
الحمريات . أجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في  
جميع اقطار العالم || جميعها جارية تقم عشاواتها في التربة .  
أجسامها صغيرة ، محصورة ، ملونة . أجنحتها وقوائمها  
نشطة . قرونها الاستشعارية عيطية ، مستطيلة ، مدققة  
الاطراف . تلص طرائدها فتخدها وتنقلها إلى عشاواتها ||  
أشهر أجناسها النيسون والكوريت .

Epi (F). Tuft (E). ٢٩٥٢٩ - نَيْسَان  
هو الدائرة من الشعر .

Porc-épic commun (F). ٢٩٥٣٠ - نَيْسَب  
هو الشيم الملبول ، اطلبه .

Chiloetomates. ٢٩٥٣١ - نَيْسَمِيَّات  
Chiloetomés (F).  
رئيسة من الحيوانات الطليعية الضيكيات . فصائلها  
وأجناسها عديدة ، بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثة  
والبعض الآخر مناصر . جميعها منزلة ضمن حبيرات  
قرية المادة أو كسبة تعلوها أسفاط ناشرة كالشفاة تنضم  
وتنفصل حسب الحاجة .

Relation nutritive (F). ٢٩٥٣٢ - نَيْسَبَة غذائية  
Nutritive relation (E).  
هي النسبة الغذائية أي نسبة المواد الازوتية إلى غيرها من  
المواد الغذائية القابلة الانهاس في كل حلف .



نَيْسَب



نَيْكَة



نيل

**٢٩٥٤٩ - نيل هندي**  
*Indigofera indica* (S).  
*Indigotier hirsuta* (F).  
 نوع من النيل الأزرق، يجلبه تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها فناء. أوراقها كبيرة عديدة الوريقات الانطائية الترتيب التي يراوح عددها من ١١ إلى ٣٣ نصلها ساني الشكل، خلى البشرة، أصعب المواج. أزهارها عقودي التجميع كبير اللد محوري الارتكاز. أزهارها صفراء اللد تكثر البضحية المواج. انتاجه الخضابي واقر المادة متوسط الصنف.

**٢٩٥٥٠ - نيلكة**  
*Indigo*  
 خضاب أزرق يستخرج من ورق النيل وسوقه.

**٢٩٥٥١ - نيلكة عينية** هي البساط النيل، اطبله.  
**٢٩٥٥٢ - نيلنج** هو اليك، اطبله.

**٢٩٥٥٣ - نيلك**  
*Dryobalanops aromatica* (S).  
*Dryobalanops aromatique* (F).  
 شجرة حرجية وصناعية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة التوتليات، اصطناعها تمتد من الهند الى الهند الصينية وجزر التوازيك || هيكلها جميل القالب. ساقها ملساء. أوراقها متعاقبة منقطة نصلها جامدة، سانية الشكل، شديدة الخفسار الزاهي. أزهارها عقودي التجميع ثمارها فقيرة وقوة طراؤها تفوق خامي الفصل المستطيلة، المينة || وعرضا يبلغ هر الشجرة نحو ١٥ سة تتشقق ساقها طولا ويرشح منها دهن كانوري فاخر الصنف يدعى كانفور بورنيو أو بورنيوط.



نيلك

**٢٩٥٥٤ - نيلن**  
 سد نسجي مركبي شائع الاستعمال.

**٢٩٥٥٥ - نيلنج** هو النيل، اطبله.

**٢٩٥٥٦ - نيلوفر، نيلوفر، بنشين**

*Nymphaea* (S). *Nénufar*, *Nénuphar* (F). *Water-lily* (E). *Seeros* (D). *Ninfea* (I).  
 جلس نباتات عشبية جسطورية مائية من فصيلة النيلوفر. انواع المعروفة ٢٥ اصطناعها مياه البلاد الحارة والمتدلة. جلدنبرها مدادة. أوراقها وزاهاها مستطيلة المالحاق طافية. ثمارها جراء كروية الشكل. يزودها نشوية المادة. اعرف انواعها واشهرها ما يتبع.



نيلوفر ابيض

**٢٩٥٥٧ - نيلوفر ابيض، بنشين ابيض، عرالس النيل، حنيشة السك**

*Nymphaea alba* (S). *Nénufar blanc*, *Lis des étangs*, *Bianc d'eau*, *Lune d'eau*, *Volet* (F). *Flatter dock*, *White water-lily* (E). *Weisse Seeros* (D). *Ninfea bianca*, *Nenusfar*, *Luna d'acqua*, *Regina dei laghi* (I).  
 اشهر انواع النيلوفر واشيها. جلدنبرها مستطيلة متعاقبة اللد. أوراقها كبيرة اللد تعرض من ١٠ إلى ٣٠ سم. نصلها أخضر البشرة حل صفحية. أزهارها بيضاء اللون، عادية القرب، قطرها يراوح من ١٠ إلى ١٢ سم. ثماره وجدانها مأكولة. تنوره يستمر من حزيران الى ايلول.



نيلوفر أزرق

**٢٩٥٥٨ - نيلوفر أزرق، بنشين أزرق، كرتب الماء**  
*Nymphaea coerulea* (S).  
*Nénufar bleu*, *Lotus bleu* (F). *Blue water-lily* (E). *Blaue Seeros* (D). *Ninfea caelesta d'Egypte* (I).  
 نوع من النيلوفر البهري الشائع في مياه بحيرات وأبار

**٢٩٥٤٢ - نيل، نيلنج، حيلة**

*Indigofera* (S). *Indigotier*, *Anil* (F). *Indigo plant* (E). *Indigopflanze*, *Anilpflanze* (D). *Indaco*, *Endeco* (I).  
 جنس نباتات عشبية وجينية من فصيلة القرنيات القراضية. انواعه زهاء ٢٥٠ منها الحولي والعلوي والسر. ساقها فراء غشوشة. أوراقها متعاقبة مركبة رية الترتيب. أزهارها لا قياس التجميع والارتكاز. أزهارها صفراء اللد تكثر فيها الايون الوردية والحمراء. جميعها من نباتات المناطق الحارة. معظمها بري وبعضها صناعي يستخرج من أوراقه وسوقه صباغ ليل اللون. اشهر انواعه الزراعية والنيلية ما يلي.

**٢٩٥٤٣ - نيل الصباغين**  
*Indigofera tinctoria* (S). *Indigotier des teinturiers* (F).

نوع من النيل الأزرق المشهور. جنته تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه فراء. أوراقها صابغة او تساعة الوريقات الزرقية. أزهارها عقودي التجميع محوري الارتكاز. أزهاره وردية اللون يملوسا مواج اسف. انتاجه الخضابي واقر المادة جيد الصنف.

**٢٩٥٤٤ - نيل أنثي**  
*Indigofera decora* (S). *Indigotier élégant* (F).

نوع من النيل التزييني، يجلبه تملو نحو ١٥٠ سم. أوراقه لا قياسية التركيب منها الخامية الوريقات والسباعية والتساعية. وريقاته الهليجية النصل الامرد المالحاق. طولها يراوح من ٧ الى ٩ سم. وعرضا نحو ٣. أزهارها عقودي التجميع، محوري الارتكاز. أزهاره وردية اللون المالحاق. تنوره يستمر من ايار الى آب.

**٢٩٥٤٥ - نيل بحري**  
*Indigofera glauca* (S). *Indigotier glauque* (F).

نوع من النيل الأزرق. جنته متوسطة اللد تملو نحو ١٥٠ سم. ساقه فراء. أوراقه مستطيلة، عديدة الوريقات البحرية اللون، الخلية البشرة. أزهارها عكوكي التجميع محوري الارتكاز. أزهاره الى الحرة القامحة. انتاجه الخضابي واقر المادة متوسط الصنف.

**٢٩٥٤٦ - نيل عربي**  
*Indigofera arabica*, *I. anil* (S). *Indigotier anil* (F).

نوع من النيل الأزرق. يجلبه تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. ساقه فناء. أوراقه عديدة الوريقات البيضية النصل الصفرة اللد. أزهارها عكوكي التجميع. أزهاره الى الحرة الزاهية. انتاجه الخضابي متوسط اللد والصنف.

**٢٩٥٤٧ - نيل فيضي**  
*Indigofera argentea* (S). *Indigotier argenté* (F).

نوع من النيل الصناعي والنسجي، يجلبه صفرة اللد تملو من ٩٠ الى ٩٥ سم. أوراقه ثلاثية او خماسية الوريقات. وريقاته خلية النصل القضي، بيضية الشكل، مقعوبة الطرف. أزهارها عقودي التجميع. أزهاره وردية اللون بتفسيرية المواج. انتاجه الخضابي قليل المادة فاخر الصنف. تنوره يستمر من تموز الى آب.

**٢٩٥٤٨ - نيل قمريري**  
*Indigofera atropurpurea* (S). *Indigotier cramoisi* (F).

نوع من النيل التزييني. يجلبه تملو نحو ١٢٠ سم. أوراقه مركبة من ١١ روية. وريقاته الهليجية الشكل، خلية النصل المتجمع الحارة. أزهارها عقودي التجميع. أزهاره قمرزية اللون المالحاق. تنوره يستمر من تموز الى آب.

مائية ، أوراقها مستطيلة الاضلاع ، كبيرة النصل القارص .  
ازهارها كثيرة البتلات مستطيلة المالحق تنطق على سطح  
الماء || اما اجناسها الخمسة فهي النيلوفر والنوفر والنيلوب  
والنغامة والكبيبه .

٢٩٥٦٥ - نِيلُوفَرٌ أَصْفَرٌ \* Indigotine (F).  
Indigotin (E).

هي المادة الملونة في الثبل وهي رباعية التركيب بيضاء اللون  
تتأكد في الهواء وتزرق . الصناعة الحديثة تستخرجها  
من الثفلين .

٢٩٥٦٦ - نِيمَسْتِيلُ Nematosylis (S).  
Nématostyle (F). Nematosylis (E).

جنس نباتات عشبية دوفسية سر وية من فصيلة السوسليات .  
منبتها بعض مناطق امريكية الشمالية . شاربها منتصبه ،  
معتدلة الارتفاع . أوراقها صغيرة ، ضيقة النصل .  
ازهارها مستطيلة الاذن تنتركز في اباط الشرايف ||  
تزرع للزينة في الحدائق . ترطب في الارربة المتوسطة  
الانتداب المنسوبة التركيب العنصري الزاخرة المواد الغذائية ||  
انواعها المعروفة متوسطة العدد ، اشهرها التالية .

٢٩٥٦٧ - نِيمَسْتِيلُ أَرْجَوَانِيَّةٌ Nematosylis purpurea (S).  
Nématostyle pourpre (F).

عشبة تزيينية دوفسية جادحة . منبتها التماسكاس ولوزيانا .  
شراخها يرتفع نحو ٢٥ سم . أوراقها صغيرة القد ، ضيقة  
النصل ، زرقية الخضار . ازهارها متعشلة الحجم  
ارجوانية اللون . اسديتها ملتحة القواعد . متاكها منتصبه  
الحيوط الجانسة || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٩٥٦٨ - نِيمَسْتِيلُ سَمَاقِيَّةٌ Nematosylis caelestina (S).  
Nématostyle céleste (F).

عشبة تزيينية دوفسية جادحة . شراخها يرتفع من ٥٠  
الى ٦٠ سم . أوراقها صغيرة ، ضيقة النصل ، زاهية  
الخضار . ازهارها كبيرة زرقاء اللون . اسديتها ملتحة  
القواعد . متاكها حلزونية الخيوط || تنويرها يستمر من  
ايار الى حزيران .

٢٩٥٦٩ - نِيمَسْتِيلُ سَمَاقِيَّةٌ Nematosylis brunnea (S).  
Nématostyle brun (F).

عشبة تزيينية دوفسية سر وية . منبتها المكسيك . شراخها  
يرتفع نحو ٣٠ سم . أوراقها صلبة الحجم ، ضيقة النصل ،  
خضراء الخضر الزاهي . ازهارها سماء اللون بنفسجية المواج .  
بتلاتها الداخلية موهجة بالاصفر . متاكها جالسة الخيوط ||  
تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٩٥٧٠ - نِيمَسْمُورَةُ Nemospora (S).  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرغيفيات ، انواعها قليلة  
العدد والاذى تتميز بسرانها الزرقية الملوثة الشيج .  
كانت لها اسطورية ، منقطة ، طليبة الاطراف .

٢٩٥٧١ - نِيمُوزُومُا مُسْتَطِيلَةٌ Nemosome elongé (F).  
حشرة تدعى اسطوية القداء ، اطليها .

الرفيقة الشرقية . أوراقها متوسطة القد تعرض من ١٥ الى  
٢٥ سم . نصلها اخضر الصفحة العليا احر السفلى .  
ازهارها الى الزرقه يطولها مواج وردي . ثماره وجذاميره  
ماكولة . || تنويره يستمر من حزيران الى اواخر آب .

٢٩٥٩٩ - نِيلُوفَرُ أَصْفَرٌ \* Nymphaea flava (S).  
Néoufar jaune (F).

نوع من النيلوفر التريزي . مهده اهورا فلوريدا وميجرانيا .  
جذاميره نجيلية مستندقة . أوراقها متوسطة القد تطول من ١٥  
الى ١٥ سم . وتعرض من ٩ الى ١٢ سم . نصلها عجز الحمار ،  
اخضر الصفحة العليا ، اسفغ السفلى . ازهاره متوسطة القد  
لونها الى الصفار الكبريتي . || تنويره يستمر طوال فصل  
الصيف .

٢٩٥٩٠ - نِيلُوفَرُ الْعَرُوسُ \* Nymphaea lotus (S). Lotus, Nénufar blanc d'Egypte, Lotier d'Egypte (F). Egyptian lotus, White lotus, Sacred lotus (E). Agyptische Lotusblume, Weissler Lotus (D). Loto, L. sacro, L. egiziano (I).

نوع من النيلوفر السروي الملبول في مياه البلاد الحارة .  
مهده موزن النيل . أوراقه متوسطة القد تعرض نحو ٢٠ سم  
نصلها اخضر الصفحة العليا بحري السفلى . ازهاره كبيرة  
الحجم ، بيضاء اللون . ثماره وجذاميره واعناق أوراقه ماكولة .  
تنويره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٥٩١ - نِيلُوفَرُ عَطَرٌ \* Nymphaea odorata (S). Nénufar odorant (F).

نوع من النيلوفر التريزي . أوراقه مستديرة القد  
قطرها يراوح من ١٢ الى ٣٠ سم . نصلها اخضر النصفية  
العليا ، احر السفلى . ازهاره عطرية العرف ، كبيرة القد ،  
قطرها يراوح من ١٢ الى ١٥ سم . لونها الى اليباض المالحج .  
تنويره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٥٩٢ - نِيلُوفَرُ مَحْدَرٌ Nymphaea tuberosa (S). Nénufar tubéreux (F).

نوع من النيلوفر التريزي . مهده البلاد الامريكية . ضروبه  
عديدة . جذاميره متقاربة المقد الغدية الدرزية الشكل .  
أوراقه كبيرة مستديرة قطرها يراوح من ١٥ الى ٣٠ سم .  
نصلها يبدو احر اللون ثم ينصرف شيئا فشيئا الى ان يستقر  
على الاخضر الباق . ازهاره كبيرة القد ، عادمة العرف ،  
متباينة الالوان ، منها الأبيض والوردي والاجر والقرمزي .  
تنويره يستمر طول فصل الصيف .

٢٩٥٩٣ - نِيلُوفَرُ هِنْدِيٌّ \* Nymphaea indica (S). Nénufar des Indes (F). Waterlily, Water nymph (E). Nymphenblume, Seeros (D). Ninfes India (I).

نوع من النيلوفر السروي الملبول في معظم مياه انهار الهند .  
أوراقه كبيرة القد قلبية الشكل ، نصلها اخضر الصفحة  
العليا حطفي السفلى . ازهاره كبيرة الحجم ، خافتة العرف ،  
تبينة اللون . ثماره وجذاميره ماكولة . || تنويره يستمر  
طوال فصل الصيف .

٢٩٥٩٤ - نِيلُوفَرُ رِيَّاتٌ \* Nymphaeaceae (S). Nymphaeacées (F). Nymphaeaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القائلات .  
اجناسها خمسة ، انواعها عديدة . جميع نباتاتها جلدورية



نيلوفر أصفر



نيلوفر العروس



نيلوفر حطر



ثِيُوت مَبْدُول

Néogène (F).

٢٩٥٧٣ - نِيُوجِين .

نعت تعريفي يطلق على الحقبة الثانية من الاباج الثالثي المعروف أيضاً بالاباج الحديث . وهو يشمل العصر الميوسيني والعصر البليستيني || تتميز هذه الحقبة بتطور الثيرت وارتفاع العلم ، بوجه عام ، إلى الحالة الحاضرة . كما وأنها تشهد ، في الزمن الاخير منها ، ظهور اول انسان على الارض أو اول شبه بالانسان .

Neovossia (S).

٢٩٥٧٤ - نِيُوفُوسِيَه ٥

جنس فطور مجهرية من فصيلة التثريات . بوفه يحمل في اطرافه خيوط مشجية شفافة ، انتاش بوفه يتميز بدعيات غروطية الشكل تحمل العديد من البويضات املئية الضمية التجميع || انواعه للمؤذية قليلة الضرر لا تستوجب العناية

Néolithique (F). Neolithic (E). ٢٩٥٧٥ - نِيُولِيثِي ٥


نيُولِيثِي أو العصر النيُولِيثِي هو زمن الحجر المصقول .

٢٩٥٧٢ - ثِيُوت مَبْدُول \* ، مَبْدُول المَاء المَبْدُول ، مَبْدُول مَبْدُول ، مَبْدُول مَبْدُول

Molge vulgaris, Triturus vulgaris (S). Triton vulgaris, Triton punctués (F). Smoot Newt (E).

حيوان زحاف قارب ببروس من فصيلة السمندليات ورتبة السرفوتيات . موطنه يمتد من الشرق الاوسط إلى اوروبا || جسمه مستطيل الشكل بطول من ١٤ الى ١٦ سم . الذكر اصفر من الانثى . رأسه مخروطي الشكل . عيناه صغيرتان . حنكه كامل التسنين في الفكين . قاعته الاماميتان رباعيتا الاصابع اما الخلفيتان فخاسيتيا . جلده مائل القشور . ثوبه الملوي ، مدبج وزرکش وسننج بالاسمر والاخضر والاصفر والاسيد . مدبه إلى الكلبة الطحلاء تتوسطها جدة حراء تمتد من الزور إلى المزرق || يتميز بتقل الحمة . يألف البناج والمناقع . قوته الحشرات والتثريات والرخويات || يعتبر من القوارب المفيدة النافعة .





#### ٢٩٥٨٣ - هاذة قلبية الورق

*Ampelopsis cordata* (S). Vigne vierge à feuilles en coeur (F).

نوع من الهاذ التريبي. جنبته مدادة عارشة تطول من ١٥ إلى ١٠ سم. أوراقها قلبية الشكل، قليلة التفصيص تطول وتعرض من ٥ إلى ١٢ سم. تصلها ريق الصفعة، أخضر اللون، عادم الخمل || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

#### ٢٩٥٨٤ - هاذة كثيرة الورق

*Ampelopsis megalophylla* (S). Vigne vierge à grandes feuilles (F).

نوع من الهاذ التريبي. جنبته دغلية الشكل تملو من ٣ إلى ٤ أمتار. أوراقها ريشية التركيب. وريقاتها كبيرة القد بيضية الشكل تطول من ٦ إلى ١٥ سم. تصلها مالن الصفعة اللبسا، خلى السفل، أحر المروق والأعصاب. أزهارها صيدانية التجميع، يزورها سود. أزهارها يستمر طول شهر تموز.

*Ampelopsis arborea* (S). هاذة شجيرة (F). Vigne vierge arborescente (F).

نوع من الهاذ التريبي. مجمرته متصبية تملو نحو ٥ أمتار. أوراقها ريشية التفصيص، تصلها مالن الصفعة العليا خلى السفل. أزهارها خماسية الأجزاء || أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز.

#### ٢٩٥٨٦ - هاذة هاتكة

*Ampelopsis heterophylla* (S). Vigne vierge à feuilles variables (F).

نوع من الهاذ التريبي. جنبته عارشة تطول من ٥ إلى ٦ أمتار. ساتها وفروها جزؤية المهاد. أوراقها هاتكة لاقياسية التفصيص الذي يراوح من ٣ إلى ٥، تصلها مالن الصفعة العليا، خلى السفل. بلورها إلى الزرقه الزاهية. أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز.

#### ٢٩٥٧٦ - هابط، وابط

*Descendant* (F). Descending (E).

هو نقيض الصاعد.

#### ٢٩٥٧٧ - هاتكة

*Hétérophylla* (F).

*Heterophyllous* (E).

نمت تمرقي يوسف به كل نبات لانظامي الاوراق تركيبا وشكلا وارتكازا.

#### ٢٩٥٧٨ - هاجكة

*Grenouille femelle* (F).

*She-frog* (E).

الصفدة الاثى. ج. حاجات، تصغيرها حويجة وحيبة.

#### ٢٩٥٧٩ - هاجكة

*Méridien* (F). Meridian (E).

النط الرئيسي الذي يرتكز عليه قياس درجات الطول.

#### ٢٩٥٨٠ - هاجكة

الهاجكة هي النخلة تحمل صنيرة.

#### ٢٩٥٨١ - هاذ

*Ampelopsis* (S).

عتر من الجفة المذراه. انواحه المروفة ١٢ تصير بحولتها البسيطة الخالية من الاطياب المحمية ومخاضن مبيش أزهارها القدسية الشكل. واسدته هاذة. || أشهر انواحه التريينية ما يتبع.



هاذة كبيرة الورق

#### ٢٩٥٨٢ - هاذة شرقية

*Ampelopsis orientalis* (S). Vigne vierge du Proche-Orient (F).

نوع من الهاذ التريبي. هذه الشرق الاوسط. جنبته دغلية الشكل تملو من مترين إلى ثلاثة أمتار. أوراقها ريشية. وريقاتها تطول نحو ٧ سم. وتعرض نحو ٤. تصلها مالن البشرة على صفحته. أزهارها رباعية الأجزاء. أزهارها يستمر طول شهر آب.

## ٢٩٥٨٧ - مَادَّة هَلَامِيَّة الزُّوق

*Ampelopsis aconitifolia* (S). *Vigne vierge* à feuilles d'aconit (F).

نوع من الهاذ الزبني . جنبته حارشة تطول من ٥ الى ١٥ امتار . فروصها دقيقة ، جزوية السحاء في أول مهدا . اوراقها اسبعية الشكل لاقبسية التفرغيف الذي يراوح من ٣ الى ٥ ولا متساوية التسكيم الذي يطول من ٥ الى ٨ سم . نصلاها مائلة الصلصة ، عابقة الخضراء ، صفنة الحافة . يزورها برتقالية اللون || انزعارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٩٥٨٨ - مَادَّة يَابَانِيَّة *Ampelopsis japonica* (S). *Vigne vierge du Japon* (F)

نوع من الهاذ الزبني . جنبته حارشة تطول نحو ٧ امتار . جلدها رافع الصنع والادوية . اوراقها كبيرة اللد ، لاقبسية التفرغيف السكسي ، الذي يراوح من ٣ الى ٥ ، نصلاها حاقب الخضار اللامع || انزعارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٩٥٨٩ - هَارِب *Déversoir* (F). *Overflow* (E).

النفرة للمدة لتصريف الفائض من المياه .

٢٩٥٩٠ - هَارِبَا ، هَارِبِي *Ashérine* (F).

هو الحساس ، ممكة صغيرة اللد ما كولة ، اطله .

## ٢٩٥٩١ - هَارِجَة

*Acrocephalus, Calamoherpe* (S). *Rousserolle* (F). *Sedge warbler* (E).

جنس من فصيلة اللشليات . انواعه المعروفة كثيرة امدد جميعها صغيرة اللد تتميز باجنحتها المستطيلة الذرية الاطراف . اذنانها رتاجية الريش غروطية الشكل ، متاقرها مستعرضة القاعدة ، مذبذبة اللانقل || تألفت المنافع والضفاف والمقاصب والرياض . قوتها الحشرات واغرام اخسها الياسيب والتمر والبوص || اعرفت انواعها واضهرها ما يلي .

## ٢٩٥٩٢ - هَارِجَة الْبَطْلَانِج \*

*Acrocephalus palustris, Calamoherpe palustris* (S). *Rousserolle verderolle, Verderolle* (F). *Marsh warbler* (E).

نوع من الهوازج ، صغيرة اللد تطول نحو ١٤ سم . ظهورها الى الطلحة الزرنيقية المزاج . يطها الى الصفرة . زورها الى البياض الاكدر . تألفت الاماكن الرطبة والمناخ وضفاف الماء . تدن في اللخل وفي الشجيرات المتفرقة . حشيتها يراوح من ٤ الى ٥ ويضاض ترخها بمناوبة الذكر من ١٤ الى ١٥ يوما .

## ٢٩٥٩٣ - هَارِجَة السُّد

طائر من الهوازج يدهى ام نوع ، اطلها .

## ٢٩٥٩٤ - هَارِجَة الْقَصْب \* ، عَشْفَج

*Acrocephalus arundinaceus, Calamoherpe turdoides* (S). *Rousserolle turdoide, Grive de rivière* (F). *Great reed warbler* (E).

طائر من الهوازج . طولها يراوح من ١٩ الى ٢٥ سم . ظهرها الى الصبغة اصفرار المزاج . يطها الى البياض الاشعث . زورها ابض اخضر . جوشها الى الكمية المسنجة بالاسمر . تجوب البلاد في طلب المصيف والمشي . تألفت المقاصب والالاجام . تدن منها حل القصب . تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوما .

## ٢٩٥٩٥ - هَارِجَة الْمَاء \*

*Acrocephalus paludicola* (S). *Phragmice aquatique* (F). *Aquatic warbler* (E).

طائر من الهوازج ، صغير اللد طوله نحو ١٤ سم . ظهوره اخضر اللون يجلج بالاسمر . يطها الى البياض الخفي يطلو تسنج اكعب || يألف ضفاف الانهر والبحيرات ويجوب البلاد في طلب المصيف والمشي .

٢٩٥٩٦ - هَارِجَة *Ceil de l'éléphant* (E).

هي عين الفيل .

## ٢٩٥٩٧ - هَارُوم ، هَارُوم ، هَارُوم

*Digestif* (F). *Digestive* (E).

هو ما له قوة الهضم التي تحول الاطعمة وتعملها قابلة للتشيل كالصناعات الهضامة ...

## ٢٩٥٩٨ - هَارَف

هاف ورق الشجر . سقط .

٢٩٥٩٩ - هَالِل \* *Alactaga* (S). *Alactaga* (F).

جنس حيوانات كبيرة قاضية من فصيلة البربويات . انواعه عديدة موطنها الشرق العربي ومصر وايران والتركستان والتهبت || شكله شكل الجرذ . طوله نحو ٢٥ سم . ذنبه ٢٧ . رأسه صغير اللد . عيناه كيرتان . اذناه مستطيلتان . طول جوارزه الخلفية يبلغ أربعة اضعاف الامامية || قوته الى الصفرة الرملية ويلوحها مزاج اسحب . يطها الى البياض . ذنبه صناعي اللون اما الحصلة فبقاع || يألف الاراضي الطينية . جعوه قسمة رحية يجرها هو عن ٦٠ او ٧٠ سم . يطفي فيها بيانه الشفوي . يدخلها نفق طويل متدرج اما خرجها نفق مستقيم معتدل الانحدار || قوته المارد التنايت على اختلاف اشكالها وانواعها || اناء تحمل ثمانية اطياف وتضع من ٤ الى ٦ ادراس على ثلاث مرات في السنة .

## ٢٩٦٠٠ - هَال ، هِيل ، هِيلُوا ، تَالْتَة ، شَوْشَمَة ، شَوْشَمِير

*Amomum* (S). *شَوْشَمِير* (F). *Amomum* (F). *Cardamoms* (E).

جنس نباتات جلدودية طيبة عطرية برية وزراعية من سبط الهاليات وفصيلة الزنجبيليات . انواعه عديدة جميعا من نباتات المناطق الحارة || جذاميرها لبروية التركيب . سوقها منتصبة عمادة القرو . اوراقها عديدة الالتشاب متناقبة . انزعارها شديدة التجميع او متكوية . ثمارها جراء ثلاثية الاضية . بلورها تدعى حب الهال يستخرج منها ادمان عطرية طيارة كانت فيما مضى اشهر الطوبير المستصلحة في التحنيط || لبوب جذاميرها وبلورها وادعائها هاضمة ومنبهة للقلب ولقوة الجنسية . مضادة للقتنج . طاردة الرياح ، سكنة للنفس ومدرية للطحس .

## ٢٩٦٠١ - هَال جَاوَا ، تَالْتَة مُجْتَمَعَة

*Amomum maximum* (S). *Cardamome allé de java* (F). *Java Cardamoms* (D). *Cardamomo di Givra* (I).

نوع من الهال التابل الشائع الاستعمال . تكثر زراعته في بلاد جاوا . ساقه رقيقة ، اوراقه كبيرة اللد ، بلوره جيدة الصنف وافرة الاعدان العطرية الطيارة .



هَارِجَة الْبَطْلَانِج



هَارِجَة الْقَصْب



هَارِجَة الْمَاء



هَالِل

الفصيلة الباذنجانية ، ساقه غليظة بطولية اللون ، ازهاره كبيرة القند متراكبة الالوان فيها الالوان الاصفر والاصفر البرتقالي والاحمر والارزق . يزهر ذوية القند مستديرة الشكل سنطية اللون تحفظ بقايا البتلات نحو عشر سنوات .

٢٩٦١١ - **هالبيات** ، **قالبيات** (E). Amomées  
سبل من فصيلة الزنجبيليات ، اشهر اجناسه الهال .

٢٩٦١٢ - **هالبيزة** \* ، **هالبيزة** ، **تعل**  
Halesia (S). Halésia, Halésier (F). Silver bell-tree, Snowdrop tree (E). Schneeglöckchenbaum (D). Alesia (I).

جنس نباتات برية وثريتين من فصيلة الاصطركيات . انواعها ستة جميعها اشجار وشجيرات متوسطة القند . ساقها منتصبه متقاربة الفروع . اوراقها حابله ، مدققة ، متعاقبة ، تصلها يضيء الشكل مستن الحافة . ازهارها محورية الارتيكاز ، فسية التجميع ، عديدة الاسدية ، مستطيلة الزناد . ثمارها جراح مجتمعة || احرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٩٦١٣ - **هالبيزة ثنائية الجناح**  
Halesia dipeters (S). Halésia à 2 ailes (F).  
نوع من الهالبيزة الثريتين . ثمرتها تملو نحو ١٠ سم . اوراقها بيضيه الشكل تملو نحو ١٥ سم . وتعرض نحو ١٠ سم ، نصلها جامد اللون ، اخضر الصفحه العليا ، خلي السفلى . ازهارها بيضاء اللون تملو من ٢ الى ٣ سم . وتعرض من ٢ الى ٥ سم . ثمارها جراح ثنائية الجناح وشبهه الشكل تملو من ٤ الى ٥ سم || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٩٦١٤ - **هالبيزة رباعية الجناح**  
Halesia tetraptera (S). Halésia à 4 ailes (F).  
نوع من الهالبيزة الثريتين ، ثمرتها تملو من ٤ الى ٩ امتار . اوراقها املحليجية الشكل سنطية الزايم الاخير . نصلها جامد اللون اللقيق ، اخضر الصفحه العليا خلي السفلى . ازهارها متدلية ، ثلاثية التجميع ، بيضاء اللون ، صغيرة القند . ثمارها جراح رباعية الجناح مخروطية الشكل تملو من ٤ الى ٥ سم || ازهارها يستمر من آذار الى ايار .

٢٩٦١٥ - **هامكة**  
Efraie commune (F).  
هي البهفة ، اطباها ج . هام وهامات . قال ذو الرمة :  
قد اصعب التارح المجهول مصفه  
في ظل اخضر يدوم هامة اليوم

٢٩٦١٦ - **هامكة** ، **ميشتركة**  
Trayuse mécanique (F).  
عدة مجهزة باريح شفاطات تستخرج الحليب من ضرع البقرة وتقله الى رماء الحفظ الحكم السد .

٢٩٦١٧ - **هامين**  
Marcascent (F).  
Marcascent, Wichering (E).  
نمت تمريني يطلق حل كل نبات او جزء من النبات يكون في حالة الحمن .

٢٩٦١٨ - **هامي**  
Apical  
نمت تمريني يوصف به كل عضو مركزة اللدورة .

٢٩٦١٩ - **هاميليا** \*  
Hamelia (S). Hamélia (F).  
جنس نباتات برية وثريتين من فصيلة الفويات . انواعها المعروفة ١٠ ، اعطانها للمناطق الاستوائية الامريكية . ساقها فضاء . اوراقها متعاقبة ، كاملة ، سنطية النصل . ازهارها

٢٩٦٢٠ - **هال حبشي** \* ، **قالبة حبشية**  
Amomum angustifolium (S). Amome de Madagascar (F). Madagascar cardamoms (E). Madagascar Cardamomen (D). Cardamomo maggiore, C. massimo (I).  
نوع من الهال الزراعي الشائع الاستعمال في جزيرة مدغشقر . اوراقه صفية النصل الضيق . لبوب جذليه تابل مشهور . بلوره وافر المواد الدهنية العطرية المتوسطة الصنف .

٢٩٦٢٣ - **هال حسام** \* ، **حسام** ، **قالبة عشقودية** ، **امومين**  
Amomum cardamomum (S). Amome cardamome (F). Cardamon (E). Cardamomen (D). Cardamome, Cardamomo, Amomo (I).

ويروف ايضاً بالمال المنقودي . نوع من الهال الجيد الصنف . تكثر زراعت في الهند الصينية . ازهاره عشقودية التجميع . بلوره جيد الصنف ثامنة الاستعمال وافر المواد الدهنية العطرية .

٢٩٦٢٤ - **هال ذكر** \* ، **قالبة ذكرية** ، **خيرويا**  
Amomum melegueta (S). Méleguette, Méléguette, Graines de paradis (F). Melegueta-pepper, Grain of paradise (E). Malaguettapeffer (D). Grana paradisi, Sami di paradiso (I).  
نوع من الهال ، تكثر زراعت في بعض مناطق افريقية الشرقية والوسطى . اوراقه مستطيلة النصل الضيق . بلوره متوسطة الصنف والمواد العطرية .

٢٩٦٢٥ - **هال صغير** ، **قالبة صغيرة** ، **حبهان**  
Elettaria cardamomum (S). Cardamomo petite (F). Bastard cardamon, Lesser cardamon (E). Kleine Kardamomen (D). Cardamomo minore (I).  
نوع من الهال الجيد الصنف ، تكثر زراعت في سرنييب وبيلار . ساقه واوراقه صغيرة القند . ازهاره سنبلي التجميع . بلوره وافر المواد الدهنية العطرية الفاخرة الصنف .

٢٩٦٢٦ - **هالكة**  
Halo  
دائرة فضية تحيط بالتمر سبها انكسار النور الذي يخترق بلورات الجليد المتصلة في اليوم العالي البهيدة . اما الدائرة التي تحيط بالشمس فتدعى طفاوة .

٢٩٦٢٧ - **هالوجبة** ، **قروية**  
Halogeton (S).  
Halogète, Halogeton (F). Saltwort (E). Salzkraut (D). Alogeton (I).  
جنس نباتات برية وزراعية من السمرايات وفصيلة السمريقات . انواعها ستة منها الاشباح والجنبيات . ساقها طرفيها زيبه الصماء . اوراقها لحمية متعاقبة . ازهارها فردية التجميع ، محورية الارتيكاز جميلة الشكل || اشهر انواعها الهالوجبة الزراعية المأكولة .

٢٩٦٢٨ - **هالوك ويسي**  
Phélipée d'Egypte (F).  
هو الطرثوث المصري ، اطلبه .

٢٩٦٢٩ - **هالوك شرقي**  
Clandestine du Levant  
هو الطرثوث الاحمر ، اطلبه .

٢٩٦٣٠ - **هالوك نصفي**  
Orobancha caryophyllaceae (S). Orobancha du gaillet (F). Clove scented broom-rape (E). Nelken-sommerwurz (D). Erba scalogna, Succiamela garofanato (I).  
نوع من الجفيل يتطفل على النالين ومل معظم نباتات



هال حبشي



هال حسام



هال ذكر



هالبة



هاليبا



هبار انتلوس

- S. obscurus (S).  
S. obscur (F).  
S. Budang (S). S. maure, Budang (F).  
S. Germani (S). S. de Germani (F).  
S. Johni (S). S. des Nilagiria (F).  
S. ursinus (S). S. ourson (F).  
S. sanex (S). S. blanchâtre (F).  
S. mitratus (S). S. mitré (F).  
S. melalophus (S). S. mélatophe (F).

٢٩١٢٥ - هَبَارَة  
جنس تطور بجمرية من هارة الزناغيات وفصيلة السلحفاة.  
جره الكبدية أسطوانية قصيرة تعلوها كتلة صرطنية  
ضخمة التماسك ثنائية الخلية || أنواعه قليلة العدد  
والأذى أضرها هبارة التنبليات .

٢٩١٢٦ - هَبَارَة التنبليات  
Scolecotrichum graminis (S).

فطر مجهرى يركب بعض التنبليات البرية والكلالية  
فيشود الأوراق دون أن يذيقها || ظهوره الخاضع يقع  
صغيرة تركب نصل النصف ثم تتسع وتنتد فيبلغ طوله  
نحو ٣٠ سم . تبدو شقراء اللون أو سمراء ثم يتغير عيش  
ستارها .

٢٩١٢٧ - هَبَارِيَّات ، وَهَبِيَّات

Semnothecidae (S). Semnothecidae (F).  
Semnothecidae (E).  
فصيلة قزود من سقليات المنخرين تشمل أربعة أجناس :  
الهبار والحوبر والزيك والقزروب .

٢٩١٢٨ - هَبَاش \*  
Homola (S).

Homola (F). Homola (E).  
جنس حيوانات بحرية من القشريات حشرات الأرجل  
قصيرات الذيل وفصيلة الهباشيات . أنواعه المعروفة عديدة  
منتشرة في جميع بحار العالم || أجسامها شبه مجنبة الشكل ،  
تطول من ٤ إلى ٨ سم . قوائمها مستطيلة ، قليلة الأظلال  
بامتياز الزوج الأول للمفصلي الأطراف ، الكثير التنسج  
الشائك والزوج الأخير الذي يتركز في كفتي الظهر  
والذي يتنجز بالصغر والذقة والبراء الأطراف . أثوابها دائماً  
حراء اللون يعلوها مراح من الصنابي إلى الأزرق ||  
لهومها مأكولة .

٢٩١٢٩ - هَبَاشِيَّات  
Homolidae (S).

Homolidae (F). Homolidae (E).  
فصيلة حيرانات بحرية من القشريات حشرات الأرجل  
قصيرات الذيل ، ساملات القوائم . أجناسها وأنواعها  
عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || جميعها مستطيلة القد  
الذي يراوح من ٤ إلى ٨ سم . تتميز بصغر وقصر الزوج  
الأخير من القوائم الذي يتركز في كفتي الظهر || أشهر  
أجناسها وأهمها انتشاراً الهباش .

٢٩١٣٠ - هَبَال \* ، وَهَبِي ، مَرْمُوزَة

Hapale (S). Oulathi, Marmoset (F). Marmoset, Oulathi (E).  
جنس قزود أمريكية من فصيلة القزود البنية . أنواعه ٧  
موطنها حوض الأمازون والبلاد المجاورة || أجسامها  
صغيرة القد ، جميلة الشكل ، مستطيلة الشعر الناعم



هبال

كبيرة القد ، جميلة الشكل ، سفلية التجميع ، تاجية  
الأركان . ثمارها نووية غير مأكولة || أشهر أنواعها  
الأميليا الزباد الورق ويسمونها قاتلة الجرذان ، الزباد  
حراء اللون ، ثمارها جميلة المادة تقضي على الجرذان .

٢٩١٣٠ - هَبَار ، وَهَبِي ، قِرْد مُقَدَّس  
Semnothecus (S). Semnothèque (F). Solemn  
apes, Simpal (E).

جنس قزود من فصيلة الهباريات تدعى القزود المقدسة  
لان الهنود لا يمسونها وقد يعلونها || أنواعه كثيرة العدد .  
أجسامها رفيعة ، نحلة ، متوسطة القد . أذنانها مستطيلة .  
أنوارها ناعمة الشعر . جباهها مكللة بخمار من الهلب الاسود .  
موطنها الهند وجوارها . أكلها يمتد من الشط إلى ارتفاع  
٤٠٠٠ م . || تعيش على الأشجار . قوتها المواد النباتية  
من الثمار والبزور والجذور إلى البراعم والتوت || ألتها  
تضع من جرود أو جرود || أشهر أنواعها ما يتبع .

٢٩١٣١ - هَبَار أَنتِلُوس \* ، قِرْد الهند المقدس

Semnothecus entellus (S). Semnothèque en-  
telle, Entelle, Singe saint des Hindoux, Houleman,  
Houneman, Mandi, Mabus (F). Hanuman, Hoonu-  
man, Entellus (E).

نوع من الهبار ، جسمه بطول نحو ٦٥ سم . وذنبه ٩٦ سم .  
لونه أبيض اللون ، مستطيل الشعر . وجهه أسود البشرة .  
خمار جهته أسود الهلب المستطيل || موطنه شمال الهند  
حتى حدود الهند والبنجاب . يعيش جماعات متوسطة العدد .  
يفضل النباتات والأعراجل النظيلة على مجاري الماء .  
يقترب من الناس والحيوانات الأليفة || قوته الثمار والحبوب  
يأكلها أينما كانت .

٢٩١٣٢ - هَبَار حَمَلَايَا

Semnothecus schistaceus (S). Semnothèque de  
l'Himalaya, S. ardois (F).

نوع من الهبار . جسمه بطول نحو ٦٥ سم . لونه إلى الرمادي .  
شعره كثيف وطويل . ظهره عايق اللون يعلو مراح جرد .  
وجهه أسود البشرة . خمار جهته أسود الهلب المستطيل .  
أذناه صغيرتان . ذنبه بطول نحو ١٠٠ سم . وينتهي بمخلة  
مخلة . موطنه حلايا وبلاد الكشمير . أقليمه يمتد من  
ارتفاع ٢٠٠٠ إلى ٢٩٠٠ م .

٢٩١٣٣ - هَبَار دُول ، هَبَار لِنْس ، دُول

Semnothecus nemaeus (S). Semnothèque douc,  
Douc (F).

نوع من الهبار ، جسمه بطول نحو ٥٥ سم . لونه متباين  
الألوان . رأسه وأطراف يديه ورجليه سود . وجهه أصفر .  
عنه وساعده وفخذه إلى المؤخرة . ذقنه وصدره وذنبه بيش .  
بلته أظفر . ظهره إلى الزبداء || موطنه غابات الكونغو  
جماعات كبيرة العدد ، مؤذية ، تلت كل زراعة  
تصل إليها .

٢٩١٣٤ - هَبَار قَبْرِي

Semnothecus phayrei (S). Semnothèque de  
Phayre (F).

نوع من الهبار ، جسمه بطول نحو ٨٥ سم . لونه رمادي  
اللون . عايق الظهر . رأسه حري الشعر الاسمر . يعلو  
ويطون يديه ورجليه إلى البياض الأخير . كفاه إلى  
الفضة . ذنبه أبيض اللون . اسمر الطرف . بطول نحو ٧٦  
سم || يألف الغابات الكثيفة الأشجار وأجام الخيزران  
قوته الثمار والحبوب والبزور والجذور .  
ومن أنواع الهبار المعروفة تنحس بالذكور :

يلوه تبيع ثني وزركشة كستنية ورشة حلاوة. روشانا الخلفيان إلى الخطي الاطحل. حناها اكلت. ادهاها إلى الشقة || لها جبل واحد في الحول. تظهر الفراء في ايار وتبقى حتى تموز. تسرح في الليل. تعاملل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتجمع المكن لطعا لا يتأثله الحجر على الصفحات السفلى من نعال الارواق || السرعة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٧ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل مستطيل المقدم «متدق المؤخر» ثوبها الى الطحلة السمراء يملوها تجنح معترض اخضر اللون عند حل الجانبين من السكة البطنية الثالثة الى التاسعة. رأسها شديدة السمرة وبديها ورواجها || طول الاكامل الذي يستمر من ٣٠ الى ٣٢ ارجوا يتقضي ضمن غلاف رقيق شفاف في الجنالة أو تحت الارواق الساقطة.

Hopliopteron (S). هَبْرَس - ٢٩٦٤١

Hopliopteron (F). Hopliopteron (E). جنس حيوانات بحرية من الرخويات ممديات الارجل وفصيلة الاوليبيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار الصين || اصداؤها صغيرة لكامة، مردنية الشكل، مغلظة، مجنسة الغالب، زاهية الالوان الفاتحة.

Matthiola graeca (S). هَبَس - ٢٩٦٤٢  
Matthiola maritima (F).

نوع من المنشور البري، نبات عشبي بري معمر من فصيلة الصليبيات. منبتها تهاج حوض البحر الابيض المتوسط، من اليونان الى لبنان || ساقه منتصبه فراء تلو من ٣٠ الى ٧٥ سم. اوراقه متعاقبة، سنائية النصال الضيقة الزيادة. ازهاره عقودية التجميع، طرفي الاركان. ازهاره ذكية اللون عديدة الالوان منها الاحمر والبنفسجي والوردي والابيض والاصفر || تنويره يستمر من اذار الى تموز

Hypsipetes (S). هَبْسِيَت - ٢٩٦٤٣  
Hypsipète (F). Hypsipetes (E).

جنس طير من الجوائم سنيات المنابر وفصيلة الكتيبات. انواعها المعروفة نحو ٢٠ موطنها يمتد من الهند الى الصين وبعضها يعيش في الحيشة وندسفر. ملجئها الحيائي جامعي. جماعاتها قليلة العدد. تألف الغابات وضايف مجاري الماء. قوتها الحشرات المختلفة والحوام || اجسامها صغيرة قريبة الشبه بالبلابل، اطوالها تتراوح من ١٧ الى ٢١ سم. رؤوسها معتدلة الجسم. مناقيرها مخزنية ذرية. اجنحتها ذلقة. اذنانها مستطيلة، فافرة الاطراف. اوقها تختلف مع الانواع يكثر فيها الاسود الاسم الاصبع والكسني الاشعث والرماذي الازرق المواج... || تدين اعاشها في الاجمار الرينة القريبة من مجاري الماء. اناثها تحسن من ٤ الى ٦ بيضات حل مرثين في الحول. الذكور تتناوب مع الاناث في الحفن.

Ane noir (F). Black ass (E). هَبَس - ٢٩٦٤٤  
هو الهار الاسود.

Strelitzia (S). Scrdilizia (F). هَبَل - ٢٩٦٤٥

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المزيديات. انواعها المعروفة ٦ جميعها من نباتات البلاد الحارة. سوقها ليفية متراكبة الانابيب. اوراقها معتقة، كبيرة القد، ثنائية التصيف، متعاقبة النصال. ازهارها خشوية. تردد للترين || اشهر انواعها ما يلي.

الرثير. رؤوسها مستديرة. اذنانها مرودية الور. اذنانها مستطيلة جللة || جميعها شاجرة تألف النايات والاحراج البعيدة والقريبة من الممران. قوتها التار والحشرات. اكلاتها هنية، رضية. تألف حياة الدجن وتتلقي باصهارها.

٢٩٦٣٦ - هَبَال  
شمر تمل منه السهام - الواحدة هائلة.

Ecorces sèches (F). Dry peels (E). هَبَايَة - ٢٩٦٣٧  
حياة الشجر: قشرها الناشف.

Legs (F). Legacy, Bequest (E). هَبَايَة - ٢٩٦٣٨  
هو كل موهوب في وصية مكتوبة.

Broussin (F). هَبِيَج - ٢٩٦٣٩  
رود يمتري طاء سوق واغصان وافناد الشجر، سببه الصمغ أو بعض الجراثيم.

Graines de colocynthe (F). هَبِيدَة - ٢٩٦٤٠  
Seeds of the colocynth (E). هو حب الخنظل الواحدة هيبية.

Filasse (F). هَبِير - ٢٩٦٤١  
هو للشاقة، اطليا.

Diacono rivulata (S). هَبِير - ٢٩٦٤٢  
سمكة من الطنف وفصيلة القرشيات. جسمها كبير القد مبطل الشكل. طولها يراوح من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. وعرضها من ٤٠ الى ٤٨ سم. ثوبها الى الزرقا البشجية المراج. غشها مستحب العلم مرغوب فيه. اعطائها فسيحة الاجزاء تمتد من البحر الاخر الى بحار استراليه.

Haberlea (S). هَبِيرِيَة - ٢٩٦٤٣  
Haberlée (F). Haberlea (E).

عشبة صغيرة معمرة تن فصيلة الجسبريات. منبتها يمتد من الشرق الادنى الى البلقان. تربي في المواقع الصخرية. ساقها جدعة. خمرهاها الزهري يملو من ١٠ الى ١٥ سم. اوراقها اهلجية مقنطرة. نصالها جلدية مسنة الخنار. ازهارها ليلية تطول نحو ٥ سم. قطرها ٤ سم. بتلاتها خلية || تنويرها يستمر طول شهر حزيران.

Habrosia (S). Habrosie (F). هَبِرَوِيَة - ٢٩٦٤٤  
جنس نباتات عشبية حولية بيرة من فصيلة النويانيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها بعض اصفاق حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها تحلة فراء. اوراقها صغيرة، متعاقبة، شبه مخروطية الشكل. ازهارها صغيرة وردية اللون. تنويرها ديني.

٢٩٦٤٥ - هَبِرَوِيَن اَسْبَد - ٢٩٦٤٥  
Habrosyne derasa (S). Habrosyne rasé (F).

حشرة من فصيلة الشروقيات وردية حشرفيات الاجنسة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اربوة. فراشها جارية قوتها رقيق الازهار. سرتها تمش على اوراق المروج || جسمها وشي الشكل يطول نحو ١٢ سم. يسطها نحو ٣٨ سم. رأسها اسمر اللون. عينها كبريتان. زباناتها عيطان. رشفها مستطيل ملتف. جوشها وعلتها الى الحطلي الاسمر || روشانا الاسمان الى الحطلي الاسمر



هَبَالَة



هَبِيرُون اَسْبَد



هَبَب



هَبَل



هبل



هبتق



هبيس

وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحيرات ومناطق وأهوار البلاد المتعددة الحرارة || اجسامها صغيرة ، شبه بيضية الشكل ، مدهبة المزهر ، تطول من ٢ الى ٤ سم . رؤوسها صغيرة ، مستعرضة ، هيونها ناشرة . قرونها الاستشعارية غشائية مركبة من حشر فصل . كواسلها عديمة ، مستعرضة . احمادها لافحة ، نجيلية التخذيد . قوائمها نشطة || جميعها مفترسة ورائحة . تعيش بين النباتات المائية قرب الشطوط وعلى الضفاف في فصل الصيف || اشهر اجناسها الهبلد .

**٢٩٦٥٣ - هبتياريكة (Habenaria) (S). Habenaria (F).**  
جنس نباتات شبيهة سمرة من فصيلة السحليات ، انواعها نحو ٤٠٠ منظرها أمريكي المنبت . اقاليمها المناطق الحارة والمعتدلة . بعضها زراعي زينة . اشهرها الهبتاريكة الثنائية النصل .

**٢٩٦٥٤ - هبتاريكة ثنائية النصل ، زوكوندي (Habenaria bifolia) (S). Habenaria bifolia (F). Butterly orchis, Fringed orchis (E). Kleine Stendelwurz (D). Orchide bianca (I).**  
نبات عشبي زينة معمر . جذوره درنية سترابية الشكل . اوراقه قرصية متطعية ثنائية النصل . ازهاره جميلة الشكل ، يبيض اللون ، سفيلية التجميع ، ترتكز على سراج قزمي الالتشاب .

**٢٩٦٥٥ - هبتق (Hypnum) (S). Hypne (F). Feather moss (E). Astmoss (D). Ipne (I).**  
جنس نباتات طحلبية من العريشيات . انواعها المعروفة نحو ٢٠٠ ، سقوها نجيلية مدادة متفرعة . اوراقها دقيقة متراصة متناوبة تلحف السوق بكاملها || وهي تعيش وتتمرد في التراب وعلى الصخور ويطلع الانجراس . تستعمل للزينة وتستخدم خاصة في صر الآلية الخزفية والبلورية لوقايتها من الكسر .

**٢٩٦٥٦ - هبتييس (Hippomyx) (S). Hippomyx (F). Hippomyx (E).**  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهدبات الاربيل امانيات الخياشيم وحيدات الاجهزة وفضيلة الهبتييسات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق المحيط الهادي . بعضها يعيش على الاصايف المجزأة والبعض الآخر على الصخور || اصداها غروطية وحيدة المصادر قريبة الشبه بالقرن القصير المدب الطرف . اجسامها بيضية الشكل . رؤوسها مكورة . لواسها غروطية . حيزها كبيرة ترتكز على قواعد القراس . غياشيمها نظامية . ارجلها وحيدة كبيرة مجعبة .

**٢٩٦٥٧ - هبتييسات (Hippomyxidae) (S). Hippomyxidae (F). Hippomyxidae (E).**  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مهدبات الاربيل امانيات الخياشيم وحيدات الاجهزة . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد . اعطائها بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تعيش قرب الشطوط || اصداها قريبة الشبه بالخافر وبالقرن القصير . سقاط الصدقة يتطور مع العمر فيصبح كالنفساء || اعرف اجناسها واشهرها الهبتييس والمرولة .

**٢٩٦٦٦ - هبيل الملكة (S). Screllitzia reginae (S). Screllitzia de la reina (F).**  
نوع من الهبل الزينة ، يطو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه مستطيلة الاثناق . نصلها جامد المصقة المنتمية الاطراف ، لونه الى الخضار البحري . ازهاره كبيرة اللد ، ذمية الفصل ، ستميرية البتلات .

**٢٩٦٦٧ - هبيل صغير الورق (S). Screllitzia parvifolia (S). Screllitzia à petites feuilles (F).**  
نوع من الهبل الزينة ، يطو نحو ١٢٠ سم . اوراقه اسلية الشكل ، عادمة النتق ، عابقة الخضار . ازهاره متوسطة اللد ، ارجوانية الفصل ، بنفسجية البتلات .

**٢٩٦٦٨ - هبيل قشيري (S). Screllitzia augusta (S). Screllitzia augusta (F).**  
نوع من الهبل الزينة ، يطو من ٣ الى ٦ امتار اوراقه كبيرة اللد معتقة . اعنتها تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ونصلها من ٦٥ الى ١٠٠ سم . وهي اعطليجية الشكل ، قلبية القاعدة ، شديدة الخضار الباقي . ازهاره كبيرة اللد ، يبيض اللون .

**٢٩٦٦٩ - هبيل (S). Lévrier (F). Greyhound (E).**  
من الكلاب السلوقي او السلاقي ، مستطيل الجسم العتيق الاخير . يتميز بخصه وبسرعة عدوه . يستعمل في صيد الغزال .

**٢٩٦٧٠ - هبيلود (S). Hapaloderma (S). Hapaloderma (F).**  
طائر وحيد الجنس والنوع من المتشكلات وفضيلة اللغزويات موطنه بعض مناطق افريقية الحارة . يأنف الغابات الرطبة . ملجته الجمالي زوجي . قوته الحشرات على اختلاف انواعها وبعض اثاره العنيفة || جسمه متوسط اللد ، يطو نحو ٢٢ سم . قوته الى الخضار اللذي المالح . زوره ويدي اللون . يطه الى الشهية . يتميز بكثافة سياه وبكر ذبه الذي يشبه المروسة . جناحاه معتدلا الطول ، ذلقا الاطراف || يدقن عشه في صدور الانجار الحرة . الاثنى تحضن نحو اربع بويضات على ثلاث مرات في الحول . الذكور يؤن لها الغذاء .

**٢٩٦٧١ - هبيليد (S). Halipius (S). Halipia (F). Halipius (E).**  
جنس حشرات مائية مفترسة من فصيلة الهبليديات ورتبة مهدبات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة والباردة || اجسامها صغيرة ، شبه اعطليجية الشكل ، مدهبة المزهر ، تطول من ٣ الى ٤ سم . رؤوسها صغيرة ، مستعرضة . هيونها ناشرة . قرونها الاستشعارية غشائية . تاكلها وتكونها ولاسها صغيرة . كواسلها عديمة . احمادها عديمة ، لافحة ، شبه مجنبة الشكل ، نجيلية التخذيد . قوائمها نشطة . اثارها مبقجة || تألف المناطق والبيئات التي تكثر فيها الاغشاب المائية . قوتها كل ما تستطع قصه من دويبات .

**٢٩٦٧٢ - هبيليديات (S). Halipidae (S). Halipidae (F). Halipidae (E).**  
فصيلة حشرات مائية من مهدبات الاجنحة . اجناسها

Hétéroplode (F).  
Heteroploid (E).

نمت تعريفي يطلق على الاجهزة المضوية الايقاسية المنطش.

Anthrozoïdes (F).  
Antherozoïdes (E).

هي عنصر الاخصاب الذكري عند معظم النباتات. وهي التي بالتحامها مع العنصر الانثوي تكون البويضة المخصبة والاستمرار.

Rainette (F).

٢٩٦٩٤ - هَجَاة

هي الشفدع ، اطليه .

Cercopithecus (S).

٢٩٦٩٥ - هِجْرَس

Cercopithecus (F). Tailed spes, Lasiopyga (E).

جنس فرود ذيلية من فصيلة الهجربيات . انواعه المعروفة ٤٤ ، موطنها اسراج وغابات القارة الافريقية . جميعها صغيرة القد ، وشيقة القوام ، مستطيلة الاذناب ، قصيرة الاربطة ، وسيدة الاضواء . اثنايا زاهية الالوان يكثر فيها التوشيح . تعيش على الاشجار ، قوتها الثار والحبوب والجنود . جماعاتها متوسطة العدد . اناثها تقنع جروا واحداً رضعه نحو ٦ شهور || اعرف انواعه واشهرها :

٢٩٦٩٦ - هِجْرَسُ احْمَرُ \*

Cercopithecus patas, C. ruber (S). Cercopithecus patas, Singe rouge (F). Patas (E).

موطنه بعض اسراج وغابات افريقية الشمالية . ظهره وابطاءه ورشاه وباعده وذنبه الى الصبغة الجلوية . بطنه وبوامن قوائمها الى البياض الامطل . وبهيه واذاؤه سود .

٢٩٦٩٧ - هِجْرَسُ اخْضَرُ \*

Cercopithecus callitrichus (S). Cercopithecus callitrichus, Singe vert (F). Green monkey (E).

موطنه ضفاف النيجر . جماعاته كثيرة العدد . ثوبه الى الخضار الزيتوني . بطنه الى البياض الاصفر . وبهيه اسود اللون . حنار جبهته ابيض . ذنبه اصفر الملب .

٢٩٦٩٨ - هِجْرَسُ اخْضَرُ

Cercopithecus pygerythrus (S). Cercopithecus veret, Vervet (F). Vervet (E).

موطنه افريقية الجنوبية . جماعاته متوسطة العدد . ثوبه الى الخضار الاصفر يطو موج اسمر . بطنه وحنار وبهيه الى البياض الاصفر .

٢٩٦٩٩ - هِجْرَسُ اسْبَسَلُ ، اَبُو شَبَب

Cercopithecus cephus (S). Moustac

موطنه الغابات القائمة بين النابون والكنغو . ثوبه الى الصبغة ، رأسه زيتوني اللون ، وبهيه الى الزرقعة السوداء . حناره ابيض . كفه اسود . ذنبه اربد اللون ، اسمر الملب والظرف || اخلاقه رضية هنية . وهو سريع الالتباس والسيان .

٢٩٧٠٠ - هِجْرَسُ الْبَحْرِيات

Cercopithecus brazzae (S). Cercopithecus de Brazza (F). Brazza monkey (E).

موطنه مناطق بحيرات الكونغو . جسمه رشيق القوام يطول نحو ٧٥ سم . وذنبه ٧٥ سم . ثوبه الى الصبغة . حنار جبهته تاجي الشكل صناعي المقدم ، اسره المنخر . يذاه ورجلاه سود . طرف فخذيه الخارجي ابيض اللون . يياضه عند من حدود الساق الى الجاعرة . ذنبه اسود لامع .

تخلدها على غفاف مجاري الماء . قوتها المواد المضوية المنحلة والديدان وكل ما تستطيع قنصه .

٢٩٦٨٧ - هَتَلَى \*

Abolboda (F).  
جنس نباتات جلمورية برية وزراعية تربيتية . انواعه المعروفة قليلة ، منها مناطق البلاد الحارة . اوراقها اسلية الشكل ، جامعية الانتصاب . ازهارها غراخي ينتهي بزهرة عشوية ، ثلاثية التويجات وثلاث . مبيضا ثلاثي المسكن . عديد البويضات . بتلات ازهارها بياض اللون او ودية .

٢٩٦٨٨ - هُتُولِيَّة

Hottonia (S). Hottonia (F).  
جنس نباتات مائية من فصيلة الربيقيات . انواعها قليلة . اوراقها مركبة ورشيقة مستطيلة الاعتناق تومع على صبغة الماء . ازهارها عشوية التجميع طرفي الزنكاز . ازهارها خماسية التركيب || اشهر انواعها واعما زراعة المختبرية المنغمية .

٢٩٦٨٩ - هُتُولِيَّةُ مَتَقِيَّة \*

Hottonia palustris (S). Hottonia des marais, Milles-feuilles aquatique, Plumeau, Girofée d'eau (F). Featherfoil, Water gillflower, Water violet (E). Wasserfeder, Feder-Garbe (D). Garofano d'acqua, Erba militare, Penne d'acqua (I).

نوع من المختبرية . يكثر ويصودها في المناطق والمياه الرائدة . تزور في اسواض الماء قترين . ازهارها بحيلة الشكل . بتلاتها حر الصبغة صفر القاعدة .

٢٩٦٩٠ - هُتُولِيَّة

Houttuynia (S). Houttuynia (F).  
جنس نباتات طيبة جلمورية زعانة من فصيلة الصرويات . معقودة التعريف على اسم العلامة الهانغري هوتون .

انواعها المعروفة قليلة ، منها بعض اصقاع آسية الشرقية ، تعيش على غفاف مجاري الماء . سوقها تحيلة سولية تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها منقطة متعاقبة . تصلا قلبلي الشكل . مدبب المقصبة ، بارز المروق ، حشوي الصبغة السفل . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها صغيرة القد غبراء اللون ، عصاره جلودها سريفة الطعم . اوراقها مطعنة .

٢٩٦٩١ - هُتِيرِيَّة \* ، سَكَنْدُون \*

Sphanodon punctatus (S).

Sphénodon, Hatteria (F).

حيوان يبيض وحيد النورع والجنس والفصيلة من رتبة غطويات الاروس . موطنه جزر زيلندا الجديدة || شكله شبيه بالظواء ، اما التاييز الفوزي والجمودي يكتسبان في التركيب وفي القد . جسمه يطول نحو ٧٠ سم . جلده مبشّر القمل ويملو في قد رأسه وفي ثبج ظهره وذنبه عرف فضروي التركيب سنن كالنشار . رأسه مكمل . المنطقة الصدفية من الرأس مقلية التركيب . بطنه محفوف بالاضلع . مديه ملحوف بزحف جلده . ذنبه مستطيل ، قابل التجديد عند الانفصام . قوائمه نشيطة . خاصة الاصابع المقيدة شارقة ومرتزة في الحافة الخارجية من الفك الاصل الاثني امين قدأ من الذكر واصغر بطلأ منه . ثلثي من ١٠ الى ١٢ شلقة في سفره بين الصخور التي ترتادها برفقة طيور البحر . يتنقث الشلق بعد وضعه بنحو ٤ اسبوعا || يسرح في الليل . انتقاله سريع الحركة في البر وفي الماء || قوته المعافاة والصفاد والديدان والقرواص الصغيرة .



هتل



هتولية متقية



هتيرة



هيجرس احمر



هيجرس اخضر

## ٢٩٧٠١ - هجرس الغاب \* تستاس

*Cercopithecus pyrrhonotus* (S). *Cercopithecus nissus*, *Nissus* (F).

موطنه افريقية الشرقية اصحابها الصوال وكردفان ودور. ثوبه سوي اللون الاصهب الصالب. سثار وجهه الى البياض الاخير || وهو من القردة الشديدة الحذر المكيدة، التي تقتبس العلم ببطء ولا تنسى .

## ٢٩٧٠٢ - هجرس ديانا \*

*Cercopithecus diana* (S). *Cercopithecus Diane* (F). *Diana monkey* (E).

موطنه ليبريه والكنو . ثوبه جميل الالوان ، ظهره ارجواني. بطنه الى البياض الاخير . ساعده وضفاد سود الفاه ، صفر البطن . اما الذكر فيتميز بختار وجهه الاسود وبلحمه وسباله البهش .

## ٢٩٧٠٣ - هجرس سبا \* شادي، عبتج، طون

*Cercopithecus sabaeus* (S). *Cercopithecus de Saba*, *Grivet*, *Tota* (F). *Grivet* (E).

موطنه افريقية الشرقية يكثر في الحبيشة وسنار وكردفان . جسمه صغير القد ريع التناطج . ثوبه الى الخضار المايق . قوائمه وذنيه موشمة بالابيض . وجهه واذناه سود .

## ٢٩٧٠٤ - هجرس سكتار \* سكتار

*Cercopithecus talpoin* (S). *Talpoin*, *Mtapi*, *thèque* (F).

موطنه الغابون . ثوبه كثيف الشعر الناعم . ظهره الى الخضار الاسفر . يملأ الى البياض الاخير . سثار وجهه تقري الشكل ، ابيض اللون || اخلاقه هنية رضية . يقتبس العلم يدور نفور واتزعاج .

## ٢٩٧٠٥ - هجرسيات \* قروء ذبالة، قروء

*Cercopithecidae*, *Lasiopterygidae* (S). *Cercopithecidae* (F). *Cercopithecidae*, *Lasiopterygidae* (E).

الهجرسيات والهجرايس فصيلة قروء من سلالات المنخرين تشمل ستة اجناس الهجرس والحودل والملاك والشدم والقشة والقردوح .

## ٢٩٧٠٦ - هجين

*Métis* (F). *Cross-bred* (E). هو في الحيوان نتاج التجين اي الاسفاد بين حيوانين من نوع واحد ولكن من سلالتين مختلفتين .

## ٢٩٧٠٧ - هجين

*Hybride* (F). *Hybrid* (E). هو في النبات نتيجة تلبيغ زهرة بطلع زهرة اخرى من نوعها اما من غير سربها أو سربها . وهو يدعى هجلاجا

## ٢٩٧٠٨ - هذاب \*

*Parnassius* (S). جلس سحرات فراشية من حمارة اللثانيات . اناومه عديدة جميعها متوسطة القد، بسطها تراوح من ٥٥ الى ٦٥ سم . اجسادها اسطوانية مهذبة . رواشها مستعرضة مستديرة، لونها الى البياض الاخير يملؤها تمجيج ليليكي وتنتج اطعم تلبيج اسود وافر || تظهر في اوائل الصيف تمتع سكانها على نباتات فصيلة الهذلات فينتف من رقات مفالطة مضمة جوزية اللون خلية الجسم مهذبة بالهلب التضر وبسطة بالاحمر .

## ٢٩٧٠٩ - هذاب الجروء \*

*Parnassius montivagus* (S). *Parnassien des montagnes* (F). *Mountain Butterfly* (E).

حشرة من فصيلة الفراشيات ورنية حرشيات الاجنحة . موطنها بلاد جبال الشرق الاذن . فراشها واثمة قوتها رقيق الازهار . سربها تعيش على اوراق القنطريون والحذلات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ سم . بسطها نحو ٥٤ سم . واهيا اكبر اللون . عينهاا ناشزتان . زيانهاا صولجانيان . بيوشها الى الشبهة السوداء المزاج . بسطها الى الشبهة الرصاصية الغضبية الهذبة || رواشها عند الشقين الى البياض الاخير يملؤها تمجيج اريد ويليكي وتنتج اسمر وتبيج اسود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواخر الربيع تسرح في التبار . تماثل يده ظهورها بنحو اربعة اسابيع ويمتج المكن ميماديا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || للفرقة عند بلورها الكمال تطول نحو ٢٢ سم . جسمها مفلطح الشكل . ثوبها الى السمرة الجوزية تملؤها ثلاثة خطوط سود قاطبة وتنقبط جانبي احمر واصفر . قشارها كثيف الخمل والهلب القصير . رأسها اسود . فكهاا نشيطان . رواشها وبدها الى الريدة السوداء || طول اليرقة الذي يستمر من ٢٢ الى ٢٤ اسبوعا ينقضي ضمن صلبة متينة التسج .

## ٢٩٧١٠ - هذاب

*Filaridés* (F). *Filaridés* (E). ردف من الديدان السليكية الولودة . تتميز باجسادها الدقيقة النحيلة الخيطية الشكل . انواعها عديدة تعيش في الاجسام الحية فتؤذيها وقد تميتها . اغلب هذابة .

## ٢٩٧١١ - هذابة \* فيلاريية، عروكة

*Filaria* (S). *Filaira* (F).

جنس ديدان سليكية من الهذاب . انواعها كثيرة الفلد تصيب الانسان والحيوان . جميعها دقيقة الجسم النحيل ، عيضية الشكل، مستطيلة، تعيش في الجهاز الدورى وفي التسج الضام تسبب اضطرابات حتية واختلالات داخلية قد تكون سببا للموت || اعرف انواعها ما يتبع .

## ٢٩٧١٢ - هذابة الخيل

*Filaria equina* (S). *Filaire du cheval* (F).

نوع من الهذاب تطول من ٤ الى ١٢ سم . تصيب الخيل والابل والحيبر . تتركز في اغشية المعدة . تسبب بعض الاضطرابات الداخلية فلما تكون وشية الماتية .

## ٢٩٧١٣ - هذابة الدمع

*Filaria lacrymalis* (S). *Filaire lacrymale* (F).

نوع من الهذاب تطول من ١٠ الى ٢٥ سم . تركيب البقر وتعيش في مجارى خدد الدم تسبب التهابا للملتصحة . يقضى عليها باستئصالها .

## ٢٩٧١٤ - هذابة الطيباء

*Filaria cervina* (S). *Filaire des cervidés* (F).

نوع من الهذاب تركيب الطيباء والايالي في نسجها الضامة . طولها يراوح من ٣ الى ٥ سم .

## ٢٩٧١٥ - هذابة الكتب

*Filaria immitis* (S). *Filaire cruelle* (F).

نوع من الهذاب تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . تركيب الكلب تقدر في الجهاز الدورى وتستقر في بطن القلب الايمن . يكثر وجودها في الصين واليابان وفي ايطاليا واليونان .



هجرس الغاب



هجرس ديانا



هجرس سبا



هذاب



هذاب الجروء



هذابة



Cloporte commun (F). - **هَدَبَكَة** - ٢٩٧٢٥

رأبج حمار قبان .

Fulcre - **هَدَبَكَة** - ٢٩٧٢٦

هي غويوط جهاز التناسل في فطور الازديادات .

٢٩٧٢٧ - **هَدَبَكَة** طائر (السان) .

Tigre mâle (F). He-tiger (E). - **هَدَبَس** - ٢٩٧٢٨

الهدبَس البر الذكور عند بلوغه كامل النشاط .

Ciliés (F). Cilia (E). - **هَدَبِيَّات** - ٢٩٧٢٩

شعبة من التقييمات من الحيوانات الدنيا الالوان .

Thysanoptéroïdes - **هَدَبِيَّات الجناح** - ٢٩٧٣٠

طبقة حشرات من شعبة المليئات تشمل رتبة واحدة تدعى هدية الاجنحة ، اجناسها وأنواعها زهاء ١٠٠٠ تجمعها عدة فصائل .

Thysanoptères (F). - **هَدَبِيَّة الاجنحة** - ٢٩٧٣١

Thysanoptera (E).  
رتبة حشرات من طبقة هديات الجناح . فضائلها واجناسها وأنواعها كثيرة المدد . اجسامها صغيرة دقيقة يصعب تمييزها بالعين المجردة . اضططامها غروطية الشكل . امتلاكها ثنائية ماصة . قرونها الاستشعارية عديدة المقل التي تراوح ٦ الى ٩ . . اجنسيتها عند وجودها هدية التركيب مستطيلة . انوثها سوية الالوان منها الاسفر والاسمر والكتشي والاسود || حشرتها الكاملة وبرقاتها تركيب العديد من النبات . قوتها الخفيف والغسق وصارة الخلاء || اشهر حشرتها الرئيس .

Thysanoures (F). - **هَدَبِيَّة الأذنان** - ٢٩٧٣٢

Thysanura, Bristle-tails (E). Borstenschwänze (D).  
طائفة من الحشرات المذبة المدعمة الجناح . فضائلها واجناسها وأنواعها كثيرة العدد تجمع الى ربتين رتبة لاطئات الملك ورتبة ظاهرات الملك .

Hydraires (F). - **هَدَرَات** - ٢٩٧٣٣

هي المدارات ، رتبة حيوانات مائية من المحرفات .

Hydra (F). Hydra (E). - **هَدَرَة** - ٢٩٧٣٤

الهدرة هي المدار ، جنس حيوانات مائية من المدارات .

Hydrogénation (F). - **هَدَرَجَة** - ٢٩٧٣٥

المزج بالهيدروجين .

Hydrostatique (F). - **هَدَرَسَة** - ٢٩٧٣٦

Hydrostatics (E).  
علم توازن السوائل وضغطها .

Hydrobia (S). - **هَدَرُوب** - ٢٩٧٣٧

Hydrobia (F). Hydrobia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مدليات الارجل وفصيلة الهدروبوات . أنواعه المعروفة كثيرة المدد بعضها من متحجرات الاسحاب الثالثة والبعض الآخر منتشر في معظم بحار العالم . يكثر وجودها عند مصبات الانهر || اصنافها صغيرة ، مائسة ، مدبسة الاعقاب ، قرنية الاسقاط .

Filaria caprae (S). - **هَدَايَة الماعز** - ٢٩٧١٦

Filaire des caprins (F).

نوع من الديدان طويلة يراوح من ٢ الى ٥ سم . تركيب الماعز في نسبها الفاسدة فتفرح جلودها وتفسدها .

٢٩٧١٧ - **هَدَايَة المدينة** ، عرقى هَدَكِي

Filaria medinensis (S). Filaire de Médina, Ver de Médina (F). Guineas-worm (E).

نوع من الديدان تكثر في البلاد الحارة . تقيض تحت الجلد في لسج الجسم الفاسدة عند البشر والحيول والبقر وسائر البهيم . انشاما طولها من ٥٠ الى ٨٠ سم . وقد يصل طولها في بعض الاحيان الى ٤٠٠ سم . تستقر في أي مركز كان انما تغفل اسفل الساق فتصيب دملة تلتهب يخرج مفرح . يقال ان كشيها يدخل المدة مع الماء . فاجتنابها يكون اما بخل الماء او بتغييره .

٢٩٧١٨ - **هَدَايَة يأسورية**

Filaria haemorrhagica (S). Filaire des boutons hémorragiques (F).

نوع من الديدان طولها من ٣ الى ٧ سم . تركيب الخيل والبهائم والحيول . تنتركز في الفتق والكفت والجلود . تسبب دملات تتركب الدم .

٢٩٧١٩ - **هَدَايَة الأرجل**

Cirripèdes, Cirropodes (F). Cirropoda (E).

رتبة حيوانات دنيا من الفريات ، فضائلها واجناسها كثيرة العدد جميعها صغيرة القند تعيش طفيلية على الاسماك والحيوان وكل شيء تستطيع الالتصاق به . قرونها الاستشعارية بحرية بمحاجم تمكنها من الالتصاق .

٢٩٧٢٠ - **هَدَايَة** - ٢٩٧٢٠

Frigidité (F). Frigidity (E).  
حالة مقاومة سلبية أو قنور في وظائف الأعضاء التناسلية تجعل المرأة تنفر من التكاثر أو لا تتنبت بممارسته لانها قلما تتحسن الجهور الجنسي .

٢٩٧٢١ - **هَدَكَل** \*

Viscum album (S).  
Gui, Gui blanc, Morvé (F). Common mistletoe (E). Gemeine Mistel (D). Visco quercino, Vischio comune, Panis (I).

نبات طفيلي معمر من فصيلة المتنبات . يعيش على افصان الأشجار الشجرة والحرجية اخضها الفتحاح . فيقاس هائله السخ ويؤذي . برته تنث في السخ الذي يلصقها بالنصن . جلوره تلصق في لحاء المائل . فروعه ثنائية التركيب . أزوائه متعاقبة جامدة النصل الاخضر الاس . انزاعه وحيدة الشق ، ضمية التجميع ، ابطية الانكاز . شمارة نووية الشكل ، يبيضه اللون ، دابقة للمادة . برورها دقيقة مغلطمة || ثمارها مأكولة من بعض انواع الطير اخضها الثمان التي تغفل البرور مع سلها الى أي شجرة كانت || والهدال يستعمل ضد الربو والشفاق ويستخرج منه نوع من الدقيق جيد الصنف . الواحدة مدالة .

٢٩٧٢٢ - **هَدَايَة** هو المحدث ، الخلبه .

٢٩٧٢٣ - **هَدَبَة**

Cueilir (F). To gather (E).  
هدب الشرة : اجتثاثا وهدب وهدب ايضا .

٢٩٧٢٤ - **هَدَبَكَة** ، **هَدَبَكَة**

Aiguille (F). Needle (E).  
الهدية والهدية . ج هذب وهذب وأهداب . كل ورقة ابرية الشكل لا خير لها ولا عرض كورق الصنوبر واللائل ...



هدال

الملس، سواد اللون، فضة المراج، تعتبر من اقصر وأنجح القراء.

Hydrobiidae (S). هيدروبيات \* ٢٩٧٢٨

Hydrobiidae (F). Hydrobiidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربع امانيات الخياشيم المشطية. اجناسها المعروفة ٢٢ وانواعها بعض الائنات منتشرة في معظم بحار العالم وخاصة عند مصبات الانهر لانها ترضب في الماء الاجاج || اعرف اجناسها واشهرها الهذروب.

Hydraena (S). هيدروبيات \* ٢٩٧٢٦

Hydrina (F). Hydraena (E).

جنس حشرات من فصيلة الهيدروبيات وربة غديرات الاجنحة. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجناسها صغيرة، اطيالية، هيفاء، تطول نحو ٣ سم. رؤوسها مستقيمة، عينها بارزة، قرونها الاستشعارية غيطية. تأثيرها قصيرة، ملاسها مسطيلة، منمنقة، كواسلها شبه مكورة الشكل، اغادها لاحفة. قرونها مسطيلة، اثوابها سوية اللون تكثر فيها السمرة السوداء والحمرة ثم البني والكنسي || تألف مجاري الماء. تعيش تحت الحجارة المدفونة.

Hydroscaphidae (S). هيدروسيات \* ٢٩٧٢٩

Hydroscaphidae (F). Hydroscaphidae (E).

فصيلة حشرات مائية من غديرات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها منافع ويجبرات البلاد المتطلة الحرارة || اجناسها شبه بيضية اللون، متدلة التبطيط، تطول من ٨ الى ١٤ سم. رؤوسها مستقيمة، مخروطية. عينها بارزة. تأثيرها وتكونها نظامية. - قرونها الاستشعارية سباعية الفصل. كواسلها شبه مربعة الشكل، اغادها لاحفة || تعيش على النباتات المائية في البحيرات والمنافع || اشهر اجناسها الهذروس.

Hydraenidae (S). هيدروبيات \* ٢٩٧٢٧

Hydranidae (F). Hydraenidae (E).

فصيلة حشرات مائية من غديرات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجناسها صغيرة، اطيالية الشكل، متدلة الاجنح، تطول من ٣ الى ٥ سم. رؤوسها متدلة الجرم. عينها بارزة. قرونها الاستشعارية غيطية، سباعية الفصل. اغادها لاحفة. قواسلها المنمنقة. كواسلها نظامية. تعيش في المنافع والبحيرات ومجاري الماء تحت الحجارة المدفونة او بين اوراق النبات. ونها انواع تعيش تحت طبقات الصفقات. يرقاتها مفرسة || اشهر اجناسها الهديرة.

Hydroides هيدروبيات \* ٢٩٧٢٠

هي الهديرات من الهيفوات تشمل ثلاث رتب. الهديرات والهديرات المرجانية والجليديات.

Hydroméduses (F). هيدروبيات مدوسية \* ٢٩٧٢١

صف حيوانات من الهيفوات يشمل الهديرات والمدوسيات والمصليات.

Hydrocorallaires هيدروبيات مرجانية \* ٢٩٧٢٢

ربة حيوانات مائية من الهديرات.

Myrte (F). هدمس \* ٢٩٧٤٨

هو الاس، اطييه.

Frigide (F). Frigid (E). هديك، مهدك \* ٢٩٧٤٩

الهدك والمهدك من تميز بالهداكة.

Leptostroma (S). هديك \* ٢٩٧٥٠

جنس فطور مجهرية من فصيلة الهديكات. انواعها عديدة جميعها وية لا مؤذية. بكتيداتها غارضة، طبائية الشكل، سواد اللون، فريضة الانفلاق. يودنها سواد اللون، مختلفة الاشكال، منها البيضية والخرطوية والمنمنقة.

Heldreichia (S). Heldreiche (F). هيدروبيات \* ٢٩٧٤٣

جنس نباتات عشبية، معمرة، برية، من فصيلة الصليبيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منتبها جبال بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سورها زخاعة فراء. اوراقها متعاقبة، متقاربة لحماية النصال. ازهارها طرفي الارتكاز. ازهارها صغيرة، بيضاء اللون. ثمارها غريقات وحيدة البزرة || اشهر انواعها الهديريخ الحللاني الورق.

Heldreichia buplevifolia (S). هيدروبيات حبلياني الورق \* ٢٩٧٤٤

Heldreiche à feuilles de buplèvre (F).

عشبة معمرة برية من فصيلة الصليبيات. منتبها جرد لبنان. ساقها زخاعة فراء. فروعها منتصبة. اوراقها لحمية ملوكة النصال. ازهارها طرفي الارتكاز. ازهارها صغيرة، بيضاء اللون. ثمارها غريقات، تنويرها في اواخر الصيف.

Leptostromataceae (S). هديكات \* ٢٩٧٥١

Leptostromatacées (F). Leptostromataceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من ربة الزويات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد، بكتيداتها مجنحة، فحمة اللون، شاربة الارتكاز او محضرة. يوبغاتها مختلفة الاشكال، متباينة التركيب. || اعرف اجناسها الهائية التالية: انيسوبويوم (غشاء)، ينفويه، ديكورويه، غلوس ليتيرويوم، لريولا، مسليه، هديكة.

Fertilité (F). Fertilité (E). هديتي \* ٢٩٧٥٢

هو النمط للملس المتواضع. المذن هو التحسب في الانتاج.

Upupa (S). هديتي \* ٢٩٧٥٤

Huppe (F). Hoopoe (E).

جنس طير من الهديديات. انواعها المعروفة ستة، جميعها

Enhydra marina (S). هيدروبيات \* ٢٩٧٤٥

Enhydra marina, Grande loutre de mer (F). Kalan, Sea otter (E). Kalan, Grosser Seeotter (D). حيوان بحري لبون وحيد الجنس والنوع من فصيلة السرمويات. قوته الاسماك والقشريات. اعطاه مجاح مضيق بحرين. طولها نحو ١٦٠ سم. يتميز باستدارة راسه ومغطاب قائمته الخلفيتين الذي يكتنف كامل البراش دون الاظافر. فروته قصيرة الورب الناعم الكثيف، خلية



هريس



هديرة

٢٩٧٦٠ - هَدِيَّةُ يَفِيَّات (F). Flagellés (F). Flagellates (E).  
فئة من الأولي ، غالباً مجهرية ، مجهزة بأهداب دقيقة قابلة الانحناء تدعى هدبيات تحمكها من الموم والانتقال في الماء . بعضها فسفوري اما أكثرها تستمتع بالغضيب . ومنها أنواع طفيلية تعيش على الحيوانات .

٢٩٧٦١ - هَدِيْف (F). Allergène (F).  
نعت تعريفى يطلق على كل مادة قد تسبب الانهداف .

٢٩٧٦٢ - هَدِيْل (F). Pigeon mâle (F). Dove male (E).  
الهديل هو ذكر الحمام . قال فيه جرّان العميد .

كان الهديل الطالع الرجل وسطها  
من البهي شرب يفره مسنن  
والهديل صوت الحمام من هدل . والهديل كما جاء في التديري  
« فرخ كان على عهد نوح فصاده جوارح من الطير فليس  
من حامة الا وثبكي عليه الى يوم القيامة » . قال نصيب :  
فلقت اثبكي ذات طوق تذكرك  
هدلاً وقد اوى ردى نسا كان تبع »

٢٩٧٦٣ - هَدِيم : باقي نبات العام السابق .

٢٩٧٦٤ - هَدِيَّةُ الْفَيْلَمِ \* ، عَشَقِيَّةُ السَّلْتِ

Hadena scalis, Hadena didyma (S).  
Hadène du seigle, Noctuelle du seigle (F).  
Hadena scalis (E).

حشرة مؤذية من فصيلة الدفقيات مرشفتات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اوروبا ورافقة الشالية . فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها خاضعة تركيب التعجيلات البرية والزرارية || جسمها مستطيل الجرم يطول نحو ١٣ م . بسطها تراوح من ٣ الى ٣٥ م . رؤسها مستعرض الشكل . عيناها فسفوران . زربانها عيطيان . ملاسها صفيرة . مرشفتها متدل الطول . جوفها وبعثها الى الخنطى || وراشتها الى الخنطى الاسمر تعلو في الزوج الاسامي زراکش متعرجة وزخارف تراوح بين الكسني والجفوي . وتعلو في الزوج الخلفي ماجة قاعدية سمراء لا تتجاوز حدود الزام الاول || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواسط تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تماثل يمد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتتمتع المكان في عطوط مستقيمة على عصف النبات العائل || الطور الاسروفي الذي يستمر نحو ٤٠ اسبوعاً ينقضي على النبات والسرقة عند بلوغها الادراك تغلظ من ٢٥ الى ٣٠ م . جسمها اسطواني الشكل و باعت الحصار يعلو غطان فيجبان امبران يمتدان من الكويل الى الشرج . رأسها اسمر اللون ، مبهر الخلب النقيض . مذها ورواجها اقنابتا البرق || طور الاكمال الذي يستمر من ٢١ الى ٢٨ يوماً ينقضي في التربة حيث تنمدن السرقة وتمتدق بجلباب من الطين .

٢٩٧٦٥ - هَدِيَّةُ مُشَبَّكَ \*

Hadena reticulata (S). Hadène reticulée (F).  
Hadena reticulata (E).

حشرة من الفسفيات مرشفتات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق العنكب و القرنفل البري والزراري وتقتب الكماير وتلقم البور

من طور العالم القديم . اجسامها رشيقة ، رؤوسها متوربة يتنازع مروحية الشكل . اثوابها جملة الالوان المترامية الزامية يعلوها تجميع وتسلج . || حكي الفزوني ان الهدمد قال لسليان اريد ان تكون في ضيائي قال انا وسدي قال بل انت وامل عسرك في جزيرة كذا في يوم كذا فحضر سليان بمجنده فطار الهدمد فاصطاد جرادة فضغتها ورمى بها في البحر وقال كلز يا نبي الله من لاته الله ناله المرق ففسك سليان ويمنده من ذلك حولا كاملاً وفي ذلك قيل :

« جاءت سليان يوم المرض هدمدة  
اهدت له من جراد كان في فيها  
وانشدت بلسان الحمال قائلته  
ان الهدايا حل مقدار مهديا  
لو كان يهدي الى الانسان قيمته  
لكان يهدي لك الدنيا وما فيها »  
اعرف انواعه واشهرها الهدمد الشائع .

٢٩٧٥٥ - هَدُودُ شَائِع \* ، دَوْدُكُ الْجَبَلِ

Upupa epops (S). Huppe commune, H. vulgaire (F). Common hoopoe (E).

نوع من الهدمد الميزول في لبنان وفي سائر الشرق الاوسط . كنيته ابو الاصباح وابو ثامة وابو قامة وابو الربيع وابو وروح وابو جهاد وابو حباد . ج هدامد وهداميد . الواحدة هدمدة . || وهو طائر العرج الثوب متوسط الجسم طوله تراوح من ٢٧ الى ٢٨ سم . منقاره دقيق مستطيل . قمرته كبيرة اللد سوداء الاطراف . ثوبه الى الصبغة الطحلاء . جناحاه وظهوره الى الصبغة الغامقة يعلوها تسليج اسود وايضاً يتخلله الاصفر . ذنبه مقطوع الطرف اسود اللون ابيض الجانبين والوسط . || يألّف الاماكن المبهطل الازهار . قوته الحشرات والديدان . يدنّ حته في تجاويف الازهار . الاثنى تحسن وسعها من ٥ الى ٧ بيضات نحو ١٦ يوماً . الذكر يزول لما الاكل . || ينجبر من الطيور النافقة الواجب حياتها .

٢٩٧٥٦ - هَدُودُ يَمَات

Upupidae (S). Hupupides, Upupides (F). Upupidae (E).

فصيلة طير من الجوارم الرقيقات المناقير . انواعها عديدة تجتمع الى جنسين الهدمد والهدير . اجسامها رشيقة . اجنحتها ذلقة . السنبا قصيرة . ارسافها قوية . اثوابها جملة الالوان الزامية .

٢٩٧٥٧ - هَدُوْدِيَّةُ \*

Hedobia (S). Hédobie (F).  
جنس حشرات خاشية من فصيلة القفرات . انواعها المروفة ١٠ ، اعطائها البلاد الحارة والمعتدلة . جميعها صغيرة القند ، مستطيلة الشكل و اثوابها مزركشة مختلفة الالوان . يرقاتها تركب الاشجار الميتة تنغرسها وتعلها . اشهرها الهدوبية الامباطورية .

٢٩٧٥٨ - هَدُوْدِيَّةُ امِبَاطُورِيَّةُ \*

Hedobia imperialis (S). Hédobie impériale (F).

نوع من الهدوبية طويلاً من ٥ الى ٥ م . ثوبها سطحي اللون اسمر المزاج تعلو زراکش مخلفة خلية التركيب ملامدا زامية . || يرقاتها تركب اقصان الاشجار الميتة من اي نوع كانت .

٢٩٧٥٩ - هَدِيَّةُ \*

Flagello (F). Flagellum (E).



هدمد شائع



هدوبية امباطورية



هدية الفيل



هدبة مشبكة

إذا ازدحت هوم الصدر قلنسا  
معي يربأ يكون لها انفرج  
نديمي هربي وانيس نفسي  
دفاتر لي ومشتوي السراج

٢٩٧٧٢ - هَرَكُوس Acacia blanc (F).  
هو السط الابيض . الواحدة هرامة .

٢٩٧٧٣ - هَرَايَكَة Astrologues (F). Astrologers (E).  
المراصة علماء النجوم . المنجمين والمنجمين .

٢٩٧٧٤ - هَرَب Harp (F).  
الحرب . ثوب البطن .

٢٩٧٧٥ - هَرَبُوتِس Harpagod (F). Harpagod (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرغويات بمديات الابليل  
وفصيلة الكتيبيات . انواعه المرفوعة قليلة المدد اعطائها  
بعض مناطق المحيط الاطلسي للمراصة لاربيكة الثالية ||  
اصداؤها متوسطة القد وشبيهة بمخرطة جزوية اللون . فوارها  
متعددة الانفرج ثلثية التلق التي تبدو كرجل البش شكلا  
وحطابا .



هذب

٢٩٧٧٦ - هَرَبُوتِس Harpactes (S). Harpactes (E).  
جنس طير من فصيلة الطرطريات . انواعه المرفوعة نحو  
١٠ موطأ يشمل معظم مناطق آسية الشرقية والجنوبية .  
جميعها متوسطة القد . مناقبها قوية بحدة الاطراف ،  
مقمرة الحامل العليا . اجنتها متوسطة الطول ، ذلقة  
الاطراف ، رتاجية الريش . اذناها مستطيلة ، رتاجية  
التركيب . اوقها جميلة الالوان المتناسقة || فوقها المخدرات  
على اختلاف انواعها وبعض الهدويات || اعرف انواعه  
واشهرها المربوق المطوق .

٢٩٧٧٧ - هَرَبُوتِس Harpactes fasciatus (S).  
نوع من المربوق . اصطانه بلاد الهند وسويترا ، يالاف  
الغابات الكثيفة || جسمه متوسط القد بطول نحو ٣٠ سم .  
ثوبه جميل الالوان الصافية . رأسه وضعه الى السواد الفصحي  
اللامع . صدره وبطنه الى الحمرة القرمزية اللبديفة البعان  
وكذلك عصبة تطوق رأسه من العين الى العين . سواد عنقه  
واحجار صدره مفصولة ببقع ابيض كالنارج . ظفوه  
وانفيكه حشار مستعرض ابيض . جناحاه الى السواد المنسج  
بالابيض . منقاده ورساه الى الزرقه || طرائه العادي  
قصير الشوط يكثر فيه التصعيد والتبج . قوته المخرات  
والهدويات اعصها المتناكب || يذئن حشه في صعود  
الاشجار المهرية . الاث تبيض من ٤ الى ٥ بيضات  
تفحصها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوما .



مربوق

٢٩٧٧٨ - هَرَبُوتِس Harpalus (S).  
جنس حشرات من فصيلة المربوسيات . انواعه كثيرة  
المدد جميعها صغيرة القد ، دجوية المسرح ، تعيش تحت  
الحجارة والاعشاب والاوراق اليابسة . فوقها البذور  
والحيوب وبعض التار . ريقها غاشلة تعيش على اوراق  
النبات . اشهر انواعه الثلاثة التالية .

الفئة || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٧ سم . هبطها  
نحو ٤١ م . رأسها الى الحطلي الاسمر المواج . عينها  
كبريتان . زباناها غميان . جوشها وبقعها الى الحطلي  
الاسمر || روشنها الاماميان الى الحطلي الاشعث للمواج  
تعلمو شيكة من الخطوط الكستنية . روشنها الخلفيان  
الى الحطلي التني المواج يسر عنه الاطراف الخارجية .  
اهدابها الى اللقمة الصنابية || لها جيل واحد في الحول .  
تظهر الفرائة في اواسط ايار وتبقى حتى تموز . تسرح  
في الليل ، تتأطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتضع  
المكث لمدة مربة على الصفحات السفلى من تصال  
الاوراق || السرعة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٤٠ م .  
جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار . ثوبا الى  
الريكة تمتد في الظهر وتحت في الجانبين ويملوا غطان  
جانبين احمران وقصة خطوط معتمة صفراء اللون . وأسها  
الى الجفوة . مدبها الى القطعة الثمراء . وواجها الى السيرة ||  
طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في  
الربة ضمن جلاب من العين تلتصقه السرعة .

٢٩٧٧٦ - هَدْيُوتِس Hedyotis (S).  
Hedyotis, Hedyote, Hédote, Hédote (F). Dog-  
wood (E). Süsohr (D). Ediolide (I).  
جنس نباتات برية وزراعية معمرة من فصيلة الفويات .  
انواعه قليلة منها الاعشاب والجنات . اوراقها متعاقبة .  
ازهارها محورية الاكواز او تاجية . ثمارها جراء ثنائية  
اللقطة . || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٩٧٧٧ - هَدْيُوتِس Hedyotis auricularia (F).  
نوع من الهدويوتيس . اصطانه سرنيدي . جنته معمرة .  
اوراقها صانسة ذكية اللف الطري . ازهارها تاجية  
الاكواز شاذلة اللف . يستخرج من اوراقها بالتقطير  
عطر الهدويوتيس .

٢٩٧٧٨ - هَدْيُوتِس Hedyotis ombellata (F).  
نوع من الهدويوتيس . اصطانه الهند . شجته معمرة . جلورها  
صباغية يسمرها "وي" غصنها احمر اللون شائع الاستعمال

٢٩٧٧٩ - هَدْبَاب Mesites (S). Mesite (F).  
واحدته هدابة . جنس طير من فصيلة الهذابييات . انواعه  
قليلة العدد اجسامها متوسطة القد ، طولها يراوح من ٢٧  
الى ٣٥ سم . جراجها وراسها وغالبها مستطيلة . اذناها  
عريانة . صواحها لامعة ذلقة . اذناها قصيرة غروبية .  
اوقها الى الصبهة المائفة يملوها توشع خفيف . جواشها  
ويطوقها الى الصفرة الموشة بالاسود . اصنافها ثقبية اللون .  
فوقها البذور والحجوب والخرشات على اختلاف انواعها .  
تنش عشها في انصوص بين الادلغال والاعشاب الرفيعة .  
سحبها من ٨ الى ١٢ بيضة .

٢٩٧٨٠ - هَدْبَاب Mesitidae (S). Mesitidae (F). Mesitidae (E).  
فصيلة طير وسيدة الجلس من رتبة الدجاجيات . انواعها  
المرفوعة قليلة ، جميعها من طيور مدغشكر . فوقها البذور  
والحجوب والخرشات .

٢٩٧٨١ - هَر Chat (F).  
هو السنور . اطله . ج هرة والاثن هرة . قال احد بن  
فايز صاحب الجبل في اللغة :

**٢٩٧٨٧ - هَرَبُولُسْ رَلِيع** \* *Scutellaria altissima* (S). *Toque élevée* (F).

نوع من الهربولوس التريبي الممر. ساقه منتصبه تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. أوراقه منقطة أعليجية الشكل ١ نصلها جامد الصلصة ٢ سنن الحافة ٣ أزغب البشرة. أنزاعه سبيلية التجميع ٤ متقابلة الارتكاز ٥ تطول نحو ٢ سم. شفيراتها العليا ينفسجية اللون ٦ شفيراتها السفلى عاجية ٧ تنوره يستمر من حزيران الى آب.

**٢٩٧٨٨ - هَرَبُولُسْ كَثِير الزُهر** \* *Scutellaria macrantha* (S). *Toque à grandes fleurs* (F).

نوع من الهربولوس التريبي الممر. ساقه تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. أوراقه لاطئة ١ يضيئة الشكل ٢ نصلها قليل الحمل ٣ سنن الحافة ٤ أنزاعه سبيلية التجميع ٥ متقابلة الارتكاز تطول نحو ٣ سم. لوها الى الزرة الزاهية ٦ تنوره يستمر من تموز الى ايلول.

**٢٩٧٨٩ - هَرَبُولُسْ لَهِيكَة** \* *Harpella forficella* (S). *Harpella forficella* (E).

حشرة من فصيلة القربويات مرشفيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا. قرأتها جارية قوتها رقيق الانزاع. سرفتها غاشية تعيش على جنود الاشجار اليابسة والاعصان والافناد ١ جسمها قصيف يطول نحو ٧ مم. يستطاع تراوح من ٢٢ الى ٢٤ مم. رأسها مكور الشكل ٢ عيناها صغيرتان ٣ زباناها خيطيان ٤ ملاصق دقيقة ٥ مرشفتها مستدل الطول ٦ جوشها وبطنها الى النبي الصناعي المواجه ٧ روشنها الامنيان الى الصغار القائم يعلو شمع بني. روشنها الخلفيان الى الصلبة السمره المواجه ٨ اهدابها شقراء اللون ٩ لها جسد واحد الى الحول. تظهر القراشة في اوائل حزيران تبقى حتى اواخر تموز. تسرح في النهار. تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتحتج المكان مبدئياً في شقوق الخشب وتحت القشور اليابسة ١٠ السرعة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ١٦ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل ١١ مستدق المقدم والمؤخر ١٢ يمشي الحلب القصير. ثوبها الى الخنطي الاسمر. رأسها شديد السمره ١٣ مدنها ورواجها الصدرية والبطنية الى الخنطي الباهت ١٤ طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينتهي بخارج الفلق الخشبي ضمن صلجة تنسجها السرعة تحت القشور او بين الشقوق.

**٢٩٧٩٠ - هَرَبُولُسْ** \* *Scutellaria* (S). *Scutellaire, Toque* (F).

الترقة من الامير مصطلى الشهبان المأخا الى مصدر الاسم العلمي. جسس نباتات برية وتربينية من فصيلة الشفويات. انزاعه عديدة نبتية الشرق الادنى وافريقية الشمالية. سرفتها عشبية غليظة ١ اوراقها صغيرة القد لاطئة او مدققة ٢ اهدابها سبيلية التجميع ٣ مختلفه الاطوار ٤ زورها دقيقة حنطية اللون ٥ اعرفت انواعه واشهرها ما يتبع.

**٢٩٧٩١ - هَرَبُولُسْ** \* *Scutellaria alba* (S). *Toque blanche* (F).

نوع من الهربولوس التريبي الممر. ساقه زياء اللحاء تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. أوراقه منقطة أعليجية الشكل ١ نصلها جامد الصلصة ٢ خلى البشرة ٣ سنن الحافة ٤ دبق المسام ٥ أنزاعه سبيلية التجميع ٦ تطول نحو ٢ سم. لوها الى البياض العاجي ٧ تنوره يستمر من حزيران الى تموز.

**٢٩٧٩٢ - هَرَبُولُسْ** \* *Scutellaria alpin* (S). *Toque des Alpes* (F).

نوع من الهربولوس الجبلي البري الممر. ساقه تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. أوراقه لاطئة يضيئة النصل تطول من ١ الى ٢ سم. أنزاعه بياض الانابيب ١ ذرق الاطراف ٢ سبيلية التجميع ٣ تنوره يستمر من حزيران الى آب.

**٢٩٧٩٣ - هَرَبُولُسْ أَصَهَب** \* *Harpalus rufus* (S).

نوع من الهربولوس. حشرته تطول من ١١ الى ١٣ سم. ثوبه الى الصلبة الخنطية الناعمة. يألف الارربة الرملية. قوته البرور والحبوب والآبار الجافة الساقطة ١ رقاته خاضلة قليلة الاذى.

**٢٩٧٩٠ - هَرَبُولُسْ أَطْعَل الظَهْر** \* *Harpalus distinguendus* (S).

نوع من الهربولوس. حشرته تطول من ١٤ الى ١٦ سم. ثوبه الى السمره السفماء المواجه. ظهره اطحل اللون ١ اسمر التنخطيط المستطيل ٢ يركب شمائل الثقيلك لالتهام زورها الدقيقة فيضبط الشايليل ويشربها.

**٢٩٧٩١ - هَرَبُولُسْ مَلُون** \* *Harpalus senescens* (S).

نوع من الهربولوس. حشرته تطول من ٧ الى ١٠ سم. ثوبه الى الأخضر الاسفتح تعلو مشعة جزئية. زباناها وجرازمه الى الحمرة. يعيش تحت الحجارة والاعشاب ١ قوته البرور والحبوب. رقاته خاضلة قليلة الاذى.

**٢٩٧٩٢ - هَرَبُولُسِيَات** \* *Harpalidae*

فصيلة حشرات من عُمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. اعطائها العالم. منطها وابل وبعضها مفترس. رقاتها خاضلة ناعمة ومنها المفترسة التي تستحب البذبان القشرية ١ اشهر اجناسها الهربولوس والمرس والياح واللدبوس.

**٢٩٧٩٣ - هَرَبُولُسْ** \* *Pseudope*

جنس عظام من فصيلة الحنجويات المادمان القوام. انواعه قليلة. اعطائها البلاد الحارة والمعتدلة. اجسامها اسطوانية تطول من ٤٠ الى ١٠٠ سم. زورها مقلطمة. اذنانها دقيقة. سرافتها مرية متباعدة ١ قوتها الحشرات تنبت من الزسافات المغيدة.

**٢٩٧٩٤ - هَرَبُولُسْ** \* *Scutellaria* (S).

الترقة من الامير مصطلى الشهبان المأخا الى مصدر الاسم العلمي. جسس نباتات برية وتربينية من فصيلة الشفويات. انزاعه عديدة نبتية الشرق الادنى وافريقية الشمالية. سرفتها عشبية غليظة ١ اوراقها صغيرة القد لاطئة او مدققة ٢ اهدابها سبيلية التجميع ٣ مختلفه الاطوار ٤ زورها دقيقة حنطية اللون ٥ اعرفت انواعه واشهرها ما يتبع.

**٢٩٧٩٥ - هَرَبُولُسْ أَبْيَض** \* *Scutellaria alba* (S). *Toque blanche* (F).

نوع من الهربولوس التريبي الممر. ساقه زياء اللحاء تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. أوراقه منقطة أعليجية الشكل ١ نصلها جامد الصلصة ٢ خلى البشرة ٣ سنن الحافة ٤ دبق المسام ٥ أنزاعه سبيلية التجميع ٦ تطول نحو ٢ سم. لوها الى البياض العاجي ٧ تنوره يستمر من حزيران الى تموز.

**٢٩٧٩٦ - هَرَبُولُسْ أَبْيِي** \* *Scutellaria alpin* (S). *Toque des Alpes* (F).

نوع من الهربولوس الجبلي البري الممر. ساقه تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. أوراقه لاطئة يضيئة النصل تطول من ١ الى ٢ سم. أنزاعه بياض الانابيب ١ ذرق الاطراف ٢ سبيلية التجميع ٣ تنوره يستمر من حزيران الى آب.



هربولوس اصهب



هربولوس اطحل الظهر



هربولوس ملون



هريول



هريون



هريلة نيكة

٢١٧٩٤ - هَرَجُود ٥

Hétérognys (S).

Hétérognys (F). Heterogynis (E).

حشرة من فصيلة الهرجوديات ورتبة حشرقيات الاجنحة . اعطائها بعض مناطق البلاد المتعددة الحرارة . تألف البراري والجرار المبعثرة الاشجار || جسمها صغير ، نحيل ، كثيف الخمل الناعم . مسطعاً نحو ٢٠ م. رأسها صغير . صينها صغيرتان ، بارزتان . غطتها وملامسها شديدة القصر . زباناها مشطيان ، مستطيلان . اجنحتها كبيرة || الاثني مرقلة وعادة الخناج . السرفة شبه اهليجية الشكل ، مبطة ، خاملة ، تعيش على اوراق فصيلة الترنزيات الفرائشية ومنها الزوال ، ومنها الفضل .

٢١٧٩٥ - هَرَجُودِيَّات ٥

Heterogynidae.

Epiconopterygidae (S). Hétérognidés, Epiconopterygidae (F). Heterogynidae, Epiconopterygidae (E). فصيلة حشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها شلالية الاطكان || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، يغلغها خمل ناعم . مسطعاً بارزاً . اعطائها وملامسها شديدة القصر . قرونسا الاستعمارية مطشبة . اجنحتها غشقة الانتشابه . مستعرضة الطرف . الزوايا الى السرة الخنطية المتفاوتة المجات || انثاها معار مرقلة . اساريها شبه اهليجية الشكل ، مبطة || اشهر اجناسها الهرجود .

٢١٧٩٦ - هَرَجُودُ ٥

Damisque du Sénégal (F).

Korrigu (E).

هو مذلوم السنغال، موطنه يمتد من السنغال الى افريقية الشرقية والجنبة .

٢١٧٩٧ - هَرْد ٥

Curcuma (F).

هو الزكركم السباعي . اطبله .

٢١٧٩٨ - هَرْدَاء ، هَرْدَاك ٥

Thamnocalamus (S).

Bambou (F). Bambou (E).

جنس نباتات قصبة برية وزراعية من عمارة الخيزرانيات وفصيلة النجيليات . انواعها قليلة العدد ترطب في الاربة الخفيفة العميقة النور الوافرة المواد المنصوبة .

٢١٧٩٩ - هَرْدَاء هَشْدَسِيَّة ٥

Thamnocalamus hindi (S). Bambou de Hinda (F).

نوع من الهرداء يطول من القرنين الى الخمسة اذبار . ملاجانه ثورع من اخضر . اوراته تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . وتعرض نحو ١٠ م . نصلها جلدي التسنج ، صفحته العليا غصراء اللون طلعاء المواج ، صفحته السفلى بيضاء اللون زياه . يربط في الاربة البدالية الرطبة .

٢١٨٠٠ - هَرْدِيَّات ٥

Phalngides, Opilions. Faucheurs (F). Phalangides, Opilions (E).

رتبة من صف التنيكويات . اجناسها وانواعها عديدة تنقسم الى اربع فصائل منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة ، ملحونة الصدراس يابلطن ، غشوية التنس ، عادمة المشاتن ، مستطيلة الجرامز البدقيقة . اشهر فصائلها الكهوليات .

٢١٨٠١ - هَرْدِي ٥

Hourd (F).

الهردي او الهردى ، كلمة هرية اصيلة تنصعل الآن للدلالة على المجارة المجرقة من الباترن (اطلب هردى) .

٢١٨٠٢ - هَرْدِيْب مُصَبَّح ٥

Chlorophorus varius (S). Chlorophore tacheté (F). Chlorophorus varius (E).

حشرة واثمة غامضة عاشبة من فصيلة الترنزيات ورتبة مندقات الاجنحة . تألف البراري القريبة من الممران . خنافسها تعيش على ايزمار الصيوانيات ولا تمت من الاوراق . يرقاتها تركب الجدرار والاصنان والقصبان المقطوعة اليابسة وقد تسردب ساييك الكرمه ويزمار الاجمار الشمرة وسانساها . جسمها متوسط القد بطول من ١٥ الى ١٤ م. ثوبها الى الصفار الكبريتي تملوه بقع وتذاويق سود . رأسها متدل الجرم . صينها كبيرتان نازرتان . زباناها غشيانا دقيقان . ظهرها مستطيل الشكل ، ضيق المؤخر المستدير الفارق . غدهاها متدلتا الصلابة ، متناهتتا التحيز النجيل القاطب . اسرارها خاسية المغل || الاثني ايز قد من الذكر واكد ثوباً منه وقصر زبانا || جيلها ثنائي الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار وتعيش حتى اواخر ايلول . تسرح في التبار وتبيت في الليل || البرقة عند تمام ادراكها تطول من ١٨ الى ٢٤ م. جسمها محذوب الظهر ، مبطة المدب ، قصير الرواجب الخشوية الشكل . ثوبها الى الصفرة الزيتية يملوها تنقيط اسمر . رأسها احمر .

٢١٨٠٣ - هَرْدِيْب مُعَصَّب ٥

Chlorophorus trifasciatus (S). Chlorophore trifascié (F). Chlorophorus trifasciatus (E).

حشرة واثمة غامضة من فصيلة الترنزيات ورتبة مندقات الاجنحة . تألف المواقع التي تكثر فيها نباتات التفصيلة الصيوانية . خنافسها تعيش على الازمار . يرقاتها تركب اروسات النباتات الحولية والحولة وتسردب لحاء جذوع الاشجار باستثناء الصنوبريات || جسمها صغير القد بطول من ٨ الى ١٠ م. ثوبها متعدد الالوان فيه الاسود والاحمر والاسمر الخنطي واليتي الاصفر المواج . رأسها صغير الجرم . صينها صغيرتان ، نازرتان . زباناها غشيانا ، دقيقان . ظهرها مستطيل الشكل ، مستدير الطرف الفارق ، اسود اللون كالطين . غدهاها متناهتتا التحيز الخفيف القاطب . اسرارها خاسية المغل || الاثني ايز قد من الذكر واقصر زبانا منه واطول مرؤاً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل حزيران ويبقى حتى اوائل آب . تسرح في التبار وتبيت في الليل || البرقة عند الادراك التام ، تطول من ١٦ الى ٢٠ م. جسمها محذوب الظهر ، مبطة المدب ، نودي الرواجب . ثوبها الى الصفرة الصنائية المواج يملوها تنقيط احمر . رأسها جقودي اللون .

٢١٨٠٤ - هَرْدِيل ٥

Haridelle (F). Seed, Nag (E). الهرديل الصفائح الضيقة من السبور . الواحدة هرديلة .

٢١٨٠٥ - هَرْدُوك ، هَرْدُون ٥

Autruche mâle (F). هو الظلم ، اطبله .

٢١٨٠٦ - هَرَشَان ٥

Caragana (S).

هرشان تعريب الاسم التركي . جنس لباتات برية وزراعية من فصيلة الترنزيات الفرائشية . مهداها بعض بلاد الشرق الاقصى وبعض مناطق سيريخ . انواعها عديدة . جميعها معمرة . مضطها جنبي ومضها بجلي . اوراتها عالية مركبة ،



هرجود



هرديب مصبح



هرديب معصب



هرشان

٢٩٨١٣ - هَرَشَانْ كَدَلِ ٥  
*Caragana frutex* (S).  
*Caragana frutescent* (F).  
 نوع من الهرشان. جنبته تملو نحو ٢٥٠ سم. أوراقها رباعية التركيب. ورقاتها لاقياسية الشكل والحجم تقابل من ١ الى ٣ سم. وتعرض من ٤ الى ١٢ سم. نصلها بيضي الشكل، اذنياتها سادة شائكة. ازهارها كبيرة القند، فردية التجميع، لونها الى الصفار الزاهي || تنوره يستمر طوال شهر ايار.

٢٩٨١٤ - هَرَضِ  
*Clous* (F).  
 بشور صغيرة جامدة تملو النسيج النباتية.

٢٩٨١٥ - هَرَصَّة  
*Ver* (F). *Worm* (E).  
 هي الدودة. ج. هَرَصِ.

٢٩٨١٦ - هَرَضِ  
*Polymmatous* (S).  
 جنس حشرات فراشة من فصيلة الهرميات، انواعه عديدة، اصطلحوا بمنظر اصفر الغمام. اجسامها صغيرة القند كثيفة الحراشيف المتعلقة الحليمية الاطراف. اثارها ملونة. قرونها الاستشعارية مستطيلة دبوسية الشكل || تسرح في النهار. قوتها طلع الازهار وريحها || رقاتها غاشلة وأثماره تركب أوراق النبات وتماره || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

٢٩٨١٧ - هَرَضِ الباقية \*  
*Polymmatous amandus* (S).  
 فراشة من المرض، جسمها احمر اللون وصافي الملمح. طولها نحو ٣٥ سم. رواشن ذكورها الى الزرقعة البهاجونية الزاهية بطولها حنار اسود وأطار ابيض المذهب. رواشن انثاها حنطية اللون بعلها رقعة سمراء وأطار ابيض التهديد. رقاتها صغيرة القند، خضراء اللون، تركب الباقية في اوراقها وقربها.

٢٩٨١٨ - هَرَضِ البَقُولِ \*  
 أبُو دَقِيْقِ الأَزْرَقِ  
*Polymmatous baeticus* (S).

فراشة من المرض، جسمها حنطي اللون احمر الملمح بطولها نحو ٣٥ سم. رواشن ذكورها الى الزرقعة الجليدية الزاهية يطولها اطار ابيض التهديد، رواشن انثاها خمره اللون يطولها تنميش اسود. رقاتها خضراء اللون تشوبها كدرة خمره || تركب البَقُولِ وتعرض الحبوب قبل ادراكها اخضها البَقُولِ واللوباء والترس.

٢٩٨١٩ - هَرَضِ التَرَسِ \*  
*Polymmatous demon* (S).  
 فراشة من المرض. جسمها يطول نحو ٤٥ سم. رواشن ذكورها الى الزرقعة الخضراء الملمح بطولها اطار اسود وتهديب ابيض. رواشن انثاها حنطية يطولها تنقيط اسود ونقط اوسط ابيض وحنار اسود وأطار مهدب ابيض. رقاتها تركب معظم النباتات القرنية اغصنها الترس.

٢٩٨٢٠ - هَرَضِ الرُّمَانِ، قَرَمَحْلَة، دَوْدَة الرُّمَانِ  
*Virachola livia* (S).

فراشة من المرض. جسمها حنطي اللون اخضر الملمح بطولها نحو ٣٥ سم. رواشن ذكورها برتقالية الصفحة العليا، ربادية السفلى، كسنتية الطوق المذهب. رواشن انثاها بنسجينة الصفحة العليا سمراء السفلى، حنطية الطوق

وريشية، شفعية، متقابلة، تنتهي باذنية شائكة مكونة من امتداد الفلج. ازهارها خمسية التجميع او فردية يكثر فيها اللون الاسفر. ثمارها قرنية. بزورها بيضية الشكل. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٩٨٠٧ - هَرَشَانْ أَزْبِ ٥  
*Caragana pygmaea* (S). *Caragana pygmée* (F).  
 نوع من الهرشان. جنبته تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم. قرونها متدلية. أوراقها رباعية التركيب نصلها ضيق الصفحة السنائية الشكل يطول نحو ٢ سم. ويعرض نحو ٣ سم. ازهارها فردية، لونها الى الصفار الزاهي || تنوره يستمر من نيسان الى ايار.

٢٩٨٠٨ - هَرَشَانْ الصَّيْنِ ٥  
*Caragana chinensis* (S). *Caragana de la Chine* (F).  
 نوع من الهرشان جنبته تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقها رباعية التركيب. ورقاتها بيضية الشكل تطول من ١ الى ٣ سم. وتعرض من ٦ الى ١٥ سم. نصلها نالس البشيرة حل صفحية اذنياتها شائكة. ازهارها فردية التجميع، كبيرة القند، متدلية لونها الى الصفرة بعلها تسليج ارجواني ازرق الملمح. تنوره يستمر طوال شهر سوزران.

٢٩٨٠٩ - هَرَشَانْ صَغِيرِ الوَرَقِ ٥  
*Caragana altaiana*, *C. microphylla* (S). *Caragana à petites feuilles*, *Acacia de Sibirie* (F).  
 نوع من الهرشان. جنبته تملو نحو ٢٠٠ سم. ورقاتها تمد من ١٢ الى ١٨ وهي بيضية الشكل مستديرة الطرف. نصلها يطول نحو ١٠ سم. وهو خالي البشيرة حل صفحية. ازهارها فردية او ثنائية التجميع، لونها الى الصفرة الجليدية. تنوره يستمر من ايار الى حزيران.

٢٩٨١٠ - هَرَشَانْ بُرْتَقَالِي ٥  
*Caragana aurantiaca* (S). *Caragana orangé* (F).  
 نوع من الهرشان. جنبته تملو نحو ١٠٠ سم. ساتها فرهاد. قرونها متدلية. أوراقها رباعية التركيب ضيقة النصل الذي يطول نحو ١٥ سم. ويعرض نحو ٣. ازهارها فردية، برتقالية اللون || تنوره يستمر طوال شهر سوزران.

٢٩٨١١ - هَرَشَانْ شَالِكِ ٥  
*Caragana spinosa* (S). *Caragana épineux* (F).  
 نوع من الهرشان. جنبته تملو نحو ١٠٠ سم. ساتها فرهاد. أوراقها لاقياسية التركيب منها الرباعية الاصبعية الشكل ومنها السداسية والثمانية الورديات. نصلها يطول نحو ٢٥ سم. ويعرض نحو ٥ سم. صفحته العليا خضراء اللون، صفحته السفلى خلية البشيرة حملاء. راشات اوراقها شائكة تطول من ٣ الى ٤ سم. ازهارها الى الصفار الكبيرتي. تنوره يستمر من نيسان الى ايار.

٢٩٨١٢ - هَرَشَانْ كَبِيرِ ٥، شَجَرَة الخَمَصِ  
*Caragana arborescens* (S). *Caragana arborescent*, *Arbre aux pois* (F).  
 نوع من الهرشان. جنبته تملو من مترين الى خمسة امتار. ورقاتها لاقياسية العدد الذي يراوح من ٦ الى ١٢ تصالها تطول من ٤ الى ٢٠ سم. وتعرض من ٢ الى ٥ سم. ازهارها ذهبية اللون، ثلاثية التجميع او فردية. بزورها مأكولة وهي كالحصص شكلها وقذا وطعمها || تنوره يستمر من ايار الى سوزران.



هرض الباقية



هرض البقُول



هرض الترس

## هَرَضُ الشَّيْكَ - هَرِثَّة



هرض الشيك



هرض الصخر



هرض الرن



هرض النصة



هرض الغطائيات



هرضة الكوباي



هرن

المهدب || ريقها صغيرة القد سوداء الرأس قيو في أول  
مهدبا خضراء الجسم كثيفة الخلب الاسود ثم ينفث عليها  
ويتحول لونها الى الحمرة ويبلغ طولها نحو ١٢ م .  
تركب ثمار الزمان والموافاة وقد تنمر في البصر .

٢٩٨٢١ - هَرَضُ الشَّيْكَ \*  
Polyommatus icarus (S).

٢٩٨٢٦ - هَرَضِيَّاتٌ  
فصيلة حشرات فراشية تعرف بالقنقات ، اطها .

٢٩٨٢٧ - هَرَضُ ، هَرَضَةٌ  
علم الحيوان المفزول احصها علم النجبة الكبيرة المفزولة .

٢٩٨٢٨ - هَرَضَامُ ، غَرَضِيَا  
Gaudinina (S). Gaudinina (F). Gaudinina (E).

جنس نباتات مفردة التعريف علم الملاءة وفدين .  
وهي نباتات عشبية ، يرية ، حوسبة ، من فصيلة  
التجليات . انواعها المفردة قليلة البدود منها حوض  
البحر الابيض المتوسط || جميعها شطية ، سورها مالة  
او خلية . عصفها مسطح الصال الباهة الخضراء .  
انهارها سبلي . ستيلاها منتصبة .

٢٩٨٢٩ - هَرَضَمَانُ ، هَرَضَمَانُ  
هو الخراطال البري ، اطله .

٢٩٨٣٠ - هَرَضَةُ الْكُوبَاي \*  
Gyropus ovalis (S).

حشرة جلدية دقيقة من فصيلة الغرطيات . طولها نحو ١ م .  
جسمها مسطح الشكل . زياتها وقاثيرها رباعية التركيب .  
مقاطعها عدية الاطراف الحادة || تركب الكوباي  
وتؤديه .

٢٩٨٣١ - هَرَضِيَّاتٌ \*  
فصيلة حشرات جلدية من رتبة الغطائيات . اجناسها وانواعها  
كثيرة البد جيمها صغيرة القد مغلطة الجسم مقطعة  
الاصراع تنطقل على الحيوانات الجبونة من ذوات الور الجبل  
الناعم .

٢٩٨٣٢ - هَرَضِسُ ، مَهَرَضِسُ  
Improlifique (F). المقيم من النبات .

٢٩٨٣٣ - هَرَضُ \*  
Nyctes nivea (S).

Harfang des neiges (F).  
طائر من البويات وحارة الفدايات . موطنه جيم الاصقاع  
الثالية الباردة . طولها نحو ٧٠ سم . وبسطة لا تنقل من  
١٥٤ سم . ثوبه الى البياض الناصع في الطائر البالغ وهو  
منش وموش بالسمرة في الطائر الفرخ . رأسه صغير القد .  
عصره فافر القرقص . ملهرو اسود الجسم والبرة . عيناه  
الى الحمرة الصنائية . ذنبه مسطيل الريش . ارسافه وغالبه  
قصيرة القد كاسية . || يدن شه في تخاليف الصخور .  
انها تقع من ه الى ١٠ فضات تحفها بمحاولة الذكر .  
قوته الجرد والغار والدين والمروم والسلك .

٢٩٨٣٤ - هَرَضِيَّة \*  
Heraclium (S). Berce (F).

جنس نباتات عشبية كبيرة القد من فصيلة الجيميات .  
انواعها المفردة قليلة لا تنتمي الثانية . مهدبا جبال الخينة  
والهند والشرق الاوسط واروبة الغربية وامريكية الثالية .  
منها النباتات المعمرة والحولة . ابروتها ريشية مغلقة .  
كثيفة النصل . يستخرج من سورها واوراقها وزاهاها

فراشة من الهرض . جسمها اسطواني الشكل مخضور الوسط  
اطحل الثوب يطول نحو ٣٢ م . رواشن ذكورها الى الزرقوة  
البفسجية يطولها حشار اسود واطار من المهدب الابيض  
رواشن اناتها حطية اللون صفراء المراج يطولها تنميش  
اسود وابيض واجر . اطارها ابيض الهديب || ريقها  
تركب اوراق مختلف النباتات احصها الشيك .

٢٩٨٢٢ - هَرَضُ الصَّعْتَرِ \*  
Polyommatus meleager (S).

فراشة من الهرض . طولها نحو ٣٦ م . رواشن ذكورها الى  
الزرقوة السبازية الالامية يطولها حشار اسود وتهديب ابيض .  
رواشن اناتها الى الطحلة الصفراء المراج يطولها تنميش اسود  
وتسنيج اسود . قواعها ذرق الانتشاب اطرافها غير  
التهديب || ريقها ندمه تركب الصعتر وسائر النباتات  
البرية .

٢٩٨٢٣ - هَرَضُ الْعَرْنِ \*  
Polyommatus dolus (S).

فراشة من الهرض . جسمها يطول نحو ٢٥ م . رواشن  
ذكورها الى الزرقوة الزهراء المراج يطولها حشار اسود واطار  
من المهدب الابيض . رواشن اناتها الى المخطي الاصهب  
المراج يطولها تنميش دقيق اسود ويطولها حشار مهدب  
اجر . || ريقها تركب اوراق وسنف الرن والقصة .

٢٩٨٢٤ - هَرَضُ الْقَصَّة \*  
Polyommatus eros (S).

فراشة من الهرض . جسمها يطول نحو ٣٠ م . رواشن  
ذكورها الى الزرقوة القصصية المراج يطولها حشار اسود  
يتخلله بنض النقط اسود واطار مهدب ابيض . رواشن  
اناتها حطية اللون زرقاء المراج يطولها تنميش وتنميش  
وتسنيج واطار من المهدب الابيض . || ريقها تركب  
مسطم نباتات المراعي احصها النصة .

٢٩٨٢٥ - هَرَضُ الْفَطَائِيَّاتِ \*  
Polyommatus coridon (S). Polyommatus coridon (E).

P. des légumineuses (F). Polyommatus coridon (E).  
حشرة من فصيلة القنقات ورتبة حشرغيات الاجنسة .  
موطنها يشمل مسط اقطار البلاد المحتلة الحارة من العالم  
القديم . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سورها تنميش  
على اوراق الفطائيات وجوبها قيل ان تبلغ الادراك التام ||  
جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ م . بسطها نحو ٣٤ م .  
رأسها مسدل الجرم . جناحا كيرتان . زياتها صرلجانيان .  
جوشها ازرق اللون عند الذكر . كستنية عند الانثى .  
بطها كستني اللون عند الشقين || رواشن الذكر الى الزرقوة  
يطولها مراج فني وبنع كستية ومسطوط سود . رواشن  
الانثى الى السرة الكستنية يطولها في الزوج الامامي  
تهديب ابيض تترفعه خطوط حطية . ويكتنفها  
الزوج الخلفي حزام نصفي اللون من النقط الحمر يمتصها  
الاسود || ارجل واحد في الحول . تظهر الفراشة في  
حزيران . تسرح في البار . تماطل بد بطورها بنحو  
سته اسابيع وتقع المكن ميجاديا على الصفحات السفل



ثوبه الى الزرقاء السمره المراج، يطلع اقل سمره واكثر يباناً. يتميز بفكيه المستطيلين وزعانفه الصدرية المستعرجة. قوته الاسماك والقشريات. || موطنه جنوب المحيط الاطلسي بين امريكة وافريقيه.

#### ٢٩٨٤١ - هرقلية القطب

*Balaenoptera borealis* (S). *Rorqual boréal* (F).  
نوع من الحراكله. طوله نحو ١٥ م. يتميز بصغر زعانفه الظهرية والصدرية. يعيش اسراباً كبيرة العدد. قوته السمك والقشريات والرخويات والحث. || موطنه القطب الشمالي وقد يقترب، في بعض فصول السنة، من شطوط ايسلندا والنرويج.

#### ٢٩٨٤٢ - هرقلية حيتروسي

*Balaenoptera rostrata* (S). *Rorqual à rostre* (F).  
اسفر انواع الحراكله. طوله يراوح من ٧ الى ١٢ متر. يظهر الى الكهية السمره الملاج. يطلع الى اليابس الاكدر. زعانفه الصدرية سمر القواعد والاطراف يبيض القسم الاوسط. قوته الاسماك دون سواها. || موطنه شمالي المحيط الاطلسي وبحار النرويج وقد شهد في المتوسط.

#### ٢٩٨٤٣ - هرقلية معروف \* و متراكه

*Balaenoptera musculus* (S). *Rorqual commun* (F). *Finback*, *Finner* (E).  
نوع من الحراكله. طوله يراوح من ١٨ الى ٢٠ م. يظهر الحبل االون، وصاحي للمواج. يطلع الى اليابس الاكدر. موطنه المحيط الاطلسي وقد شوهد في المتوسط. يعيش جماعات. مره يبد من ١٥ الى ٢٠ نفراً. قوته السمك والقشريات يرافق اسراب الزلقة حيث تتجه.

#### ٢٩٨٤٤ - هرقلية \* و هرقلية

*Balaenopteridae* (S). *Balaenopteridae* (E).  
فصيلة حيوانات بحرية لبونة من مرتبة فصليحات الاذنك ورتبة الحوتيات || انواعها المعروفة عشرة، جميعها كبيرة الجرم ضخمة. اشهرها الحركول الازرق والحركول الحيتروسي وهركل القطب والحركول المعروف الذي يدعى منارة وكبة الجنوب وكبة الخليج وكبة القطب المعروفة بجمل البحر.

#### ٢٩٨٤٥ - هرمل

الهرمل : ضرب من الحفش فيه ملوحة وهو اذله واشده انبساطاً على الارض واستطلاحاً. ا. م.

#### ٢٩٨٤٦ - هرقلية

*Triton* (F).  
هي التروته، من اسماك المياه العذبة. اعطياها.

#### ٢٩٨٤٧ - هرغوس \*

*Hemipterus* (S). *Hémiptère* (F).  
جنس اسماك بحرية من شاتكات الزعانف وفصيلة القديات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطياها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اجسامها وشعيمة الشكل، مستحثة، تقطن من ٤ الى ٦ سم. رؤوسها كبيرة، مستعرجة طولها زحارف واطراف متباينة الاشكال عديدة. اشداها كبيرة. زعانفها الظهرية والصدرية والشرجية كبيرة، كثير المناسخ الحادة. زعانفها الخوفية صغيرة، والذيلية مقنطرة. اذواها الى الريدة الرصاصية الملاج يملوها في ظهورها تتجيب اسمر. رؤوسها حفرها اللون فضلة والحطني الاسمر || لونها كاعة الصفند.

نوع من الكحول جيد الصنف. وقد تستعمل اوراقها في صناعة مشروب خاص قريب الشبه من الجعة || اشهر انواعها ما يلي.

#### ٢٩٨٤٥ - هرقلية إيرانية \*

*Heracleum persicum* (S). *Berce de Perse* (F).  
نوع من الهرقلية المصرة القواعد العرف المستحب. مهدا بلاد ايران. يجلبها تملن من مترين الى ٣ امتار. اوراقها مركبة، فصوصها ذرية. نصلها عابق الخضار الالسن. ازهارها كبيرة القد، يمشاء اللون. اوراقها وعماها صناعة يستعمل منها عطر فاخر الصنف ويستخرج منها مشروب شائع استعمال. || تنورها يستمر من حزيران الى آب.



هرقلية إيرانية

#### ٢٩٨٤٦ - هرقلية زغبية، هرقلية صغية

*Heracleum pubescens*, *H. gummiferum*, *H. speciosum* (S). *Berce duvetée*, *B. pubescente* (F). *Downy cow-parsnip* (E). *Flaumiges Herkuleskraut* (D). *Panace* (I).  
نوع من الهرقلية المصرة العادة العرف. مهدا بلاد القفقاز. يجلبها تملن من ١٢٥ الى ٢٥٠ سم. ساقها زغبية اللحاء. اوراقها مركبة. وريقاتها كبيرة القد. نصلها شاتك الحانة، اخضر الصفحة العليا، حلي السفل. ازهارها الى الياض الكندر. || سوقها تنضج عند سزها او تلفها مادة سكرية مأكولة يقال انها جزية الشفع. ويستخرج منها ومن اوراقها مادة كحولية شائعة الاستعمال. تنورها يستمر من حزيران الى آب.



هرقلية نائمة

#### ٢٩٨٤٧ - هرقلية صولية

*Heracleum lanatum* (S). *Berce laineuse* (F).  
نوع من الهرقلية المصرة. مهدا امريكة الشمالية. يجلبها تملن من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. ساقها وفروعها زغبية اللحاء. اوراقها قلبية الفصوص المسننة الحانة. نصلها اخضر الصفحة العليا، ازغب السفل. ثمارها صغيرة القد. تنورها يستمر من حزيران الى تموز.

#### ٢٩٨٤٨ - هرقلية نافعة \* و سقندليون، غيطل

*Heracleum sphondylium* (S). *Berce branche-ursine*, *Patte d'oie* (F). *Meadow parsnip*, *Cow-parsnip*, *Hogweed* (E). *Heilkraut*, *Weissenherkuleskraut* (D). *Spondillio*, *Panace erculeo*, *Zampa d'oca* (I).  
اشهر انواع الهرقلية واكثرها انتشاراً. تتميز من النباتات الضارة لان عناصرها الطبيعية جشالية تؤذي المواشي التي تاكل اوراقها. ومع ذلك فزراعها شائعة ويستخرج منها كحول جيدة الصنف ويصنع من اوراقها مشروب مستحب النظم قريب الشبه من الجعة.



هركل معروف

#### ٢٩٨٤٩ - هرقلية

*Balaenoptera* (S). *Balaenoptère*, *Rorqual* (F). *Rorqual*, *Fin whale* (E).  
جنس حيوانات بحرية لبونة من الحوتيات. انواعها المعروفة اربعة ومنهم من قال ١٢. جميعها كبيرة القد، وشعية الشكل، ضخمة الرأس الذي لا يقل طوله عن الزمام الاول من الجسم. اعناقها مستطيلة التضفد. زعانفها الظهرية محببة الى الدوراء. زعانفها الصدرية ذرية الاطراف. موطنها جميع البحار تجوبها في طلب الحصيد والمض.



هروس

#### ٢٩٨٥٠ - هرقلية اذوق

*Balaenoptera sibbaldi* (S). *Baleine bleue*, *Rorqual de Sibbald* (F).  
اكبر انواع الحراكله واضخمها جنه. طوله نحو ٢٦ م.



هرثة الشروش



هرندي



هرثوع اسنغ



هرثوع برتقالي



هرثوع جامد



هرثوع خيش

٢٩٨٦٠ - هرثوع يات \* (S).  
Hernandiaceae (F). Hernandiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين كثيرة الثمارات منخفضة المبيض. اجناسها وانواعها قليلة العدد. اعطائها بعض المناطق الاستوائية من العالم القديم والجديد || نباتاتها اشجار كبيرة، فراء، اوراقها منفعة، متعاقبة، جامدة، الاتصال القلبية الشكل او البيضية، ازهارها متكررة التجميع، طرفي الارتكاز. ازهارها صغيرة صفراء اللون او نورية، ثمارها مسهلة، اغشائها صناعية.

٢٩٨٦١ - هرثوع، هرثوع، هرثوع \* (S).  
Boletus (S). Bolet (F). Boletus (E).

جنس فطور من فصيلة السيات الشالية. انواعه كبيرة العدد تألف الثمارات والاصراج القليلة اغشائها صراج السديان. بعضها يأكل مستحب الطعم وبعضها جسامي ضار او كثير الاذى. اشكالها واغشائها والوانها مختلفة، جميعها قلنسوية السافل الجامدة المادة || اعرف انواعه واغشائها ما يتبع.

٢٩٨٦٢ - هرثوع اسنغ \* (S).  
Boletus aereus (S). Bolet bronza (F).

نوع من المزنوع المأكول. يعيش ويتكاثر في التربة. ساقه غليظة اللد، وردية اللون. عسلاته كبير اللد، فارش القلنسوة، كسني اللون، اسفح المراج. مكسره ابيض اللون ينصرف الى الوردي عند تأكله من المراه.

٢٩٨٦٣ - هرثوع البكر \* (S).  
Bolet des boeufs, Albarelle (F). Boletus bovinus (E).

نوع من المزنوع ينتمي الى فصيلة السيات الشالية. يتبر من الفطور المأكولة. يعيش على الجار الحور والكتنة || جذعه اسطوانية الساق المنصبة. عسلاته كبير، فارش، جامد اللحية، حنلي اللون، اصفر المراج. مكسره الى البياض التي ينصرف الى الوردي عند تأكله من المراه.

٢٩٨٦٤ - هرثوع برتقالي \* (S).  
Boletus aurantiacus (S). Bolet orange (F).

نوع من المزنوع المأكول المشحب الطعم. يعيش على جذور السديان. ساقه غليظة، صقلاته كبير، اللد، برتقالي اللون، زن من ٦٠٠ الى ١٠٠٠ غرام. مكسره ابيض اللون ينصرف الى الوردي عند تأكله من المراه.

٢٩٨٦٥ - هرثوع جامد \* (S).  
Boletus scaber (S). Bolet rude, Roussille (F).

نوع من المزنوع المأكول المشحب الطعم. يعيش على جذور السديان. جذعه ينفي الشكل، صقلاته كبير اللد، جامد اللحية، حنلي اللون، اسفل المراج. مكسره ابيض اللون يبقى على حاله او ينصرف قليلا الى الوردي عند تأكله من المراه.

٢٩٨٦٦ - هرثوع خيش \* (S).  
Boletus luridus (S). Bolet pernicieux, B. bième (F).

نوع من المزنوع الجسامي المادة، حريف الطعم، مر اللذان، ساقه غليظة حراء البيرة. صقلاته كبير القلنسوة القارضة، حنلي اللون، اسفح المراج. مكسره ابيض اللون ينصرف الى الزرقه عند تأكله من المراه.

Pyramidal (F).  
نمت وصفي يظن على ما كان شكله يشبه الهرم.

٢٩٨٤٩ - هرثيس \*  
هر الكركدن الابيض، اعطيه.

٢٩٨٥٠ - هرثيسكة \*  
اثنى الحيقطان.

٢٩٨٥١ - هرثيسيوم \* (S).  
Hormiscium (S).  
جنس فطور بحيرية من الدغيات وفصيلة الطحيسيات، مشجها موقود التركيب. جبرها الكنديه سميعة الانظام، منقطة الاطراف، ملونة المادة. || انواعه قليلة العدد تعيش على المواد المصفوبة والنباتية السائرة الى الاخلال.

٢٩٨٥٢ - هرثيمكة \* (S).  
Hermella (F). Hermella (E).

جنس ديدان حلقيه قساية من فصيلة الهرمليات انواعها المعروفة عديدة تعيش في رمال الشواطئ التي لا تنفع منها المياه، ضمن انايب هويدية الارتكاز تصم فروعها بملاسها الرامية الكثيفة المسد.

٢٩٨٥٣ - هرثيمليات \* (S).  
Hermellidae (F). Hermellidae (E).

فصيلة من الديدان الحلقية القصابة. اجناسها المعروفة قليلة العدد موطها رمال الشواطئ البحرية في الاقاليم الجادة والمعتدلة الحرارة || اشهر اجناسها الهرميلة.

٢٩٨٥٤ - هرثين \* (F).  
Hermine (F).  
هر القاقم، حيوان من السرايب.

٢٩٨٥٥ - هرثصكة \*  
مشي الدودة.

٢٩٨٥٦ - هرثوع \* (S).  
Ricin (S).  
الواحدة هرثة. جنس حشرات جلدية من فصيلة الهرمليات. انواعها عديدة تركيب الطيور الجوارم. جميعها ذرية اللد، مستطيلة الجسم والرأس، دقيقة الاصابع، متباعدة الحلب النظامي الارتكاز. || اعرف انواعها هرثة الشروش.

٢٩٨٥٧ - هرثصكة الشروشور \* (S).  
Ricin (S).

حشرة جلدية من الهرم. طرفا نحو ٣ م. رأسها، مبط المقدم. تأثيرها قوية، زباناها جدعة، بطها يبغي الشكل. || تركب الشراير والمصانير الفريدة فتزدها وقد تصفها.

٢٩٨٥٨ - هرثصيات \* (S).  
Ricinidae (S).

فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلذبات. انواعها عديدة. اجسامها دقيقة، مستطيلة الشكل، مغلطعة، طرفا يراوح من ٣ الى ٣ م. تكثر الطيور الجوارم اغشائها الشروشور والمصانير الفريدة || اشهر اجناسها الهرم،

٢٩٨٥٩ - هرثندي \* (S).  
Hernandia (F).

جنس نباتات بحيرية من فصيلة الهرنديات: انواعها المعروفة سبعة جميعها من اشجار المناطق الاستوائية. اوراقها متعاقبة، منفعة، قليلة النصل الجامد الخصب الصفحة. ازهارها عشكوية التجميع، طرفية الارتكاز. ثمارها مسهلة. اغشائها صناعية. تقع اوراقها منشط شاي يستعمل حقنًا بالسر.

٢٩٨٧٤ - هَرِيَّات ، قِيدِيَّات (F). Amentacées (F).

هي النباتات التي تكون أزهارها الذكرية على شكل حريرة أو قدةً لذلك فالجوزيات والبيقصيات والسندانيات إلى آخره يجيها من الهريات .

٢٩٨٧٥ - هَرِيَّاع (F). Feuilles mortes (F).

Dead leaves (E). الورق تنفضه الريح فيتناثر على الأرض .

٢٩٨٧٦ - هَرِيَّوَة ، قِيدَة (F). Chaton (F).

Setting of a gem (E). نظام هجرة قوامه سنبله مركبة من أزهار وسيدة الشق .

٢٩٨٧٧ - هَرِيَّصَة (F). Mare d'eau stagnante (F).

Pool (E). مستنقع الماء الساكن .

٢٩٨٧٨ - هَرِيَّعَة (F). Peltaris (S). Peltaire (F).

جنس نباتات برية حولية أو معمرة من فصيلة البيليبات . أنواعها المعروفة أربعة أعطانها الشرق الاوسط واروبة الشرقية . أوراقها متعاقبة . أزهارها عنقودية التجميع ، طرفية الانكناز . ثمارها غرنديلة مبطلة || أشهر أنواعها هريمة النورم .

٢٩٨٧٩ - هَرِيَّعَة الثوم \* (F). Peltaria alliacea (S).

Peltaire alliaire (F). Shieldwort (E). Knoblauchscheibenkraut (D). Peltaria (I). نوع من الهريمة المبدولة المعمرة . أوراقها متعاقبة بيضية الشكل حاضنة ، فصلها حايق الخضار البحري ، ناشر الاصباح . أزهارها يضاء اللون || أوراقها ثوبية الرائحة عند القس . يقال أنها طيبة تغيد المعدة وتظهر الأسماء .

٢٩٨٨٠ - هَرَكُر (F). Luscinia, Philomela (S).

Rossignol (F). Nightingale (E). جنس طير من فصيلة الشغليات . أنواعه ثلاثة الهزار الأشرق والغندليب والمزقة . أجسامها صغيرة القند مستطيلة الشكل . مناقيرها دقيقة مدنية الملاحظ . أجنتها وأذنانها متوسطة الحجم . أرساغها طويلة . أصابعها نحيلة . أطافرها ضعيفة . ألوانها جميلة الألوان المتخالفة المزاكية || جميعها غريزة تألف المواقف الربطية . تجوب البلاد في طلب الحضيف والمشي . تدفن في الإدفال وقد تركر عشها على الحضيف بين الشب . قوتها الحشرات .

٢٩٨٨١ - هَرَكُر أَشْرَقِي \* (F). Philomela major, Luscinia luscinia (S).

Rossignol (F). Nightingale (E). جنس من الهزار . تفرقة قريبة لشبه من نغمة الغندليب إلا أنها لا تضاهيها بالرقعة ويحسن الإلحان وتعددا || طوله نحو ١٨ سم . ثوبه إلى الخلفي الاصهب الملوخ . صدره وبطنه إلى البياض الاكدر . أجنته منمشة بالاسمر . مناقره حننلي للمقطع الأعلى . اصفر الاسفل . ساقه واصنابه إلى الصفرة الخطية || قوته الحشرات . يدفن في الإدفال . انشاء تضع من ٤ إلى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر .

٢٩٨٨٢ - هَرَكُر غَرِيد (F). Luscinia luscinia (S).

هو الغندليب ، اطليه . هَرَكُر جَمَان (F). Luscinia luscinia (S). هو نبات الفاشرين ، اطليه .

٢٩٨٦٧ - هَرْتُون لَينِد \* ، بوليطن كاة (F). Boletus edulis (S).

Bolet comestible, Cèpe, Ceps (F). Esculent boletus, Polish mushroom (E). Edelhöhrling (D). Bolet comestible (I). أشهر أنواع الهرنون المأكول . لذية الطعم ، مستحب المذاق يعيش ويتكاثر على التربة في ظل الأشجار الحرجية اخصبا السنديان . صفاته قلنسوي الشكل ، كبير القند ، جامد اللحية ، لونه إلى البياض الاكدر الاصفر الملوخ . مكسره ابيض اللون ينحرف إلى الوردي عند تأكله من الهواء .

٢٩٨٦٨ - هَرْتُون لَينِد \* (F). Boletus cyanescens (S).

Bolet indigotier, B. bleuissant (F). نوع من الهرنون الجمال المذوي المر المذاق . ساقه غليظة حراره اللون . صفاته كبير القند قريب الشبه من صفات الهرنون الاسفع . مكسره ابيض اللون ينحرف إلى الزرقه النيلية عند تأكله من الهواء .

٢٩٨٦٩ - هَرْتُونِي \* ، هَرْتُونَة (F). Apers spica-venti (S).

Agrostide des champs, Jouet du vent, Epi du vent (F). Corn grass, Silky bent grass, Wind grass (E). Windhalm, Echter Windhalm (D). Spica venti (I). نبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات . يكثر بين الزروع وفي الأراضي البرية الخساسة .

٢٩٨٧٠ - هَرِيَّيس \* (F). Heliornis fulica (S).

Héliorne (F). Heliornis (E). طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة التفلقيات . قريب الشبه بالنعناض والفرقة . يألف المستنقعات والبحيرات وصفات الانهر . قوته الحشرات والنباتات المائية || جسمه متوسط القند ، يطول نحو ٣٠ سم . يتميز بطول عنقه ويقصر ذنبه المستدير . رأسه متدل الجرم . مناقده ضميم مدبب الطرف . جناحا فارشان و لافشان . ساقه قصيرتان . أصابعه مستطيلة مخظبة تمكته من السير على الأعشاب المائية . ثوبه الملوي متداخل الاسود والاسمر . ثوبه السفلي إلى البياض الاصفر . رأسه وعنقه بلون الصفر تملوها جذة سوداء أول تمتد من قاعدة المنقاد إلى الرداء . وجدته ثانية تمتد من طرف العين إلى الظهر || يدشن عشه على ضفاف الماء بين القصب والاسل . الانثى تحضن وعدما نحو ١٢ بيضة بينها الذكر يؤمن لها الغذاء . الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع .

٢٩٨٧١ - هَرَرَّوَة (F). Bèlement (F).

Bleating (E). صوت الشان .

٢٩٨٧٢ - هَرِير (F). Pempéhride (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف . انواعه المعروفة قليلة العدد ، أعطانها مجار البلاد الحارة . أجسامها صغيرة القند مفلطحة . ميرتها مستديرة كبيرة ، ألوانها إلى السمرة . ظهورها ينفسجية الملوخ . بطونها فضية . حومها مأكولة تعتبر من الاصناف العادية .

٢٩٨٧٣ - هَرِي (F). Granier (F).

Granary, Corn-loft (E). هو الابار ، مستودع رطب الجوانب تجمع فيه الحبوب . ج . أهرا .



هَرُون لَينِد



هَرُون لَينِد



هَرُونِي



هَرِيَّيس



هريمة الثوم



هزار أشرق



هَزَان



هَس جِل



هِسِير الْحَزَائِيَات



هِسِير الشَيْك



هِسِير الْعَرْسَج



هِسِير الْقَرَايِين



هِسِير الْقَرْطُم

## ٢٩٨٩٠ - هِسِير \* Hesperia (S).

جنس حشرات من فصيلة الهسيرييات. أنواعه المعروفة كثيرة المدد اما الصلابة قليلة. فرائدها صغيرة القدر طولها ٢٢ الى ٣٣ سم. اجسامها موزنية الشكل. اوتارها الى السرة. رواشها موزكة وبقيجة. مكنا كروي الشكل تنحصر على صفحات الاوراق السفلى. اشهر انواعها واشهرها ما يتبع.

## ٢٩٨٩١ - هِسِير انْخَبَازِيَّات \* Hesperia malva (S). Plain-chant (F).

حشرة من الهسير. فرائدها صغيرة القدر طولها نحو ٢٢ سم. ثوبها الى السرة السوداء تملؤها مائة نغية. رواشها ذكورها واناثها قريبة لشبه لا يفرقها سوى اتساع التبييض الابيض في الذكور. يكثر وجودها في نيسان وآيار وفي تموز وآب. ريقاتها موزية تركب الحزازيات والنباتات والشجك والوسج.

## ٢٩٨٩٢ - هِسِير الشَيْك \* Hesperia serratus (S).

حشرة من الهسير. فرائدها تطول نحو ٢٢ سم. ثوبها الى السرة الخفيفة. رواشها ذكورها الى السرة الخفيفة يتخللها وتبييض اخضر. رواشها اناثها كستنية اللون يتخللها تبييض وتبييض ابيض. يكثر وجودها في نيسان وآب. ريقاتها موزية تركب اوراق الشجك.

## ٢٩٨٩٣ - هِسِير الْعَرْسَج \* Hesperia sao (S).

Hesperie des ronces (F). Hesperia sao (E). حشرة من فصيلة الهسيرييات ورنية حشريات الاجنحة. موطنها بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم. فرائدها واسعة قوتها رقيق الاتزار. سرتها تعيش على اوراق الوسج والبلان. جسمها صغير القدر يطول نحو ١٠ سم. بسلتها نحو ٢٣ سم. راسها كستي اللون. عيناها كيرتان. زياتها صولطانيان. جوشها وبطنها الى الكستي القاتم. رواشها الذكر الى السرة الكستنية تملؤها رشفة بيضاء. رواشها الانثى اقل لونه وزيوتها. لها جيلان في الحول. تظهر فرائده الجبل الاول في نيسان وتظهر فرائده الجبل الثاني في تموز. تخرج في النهار. تماثل بحد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمنع المكن ميعادها على امان الاوراق ونصالحا. السرة تنحصر بلونها الكلي تطول نحو ٢٥ سم. جسمها اسطواني الشكل. ماسن القشعر. احمل اللون. اصفر اللوح. جوي الرأس. اسمر اللبد والرواسب. طوره الاكمال الذي يستمر في الجبل الاول نحو ١٥ يوما. يستمر في الجبل الثاني نحو ١٨ اسبوعا ويتقضي ضمن صلجة تحميها السرة بين الاوراق.

## ٢٩٨٩٤ - هِسِير الْقَرَايِين \* Hesperia proo (S).

حشرة من الهسير. فرائدها تطول نحو ٣٠ سم. ذكورها واناثها متساويان في القدر. ثوبها اسمر كستي اللوح. رواشها موزكة وبقيجة وهي في الذكور زاهية الالوان المركزة على الخلفي الاخر. يكثر وجودها من حزيران الى تموز. ريقاتها تركب القرايين ورائها النباتات الحزازية.

## ٢٩٨٩٥ - هِسِير الْقَرْطُم \* Hesperia carchami (S).

حشرة من الهسير. فرائدها تطول نحو ٣٠ سم. ثوبها الى

## ٢٩٨٩٤ - هَزَان \* Opisthocomys (S). Hoazin (F).

جنس طير من فصيلة النراسيات. انواعه قليلة تتميز براسها المسجحة التي تشبه راحة اليتيس. جميعها مستطيلة القدر الرشيق. قوية الخنار. قزعية الرأس. نحلة المتق. مستديرة الاجنحة. مستطيلة الذيل. اوتارها الى السرة السوداء يملؤها نأير ابيض وتوشج وتوشج. صفها وجوشها الى التياض التي. تألف الاحراج. تعيش اسراب كبيرة. قوتها التار. تدرش صفها. في الاندغال والاشجار المنقبة. فوق الماء. اناثها تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها وسدها اربعة اسابيع.

## ٢٩٨٩٥ - هَزِير \* Lion

من اسماء الاسد المشهورة.

## ٢٩٨٩٦ - هَزْرُوج \* Pied du champignon (F).

هو ساق الفطر.

## ٢٩٨٩٧ - هَبَّاس \* Pelidna (S).

Pelidna (F). Pelidna (E). جنس طير من دجاجيات الارض. انواعه المعروفة قليلة العدد. جميعها من القواطع. اجسامها صغيرة القدر قريبة تشبه من الجملول. اوتارها الى الربعة الخفيفة. تميل وترش بالاسمر في الظهر والجناح. ترمر وتبيض في المتق والجوش والابطن والبلطن. مناقبها مستطيلة. دقيقة. اذنانها صغيرة. اجنتها لاسفة. قوتها الحشرات والديدان والحلزون والرعويات. اعرف انواعه واشهرها الحساس الجبلي.

## ٢٩٨٩٨ - هَسَّاس جَبَلِي \* جَهْلُول الشَّرْق Pelidna alpina, Tringa subarctica (S).

Pelidna alpina, Bécasseau corcoll (F). Curlew Sandpiper (E). طائر من الحساس. اعطانه قسيمة الارباء تمتد من اليابان الى اوردية. مصيفه جبال البلاد المعتدلة الحارة. مشتتة ساحل البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر ويصر والسودان والحبشة. جسمه صغير القدر. طوله نحو ١٦ سم. ثوبه الى الربعة الخفيفة. ظهره عايق اللون يملؤه تميمين اسمر واخضر. صفقه وجوشته وبطنه الى التياض الاخير يديم بقية التي في الصدر. متقاده اسمر اللون. رصاصي اللوح. عيناه الى السرة الكستنية. يذفن في افحوص قليل المتق. صاحي الشكل. يبطه يائم الحاشاش. حشسته من ٣ الى ٤ بيضات ترخمها الانثى دون الذكر نحو ١٧ يوما.

## ٢٩٨٩٩ - هِسِيَّة \* Hipsa (S).

Hipsa (F). Hipsa (E). جنس حشرات خافضة من هدييات الاجنحة وفضيلة النضاريات. انواعها المعروفة نحو ٣٠٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الاسرائيلية والحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم. اجسامها صغيرة القدر تطول من ٧ الى ١٠ سم. رؤوسها صلبة. حيزها بارزة. قربنها الاستشعارية بحيطه منتصبة. كواسلها واحداها وحواشيها بطونها مدرزة بالشوك الدقيق الحاد. احداها شبه نجية الشكل مستديرة المؤخر الاذن. اوتارها متباينة الالوان والماجات. يكثر فيها الاسود وشفتها ثم الجوي ثم الكستي والبي.

(١٦٩٥-١٧٣٣) أنواعها عديدة تنتمي الى فصيلة الفويات. اصطلحها البلاد الامريكية. جميعها اصحاب سبروتية ممره. اوراقها متقابله. ازهارها قلبية الشكل، مستطيلة المالحق || اشهر انواعها ما يتبع .

### ٢٩٩٠٣ - هسپيرينته أرجوانية

*Houstonia purpurea* (S). *Houstonia purpurea* (F). نوع من الهستونية . ساقها خضيه تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها بيضيه النصل ، صغيرة القد ، ثلاثية أو خاسية الفلوع. ازهارها ارجوانية اللون ، حامية الازتيكاز. تورها يستمر من ايار الى ايلول .

### ٢٩٩٠٤ - هسپيرينته كرساوية

*Houstonia caerulea* (S). *Houstonia bleue* (F). نوع من الهستونية . ساقها خضيه تملو نحو ٢٠ سم. اوراقها خضيه أو اهليلية النصل ، صغيرة القد ، فردية الفلوع. ازهارها الى الزرقه البنفسجية المواج . ازهارها يستمر من نيسان الى تموز .

### ٢٩٩٠٥ - هسپيرينته صغريه الورق

*Houstonia serpyllifolia* (S). *Houstonia à feuilles de serpolet* (F). نوع من الهستونية . ساقها خضيه تحمله تملو من ٨ الى ١٥ سم. اوراقها كاوراق الصغر البري شكلًا وقد ولوًا. ازهارها زرقاء اللون ، فردية التجميع . تورها يستمر من ايار الى آب .

### ٢٩٩٠٦ - هسپير ٥

*Hister* (S). جنس حشرات مغتره من فصيلة الهستريات . انواعها عديدة ، جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ٥ الى ١٥ سم. لهاها الى السواد اللامع يملو تنقيط وتقيح اخر || يرقاها قانصة مغتره لا تمتع من كل حشرة تستطع اليها سيلا . اشهر انواعه :

- هستير احر الفعد ° *Hister purpurascens* (S).
- هستير احر النقطة ° *Hister uncinatus* (S).
- هستير رباعي النقطة ° *Hister quadrimaculatus* (S).
- هستير لا متساوي الفك ° *Hister inaequalis* (S).

### ٢٩٩٠٧ - هسپير آحمر الغمد ٥

*Hister purpurascens* (S). *Hister pourpré* (F). *Hister purpurascens* (E). حشرة نائلة جاسه من فصيلة الهستريات ورتبه غدييات الاجنحة . تألف المراعي وبجوانب البروت والارواح القريبة من العمران وكل مكان يكثر فيه الحشرات والاربع والقمله || جسمها صغير القد بطول نحو ٥ سم. ثوبها الى السواد المالحق لهدما الى الحمرة الارجوانية . رأسها صغير الحجم . عينها صغيرتان . زباناها صولجانيان . ظهرها سداسي التخديقه النندي . يلحف ثلاثة ارباع البطن . ارساغها خماسية النعل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجبلانية في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسافه في اوائل آب وتضع الحكن في اكرام الزبل ... || البريقه عند كمال نموها تقطو نحو ١٢ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، اغبر اللون ، كسني الرأس والشرج والرواجب ، مشلل الجانبيين ، مهدب الفول .

السمة السوداء المواج . رواشن ذكورها غراء اللون ، خضر الزراكشي والتاييج والتجاذيع . رواشن اناتها الى السمة يملوها بقيح ابيض . يكثر وجودها من ايار الى آب . يرقاها تركيب القرطم وسائر الخبازيات .

### ٢٩٩٠٦ - هسپيرينته ، زهرة الخبب

*Hesperantha* (S). *Hesperanthe* (F). . جنس نباتات عشية دوفسية من فصيلة السوسنيات . منبتها بعض مناطق افريقية الجنوبية . اوراقها ثنائية الصف ، ضيقة النصل ، ازهارها سنبل التجميع . ازهارها صغيرة القد ، قرواسة المرفط المعري تنفتح عند غروب الشمس || انواعها المعروفة قليلة المدد ، أشهرها التالية :

### ٢٩٩٠٧ - هسپيرينته زبانه

*Hesperantha pilosa* (S). *Hesperanthe velue* (F). نوع من الهسپيرينته . ساقها شراخية ترتفع من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها خلية ومزبغة . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها صغيرة القد ، يضاء اللون من الخارج والداخل || تنورها يستمر من نيسان الى ايار .

### ٢٩٩٠٨ - هسپيرينته قريفيه العرف

*Hesperantha cinamomea* (S). *Hesperanthe à odeur de cannelle* (F). نوع من الهسپيرينته . ساقها شراخية ترتفع من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقها جرداء غلدة السطح . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها صغيرة القد ، قريفيه العرف . يتلاتها الخارضية الى الحمرة الحمريه . يتلاتها الداخلية يضاء اللون || تنورها يستمر من نيسان الى ايار .

### ٢٩٩٠٩ - هسپيرينته محججه

*Hesperantha recurvata* (S). *Hesperanthe recourbée* (F). نوع من الهسپيرينته . ساقها شراخية نشيطه ترتفع من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها مقعره السطح ، جرداء النصل . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها كبيرة القد محججه الانابيب ، من التلات الخارضية ، بيض الداخلية || تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

### ٢٩٩٠٠ - هسپيريئات

*Hesperilidae* (S). *Hesperidés, Hespéridés* (F). *Hesperilidae, Common Skippers* (E). *Dickkopflüster* (D). فصيلة حشرات من حشرقيات الاجنحة . اجنحتها وانواعها كثيرة المدد ، جميعها صغيرة القد . ورووها غليظة . قرنها الاستقصائية دقيقة منفردة . ارجلها الامامية تامة النمو . بطونها كبيرة . مكثا قلنسوي الشكل . يرقاها عارية أو مبشرة الخلب ، مستدقة الاطراف ، خضيه الوسط . خادراتها تلحف بخلاف ريق الصفهه متن الحباك شبه الشرفه تنسجه بين الاوراق المتشابكة || اشهر انواعها وامرها باللاتصاد الزراعي الهسپير والتزيين والياروز واليانوف والكركرود .

### ٢٩٩٠١ - هسپته

*Funkle* (F). هي الفسكه . نبات من الزنبقيات . اطلبها .

### ٢٩٩٠٢ - هسپونيه ٥

*Houstonia* (S). *Houstonie* (F). جنس نباتات معقوده التعريف على اسم العلامة هستن



هسپونه



هستير



هستير احر الغمد



هليونيت

الاسفر . ثماره جزئية اللون . اغاليجه مستطيلة ، قلبية  
التفاحة ، ذكية العلم ، فاقرة الصنفت .

### ٣٠٠٠٧ - هليونيت عكاش

*Asparagus scandens* (S). *Asperge grimpante* (F).  
نوع من الهليون التريبي السرح . ساقه متسلقة . فروعها  
تحيلة افاقية الانتشاب متدلية . ردياته ثلاثية التجميع ،  
تصلها ميطة الصفعة يطول من ٦ الى ١٣ سم . ازهاره  
الى الخضار الباقي . ثماره حراة لينة وحيدة البزيرة .

### ٣٠٠٠٨ - هليونيت معروف \* هليونيت

*Asparagus officinalis* (S). *Asperge commune* (F).  
*Common asparagus*, *Sparrow-grass* (E). *Echter*  
*Spargel*, *Asparagus* (D). *Asparago comune*, *Sparago*  
*cultivato*, *Asparagio* (I).

هو الهليون البقلي المشهور . ضرره واصراره الزراعية  
عديدة جميعها مأكولة الاغاليج . اربوت قهقرية . اغاليجها  
غلظية . ساقها سرعة فزاعة طول من ٦٥ الى ١٥٠ سم .  
ردياته حزنية التجميع تمتد من ٣ الى ٦ . تصلها غليظ  
الشكل يطول من ٦ الى ١٥ سم . ازهاره خضراء اللون .  
ثماره الى الحمرة النابتة .

### ٣٠٠٠٩ - هليونيتات ، هليونيتات

*Asparagées* . سبط من فصيلة الزنبقيات ، اشهر اجناسه الهليون .

### ٣٠٠١٠ - هليونيت ، آسفرجين ، آسبراجين

*Asparagine* (F). *Asparagin* (E).  
مادة حيوية قابلة التبلور عادمة المرفق تافهة العلم لانتروب  
في الكحول ، تدوب في الماء العالي وفي الحوامض والقل .  
توجد في عصارة معظم النباتات تكثر نسبتها في اغاليج  
الهليون . تستعمل لادر البول .

### ٣٠٠١١ - هساشة

*Platypiza* (S). *Platypéza* (F). *Platypéza* (E).

جنس حشرات من فصيلة الهشائيات ورثة ذوات الجناحين .  
انواعها المروفة نحو : . منتشرة في معظم اقطار البلاد  
المتحدة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٥ سم .  
رؤوسها مستضخنة . عيونها متلاصقة عند الشقين . قرونها  
الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل ، تنتهي بنسيلة  
دقيقة . اضطامها قصيرة . ملاصقا وحيدة العقلة . كولسلها  
شامة هريمه ، مبرشة الملب . بطونها بارزة الحدة ، مبرشة  
الملب . رواشها كبيرة . قسطانية التخفيف . قوائمها  
نسيطة || تألف المواقع التقلع والحراج المبرشة الانحجار .  
يرقاتها عارضة تعيش على الفطور .

### ٣٠٠١٢ - هساشيات

*Platypizidae* (S). *Platypézidae* (F). *Platypézidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وازواعها  
المروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد المتحدة  
الحرارة . تألف المراعي والمروج والنباتات || اجسامها  
صغيرة تطول من ٢ الى ٥ سم . رؤوسها مستضخنة . عيونها  
متلاصقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة . ثلاثية  
الفصل . ملاصقا وحيدة العقلة . اضطامها قصيرة .  
شفاهاها السفلى لاقعة او لثابة . كولسلها هريمه  
الشكل ، مبرشة الملب اللينق . رواشها كبيرة . شفاة  
بطونها مردلية . خلية انتشار . قوائمها قياسية || يرقاتها  
مبطلة تعيش على بعض انواع الفطور وعلى المواد النباتية  
الجزئية الاخلال || اشهر اجناسها الهاشة .



هليون معروف

اوراقها صفية . يكثر وجودها في المناطق وفي الموائع  
الرطبة .

### ٣٠٠٠٠ - هليونيت

*Héliomètre* (F). *Heliometer* (E).  
هو انجرام ، جهاز يستخدم في قياس قطر دائرة الاجرام  
السيارية .

### ٣٠٠٠١ - هليونيت ، هليونيت

*Asparagus* (S). *Asperge* (F). *Asparagus* (E).  
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الزنبقيات . انواعه  
المروفة نحو : . جميعها اشجار قهقرية ممررة . معظمها  
بري . وبعضها زراعي وتريبي . ساقها منتصبه وعارضة  
ومتدلية . اوراقها رديية . ازهارها تحيلة خضراء اللون ،  
ثمارها غنية || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

### ٣٠٠٠٢ - هليونيت اجسدة

*Asparagus crispus*, *A. decumbens* (S). *Asperge cré-*  
*pue* (F).  
نوع من الهليون التريبي . ساقه دقيقة متسلقة متصبغة كثيرة  
التفرع المتوسطة المتدلية العادة الطويلة . ردياته ثنائية  
او ثلاثية التجميع ، تصلها جاند الصفعة يطول من ٤ الى  
٧ سم . ثماره حراة اللون مداسية البزيرة .

### ٣٠٠٠٣ - هليونيت بري ، هليونيت شالك

*Asparagus acutifolius* (S). *Asperge piquante*, *A. sau-*  
*vage* (F). *Wild asparagus* (E). *Strauchasparagus* (D).  
*Asparago salvatico*, *Sparagio agreste*, *Corrida* (I).  
نوع من الهليون البري يكثر في المناطق الجبلية . ساقه  
تحيلة مستطيلة متقلية . فروعها قليلة متباعدة . ردياته  
ضمية التجميع ، حزنيها تمتد من ٤ الى ١٢ . تصلها جامد  
الصفعة . شالك العصقة ، يطول من ٥ الى ٦ سم . ازهاره  
عطرية المرفق . ثماره سوداء اللون . اغاليجه صغيرة القند  
تحيلة القندر مأكولة .

### ٣٠٠٠٤ - هليونيت ريشي

*Asparagus plumosus* (S). *Asperge plumose*, *A. plu-*  
*mée* (F). *Asparagus fern*, *Feather asparagus* (E).  
*Zierspargel* (D). *Asparago filiforme*, *A. plumoso* (I).  
نوع من الهليون التريبي الدائم الاخضرار . ساقه فزاعة  
شائكة ، فروعها ريشية التركيب غزيرة الشكل ، ردياته  
حشوية دقيقة شائكة تطول من ٣ الى ٦ سم . حزنيها تمتد  
من ٦ الى ١٢ || ضرره واصراره عديدة جميعها تريية  
تزرع في المرائن .

### ٣٠٠٠٥ - هليونيت سرخسي

*Asparagus filicinus* (S). *Asperge fougère* (F).  
نوع من الهليون التريبي السرح . ساقه منتصبه تطول نحو  
١٥٠ سم . فروعها افاقية الانتشاب والجلوس شكلها  
كالسرخس . ردياته عرجنة لاقسية الطول حزنيها تمتد  
من ٣ الى ٥ . ازهاره الى الخضار الاسفر . ثماره ودية  
اللون .

### ٣٠٠٠٦ - هليونيت ضمي

*Asparagus verticillatus* (S). *Asperge verticillée* (F).  
نوع من الهليون البقلي . مهده التفقاز . اقليمه البلاد  
الباردة . ساقه لينة خشوية تطول نحو ٢٥٠ سم . ردياته  
ضمية التجميع حزنيها تمتد من ٣٠ الى ٣٠ . تصلها جامد  
الصفعة يطول من ١٢ الى ٢٥ سم . ازهاره الى الخضار

٣٠١٣ - هَمَاق مَرُوش \*

Cinclosoma punctatum (S).  
Cinclosome punctué (F).



هَمَاق مَرُوش

طائر من الجوارح سنّيات المناسير ينتمي الى فصيلة الشحروبديات بأشكال الغابات والاشراج القريبة من الحدائق والجنائن . قوته الحشرات الصغيرة وتأثر على اختلاف اجناسها باستثناء الموز والبرتقال || جسمه متوسط القد بطول نحو ٢٤ سم . ثوبه الى الطحلة يملؤها موج اشجع ورقشة سوداء . رأسه يجمع بالابيض . عسراء الى اللباض الماسج . زوره الى الجلوة . بطنه الى الفيرة المنشفة بالصبهة . ذنبه معتدل الطول ، ضيق الطرف . قائمته رفيعةان دقيقتان ، لونها الى السمرة الزرقية || يدقن حشه في الاججار الرزمة الوراقة الظل . الاثنى تحضن وحدها من ٣ الى ٥ بيضات بينا الذكر يؤن لها الغذاء .

٣٠١٤ - هَمَامِيلِس  
Hamamèle (F).  
هو المشتركة ، المطلبه .

٣٠١٥ - هَمَمِيَّتِي \* ، حَجَر الدَّم ، شَادَنَج  
Hématis (F). Haematis (E).  
معدن حديدي اديس اللون يعرف كإبريا باسم اكسيد الحديد الطبيعى . انواعه عديدة شهرا وأكثرها انتشاراً الليمونيت . راجع مجر الدم .

٣٠١٦ - هَمَمِيَّتِي أَسْمَر \*  
Hématis bruna (F).  
هو الليمونيت ، اطلبه .



هَمَمِيَّة الاجاث

٣٠١٧ - هَمَمِيَّة  
Drosophila (S). Drosophile (F).  
جنس حشرات من فصيلة الحميجيات . انواعها المعروفة عديدة جميعها صغيرة القد ، سوية الثوب ، شفاقة الجناح النائر الاصصاب || رقاتها مضيائة ، نيرة ، هواكة ، نائلة ، تعيش على جميع المواد المختصرة او السائرة نحو الاغيار والاختلال .

٣٠١٨ - هَمَمِيَّة الانبعاث \*

Drosophila melanogaster (S). Moucheron des caves (F). Common fruit fly, Pomace fly (E).  
Taufiege, Essigfliege (D).

نوع من الحمجة . طولها نحو ٢ مم . ثوبا الى الصفرة البرتقالية . تركيب جميع انواع البآر الساقطة المطربة وتجنبد بنشاي مختلف الاختبارات الكحولية والمضوية . تمنع مكحا او تلقية حيث تعيش ينقب من رقات دقيقة طولها نحو ٦ مم . ثوبها الى الفيرة || كزودها كسكتينة اللون ، قصيرة القد ، خليقة الشكل ، تقضي طورها البدري في نفس المحيط || وهذه الحمجة هي التي يستخدمها علماء الوراثة والورث في ابحاثهم الحياتية والتناسلية .

٣٠١٩ - هَمَمِيَّات  
Drosophilidae  
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠ جميعها صغيرة القد بطيئة الطيران تعيش على المواد النباتية المختصرة || رقاتها نيرة هواكة ونائلة تعيش ايضاً على مختلف العصارات والانتاجات النباتية .

٣٠٢٠ - هَمَدَاو \*  
Haemodorum (S).  
Hémodore (F).

جنس نباتات جلمورية معمرة من فصيلة الهمدريات . انواعه عديدة جميعها ترينية . ازهارها هامة الازتكاز . عقودية التجميع او سلبية ، جميلة الاشكال والالوان الزراعية .



هَمَدَاوِيَّة الْوَزَال

٣٠٢١ - هَمَدَاوِيَّات \*  
Haemodoraceae (S).  
Hémodoracées (F). Haemodoraceae (E).  
فصيلة نباتية من وحدات الفلقه . اجناسها ٢٠ انواعها زهاء ١٠٠ معظمها جلموري معمّر وبعضها سقولي . اوراقها باغليتها مزدوجة الصفرت . ازهارها نظامية . اسديتها ثلاث او ست . مدقاتها لا قياسية الارتفاع لذلك لستوى سطحها قد يكون ارفع او احط من مستوى الاسدية . أشهر اجناسها الهمدار .

٣٠٢٢ - هَمَدَاوِيَّة الْوَزَال \*  
Apoplexie de la vigne, Folletage  
وصم فبائي شديد الوقع مجهول الاسباب يصيب الكرمة فيذبل اوراقها ويسم سرعها التي تجف في يضع ساعات .

٣٠٢٣ - هَمَرُوفِيَّة الْوَزَال \*  
Hemerophila abruptaria (S).  
Hémérophila à ailes dentelées, Phalène des genêts (F). Hemerophila abruptaria (E).

حشرة من فصيلة الارابيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط والاقليم الداخلية المتاخمة . فراستها جاسرة قوتها رقيق الانهار . سرقتها تعيش على اوراق الوزال والزنان ... || جسمها ابيض الشكل بطول نحو ١٢ مم . بسطها نحو ٣٨ مم . رأسها كبير الجرم . ضينها كبريتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، غطيان عند الانثى . جوشنها وبطنها الى الخطي الكلف المواج || روشانها الاماسيان الى الخطي الاكلف تملوه سرعجة معتزعة سمراء وزراکش وتزادق كسكتينة . روشانها الخلفان الى الخطي الاشجع يملو تشيظ اسمر وبرتقبة كسكتينة . تسنيتها خاسي الفروض اسمر . ادهابها الى القسمة || لها جيلان في الجيل . تظهر فراشة الجبل الاول في اواخر آذار وتظهر فراشة الجبل الثاني في اواسط تموز . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتع الممكن مصاديا على الصفحات السفلى من تصال الأوراق || السرعة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٤٠ مم . جسمها شبه وشعي الشكل . ثوبها الى الشبهة الخطية المواج يملؤها في كل سكة ابتداء من الرابعة زوج من النقط جاذبية الازتكاز ، سمراء اللون . رأسها شديد السمرة . رواجبها البطينية الوسطى ماصة بما يجعلها تقفوس عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي ضمن سلجة تحبكهما السرعة في كل مكان باستثناء التربة .

٣٠٢٤ - هَمَم \*  
الصغير من الغباء .

٣٠٢٥ - هَمَمَق  
Herbes tendres (F).  
الكلاء الحش اللين .

٣٠٢٦ - هَمَمَق  
Boresava (S). Borsave (F).  
نبات عشبي حولي يري وحيد الجنس والنوع من فصيلة الصليبيات . منبته بعض اصقاع الشرق الادنى || ساقه مائلة فرعاء منتصبة تملو نحو ٦ مم . اوراقها متناقية ، راسه قلبية النصال المسطيلة الاطراف الحادة . ازهاره طرفي ، ازهارها صغيرة ، لونها الى الصفار الباهت . تنويره ديبعي .

٣٠٢٧ - هَمَمَقِي  
Hammatolobium (S).  
Hammatolobion (F).  
جنس نباتات عشبية بوية معمرة من فصيلة القرنيات .

## ٣٠٠٣٦ - هَمْشُ الصُّخُورِ

*Haemanthus rupestris* (S). *Haemanthe des rochers* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته ثنائية الساق القطبية الانتشاب: ساق قصيرة تحمل من ورتين إلى أربع ورفات وساق شمراعية تحمل الأزهار. أوراقها أعليجية جميلة الأخضر. نصلها يطول نحو ١٥ سم. ويعرض نحو ١٠ سم. شراخه يطول نحو ٣٠ سم. يتوجه صيوان قطره نحو ٨ سم. يضم من ٦٠ إلى ٧٠ زهرة قرمزية اللون، فارقة البتلات. تنوره يستمر طوال شهر أيار.



هَمَيْق

## ٣٠٠٣٧ - هَمْشُ بَهِيّ

*Haemanthus magnificus* (S). *Haemanthe magnifica* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته مستطيلة الشكل. أوراقها طويلة الانتشاب تركز على ساق جديفة، نصلها يطول من ٣٠ إلى ٤٠ سم. ويعرض من ٨ إلى ١٠ سم. عورته شفعية الترتيب بارزة، ثمانية أو عشادية الأزواج. شراخه الأزهرى يطول من ٤٠ إلى ٦٠ سم. صيوانه كبير القدر قطره يراوح من ٢٥ إلى ٣٥ سم. أنصاره كثيفة التجميع لوها إلى البرتقالي الأرجواني الموالج. تنوره يستمر من حزيران إلى أيلول.

## ٣٠٠٣٨ - هَمْشُ رُجْجَرِيّ

*Haemanthus cinnabarinus* (S). *Haemanthe cinabre* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته مستديرة الشكل. أوراقها قرصية الانتشاب، شفعية العدد الذي يراوح من ٤ إلى ١٦ نصلها شيق الصفعة يطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. شراخه الأزهرى يتوسط الأوراق ويطول نحو ٣٠ سم. صيوانه يد من ٣٠ إلى ٤٠ زهرة جملة اللون الأحمر الفائق الأصفر الموالج. تنوره يستمر طوال شهر نيسان.



هَمْش

## ٣٠٠٣٩ - هَمْشُ كَثِيرِ الزَّهَرِ

*Haemanthus multiflorus* (S). *Haemanthe multiflora* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته وحيدة الساق الشمرارية. أوراقها وزية، ثلاثية أو خماسية. نصلها بارز الفروق السداسية أو الثمانية الأزواج، يطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. شراخه الأزهرى يطول من ٣٥ إلى ٦٠ سم. يكمله صيوان قطره يراوح من ١٥ إلى ٢٥ سم. يضم من ٧٠ إلى ١٢٠ زهرة قرمزية اللون، هجينة البتلات. تنوره يستمر طوال شهر نيسان.

## ٣٠٠٤٠ - هَمْشُ لِيْثْدَن

*Haemanthus lindeni* (S). *Haemanthe de Linden* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته كالاروبية. أوراقها بمنقة دائمة الخضار. نصلها أعليجي الشكل، سناني الزام الأخير، يطول من ٢٠ إلى ٣٠ سم. ويعرض من ١٢ إلى ١٤ سم. شراخه الأزهرى يطول نحو ٤٥ سم. يتوجه صيوان قطره نحو ٢٠ سم. يضم نحو ١٥٠ زهرة أرجوانية اللون. تنوره يستمر طوال شهر أيار.



هَمْشُ أَخْضَر

## ٣٠٠٤١ - هَمْشُ أَخْضَر

*Chironomus tendens* (S). *Chironome vert* (F).

حشرة من الحموش طولها يراوح من ٧ إلى ٨ سم. لوها من الخضار الأصفر الموالج. قرنها الاستشعارية مركبة إلى ١٤ حلقة عند الذكر ومن ٧ حلقة عند الأنثى. أصابعه الإسمية مهدية مستطيلة رتبتها ثلث أوراق النباتات المائية.

أنواعها المعروفة قليلة العدد منها بعض أصناف الشرق الأوسط وأفريقية الشرقية والشمالية || سورها مزرية مستطيلة معتدلة الانشعاب. أوراقها مركبة وثرية التجميع. وريقاتها صغيرة بيضبة النصال المستطيلة، أزهارها ذهبية اللون أو أرجوانية. تنورها ديمي.

## ٣٠٠٤٨ - هَمْشِيْقِيّ

*Tiarella* (S). *Tiarella* (F).

جنس نباتات جذموية معمرة من فصيلة الفلييات. أنواعها المعروفة قليلة العدد. سورها عشوية منتصبه فراء. أوراقها مركبة، مستطيلة الاطراف، لا نياسية التفريخ والتسعين. نصلها إلى الخضار الزاهي. أزهارها عشوية التجميع، صغيرة القد، بيضاء اللون أو صفراء. ثمارها جبراء لا متساوية المصارع. تنورها يستمر من نيسان إلى أيار.

## ٣٠٠٤٩ - هَمْشِاج

*Hybride* (F). *Hybrid* (E).

هو الطين النباتي، ج. هاليج.

## ٣٠٠٣٠ - هَمْشِاجَة وَهَوَكَة

*Amble* (F).

ضرب من سير الدواب.

## ٣٠٠٣١ - هَمْشَن

*Marcescence* (F).

*Marcescence, Withering* (E).

حالة كل زهرة أو نبات في طور الذبول أو القفامة.

## ٣٠٠٣٢ - هَمْشُش

*Haemanthus* (S).

*Haemanthus* (F).

جنس نباتات دوفسية من فصيلة الرجسيات. أنواعها عديدة، مهدا البلاد الحارة والاستوائية. سورها شمراعية تنجوي بالزهرار صيوان التجميع يركز على شراخه عديد المصارع. ثمارها قرنية الخمر. عنية الشكل، وسيدة البزرة. || أعرف أنواعها وأشهرها ما يتبع.

## ٣٠٠٣٣ - هَمْشُشُ أَبْيَض

*Haemanthus albus* (S). *Haemanthe blanc* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته مستديرة صفيرة القد. أوراقها رباعية العدد، خمبة التركيب، صفعية الشكل؛ نصلها يطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. ويعرض من ٦ إلى ٨ سم. حثاره مهدب الخاف. شراخه الأزهرى يطول نحو ٢٠ سم. صيوانه صغير الحجم قطره نحو ٧ سم. أزهاره كثيفة التجميع بيضاء اللون. تنوره يستمر طوال شهر حزيران.

## ٣٠٠٣٤ - هَمْشُشُ أَحْمَر

*Haemanthus coccineus* (S). *Haemantheponceau* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته صفيرة القد، ثنائية الأوراق الكبيرة التي تطول من ٥٠ إلى ٦٠ سم. وتعرض من ١٥ إلى ٢٠ سم. شراخه الأزهرى يطول نحو ٢٠ سم. صيوانه صغير الحجم، قطره نحو ٨ سم. أزهاره كثيفة التجميع حراء اللون. تنوره يستمر من آب إلى تشرين.

## ٣٠٠٣٥ - هَمْشُشُ أَرْجَوَانِيّ

*Haemanthus puniceus* (S). *Haemanthe escarlate* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته مستديرة الشكل. أوراقها قرصية الانتشاب شفعية العدد. نصلها جميل الخضار الزاهي، شيق الصفعة، يطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. ويعرض من ١٢ إلى ١٤ سم. شراخه الأزهرى يتوسط الأوراق ويطول نحو ٤٠ سم. صيوانه يحمل من ٤٠ إلى ٥٠ زهرة جملة اللون الأرجواني. تنوره يستمر من حزيران إلى أيلول.





هَمْشُوش رِيشِي



هَمْشِيَّة صَيْبِيَّة



هَمْشِيَّة الْبِن



هَمْشِيَّة

٣٠٠٤٢ - هَمْشَر رِيشِي \*  
Chironomus plumosus (S). Chironome duveteux (F).  
حشرة من الهَمْشُوش طَوْرًا يَرَوَحُ مِنْ ٩ إِلَى ١٣ م. ثَوْبَهَا  
أَمْلَسُ الْوَرْنِ يَطْلُقُهُ غَسَطُ اسْوَدٍ وَيَتَرَفَعُ جَمِيعُ أَصْفَرٍ .  
سِيَّاقُهَا صَفْرَاءُ الْوَرْنِ . أَوْرَاقُهَا الْإِسْمَاطِيَّةُ مَهْدِيَّةُ مَسْتَطِيلَةٍ .  
رِقَّتُهَا حِمْرَاءُ الْوَرْنِ تَمِيشُ عَلَى الْبَهَاتَاتِ الْمَائِيَّةِ وَكَلَّ تَلْعَمُ أَوْرَاقَ  
بَهْضَهَا .

٣٠٠٤٣ - هَمْشُوشِيَّات \*  
Chironomidae, Tendipadidae (S). Chironomidae (F). Midge (E).  
Zuckmücken (D).  
فَصِيلَةُ حَشَرَاتٍ مِنْ رَتَبَةِ ذَوَاتِ الْجَنَاسَيْنِ . أَجْسَامُهَا وَأَنْوَعُهَا  
كَثِيرَةٌ الْمَدَدُ جَمِيعُهَا صَغِيرَةٌ الْفَعْدُ قَرِيبَةُ الشَّيْءِ مِنَ الْبَهْضِ .  
أَجْسَامُهَا عَادَةً الْخَرَّاشُفُ . قُرُوبُهَا الْإِسْتِمْعَالِيَّةُ رِيشِيَّةُ .  
رُؤُوسُهَا صَغِيرَةٌ . أَعْيُنُهَا وَوُجُوهُهَا صَغِيرَةٌ لَا تَمَكَّنُهَا مِنْ  
اتِّصَاعِ الْإِدْمِ ۥ تَكْثُرُ عَلَى الْأَشْجَارِ الْمَائِيَّةِ وَعَلَى الْمُرَادِ  
الْعُضْوِيَّةِ الْخَفِيزَةِ قَرِيبَ جَرَارِيِّ الْمَاءِ . تَعْتَبَرُ مِنَ الْهَوَامِّ  
الْمُرْجِيَّةِ غَيْرِ الْفَارَسَةِ .

٣٠٠٤٤ - هَمْشِيَّة  
Dette non réglée (F).  
كُلُّ دَيْنٍ لَمْ يَدْفَعْ بِتَارِيخِ اسْتَحْقَاقِهِ .

٣٠٠٤٥ - هَمْشِيَّة صَيْفِيَّة \*  
Hemitehea aestivaria (S). Hémichée estivale (F).  
Hemitehea aestivaria (E).  
حَشَرَةٌ مِنْ فَصِيلَةِ الْأَرِيَّاتِ حَرَشِيَّاتِ الْإِجْتِمَاعِ . مَوْطِنُهَا  
بَعْضُ الْأَسْوَاقِ الْمَعْتَدَةِ الْحَرَارَةِ مِنَ الشَّرْقِ الْأَوْسَطِ وَالْأَفْرَافِ  
وَالرَّوْبَةِ . قَرَارَتُهَا جَارِسَةٌ قُوَّتُهَا رَحِيقُ الْإِزْهَارِ . سَرَقَتُهَا  
تَمِيشُ عَلَى أَوْرَاقِ الشَّجَرَاتِ ۥ أَجْسَامُهَا قَصِيرَةٌ يَطُولُ نَحْوُ  
١٠ م. يَطْبُخُ نَحْوُ ٣٠ م. رَأْسُهَا مَعْدَلُ الْجَرْمِ . عَيْنَاهَا  
نَازِلَتَانِ . زَبَانُهَا مَسْطُوحَانِ عِنْدَ الذَّكَرِ ، مَغْطِيَانِ . عِنْدَ  
الْإُنْثَى . جَوْشَنُهَا وَيَطْلُقُ إِلَى الْخَفَاةِ الْزَيْتِيَّةِ الْخَطِيئِ الْمَوَاجِ  
وَرَأْسُهَا عِنْدَ التَّغْنِيَةِ إِلَى الْخَفَاةِ الْزَيْتِيَّةِ الْأَصْفَرِ الْمَوَاجِ  
يَتَوَسَّطُهُ خَطٌ مَعْرُوضٌ مَحْطِيٌّ وَيَعْلَمُهُ عِنْدَ الذَّكَرِ ثَمْعٌ نَقْطَ  
حَتَّارِيَّةٍ صِمَاءُ الْوَرْنِ ، وَسِعَ نَقْطُ حَتَّارِيَّةٍ . عِنْدَ الْإُنْثَى ۥ  
لَهَا جَبَلٌ وَاحِدٌ فِي الْحَوْلِ . تَطْلُقُ الْقَرَارَةَ فِي حَزِيرَانٍ يَتَقَبَّضُ  
حَتَّى أَوَارِشِهَا تَمُوزُ . تَسْرَحُ فِي الْبَلِّ . تَعَاظِلُ بَعْدَ ظُهُورِهَا  
بَنَحْوِ سِتِّ أَسَابِيحٍ وَتَعْتَمِدُ الْمَكْنَ لَطْفًا صَغِيرَةً مَرْمِيَّةً عَلَى  
الصَّفَحَاتِ السَّقْلِ مِنْ نَصَالِ الْأَوْرَاقِ ۥ السَّرَقَةُ عِنْدَ بُلُوغِهَا  
الْكَمَالِ تَطُولُ نَحْوُ ٢٢ م. جَسْمُهَا شَبَّ اسْطَوَالِيَّ الشَّكْلِ ،  
مَقُوسُ الْخُمْزِ . ثَوْبُهَا إِلَى السَّمَرَةِ الْزَيْتِيَّةِ الْمَوَاجِ تَعْلَقُهَا رَقَشَةً  
فَرْدَةً وَسِعَ خَطُوطُهَا مَعْرُوضَةٌ جَزْوِيَّةُ . رَأْسُهَا إِلَى الْجَزْوَءِ ۥ  
رَوَاجِبُهَا لَبَطِيَّةُ الْوَسْطَى مَاصِيَّةٌ مَا يَجْعَلُهَا تَقْفُوسُ عَسَدِ  
الْإِنْتَقَالِ ۥ طَوَرُ الْإِكْمَالِ الَّذِي يَسْتَمُرُّ نَحْوُ ١٥ يَوْمًا  
يَتَقَفَّى تَحْتَ الْقَشُورِ وَبَيْنَ قَشُورِ الْبَحَاءِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى  
خَاوِيَّةٍ تَحْبِكُهَا السَّرَقَةُ بِأَقْلٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ .

٣٠٠٤٦ - هَمْشِيَّة \*  
Hemiteia (S).  
جَنْسُ فَطُورٍ مَجْمُوعَةٍ مِنْ فَصِيلَةِ السَّحَابِيَّاتِ . تَمِيزُ بِدَعْمَانِهَا  
الْإِلَافِيَّةِ الَّتِي تَلْبَسُ فِيهَا الْإِسْكَالُ الْمَرْدَنِيَّةُ وَالْبَرْمِيَّةُ .  
مَشِيَّتُهَا يَمِيشُ وَيَتَكَثَّرُ فِي التَّنَجِجِ النَّيَّاطِيَّةِ السَّلْمِيَّةِ .  
هَيْئَتُهَا يَجُوزُ بِمَرَارَتِهَا خُصَّةُ . تَكْنَأُهَا حَزْبِيَّةُ التَّجْمِيعِ ،  
اسْطَوَالِيَّةُ الشَّكْلِ أَوْ صَوَانِيَّةُ ۥ أَنْوَعُهَا الْمَعْرُوفَةُ ٢٣  
جَمِيعُهَا مِنْ فَطُورِ الْبِلَادِ الْحَارَةِ وَالْإِسْتَوَالِيَّةِ . أَعْرَفُهَا  
وَأَشْهَرُهَا هَمْشِيَّةُ الْبِنِ .

٣٠٠٤٧ - هَمْشِيَّة الْبِن \*  
Hemiteia vastatrix (S).  
Rouille du caféier (F).

فَطْرُ الْبِنِ \*  
فَطْرُ مَجْمُوعَةٍ يَصِيبُ أَوْرَاقَ الْبِنِ فَيُجْعِلُهَا وَيُضِلُّهَا  
التَّصْفِيرِي الْوَاجِبُ يَفُودِي الشَّجَرَةَ وَيَنْبِيءُ إِلَى حُلْمِهَا  
وَأَتَانِهَا ۥ مَظْهَرُهَا الْخَارِجِيُّ يَتَغَنَّيُ صَغِيرَةً مَسْتَدْرَةً قَطْرُهَا  
يَرَوَحُ مِنْ ١ إِلَى ١,٥ م. تَرَكَّبُ نَصَالِ الْأَوْرَاقِ عَلَى  
صَفَحَاتِهَا السَّقْلِ . تَبْدُو مَبْدَرَةً بِرَقَالَتِيَّةِ الْوَرْنِ ثُمَّ تَتَكَافَأُ  
وَتَتَلَعَّبُ بِفَشَاءِ خَلِّي الشَّكْلِ ، لَزَجُ الْمَادَّةِ ، يَسِيبُ جَوَافَ  
النَّسِيجِ وَيَسَاهُ ۥ يَكْتَفِي بِاسْتِمَالِ سَائِلِ بَوْرَدِ الْمَرْكَزِ  
مِنْ ١ إِلَى ٢ ٪ عَلَى ثَلَاثِ أَوْ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ ابْتَدَأَ مِنْ  
نَهَايَةِ تَصَلِّ الشَّوَاءِ .

٣٠٠٤٨ - هَمْشِيَّة  
Marcoscibie (F).  
الْحِمِيَّةُ مَا كَانَ قَابِلًا لِلذَّبُولِ .

٣٠٠٤٩ - هَمْشِيَّة \*  
Haminée (S).  
Haminée (F). Haminea (E).

جَنْسُ حَيَوَانَاتٍ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الرُّغْوِيَّاتِ مَدِيدَاتِ الْإِرْبَجِ  
وَفَصِيلَةِ الْغَالِيَّاتِ . أَنْوَعُهَا الْمَاعَصَرَةُ الْمَعْرُوفَةُ مَتَوَسِّطَةُ الْمَدَدِ ،  
مَنْشُورَةٌ فِي مَعْظَمِ بَحَارِ الْعَالَمِ ۥ أَصْدَانُهَا شَبَّ بَهْضِيَّةِ  
الشُّوْرُزِ ، شَافَاةٌ ، مَالَسَةٌ ، مَسَاوِيَّةُ الْأَلْوَانِ الْوَحِيدَةِ  
الْخَضَابِ . أَجْسَامُهَا ضَفَافَةٌ الْرَوَاءِ الْإِلَاحِفِ .

٣٠٠٥٠ - هَمْشِيَّة  
Hémione (F).  
هُوَ فَرَّاءُ التَّنْتِ ، نَوْعٌ مِنَ الْحِمْرِ الْوَحْشِيَّةِ وَفَصِيلَةُ الْخَلِيَّاتِ .

٣٠٠٥١ - هَمْشِيَّة  
Hémionite (F).  
هِيَ الْبَسِيجُ الشَّبَكِيُّ ، أَعْلَاهُ .

٣٠٠٥٢ - هَمْشِيَّة  
Pédoncule (F). Peduncle (E).  
هُوَ مَمْلَقُ الثَّمَرَةِ يُقَالُ لَهُ إِهَانٌ . ج. أَمْنٌ .

٣٠٠٥٣ - هَمْشِيَّة  
Sirens (F). Sirens (E).  
رَتَبَةُ حَيَوَانَاتٍ قَازِيَّةٍ مِنْ صَفِّ الصَّفْهِيَّاتِ . لَهَا ، حَتَّى  
الْآنَ ، فَصِيلَةٌ وَاحِدَةٌ تَشْمَلُ ثَلَاثَةَ أَنْوَعٍ ۥ جَمِيعُهَا مِنْ  
مَسْتَقَرَّاتِ الْخَلِيَّاتِ . أَجْسَامُهَا مَسْتَطِيلَةٌ ثَنَائِيَّةُ الْقَوَائِمِ ،  
رَبَاعِيَّةُ الْأَصَابِعِ ۥ تَمِيشُ عَلَى صَفَافِ الْمَسْتَقْعَاتِ وَبِجَارِيِّ  
الْمَاءِ . يَلَاعِبُهَا مَائِيَّةٌ ۥ قُوَّتُهَا الْبَدِيدَانِ وَالرَّوْبِيَّاتِ الصَّغِيرَةِ .

٣٠٠٥٤ - هَمْشِيَّة  
Lavande spic (F).  
هُوَ الْخَزَامِيُّ الذَّكَرِيُّ ، أَطْلَبُهَا .

٣٠٠٥٥ - هَمْشِيَّة  
Anon (F).  
هُوَ الْجَشَشُ ابْنُ الْإِتَانِ .

٣٠٠٥٦ - هَمْشِيَّة  
Moqueur (F). Mocking-bird (E).  
جَنْسُ طَيْرٍ كَانَ فِي التَّصْنِيفِ الْمَاضِي يُنْتَسِبُ إِلَى فَصِيلَةِ  
الْمُحْدَمِيَّاتِ وَهُوَ فِي التَّصْنِيفِ الْحَدِيثِ يُنْتَسِبُ إِلَى فَصِيلَةِ  
مَسْتَقَلَّةٍ تَدْعَى هَمْشِيَّاتٍ ۥ أَنْوَعُهَا الْمَعْرُوفَةُ ١٢ أَصْلَانِهَا  
الْمَنَاطِقُ الْإِسْتَوَالِيَّةُ . مَظْهَرُهَا أَفْرِيْقِيٌّ وَبَعْضُهَا أُسُورِيٌّ  
وَأَمْرِيْكِيٌّ ۥ تَمِيزُ بِطَوْلِ مَنَاقِبِهَا الْمَهْدُودَةِ وَبِاسْتِطَالَةِ  
أَذْنَائِهَا الرَّتَاجِيَّةِ الرَّيْشِ . أَجْسَامُهَا قَصِيرَةٌ تَكَادُ لَا تَلْمِشُ  
قَاعَةَ الْإِفْتِيكِ ۥ جَمِيعُهَا تَأَلَّفُ الْغَالِيَّاتِ وَالْحَرَاكِ ۥ قُوَّتُهَا  
الْمَشْرِطَاتُ أَجْسَامُهَا الْخَفِيزَةُ وَالْإِرْفَةُ وَالْبَدِيدَانِ وَالْجَرَادُ وَالنَّسَلُ  
وَالْمُحْدَمِيَّاتِ وَالْمَنَاطِكُ وَبَعْضُ الثَّوَرِ الْبَرِّيَّةِ ۥ أَشْهَرُ  
أَنْوَعُهَا الْخَبِيرُ الْآخَرُ الْخَفَافُ .

## ٣٠٠٥٧ - هَبْرَ أَحْمَرُ الْمَنَاقِر \*

*Irisor archorhynchus* (S). Moqueur à bec rouge (F).

نوع من الحبس. موطنه أراضط أفريقية. جسمه أبيض الفذ يطول نحو ٤٥ سم. ثوبه إلى الزرقوة السماء يطولها مراح يراوح من الإصفر إلى الأصفر اللامع. جناحاه وذنبه مبنجة بالأبيض. عيناه صليتان. منقاره وساقاه إلى الحرة || يألف النباتات والأشجار الكثيفة. سربه بعد من ٤ إلى ١٠ أزواج. قوته الحشرات والديدان والكمل الحبس || يدين شته في مجاويف الأشجار. انشاء تحفن ٨ بيضات نحو ١٦ يوماً.

## ٣٠٠٥٨ - هَبْرَيات \*

Mimidae (S).

Mimidae (F). Mimidae (E).

فصيلة طير من لافقات التمل ورتبة الجواثم. أجناسها وأنواعها المعروفة عديدة. معظمها من طيور القنطرة الأمريكية وبعضها أفريقي وأسيوي || القسم الذي يتوطن أمريكا الجنوبية أبد في مناطقه. أما القسم الذي يتوطن أمريكا الشمالية فانه من القنطرة التي تجوب البراري في طلب الحبوب والفتى || أشهر أجناسها الحبس.

## ٣٠٠٥٩ - هَبْرُوع \*

نوع من الطرثوث يؤكل.

## ٣٠٠٦٠ - هَبْرُون \*

هو الجبل الشائع، الطله.

## ٣٠٠٦١ - هَبْرُجُل \*

Siren (F). Siren (E).

جنس حيوانات قازية من فصيلة الهنجلية. أنواعها المعروفة ثلاثة. موطنها بعض مناطق أمريكا الشمالية وكندا. تألف غشاف مجاري المياه العذبة. تعيش معظم حياتها في الماء || أجناسها شبه قريشية الشكل تطول من ٣٥ إلى ٧٥ سم. رؤوسها قصيرة. أسنانية. أعطاشها مستعرة الاشداء. عينها شديدة الصغر. أعناقها مجهر بأطراف مجمدة وبشرة. وهي مجهر أيضاً بقاعين فقط. قاعها صغرتان، أماما الارتكاز || قوتها الديدان والديدان الصغيرة.

## ٣٠٠٦٢ - هَبْرُجِلِيَّات \*

Sirenidae (S).

Sirenidae (F). Sirenidae (E).

فصيلة حيوانات قازية من رتبة الهنجل. كانت، قبل التصنيف الأخير الذي يعود إلى ١٩٩٥، تنتمي إلى رتبة السرفجيات. أما الآن فهي الفصيلة الوحيدة التابعة إلى رتبة الهنجل || أنواعها المعروفة ثلاثة موطنها بعض مناطق أمريكا الشمالية وكندا.

## ٣٠٠٦٣ - هَبْرَدَا \*

*Tricyrtis* (S).

*Tricyrtis* (F). *Tricyrtis* (E).

جنس نباتات جلدومرية جاذبة مسرة من فصيلة الزنبقيات. أنواعها المعروفة سبعة مهددا بالانقراض || سوقها غمراوية مرققة. أوراقها حافضة متعانية سائبة النصل. أزهارها طرفية يضاء اللون أو مرققة بالبنفسجي || تزورع للزئيرين ولا تخفى البرد. ترطب في الإترية المعتدلة الاندماج || المتساوية التركيب المنصري، الننية بالمواد الضوئية والأزوت || أشهر أنواعها الهنداء الشائكة والمزينة والمستطيلة الزنيد.

## ٣٠٠٦٤ - هَبْرَدَا شَائِكَة \*

*Tricyrtis hirta* (S).

*Tricyrtis hirta* (F).

نوع من الهنداء. مهددا باليابان. ساقها منتصبه كثيفة

المحب البقيق الشائك، ترتفع من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقها حافضة متعانية تطول من ١٥ إلى ١٥ سم. نصلها سائبة، ذرية، مرققة الصفحات العليا. أزهارها يضاء سائبة مرققة بالبنفسجي، قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها ديمي أو غريفي.

## ٣٠٠٦٥ - هَبْرَدَا مَرْجَبَة \*

*Tricyrtis pilosa* (S).

*Tricyrtis velut* (F).

نوع من الهنداء. منبها الهند. ساقها خلية السماء، قليلة الفروع، ترتفع من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقها حافضة متعانية، خلية النصال السائبة الشكل || أزهارها إلى الأبيض الناجي، قطرها نحو ٢٥ سم. تنويرها يستمر طوال شهر أيار.

## ٣٠٠٦٦ - هَبْرَدَا مُسْتَطِيلَة الزنيد \*

*Tricyrtis macropoda* (S).

*Tricyrtis à long pédicelle* (F).

نوع من الهنداء. منبها الصين. ساقها قليلة الخمل والزرغب ترتفع من ٥٥ إلى ١٠٠ سم. أوراقها متعانية معتقة؛ نصلها المثلج مائلة تطول من ١٥ إلى ٢٠ سم. || أزهارها مستطيلة الزنيد، قطرها نحو ٣ سم. لونها إلى النياس الناجي يطول تمسح برتقالي ينصرف نيا بعد إلى الأصفر || تنويرها ديمي.

## ٣٠٠٦٧ - هَبْرَدَا \* طَرَحْخُون \*

*Taraxacum dens leontis*, *T. officinalis*, *T. vulgare*, *Leonodon taraxacum* (S). Pissenlit officinal, P. commun, Dent-dellon (F). Dandelion, Blow-ball, Canker-wort (E). Echte Kuhlmann, Löwenzahn (D). Tarasacco, Tarasacco, Dente di leona (I).

نبات عشبي بري مسمر من فصيلة المركبات. ينبت في جميع الأراضي المزروعة ويكثر من النباتات الكاسية الضاربة. جلده غليظة أسنانية. أوراقه قرصية الانتشاب ضمية. أزهاره وريسية الجميع. أوراقه الفتية مأكولة عديدة المنافع الصحية || ضروبه الزراعية البقلة المشهورة نحو ٨. يتكاثر بالبذور. تبرز شتلاته من أوائل الربيع إلى أواسط الصيف. تدرس الشتول في مستقرا على أبعاد ٥٠ إلى ٤٠ سم.

## ٣٠٠٦٨ - هَبْرَدَا \* هَبْرَدَا \*

*Chichorium endivia* (S). *Chicorée endive*, *Endive* (F). *Endive*, *Batavian endive* (E). *Endive*, *Endivien*, *Endivienwegwarte* (D). *Endivia*, *Cicoria degli ord* (I). نبات يقل من فصيلة المركبات السبوية. أصرامه عديدة تجتمع إلى ضربين الهنداء الجمدة والهنداء الخسنة. جلده غليظة سزائية الشكل. أوراقه قرصية الانتشاب. أزهاره إلى الزرقوة البنجرولية.

## ٣٠٠٦٩ - هَبْرَدَا بَرَقَة \* هَبْرَدَا مَرْجَة \*

شيكوريه

*Chichorium Intybus* (S). *Chicorée sauvage*, *Ch. amère* (F). *Succory*, *Wild chicory* (E). *Zichorienwegwarte*, *Zichorienwurz* (D). *Cicoria*, *C. amara*, *C. da toglio*, *Radichio* (I).

نوع من الهنداء وهو نبات يقل بري وزراعي. ضروبه المشهورة عديدة فأوراقها المميزه شكلية، خواصها الصحية والطبية واحدة، جميعها تلغى نتي التمد. جلدها سزائية مستطيلة. سوقها غراما تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقها



هَبْرَ أَحْمَرُ الْمَنَاقِر



هنداء شائكة



هندب



هندباء



هندباء برقة

30081 - هَنْدَسَة رِيْعِيَّة  
Génie rural (F). Rural engineering (E).  
علم يتناول التشييد الزراعي على اختلاف أنواعه من الإبنية إلى الآفنية .

30082 - هَنْدَسَة زَرْاعِيَّة  
Génie agricole (F). Agricultural engineering (E).  
علم يتناول التربة والنبات والحيوان والإستثمار .

30083 - هَنْدَسَة سَطْحِيَّة  
Géométrie plane (F). Plane geometry (E).  
علم يبحث في السطوح ذات البعدين ويشمل دراسة خصائص الخطوط والزوايا والأشكال من مثلثات ومربعات ودوائر .

30084 - هَنْدَسَة قَرَاعِيَّة  
Géométrie dans l'espace (F). Geometry of space (E).  
علم يبحث في الأشكال ذات الأبعاد الثلاثة أي الأجسام كالكرة والمكعب والمُهرم .

30085 - هَنْدَسَة كَهْرَبَالِيَّة  
Génie électrique (F). Electric engineering (E).  
علم يتناول إنتاج طاقة الكهرباء واستثمارها .

30086 - هَنْدَسَة مِعْيَارِيَّة ، هَنْدَسَة مَدَنِيَّة  
Génie civil (F). Engineering (E).  
علم يتناول البناء بأشمل معانيه .

30087 - هَنْدَسَة مِيكَانِيكِيَّة ، هَنْدَسَة آلِيَّة  
Génie mécanique (F). Mechanic engineering (E).  
علم يتناول الميكانيكا وما ينشئ منه من آلات .

30088 - هَنْدُسُ  
Connaissance (F).  
Counoisssseur (E).  
الهندس من كان علمه أو اختصاصه يمكنه من تحليل ومعرفة الشيء المطلوب . ج هندسة .

30089 - هَنْعَة  
الهنعة منزل من منازل القصر الشامية وهي مجموعة من خمسة كوابك يقال لأحدها الرز والثاني الميسان . وفي تشبه بشكلها الألف الكوفي في رقيب الهنعة يدعى النام .

30090 - هَنْيَك \*  
Volvula (S).  
Volvule (F). Volvula (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربيل وفصيلة الباليغات . أنواعه المعاصرة المرفوقة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة في اصداقها شبه اسطوانية الشكل ، صغرية القذ ، وصيدة الألوان السوية . فوهاتنا مسطيلة الفلوج انقباضية .

30091 - هَيْكَلَة المَرْجُوع \*  
Paroplia scamica (S).  
Paroplie des prairies (F).  
حشرة من فصيلة اليزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها شديد الصغر يظل من ٣ إلى ٤ سم ، || فورها سنطي اللون تملوه رقيقة سوداء تمتد من الرأس إلى أواسط الظهران . رأسها عريض . خطمها ممتد الطول . عينها صغيرتان . زباناها شديدة الصغر والذقة . كوسلها يلحف القسم الاكبر من الرأس . سمعتها بحمرة . ظهرانها كابل

مسطيلة مفرقة . انزاعها إلى الزرقعة الزاهية || زراعها تستوجب بعض العناية اخصها الطمر بالثقل أو بالمواد الدبالية للحصول على أوراق عادمة الخصب .

30090 - هَنْدَبَاء جَعْدَكَة  
Chlorée frisée (F).  
ضرب من الهندباء الزراعية المأكولة . أوراقها قرصية لينة مجمدة النمل الكثير التشرثم والتسنين .

30091 - هَنْدَبَاء حَسِيَّة  
Escarole, Scarole, Scarole (F). Endive (E).  
ضرب من الهندباء الزراعية المأكولة . أوراقها فائضة مستعرضة متراكبة . نصلها متصم الصفحة ، مفرس الحنار .

30092 - هَنْدَبَاء زَرْقَاء  
هي الطليسة ، اطليا .

30093 - هَنْدَبَاء وَتْلُوف  
Witloof, Chlorée de Bruxelles (F). Witloof (E).  
نوع من الهندباء الزراعية تتميز بجنودها الحرجلية الشكل والقد وبأوراقها الضمية المنتصبة . راجع وتلوف .

30094 - هَنْدَرْسُونِيَّة  
Hendersonia (S).  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنبيات . أنواعها قليلة لا مؤذية . وبناها سمره اللون تحضن الثغبات البكتيرية التي تخترقها فتقرب الحق . وبناها أهليجية الشكل ، عديدة الخلايا سنطية اللون .

30095 - هَنْدَرْسُونِيَّة  
Hendersonia (S).  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنبيات . أنواعه المرفوقة زهاء ٢٠٠ معطها يبي عديم الاذي أو قليله || يكتندبها كروية الشكل أو مفلطحة ، محصورة الارتكاز أو شارفة . جرها لمبي النسيج اسمر الصفعة الخاضية . وبناها وشعبة ، مؤثرة ، سنطية اللون || أشهر أنواعها ما يتبع .

30096 - هَنْدَرْسُونِيَّة إِبْرِيَّة  
Hendersonia acicola (S).  
فطر مجهرى من الهندوسونية يركب أوراق الاجاص فيوشها برقشة سنطية لا نظامية الشكل والحجم والترتيب تنس إلى النصل اذا أنمتها العوامل الطبيعية وتسبب الاصابات الباكور .

30097 - هَنْدَرْسُونِيَّة إِبْجَاسِيَّة  
Hendersonia piricola (S).  
فطر مجهرى من الهندوسونية يركب أوراق الاجاص والسفرجل والتفاح فيوشها برقشة مزوانية الشكل سمره اللون تسبب تعميم نسيج النصل والاصبال الباكور .

30098 - هَنْدَرْسُونِيَّة وَرْدِيَّة  
Hendersonia canina (S).  
فطر مجهرى من الهندوسونية يصيب اخضات الورد وثمار . منظوره الخاضعي يقع صغيرة مزوانية مبشرة سوداء اللون تملو الاضغان والبآر دون ان تقع بها شديد الاذى .

30099 - هَنْدَسَة الْكَيْتْرُونِيكِيَّة  
Génie électronique (F). Electronic engineering (E).  
علم يتناول الكترولونيك وتجهيزاته .

30090 - هَنْدَسَة عَنَلِيَّة  
Géométrie analytique (F). Analytic geometry (E).  
علم يبحث في تطبيق القواعد الجبرية على الهندسة .



هَنْك



هَرَاك

٣٠٠٩٨ - هَوَاكِي ، اَيُرُوِيَّ Aerobique (F).  
Aerobic (E).  
نمت تعريف يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي لا تستطيع الحياة والتكاثر بعيداً عن الهواء.

٣٠٠٩٩ - هَوَاكِي الْجَدُر Exorhize  
نمت تعريف يطلق على كل نبات ينشعب جذبه في الهواء اي خارج التربة.

٣٠١٠٠ - هَوَاكِيَّة ، اَيُرُوِيَّة Aérobie (F).  
Aerobe (E).  
صفة للكائنات المجهرية الحية التي لا تستطيع النيش متقطعة عن الهواء.

٣٠١٠١ - هَوَاكِيَّة Pulsatilla (F).  
هي شقيق النهناء ، اطلبه .

٣٠١٠٢ - هَوَبَر \* ، هَوَبَر Rhinopithecus (S).  
Rhinopithecus (F).  
جنس قرد من فصيلة المبراريات . انواعه قليلة العدد ، موطنها بلاد التبت . تعيش في الاجراج الجبلية التي ينمرها الثلج نحو ازمة اشهر || اجسامها متوسطة الحجم تطول من ٦٥ الى ٧٥ سم . ويبدو الى الخضار الاصفر . مناعيتها رقيقة الازنية . اذنها طويلة الشعر المرمزي الشكل والقد ، لونه الى الوردية الصنائية ، اكبه القاعدة اصفر الطرف يعلو موانع فضي . اذنانها جللة تطول نحو ١٠٠ سم . || تعيش جماعات كبيرة يراوح عددها من ٦٠ الى ١٠٠ قوتها التبار والاشجاب والجور والبرام والتواهي . اناها تقص جرواً واحداً ترضعه نحو ٦ شهور.



هو بر

٣٠١٠٣ - هَوْتَة الارض المنخفضة .

٣٠١٠٤ - هَوْتَشْتَرَا Hutchinsia (S).

Hutchinsia (F).  
نبات معقود التحريف على اسم العائلة الايرلندية السيدة هوتشتر . عشية صغيرة معمرة من فصيلة الصليبيات . اطلها تشمل بعض اقالم البحر الايضر المتوسط || ساقها فراء قصيرة ، تملو نحو ١٠ سم . اوراقها متعاقبة مركبة ، وثرية البد ، خاسية او سباعية او تساعية الورديات السنانية الصغيرة . ازهارها متفردية التجميع . ازهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى آب .

٣٠١٠٥ - هَوْتِين Hotinus (S).

Hotine (F). Hotinus (E).  
جنس حشرات وائمة من نصفيات الاجنحة المتجانسة وفصيلة البرانيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اطلها تحت من الحد الى الصين . تألف النباتات والحيات قوماً وحيد الازهار || اجسامها متوسطة القد تطول من ٣٦ الى ٣٦ سم . رؤوسها صغيرة . عيونها صغيرة ناضرة . قربها الاستشمارية دقيقة ، شديدة الصغر ، سفلية الانتساب ، مركزها تحت العين . جباهها ناتئة تمتد كالقرون المتسلطة الشفافة . اذنها متباينة الالوان تكثر فيها السمرة الصنائية الموانج . رواشها لاحقة مبقجة بالاخضر والاصفر .



هوجل

٣٠١٠٦ - هَوَجَل \* Hugonia (S).

Hugone, Hugonie (F). Hugonia (E).  
جنية طيبة برية معمرة من فصيلة الكتيانيات . مهدا

الحنحية ، لاحت ، حنطي اللون ، اسمر المروق . ووشها غشائيان ، شفافتان . بطنها الى الحنطي ، يسمر في الصفحة السفلى ويصفر في العليا . قوتها حنطية سمراء مسرعا المروج والمراعي . قوتها التسع .

٣٠٠٩٢ - هَبْكَ \* ، هَوَاكِي Hentiochus (S).  
Héntioque, Cocher (F). Whip-fish (E).

جنس اسماك بحرية من شالكات الزعانف وفصيلة السحليات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة || اجسامها مبططة ، رقيقة الظهور ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . بطنها دالة المتغير . زعانفها الظهرية تنتهي برق غشوي المادة يشبه سوط الحوزي . اذنها الى الربعة الخضراء او الربعة الفضية يعلوها تجميع متعرج اسود || حولها ما كوكلة ، متوسطة الصنف .

٣٠٠٩٣ - هَوَاك Air  
هو ما يستنشق كل حي لحياته . وهو مادة غازية مركبة تلتفط سطح الكرة الارضية فتكون السكالك او السحاب ، وتقل كتانتها كلما ارتفعت عن سطح البحر . ومن المسلم به ان نصف مجموع الهواء الارضي يقع في المنطقة الكائنة بين مستوى سطح البحر او مرسى المنوع وارتفاع ٦٠٠٠ م . اما العناصر التي يتكون منها الهواء ونسبها فهي :  
ازوت نحو ٧٨ جزراً  
اكسجين نحو ٢١ جزراً

ثم النيز من الايون غازات الكربون والازوت والنيون والكريبتون والهليوم ، البغ . وهو يحتوي ايضاً على بخار مائي يعرف بالرطوبة النسبية .

٣٠٠٩٤ - هَوَاك Sylviladés (F).  
في اللغليات ، اطلها .

٣٠٠٩٥ - هَوَاك Saprophage (F).  
Saprophagous (E).  
اخشرات المواكة هي التي تعيش على المواد النباتية للخلعة .

٣٠٠٩٦ - هَوَاك \* Calorampus fuliginosus (S).  
Caloramphie fuligineux (F).

مائل من المتسلقات وفصيلة البقائيات . موطنه بعض اصقاع الهند والبلاد المجاورة . يألف الاذغال والخراج اليميرة الاشجار ولا يستقر في مكان اكثر من خمس دقائق . ملجته الحياتي جماعي ، فوجيه قليل العدد لا يتجاوز خمسة ازواج || جسمه ممتدل القد يطول نحو ٢٥ سم . رأسه كبير الحجم . منقاده شبه مخروطي الشكل ، كبير الحجم ، ارتفاعه عند القاعدة يفرق مرضه . جناحاه صغيران ، ذلفان . ذنبه ممتدل الطول ضيق الترس ، مقطوع الطرف . ثوبه الى السمرة السجانية المتغايرة الماحجات . منقاده وقامتساء الى السمرة الزرقية || صوته مزيج طنان . قوته الحشرات على اختلاف فصائلها وانواعها والثمار النسيبة البرية || يدن حبه في غنائف الاشجار ، الاثني تحفن رسدها من ٣ الى ٤ بيضات بينا الذكر يلين لها الغذاء .

٣٠٠٩٧ - هَوَاكِي Aérhydrique (F).

نمت تعريف يطلق على ما يتفطل بالهواء والماء او يسمل بالهواء والماء .

المنه . جلودها ولحاء ساقها وفاندها مرقمة وقدر البول .  
ساقها فراء تملو نحو ثلاثة امتار . انفاها فردية او  
ثنائية الحوائق . اوراقها متناحية ، متنفدة . نساها اهلالية  
الشكل ، سنانية الاطراف . ازهارها عذقي التجميع ،  
عمودي الانكناز وطرفي . ازهارها صفيرة اللحم خاسية  
البتلات ، وردية اللون . ثمارها سوقية تلحم صبة  
صفيرة عذدة السطح . ازهارها وجلودها عطرية العرف  
المستحب الشبيه بالبنفسج .



هود البطباط

٣٠١١١ - هَوْدَانِيَا \*  
Phaeostilbaceae  
عارة بطوط مجهرية من فصيلة الكحبيات . تتميز بأعضائها  
المروائية العابسة الالوان . تشمل عدة انواع تنتمي الى  
ثلاثة اجناس : الازاروبسيس والسيزانوس والشفقة .

٣٠١١٢ - هَوْدَه \*  
Ranella (S).  
Ranella (F). Ranella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الاربل  
وفصيلة اليوسويات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة  
منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة اخصها المحيط الهندي  
اصنافها شبه اهلالية الشكل محاذية يطولها جذبان  
جانبيان محددان او حاسنان او شاككان يكتنفانها من  
طرف الفتحة الى العقب .

٣٠١١٣ - هَوْدَكَة \*  
Stigmatopelia (F).

طائر من فصيلة الحاميات قريب الشبه بالرفقة . مهدد  
المناطق الحارة من العالم القديم يجرى في طلب المرتع  
والصيد والتمشق . جسمه متوسط القد ، يطول نحو  
٢٧ سم . ثوبه الى الطحلة الصنائية المورق تسر في الرأس  
والظهر والجناح والذنب ، وتغير في الخمر والعنق والصدر  
والبلع والافتيك . متفاد حنلي اللون . رجلاه الى السرة .  
يدن عته في الاشجار المتوسطة الارتفاع . حفضته بيضتان .  
الانثى تقوم بالترميم اما الذكر فيقوم لها القوت .

٣٠١١٤ - هَوْدَكَة \*  
Surnia funerea (S).

Surnia, Chouette-épervier (F).  
طائر من البويات وعامة الفناديات . ثوبه الى البياض  
الاكعب يملو تسليج اسمر يطوق العين والاذن . رأسه  
عادم القترعة مستعرض وقصير . بحره لاطى . القرس .  
منه قوي البهرة . سقطه كبير القد منفرج الزاوية .  
ذنبه منفذ الريش ، مستطيل . اسراعه ومخالبه قصيرة كاسية .  
موطنه فسح الارباة يشمل معظم المناطق المعتدلة . يألف  
اسراج الصنوبر واللوز . يسرح في النهار وفي الليل يستريح  
من الساعة المباشرة الى الرابعة من بعد الظهر ومن العاشرة  
ليلا الى الثالثة بعد نصف الليل . . يدن عته في تجاريف  
الاشجار وفتحات الصنوبر . الانثى تضع من ٤ الى ٨  
بيضات تحضنها بمناوبة الذكر . . قوته الجرد والنفار  
والحشرات عل اختلافها . ج هود .

٣٠١١٥ - هَوْدَل \*  
Monstruosité (F).

Monstrosity (E).  
الابتعاد المشبه عن الشكل المألوف ان في الحيوان  
او في النبات .

٣٠١١٧ - هَوْر \*  
Etang naturel (F).

Natural pond, N. pool (E).  
بحيرة صغيرة تفيض بها مياه غياض وأجام فتقع .  
ج اهور .

٣٠١١٨ - هَوْرِيَا \*  
Haworthia (S).

Haworthia (F). Haworthia (E).  
جنس نباتات لحمية مرقمة معمرة من فصيلة الزنبقيات .

٣٠١١٧ - هَوْد البَطْبَاط \*  
Heodes phlaeas (S).  
Cuivré de l'oselle (F). Heodes phlaeas (E).

حشرة من فصيلة القنقيات ورتبة حشرقيات الاجنحة .  
مولها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشها جارية  
قوتها رقيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق البطباط  
والخبيض . جسمها صغير القد يطول نحو ١١ م .  
سبطها نحو ٢٨ م . رأسها صغير الجرم . عينها ناشزتان .  
زبانها ابيض صولجاني اللون . جوشها حنلي اللون كسني  
المراج سبطها كسني اللون . روشنها الامانيان الى الصبهة  
المعنية يملوها سبع نقط كسنية وسنار خارجي من اللون  
نفسه . روشنها الخلفيان الى السرة الكسنية الفراء المورق  
يطولها قرب الطرف الخارجي جدة مذبذبة الاطراف لونها  
الى الصبهة المذقية . لها جيلان في الحول . تظهر فراشة  
الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب .  
تسرح في النهار . تعاطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع  
وتتمح الممكن ميحادي على نصال اوراق المائل . السرة عته  
بولها الكمال تطول نحو ١٥ م . جسمها اهلالي الشكل ،  
الحسد الظاهر . كيف الحمل القصير . ثوبا الى الخضار  
الاسمر يملو عطف قاطب اسمر وقسمة اطواق كسكية جزوية  
اللون . رأسها ارجواني اللون . منها ورواجها الى الطحلة  
السمراء . طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول  
نحو ثلاثة اسابيع ، يستمر في الجيل الثاني نحو ٢٢ اسبوعا .

٣٠١١٨ - هَوْد الحَمَاض \*  
Heodes virgaurea (S).

فراشة من فصيلة القنقيات . طولها نحو ٣٣ م . ذكرها  
اسمر الجسم غليظ الصدر مستنق البطن . رواشته الى الصفرة  
الخمر المراج يطوقها حمار اسمر ويطولها تنقيط لا قياسي  
الحجم والبيضة . انفاها حمر الجسم خفيفة الصدر والبطن  
وراشها الى الصفرة الخفيفة يطوقها حمار اكعب ويطولها  
تنقيط اسمر واسود . يألف المناطق والمراعي . يسرح  
من حزيران الى آب . يرقته خاضعة تركيب اوراق الحمض .

٣٠١١٩ - هَوْد المتنايع \*  
Heodes chryseis (S).

فراشة من فصيلة القنقيات . طولها نحو ٣٢ م . ذكرها  
اصهب اللب يملو مواج مذهب . رواشته الى الحمرة  
الصنانية يملوها تنقيط اسمر وتمشج ازرق . حشارها حاب  
اللون . ابيض الطرف . انفاها حمر الجسم . حنطية الراشن  
للونجة بالاصفر والاخر يملوها تنقيط اسود ويطولها  
حمار اسمر . يألف المناطق والمواقع الرطبة . يسرح من  
حزيران الى تموز . يرقته تركيب اوراق معظم النباتات  
اللمعية .

٣٠١١٠ - هَوْد الوَرَاك \*  
Heodes doritis (S).

فراشة من فصيلة القنقيات . جسمها منحرفي الشكل اسمر  
اللون يطول نحو ٣٥ م . ذكرها كسني الراشن المنقطة  
بالاسود . انفاها خضمة الشكل ، وراشها الى الصبهة الخضراء



هود الحامض



هود المتنايع



هودعة



هودلة



هودة

مهدا بعض مناطق افريقية الجنوبية . سوطها متدسلة لا إثر لها . اوراقها صغيرة الجرم ، لحمة النصل . ازهارها بيضاء اللون || تزود الثريتين ضمن البيوت . ترطب في الاثربة المعتدلة الاندماج ، الوافرة الخصب ، الثنية بالمواد الغذائية العضوية وللمعدنية || انواعها عديدة اشهرها التالية :

#### ٣٠١١٩ - هَوْرِيَا جَامِيْدَة (S). *Haworthia rigida* (S). *Haworthia rigida* (F).

نوع من الهورثيا . اوراقها مشقعة ، خاصة الصفوف ، عمودية الارتكاز ، تطول من ٧ الى ١٢ سم . نصلها شديدة الصلابة ، بحرية الخضار ، يطولها موج اسمر . ازهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

#### ٣٠١٢٠ - هَوْرِيَا سَوْدَاء (S). *Haworthia atrovirens* (S). *Haworthia noirâtre* (F).

نوع من الهورثيا . اوراقها متتسبة ، شيقة النصل ، غزوية الشكل ، تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٨ الى ١٠ سم . نصلها مثالة ، منشارية الحفاف ، لونها الى الخضار الالامس الشديد السرة . ازهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

#### ٣٠١٢١ - هَوْرِيَا لَوْرَجَة (S). *Haworthia viscosa* (S). *Haworthia visqueuse* (F).

نوع من الهورثيا . اوراقها مشقعة ، ثلاثية الصفوف النظامية الترتيب ، عمودية الارتكاز ، تطول من ١٠ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٢٠ الى ٣٥ سم . عتصتها شائكة . عصارة نصلها لزجة . ازهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

#### ٣٠١٢٢ - هَوْرِيَا مَزْرَدَة (S). *Haworthia fasciata* (S). *Haworthia zébrée* (F).

نوع من الهورثيا . اوراقها مشقعة افقية الارتكاز ، تطول من ٣ الى ٤ سم . وتعرض من ١٥ الى ٢٠ سم . نصلها مائل الصفحة العليا ، لؤلؤي الخطوط المتعرجة النظامية الشكل والترتيب ، غشن الصفحة السفلى . ازهارها بيضاء اللون ، تبينة الموج || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

#### ٣٠١٢٣ - هَوْرِيَا مَشْبَكَة (S). *Haworthia reticulata* (S). *Haworthia réticulée* (F).

نوع من الهورثيا . اوراقها مشقعة ، افقية الارتكاز ، مقطعية الرؤوس ، تطول نحو ٢٥ سم . وتعرض نحو ٧ سم . نصلها محدودة الصفحات العليا ، محددة السفل . لونها الى الخضار الزاهي تملو خطوط متشابكة سمراء اللون . ازهارها تبينة اللون يطولها موج اخضر || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

#### ٣٠١٢٤ - هَوْرُس (S). *Rhacophorus* (S). *Rhacophore* (F). *Rhacophorus* (E).

جنس حيوانات قازبة شاجرة من الضفادع وفضيلة الهورمبات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ اعطائها تمتد من الهند الى الصين واليابان وجزيرة مدغشقر || اجسامها متبانية اللد يكثر فيها لحم الوسط . احوالها تمانح البيئة التي تعيش فيها . اصابع قوائمها مقبدة بحطب رجة تمتد

حتى الاطراف المهزبة بلطب محببة تمكثها من تسلق السطح المائلة ومن التفرز شلجياً من شجرة الى شجرة .

#### ٣٠١٢٥ - هَوْرَسِيَا (S). *Rhacophoridae* (S). *Rhacophoridae* (F). *Rhacophoridae* (E).

فصيلة حيوانات دوداء قازبة شاجرة من لمة الحديديات ومرببة السوريات ورببة البترارات . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٨٠ مهدا البلاد الاسيوية والافريقية ومدغشقر . جميعها من الضفادع المعتدلة اللحم || اجسامها متوسطة اللد ، احوالها مختلفة الالوان يكثر فيها الاخضر . تتميز بمائة البنية التي تموش فيها وتتميز ايضا بمسامة سطح غشلي قوسها الصدري في مركز قناتها ، ومجمل قنرة المعز من التتواتر المنظمة الجانبية . فكرها العليا مسنة . اصابع قوائمها مقبدة بحطب متبانية الرحابة والاستداد . اطراف اصابعها مزجزة بلطب محببة تمكثها من تسلق السطح المائلة || تعيش معظم حياتها على الاشجار وتختلف النباتات || اناتها تسرا في تخاضن خاصة تغلفها بموازرة الذكور على شفاف المنافع والقدان فوق مستوى الماء ينمو ١٠ سم . ثم تحلق نفقا ثانيا متحدرا من المحضن الى سطح الماء . الاناث عند التفرقة تفرق اولاً مادة رغويرة قوارة تمقبا شلة الدليل المؤلفة من ٤ الى ٦٠ ديلة . ويبقى الدليل ضمن هذه الرغويرة التي تون له الرطوبة حتى التفت فيزلق اذ ذاك على سطح المنحدر وينفوس في الماء .

#### ٣٠١٢٦ - هَوْرَسَة (S). *Aphomia sociella* (S). *Aphomia sociale* (R).

فراثة من فصيلة الناريات ورببة حرشيات الاجنحة . الاثى اكبر قدماً من الذكر . يسلط نحو ٣٥ سم . وبسطة الذكر ٢٦ سم . جميعها الى البيضاء الخطي الموج . روضها الاماميان الى التربة الشباه في اقزائين الاولين ثم الى الطحلة الخضراء تضرها خطوط سمر ونقط سمر تتاحم الاصاب . روضها الحفاليين الى البياض الاخير . اهداب روضتها نصية ترتكز على جده سوداء قليلة المرض || يربها الى الطحلة الصفراء تملوها لمل سمر . رأسها جزوي اللون || تعيش في عشاء بعض الحشرات من غشائيات الاجنحة وقد تدخل المنازل والمكاتب ويستودعات الورق فتقرض الورق والكاتب والفلين ...

#### ٣٠١٢٧ - هَوْرَة ، لَاهِر (F). *Falae* (F). *Cill* (E).

جنور مجدلي سلف من انظام امواج البحر . ج هوراع ولواجر .

#### ٣٠١٢٨ - هَوْرَن (F). *Huron* (F).

حيوان لاحم مفترس يدعى فروزون ، اطليه .

#### ٣٠١٢٩ - هَوْرَة (S). *Hura* (S).

*Hura*, *Sablier* (F). *Sandbox*, *Possumwood* (E). *Sandbückenbaum* (D). *Sablier blanc* (I).

جنس اشجار برية وخرجية من فصيلة القيربونييات . انواعها المعروفة ٥ ، اعطائها البلاد الاستوائية والحارة . اوراقها متتقة متتابة نغيفة . نصلها قليلة الشكل ، مدبية القصبة . ثمارها مجموعة من القصوص الثنائية التلغة تحضن زورراً لياها بجالي المادة الفعالة . والثار عنه انقلحق بعد الادراك التام تحدث دورياً يليه دورى الانجفار . يستخرج من عصارة سوطها ومن لباب ثمارها مادة قلووية جعالية شديدة التلشط .



هور



هور

٣٠١٣٦ - هُوَشِيرَا مُدَمِّيَّة

*Heuchera sanguinea* (S). *Heuchère sanguine* (F). *Corai bells*, *Crimson bells* (E). *Alranwurz*, *Rote Alunwurz*, *Purpurglockchen* (D). *Eucera sanguinea* (I).

نوع من الهوشيرا ، شامريتها تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اورانها مدورة خماسية او سباعية الفصوص المسننة الملهدية. نصلها مائل البشرة على صفحتيه. ازهارها متعدودة التجميع ، لونها الالحمرة الدامية || تنورها يستمر من ايار الى تموز .

٣٠١٣٧ - هُوَشِيرِيَّة  
*Hovenia dulcis* (S). *Hovénie*, *Hovène sucré* (F). *Japanese raisin tree*, *Ground squirrel*, *Gopher* (E). *Hovanie*, *Zieseln* (I). *Ovenia* (I).

نبات وحيد الجنس والنوع من فصيلة البنيات . مهد الشرق الاقصى من اليابان الى الصين . شجرته تملو حتى ٢٠ م. اورانها مسننة متعاقبة عابدة ؛ نصلها قلبي الشكل يطول نحو ١٦ سم. ويمرض نحو ٩٩ صفحت مائلة البشرة ، مسننة الحافة . ازهارها خشوية التركيب ، صغيرة القند ، ريجلاتها وقناياتها لبابية المادة ، حمراء اللون ، مأكولة ، سكرية المذاق ، طعمها كالزبيب . ويستخرج منها ومن الاوراق عطر مرغوب فيه شائع الاستعمال || تنورها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠١٣٨ - هَوَقَل  
*Spermophilus* (S). *Spermophile* (F).

جنس حيوانات لينة قاعسة من فصيلة السنجابيات. انواعه نحو ٦٠، منها ١٥ موطنها العالم القديم و٥٥ موطنها امريكا الوسطى والجنوبية . جميعها صغيرة القند طولا يراوح بين ٢٥ و ٣٥ سم. واذنانها من ٦ الى ٨ سم. || اجسامها مستديرة رشقة . رؤوسها اسطوانية الشكل . عيونها كبيرة . اذانها مستديرة . جرائزها الامامية رباعية الاصابع اما الخلفية فخاصيس . اذانها تقصر جيليات الصفوف . انواطها موية اللون رؤوسها واطراف جرائزها الى الجفوة الصنانية . ظهورها الى الريدة . بطونها الى الصفار النبي . وفي بعض الانواع الامريكية الذوب غططة بينها مؤذرة . تأثف الادغال والحقول المزروعة . تنقلق الانجرار بخفة ، لكنها تقضي حياتها على الخفيض . جحورها سحيرات فسيحة مستديرة عديدة الاتفاق تتركزها في الحوم على اعماق تراوح من ١٥٠ و ٢٠٠ سم. قوتها البزور والحطب والجنادر والفار والوزغ والطير . اناتها تنقع من ٣ الى ٦ ادماس تبصر وتكتسب بعد اسبوع .

٣٠١٣٩ - هَوَلَان  
*Semnopithèque* (F). نوع من القردو المندسة يدعى هبار ، اطلبه .

٣٠١٤٠ - هَوَلِيَّات  
*Sphingidae* (F). هي فصيلة الصليليات من سرشفيات الاجنحة .

٣٠١٤١ - هَوَلِيَّة  
*Protoparce* (S). *Protoparce*, *Sphinx d'Amérique* (F). *Horn worms*, *Horn blowers* (E).

جنس حشرات من فصيلة الصليليات او الحوريات . انواعه المعروفة خمسة . جميعها فراشات كبيرة اشد لا يقل طولا عن ٦ سم . ويسطها تراوح من ١٠ الى ١٢ سم. انواطها مسننة عابطة الموج يطولها تجميع وتقيح اسمر . وازهارها الامامية وأخلفية مزعقة وزرقة بالاسمر والاحضر

*Horia* (S). *Horie* (F). *Horia* (E).

جنس حشرات منغطة طمية من غديات الاجنحة وفصيلة الزراحيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم المناطق الاستوائية من المايلين القديم والجديد . الجملانة منها خاضعة والشم اما البرقة فقاتلة وبشرها يظفل على غشائيات الاجنحة || اجسامها كبيرة تطول من ٤٠ الى ٤٥ سم. رؤوسها كبيرة ناشزة . ملاحسها الشفوية قاعسة . قرونها الاستعمارية صوبانية مقوسة . كوسلها اصقب من الراس والطين . اتحادها بجنية الشكل . انواطها متباينة اللون يكثر فيها الاحمر الحمرى والجلوي ، وبشرها مطوق الدم بطرقن ، قاعدي وطرفي || جميعها نافعة تستعمل استعمال الفراع .

٣٠١٤١ - هَوَزَب  
*Gyps des Indes* (F). هو الغشمام الهندي ، اطلبه .

٣٠١٤٢ - هَوَزَن  
*Ketupa* جنس طير من البويات وحمارة البويات . انواعه المعروفة اربعة . موطنها يند من الصين الى الهند وبلاد فارس . جميعها كبيرة القند ، قريبة الشبه من الببوا . طولا يراوح من ٥٠ الى ٩٠ سم. انواطها الى الطلمة يطولها رقة سوداء . تأثف الغابات الخفيفة القائمة على مجاري الماء . سرعها دجوي يند من النسق الى الفجر . قوتها المستحب الاسماك والقشريات || تدن في تجاريف الانجرار . حضنتها تراوح من ٤ الى ٦ بيضات || اشهر انواعه هوزن جابا وهوزن سرنديب .

٣٠١٤٣ - هُوَشِيرَا  
*Heuchera* (S). *Heuchère* (F). *Heuchera* (E). *Alunwurz* (D). *Eucera* (I).

نبات معقود التحريف على اسم الطبيب النساوي هوشير (١٦٧٧-١٧٤٧) وهو جنس نباتات عشبية رية وتريينية من فصيلة القليات . انواعه نحو ٤٢٠ جميعها جلوسورية معمرة . اورانها جلعية الانتساب لا قياسية الاشكال والتفصيص . ازهارها صغيرة القند لا نظامية التجميع على منها المتعدودة والسبيلية والشكلوية . جميعها تركز على شامريخ منتصب رقيقة .

٣٠١٤٤ - هُوَشِيرَا امريكية  
*Heuchera americana* (S). *Heuchère d'Amérique* (F).

نوع من الهوشيرا . شامريتها تملو نحو ٥٠ سم. اورانها مدورة خماسية او سباعية الفصوص المسننة الحافة . نصلها مثل البشرة على صفحتيه . ازهارها متشكولة التجميع ، صغيرة القند ، تبو الى الخضار اليابات ثم تنحرف الى الحنطي . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠١٤٥ - هُوَشِيرَا صَغِيرَة الزَّهَر  
*Heuchera micrantha* (S). *Heuchère à petites fleurs* (F).

نوع من الهوشيرا . شامريتها تملو نحو ٦٠ سم. اورانها مدورة خماسية الفصوص المسننة . نصلها مائل البشرة على صفحتيه . ازهارها متشكولة التجميع يرض البتلات ، خضر الكؤوس ، من المار || تنورها يستمر من ايار الى حزيران .



هوري



هوزن



هوشيرا



هوشيرية



هول



هولية

### ٣٠١١٩ - هوميروم الحجاب (S). *Homeria collina*

*Homérie des collines* (F).

نوع من الموميرة. منتبها الحجاب المشرفة على البحر. ساقها شراخية ترتفع من ٤٥ إلى ٦٠ سم. ورقها وسيدة مستطيلة النصل. أزهارها تلونق الشراعات وهي إلى الحمرة السفعاء أو الحمرة الموحشة بالبرتقالي في تنويرها صيفي.

### ٣٠١٢٠ - هوميروم أنيقة (S). *Homeria elegans*

*Homérie élégante* (F).

نوع من الموميرة. ساقها شراخية ترتفع نحو ٣٠ سم. ورقها وسيدة مستطيلة. أزهارها تلونق الشراعات وهي إلى الصفار الكبريتي تعلوه رفقة زرقاء في تنويرها صيفي.

### ٣٠١٢١ - هوميريات (S). *Humiriaceae*

*Humiriées* (F). *Humiriées* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستطلة الفلوات رقيقة المبيض. اجناسها ثلاثة وأنواعها نحو ٤٥ أعطانا البلاد الاستوائية اخصها امريكا الجنوبية || نباتاتها غيرات وجينات. أوراقها بسيطة، متعاقبة، واحدة الزنات، جلدية النصال. أزهارها عشكولي التنجيم، طرفي الارتكاز. أزهارها خنثوية، نظامية، خلبية الاجزاء. ثمارها نورية || اشهر اجناسها المومير.

### ٣٠١٢٢ - هوهو، كوكو مذهب

*Chrysococcyx auratus* (S).

*Chalcid doré, Coucou doré* (F). *Glided cuckoo* (E).

طائر من القوقيات وفصيلة القيقويات. اصنائه افريقية الشرقية من البحر الاحمر الى الموزنيك. يأنث اللهايات الكثيفة. يحمله الاخصان الاقنية الارتكاز في الانجبار الباقية || وهو من القوراب التي تجوب الغابات في طلب الرزق. جسمه متوسط القد يطول نحو ٣٠ سم. نوبه إلى السمرة الخنثوية يملوها مراح اسفع في الجنين وماجة ذهبية في ريش سائر الجسم || قوته الخفارت والاساريع اثناء كاش التوراق لا تحضن البيض بل تقعه في عشاش غيرها من الطير اخصها عشاش العصافير الحارشة.

### ٣٠١٢٣ - هويبا (S). *Hoya*

*Hoya, Hoyer, Quadrille* (F). *Fleshy leaved, Vex flower plant* (E). *Fleischige Hoya, Porzellablume* (D). *Fior di cera, Fiore della cera* (I).

جنس نباتات ترينية مدمرة من فصيلة الصقلابات. جميعها جينات مستطيلة حارشة فراء. أوراقها متعاقبة منقطة بضيء الشكل. نصلها جامد الصفة، قائم الثغفار. أزهارها صيرولي التنجيم لفسوي الشكل ايلي الارتكاز. أزهارها صغيرة القد عاجية اللون يتوسط بناتها دائرة حمراء. تنويرها يستمر طوال الربيع والصيف.

### ٣٠١٢٤ - هويصة (S). *Lophomya d'Inhaux*

حيران لبون قاصم يدي لفيوم، اطليه.

### ٣٠١٢٥ - هياد ٥، هيصاص ٥ (S). *Hyas*

*Hyade* (F). *Hyas* (E).

جنس حيوانات بحرية من القشريات شاريات الارجل قصيرات الذيل الحمرجات رصفية المناجات. انواعه المعروفة قليلة البدن منتشرة في جميع بحار العالم باستثناء القطبية || اجسامها مخرمة، منعدلة التطبيل، مثلثة النصفية العليا، تقوّل من ٥ إلى ١٠ سم. ملاقطها شديدة، قوائمها



هوميروم أنيقة



هويبا



ميد

والاصفر والاخر الجروي. || تظهر القراشات وهي وسيدة أو ثنائية الجبل الحولي في اوائل حزيران فتستظل ثم تنجم مكبها على أوراق الصغ وسائر نباتات الفصيلة الباذنجانية فينتفخ بعد متحه بجسمة أيام ويكون ذلك عند اواخر الوتيرة الثانية من حزيران. ريقها لدعي اللودة القرنية || ريقها غفراء اللون، سماء اللهب، كبيرة القد، مجعدة الجوانب، تحمل في امل مؤمرها زائدة صغيفة التركيب تشبه القرن، وهي تبلغ حجمها النهائي بعد نفقها بأربعة اسابيع فيأورح اذ ذلك طولا من ٨ إلى ٩ سم. || اصغرها كبيرة لانها تلثم النصال مع مرورها ولا تبني الاكل الاصلاح النخينة || تكافح تغيرا أو نفسا باستمال اخضر باريس أو زربلخات الرصاص أو الكريوليت أو الأندرين.

### ٣٠١٢٦ - هوم (F). *Sous-sol*

*Subsol* (E).

الهوم هو بطنان الارض لا يخاله حرث أو قنب.

### ٣٠١٢٧ - هوم التجوس

« شجرة شبيهة بالياضين فيها بعض الحلاوة الحدة وأجود زهرها الاخير الذي يملو صفرة ويكون سديفاً وسحيت هوم الميرس لأن عبدة النار يستعملونها في عبادتهم وينسبون لها منافع عجيبة. » التاموس

### ٣٠١٢٨ - هومات (S). *Humate*

ملح يتأتى من الحامض الدهالي.

### ٣٠١٢٩ - هومس (S). *Humus*

هو الدهال، اطليه.

### ٣٠١٣٠ - هوميروم أنيقة (S). *Humea elegans*

*Humée élégante* (F).

جسمة سبروتية ترينية محولة من فصيلة المركبات. مهدها استرالية. ساقها فراء تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقها متعاقبة سافنة. نصلها اهليسي الشكل، جميل الخفارت، خلي النصفية، يطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. راجعته، عند اللمس، هلموية العرف. أزهارها رؤسية التنجيم، صغيفة القد، كثيرة العدد، تطول من ٥ إلى ٨ سم. لونها يختلف مع القرب، منها القرمزي والياتوني والاشقر الخنثي والايض. أزهارها هرمي الترتيب. تنويرها يستمر من حزيران إلى تشرين. تتكاثر بالبذر ويجود في جميع الاودية المعتدلة الاندماج والرطوبة.

### ٣٠١٣١ - هوميروم (S). *Humirum*

*Humiria, Humiris* (F).

جنس نباتات جينية معمرة من فصيلة الهوميريات. انواعه المعروفة نحو ٢ مهدها امريكة الاستوائية، سوقها معتدلة التفندي. أوراقها بسيطة، نظامية، متعاقبة، جامدة النصال. أزهارها عشكولي التنجيم، طرفي الارتكاز. أزهارها بيضاء اللون أو تبنية أو وردية.

### ٣٠١٣٢ - هوميروم (S). *Homeria*

*Homérie* (F). *Homeria* (E).

جنس نباتات عشبية دوفعية بوية وزراعية ترينية معقودة التعريف على اسم هوميرس. منتبها بعض اصفاق الشرق الاذل وافريقية النالية. سوقها شراخية. أوراقها فردية عقيمة النصال المستطيلة. أزهارها جيلة الشكل، متساوية البلات، ملتصقة الاسدية التي تصبح كالانبوب || وهي من فصيلة السوسنيات. انواعها قليلة العدد اشهرها النالية.





هَيْال



هَيْبُ الْجَزَاب



هَيْبُ الْفَرْقَل



هَيْبُ الْفَطَانِيَّات



هَيْبُ مَثَلُون



هَيْبُون

كبيرة . انوابها الى المرة الصفراء المولح || تألف المواتع التي يكثر فيها الخث او الاسنجع او الحيوانات الطحلبية حيث ترتب طرائعها بامتثال || اشهر انواعه الهيدان المنكوبتي (H. araneus) .

٣٠١٥٦ - هَيْكَار (E). Ebouls (F). Fallen rocks (F). هي المواد المنكوبة من حفور وغيرها .

٣٠١٥٧ - هَيْطَاط (E). Marée montante (F). Flood-tide (E). هو اندفاع مياه البحر ودونها من الشط . ويعدى المذ ذلك لان المياحة عند ارتفاعها واندفاعها نحو اليابسة تنتشر وتمتد وتقرب .

٣٠١٥٨ - هَيْبَب (E). Hippa (S). Hippa (F). Hippa (E). جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طويلات الاذناب وفصيلة الهيببات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من قشريات بحار المناطق الحارة || اجسامها صغيرة اللد || محددة الظهور || تطول من ٢ الى ٤ م . تتميز بقرونها الاستشعارية المشاورية التركيب المستطيلة المحببة ويميلونها البيئة المستطيلة وياربجلها القصيرة المتعرجة الاطراف التي تمكنها من الانتقال بسرعة . انوابها تراوح بين الزرقه والبركة يطولها الى السرة .

٣٠١٥٩ - هَيْبَبَال (E). Hybalus (F). Hybalus (E). جنس خنافس من هيديات الاجنحة صفحيات القرون وفصيلة الخنافس . انواعه المعروفة ١٢ اعطائها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط والجزيرة العربية || اجسامها شبه بيضيه الشوزن تطول من ١٠ الى ١٥ م . كواشها وانحادها متدة الاحديداب . رؤوسها مخروطية . متاكها ناشرة مدبية . عيونها صغيرة ماحدة . قرونها الاستشعارية مذكورة الاطراف الصفحية . قوائمها نشيطة متكاثرة الغلب الذي يطوق ايضا الرأس والجزء الاسامي من الكوسل . انوابها تراوح من الشفعة السراة الى الجفوة . انحادها لاحفة . مستديرة الاطراف || جميعها جامدة تعيش على المواد العضوية والنباتية المنحلة .

٣٠١٦٠ - هَيْبَر (E). Hypera (S). جنس حشرات من السوسيات . انواعه كثيرة العدد جميعها صغيرة اللد طولها يراوح من ٣ الى ٧ م . انوابها تختلفة الايران يكثر فيها المنيحي الاسمر . قرونها الاستشعارية مرفقية منفرجة الزوايا || اعطائها البلاد الممتدة الحرارة . مسرعها دجوي . اشهر انواعها ما يتبع .

٣٠١٦١ - هَيْبَرُ الْجَزَاب (E). Hypera fasciculata (S). نوع من الهير . طولها يراوح من ٥ الى ٧ م . ثوبه حنطي اللون تملوه مشعة رمادية وتغطى قاطب اسود . يألف الازربة الرملية . يركب جميع انواع الجزراب ومنظم النباتات البروتية التي يقضم اوراقها || يرقاته مؤذية تنخر البراعم وقد تسبب تنفعا .

٣٠١٦٢ - هَيْبَرُ الْقَرْفَل (E). Hypera arator (S). نوع من الهير . طولها يراوح من ٥ الى ٧ م . ثوبه الى

السرة الحنطية يملوها توسيع قاطب قليل السرة والذكاة . يرغب في الازربة القليلة الانساج والرطوبة . يركب اكثر القترنليات يقضم الاوراق ويؤذيها .

٣٠١٦٣ - هَيْبَرُ الْفَطَانِيَّات (E). Hypera nigrirostris (S).

نوع من الهير . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م . ثوبه الى الخضرة الزاهية . عظمه اسود . يرغب في المواقع القليلة الرطوبة . يركب الفطانيات يقضم الاوراق ويؤذيها . يرقاته تلثم البراعم والازمار تنفض عليها .

٣٠١٦٤ - هَيْبَرُ مَثَلُون (E). Hypera variabilis (S).

نوع من الهير . طولها نحو ٥ م . ثوبه الى الصفار الحنطي يملوه مواج اسف . يركب اوراق اليريم فيعملها كالغزال . يرقاته صغيرة اللد فستقية اللون تعيش على البراعم والاوراق النابتة .

٣٠١٦٥ - هَيْبَرُ سَيْسِيَّة (E). Hibbertia (S). Hibbertia (F). Hibbertia (E).

جنس شجيرات وجنبات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الدلانيات . انواعها المعروفة نحو ٨٠ منتشرة في جميع جزر الزايج وارقانية وسترالية وبنانية || نصف نباتاتها شجيرات صغيرة والنصف الآخر سرعي او مستقل وعارض . اوراقها متناقبة . كبيرة النصال . معتقة او حاشنة . ازهارها محورية الازتكاز او البغلة . كبيرة اللد . خماسية البتلات المنسطة . يسود فيها الابيض التي المولح . ومنها الصفراء واللثادية والاريدوانية والمروضة .

٣٠١٦٦ - هَيْبَرُ سَيْسِيَّة (E). Hibbertia (S). Hibbertia (F). Hibbertia (E).

نبت عشبي بري حولي من فصيلة الخشخاشيات . اوراقه بحرية اللون كثيرة التفريش والتشريح . ازهاره فردية التجميع . طرية الازتكاز . رباعية البتلات المزدوجة التركيب . ثماره قرون مستطيلة منجلية الشكل .

٣٠١٦٨ - هَيْبُون (E). Hippopus (F). Hippopus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم وفصيلة الجربانيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض بحار البلاد الحارة اخضها البحر الاحمر والاطح الهندى || اصحابها لاشاوية المصارع والاضلع والتخديد الطولي . ملونة وبمقبة بالاحمر والاصفر || تعيش متنمة في الرمال وفي الاسمال على اعماق تراوح من مترين الى خمسة امتار .

٣٠١٦٩ - هَيْبِيَّات (E). Hippidae (S). Hippidae (F). Hippidae (E).

فصيلة دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الارجل . طويلات الاذناب . اجسامها وانواعها المعروفة نحو ٦٠ || اعطائها بحار البلاد الحارة . تألف المواتع الكثيرة الامات والتي لا يزيد معها من ٣٠ مم || دماعيها قريبة اللب بدماعيس السرطان الا ان اذنابها عادية الحمة || اعرف اجناسها الهيب .



هَيْب

السرة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٩ سم. جسمها أسطواني الشكل. فوها إلى الحلقة القفراء مملوفاً تديش مدينة. رأسها شديد السرة. تحمل في أعلى عنقها زائدة صديرة مَيَّنة نارية اللون تنشر عند الانقباض وتقلع منها رائحة حريفة مزجية. وراؤها وبها إلى السرة في طول والكمال يستمر نحو ٢٨ أسبوعاً. تحضيا الحاداة متدلية برابط المثنى تمضده الحفصية.

٣٠١٧٦ - هَيْمَة Aglon (F). Eaglet (E).  
هو فرخ العقاب لا يزال بحماية أبيه وأمه.

٣٠١٧٧ - هَيْمَة بقلة من التجبل (اللسان).

٣٠١٧٨ - هَيْج Etiolement (F). Etiolation (E).  
اصفرار النبات وتحوله. راجع قفصاة.

٣٠١٧٩ - هَيْجِيغ \* Nycticebus tardigradus (S).  
Nycticebe tardigrade, Loris cardigrade (F).  
Kukang Loris, Slow-paced Loris (E).

حيوان لبون وحيد الجنس والنوع من فصيلة الليموريات موطنه يمتد من الهند إلى سوماترا. يألف الغابات والأحراج الميثره الأشجار التي يتسلقها بنجعة مدعشة. جلته الحياتي جامعي. جماعته قليلة العدد الذي يراوح من ٥ إلى ٢٠ سره دجوي يستمر من فحة الليل إلى النجر العميق. قوته أوراق الأشجار وزيماتها والثمار والبساتين والمصافير ويضيها في يختار من الحيوانات الشجرة لانه يحضي معظم حياته على الأشجار. جسمه قصيف صغير بطول نحو ٣٨ سم. يتميز بالندام الذنب. رأسه شبه مكور الشكل صغير الحلق والأفان. عيناه كبيرتان مستديرتان. أذناه صغيرتان، مستديرتان، كاسيتان، شره جتل بالغ النومة خلى اللمس. لونه إلى الصبغة الصفراء المالح يطوها تمسح ادعس في الايطان ويلدو غط قاتب كسني يمتد من الحاجبين إلى قمة الرأس فتج الظهر الفارم. عيناها مطوختان بالاسود الدعس. قصبه أنفه غبراء اللون. وقوبه هذا يتصور مع العمر إذ تملوه نمشة فضية تزداد مع مرور الاعوام في الاثنى تتحلل يشوب الذكر إلا أنه أجهت ماجة وهي ثنائية الثدي. يحملها يستمر نحو سبعة أشهر تقص في تمامه جرواً واحداً.

٣٠١٨٠ - هَيْدَب Cumulus  
هو الصير، نوع من النجوم الماطرة المتوسطة الارتفاع.

٣٠١٨١ - هَيْدَرَات Hydrate  
جزء ماء استبدلت منه ذرة الهيدروجين القاعدية بذرة اخرى موجبة الكهربية.

٣٠١٨٢ - هَيْدَرَات الْكَرْبُون، مَوَاد هَيْدُرُوتِيَّاتِيَّة Hydroates de carbone, Matières hydrocarbonées (F).  
Hydrocarbon (E).

مركبات عضوية من الكربون والاكسجين والهيدروجين، منها المخلصات غير الأثرية كالنشا والسكر ومنها المواد اللعنية وغيرها.

٣٠١٨٣ - هَيْدُرُوتِيَّات \* Hydroptilidae (S).  
Hydroptilidés (F). Hydroptilidae (E).  
فصيلة حشرات من رتبة جملونات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد



هَيْج

٣٠١٨٠ - هَيْمَة Fibigla (S).

Fibigle (F). Fibigla (E).  
جنس نباتات نجمية أو هشيبة معمرة برية من فصيلة الصليبيات. انواعها المعروفة قليلة العدد. جميعها من ثبوت حوض البصر الابيض المتوسط في سوتها فراء. اورانها متماثلة، سنانية النصال. ازهارها شبه سنبل التجميع. ازهارها صغرة صفراء اللون. ثمارها سفاه، شبه بيضبة الثوزن، مبطة الجرم، حلبة السقاء، ثنائية البزور والمفلمطة المستديرة في أعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية:

٣٠١٨١ - هَيْمَة جُوبِيَّة Fibigla clypeata (S).  
Fibigle à bouclier (F).

نوع من الهيمية، نجمة صغرة. اورانها الجذعية سنانية النصال المستطيلة. اورانها العليا غيطية. تنويرها صيفي.

٣٠١٨٢ - هَيْمَة صُرْلِيَّة النَّمَر Fibigla eriocarpa (S). Fibigle laineux (F).

نوع من الهيمية. عشبة معمرة. اورانها الجذعية رجيحة النصال المستطيلة المسندة الحار. اورانها العليا صغرة الشكل قصيرة. ثمارها مستطيلة الحمل الذي يلبس بالصفوف تنويرها صيفي.

٣٠١٨٣ - هَيْمَة مَشْخِصِيَّة Fibigla rostrata (S).  
Fibigle éperonné (F).

نوع من الهيمية. عشبة معمرة. اورانها كدوك الجلوبية. ثمارها كثيفة الحمل المتوسط الطول، تنتهي بنمسا حادة. تنويرها صيفي.

٣٠١٨٤ - هَيْمَة \* Zerynthia (S).

جنس حشرات فراشية من عماره المذابيات. انواعه عديدة جميعها متوسطة القد، بسطها تراوح من ٤٦ إلى ٥٢ سم. اجسامها أسطوانية الشكل، حنطية اللون. بطونها ملونة يكثر فيها الاحمر والخضوط القاطية. وراؤها إلى الصفرة تملوها زركشة سوداء وتيجيح احمر وارزق في اوائل الربيع، تمتح مكنتها على مختلف النباتات البرية. يقطف من يرقات غاضلة تعيش على أوراق النبات. يرقاتها أسطوانية الشكل غبراء اللون منشفة بالاسود.

٣٠١٨٥ - هَيْمَة الزَّرَاوَنْد \* Zerynthia polyxena - creusa (S).

Zerynthie du littoral, Thals, Cassandre (F).  
Zerynthia polyxena - creusa (E).

حشرة من فصيلة الفراشيات رتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها البلاد الحارة وبعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط. فراشها رائحة قوتها مغر الاندفاع، سرعتها تعيش على أوراق النباتات البرية وأغصانها الزرارة في جميعها متوسط القد بطول نحو ١٩ سم. بسطها نحو ٤٨ سم. رأسها كسني اللون. عيناها كبيرتان ناشزتان. زباناها صرغياتان. جوشها كسني اللون. يطها إلى الخنطى العنان يملو تقطيع جانبي اصفر وغطوط قطبة ومرتعة كسنية في وراؤها. عند التثقيب إلى الصفرة تملوها زراکش وتراويق سود ويقتح ونقط حر وزرك في الحابل واحد في الحول. تظهر الفرائنة في مطلع الربيع تسرح في النهار. تتماثل بعد ظهورها بنحو ستة أسابيع ويمتد لكن ميعادها على نصال أوراق النباتات البرية وأغصانها الزرارة في

٣٠١٢٢ - هيدروبيسيكيات  
Hydrologie (F).  
Hydrology (E). علم خصائص المياه وتوزيعها .

٣٠١٢٣ - هيدروبيسيكيات \*  
Hydromys (S).  
Hydromys (F). جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الفأريات . أنواعها قليلة موطنها أستراليا ، جميعها قاذية ، أجسامها مسطيلة . طولها الكامل يراوح من ٤٥ إلى ٦٥ سم . رؤوسها مدوية الشكل . ذلقتها مقطوعة . أذنانها مستديرة . جرابها قصيرة ، أصابعها خاسية غشائية القاعدة || تألف شطوط البحر وغفاف الأنهر والبحيرات ، تسبح وتنطس بسهولة فائقة . قوتها المواد النباتية والأسماك الصغيرة والقشريات .

٣٠١٢٤ - هيدكة \*  
Nectria (S). جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشطيات . أنواعها عديدة بعضها شديد الأذى || يوهضها الخاريجي . اهليلجي الشكل ، صغير القد ، رمحي الارتكاز . أحسانها فضضة ، ثديوية السطح ، مرجانية اللون ، ترتكز على ونية نائفة || يورغ نكتاتيا ثنائي الجها تشطره ويؤثر معترضة الى جزئين || مثسايين العلوي أكبر من السفلي || أعرف أنواعها وأضرها البتة التالية .

٣٠١٢٥ - هيدكة حمراء \*  
Nectria cinnabarina, Tubercularia vulgaris (S). Nécrose du bois (F). Coral spot (E). Rotpustelkrankheit (D).

فطر مجهرى يمتري بعض الانجبار المشمرة والحرجية انغصها الاجاص والتبلا والبنقد والتوت والجوز والحوار والخرف والمان والنجوخ والدردار والزنان والزيتون والشم والصفيراء والصنوبر والعرب والغبيراء والقرون والقيقب والكستة والبلابل والمران والمغث والبنق والمهلد الخ... فيغطها وقد يسبب يفسها || مظهرها الخاريجي يشور جزئية اللون لا لقياسية البعثة تركب الاغصان والافنان من الربيع الى الشتاء تنشط البشرة واللحاء وتقضي على الشكير عند انتشاب اجناسها فيبدو الخشب حاريا من التشور تملو كسة سمراء || يكاثف في الانجبار المشمرة مكافئة الهيدكة الحنطية .

٣٠١٢٦ - هيدكة حنطية \*  
Nectria galligena, Cylindrocarpum mali (S). Chancres du pommier, Ch. des arbres fruitiers à pépins (F). Apple canker (E). Apfelbaumkrebs, Nectriakrebs (D).

فطر مجهرى يصيب التفاح والاجاص فيسبب اوعم المعروف بأكلة التفاح || مظهره الخاريجي يشور مقررة لا لقياسية الشكل والحجم تركب الاغصان والافنان والافنان والبار || يبدو على الافنان والافنان بقع جزئية تركب بشره اللحاء ، عند انتشاب البرعمة ، فتجدها وتقضي عليها وعلى ما دونها من اللحاء حتى الشكير . وقد تمتد الى البرعمة فتغطها || وهو على آثار بقع ضمنية تركبها قبل الإدراك وعنده ويبدء تنشط السوط وتمجبه بعد البشرة والقشرة ، يذبل الثمر ويسقط او يفسد ويبقى كالموياء يتكشفه طبقه غروية لجزء لا تخلو من بعض التجاويف الخملية . يتكاثف أولا بقطر الاغصان واصابعها ويظهر الجروح إما بسلقات الحديد المحلول ٢٪ وأما بالمرتكب التالي : سلفات النحاس ١ ، كلس يافض ٢ ، زيت كتان محروى ٢ . ثانياً باستعمال سائل بودرو المحلول من ٢ الى ٣٪ أو غيره من الفوطير الفعالة على ان تنضج الانجبار في الحريف

المعتلة الحرارة || اجسامها شديدة الصفر ، سمراء اللون . بسطة اجنتها تراوح من ٦ الى ٨ م . اجنتها الامامية كثيفة الخمل مميحة || ملجها الحياتي جاسي . افواجها كثيرة العدد . طياتها سريع الحركة . تخلق فوق مجاري الماء من العصر الى فحة الليل || اساريها تعيش في المياه الراكة ملحوة بمجاليب بسطة او قنينة الشكل ، حريرية النسيج || أشهر اجنتها :

Hydroptila (S).  
Agrytes (S).  
Oxyethira (S).

الهيدروبتلا  
الآفريلا  
الاكسيثيرا

### ٣٠١٨٤ - هيدروبيسيكيات \*

Hydropsychidae (S). Hydropsychidés (F).  
Hydropsychidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة . اجنتها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد ، وبداء اللون . بسطة اجنتها تراوح من ٢٥ الى ٣٢ م . اجنتها قليلة التزاوج ، شبه شفافة ، مهدبة الحواف الخلفية . ملابسها الفكية مسطيلة عند الشقين || اساريها طليقة ، تعيش في المياه الجارية بين الاشعاب المائية والصخور . بقى اجنتها مفرس يصنع شباك يحبكها بين الاشعاب فيقتبس ما يعلق من حويينات || أشهر اجنتها :

Hydropsyche (S).

الهيدروبيسك

### ٣٠١٨٥ - هيدروبيسين ، هيدروبيجن ، هيدروبيجن

الهيدروبيجن . Hydrogen (E). Hydrogène (F). مولد الماء . غاز شديد الاشتراك عادم اللون والطعم والرائحة يوجد في الماء وفي جميع المواد العضوية . رمزه (H٢ - يد) . وزنه الذاتي ١.٠٠٨ - راجع ايدروبيجن .

Hydrographe (F).

هيدروغراف

Hydrographer (E). العالم بالمياه السطحية ويسأولها .

Hydrographie (F).

هيدروغرافية

Hydrography (E). علم المياه السطحية ورسفها .

### ٣٠١٨٨ - هيدروبيات \*

Hydrophidae (S). Hydrophidés (F). Hydrophidae (E).

فصيلة حيات خبيثة سامة من امانيات الاغاديد . اجنتها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم صغار البلاد الحارة . جميعها تقرب الشطوط في زمن الفساده لانها تطمر ايضا في الرمل . وبها انواع تقسم الاغوار وتسير بعيدا في الأنهر || أعرف اجنتها وأشهرها الهيدروبيس المعروفة بحية الماء والقمام والبرداس والتجافة .

Hydrophis (F).

هيدروفيس

اطلب خية الماء .

Hydrocarbons (F).

هيدروكربور

Hydrocarbon (E).

الهيدروكربور تألف الكربون والهيدروجين .

Hydrocotyle (F).

هيدروكوتيل

Pennywort (E).

هي فصمة الماء ، اطلبها .



هيدروبيس



هيدكة حمراء



هيدكة حنطية

اصقاع العالم . سوقها فردية تنشعب عند القمة . اوراقها جلدية الانتشاب . ازهارها وريسية صغيرة ملونة ٥ أعرف انواحه واشهرها ما يلي .

### ٣٠٢٠٤ - هيراسيوم لزغب ، قطرة

*Hieracium pilosella* (S). *Piloselle*, *Vélouette*, *Oreille de rat* (F). *Mousse ear hawkweed*, *Mousse ear* (E). *Kleines Habichtskraut*, *Mausohrchen* (D). *Pelosella*, *Pelosoetta* (I).

نوع من الهيراسيوم البري . جلوره طيبة يقال انها تستعمل في بعض العلاجات الصدرية . ساقه مزينة تملو نحو ٣٠ سم . اوراقه جلدية الانتشاب ، بيضية الشكل ، نصلها أزغب البشرة على صفحتيه . ازهارها فردية ، صفراء اللون . ذهبية المويج .

هيدكة سوداء



هيدكة صئورية



هيدكة قمرية



هيدكة مرجانية



هيراسيوم



هيردان



هيمية

بعد الالبياء ٥ هذا مع العلم ان التفاح او الاجاص المرص لهذا الوبس هو الموجود في الموانع الرطبة والمفروس على اعماق تقود ٥٥ سم . وفي تربة كتوم او تربة كثرت فيها نسبة المادة الكلسية .

### ٣٠١٩٧ - هيدكة سوداء ٥ ، آكله الزان

*Nectria ditissima*, *Cylindrocarpum wilkommii*, *Fusidarium candidum* (S). *Chancro du hêtre* (F).

فطر مجهري يصيب الزان بافاته الفنية فيملها ٥ مظهره الخارجي لطع قديمة الشكل مبداء اللون دائرية الانتشار يراوح طولها من ١ الى ٢ سم . تصيب بشرة الانسان وتنتشر مرضا الى ان تطرقها تنفضي حل اللحماء وعلى التبادل التنفي . وقد تسبب قروصا ثائثة تملب الخشب كما في التفاح والاجاص والحور .

### ٣٠١٩٨ - هيدكة صئورية ٥ ، آكله الصئوريات

*Nectria cucurbitula*, *Cylindrocarpum cylindroides tenue* (S). *Chancro des conifères* (F).

فطر مجهري يركب بعض الاشجار الصئورية انحصا الصئور والنب ٥ مظهره الخارجي يقع مبدية الخار لا قياسية الشكل ولحمه لونها الى الحمر الغراء . اعلاها يبيض قصار لا متساوية الانتشار والكثافة ، تنمري الاثان المجروسة وتكثر في الاغصان المقطوعة المطروسة حل للزرة الرطبة ٥ اغصان زعيدة لا تستلزم المكافئة .

### ٣٠١٩٩ - هيدكة قمرية ٥ ، آكله الحور

*Nectria coccinea*, *Cylindrocarpum candidum* (S). *Chancro du peuplier* (F).

فطر مجهري يصيب الحور فيسبب الوبس المعروف بآكلة الحور وقد يصيب القيقب والاسفندان والزان والزان والسندباد . مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل ولحمه قمرية اللون . تركب بشرة القيقب والاثان فصلها يد ان تقرح اللحاء والشكر . ويص الخشب ٥ يكافح في الحور مكانة الهيدكة الخطية ون المستحسن تخفيض اثره لتخفيف رطوبته .

### ٣٠٢٠٠ - هيدكة مرجانية ٥

*Nectria ribis*, *Tubercularia confluens* (S).

فطر مجهري يركب الكشيش والاجاص والزيزن والندار . مظهره الخارجي يباس فيال يعل يبيض افاد الشجرة ثم يعبه يظهر بثور متفتحة لا قياسية الحجم لونها الى الوردي ثم يتحرف الى المرجاني ٥ يكافح بقطع الاعضاء المصابة عند ظهور اليباس وباستعمال الطرق المذكورة في مكانة الهيدكة الخطية .

### ٣٠٢٠١ - هيرتوك

*Hyrrae* (F). حيوان لاسم مقترى يدعى فرزون ، اطليه .

### ٣٠٢٠٢ - هيرازماج

*Menthe crépue* (F). هو التمتع الجمعي ، اطليه .

### ٣٠٢٠٣ - هيراسيوم ٥ ، حشيشة الغرب

*Hieracium* (S). *Epervière*, *Oreille de souris* (F). *Hawkweed*, *Hawk's eye* (E). *Habichtskraut*, *Distelkraut* (D). *Ieracio*, *Orecchio di topo* (I).

جنس نباتات عشبية معمرة برية ويترية من فصيلة المركبات . انواعه المعروفة زهاء ٢٠٠ منتشرة في معظم

### ٣٠٢٠٥ - هيراسيوم برتقالي

*Hieracium aurantiacum* (S). *Epervière orange* (F).

نوع من الهيراسيوم الزبني . ساقه تملو من ٢٠ الى ٥٥ سم . اوراقه جلدية الانتشاب باستثناء واحدة او اثنين . نصلها اعليجلي الشكل ذلك الزام الاخير لونه الى الحمر الغراء . رؤسائه الزهرية برتقالية اللون ، عابكة المويج ، كثيرة العدد الذي يراوح من ٥ الى ١٥ ٥ تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

### ٣٠٢٠٦ - هيراسيوم صوفي

*Hieracium villosum* (S). *Epervière à toison* (F).

نوع من الهيراسيوم الزبني . ساقه تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه الجذرية منقطة ، ستانية الشكل ، تطول من ٧ الى ١٥ سم . وتعرض من ١ الى ٢ سم . اوراقه الجذعية لائفة ، قلبية الشكل ، صفراء لثاء ، حبيبة مجرة اللون بملوها مويج ازرق . نصلها مستطيل الزنب المبرج . رؤسائه الزهرية فردية التجعج او ثلاثية ، نرسا الى الصفار الزاهي ٥ تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

### ٣٠٢٠٧ - هيرودان

*Falcaria* (S). *Falcraie*, *Citrime* (F). *Falcaria* (E). *Sicheldolde* (D). *Falcaria* (I).

جنس نباتات شدية برية من فصيلة الحبيبات . انواعه المعروفة اربعة ، منها الحقل والبراري . سوقها فراء متعب . اوراقها جلدية مستطيلة الاثان والقموس اضعية . ازهارها صويالي . ازهارها صفراء لثاء وردية اللون او ليلية .

### ٣٠٢٠٨ - هيرية ٥

*Hyria* (S). *Hyrie* (F). *Hyria* (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات صفحيات الحياشيم وفصيلة التبادات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اعلاها انهر وميجرات امريكية الجنوبية واصغها نهر الامازون ٥ اصداها كبيرة لثاء ، متساوية المصارع الاذنية ، تطول من ٨ الى ١٢ سم . غشاء اصفاها من الداخل متدل المشاة للزوي المادة ٥ تديش في اسام الصفات وينها انواع تقترب من الاغوار ٥ لحوبها مأكولة ، متوسطة الصنف .

### ٣٠٢٠٩ - هيس

*Age* (F). *Plough-beam* (E). هو السلب اي الجزء الجامع لاثار اجزاء الحراث .

Choléra des poules (F). **هَيْبَةُ الطير** ٣٠٢٢٠  
هي كوليرا الدجاج ، اطليها .

٣٠٢٢١ - **هَيْبَمَان** \* ، **شَجَل الخَيْل**

Cochlearia armoracia (S). Ralfort, Grand ralfort, Ravenelle, Cran des Anglais, Cranson, Radis à cheval, Moutarde des Allemands, Armoracia(F). Common horseradisch (E). Meerretich Löbelfkraut, Meer-Rettig (D). Ramolaccio, Armoraccia, Erba forte, Barba forte, Rafano (I).

جنس نباتات عشبية طيبة برية معمرة من الهيفانيات وفصيلة الصليبيات . جنورها غليظة مستطيلة يشبه اللين خردلية الطعم . اوراقها متعاقبة متفكة سنانية الشكل ، أزهارها صغيرة اللقد ، يشابه اللين ، سنطيلة التجميع ، هامة الاوتكاك . ثمارها خربشات دقيقة مستطيلة . ثروها مستدرة حمراء اللين ، يتصمر منها زيت طيار يشبه زيت الخردل ، يذوي زيت خردل الزهوان او الخردل الألماني . وهو مضاد لداء الحفر ، يدر اللسان والبول ، ويفيد الامراض العصبية المزمنة .

Raphanées (F). **هَيْبَمَانِيَّات** ٣٠٢٢٢  
سبط من فصيلة الصليبيات يشمل بعض الاجناس اشهرها الهيفان والفجل .

Oryx de Nubie (F). **هَيْبَكَة** ٣٠٢٢٣  
هي الاربع السواني ، اطليه .

Molossinés (F). **هَيْبَعَرَات** ٣٠٢٢٤  
عمارة من فصيلة الراسيات . اجناسها اربعة ، تتميز باذانها المنفصلة عن الفشاء الجلدي || أما اجناسها الاربعة فهي : الزنزاب والصفوع والفورب والميرة .

Molosse (F). Molossus (E). **هَيْبَعَرَة** ٣٠٢٢٥  
جنس غفائش من عساة الحيرات . موطنه البرازيل والاقليل . انواعه عديدة . اجسامها صغيرة اللقد رمية . رؤوسها غليظة . فرائسها مستعرضة رافعة . اذانها كبيرة ، قلبية الشكل || يعيش بجاعات متوسطة العدد . يسرح في اوائل الليل واواخره . قوته الحشرات . يألف تجاوبف الانجبار الحربية والمعاور والكهوف .

Vent du Nord-Est (F). **هَيْف** ٣٠٢٢٦  
North-East wind (E).  
رياح مهبها بين الشمال والشرق وجهتها بين الجنوب والغرب . وهي ريح حارة نكباء تهيج النبات وتؤذيها .

Hyphales (F). **هَيْفَانِيَّات** ٣٠٢٢٧  
مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزويات . تتميز بهيئتها السطحي الاوتكاك ، التذني الشكل . كائناتها تملو كرمياتها الثؤادية || فصالها اربع : الكنتيات والكحيبيات واللطحيات والولطحيات .

Hypha (F). Hypha (E). **هَيْفَة** ٣٠٢٢٨  
ج . هيف . مجموعة خيوط نباتية حادة الحافض يتألف منها هيكل الفطر والحزاز .

٣٠٢٢٩ - **هَيْفَل** ، **جَرِيح**  
Forsythia (S). Forsythie (F). Golden bells (E). Glockenstrauch, Forsythie (D). Forsythia (I).  
جنس جنبات برية وزيينية من فصيلة الزيتونيات . انواعه

Histogenèse, **هَيْسْتُوجِنِيَة** ٣٠٢١٠  
Histogénie (F). Histogeny (E).

الهستوجنية علم يبحث في تكوين الانسجة العضوية .

Histographie (F). **هَيْسْتُوجْرَافِيَة** ٣٠٢١١  
Histography (E).

الهستوجرافية وصف الانسجة العضوية .

Histon **هَيْسْتُون** ، **هَيْسْتُون** ٣٠٢١٢  
عنصر فرضي يقال انه اساس المواد النووية الخلية .

Roncraie (F). **هَيْشَة** ٣٠٢١٣  
Brake, Brambly ground (E).

هي دخل البلق او منته وكل ارض كثر فيها هذا النبات .

٣٠٢١٤ - **هَيْشَر** هو الحرف ، اطليه .

٣٠٢١٥ - **هَيْشَرِيَّات**  
Carduacées, Carduinées, Cynarées, Cynarocéphales, Flosculeuses (F).  
سبط من فصيلة المركبات ، اجناسه وانواعه كثيرة العدد معظمها بري وبعضها زراعي || اشهر اجناسه : الارضي شوكي والقرمز والتغترين والصهباء والكاريين والارتطيون وربي الايل والورطة .

٣٠٢١٦ - **هَيْشَمَ هَرَمِي** ، **كُونِيَة هَرَمِيَة** ، **مَكْنَسَة الحِنَة**

Kochia trichophylla (S). Kochia-cyprès (F). Mock-cyprès, Summer-cyprès (E). Sommer-Cyprasse (D). Cipresso d'estate (I).

نوع من الهيشم وهو عشبة سولية زينة هرية الشكل . ساقها فراء ناع . اوراقها مشرعة خلية ليدة تبلو جملة الخضار الاصفر الزاهي ثم تنحرف الى الصنابي وتستقر على الاحر الى ان تلوي في اواسط الخريف .

٣٠٢١٧ - **هَيْشُور**

الهيشور والحيشوم واحد . قيل . نبات رغو فيه طول على رأسه برصوة كأنه عتق الرأل . وقال ابو حنيفة : من المشب وله ورقة شاكبة منها شوك ضخم وهو يسقم ، وزهره صفراء وتغلزل . له قصة في وسطه حتى تكون اطول من الرجل (المان) .

٣٠٢١٨ - **هَيْص** ، **هَيْص** ، **ذَلَق** (F). Fiente (F).  
Dung, Droppings (E).

هو رجيع الطير من اي جنس كان وهو من الاصداء العضوية النشطة الذنية بالامدة الاثرية || يقال حاص وهاض وذلق وذائق الطائر : ربي برجيته .

٣٠٢١٩ - **هَيْصُور** \*

Sisor  
سمكة بحرية مستطيلة وصيدة الجنس والجنس ولكن من مفتوحات المانة وفصيلة السلوريات . اصطادها المياه الحثية . تتميز بفراية جسمها المردني الشكل الدقيق الطرف . رأسها مقطوع الخطم . تحبل في فكها عذتان مستطيلتان ، زعانفها كبيرة اللقد . زعنفتها الشرجية تنتهي بأيل دقيق كالقاص طولها يعادل طول الجسم .



هيصور



هيفان



هيرة



مِفْلُومِ اسط



مِفْلُومِ تَوَحِي



مِفْلُومِ حَزْمِي



مِفْلُومِ رَحَارِي



مِفْلُومِ قَرِيدِي



هَيْبَةِ

سأله محتلة الجرم ، ناشرة الطوق بيشاء اللون . نكته كالتوبيخ قطرها نحو ٤ سم . لونها الى الصفار الاسفع اللامع . اطراسه الى الوردي المايق .

### ٣٠٢٢٦ - هَيْكَلُومِ حَزْمِي\*

*Hypholoma fascicularis* (S).  
*Hypholoma fasciculé* (F).

نوع من الميفلوم . يعيش على خلاء الجلولو المسطوية . ساقه رفيعة ، دقيقة ، موصبة ، صفراء اللون . نكته قطنسوية الشكل ، رعدة ، قطرها نحو ٤ سم . لونها لزن الساق . اطراسه دقيقة ، تحيلة ، زيتونية اللون . لحيت صفراء اللون ، مرة المذاق .

### ٣٠٢٢٧ - هَيْكَلُومِ زَنْجَارِي\*

*Hypholoma seuginosum* (S).  
*Hypholome vert de gris* (F).

نوع من الميفلوم . يوجد في غابات السديان والمثلول . ساقه لزنية ، مستطيلة ، برادية اللون ، رقيقة الطوق . نكته دينة ، مظلية الشكل ، قطرها نحو ٦ سم . لونها الى الرمادي الزنجاري المواج . اطراسه الى البني الزنجاري .

### ٣٠٢٢٨ - هَيْكَلُومِ قَرِيدِي\*

*Hypholoma sublateralitum* (S).  
*Hypholome brique* (F).

نوع من الميفلوم . يعيش على الارويات والجُلُوحِ النشرة . ساقه موصبة متندلة الارتفاع والفلاحة ، قليلة الاستدارة ، شبه مبطلة . نكته صوبانية الشكل ، قربية اللون ، قطرها نحو ٨ سم . لحيت بيضاء اللون ، مرة المذاق .

### ٣٠٢٢٩ - هَيْبِيَات\*

*Hyphomycètes* (F).

*Hyphomycetes* (S).

نظور مجهرية غزلية ، عارية الزور ، ظاهرة الخيط الكثيفة التجميع ، تسمى -ساح- الانجار والجلود والورق وفيها ... قسب نوعاً من العفن الفشار .

### ٣٠٢٤٠ - هَيْبِيَّة\* ، شَجَرَةُ الْمَطَاطِ، مَطَاط

*Hevea* (S). *Hévéa*, *Arbre à caoutchouc* (F). *Caoutchouc tree* (E). *Kautschukbaum* (D). *Evea* (I).

جنس اشجار حرجية وزراعية من التروحات السوبيات . انواعه قليلة المدد . اوراقها متعانة ، معتمة ، الهلجية ، مستطيلة النصل الجادة . يستخرج من سوقها بالخر مصارة لزجة مطاطة لها استعمالها الصناعي || اشهر انواعه هيفية البرازيل وهيفية النريان .

### ٣٠٢٤١ - هَيْبِي ، هَيْبَم ، هَيْكَل

الحيق والحيقم : ذكر النام . يقال اُثم من هيق واهدى من هكل .

### ٣٠٢٤٢ - هَيْكَل

*Ossature* (F). *Framework* (E). مجموعة الاعضاء الجادة الصلبة الرئيسية التي يرتكز عليها الجسم والتي .

### ٣٠٢٤٣ - هَيْكَلُ عَظْمِي

*Squelette* (F).

*Skeleton* (E).

مجموعة العظام التي يرتكز عليها الجسم الحيواني .

المعروفة ، مهدا يمتد من اليابان الى اوروبية . سوقها فراء . اوراقها متعانة مائلة . ازهارها رباعية الفسل ، لخاسية البلات المندجمة القاعدة ، ثنائية السداة ، جملة الشكل ، ذهبية اللون ، تنور قبل انبلاج الورق .

### ٣٠٢٣٠ - هَيْكَلُ أَخْضَرُ الْفُرُوعِ

*Forsythia viridissima* (S). *Forsythia vert franc* (F).

نوع من الهيفل التريزي ، جنبته تملو من مزين الى ثلاثة امتار . ساقه فراء . فروعه مجوفة السلايات ، منصبة ، خضراء اللون . اوراقها معتمة سبانية الشكل ، نصلها جامد الصفحة يطول من ٦ الى ١٥ سم . ويعرض من ٢ الى ٤ . ازهاره لا قياسية التجميع الذي يراوح من ١ الى ٣ ، لونها الى الصفرة الباهة || تنوره يستمر من اذار الى نيسان .

### ٣٠٢٣١ - هَيْكَلُ أُرُوبَةِ

*Forsythia europaea* (S).

*Forsythie d'Europe* (F).

نوع من الهيفل التريزي ، جنبته تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقه فراء . فروعه منصبة صماء اللون . اوراقه معتمة بفسية الشكل ، نصلها جامد الصفحة شبيحة للتسعين يطول من ٤ الى ٨ سم ، ويعرض من ٢ الى ٤ سم . ازهاره لا قياسية التجميع الذي يراوح من ١ الى ٣ ، يتلاتها ملتفة الاطراف ذهبية اللون || تنوره يستمر من اذار الى نيسان .

### ٣٠٢٣٢ - هَيْكَلُ مَدَّتِي الْأَزْهَارِ

*Forsythia suspensa* (S). *Forsythie à fleurs pendantes* (F).

نوع من الهيفل التريزي ، جنبته تملو من ٢ الى ٤ م . ساقه فراء . فروعه مجوفة السلايات ، سفلية اللون ، تقش مستقيمة منصبة من تنطف وتندل . اوراقه مركبة ثلاثية الشخرم ، وريقاتها جامدة النصل مشارية الحافة . ازهاره متندلة ، لونها الى الصفار المذهب المايق . تنوره يستمر من شباط الى اذار .

### ٣٠٢٣٣ - هَيْكَلُوم\*

*Hypholoma* (S).

*Hypholome* (F).

جنس نظور من فصيلة الفاريقوتيات . انواعه المعروفة قليلة المدد اعطائها بعض غابات المناطق المعتدلة الحرارة والحارة . تعيش على جذوع الانجار واوريقاتها وعلى الزبل والدبال . معظم انواعه كاعن الصنف غير مرغوب فيه . اعرف انواعه واشهرها الخمسة التالية :

### ٣٠٢٣٤ - هَيْكَلُومِ أَمْعَط\*

*Hypholoma depilectum* (S). *Hypholoma pelé* (F).

نوع من الميفلوم . يوجد في حراج الصنوبر . ساقه خفيفة ، سفحة ، دينة ، تنتهي بطوق مستعرض الحاشية ، لونها الى الطعلة يملوها تشيح ازرقة . نكته كبيرة ، شبه مستديرة ، لزجة ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى الطعلة الصفراء . اطراسه تبدو ليلكية ثم تحمر نحو الحمرة الابوانية .

### ٣٠٢٣٥ - هَيْكَلُومِ تَوُوجِي\*

*Hypholoma coronillum* (S).

*Hypholome petite couronne* (F).

نوع من الميفلوم . يوجد على الزبل في المواقع الرطبة .



الجنس والنوع من فصيلة القرنيات . منبتة بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || ساقه مزقية اللحاء ، منتصبه ، قليلة الفروع ، تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . اوراقه مركبة ، وقرية التجميع ، متناحية النصال . ازهاره صفراء اللون ، زنادية ، مستطيلة المالحق المنزقية || ثويده ربيعي .

٣٠٢٦٥ - هَيْئَمِيَّات ٥  
Spirillaceae  
فصيلة من البكتيريا تتميز بشكلها الحلزوني . خلاياها وحيدة الاتجاه عمودية الانقسام .

٣٠٢٦٦ - هَيْوَلَارِيَقُون  
Millepertuis (F).  
هو الماذي ، اطلبه .

٣٠٢٦٧ - هَيْوَلَارِيَقُونِيَّات  
Hypéracées (F).  
فصيلة نباتية جاء وصفها في داذيات .

٣٠٢٦٨ - هَيْوَلِيَّات  
Protides (F). Protid (E).  
هي الاجسام التي تدخل في تركيب وذف سميرات الانسجة الحيوانية والخلايا النباتية . وتقسم الهويليات الى :

هويليدات  
Protéides (F). Protéid (E).  
وهويلينات  
Protéines (F). Protein (E).

٣٠٢٦٩ - هَيْئَة  
Configuration  
هي الشكل الخارجي .

قوتها رقيق الازهار . سرتقا تعيش على نصل اوراق السندبان || جسمها متدل لثد يطول نحو ١٥ م . بسطتها نحو ٢٢ م . رأسها يرمي الشكل ، اخضر اللون . عينها كبيرتان . زباناها غيطيان . جوشها اخضر . بعلتها الى الطحلة الغبراء الموج || وشناها الاماميان الى الخفيرة الجميلة يطوقها حثار ابيض ويلوطها : ضيطان ابيضان متفرسان يقنآن الصفحة الى ثلاثة اقسام شبه متساوية . وشناها الخلفيان الى الطحلة الغبراء تمبق عند الذكر وتبت عند الانثى || لها جيل واحد في الحول . تنظر الفرافرة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تعاظم بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتص المكن لطخاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٠ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مائل القشار . فوها الى الطحلة الخضراء الموج . رأسها اسود . مدنها ورواجها الى الطحلة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي في الجنالة او في التربة حيث تنفس السرعة ملتصقة بجلباب من الطين .

٣٠٢٦٢ - هَيْم  
Spirochètose aviaire (F).  
هو زهري الطير ، اطلبه .

٣٠٢٦٣ - هَيْمَج  
شجرة المند (السان) .


٣٠٢٦٤ - هَيْمَنُوكَرْبُس  
Hymenocarpus (S).  
Hyménocarpe, (F).

ويدعى ايضا شمردس . نبات عشبي برقي حولي وحيد



هويلية ثائية اللون





Dressé (F). Erect (E).

٣٠٢٧٥ - وَاكْد

هو الشيء القائم السوي الانتصاب ، يقال قرن واكد وساق واكدة .

٣٠٢٧٦ - وَاكْسُونِيَّةٌ ، وَطُصُونِيَّةٌ Watsonia (S). Watsonia (F). Bugle lily, Watsonia (E). Watsonia (D). Watsonia (I).

جنس نباتات معقودة التعريف على اسم الطبيب البريطاني واتسون (١٧١٥-١٧٨٧) وهي عشية دوقسية من فصيلة السيفيات. انواعها المعروفة نحو ٢٥ مهدا افريقية الجنوبية . سوقها قرصية الانتشاب . اوراقها عصفية النصل . ازهارها جميلة الشكل متعددة الالوان || اشهر انواعها ما يتبع .

٣٠٢٧٧ - وَاكْسُونِيَّةٌ اُرْجَوَانِيَّةٌ

Watsonia coccinea (S). Watsonia écarlate (F).

نوع من الواتسونية البرية ، شراخها الزهري يعلو من ٢٥ الى ٣٥ سم . اوراقها عصفية النصل . ازهارها سليل التجميع يمد من ١٥ الى ١٦ زهرة . ازهارها ناشرة القصاب المستنقعة ، لوها الى الاربعاني الزاهي || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٢٧٨ - وَاكْسُونِيَّةٌ قَصِيرَةُ الْوَرَقِ

Watsonia brevifolia (S). Watsonia à courtes feuilles (F).

نوع من الواتسونية البرية ، شراخها الزهري يعلو من ٢٥ الى ٣٥ سم . اوراقها عصفية الشكل قصيرة النصل . ازهارها سليل التجميع يمد من ٨ الى ١٢ زهرة . ازهارها محببة القصاب القيمة الاطراف . لوها الى البياض الموشح || تنورها يستمر طوال شهر ايار .

Descendant (F).

٣٠٢٧٠ - وَاكْبُطٌ ، هَاكِبُطٌ

هو نفيس العاعد . Descendant, Descending (E).

٣٠٢٧١ - وَاكِبِلٌ

هو المطر الشديد الغهم القطر ، والربيل ايضاً .

٣٠٢٧٢ - وَاَتٌ

وحدة مقياس قوة التيار الكهربائي .

Watt

Xylopia (S).

٣٠٢٧٣ - وَاَتٌ ، جَوْزَةُ الشَّرَاكِ

Xylopie (F).

جنس الشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة التفشديات . انواعها المعروفة قليلة ، مهدا الحبيشة ، وقد انتشرت في اكثر المناطق الافريقية . اوراقها متعاقبة معقفة كاملة ، نصلها جامد الصفحة قصير الزناد . ازهاره ابطية او محورية الاوتكاز مدهبة البتلات البيض . ثماره عنية . يزود حريفه الطعم فكهة مقوية تستعمل استعمال البهارات . اشهر انواعه وات الحبيشة .

٣٠٢٧٤ - وَاَتٌ الْحَبِشَةُ ، فِلْفِلُ السُّودَانِ

Xylopia aethiopica (S). Xylopie d'Ethiopie, Poivre d'Ethiopie (F). African pepper tree (E). Athiopischer Pfefferbaum, Mohrenpfeffer (D). Pepe d'Ethiopie (I).

نوع من الوات الزراعي يكثر في الحبيشة وقد تمت زراعته معظم الاقطار الافريقية الحارة . شجرته متوسطة القد . اوراقها متعاقبة معقفة . نصلها اهليلجي الشكل جامد الصفحة . ازهاره فردية التجميع ، ابطية الاوتكاز . ثماره عنية مستطيلة تلتف صفاً واحداً من البزور الاجانية الشكل || ثماره وبزوده من التوابل المنشطة الشائعة الاستعمال .



وات الحبيشة

## ٣٠٢٧٩ - وَأَسْوَطِيَّة كَثِيفَةُ الزَّهْرِ

٣٠٢٨٧ - وَأَحْصَ Osis

بقعة خضراء نضرة تفر لها الماء ويصعب التربة في وسط صحراء قاحلة .

٣٠٢٨٨ - وَأَحْصَ جنات كثير الريش .

٣٠٢٨٩ - وَأَحْصَ Lintole (F).

نمت تعريفني يطلق على الديدان والحشرات الدنبا الشاملة التي تعيش في التلي والأوسال .

٣٠٢٩٠ - وَأَحْصَ Héritier, Noir (F). Heir (E).

هو احد اقرباء الميت الذين يحق لهم شرعاً اخذ نصيب معين من تركته .

٣٠٢٩١ - وَأَحْصَ Hécérotrophe (F).

Heterotroph (E). هو كل نبات يعيش طفلياً على المواد الغذائية التي يحورها ويغلبها النبات النشاح .

٣٠٢٩٢ - وَأَرْفَ Verdoyant (F). Verdant (E).

ورف النبات : نسر واهتر فهو وارف اي ملتح أو ناضر .

٣٠٢٩٣ - وَأَرْفَ Frondicole (F).

الوارق ما كانت حياته مستمدة من الورقة أو أنه يعيش عليها .

٣٠٢٩٤ - وَأَرْفَ Chien de barger (F).

Shepherd's dog (E). الوارح هو كلب الراعي لانه يرع الوحش عن الثمن .

٣٠٢٩٥ - وَأَشْعَ، وَأَشْعَ Fioricole (F).

هي الجارسة ، الحشرة التي تعيش على الازهار .

٣٠٢٩٦ - وَأَشْعَ Anthophage (F).

Anthophagus (E). من يعيش على الازهار ونشأ ، راجع جابس .

٣٠٢٩٧ - وَأَشْطَ Cryptandra (F).

نمت تعريفني يطلق على كل ذكر من الحيوان طامس الشوار الشقي .

٣٠٢٩٨ - وَأَشْطَرْنِيَّة Wachendorfia (S).

Wachendorfia (F). جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المهادريات . ازهارها المزهرة اربعة ، مهدبا منطقة رأس الجراء الصالح في اطراف افريقية الجنوبية || جميعها تزهرية . اوراقها لائقة ، كبيرة ، مستطيلة النصال المغدة المندبة الاطراف . شاربخها الزهرية تنتهي بمجموعات من الازهار سلبية التركيب . ازهارها سداسية البتلات ، مستحبة العرف الخافت ، حيلة الالوان الزاهية .

٣٠٢٩٩ - وَأَشْطَرْنِيَّة Washingtonia (S).

Washingtonia, Pritchardia (S). Washingtonia, Pritchardia (F). جنس اشجار ترينيد من فصيلة النطليات معقودة التعريف على اسم واشنطن رئيس الولايات المتحدة || انواعها

Watsonia densiflora (S). Watsonia à épi dense (F).

نوع من الواتسونية الزيبية السبروتية . شراخها الزهري يعلى من ٦٠ الى ٩٠ سم . اوراقها صفية النصل تطول من ٤٥ الى ٦٠ سم . وتعرض نحو ١٢ سم . حصارها سبيك الخاشية تني اللون . ازهارها سبلي التجميع كثيف الترتيب يعد من ٤٠ الى ٥٠ زهرة . ازهارها حجنة القصاب المستطيلة ، قصيرة البتلات ، لونها الى الوردي ونشأ فسر وب يفس || تنورها يستمر من اواسط ايار الى اواسط حزيران .

## ٣٠٢٩٠ - وَأَسْوَطِيَّة مَرِيَالِيَّة

Watsonia meriana (S). Watsonie mériane (F).

نوع من الواتسونية السبروتية . شراخها الزهري يعلى من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها سببية الشكل ثمرس نحو ٣ سم . ازهارها سبلي التجميع ، وعلى الترتيب ، يعد من ١٢ الى ٣٠ زهرة . ازهارها حجنة القصاب مستطيلة البتلات لوناً الى البياض الناصع ونشأ فسر وب وردية ووشحة || تنورها يستمر طوال شهر ايار .

## ٣٠٢٩١ - وَأَسْوَطِيَّة مُنْتَصِيَّة الزَّهْرِ

Watsonia strictiflora (S). Watsonie à fleurs dressées (F).

نوع من الواتسونية الزيبية . شراخها الزهري يعلى من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها صفية النصل المستدق . ازهارها سبلي التجميع يعد من ١٢ الى ١٨ زهرة . ازهارها مستقيمة القصاب المنتصب التي تطول نحو ٤ سم . بتلاتها مستدلة للقد حماره اللون توسط كل منها نجمة بنفسجية اللون قرمزية الموضع || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

## ٣٠٢٩٢ - وَأَسْوَطِيَّة وَدِّيَّة

Watsonia rosea (S). Watsonie rose (F).

نوع من الواتسونية الزيبية السبروتية . شراخها الزهري متشعب الفروع يعلى من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها صفية النصل . ازهارها حجنة القصاب . قصاباً وبتلاتها متساوية في الطول و لوناً الى الوردي الزاهي || تنورها يستمر من تموز الى ايلول .

## ٣٠٢٩٣ - وَأَلْنِ Alizé (F). Trade-winds (E).

اسم يطلق على الرياح السائدة المنتظمة التي تهب بين دارتي الانقلاب من الشرق الى الغرب . ومما وأتاتان ، وأتن الشال الذي يهب من الشمال الشرقي ويجه نحو الجنوب الغربي وواتن الجنوب الذي يهب من الجنوب الشرقي ويجه نحو الشمال الغربي . والواتن تستعمل ايضاً بمعنى النصفه او النمت .

## ٣٠٢٩٤ - وَأَلْجَ Zoophage (F). Zoophagous (E).

الوالج ويدعى اللامح ما كان قوته اللحم سيواناً كان ام دوية ام سشرة .

## ٣٠٢٩٥ - وَأَجِب Débet (F). Debit (E).

هو ما يلزم دئمة بعد المحاسبة .

## ٣٠٢٩٦ - وَأَجِب الْأَدَامَ Exigible (F).

هو ما كانت المطالبة به ممكنة . Demandable (E).



واندرفية



واشطنونية

## ٣٠٣٠٧ - وَاقِ الشَّجَرِ\* ، غُرَابِ اللَّيْلِ

Nycticorax nycticorax (S). Bihoreau, Héron bihoreau (F). Night heron (E).

طائر من البشونيات ، جسمه متوسط القد يطول نحو ٥٦ سم. ثوبه متباين الألوان ، أسود الرأس والرقبة ، أخضر الظهر ، أخضر الصدر والبطن. يعيش على رأسه بموضع الريش العتيق الطويل اللبدي الأبيض .

## ٣٠٣٠٨ - وَاقِ صَغِيرٍ\* ، مِلْبَحِيَّةٌ

Ixobrychus minutus (S). Blongios nain (F). Little bittern (E).

طائر من البشونيات ، جسمه صغير القد يطول نحو ٣٧ سم. ثوبه متراكب الألوان ، ظهره اسمر يلعب بالأخضر ، بطنه إلى الصهبة ، باطن جناحه أبيض ، متقارص أصفر الجسم اسمر منتشر . ساقه إلى الخضار البحري .

## ٣٠٣٠٩ - وَاقِيَّةٌ

Evénement (F).

الواقعة هي الحادث ، أطلبه .

## ٣٠٣١٠ - وَاقِلٌ

Balaena japonica (S).

Baleine du Japon (F). Whale of the Japan (E). نوع من البال ، موطنه شمال المحيط الهادي وقد شوهد قرب كاليفورنيا وجزر ألوتيا . جسمه كبير القد ، رمعي الشكل ، يطول من ١٤ إلى ١٨ م. ثوبه نقي اللون ، رصاصي المواجه ، يمتد مع اقترابه من ثوب الظهر ويغير عند البطن . أثناء تقصير جرواً واحداً رخصه نحو الحول .

## ٣٠٣١١ - وَاقِيَّةٌ

Talles (F). Suckers (E).

الواقية هي فراخ الزرع الناتجة عن الاضطراب ، راجع شطه واضطراب .

## ٣٠٣١٢ - وَالْبَرِيَّانُ آخَرُ

Valériane rouge (F).

هو الزهرة الحمراء ، أطلها .

## ٣٠٣١٣ - وَاقِمٌ

Sarre (F).

هو المصري ، أطلبه .

## ٣٠٣١٤ - وَاقِلٌ

الواقن ، الواكبن ، نمت تمرني يطلق على كل طائر حاشن .

## ٣٠٣١٥ - وَاقِيْفٌ

Verdoyant (F). Verdant (E).

النباتات الواضحة المزهرة من كثرة الأوراق الخضراء .

## ٣٠٣١٦ - وَاهِيَّاتُ الْمَتَايِرِ

Lévirostrates (F). Levirostrata (E).

مرتبة من الطيور الجوارح التي تتميز بضفط متناظريها الكبيرة . فصائلها وأجناسها عديدة . أشهر فصائلها الخضاريات والشرقيات والأركوبيات .

## ٣٠٣١٧ - وَاقِيٌّ

Chacal (F).

هو ابن آوى ، أطلبه .

## ٣٠٣١٨ - وَبَاءٌ وَبَوَاتَانُ

Epidémie, Epiphytie, Epizootie (F). Epidemic, Epizooty (E).

كل مرض شديد العدوى سريع الانتشار يصيب الإنسان أو الحيوان أو النبات وينتقل من مكان إلى مكان ومن

المعرفة حمة جميعها أسطوانية السوق البليغة المائلة المنتصبة . أوراتها مروحية الشكل جميلة الخضار الفسقي ، كرهها مستطيل البود دقيق شائك ، شوكة صدر القد محجن . أوزارها عكولي التجميع ، كبير القد ، كثير التشعب . أوزارها خطوية التركيب . ثمارها ثروية جامدة اللب الماد القابلة . يزورها خشبية صلبة لا تصلح لشيء . مهدها كاليفورنيا وجزر الإليانيس الهادي . أشهر أنواعها ، الراسطونية القوية والواسطونية البليانية .

## ٣٠٣١٠ - وَاشْتِطُونِيَّةٌ قَوِيَّةٌ

Washingtonia robusta (S). Washingtonie robuste (F).

نوع من الراسطونية . جذعها عمودي الانتصاب ، غليظ القاعدة ، مستدق الطرف ، يطول من ٦ إلى ١٠ أمتار . أوراتها دودية مروحية قطرها نحو ٢٠٠ سم. ثوبها إلى الخضار الفسقي اللبس المواجه . كرهها شديد الخضار يطول نحو ١٠٠ سم. شوكة أصفر اللون صغير القد شديد التجميع . مهدها شواطئ نهر سكرمنتو في كاليفورنيا . تمثيل ويجود أيتها زيمت بشرط أن لا تنخفض الحرارة من ست درجات ستيفراد وأن يؤمن لها الري الوافي عند الحاجة .

## ٣٠٣١١ - وَاشْتِطُونِيَّةٌ لَيْفَانِيَّةٌ

Washingtonia filifera, Pritchardia filifera (S). Washingtonie filamenteuse (F).

نوع من الراسطونية . جذعها أسطواني مستقيم يرتفع من ٦ إلى ١٠ أمتار . أوراتها دودية مروحية قطرها نحو ١٥٠ سم. ثوبها إلى الخضار الفسقي الزاهي يعلوها خيوط ليفية شقراء اللون تشبه الشعر . كرهها دقيق متين شائك طوله نحو المتر . مهدها كاليفورنيا ، تحصل الحرارة المنخفضة سي الست درجات ولا تحشى العنقش . تمثيل في جميع الأتربة لكنها تفضل الحوارة حيث تجود وتنمو بسرعة .

## ٣٠٣١٢ - وَاقِسٌ

Pathogène (F). Pathogen (E).

كل متفطر أو كائن حي يسبب مرضاً ما .

## ٣٠٣١٣ - وَاقِدَةٌ

Grippe (F). Influenza (E).

هي الانفلونزا ، مرض معد يصيب الحيوانات ولا سيما الخيل .

## ٣٠٣١٤ - وَاقِيٌّ

Préventif (F). Preventive (E).

٣٠٣١٥ - وَاقِيٌّ

Botaurus stellaris (S).

Butor étoilé (F). Bittern, Common bittern (E).

طائر من فصيلة البشونيات ، طويل العنق والمنقار والرجلين والأظفار ، قصير الزنكي . أصفر الزنكي . أصفر الريش المرقش المشيح يحب العزلة فيختفي في النهار بين الأسل ويكثر الصياح في الليل . قال الشاعر مرقش البدوي :

ولقد حدثت وكنت لا أدعو على واق وسام  
فاذا الاشام كالآيا من والأيا من كالآسام

وكذلك لا خير ولا شر على أحد يندم

## ٣٠٣١٦ - وَاقِ أَبْيَاضٍ، سَبِيحَةٌ

Ardeola rallioides (S). Héron crabier (F).

Boatbill (E).

طائر من البشونيات ، صغير القد طوله نحو ٤٢ سم. ثوبه إلى البياض الأخضر يحمل على رأسه طرة من الريش المستطيل اللبدي الأبيض والأسود . منقاره إلى الزرقعة ، أسود المنتش والقاعدة .



واق



واق الشجر



واق صغير

## ٣٠٣٣١ - وبيلة ٥ Calonectria (S).

جنس فطور مجهرية من الساعيات وفصيلة الشوفيات .  
اعانتها غنفة ، محبة السطح ، مرجانية اللون ، تركت  
حل رنية نائفة . تكاثرت صفة الشكل . وبوها عديد  
الحلابة البثرية الانقسام المتوازي || انواعها المزدوجة قليلة  
اعرفها وبلة الزرع .

## ٣٠٣٣٢ - وبيلة الزرع ٥

Calonectria graminicola, C. nivalis, Fusarium nivale, F. miniatum, F. loliae (S). Moisissure nivale des céréales, Fusariose des céréales (F). Snow mould of cereals (E). Schneeschimmel (D).

فطر مجهرى يركب الزرع وأخصها السيلم والحلطة والشروان  
وبعض النجيليات البرية || مظهره الخارجي يكن حل  
شكلين : الاول عندما يصيب الزرع في اياه خبه فيقوم  
ككتلة من القطر المنفوش تلتصق ثوابي الزرع وعصفه  
كالحلقة || والشكل الثاني عندما يصيب الزرع بعد محبه  
فيبدو اذ ذاك لطحاً خلية لا يقياسه الشكل والحجم ، لونها  
الى النبرة تملو الصفص والاحما والفلانيات || اعراضه  
منطقة برطوبة التربة والعوامل الجوية الملائمة || يكافح  
بتطهير البذار بواسطة احد الفطريات الناجمة ومنها املاح  
الذئبق .

## ٣٠٣٣٣ - وبيرة ٥ Phacelia (S).

Phacelia (F), Phacelia (E).  
الاسم العلمي من اليوناني يعنى « حزة » . جنس نباتات  
عشبية ، حولية او محولة من فصيلة النجميات . انواعها  
المعروفة عديدة منتهية المناطق الحارة من المليون القديم  
والجديد || بعض انواعها الحولية مرعوية تزور للاقارب  
والانعام ، سوقها خلية الصفاء ، فراء . اوراقها متعاقبة ،  
ريشية . ازهارها سبلي التجميع ، ازهارها رخاوية يحمرها  
النمل وهي زرقاء اللون او بنفسجية او ليلية او بيضاء ||  
اشهر انواعها التالية .

## ٣٠٣٣٤ - وبيرة جرسية ٥

Phacelia campanularia (S), Phacelia campanulée (F).  
نوع من الويرة التريينية . عشية حولية تملو من ١٥ الى  
٣٥ سم . اوراقها احليلجية الشكل مفردة وسنة . ازهارها  
بيضاء اللون . توجعها مفرقة الشكل ، لونها الى  
الزرق المائقة يملوها عند قواعدها خمس نقط سود ||  
تنويرها يستمر من حزيران الى ايلول .

## ٣٠٣٣٥ - وبيرة لبيدة ٥ Phacelia congesta (S).

Phacelia congesta (F), Phacelia dense (S).  
نوع من الويرة التريينية . عشية حولية تملو من ٣٥ الى  
٥٥ سم . ساقها وفروعها مزينة الصفاء . اوراقها ثلاثية  
ار خالصة او سباعية التثريب القدي . ازهارها كبيرة القند  
قطرها نحو ٦ سم . لونها الى الزرق المائلة . توجعها خلية  
البشرة ، فصلها سنانية الشكل . اسديتها قليلة النفوش ||  
تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

## ٣٠٣٣٦ - وبيرة لرجة ٥ Phacelia viscosa (S).

Phacelia viscosa (F).  
نوع من الويرة . عشية حولية تملو من ٣٥ الى ٦٥ سم .  
اوراقها شبه قلبية الشكل ، تطلو نحو ٦ سم . نساها  
لزنية ، مسنة الخنار . ازهارها معتدة الحميم ، قطرها  
نحو ٣ سم . لونها الى الزرق تتصلها بقبة اسطوانية ||  
تنويرها يستمر من تموز الى آب .

منطقة جغرافية الى اخرى . وهو بذلك يتنص من الامراض  
المعدية التي لا تنتقل من منطقة جغرافية الى اخرى .

## ٣٠٣٣٩ - وباء مؤذني ٥ Enzootie (F), Enzooty (E).

هو الوباء المحدد الانتشار الذي لا يتجاوز المزرعة او  
المنطقة الجغرافية .

## ٣٠٣٤٠ - وباء ٥ Epidémiologie (F).

Epidemiology (E).  
الوباء علم يبحث في مائة الامراض الوبائية وفي اسبابها .

## ٣٠٣٤١ - وبات ٥ Adaptation

من وبات بالمكان : اتم . الوبات هو الالاء الموق  
الناجم .

## ٣٠٣٤٢ - وبكار ٥ Tridax (S), Tridace (F).

بجسة عشبية حولية برية من فصيلة المركبات . ساقها  
مزنية الفروع تملو نحو ٩٠ سم . اوراقها متعاقبة مثثة  
انفصوص المدية الشاذكة . ازهارها كثيف التجميع .  
رؤسها الزهرية صفراء اللون ، شاذكة السينات المثثة  
الحسك . بزورها ريشية التهذيب . تنويرها يستمر طوال  
شهر حزيران .

## ٣٠٣٤٣ - وباط ٥ Rabougrissement (F).

Stunted (E).  
هي حالة كل حيوان او نبات شذ يجنبته وقلة نمو عن  
معدل نوعه || أما الحيوان او النبات الذي يشذ يصغر  
جسمه عن معدل نوعه فهو اضعب وهي زباه .

## ٣٠٣٤٤ - وبك ٥ Disproportion

الويد هو النقص الجسموري المائب ، ح او باد .

## ٣٠٣٤٥ - وبير ٥

هو الزل ، حيوان من السمانيات ، اطله .

## ٣٠٣٤٦ - وبير ٥ Poll, Duvet (F), Hair, Down (E).

الوبر هو للابل واللاما والارانب ونحوها كالصوف لقم .  
وهو احدى خامات النسيج المشهورة تستخدم في صنع  
المسوجات المختلفة وسور اهركات التي تترص فرطوبة .

## ٣٠٣٤٧ - وبير ٥ Cathcartia villosa (S).

Cathcartia velus (F).  
نبات عشبي حولي بري وريبي من فصيلة الخشاشيات .  
ساقها فروع كثيفة الزغب المستطيل تملو نحو ٣٥ سم .  
اوراقها ريشية الشكل مستعرضة . تصلها عشن الصفص ،  
خلى البشرة ، مهدب الاطراف . زغبها واحداً جزوية  
اللون . ازهارها ناجية فردية كبيرة القند ، قطرها نحو ٥ سم .  
لونها الى الصفار الكبريتي الزاهي || تنويرها يستمر  
طوال شهر حزيران .

## ٣٠٣٤٨ - وبيري ، زطبي ٥ Tometeux (F).

Tometous, Downy (E).  
نمت تمريني يطلق حل اجزاء النبات والحيوان المنطاة  
بور قصير نام .

## ٣٠٣٤٩ - وبس ٥ وبس الجرو : فتح فيه .

## ٣٠٣٥٠ - وبك ٥ Rut, Chaleurs (E), Rut, Heat (E).

طلب الضأن او بالاسرى الانتاج للصفاد .

مفتول، أما إذا انبسط يدي الصفاق كما في عضلات الظهر. أما وظيفته فهي التوسط بين أطراف العظام والمضلات أو بين العضلات نفسها.

٣٠٣٤٧ - **وَتْر** (F), Odd, Uneven (E).  
الوتر ما لم يتشغل من العدد.

٣٠٣٤٨ - **وَتْر التماس** (F).  
Corde de contact (F).

٣٠٣٤٩ - **وَتْر الزاوية القليمة** (F).  
Hypoténuse (F).  
Hypotenuse (E).

٣٠٣٥٠ - **وَتْرِيَة ، فَرْدِيَة** (F).  
Imparité (F).  
Imparity (E).

٣٠٣٥١ - **وَتْرِيَة التركيب** (F).  
Imparipennée (F).  
نمت وسمي يطلق على الأوراق المركبة المنتهية بورقة فردية واحدة.

٣٠٣٥٢ - **وَتْر** (F).  
Waltzie (S).  
Waltzie (F).  
جنس نباتات حولية برية وتربيتية من فصيلة المركبات. أنواعه المعروفة نحو ١٢ شكلها شكل السرخس. سويها فراء. أوراقها متناحية جامدة النصل. أزهارها رؤسية. يزدهر بجمرة بانتداد متقادي الشكل || أحرف أنواعه وأشهرها ما يلي.

٣٠٣٥٣ - **وَتْرَة بَيْضَاء** (S).  
Waltzie nivea (S).  
Waltzie blanche (F).

نوع من الوتر، عشبته تملو نحو ٥٠ سم. رؤسيها الزهرية كثيرة العدد. أزهارها إلى القربى، قناباتها مذبذبة الأطراف || بيضاء اللون || تنورها يستمر طوال فصل الصيف.

٣٠٣٥٤ - **وَتْرَة عَنَكْرِيَة** (S).  
Waltzie corymbosa (S).  
Waltzie en corymbe (F).  
نوع من الوتر، عشبته تملو نحو ٦٠ سم. أزهارها عشكولي التجميع، لبه القربى. رؤسيها الزهرية كثيرة العدد. أزهارها وردية اللون قناباتها مستطيلة لسة بيضاء اللون. تنورها يستمر طوال فصل الصيف.

٣٠٣٥٥ - **وَتْرَة مَهْدَبَة** (S).  
Waltzie aurea (S).  
Waltzie dorée (F).

نوع من الوتر، عشبته تملو من ٥٠ إلى ٧٠ سم. أزهارها عشكولي التجميع، وعلى القربى المتباد. رؤسيها الزهرية كبيرة النصف قليلة العدد. أزهارها وقناباتها ذهبية اللون || تنورها يستمر من آب إلى أيلول.

٣٠٣٥٦ - **وَتْلُوف** (S).  
Cichorium intybus (S).  
Witloof, Chicorée à grosse racine (F).  
Witloof (E).  
نوع من المهنداة الزراعية الخنازية. وهي بقلة مأكولة الجذر والأوراق تكثر زراعتها في البلاد الأوروبية. ترطب في الأرض الخوارة المتوسطة الانسجام الفنية بالمواد العضوية. زراعتها تتطلب بعض العناية أخصها طعم الأوراق عند ازدياد الإبراء الأولى منها || أما الوتلوف فهو يحوي ما قدره :

من الماء	٩٣,٠٠ ٪
من المواد الأزوتية	١,٢٢ ٪
من المواد الدهنية	٠,٤٧ ٪
من المواد المستخلصة	٠,٣١ ٪

٣٠٣٥٧ - **وَبِيرَة مُهْدَبَة** (S).  
Phacelia purshii (S).  
Phacélie frangée (F).

نوع من الوبرية. عشبته حولية تملو من ٢٥ إلى ٥٠ سم. أوراقها السفلى مفتحة طول نحو ١٠ سم. وتتسم إلى ١٥ سكة. أوراقها العليا لائحة، خاسية السك. أزهارها صلبة النصف قطرها نحو ١٥ سم. لونها يراوح بين الأزرق والبيجي. فلق توجعها مهدبة الأطراف || تنورها يستمر من أيار إلى حزيران.

٣٠٣٢٨ - **وَبِيلَة ، وَبِيل** (F).  
Fagot (F).  
Faggot (E).  
حزمة الخشب اللدقيق الميدان.

٣٠٣٢٩ - **وَت** (F).  
Cri du palombe (F).  
الوت والوت : صياح الورشان.

٣٠٣٤٠ - **وَتَح** ، **كَبْنُود** (S).  
Capnodium (S).  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرتجات. أنواعه عديدة، منتشرة في معظم أقطار العالم، تركب الحشويات والريثون والصنصناف والسنديان إل... أعصابها مكررة ترتكز على أمن دقيقة تنشب في وتبات المشج. أبقاها الزقية مؤنثة التركيب توتية الشكل سمراء اللون || وهو تركب على السرق والأضغان وبشرة الاقنان ولا يمتري الأوراق. مظهره الخارجي وشاح كالصمغ لا قياسي الكثافة والسك، لزج الملمس، اسمر اللون.

٣٠٣٤١ - **وَتَح المَهِلُون** (S).  
Zoplia rhizophila (S).  
فطر مجهرية يدي من الرتجات تركب جشور المهلون والسفدر فيزها وقد يقضي عليها. أعصابه سود كروية الشكل. زته يقضي مذهب الرأس والنقب، مشدود الوسط يحسن ٨ أبراج ثنائية البويذات المائلة.

٣٠٣٤٢ - **وَتَحِيَّات** (S).  
Capnodiaceae, Perisporiaceae (S).  
Périssporiaceae, Capnodiaceae (F).  
F. Perisporiaceae, Capnodiaceae (E).  
فصيلة فطور مجهرية تنتمي إلى رتبة الرتجات. أبقاها محصورة متراكبة منتفخة سمراء اللون. يوتها يتحرر عند نفع الإصاع، من مرق رأسي لا نظامي الانشقاق وهو كثير العدد أسطواني الشكل أو يبيضا، خيرات لا قياسية العدد || أجسامها وأزراعها كثيرة أمي تركب النبات وتطفل عليه فقليلة، أشهرها التوح والثان.

٣٠٣٤٣ - **وَتَد** (F).  
Pile, Stake (E).  
عود من عشب متوسط الغلاظة والطول يستعمل للفرز في المناع.

٣٠٣٤٤ - **وَتَدَة** (F).  
Tragus  
هنة مثناة الزوايا مركزها عند فوطة صمغ الأذن.

٣٠٣٤٥ - **وَتَر** (F).  
Chord (E).  
جسم خيطي مرن يستعمل في بعض الآلات الموسيقية المعروفة بالآلات الوترية. تصنع الأوتار عادة من أمعاء بعض الحيوانات ومن أسلاك معدنية. ويجب أن يكون الوتر منسوب الغداء والكثافة في كامل طوله.

٣٠٣٤٦ - **وَتَر** (F).  
Tendon (F).  
Tendon, Sinew (E).  
الوتر صغيرة من الألياف تتكون من الحبيبات العضلية التي لم تتحول نهائياً إلى نسيج عضلي. وهو عادة مستدير



وتح المهلون



وتلوف



ونبة



ونفة



وتير

### ٣٠٣٧١ - وكلة \* Ampullacera (S).

Ampullacera (F). Ampullacera (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهدبات الابريل .  
انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من عطر زيلندا الجديدة ||  
تألف الخلدان حيث تكثر التنبؤات البحرية التي تعيش  
عليها || اصداؤها شبه اجاصية الثوزن ، متباينة الحجم ،  
كبيرة القفوة ، ملونة ، يكثر فيها الجوزي والكسني  
التي المواجه || جعلها مأكولة ، مرغوبة فيه .

### ٣٠٣٧٢ - وتل Structure

الزئ هو البنية ، راجعها .

### ٣٠٣٧٣ - وتل Séléctionner (F). To Improve (E).

وتل الحيوان والنبات : أصله ويمكن فيه مبادئ الاستخاب .

### ٣٠٣٧٤ - وتل Parenchyme (F). Parenchyma (E).

هي نسيج الاعتناء والخضيب في نصل الورقة من كل  
نبات .

### ٣٠٣٧٥ - وكيم وكيم المكنز لحماً من المواشي .

### ٣٠٣٧٦ - وكير \* ، غطارية Gautheria (S).

Gauthéria (F).  
جنس نباتات معمرة من فصيلة الخلدنيات . انواعه عديدة ،  
مهدا بلاد الشرق وأمريكا . معظمها جنات صغيرة القند  
متنونة . اوراقها متعاقبة ، بيضيه ، حرة . ازهارها كروية  
الشكل . ثمارها لحية ، مأكولة ، حبة القالب والتركيب ،  
خاصية الخمر || اشهر انواعه ما يتبع .

### ٣٠٣٧٧ - وكير شكلون Gautheria shallon (S).

Gauthéria shallon (F).  
نوع من الوثير وهو جنبة متصبية قراء تملحو نحو ١٠٠ سم .  
اوراقها كبيرة القند تملحو من ٨ الى ١٠ سم . نصلها جلدي  
الصفحة سنن الخمار . ازهارها عتقوي التجميع ، تاجي  
الارتكاز . ازهارها صغيرة القند بيضاء اللون و ودية  
ثمارها الى السرة الزرقاء المواجه . كمايرها لحية مأكولة .  
تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

### ٣٠٣٧٨ - وكير مداد ، غطارية كندية ، عنب Gautheria procumbens (S).

القطا  
Gauthéria couchée, Thé de Terre-Neuve, Thé de montagne (F). Checker berry, Winter-green (E). Canadischer Tee, Wintergrün (D). Tà di Terranova, Tà del Brasile (I).  
نوع من الوثير وهو نبات عارض مداد . اوراقه تملحو نحو  
٥ سم . وتعرض نحو ٣ ، نصلها جلدي الصفحة سنن  
الخمار . ازهارها فردية الترتيب ، ابيلة الارتكاز ، نويا الى  
اللباس الموشم بالودي . اوراقه تشتمل امتثال الشاي  
لانها عطرية الرائحة ولا تملحو من بعض المنافع الصحية وقد  
يستخرج منها عطر « الفانيلين » || تنويره يستمر طوال  
فصل الصيف .

### ٣٠٣٧٩ - وكير وتشي Gautheria vitchiana (S).

Gauthéria de Veitch (F).  
نوع من الوثير وهو جنبة متصبية قراء تملحو نحو ١٠٠ سم .  
اوراقها اهلجية مدينة القاعدة تملحو نحو ٨ سم . نصلها  
جامد الصفحة ، سنن الخمار ، حلي للتسني ، حلي المروق .  
ازهارها عتقوي التجميع . ازهارها بيضاء اللون ،  
صغيرة القند ، ثمارها حنطية اللون يرتقالية المواجه . كمايرها  
لحية مأكولة || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

### ٣٠٣٨٠ - وتشي Autoctone (F).

Autocthonous (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل من كان مقيماً في وطن اسلافه .

### ٣٠٣٨١ - وتين وزن الماء ، دام ولم يتفعل .

### ٣٠٣٨٢ - وتين

الوتين هو بروز اغلول عند الولادة في وضع خاص  
يختلف من الوضع الطبيعي .

### ٣٠٣٨٣ - وكيتشة Mât (F). Meatus (E).

الفجوة بين خلايا النسيج النباتية . ج وقع ونواتج .

### ٣٠٣٨٤ - وكيتشة Pal, Pieu (F). Pale, Stake (E).

ما رز في الأرض أو الحائط من خشب .

### ٣٠٣٨٥ - وكير Rosier blanc (F).

هو الوردة الابيض ، اطلبه .

### ٣٠٣٨٦ - وكيرة Décade (F). Decade (E).

اسم لقدع الشرة .

### ٣٠٣٨٧ - وكيتشة Mycetopus (S).

Mycétape (F). Mycetopus (E).  
جنس حيوانات مائية من الرخويات صفحيات الخلدان  
وفصيلة الياضات . انواعها المعروفة قليلة العدد معظمها  
من عطر انهر وبحيرات امريكا الجنوبية || اصداؤها شبه  
بيضية الشكل ، زرقمة التعلد ، تملحو من ٦ الى ١٢ سم .  
وهي متساوية المصاريع ، لامتناهية الاصلح . تتميز  
بامتلاحة الابريل المنجية بقراص كتنكاف القفود تشب  
في منور الجبريات والانهرو وفي الحصى ايضا || تعيش  
جمجمرات كبيرة العدد . لحويها مأكولة ، متوسطة الصنف .

### ٣٠٣٨٨ - وكاجكة كثرة اللحم .

### ٣٠٣٨٩ - وكاركة كثرة الشحم .

### ٣٠٣٩٠ - وناقية هي الياص ، املايه .

### ٣٠٣٩١ - ونالكة Tectologia (F). Tectology (E).

الوالة البحث الشوزي الصرف الهيكلية العضوية .

### ٣٠٣٩٢ - وتامكة Colladonia (S).

Colladonia (F). Colladonia (E).  
جنس نباتات عشبية معمرة برية من فصيلة الخلديات .  
انواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد  
الحارة والمعتدلة الحرارة || سفلها قراء متغايرة الارتفاع .  
اوراقها متعاقبة ، لتياسية الشكل ، منها الرجمة المستطيلة  
والقلبية والممنصصة والريشة . ازهارها صوبالي التجميع ،  
طرني الارتكاز . ازهارها صفراء اللون . اشهر انواعها :

### ٣٠٣٩٣ - وثامة صغيرة الثمر C. microcarpe (S).

### ٣٠٣٩٤ - وثامة مجنحة C. alata (S).

### ٣٠٣٩٥ - وثامة مشرمة C. crenata (S).

### ٣٠٣٩٦ - وكير

الور : الذي خلا من الحويثات المنوية .

٣٠٣٩٦ - **وحيين** - الوحيين هو شط الوادي المزروع .

٣٠٣٩٧ - **وحاف** - Banc (F). Layer bed (E).

من الطبقة من الرمل أو الساف من الصخر أو الرصيف من المربان الخ...

٣٠٣٩٨ - **وحال** - Terrivome (F). Terrivomous (E).

الرحال قاذف الرجل أو التراب . بركان وحال .

٣٠٣٩٩ - **وحادي** - Sporadique (F). Sporadic (E).

هو من النبات من ألف البش منفردا .

٣٠٤٠٠ - **وحدة** - Unité (F). Unity, Unite (E).

اصطلاح يستخدم في العلوم الطبيعية أساسا لقياس . في النظام الفرنسي لمقاييس الاطوال والمساحات والاحجام ، يعتبر المتر والمتر المربع والمكعب وحدة هذه المقاييس ومن اجزائه ومضاعفاته اشقت المقاييس الاخرى . وفي الاوزان يعتبر الغرام واجزائه ومضاعفاته وحدة القياس . وفي النظام الانكليزي يعتبر البرد وحدة لقياس الاطوال والمساحات والاحجام ، والباوند وحدة الاوزان . وفي الهندسة تعتبر الدرجة وحدة القياس وهي الزاوية الناتجة عن تقسيم الدائرة الى ٣٦٠ قسما متساويا . وفي علم الحرارة تعتبر السعة وحدة القياس ويبر عنها بكمية الحرارة اللازمة لرفع حرارة غرام واحد من الماء النقي من درجة ١٥ الى ١٦ مئوية . وفي الكهرباء يعتبر الامبير وحدة التيار ويبر الاوم وحدة للمقاومة . وفي علم الصوت فوسدة القياس وحدة القياس هي الشمة . وفي علم الصوت فوسدة القياس هي الجبل .

٣٠٤٠١ - **وحدة غذائية** - Unité nutritive (F). Nutritive unity (E).

هي عنصر الغذاء الرئيسي او القيمة الغذائية القابلة للتشيل الموجودة في مادة معينة او شكه مقرر . لذلك نقول ان التشكم الصحيح يجب ان يركز على محوى العناصر الغذائية وما ينجم عنه من وحدات . راجع جدول العلف .

٣٠٤٠٢ - **وحركة** - Nycteria (S). Nyctère (F).

جنس حيوان من فصيلة الحوريات . انواعه سبعة ، تعيش بنجويث قصبة الأنف وبالزوائد الجلدية التي تعمل سحار التجويف الامين والايسر . اجسامها صغيرة القد . طولها يراوح من ٧ الى ٩ سم . بما فيه الذنب الذي يطول من ٣ الى ٤ سم . اثوابها الى الصفة الخطية المختلفة المواج ، بطونها زاهرة . موطنها افريقية الشرقية والحبيشة والسودان ومصر وليبيا وتونس والجزائر ومراكش . تألف الكهوف والمغاور والبيوت الخربة . تعيش جماعات قليلة العدد . قوتها الحشرات والدوريات والمغولم .

٣٠٤٠٣ - **وحيريات** - Nycteridae (F). Nyctéridés (F).

فصيلة من الحفائش مركزها بين الحفائش والمشات . انواعها ١١ ينتمين الى جنسين البقرة والمطبات . من ميزاتها الخاصة زوائدها المخرية المزدكفة وكبر آذانها الزائدة القاعدة الملمومة . اناتها تضع جروا واحدا تحمله دائما حتى بلوغه . موطنها افريقية الشرقية وبسلاط الحبيشة .

٣٠٣٨٠ - **وكيرة** - Clotson (F).

هي الحاجز المكيوي . Dividing membrane (E).

٣٠٣٨١ - **وكيكة** - مستند - Document

هي في القانون التجاري كل معاملة خاصة بالبيات المسافرة ان صادرة او واردة .

٣٠٣٨٢ - **وكيكة التأمين** - Police d'assurance (F). Insurance policy (E).

هي المقد المحر الذي يثبت انعقاد التأمين وشروطه .

٣٠٣٨٣ - **وكيكة** - Pierre à briquet (F). Flint (E).

سجر القنادة . ولا والذي اخرج النار من الرميكة .

٣٠٣٨٤ - **وكيكة محددة** - Acilius sulcatus (S). Acilius silloné (F).

حشرة مائية قانصة من فصيلة المكنوزيات ورثة مهديات الاجنحة . موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف المنطق والندران . تعيش في الماء . تنفس كل ما تيسر لها من الحشرات الدنيا والارالي ولا تترك الماء الا في زين الكرم والتسكة لانها تمنع المكن على الصفحات السفلى من تعال الاوراق التي تلتاس سطح التربة . جسمها شبه بيغي الشكل بطول نحو ١٨ مم . ثوبا الى الخيلي الاسمر المواج . ظهراتها مائل للصفحة عند الذكر ، عنددها عند الانثى . لها جبل واحد في الحولى . يرقبها تسمى الى الماء بعد التفنق بنحو اربعة ايام وهي قانصة كالشرة الجملانة .

٣٠٣٨٥ - **ووج** - هو عود الرج ، اطله .

٣٠٣٨٦ - **وجار** - Chenil (F). Dog-Kennel (E).

الوجار . ج. اوبرة وجير . هو ماوى الكلب ويكون عادة من خشب . وفي الاصل هو سرب الفصيح والذئب والشلب ونحو ذلك .

٣٠٣٨٧ - **وجنب** - الوجنب هو انعقاد اللبا في الفرع .

٣٠٣٨٨ - **وجنية** - Cure, Fournée (F). Batch, Baking (E).

ما يتوحيه الجفاف من تبخ على دفعة واحدة .

٣٠٣٨٩ - **وجنر** ، وجنر - Garenne (F). Warren (E).

هو ماوى القواقع .

٣٠٣٩٠ - **وجن** - Moraine (F).

حجر على طانية جليدية .

٣٠٣٩١ - **وجه** - Face (F).

٣٠٣٩٢ - **وجنهي** - Facial (F).

٣٠٣٩٣ - **وجوب الأداء** - Exigibilité (F). Exigibility (E).

هو ان يصبح الدين واجبا ادائه الى الدائن .

٣٠٣٩٤ - **وجبات** - Acorées (F).

سبط من فصيلة القنليات .

٣٠٣٩٥ - **وجيد** - Terrain plat (F). Level ground (E).

ما استوى من الارض . ج. وجدان .



ويرة محددة



وسرة

Monopátale (F). **وَحِيد البَتَكَة** ٣٠٤١٧  
Monopetalous (E).  
نمت تمرينى وصى يدل عل التوزيع الوحيدة البتلة .

Monorchide (F). **وَحِيد الخَيْبَكَة** ٣٠٤١٨  
Monorchid (E).  
من الحيوان ما كان ذا خصية واحدة .

٣٠٤١٩ - **وَحِيد الخَلِيَة**  
Monocellulaire, Unicellulaire (F). Monocellular,  
Unicellular (E).  
مركب من خلية واحدة ، او ذو خلية واحدة .

Monostomique (F). **وَحِيد اللِّدَوَة** ٣٠٤٢٠  
Monostomic (E).

Uniflore (F). **وَحِيد الزَّهْرَة** ٣٠٤٢١  
Uniflorous (E).  
ذو زهرة واحدة .

Unicaula **وَحِيد السَّاق** ٣٠٤٢٢

Monandre (F). **وَحِيد السَّدَاة** ٣٠٤٢٣  
Monandrous (E).  
من النبات ما كان ذا عضو تذكير واحد .

Monostigmé (F). **وَحِيد السِّمَة** ٣٠٤٢٤  
Monostigmatic (E).  
ذو ميسم واحد أو أطوية واحدة .

Unilabé (F). **وَحِيد الشِّفَة** ٣٠٤٢٥  
Unilabiate (E).  
ذو شفة واحدة .

Unisexué (F). **وَحِيد الشَّخْص** ٣٠٤٢٦  
Unisexual (E).  
ذو أعضاء تناسلية ذكرية أو انثوية .

Monoploid **وَحِيد العِثْرَة** ٣٠٤٢٧  
هو كل نبات قوام تركيبه البدائي فترة بسيطة .

Unilobé (F). **وَحِيد الفص** ٣٠٤٢٨  
Unilobate (E).  
نمت تمرينى يطلق عل كل نصل ورقة وحيد الفص .

Monostépalé (F). **وَحِيد الصِّفْلَة** ٣٠٤٢٩  
Monostepalous (E).

Monocotylédone (F). **وَحِيد الفِصْلَة** ٣٠٤٣٠  
Monocotyledonous (E).  
اسم أو صفة كل نبات من ذوات الفلقة الواحدة .  
والنباتات وسيدات الفلقة تولد اسد قسي مستورات  
البزور .

٣٠٤٣١ - **وَحِيد القَرْن** هو الكركدن الهندي ، أطليه .

Monocéros, Licorne (F). **وَحِيد القَرْن** ٣٠٤٣٢  
Monoceros (E).

كوكبة نجوم جنوبية الموضع مركزها بين الكلب الاكبر  
والكلب الاصغر والجبار والشمسج الاثنى . وهي تمثل  
حيوان غرابي له جسم الفرس وني رأسه قرن واحد ||  
نجريها متقاربة الاشكال والالوان ولربط عددها ٢١ .

Unipolaire (F). **وَحِيد القُطْب** ٣٠٤٣٣  
Unipolar (E).

Bête sauvage (F). **وَحْش** ٣٠٤٠٤  
Wild animal (E).

Bête féroce (F). **وَحْش فَهَار** ، **سَبَّع** ٣٠٤٠٥  
Carnivorous animal (E).

Férin (F). **وَحْشِي** ٣٠٤٠٦  
نمت تمرينى يطلق عل كل ما هو متصل بالحيوانات  
الوحشية .

٣٠٤٠٧ - **وَحْشِي**  
الوحشي الجانب الخارجى او الايمن من الرشفة ومن كل  
شيء يقابله الانسى اى الجانب الداخلى او الايسر .

Pustule (F). **وَحْشَة** ٣٠٤٠٨  
Pustule, Pimple, Blotch (E).  
هي البثرة تركب اللنج الحيوانية والنباتية . ج وسمى .

٣٠٤٠٩ - **وَحْف**  
الوصف : النبات الريان من اى فئة كان .

Terre noire (F). Black soil (E). **وَحْفَاء** ٣٠٤١٠  
التربة السوداء وتسمى اللديجور .

Rocher noir (F). Black rock (E). **وَحْفَة** ٣٠٤١١  
هي الصخرة السوداء .

Mud, Boue, Bourbe (F). **وَحْل** ٣٠٤١٢  
Fange, Mire, Silt (E).

مزيج من الطين وبعض المواد العضوية يوس في المنابع  
وعلى صفات مجاري الماء .

٣٠٤١٣ - **وَحْن** ، **لُؤْس**  
رواسب طينية رملية علامة الاحافير تنفي بعض الآثربة  
في مواقع معينة . أما كلمة لوس فن وضع الامير مصطلى  
الشهابي .

٣٠٤١٤ - **وَحْشَح** \*  
Chalcopellis afra (S).  
Chalcopelle africaine (F).

طائر من الزغل . اعطاه تيمد من افريقية الشرقية الى  
البالية || جسمه صلب الفذ . يطول نحو ٢٠ سم . رأسه  
الى الصهوة الرمادية . ظهره وذنبه الى السمرة الكستنية  
المزاج . انفيه اسود . جوشته اخر . بعته الى البياض  
الافير . جناحه الى السمرة السوداء . حدقة عينه  
كالقوت . منقاده اسود . وجلاه الى الجزرة || ملجته  
الحياقي جمالي . سر به يمد عشارت الازواج . يالغ  
الغياض وصفات مجاري الماء . قوته البزور والحبيب ||  
يدلن حش في الادفال الاثية . الاثنى تضع من يصفين  
الى ثلاث يصفات تحضنها بمنابرة الذكر .

٣٠٤١٥ - **وَحِيد الإزْهَرَاك**  
Monocarpien (F).  
Monocarpous (E).

نمت تمرينى يوصف به النبات الذي يزهر ويثمر مرة  
واحدة .

٣٠٤١٦ - **وَحِيد الأسَّاس**  
Monobasique (F).  
Monobasic (E).



وَحْش



انواعها المعروفة نحو ١٥ اعطانها تحت من الجزيرة العربية الى اوروبا الجنوبية وافريقية الشمالية || تألف الرمال والقياني . قوتها الذباب والحمام والحشرات والديدان || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، رشيقة ، تطول من ١٨ الى ٢٢ سم . انواطها بلون الرمال وقد تمتاز البيئة التي تعيش فيها .

Osmia (S).

Osmie (F). Osmia (E).

جنس حشرات جارية من الحبوبيات غشائيات الاجنحة وفصيلة المشطليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها صغيرة ، قريبة الشبه من النحل ، تطول نحو ١٥ سم . انواطها قائمة تكثر فيها السمرة السوداء الماراج والسمرة السقما . قشورها كثيف الملمس الدقيق الناعم الشفيع اللون او اخضر || ملجئها الخياشي انزواي . تشبه غشائيات في جلوع الاشجار النخرة وفي حيطان الخراف . قوتها رحيق الازهار واللعل وما يجمعه من عسل في تخاريبها المسددة الانسل . الواحدة وضاعة .

Cerceris (S).

Cerceris (F). Cerceris (E).

جنس حشرات قانصة واثيمة نافعة من الحبوبيات غشائيات الاجنحة المصورة وفصيلة الاثيمات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد معتدلة الخياش . انواطها ملونة بكثرت في الاسود المخلوع بالاصفر والاسود المخلوع بالابخر || تصفر في المواطن الرملية . اصغافها رداء فسيحة متراكبة اخلايا المحجورة المنفصلة || قوتها بعض غدييات الاجنحة اغصها السوس والزقونيت تقتنصها فتخدرها وتنقلها الى اصغافها زادا لها وليرقاتها .

Fluctuation

حالة عدم الاستقرار الشوزي التي تتعرض لها الحبوب في طور استنسابها .

Macération (F). Maceration (E).

مرث الشيء بالماء لاستخلاص مواده .

Ochina (S). Ochine (F).

جنس حشرات غشائية من فصيلة التفريجات . انواعها قليلة جميعها صغيرة القد طويلا براوح من ٢ الى ٤ سم . انواطها حطبية اللون يملوها تجلبيج اسود || رقاتها هامة تركب لحاء وشكير مختلف النباتات المتسلقة المارضة احصها للابلاب .

Sphaerostilbe (S).

جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشويات . يتميز باصغانه الجامعة الانتساب المركزة على وليمه مدلية لاجولية ، يوغها ثمالى المدد ، ثنائي الخلية ، يجمعه تكات صغية الشكل || له نوعان مؤذيان ونشيش الموز ونشيش مغاجى .

Sphaerostilbe musarum, Calostilbella calostilbe (S).

Unipétale (F).

Unipetalous (E).

اسم يطلق في علم النبات على كل زهرة توحيها وحيد البتلة او النعالة .

Monostylé (F).

Monostylous (E).

Monochrome

Homocentrique (F).

Homocentric (E).

Monolque,

Uniloculaire (F). Monocleous, Unilocular (E).

كل نبات تكون ازهاره وحيدة الشق والحمل اي ان البتلة الواحدة لا تحمل سوى ازهار جلدية واحدة ان ذكرية او انثوية .

Univalve

ويدهى وحيد الصمام . هو ما كان ذا مصراع او صمام واحد .

Monovalent

Monotocardes (F).

رتبة من الرغويات مديات الابل . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة . بعضها من متصبرات الازنة الغابرة والبعض الآخر معاصر . جميعها من الرغويات الرحيمة الخيشوم والاذنية والكلية .

Monotogrades (F).

رتبة حيوانات من الرغويات المدينة الاماميات الخياشي .

Monoplacophores (F).

شعبة من الرغويات صغيبات الخياشي تتميز باصغافها الفردية . انواعها المعروفة قليلة المدد لا تتجاوز المشرة .

Monomyaires (F).

شعبة من الرغويات صغيبات الخياشي . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة المدد جميعها وحيدة الفصيلة القافلة .

Monotrèmes (F).

Monotremata (E).

رتبة من الثدييات اللامشيميات ، تصبر ادنى رتب البليات منها خلل الماء والنفسان .

Monosperma (F).

Monospermous (E).

صفة كل نبات مزار احادية البلية .

Monogyne (F).

Monogynous (E).

اسم تعريفي يطلق على كل زهرة وحيدة الخياش او الكريولة .

Eremias (S).

Erémie (F). Eremias (E).

جنس حيوانات بويضة من الغطاء وفصيلة الضبابيات .

٣٠٤٣٤ - وحيد النعالة

٣٠٤٣٥ - وحيد القلم

٣٠٤٣٦ - وحيد اللون

٣٠٤٣٧ - وحيد المركز

٣٠٤٣٨ - وحيد المسكن

٣٠٤٣٩ - وحيد المصراع

٣٠٤٤٠ - وحيد المكافاة

٣٠٤٤١ - وحيدات الأجهزة

٣٠٤٤٢ - وحيدات الأذنين

٣٠٤٤٣ - وحيدات الأصداف

٣٠٤٤٤ - وحيدات التفتال

٣٠٤٤٥ - وحيدات المسلك

٣٠٤٤٦ - وحيدة البيروكة

٣٠٤٤٧ - وحيدة الخياش

٣٠٤٤٨ - وحيركة



ونشاش



ونشاش



ونشة

خاصة بتبولل الزوايا واكثرها وباستنفاص الايلاع والشهوة الجنسية .

### ٣٠٤٦٢ - وَدَّاقِي، وَدَّكَّان، وَدُّقِي

Rut des solipèdes (F). Rut of the solipeds (E).  
شهوة اناث ذات الحافر الال للتمل او الزين الذي تطلب فيه الاناث فصولا للفساد .

٣٠٤٦٣ - وَدَّج Mobile, Motif (F).  
هو السبب والوسيلة .

٣٠٤٦٤ - وَدَّح، قَاوَانِيَا، قَاوِيَا، عَوْدُ الصليب Paeonia (S). Pivoine, Peonie (F). Peony (E). Paeonia (D). Peonia (I).

جنس نباتات شبيهة معمرة من فصيلة الشقاريات. انواعه نحو ٢٠، معظمها بري وبعضها زينة. جلودها خضوية، لحسية، غليظة. اوراقها متعاقبة، انزاعها كبيرة القد، لحسية العصل، عديدة البتلات، لا قياسية للكرابل. اشهر انواعه ما يلي .

### ٣٠٤٦٥ - وَدَّحٌ جِلْدِيّ الْوَرَق

Paeonia corticea (S). Pivoine à feuilles coriaces (F).  
نوع من الودح، ساقه شبيهة بجذوة اللوز تملو من ٤٠ سم الى ٧٠ سم. اوراقه قليلة التفريش المستعرض، نصلها جلدي الصفحة، عاين العليا بحري السفلى. زهرته حامية الاركان وسيدة، تفرس من ١٠ الى ١٢ سم. لونها ال الوردي او الالبيس || تنوره يستمر طوال شهر حزيران.



ودح صيني

٣٠٤٦٦ - وَدَّحٌ شَاذٌ Paeonia anomala (S).  
Pivoine anomala (F).

نوع من الودح الزينة، ساقه شبيهة تملو من ٦٠ الى ٧٠ سم. اوراقه كبيرة القد كثيرة التفريش والتشريح والعروق والشرايين، عروقها وشرايينها خلية البشرة. زهرته حامية الاركان وسيدة، تفرس نحو ١٠ سم. لونها ال الوردي . تنوره يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٤٦٧ - وَدَّحٌ شَجَرِيّ Paeonia moutan (S).  
Pivoine en arbre (F).

نوع من الودح الزينة، ساقه خشبية تملو نحو ١٥٠ سم. اوراقه كبيرة القد ثلاثية او لحسية التفريش، نصلها عاين الصفحة العليا بحري السفلى، انزاعها كبيرة القد تفرس من ١٥ الى ٢٥ سم. لونها يختلف مع الفروبي، منها الالبيس والوردي والاحمر والقرنبي || تنوره يستمر من اوائل ايار الى اواخر حزيران .

### ٣٠٤٦٨ - وَدَّحٌ صَغِيرُ الْوَرَق

Paeonia tenuifolia (S). Pivoine à feuilles menues (F).  
نوع من الودح . ادمته ركوبية . ساقه شبيهة تملو نحو ٥٠ سم. اوراقه قليلة متعاقبة تمتد من ١٠ الى ١٢ سم، جميعها صغيرة القد كثيرة التفريش والتشريح . زهرته حامية الاركان وسيدة، تفرس من ٨ الى ١٠ سم. لونها ال الفروبي العاين المراج || تنوره يستمر من اواسط ايار الى اواسط حزيران .

### ٣٠٤٦٩ - وَدَّحٌ صِينِيّ \* وَدَّحٌ عَطِر

Paeonia albiglora (S). Pivoine odorante, P. de Chine, P. à odeur de rose (F).  
نوع من الودح، فروبه الزينة عديدة . ساقه علبية جذوية اللوز تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقه كبيرة القد

### Maladie de Bonnygate du bananier (F).

فطر مجهري يصيب اللوز من جلوره الى اوراقه يطمعه ويهتبه || يبيلو على الاوراق عصابات خفيفة مستطيلة لونها ال السمرة الداكنة تملب النسيج وتسبب يباسه . ويبدو على اتحاد الازمة للزغ غنية لونها الى السمرة تحويها اهداب حر تحوي مشج الفطر الذي ينخر النسيج ويرقي انقياً من نمد ال نمد يسلفه حتى القلب || وهو ال الجلود عند انتشائها بوزة حفر تنقذ النسيج الى الانحلال . واذا اعترها عند اطرافها او بعيداً عن زاوية انتشائها فهو بقمة سمراء اللون مهدبة بالاحمر || يكافح بالقتلح وطر اللوز المربوه بعد تغيره بالكلس الحراق ومن الواجب تطهير البيش اقبلاً قبل طمره .

### ٣٠٤٦٩ - وَنَخِيشٌ مُفَاجِئٌ

Sphaerostilbe repens, Stilbum (S).

فطر مجهري شديد الاذى يسبب حفر الجلود في بعض الانواع النباتية انحصار المطاط واللينة والمواد الاخرى، وقد شوهد على جذور اللبؤن الحامض || مظهره الخارجي حفر خلل الشكل ليد التجميع لونه الى الجذوة السمراء وهو كثير المصحات القسيحة الحجم || اضراره جسيمة لانه يمتد الانتشار بعد ان يقضي على جرادة جلودها . يكافح بالقتلح وحرق الانتشار المربوه ويتطهر مواتها وتخفيض التربة . ومن الانسب اجنب التربة الرطبة لكتوم لانها تادم انتشار هذا النوع .

٣٠٤٧٠ - وَدَّأ، قَدَن Aplanr, Niveler (F).

To smooth, To level (E).  
رداً الارض او فذتها : بسط سطحها وسواه انقياً .

٣٠٤٧١ - وَدَّاب Alcadium (S).

Alcadium (F). Alcadium (E).  
الوداب فطر ينمو على جلود وعصان الانتشار اليابسة، النخرة، المصفة .

### ٣٠٤٧٢ - وَدَّاج، وَدَّحٌ، شَرِيَانٌ سَبَّالِيّ

Carotide (F). Carotid (E).  
شريان في العنق وما وداجان او ودجان : شريانان غليظان هريضان عن بين ثمة النسر ويسارهما .

٣٠٤٧٣ - وَدَّاسٌ Enoplateuthis (S).

Enoplateuthis (F). Enoplateuthis (E).  
جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات ورأسيات الابليل، مزدوجيات الخياشيم، مشاريات الجرامز وفصيلة الطردسيات، انواعه المروفة ستة، اعطائها معظم المناطق المستندلة الحاررة من المحيط الهادي والمحيط الاطلسي والبحر الالبيس المتوسط || اجسامها اسطوانية متباينة الاستطالة التي تزداد الى النوع، اصفر الانواع وهو وداس المتوسط يطول نحو ثلاثة امتار . اما الانواع الكبيرة كوداس اقيانية فيطول نحو عشرة امتار . وداس جزر الزابج يطول نحو ١٢ متراً || رؤوسها كبيرة وعيونها كذلك . زعانفها طرفية الاركان، منها قلبية الشكل ومنها زوانية . جرابها مجسمة و متساوية الطول باستثناء الزوج القفيف فانه شديد الطول، ينتهي برسى متانية الشكل تملوها الحامب الكبيرة والكلايب القترية المادة .

٣٠٤٧٤ - وَدَّاقِيّ Spermatopé (F).

نعت تعريفية توصف به الاظنية الخاصة او المزموع انها

Mouillage (F).  
Soaking, Wetting (E).

٣٠٤٧٩ - وَدَن

٣٠٤٨٠ - وَدَن الْأَسَدِ

هو الصلج، نبات عشقولي من البرباريسيات.

٣٠٤٨١ - وَدَن الصَّيْلِ

شجيرة برية تدعى ككولوب كينو، اطلبه.

Pousse (jeune) (F).  
Shoot (young) (E).

٣٠٤٨٢ - وَدِيَّة

هي القثيث جاز انتلاءه. ج. ودي.

Ophiorhiza (S).  
Ophiorhize (F).

٣٠٤٨٣ - وَدِيَّة

جنس نباتات عشبية من فصيلة الفويات. أنواعها المعروفة نحو ٥٠ منها المحلية وأصولها والمعمرة، أعطانها بعض مناطق البلاد الحارة منبها من نباتات الهند وماليزية وبعضها الآخر من نباتات أمريكا الجنوبية || سواها متباينة: الارتفاع. أوراقها متعاقبة، متعققة، سنائية النصال. أزهارها ضمي التجميع، محوري الارتكاز وطرقي. أزهارها مستطيلة الكؤوس خاصة البتلات، مختلفة الألوان يكثر فيها الأصفر ثم الوردى ثم الأبيض. ثمارها جرد ثنائية الخدر. يزورها سواد اللون مكدرة تستعمل كدافعة الحمى. ومنها نوع هندي المنبت يدعى ودعة ترياقية (Ophiorhize mitréole) جلدها ترياقية تستعمل ضد السم الافاعي.

٣٠٤٨٤ - وَدِيَس يبيض المشب من أي جنس كان.

٣٠٤٨٥ - وَدِيَّة (F). Triosteum (S). Triostée (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الجانيات، أنواعها المعروفة قليلة العدد منها البرية والبرية. سواها غرامات تملو من ٣٠ الى ١٢٠ سم. أوراقها متعاقبة، سنائية النصال. أزهارها متباينة الأشكال. أزهارها عديدة الألوان || أشهر أنواعها البرية الثلاثة التالية:

٣٠٤٨٦ - وَدِيَّة حَمَلِيَا

Triosteum Himalayanum (S).  
Triostée de l'Himalaya (F).

نوع من الوديسة البرية، ساقها كثيرة الفروع تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. أوراقها حاضرة ملتصقة الأذيات، سنائية النصل، تطلو من ٦ الى ١٠ سم. وتعرض من ٢ الى ٣ سم. || أزهارها سنبل التجميع. أزهارها صغيرة، منتفخة اللون. ثمارها عنبية صفراء || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف.

٣٠٤٨٧ - وَدِيَّة ضَيْقَةُ الْوَرَقِ

Triosteum angustifolium (S).  
Triostée à feuilles étroites (F).

نوع من الوديسة البرية، ساقها تملو من ٤ الى ٩٠ سم. أوراقها حاضرة، سنائية النصل، تطلو من ٨ الى ١٤ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ سم. أزهارها محورية الانتساب، فردية، صفراء اللون || تنويرها يستمر من أيار الى آب.

قليلة التفريش المستعرض، نصلها متبوع الصفحة جبل الخضار الباقى، خلى البشرة السفل. أزهارها هامي الارتكاز يمد من ٣ الى ٥ أزهار. زهرته فواحة العرف المطري، كبيرة القند، يضاء اللون أو مخضبة || تنويره يستمر من أيار الى أواخر سبيران.

٣٠٤٧٠ - وَدَع مَخْرُفِي \* Paeonia officinalis (S).  
Pivoine officinale, P. des jardins, Rose de Sérané, R. de Notre-Dame (F).

نوع من الودع البرية، ساقه عشبية جزوية اللون تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم. أوراقه كبيرة القند ثلاثية أو خاسية التنعيس، نصلها مائل الصفحة المتعقبة مضرب العروق. أزهارها كبيرة القند تعرض نحو ١٥ سم. بتلاتها مهدبة الاطراف، لونها الى الحمرة المختلفة المواجه || تنويره يستمر من أيار الى سبيران.

٣٠٤٧١ - وَدَع مَرَجَانِي Paeonia corallina (S).  
Pivoine corail (F).

نوع من الودع، ساقه عشبية جزوية اللون تملو نحو ٧٠ سم. أوراقه قليلة التفريش المستعرض، نصلها جامد الصفحة جبل الخضار، زهرته حامية الارتكاز وسيدة، تعرض نحو ١٥ سم. لونها كالمرجان، كرايلها خلية القشور. يزورها تبدو قمرزية ونفثي عند تمام الإدراك و بالسواد اللامع. تنويره يستمر من نيسان الى سبيران.

٣٠٤٧٢ - وَدَر Trier (F). To pick (E).  
نحى ما لا يلجم مع غيره.

٣٠٤٧٣ - وَدَس Défaut (F). Flaw (E).  
العيب البين أن في الحيوان أو في النبات.

٣٠٤٧٤ - وَدَعَة \* مسفكة Porcelaine (F).

ج. ودع. الودع، اصداق بحرية ونهرية من ذوات الصراع الواحد تكون لبعض الحيوانات الرنة كالقواقم وغيرها. وهي صغيرة القند مختلفة الاشكال والألوان يكثر فيها الشكل الحلزوني.

٣٠٤٧٥ - وَدَعِيَّات Cypridae (S).  
Cypréides (E). Cypréides (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الأرجل أمانيات الهياش المشطية. اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة وبعض البلاد المتدلة الحارة || جميعها مفترسة، يضيعة الاصداق الصغيرة اللحمية. فوايدها مستطيلة مقعرة الجوانب اليسرى، محدبة اليمنى المسنة الخنار الداخلي و المنفخة الخنار الخارجي || أشهر اجناسها الودع.

٣٠٤٧٦ - وَدَف Sperme (F). Sperm (E).  
الودف والوداف هو في الحيوان.

٣٠٤٧٧ - وَدَك Lard (F). Bacon (E).  
هو الشحم الذي يتكون تحت جلد بعض الحيوانات كالخنزير مثلا...

٣٠٤٧٨ - وَدَك Animaux ruminants (F).  
Ruminant animals (E).

الودك ما يجتر من الحيوان الوشي، وما لا يجتر فهو الزهم.



ودع مخري



ودعة



ودعة

## ٣٠٤٨٨ - وَدَيْشَة مَثْقُوبَة الزَّرْق ٥

Triosteum perfoliatum (S).

Triosteum perfoliata (F).

نوع من الوديشة الأريينية. ساقها تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اورثانها حافضة ملتصقة الاذنيات تجسدو كالكثوبية، نصالها بيضية الشكل تطلو من ١٠ الى ٢٢ سم. وثرس من ٥ الى ١٢ سم. ازهارها محورية الالتشاب، ضمية التجميع، صغيرة القد، ارجوانية اللون || تنويرها يستمر من ايار الى تموز.

Dépôt (F). Deposite (E).

عقد يتسلم به شخص متقرا يملكه شخص آخر ليحفظه عيناً كما يحفظ ماله الخاص ويرده متى طلبه صاحبه.

٣٠٤٩٠ - وَدَيْشَة عَيْدَوْلَة ٥

Liparis nostrum (S).

Liparis commun (F).

سكة بحرية من ثنائيات الزعانف وفصيلة الشعظاريات موطنا بعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة || جسمها شبه وشي الشكل، ضمن المقدم، دقيق المؤثر، بطول نحو ١٦ سم. مسكها حاد السهف، نزع، رأسها مستطيل الجرم، قصير الخط، كبير الشفق، عينها ماحتان. زعنفتها الظهرية مستطيلة قاطبة تمتد حتى قاعدة الذيلية. للثرجية تقابل الظهرية وتحتها. زعانفها الصدرية والحوضية مندغة قناع الرأس عند فكها. زعنفتها الذيلية صغيرة شبه مزوانية الشكل. ثوبها الى السمرة الحطية المورقة بالاسود. يطنها الى القدرة الزرقاء المواج || لحها متوسط الصفت، ما كمل.

٣٠٤٩١ - وَدَيْشَة ٥

Odontitas (S). Odontite (F).

جنس نباتات شبيهة بيرة، حولية من فصيلة الخنازيريات. انواعها المورقة قليلة العدد منبتها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || سويها قليلة الفروع. اوراقها متعاقبة نصالها اهليلجية متجمعة. ازهارها صغيرة حمراء اللون || تنويرها ربيعي.

٣٠٤٩٢ - وَدَيْشَة جَمَيْمِلَة ٥

Enidella speciosa (S).

Enidella élégante (F).

حشرة من فصيلة الدلفاسيات ورتبة متجانسات الاجنحة. جسمها صغير القد بطول من ٦ الى ٧ سم. || ثوبها الى الحطى الاضفتح المواج يملو تدبج في الظهران. رأسها معتدل العرض، ناشر الفافوخ الذي يملو كالقرن. ميناها كبرتاتان. زباناها مستطيلة الفصل الاول والثانية كقولها قصير، حديقتها محرمة. ظهرانها كامل الحنجية. شارب، بين المروق. روشانها خشائتان، شفافان. بطنها معتدل التبطيط. الزوج الخلفي من قوائمها مجهز كسائر الدلفاسيات || سرها ضفاف مجاري الماء.

٣٠٤٩٣ - وَدَيْن ٥

Mouillable (F). Wetable (E).

٣٠٤٩٤ - وَدَيْشَة الثَّوْب ٥

Glisthochilus quadripunctatus (S).

حشرة من الوديشات، صغيرة القد بيضية الشكل، طوطا براوس من ٥ الى ٦ سم. ثوبها الى السواد اللامع يملوها في كل من عهديها ثريمة ونقطة يرتقالية اللون، زباناها وارجلها شقر. تعيش تحت لحاء الثنوب. قوتها ما تقتصره من الكراشيات.

## ٣٠٤٩٥ - وَدَيْشَة الثَّوْب الجَفَاءَة ٥

Carpophilus hemipterus (S).

Carpophile des fruits secs (F).

حشرة من الوديشات، صغيرة القد، تطلو نحو ٣ سم. عودها لا يطنان كامل ظهرها. ثوبها الى البني اللامع. تركيب البئر الناضجة الساطعة ثم الجافة اصعبها التين والشمش.

٣٠٤٩٦ - وَدَيْشَة السَلَجَم ٥

Meligethes viridescens (S). Mélégethe du coiza (F).

حشرة من الوديشات، صغيرة القد، طوطا براوس من ٢ الى ٣ سم. ثوبها الى الخضار الازرق المواج. زباناها وارجلها شقر. تركيب مع ريقاتها جمع النباتات الصليبية واصعبها السلجم.

٣٠٤٩٧ - وَدَيْشَة المَلْفُوف ٥

Meligethes aeneus (S). Mélégethe du chou (F). Pollen beetle (E). Rapslanzkäfer (D).

حشرة من الوديشات، صغيرة القد، طوطا نحو ٣ سم. ثوبها الى الخضار الزرجدي، زباناها وارجلها سود. تركيب هي وريقها معظم النباتات الصليبية اصعبها الملفوف.

٣٠٤٩٨ - وَدَيْشَة حَنْطِيَّة ٥

Carpophilus dimidiatus (S). Carphophile brune (F).

حشرة من الوديشات، صغيرة القد تطلو، نحو ٣ سم. ثوبها الى الحطى الاسمر المواج. تركيب البئر الجافة قنفرها مع ريقاتها وتنطها.

٣٠٤٩٩ - وَدَيْشَة غَبَرَاه ٥

Soronia grisea (S). Soronie grise (F).

حشرة من الوديشات، طوطا براوس من ٢ الى ٥ سم. ثوبها حطلي اللون يملو تبيج وتجميع اسمر. زباناها وارجلها حنطية. تعيش تحت لحاء الاشجار الحرجية والثمرية.

٣٠٥٠٠ - وَدَيْشَات ٥

Nitidulidae (S).

Nitidulidés (F). Nitidulidae, Sap-feeding beetles, Sour bugs (E). Glanzkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة عديدات الاجنحة. اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد بيضية الشكل فاطمة. قربونها الاستعمارية صوبلانية مركبة من ١١ فاصلة. ارسافها خالية او خفلة الايزر. تعيش على الاغذاء وتحت لحاء الاشجار وعلى المواد العضوية الحيوانية والنباتية الجافة.

٣٠٥٠١ - وَدَيْشَة ٥

Protoplasme (F). Protoplasm (E).

هي البروتولازيا، المادة التي تتكون منها حبيرة او خلية الاجسام الحية.

٣٠٥٠٢ - وَدَيْشَة ٥

Protoplasmique (F).

Protoplasmic (E).

ما هو متعلق بالودشة اي بالمادة الازلية المحرورية او الخلية.

٣٠٥٠٣ - وَدَمَاء ٥

Bréhaïne (F). Barren (E).

الوذاء الماتر. نعت ترمي يطلق على كل اثنى عاقر من الحيوان.

٣٠٥٠٤ - وَدَمَة ٥

Edème (F). Edema (E).

هي الابدوما اي الاستسقاء الوضعي.



وديشة مدولة



وديشة الثنوب



وديشة البئر الجافة



وديشة السلم



وديشة الملفوف



وديشة حنطية



وديشة غبراه

## ٣٠٥١٤ - وَرْدَةُ الصَّبَاغِين \*

*Serratula tinctoria* (S). *Sarrette des teinturiers* (F). نوع من الورع ، ساقها منتصبه سرحة تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقها لا قياسية التفريص . رؤيساتها الزهرية متشكولة التجميع ، كثيرة العدد ، تطلو من ١٥ إلى ٢٠ سم. يتفرص من ١٥ إلى ٢٠ م. أزهارها متساوية القد قرمزية اللون . قنابات قلائها خضر الصفحات الخارجية حمر الموج . وهي نبات خشباتي يستخرج من أزهاره وصوة ويجوده صباغ يفتق اللون مرغوب فيه || تنويرها يستمر من تموز الى تشرين الأول .

## ٣٠٥١٥ - وَرْدَةُ خُجَاسِيَةِ التَّفْصِيس

*Serratula quinquefolia* (S). *Sarrette à 5 folioles* (F). نوع من الورع ، بجملته فروع الساق تملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. فروعها منتصبه زباه اللحاء . أوراقها خماسية التفصيص . فصوصها المتقابلة سنانية الشكل صغيرة القد ، فصها الأخير كبير القد مستدق القاعدة . نصلها مائل الصفحة مسنن الحافة . رؤيساتها الزهرية طرية الارتكاز ، فردية || تنويرها يستمر من تموز الى آب .

## ٣٠٥١٦ - وَرْدَةُ شَعَاعِيَّة

*Serratula radiata* (S). *Sarrette radiée* (F). نوع من الورع ، بجملته صغيرة القد فروع تملو من ٤٠ إلى ٩٠ سم. فروعها منتصبه زباه اللحاء . أوراقها خطية التفريص ، فروعها تعد من ١٩ إلى ٢١ ، جميعها مسننة الحافة . رؤيساتها الزهرية طرية الارتكاز ، فردية التجميع ، شعاعية التركيب والشكل . أزهارها حراء اللون قرمزية الموج . تنويرها يستمر من تموز الى آب .

## ٣٠٥١٧ - وَرْدَةُ عُرْطِيَّة

*Serratula centaureoides* (S). *Sarrette centauree* (F). نوع من الورع ، بجملته تملو من ٨٠ إلى ١٢٠ سم. ساقها فروع . فروعها سرحة . أوراقها كبيرة القد عرطية الشكل ، كثيرة التفصيص . نصلها مسنن الحافة ، أخضر الصفحة العليا للمائلة ، لحول السفلى المربعة . رؤيساتها الزهرية طرية الارتكاز ، فردية التجميع ، كبيرة القد ، قطرها يراوح من ٦ إلى ٧ سم. لونها الى البياض الناصع . قنابات قلائها حنطية اللون مهدبة الحنار || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

## ٣٠٥١٨ - وَرْدَةُ حُجَاسِيَةِ

*Serratula coronata* (S). *Sarrette couronnée* (F). نوع من الورع ، بجملته منتصبه قليلة الفروع تملو من ٥٠ إلى ١٥٠ سم. فروعها سرحة . أوراقها مفصصة لا قياسية الترتيب . نصلها مائل الصفحة ، مسنن الحافة . رؤيساتها الزهرية طرية الارتكاز فردية التجميع . أزهارها قرمزية اللون ، اختارية منها اطول من الوسطى والوسطى اطول من المركزية . قنابات قلائها زغبية البشرة على صفحتها الخارجية || تنويرها يستمر من تموز الى آب .

## ٣٠٥١٩ - وَرْدٌ هُوَ اقْطِيع مِنَ الطَّيْرِ .

## ٣٠٥٢٠ - وَرْدٌ

*Lion du Guzerat* (F). هو اسد الهند ، اعليه .

## ٣٠٥٢١ - وَرْدٌ ، جُلٌّ

*Rosa* (S). *Rosier* (F). *Rose-tree*, *Rose-bush* (E). *Rose* (D). *Rosa*, *Rosa* (I). هـ

جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة الورديات . انواعه

## Ultra-violet

## ٣٠٥٥٥ - وَرْدَةُ الْبَيْضِجِي

*Hérédité* (F). *Heradity* (E). وَرْدَةٌ هـ  
هي انتقال صفات الآباء الى انسالهم وسلالاتهم في الحيوان والنبات تبعا لنظام خاص يعرف بقانون الوراثة . وتعتبر الوراثة من العلوم الحديثة التي احتلت مكانا هاما في ديس الاحياء ويميزى الفضل في لفت الانظار اليها الى اباحت العلمنة هـ مندل هـ .

## ٣٠٥٥٧ - وَرْدَاة

*Bembex* (S). *Bembex* (F). *Bembex* (E).  
جنس حشرات قانصة وانجبة نافعة من الحويوات خشبات الاجنحة المخسرة وفضيلة الاتقيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها متباينة الحجم ، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة . اثارها ملونة يكثر فيها الاصفر الهلج بالاسود ثم الاصفر الاخضر البليج بالاسود || جميعها تصفن في التربة . اصغابها رداء متمسكة متراكبة الخلايا المسددة السطح تغور من ٢ الى ٧ سم. مدخلها انبوبية منحرفة نحو سطح التربة || قوتها الذباب والحوام والصغير من ذوات الجنائن تقتنصها فتخدرها وتنقلها الى اصغابها زادا لها وليرقاتها .

## ٣٠٥٥٨ - وَرْدَاق

*Feuilleaison* (F). *Foliation* (E). وقت خروج الورق .

## ٣٠٥٥٩ - وَرْدَان

*Urania* (S). *Uranie* (F). *Uranie* (E).  
جنس حشرات فراشية من حرشفيات الاجنحة وفضيلة الورديات . انواعه المعروفة قليلة المدد موطنها يمتد من تهايم البسر الاخر الى بعض مناطق افريقية الشرقية وجزيرة مدغشقر || جميعها كبيرة القد ، مذنبه الراش والخلقية هـ بجملته الزخارف والاولان للجهة المتدخلة || يرقاتها الى البياض الكبيرتي الموج تملو نمشة سوداء . رؤوسها صفراء اللون او حراء || اجسامها الحولية ثلاثة .

## ٣٠٥١٠ - وَرْدَالِيَّات

*Uranidae* (S). *Uranidés* (F). *Uranidés* (E).  
فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، منتشرة في بعض مناطق افريقية الشرقية وجزيرة مدغشقر || جميع انواعها كبيرة القد ، متراكبة الالوان الزاهية اللامعة || اعرف اجناسها واشهرها الوران هـ .

## ٣٠٥١١ - وَرْبُ

الورب : وبارب الوشي .  
٣٠٥١٢ - وَرَّة  
الوردة : الحفيرة الصغيرة المدة لانتقال الفرسه .

## ٣٠٥١٣ - وَرْدِج

*Serratula* (S). *Sarrette*, *Serrate*, *Serratule* (F). *Saw-wort*, *Dyer's savory* (E). *Färbeschärde* (D). *Serratola*, *Sarretta*, *Serretta* (I).  
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعه عديدة ، معظمها بري وبعضها زبيني . أوراقها شوكية لا قياسية التفريص . رؤيساتها اسطوانية . أزهارها انبوبية . زورها قزعية القطب . تعيش في جميع الارربة الزراعية وتكثر بالبذر . اعرف انواعه واشهرها ما يلي .



وردة الصباغين

الخضار الأزرق. ازهاره شكولي التجميع. ازهاره عادية  
المرق. حراء اللون، صغيرة القد، قطرها يراوح من  
٣ الى ٥ سم. || تنوره يستمر من حزيران إلى آب.

### ٣٠٥٢٦ - وَرْد أَصْفَر \* وِعَاط

Rosa lutea (S). Rosier jaune (F). Austrian briar (E).  
Gelbe Rose (D). Rosa canina lutea, R. c. fetida (I).  
نوع من الورد السبروتي. جنبته مدادة تطلو من ٢ الى  
٤ أمتار. ساقه وفروعه متبادعة المناسخ الجالسة أو القليلة  
الإحدياد. أوراقها لا قياسية التركيب تتألف من ٥  
أو ٧ أو ٩ وريقات. وريقاتها اهليلجية الشكل. نصلها  
مسن الحافة بارز المرق. ازهاره صفراء اللون كريمة  
الرائحة، قطرها نحو ٧ سم. || تنوره يستمر طوال شهر  
تموز.



ورد احمر

### ٣٠٥٢٧ - وَرْد الْبَنَسَج

Rosa Banksiae (S).  
Rosier de Banks (F).  
تقرع من الورد الجادح الذي يتطلب موطن خاصة، ممرضا  
الجنوب. جنبته تطلو من ٣ الى ١٠ أمتار. فروعهها تحلة  
عامة الشوك. أوراقها خماسية أو سباعية التركيب غرزية  
الزئامات. وريقاتها مائلة لامة. نصلها مسن الحافة  
خفي الصلع. ازهارها ضمي التجميع. ازهارها صغيرة القد،  
بنفسجية المرق، صفراء اللون || تنوره يستمر من  
حزيران إلى تموز.

### ٣٠٥٢٨ - وَرْد الْحَمْلُ، وَرْد مَدَاد

Rosa arvensis (S). Rosier rampant, R. d'Ayr-  
shire (F).  
نوع من الورد الجادح. جنبته مدادة تطلو من ٢ الى  
٤ أمتار. فروعه دقيقة مستطيلة، مناسخها متوسطة  
التعديب. أوراقها ثلاثية أو خماسية أو سباعية التركيب،  
ورقاتها اهليلجية سنانية؛ نصلها مائل للون، متوسط  
اللمعة، خفي الصلع. ازهاره متوسطة القد، قليلة المرق،  
حراء اللون أو وردية || تنوره يستمر من أيار إلى  
حزيران.

### ٣٠٥٢٩ - وَرْد الْحَبَار

Bupthale fétida (F).  
هو الربد النتن، أظله.

### ٣٠٥٣٠ - وَرْد الزَّوْائِي

Ketznie de Syria (F).  
هو الحطبي السوري، أظله.

### ٣٠٥٣١ - وَرْد السَّمَاء

هو اللخيس، أظله.

### ٣٠٥٣٢ - وَرْد السَّيَاح

Rosa agrestis, R. sepium (S). Rosier des haies (F).  
نوع من الورد السبروتي الميليل. جنبته تملو من ١٠٥  
الى ٣٠٠ سم. ساقها وفروعها كثيفة المناسخ المتساوية  
القد، القليلة الإحدياد. أوراقها خماسية أو سباعية  
التركيب، وريقاتها ثنائية القسطن؛ نصلها مائل  
الصفحة مائل الخضار. ازهاره صغيرة القد، يضاء  
اللون أو وردية، متشعبة المرق الطري || تنوره  
يستمر طوال شهر حزيران.

### ٣٠٥٣٣ - وَرْد الشَّاي

Rosier thé (F).  
هو ورد الهند، أظله.

### ٣٠٥٣٤ - وَرْد الشَّمْس

هو اليعمان المستدير الورق.

المروفة زهاء ٥٥٠، ضروريه واسراعهم وجهته لا تقل عن  
٧٠٠٠ سقيا؛ شائكة منصبة أو مدادة، شوكها أو  
مناسخها غروبية الشكل مدبية الحمة المحجنة. أوراقها  
مركبة متبادعة. ازهارها طويلة الارتكاز، فردية أو شكولية  
التجميع. كؤوسها لا قياسية التفصيص يكثر فيها  
الشخس. بسات توجيحاتها لا نظامية العدد منها الرباعية  
والخماسية والكثيرة العدد. أسديتها عديدة. خدورها طليقة  
وسيدة المساكين. يزورها بيضيه صغيرة خلية البشرة.  
يستمر الورد من اشهر النباتات التي ينفذها وأصحابها للانسان  
وارها. يحمي في جميع الأثرية القليلة الاندماج. يرغب  
في الخصة ولا يصر كثير في الرمية. يتكاثر بالفسائل  
والمقل واللبور والتطعيم. يستخرج من زهر بعض انواعه، ما  
بالتقطير، دهن الورد وياه الورد || اشهر انواعه ما  
ينج.

### ٣٠٥٣٥ - وَرْد أَيْد

Rosa sempervirens (S).  
Rosa toujours vert (F).  
نوع من الورد الرفه، جنبته مدادة تطلو من ٤ الى ٦  
أمتار. فروعه سريعة مستطيلة. أوراقها ابيدة، خماسية أو  
سباعية التركيب. وريقاتها جلدية النصل اللامع الماد  
الحمل. ازهاره عطرية المرق، كبيرة القد، قصيرة  
النصل، يضاء اللون أو قشدية || تنوره يستمر من  
أيار إلى حزيران.

### ٣٠٥٣٦ - وَرْد الْبَيْض، وَكَبَر

Rosa alba (S). Rosier blanc (F). White rose, Single  
white rose (E). Weisse Rose, W. Gartenrose (D).  
Rosa bianca, R. angiola, R. carnicina (I).  
نوع من الورد السبروتي. جنبته تملو من ٢ الى ٤ أمتار.  
ساقها منصبة، فروعهها متدلية. مناسخها لا قياسية التركيب  
والخمس والتسعين. أوراقها سباعية التركيب، وريقاتها  
ينغية للشكل، نصلها أخضر اللون، مائل الصفحة  
الدنيا، خفي الصلع. ازهارها نوردي التجميع. ازهارها  
كبيرة القد، يضاء اللون، متشعبة المرق || تنوره  
يستمر طوال شهر حزيران.

### ٣٠٥٣٧ - وَرْد أَحْمَر \* حَوْجَم

Rosa gallica (S). Rosier de France, R. de provins,  
R. rouge (F). French rose, Common rose (E). Gal-  
liche Rose (D). Rosa domestica, R. incarnata, R.  
d'orto (I).  
نوع من الورد السبروتي. اسراعهم وجهته كثيرة العدد.  
سوقها وفروعها مستطيلة. مناسخها كثيفة التجميع لا  
قياسية الارتكاز، حادة الحمة المخدوبة. أوراقها ثلاثية  
أو خماسية التركيب. وريقاتها كبيرة القد مستطيلة؛  
نصلها غش الملس مسن الحافة. ازهارها كبيرة القد،  
قطرها يراوح من ٨ الى ١٠ سم. || تنوره يستمر  
من أيار إلى تموز.

### ٣٠٥٣٨ - وَرْد أَحْمَر الْوَرَق

Rosa rubrifolia (S).  
Rosier à feuilles rouges (F).  
نوع من الورد السبروتي الميليل. ساقه تملو من ١٠٥  
الى ٣٠٠ سم. مناسخها متساوية القد، مبرقة التجميع.  
فروعه مجزوية اللون، خلية اللحاء، متبادعة المناسخ  
الجالسة أو القليلة الإحدياد. أوراقها خماسية أو سباعية  
التركيب وريقاتها حر الزعجات والأمن والفلو،  
نصلها مائل الصفحة، خفي الصلع الناشز، لونه إلى



ورد اصفر

منها دهن الورد ودها الورد. || تنوره يستمر من الربيع الى اواخر الخريف .

### ٣٠٤٣ - وَرْدُ حَرَشِ \*

Rosa rugosa (S).

Rosier rugueux (F).

نوع من الورد السبروتي. اصراعه كثيرة العدد ، وسوقها منتصبة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. مناسخها متباعدة ، ثنائية الترتيب ، قليلة التجميع . فروصها زياء السماء متقاربة المناسخ اللانسياسية الحجم . اوراقها لا نظامية التركيب ، ورتبة التجميع ، تتألف من ٣ الى ٩ وريقات نصلها تتمع الصفحة ، باهت اللون ، خلي البشرة السفلى . ازهارها فردي او ثلاثي التجميع . ازهارها حطرة متفارة القد تختلف باختلاف الاصرام ، قطرها يراوح من ٩ الى ٩ سم. ثمارها كروية الشكل كبيرة القد لونها الى الحمرة الزاهية . تنوره يستمر من ايار الى حزيران .

### ٣٠٤٤ - وَرْدُ تَحْيِي

Rosa villosa, R. pomifera (S). Rosier velouté (F).

نوع من الورد السبروتي الميزول . جنبته مدادة تطلو من ٤ امتار ، ساقها وفروها متباعدة المناسخ المتساوية القد القليلة الاسدياب . اوراقها مركبة تتألف من ٧ او ٩ او ١١ وريقة ، نصلها خلي البشرة على صفحته . ازهارها حطرية العرف حراء اللون ، قطرها يراوح من ٣ الى ٦ سم. نصلها وثمارها حلبيّة البشرة || تنوره يستمر من حزيران الى آب .

### ٣٠٤٥ - وَرْدُ صَغِيرِ الْوَرَقِ

Rosa microphylla (S). Rosier à petites feuilles (F).

نوع من الورد ، ساقه منتصبة تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. فروعه عادمة الزغب ، ثنائية المناسخ المستقيمة السمره اللون . اوراقها ابيدة ، مركبة ، تتألف من ١١ او ١٣ او ١٥ وريقة . نصلها جامد الصفحة اخضر اللون . ازهاره وردية اللون او بيضاء ، قطرها يراوح من ٦ الى ٧ سم. || تنوره يستمر من آب الى تشرين .

### ٣٠٤٦ - وَرْدُ عَجَسِي

Rosa persica (S). Rosier à feuilles d'épine-vinette (F).

نوع من الورد السبروتي ، يمتلئ تملو نحو ٦٠ سم. ساقه وفروعه قليلة المناسخ المتباعدة . اوراقه كاملة بسيطة ، نصلها مسنن الحافة ، مجري اللون على صفحته ، يطول من ١٥ الى ٣٠ سم. ويرس من ٥ الى ١٥ . ازهاره طرية ، فردية ، لونها الى الصفار الموشع بالاحمر || تنوره يستمر طول شهر حزيران .

### ٣٠٤٧ - وَرْدُ فِيرَجِيَّةِ

Rosa virginiana, R. fraxinifolia, R. blanda (S). Rosier de Virginie (F).

نوع من الورد السبروتي . هذه البلاد الامريكية . جنبته تملو من ٢ الى ٣ امتار . ساقها وفروها جزوية السقاء ، مناسخها لا قياسية الحجم والترتيب والتجميع . اوراقها خاسية او سباعية التركيب ، وريقاتها صغيرة القد اعليجية الشكل ، نصلها جامد الصفحة ، متباعد التسنين ، قليل الزغب على الجهة السفلى . ازهارها كبيرة القد حراء اللون لا نظامية التجميع || تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

### ٣٠٤٨ - وَرْدُ فِينِي

Rosa phaenicia (S). Rosier de Phénicie (F).

نوع من الورد البري الميزول في جبال لبنان والمولوين .

Rose de Chine (F).

### ٣٠٤٩ - وَرْدُ الصين

هو الأتجره الهندي ، اطلبه .

Rosa setigera (S).

### ٣٠٥٦ - وَرْدُ التَّرَاكِي

Rosier de la prairie (F).

نوع من الورد السبروتي . جنبته مدادة تطلو من ٣ الى ٩ امتار ، فروعه سريعة ، مناسخه غليظة جالسة . اوراقه ثلاثية او خاسية التركيب . وريقاته اعليجية مسنة ، نصلها اخضر الصفحة العليا ، خلي السفلى البهراء اللون . زيمتا اوراقها واعناها حلبيّة الحمار . ازهاره عشوكي التجميع . ازهاره عادمة العرف بيضاء اللون او وردية . تنوره يستمر طول شهر تموز .

### ٣٠٥٧ - وَرْدُ النَيْسِلِ

Pastel des teinturiers (F).

هو وشة الصباغين ، اطلبه .

### ٣٠٥٨ - وَرْدُ الْهِنْدِ، وَرْدُ الشَّامِ، عُرْشِي

Rosa indica (S). Rosier de l'Inde, R. ché (F).

نوع من الورد السبروتي الشام الزراعية . اصراعه وجهته كثيرة العدد . ساقه منتصبة تملو من ٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه ثلاثية او خاسية او سباعية التركيب . وريقاته اعليجية مدبية ، نصلها لامع البشرة عايق الخصار . ازهاره متوسطة القد قطرها يراوح من ٥ الى ٧ سم. لونها تختل باختلاف الصرم والمسلج ، يكثر فيها الاصفر والبرتقال والاحمر ومشتقاتها . || تنوره يستمر طول فصل الربيع والصيف والخريف .

Eglantier (F).

### ٣٠٥٩ - وَرْدُ بَرِّي

هو النسرين ، اطلبه .

Rosa pimpinellifolia (S).

### ٣٠٤٠ - وَرْدُ بِلَانِي

Rosier pimpinelle (F).

نوع من الورد السبروتي . جنبته تملو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ساقها وفروها كثيرة المناسخ والحلب . اوراقها لا قياسية التركيب تتألف من ٥ او ٧ او ٩ او ١١ وريقة . وريقاتها ثلاثية الشكل . نصلها خلي الصفحة السفلى ، فصي المراج . ازهاره صغيرة القد قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم. لونها يختلف باختلاف الصرم منه الابيض والوردي والاصفر . تنوره يستمر من ايار الى حزيران .

Rosa gigantea (S).

### ٣٠٤١ - وَرْدُ جَبَارِ

Rosier géant (F).

نوع من الورد السبروتي العاشر . جنبته تملو من ١٠ الى ١٢ م. ساقه وفروعه عادمة الشوك . اوراقه خاسية او سباعية التركيب . وريقاته اعليجية نصلها جامد اللون او على صفحته . ازهاره كبيرة القد قطرها يراوح من ١٠ الى ١٢ سم. لونها الى البياض التبي او الصفار الباهت . تنوره يستمر طول شهر ايار .

### ٣٠٤٢ - وَرْدُ جُورِي، وَرْدُ بَلَدِي، وَرْدُ شَامِي

Rosa damascena (S). Rosier de Damas, R. des quatre saisons (F). Damask rose (E). Damaszenerrose (D).

Rosa damaschina, R. de les quatre saisons (I).

نوع من الورد السبروتي الميزول . جنبته تملو من ٩٠ الى ١٨٠ سم. ساقها وفروها كثيفة الشوك . مناسخها حادة الحمة المنحنية . اوراقها خاسية او سباعية التركيب وريقاتها يضيئة الشكل ، جامدة التصل المسن الحافة . ازهارها وردية اللون ، كبيرة القد ، فواصة العرف السطري ، يستعطر



ورد حرش

لونها إلى الأبيض أو الوردى ؛ فصلها تتبهي بزوائد وريّة .  
تنوره يستمر من أيار إلى تموز .

٣٠٥٤ - **وَرْدٌ مَسْكِيٌّ** \*  
*Rosa moschata* (S).  
*Rosier musqué* (F). *Muskatrose*,  
*Bisamrose* (D). *Rosa muschata* (I).

نوع من الورد . ساقه منتصبه تعلو نحو ٣ أمتار ، قروعه  
مستطيلة مثدية . أوراقه خضراء أو سباجية أو شحابة  
التركيب . وريقاته بيضيه سائبة ؛ فصلها مائل للصفحة  
العليا ، خلى السفلى . أزهارها متكونة التجميع ، أزهاره  
مسكية العرف ، قطرها يراوح من ٤ إلى ٥ سم . لونها إلى  
البياض الأصفر || تنوره يستمر من تموز إلى تشرين .

٣٠٥٥ - **وَرْدٌ أَلِيّ**  
*Colombi-moineau* (F).  
جنس طير من فصيلة الحماميات . أنماه قليلة المد بجيها  
ربعة الجسم ، صغيرة الرأس ، قصيرة المنق ، مستدلة  
الجناح ، مستطيرة الأنيك القصير ، نحلة المنقار ، عارية  
الرئع || أشهر أنواعه الورداني المطوق .



ورد كبير الزهر

### ٣٠٥٦ - وَرْدٌ كَانِي مَطْوَرٌ

*Chamaepelia passerina* (S). *Colombi-moineau* pas-  
serine, *Pigeon de terre* (F). *White-throat* (E).

نوع من الورداني وهو طائر متوسط القد . طوله نحو ١٨ سم .  
ثوبه إلى الصبغة الوردية . رأسه وقرنيه وصفه زرق المراج .  
صفه مطوق بالأبيض . جناحه أغمر الرقعة تعلو وشمّة  
سمراء صفاء المراج . قوادمه وأباهره حر الأظار الخارجي .  
بيض الداعل . عيناه برتقالية اللون ، منقاره وساقاه حر .  
يألف المراعي والسهول المزروعة والحفاظ والجائن . سريره  
يعد من ١٠ إلى ١٦ في . قوته الحبوب والبزور حل إختلافها .  
يدئن في الجنايات والإدغال . أثناء تحضن ستويًا من مرتين  
إلى ثلاث مرات ، حضنتها يستانح .

٣٠٥٧ - **وَرْدٌ كَانِيَّاتٌ**  
*Blattopteroïdes* (F).

طيفة من الحشرات تنتمي إلى شعبة البرقانيات وطائفة  
المنحاض أصلاً . وثبها الحالية ثلاث : السرغانيات  
والعقانيات والسرغانيات . اشكالها وأحجامها عديدة ومختلفة .  
تتميز بأرسانها المركبة التي يلب فيها الشخص .

٣٠٥٨ - **وَرْدَةٌ**  
*Rosa* (F).

زهرة الورد . اشكالها وأحجامها وعدد بتلاتها وألوانها وعرفها  
تختلف باختلاف النوع والصمم .

٣٠٥٩ - **وَرْدَةٌ أُرَيْحَا** هي كف العذراء ، عطليا .

٣٠٥٦٠ - **وَرْدَةٌ التَّيْل** هي لوس التيل ، عطليا .

٣٠٥٦١ - **وَرْدَةٌ الحَيْد** هي الحليلة المنتصبه ، عطليا .

٣٠٥٦٢ - **وَرْدَةٌ السَّيَّان** هي الكايلية ، عطليا .

٣٠٥٦٣ - **وَرْدِيَّاتٌ**  
*Rosaceae* (S).

*Rosacées* (F). *Rosaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مديدة الفصائل . أنواعها  
المعروفة زهاء ١٠٠٠ تنتمي إلى ٧٠ جنساً تجمعها عدة  
أسباط . نباتاتها مجموعة كاملة من الأشجاء والجبنيات  
والشجيرات والأشجار . أوراقها متضاربة مختلفة الاشكال  
والترتيب . أزهارها نوري التجميع . أزهارها خشوية  
ثمريها متباينة الاشكال والأحجام والألوان . وهي تشمل

يرغب في المواقع الربوية . جنبته منتصبه حزيمة الفروع  
تعلو من ٨٠ إلى ٢٥٠ سم . مناسخها متينة بحجة مبيّنة  
لا قياسية التجميع . أوراقها ثلاثية أو خماسية التركيب .  
وريقاتها أهليجية الشكل . فصلها أزغب البشرة حل  
صفحتيه . أزهارها متكونة التجميع . أزهارها صغيرة القد  
بيضه اللون عناية العرف || تنوره يستمر من أيار إلى  
آب .

٣٠٥٤٩ - **وَرْدٌ لَيْتَابِيٌّ**  
*Rosa bracteata* (S).

*Rosier bractéolé* (F).  
نوع من الورد الجامح الذي يتطلب مواقع معينة معرفها  
الجنوب . جنبته تعلو من ٣ إلى ٤ أمتار . ساقه وقروعه  
مزينة النعاه ، مبيّنة المناسخ المهيّنة . أوراقه تساعية  
التركيب ، زعماتها مفرقة مهدية الختار . وريقاته أهليجية  
الشكل ، فصلها لأمع الصفحة العليا حل السفلى الصفراء  
اللون . أزهاره كبيرة القد ، ممشوية العرف ، بيضاء  
اللون ، مطوقة بقلادة من القناب || تنوره يستمر طوال  
شهر تموز .

٣٠٥٥٠ - **وَرْدٌ كَثِيرُ الزَّهَرِ** \*

*Rosa multiflora* (S). *Rosier multiflore* (F).

نوع من الورد البروتي المداد . جنبته تعلو من ٤ إلى  
٦ أمتار . قروعه صرعية مستطيلة . أوراقه خضراء أو  
سباجية أو تساعية التركيب . وريقاته أهليجية الشكل ؛  
فصلها مائل للصفحة العليا حل السفلى . زعماتها مهدية  
التستين المشطلي . أزهاره هرمي المنقود . أزهاره متوسطة  
القد ، كثيرة العدد ، بيضاء اللون أو وردية || تنوره  
يستمر من أوائل حزيران إلى أواخر تموز .

٣٠٥٥١ - **وَرْدٌ كَرْوَلِينِيٌّ**  
*Rosa carolina* (S).

*Rosier de la Caroline* (F).

نوع من الورد البروتي ، يرغب في المواقع الربوية . جنبته  
منتصبه لساق تعلو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم . ساقه وقروعه  
جزوية اللون ، ثنائية المناسخ المهيّنة . أوراقه لا قياسية  
التركيب منها الثلاثية والخماسية والسباجية والتساعية . وريقاته  
أهليجية الشكل ؛ فصلها منشاري الحافة حل البشرة السفلى .  
أزهاره فردية ، وردية اللون ، كثيرة العدد ، قطرها يراوح  
من ٤ إلى ٧ سم . || تنوره يستمر من تموز إلى آب .

٣٠٥٥٢ - **وَرْدٌ لَمَاعٌ**  
*Rosa nitida* (S).

*Rosier brillant* (F).

نوع من الورد . جنبته صغيرة القد ، ساقها تعلو من  
٤٠ إلى ٦٠ سم . مناسخها ثنائية ، متفرقة ، جالسة  
الانتصاب ، كثيرة الهلب . أوراقها لا قياسية التركيب ،  
وترية التجميع ، تتألف من ٣ إلى ٩ وريقات ؛ فصلها  
مائل البشرة حل صفحتيه ، شديد الأزهار واللصمة ، مسن  
الحافة . أزهارها عادية العرف ، قطرها يراوح من ٣ إلى  
٦ سم . لونها إلى الحمرة الزاهية البراقة || تنوره يستمر  
طوال فصل الصيف .

٣٠٥٥٣ - **وَرْدٌ مَعْتَلٌّ الْأُورَاقِ**  
*Rosa laevigata* (S). *Rosier trifoliolé* (F).

نوع من الورد الجامح الذي يتطلب مواقع خاصة معرفها  
الجنوب . جنبته مستطيلة تعلو نحو ٤ أمتار ساقها وقروعه  
كثيرة الشوك ، طيفة المناسخ المهيّنة . أوراقها ثلاثية  
التركيب ، مغززية الزنات . وريقاتها سائبة مستطيلة  
المنصبة المدية . فصلها مسن الحافة لأمع البشرة النرسية  
حل صفحتيه . أزهارها قليلة العرف قطرها نحو ٧ سم .



ورد مسكي



des bois (F). Wood pigeon, Ring-dove (E). Ringeltaube (D).

نوع من الحمام البري ، كبير الجثة ، طوله نحو ٤٥ سم ، رأسه وعنقه وزيناه إلى الرمادي الأزرق . ظهره وجناحه إلى الرمادي الاسمر . ذوره وصغره وبطنه متراكبة إلا اللون فيها الرصاصي والرمادي والأزرق والأحمر والاشقر ، جميعها سفاه المروج . صروبه عديدة معظمها من التقاطع يحوي البلاد في طلب المصيف والمشي . أوبده قليلة أعطائها البلاد الحارة . وهو يألف الإسراج والثابات . يعيش أسراباً كبيرة العدد . قوته الثأر وألحوب والبزور . يدثن في الإلتجار . يعيش ويبيض من مرة إلى مرتين في السنة . ج وراثين وورشان .

٣٠٥٧١ - وَرْطُورَة Epilatre de Germanie (F).  
هي الطغاس الجرمانى ، اعليه .

٣٠٥٧٢ - وَرَق

ورق النبات : نسر واهتر فهو وارث أي ناسر راف شديد الخضرة .

٣٠٥٧٣ - وَرَق Sideroxyton (S).  
Sideroxyton, Bois de fer blanc, Bois de sable (F).  
Iron wood (E). Eisenbaum (D). Bumelia, Legno ferro (I).

جنس نباتات حرجية وزراعية من فصيلة الطليحات . أنواعه زهاء ٨٠ منها الأشجار الكبيرة الشائعة والمتوسطة القد والصغيرة . أوراقها متعاقبة مستطيلة جلدية النصل . أزهارها أبغية الارتكاز ، صغيرة القد ، قصيرة الزناد ، صفراء اللون . ثمارها لوزية الشكل والقصد ، بعضها مأكول أو دهي المصارة الصناعية وبعضها لا يصلح لثي . أخشابها شديدة الصلابة ، تبيد اللون ، يدعونها غشب الحديدس الأبيض ، قشورها طيبة مضادة للحميات .

٣٠٥٧٤ - وَرَق Morceler, Partager (F).  
To parcel out, To divide (E). ورق الأرض : قسما .

٣٠٥٧٥ - وَرْدِيَّة Urvillea (S).  
Urvillea (F). Urvillea (E).  
جنس نباتات عارشة ، صمرة ، برية وتربيتية من فصيلة السابنديات . أنواعها المعرولة ثمانية ، مهدا بعض مناطق أمريكا الجنوبية الحارة . سوقها مزينة اللحاء ، فراءه أوراقها متعاقبة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات الكفكية المفرقة . حوائطها مستطيلة ، متشعبة . أزهارها صفودي التجميع ، أبلي الارتكاز . أزهارها صغيرة القد ، رباعية البتلات المستقلة ، متباينة الألوان ، منها الأبيض والأصفر والوردي والآخر المختلف الماهجات . ثوريرها ديمي أو صيفي .

٣٠٥٧٦ - وَرَق Papiers (F). Papers (E).  
صانف ورقية رقيقة مصقولة تصنع من مختلف المسواد النباتية ، أخشاب الخشب ، بمد تحويلها إلى عجينة يمكن مدها وتوليدها وصقلها .

٣٠٥٧٧ - وَرَق ، مَشَق Effaillage (F).  
Stripping of the leaves (E). ورق الشجرة : انزع ورقها .

أكبر مجموعة من الأشجار الزراعية المثمرة وما لا يستهان به من النباتات العطرية والعلبية . أسباطها ما يتبع :

Pirées, Pomacées (F).  
Chrysobalanées (F).  
Potérées (F).  
Rosées (F).  
Dryadées (F).  
Spirées (F).  
Rubées (F).  
Fragarées, Potentillées (F).  
Quillajées (F).  
Amygdalées, Prunées (F).  
Neuradées (F).

٣٠٥٦٤ - وَرْدِيَّة Rhododendron (F).  
هي العسل ، اعليه .

٣٠٥٦٥ - وَرْس ورس النبات أخضر . وورس الصخرة في الماء : ركب الحث .

٣٠٥٦٦ - وَرْس \* ، غُمرْكة Memecylon tinctorial (F).  
Mémécyle tinctorial (F).  
Ceylon coral tree (E). Safranbaum, Beerenbaum (D). Corniola (I).  
شجرة برية وزراعية من الورسيات وفصيلة القرانيات . أوراقها متعاقبة متقابلة . نصلها سناني الشكل ، جامد الصلعة . أزهارها ضمية التجميع محورية الارتكاز متقابلة التصفيف . أوراقها غضائية مشهورة يستخرج منها صباغ أحمر اللون .

٣٠٥٦٧ - وَرْس مَشُونَة هو التنبيل ، اعليه .

٣٠٥٦٨ - وَرْسِي \* Peltopus (S). Peltopo (F).  
طائر من الحمام البرحي شبيه بالترغلة . موطنه يمتد من الهند إلى جزر القباية . يدثن في التلويب التي تجرب البلاد في طلب الرقة . ملجته الحياتي جامي . جماعته متوسطة العدد . قوته البليور وبعض الحشرات . جسمه متدل القد بطول نحو ٣٢ سم . لويه أخضر الرأس والرداء والجناح والذنب ، صناني الصدر المشوي بالآخر ، أصفر البطن المشوي بالوردي . يدثن عه في الأشجار القليلة الارتفاع . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من مرتين إلى ثلاث مرات في الحول . حضنتها يبيضتان . الترخع يستمر نحو ١٣ يوماً .

٣٠٥٦٩ - وَرْسِيَّات Mémécylées (F).  
سهل من فصيلة القرانيات . اجناسه وأنواعه عديدة منها الأشجار والشجيرات والجنات . جميعها من نباتات المناطق الحارة . أوراقها سنانية متعاقبة متقابلة . أزهارها شكلوكية التجميع . محورية الارتكاز . متقابلة الترتيب ، صغيرة القد . ثمارها غنية التكون بعضها مأكول يستحب العلم . وبها أنواع صناعية صبغية الأوراق أشهرها الورس .

٣٠٥٧٠ - وَرْشَان \* Columba palumbus (S).  
Colombe ramier, Grand ramier, Palombe, Pigeon



ورس



ورس



ورشان



ورق



ورقية

## ٣٠٥٧٨ - رَوَقُ التَّشَدُّدِ

Billot de banque (F).  
Bank-note, Bank-bill (E).

هو من السندات التي تصدرها مصارف الإصدار وتلتزم بها أن تدفع نقداً لحاملها لدى الإطلاع مبلغاً معيناً فيها .

## ٣٠٥٧٩ - رَوَقُ شَافِيلٍ

Papier filtre (F).  
Filter paper (E).

## ٣٠٥٨٠ - رَوَقَاءُ ٥٠

Chalcophaps (S).  
Chalcophaps (F).

طائر من الضواري ينتمي إلى فصيلة الحماميات . موطنه جند من الجزيرة العربية إلى الصين واليابان . ينتقل مع فصل السنة من مكان إلى مكان . ملجئه الخيالي زويبي الأ في زمن الرحيل . يألف الإحراج والبراري . يمدو على الأرض بشفة ويظهر بسرعة قدفة . قوته الحبوب والبرور البرية وبعض الحشرات || جسمه معتدل القد ، طويل نحو ٤٢ سم . ثوبه معتدل الشبهة والريادة والكهبة ، جميعها سعاد المراج ، ويعطو في أواخر الظهر غطان أغبران ، ذنبه معتدل الطول ، مستدير الطرف . متفاد ، وتنتاد راصابه إلى السمرة الزرقية || يذئن حشه في الأشجار الرقيقة . الانثى تحضن بمتوبة الذكر من مرتين إلى ثلاث مرات في العام . حشنتها بيضتان فقط .

٣٠٥٨١ - رَوَقَةُ ، إِصَاد ، شَيْدَة  
Chape (F).  
Cope (E).

هو ما طلي به الحائط ونحوه .

## ٣٠٥٨٢ - رَوَقَةُ

Feuille (F). Leaf (E).

هي في النبات عضو التمثيل والتنفس والتيست الذي يستمد فاعته الفعالية من الضوء والهواء . تتركب الورقة من ثلاثة اجزاء : النصل والعتق والقاعدة . فالنصل هو الصحيفة الخضراء التي يملؤها الخشب ، يتكون هيكله من شغل وعروق وأعصاب تختلف وضعها وتوازيها وشبكها باختلاف الفصيلة والجنس والنوع . أما العتق فهو امتداد الشغل وهو صلة الوصل بين الساق والنصل أو الفرع والنصل . بين الازراق ما كانت عادمة البت وتعرف باللاطة والجالسة والحاغسة الخ ... وأما القاعدة فهي موضع اتصال العتق أو النصل بالساق أو الفروع وقد تكون هذه القاعدة لمطلوية كما في الكريمة أو لاسفة الساق كما في التيجليات أو قرصية مخزنة كما في البصل . وقد تنمو من القاعدة زوائد ورقية تدعى الاذنيات || وتنقسم الازراق إلى أبيدة أو حررة أي دائمة الخضرة وإلى عابدة أو ناضفة وهي التي تسقط في الخريف . أما أشكال الازراق وتزييناتها لمديدة تخص منها بالذكر اسمها وهي التالية :

ورقة إبرية  
ورقة إسفينية  
ورقة إهليجية  
ورقة رينية  
ورقة بسيطة  
ورقة بيضبة  
ورقة بيضبة متعكسة  
ورقة لالبية التخرج  
ورقة لالبية التخرج  
ورقة لالبية التخرج  
ورقة لالبية التخرج

ورقة جمده ، جمدة

ورقة حادة ، مدينة

ورقة حاشية

ورقة حذباء العروق

ورقة حلقية

ورقة حطية

ورقة ذرية

ورقة ذرية العروق

ورقة دوارية

ورقة دبابية

ورقة رهابية

ورقة ريشية

ورقة ريشية العروق

ورقة ريشية خمرية

ورقة ريشية مشرمة

ورقة ريشية ملفقة

ورقة سنانية

ورقة سهمية

ورقة شوكية

ورقة صحمية ، كاملة

ورقة طبرزينية

ورقة غمدية

ورقة لارية

ورقة نقاد

ورقة كفية

ورقة كلية العروق

ورقة كلية خمرية

ورقة كلية مشرمة

ورقة كلية ملفقة

ورقة لاطنة

ورقة لولبية

ورقة متحدة

ورقة متعالية

ورقة متعاقبة

ورقة متقاطعة

ورقة متصمجة

ورقة مثقوبة

ورقة مخززة ، مسنة

ورقة مخززية

ورقة مركبة

ورقة مستقيمة العروق

ورقة مشرشرة

ورقة منقطة

ورقة مغرقة

ورقة مفارقة

ورقة مقطوعة

Feuille crépue

Feuille alguë

Feuille auriculée

Feuille curvinnervée

Feuille verticillée

Feuille linéaire

Feuille peltée

Feuille pectinnervée

Feuille acyclique

Feuille lyrée

Feuille mucronée

Feuille pennée

Feuille penninnervée

Feuille pennatifide

Feuille pennatifarctée

Feuille pennatifarctée

Feuille lancéolée

Feuille sagittée

Feuille spinuleuse

Feuille entière

Feuille hastée

Feuille engainante

Feuille roncée

Feuille décurrente

Feuille palmée

Feuille palmatinervée

Feuille palmatifide

Feuille palmatifarctée

Feuille palmatifarctée

Feuille sessile

Feuille spiralee

Feuille connée

Feuille alterne

Feuille opposée

Feuille déscussée

Feuille boursofflée

Feuille perforlée

Feuille dentée

Feuille subulée

Feuille composée

Feuille rectinnervée

Feuille lacinée

Feuille pétiolée

Feuille crénelée

Feuille séquée

Feuille émarginée

Feuille tronquée



ورقة

٣٠٦٥٦ - **وِسْتَارِيَه** Wistaria (F).  
هي البيلة ، نبات عايش زيميني ، اطلبها .

٣٠٦٥٧ - **وِسْتِي** Oulstilti (F).  
هو الجبال ، من القردة الذبية ، اطلبه .

٣٠٦٥٨ - **وِسْد** Biffonner (F). To ridge (E).  
وسد التربة توسيداً : اقام فيها الاتلام .

٣٠٦٥٩ - **وُسْطَى** Médius (F). Middle finger (E).  
الوسطى من الاصابع ما بين السبابة والبصر .

٣٠٦٦٠ - **وُسْتَف** Décortiquer (F).  
To decorticate (E).  
قشر . الثمار الموصفة هي الثمار المقشرة وقد يكثر استعمال التوسيف في اللوز والصنوبر والجوز .

٣٠٦٦١ - **وُسْتَف** Pelure (F).  
Peel, Skin, Paring (E).  
الوُسْتَف القشرة الخارجية التي تلحف لب بعض الثمار كالجز والوز والبطاطا والبندورة ... اما قشرة الدراق والتفاف واللاجاس والخوخ البغ ، فتدعى حشاة . اطلبها .

٣٠٦٦٢ - **وِسْكِي** Whisky (F). Whisky (E).  
مشروب كحولي مسكر يصنع من منتش الشعير والخرفال والفيلم . تكثر صناعته في بلاد الانكليز . يقال ان القليل منه يفيد الجسم البشري .

٣٠٦٦٣ - **وِسْم** Ferrade (F). Branding (E).  
كَي الحيوان بعلامه فارقه منمناً لفرقه .

٣٠٦٦٤ - **وِسْم** Etiqueter (F).  
To ticket, To label (E).  
وسم النبات : وضع له سمه من خشب او غيره من المواد كتب عليها التعريف المميز .

٣٠٦٦٥ - **وِسْمَه ، وِسْمَه ، عِظْلِي** Isatis (S). Pastel (F).  
جنس نباتات عشبية محولة من فصيلة السليلبيات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والعتلة . معظمها يري وبعضها صناعي وعلمي . اوراقها كاسلة مستطيلة . ازهارها حامي . ازهارها صفراء اللون . ترغب في الاراضي الجصية . اشهرها وسمه الصباغين .

٣٠٦٦٦ - **وِسْمَه الصَّبَاغِين \* وَرْد التَيْلِيل** Isatis tinctoria (S). Pastel des teinturiers, Guède (F).  
Wood, Ash of Jerusalem, Dyer's weed (E). Färber wald, Wilder Indigo (D). Pastello, Gistro, Guado (I).  
نوع من الوسمه ، يملونحو المتر ، يزهر لاستخراج مواد الصبغة الممزوجة في اوراته . اوراته متعاقبة ، السفلى منها اهلبيجية ولعليها سهمية . فصلها جامد الصفحة حابس الحفصار || ينثر في اوائل الربيع . تنترج اوراته تباعاً ، عند ازدياد نضالها ، وتجف في اللؤل ثم تسحق وتخصر .

٣٠٦٦٧ - **وِسْمِيَّات ، فُسْتِيَّات عَاقِرَة** Mycella sterila (S).  
مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزويعيات . انواعها عديدة تجتمعها خمسة اجناس : الازويدوم ، الركدويدوم ، الرزوكوتيفيه ، السايروسوم والمونيزيلوبسيس || معظمها

٣٠٦٦٧ - **وَزِيم** Gynécée (F). Gynaecium (E).  
جهاز اخية الزهرة ، يشمل المبيض والسمة والقلم . راجع مقسمة .

٣٠٦٦٨ - **وَزِيمَكَة** Botte (F). Bundle, Truss (E).  
ما حزم من البقول والئن على اختلافها .

٣٠٦٦٩ - **وَزِين** حب الحنظل المطحون .

٣٠٦٧٠ - **وَسَابِي** Wasabi (F).  
نبات يقلى مشهور باسم يريوه ، اطلبها .

٣٠٦٧١ - **وَسَاجِكَة \*** Pelor (S). Pelor (F).  
سمكة من الجلاخ الشالكاكات الزمائف . اصطناعها تمتد من المحيط الهندي الى البحر الاحمر . جسمها مخروطي الشكل صغير القد ، ينتهي ذنفعه مستديرة مجذمة بالاسم الجؤوري . زعانفها كبيرة ملونة وسبعة كالشار . الظهيرة منها تمتد من الرأس الى الذنب . رأسها مخروطي الكسم تملوه التزويق النافرة المستعيرة . عيناها ناشزتان مستديرتان متقاربتان . لونها الى السمره الطحلاء تعرضه بعض الخطوط الجؤورية وهو يقيق مع اقترابه من الطور ويبيض منه البطن .

٣٠٦٧٢ - **وِسَادَة** Empodium

٣٠٦٧٣ - **وِسَان \*** Stanops gracilis (S).  
Loris grêle (F). Slender loris (E).  
حيوان لين وحيد الجنس والنوع من فصيلة الليموريات . موطن سرنديب والهند . يألف الاجراع والغابات ويتسلق الاشجار بشفة . ملجته الحياتي جامعي . جماعته قليلة العدد قها يتجاوز خمسة . مسرحة دجوي يستمر من النعشة الى الفجر المبين . قوته الجنادب والجراد وجميع انواع الحشرات والثار السكرية والعسل والصفائر الصغيرة وببعضها وبعض الاعشاب وورق الاشجار || جسمه قصيف صغير يطول نحو ٢٢ سم . يتشيز باستدارة الرأس وببعض الاثف وتجلو مؤخره من الذنب . عيناه كبيرتان مستديرتان . اذناه صغيرتان ، مستديرتان الاطراف المرءاء الناعمة الوبر . شره نام ، لبد التجميع ، حريري للممس . ثوبه الى الصغرة للشباب يملونحو مواج ادعش في الظهر وقفي في سائر اقسام الجسم . هيناه مطوختان بالاسود . قصبة انفه ومقدم خطمه الى البياض الاخير . تحره اطراف قوائمه الى الرعدة القفراء || الاثنى ثنائية الثدي ، وبياضه الحلمات الصغيرة الدقيقة . مجعلها يستمر نحو سبعة اشهر تنقع في حمامه من جروين الى اربعة جراه .

٣٠٦٧٤ - **وَسْب** Flaveria (S). Flavérie (F).  
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها اشباح حولية . سوتها مسرحة اوراقها مفردة متعاقبة مائلة البشرة . ازهارها رؤيسية نورية التجميع || اشهر انواعه وسب الحنش .

٣٠٦٧٥ - **وَسْب الحَنْش \*** Flaveria contrayerba (S). Flavérie du Pérou (F).  
Peruvian dyers weed (E). Flaverie (D). Flaveria (I).  
نوع من الوسب وهو عشبة برية طلية يقال انها تستعمل كشادة لم الاقاي . ساقها متعقبة قرعاء . اوراقها مفردة ، خطية للتشريح ، بحرية اللون . رؤيساتها الزهرية كبيرة القد . ازهارها انبوبية الشكل يضاء اللون .



وساجة



وسان



وسب الحنش



وسمة الصباغين



وسيم



وسيم



وشاعة



وشاعة



وشاعة

قصيرة ، ثلاثية الفصل . كوالها شبه اسطوانية . بطونها غروطية ، تنتهي بمرزات ذرية . كوالها و بطونها مبيضة الحلب الاسمر . رواشها باقة الخضاب ، مجعدة بالاسمر || الحشرة الجملانة واثمة اما البرقة ذئادة او قائللة او غصائله || اشهر اجناسها الوسيمية .

٣٠١٧٥ - **وسيمكة** \*  
Anisophylla (S).  
Anisophyllée (F).

جنس اشجار وشجيرات حرجية من فصيلة القراصيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منبها بعض الاصناف الاستوائية الاسيوية والافريقية || اجناسها كبيرة و رقيقة ، متباعدة الفروع . اورثها منقطة ، متعالية ، سنانية الاتصال . ازهارها ابيض الازتكاز ، سنثلي التجميع . ازهارها صغيرة ينضاه اللون او صفراء . ثمارها عنبة ، بذورها عادمة الالح || اغصانها صناعية ، متوسطة الصلابة .

٣٠١٧٦ - **وشاعة** \*  
Radiolites (S).  
Radiolite (F). Radiolites (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الحلياش وفصيلة الرشاعيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من متحمرات الطبقة الطليانية || اصنافها شبه خنوقية الشكل ، لامتساوية المصارع ، العلوي منها صغير القد ، جلوني الشكل ، مسطحة الصفحة الخفدة ، اما السفلي فخرطوي موشح .

٣٠١٧٧ - **وشاعيات** \*  
Radiolites (S).  
Radiolites (F). Radiolites (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الحلياش ، عادات الرغوس . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من متحمرات الطبقة الطليانية || تتميز انواع هذه الفصيلة بالتباين القائم بين مصرعي اصنافها اذ ان المصراع الاسير سقاطي الشكل في حين ان الايمن شبه خرطوي || اعرف اجناسها واشهرها الرشاعة .

٣٠١٧٨ - **وشاعة** \*  
Asticot (F). Maggot (E).

هي دوسمة ذبابة اللحم . تركيب التسج الحية فتزويها لها مقوسة لاحة .

٣٠١٧٩ - **وشاعة** \*  
Exostemma (S).  
Exostème (F).

جنس اشجار وجنبات برية ، طيبة ، من فصيلة القويحات . انواعها المعروفة ١٢ مهدا البلاد الاستوائية || اورثها متعاقبة ، منقطة . فصالحا يفيشي الشوزن او اهليحية او سنانية . ازهارها طرني او عمودي الزتكاز ، عثقي التجميع . ازهارها انبوية التجمع ، ينضاه اللون او وردية . ثمارها حقة ، ثنائية الخلد . تحوي العديد من البذور الصغيرة المفلطحة || اشهر انواعها الاثنان التاليان :

٣٠١٨٠ - **وشاعة كبيرة الزهر** \*  
Exostemma grandiflora (S).

Exostème à grandes fleurs (F).  
نوع من الوشاعة . منبها فتزويلا . ساقها ترتفع نحو عشرة امتار . قشورها مرة المذاق دافعة للحصى وسهلة المعلة .

من الفطور الزمية التي تعيش في التربة على المواد النباتية المتحلة وبعدها طليل يعيش على النباتات الماتلة فيعطب التسج ويرقسها دون ان يقع بها شديد الاذى .

٣٠١٨١ - **وسيط** \*  
Catalyseur (F). Catalyser (E).  
هو المسعال ، جسم يحدث التحليل بالمالسة .

٣٠١٩٩ - **وسيط** \*  
Remisier (F).  
Half-commission man (E).

هو من يتوسط في انعقاد صفقة بين العميل والسمسار او بين البائع والمشتري .

٣٠١٧٠ - **وسيطعة** \*  
Milieu de culture (F). Medium culture (E).

الوسط الملائم لزراع الميكروبات والفطور .

٣٠١٧١ - **وسيمكة** \*  
Moyen (F). Plea (E).

هي السب أو الورقة القانوي أو الفني تبي عليه للتعوى ويدل عليه امام المحكمة .

٣٠١٧٢ - **وسيم** \*  
Callista (S).  
Calliste (F). Calliste (E).

جنس طير من فصيلة التنغريات . انواعها المعروفة نحو ٦٠ جميعها من طيور امريكة الوسطى والجنوبية . تألف الذبذبات والحراج التي يكثر فيها الدغل . نظامها الحياتي جاعي . اسرارها متغاولة العدد ، تكثر فيها القلة || اجسامها صغيرة القد و ريشة القوام ، تطول من ١٤ الى ١٧ سم . مناقيلها غروطية الشكل تنتهي بمقاطع صغيرة ذرية . اجنتها معتدلة الحجم . اذناها متوسطة القد ، مقطوعة الاطراف . اسرارها رقيقة دقيقة . اصابعها معتدلة الحجم . اثنائها جيلة الاالان الساطعة فيها الازرق والاخضر والاصهب والاسود || جميعها تعيش على البلور وبعض التار المتنية || تتنن اغصانها في الادغال على ارتفاع بعض الاندام عن سطح التربة . اناثها تقنع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الاكور نحو ١٤ يوما .

٣٠١٧٣ - **وسيمكة** \*  
Palloptera (S).  
Palloptère (F). Palloptera (E).

جنس حشرات من فصيلة الوسيميات وذرية ذوات الجناحين . انواعها المعروفة قليلة العدد اغصانها بعض مناطق البلاد الحارة والمتعدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، هيفاء ، شبيهة الالوان او صفراء ، تطول من ٣ الى ٤ سم . رؤوسها مذكورة . عيونها صغيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل الدقيقة . اغصانها معتدلة الطول . ملامسها صغيرة . كوالها شبه اسطوانية بطونها غروطية تنتهي بمرزات ذرية . رؤوسها وكوالها و بطونها وانغخاذها مبيضة الحلب الدقيق . رواشها باقة الخضاب مجعدة بالاسمر الجفوي || جميعها واثمة تألف كل مكان تكثر فيه الازهار . يرقاتها خاضلة او دامتة .

٣٠١٧٤ - **وسيميات** \*  
Pallopteridae (S).  
Palloptéridés (F). Palloptères (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف المراعي والبراري والحراج || اجسامها صغيرة هيفاء ، تطول من ٣ الى ٦ سم . رؤوسها شبه مذكورة ، عيونها فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية

## ٣٠٦٨٧ - وَشَعْمَةٌ عَظِيمَةُ الْوَرَقِ

*Centranthus angustifolius* (S). *Centranthe à feuilles étroites* (F).

بجلة سبروتية معمرة تملو نحو ٨٠ سم. أوراقها ساقية ملتصحة ضيقة، طويلاً يراوح من ٨ إلى ١٥ سم. وعرفها من ٢ إلى ٥ سم. نصلها حبيك الصفة بحري اللون. أزهارها عتقودي التجميع. أزهارها وردية زائفة، متوسطة الداجرة || تنورها يستمر من أيار إلى تموز.

## ٣٠٦٨٨ - وَشَعْمَةٌ عَظِيمَةُ السُّوقِ

*Centranthus macrosiphon* (S). *Centranthe à grosses tiges*, *Valériane à grosses tiges* (F).

عشبة سبروتية حولية عديدة الاصرام. ساقها غمية غليظة مجوفة كثيرة الفروع تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها ساقية ملتصحة لائقة، نصلها بحري اللون. أزهارها عتقودي التجميع، غارث القمة، أزهارها وردية اللون أو بيضاء أو موهجة في بعض الاصرام || تنورها يستمر من حزيران إلى آب.

## ٣٠٦٨٩ - وَشَعْمَةٌ نَحِيلَةٌ

*Centranthus calcitrapa* (S). *Centranthe chausse-trape* (F).

عشبة سبروتية حولية نجيلية الساق تملو نحو ٣٠ سم. أوراقها ساقية ملتصحة ريشية مخرمة. أزهارها عتق التجميع، حامي الاكناز. أزهارها وردية اللون قصيرة الداجرة. تنورها يستمر من أيار إلى تموز.

## ٣٠٦٩٠ - وَشَعْمَةٌ

*Fusiforme* (F). *Fusiform* (E). نمت وصني يذلل على الشكل المغزلي المسكوب الجسم المذهب الطرش.

## ٣٠٦٩١ - وَشَقَّ

الوشق كوكبة نجم شمالية الموقع مركزها بين الدب الأكبر والنمات || عدد نجومها ٤٦ معظمها من المراتب الخامسة والسادسة والسابعة ونها نجم من المربعة الرابعة مركزه في اواسط الدب.

## ٣٠٦٩٢ - وَشَقَّ

جنس حيوانات مفترمة من فصيلة السنوريات ورتبة اللوامس، أنوعها عديدة بعضها اصفر قفلاً من الفهد، بجلة الشكل، متناسبة التكوين، قصيرة الذنب مخروطية الاذن، يملو طرف اذنانها جمة من الزبر الاسود. قربها ما استطاعت اليه سبيلاً من الحيوان والطيور || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع.

## ٣٠٦٩٣ - وَشَقَّ أَحْمَرُ

*Lynx rufus* (S). *Lynx rouge* (F). *Red lynx* (E). نوع من الوشق الاحمر يكي. جسمه متوسط القفد يملو نحو ٨٥ سم. وذنبه ٣٠. ثوبه امفر اللون احمر يملو نوثم السطح وتوشيع اسمر.

## ٣٠٦٩٤ - وَشَقَّ أُرْوِي \* وَشَقَّ مَبْدُولُ

*Lynx vulgaris* (S). *Lynx vulgaire*, *L. d'Europe* (F). *Common lynx*, *European lynx* (E).

نوع من الوشق، كبير القفص، شديد الاذن موطنه اوروبا. وهو كبير الجفلة طوله نحو ١٢٥ سم. وذنبه ٢٠ أما ارتفاعه فنحو ٦٥ سم. اطوار اطوار السنور، يتسلق الاشجار. قوة الطير وصغير الحيوان.

## ٣٠٦٨١ - وَشَاكَّةٌ كَثِيرَةُ الزُّهْرِ

*Exostemma floribonda* (S).

*Exostème floribonde* (F).

نوع من الوشاكَّة، منبتها الاثليل، ساقها ترتفع نحو خمسة أمتار. خواصها الطبية كخواص الوشاكَّة الكبيرة الزهر.

## ٣٠٦٨٢ - وَشَاكَّةٌ \*

*Cynogale* (S). *Cynogale* (F). حيوان وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزباديات. موطنه جزر الزابيج.

يملكه الجيرات ويغاري الماء. يخالط الحيواني فردي لا يجتمع الذكر والانثى الا في زمن الوداق والكوم || جسمه مستطيل الشكل، صغير القد، قصير القوائم، يملو نحو ٧٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٥ سم. رأسه شبه مخروطي الشكل، مبطط الجرم. عيناه صغيرتان لوزيتان. اذناه صغيرتان مستديرتان. مخارجه مجهز بقلق ينطق عند الحاجة. سباله كثيف الملبس الطويل الاشرق. قوائمه خضابة الاصابع. ذنبه وافر الوبر القيد الجلل. ثوبه الى الكهبة السوداء يمتد في الرأس والظهر ويذير في الصدر والبطن || يسبح ويغوص في الماء ويسير على الارض بسرعة ويتسلق الاشجار. قوته الاسماك والسرطان وكل ما استطاع اليه سبيلاً من الطير والحيوان.

## ٣٠٦٨٣ - وَشَعْ

*Fleurs des légumes* (F). الرشع : زهر البقول.

## ٣٠٦٨٤ - وَشَعْ الْمَاءُ \* وَكَيْسَتَارِيَّة

*Vallisneria* (S). *Vallisnerie*, *Vallisneria*, *Vallisneria* (F). *Eel grass*, *Tape grass* (E). *Sumpfschraube* (D). *Vallisneria* (I).

جنس نباتات عشبية رندية مائة ثمانية المسكن من فصيلة كلديات الماء. تعيش وتتكاثر في المياه العذبة الراكدة وفي الاحواض. أوراقها صفيحة طويلة من ٣٠ إلى ٨٠ سم. وتعرض من ٦ إلى ١٢ م. أزهارها صغيرة القفد، الذكرية منها ثنائية السداة تنفصل من قاعدتها وتعلق على سطح الماء بانتظار الزهرة الانثى المرتكزة على زناد لولبي نابض يوجه الزهرة عند ادراكها للتناسل باتجاه الرياح العالم.

## ٣٠٦٨٥ - وَشَعْمَةٌ

*Centranthus* (S). *Centranthe* (F). جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة النارديةيات. انواعها المعروفة ستة، مهددا حوض البحر المتوسط. سوقها مرسمة، أوراقها متعاقبة، أزهارها سوية اللون الاحمر او الالبيض، خواصها الطبية لا تختلف عن خواص سائر النارديةيات لكنها اضعف منها بالمناصر الفعالة || اشهر انواعها واعمالها زراعية ما يتبع.

## ٣٠٦٨٦ - وَشَعْمَةٌ حَمْرَاءُ \* وَالْيَرِيَّانُ أَحْمَرُ

*Centranthus ruber* (S). *Centranthe rouge*, *Valériane rouge*, *Behen rouge*, *Barbe de Jupiter*, *Lilas d'Espagne* (F). *Red spur-valerian*, *Jupiter's beard*, *Fox's brush* (E). *Baldrian*, *Rota Spornblume* (D). *Valeriana rossa*, *Barba Giove* (I).

بجلة سبروتية معمرة طيبة وزينية تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. اصرامها الزراعية عديدة. سوقها موقرة. أوراقها بيضية ذرية، نصلها كامل الصفة مسنن الحافة جميل انقشار يملو من ٨ إلى ١٢ م. ويعرض من ٢ إلى ٤ م. أزهارها عتقودي التجميع، صبوراني القمة. أزهارها مصرية العرف، مستطيلة الداجرة، اردجوانية اللون || تنورها يستمر من أيار إلى آب.



وشاكَّة



رشع الماء



شعفة حراء



وشق أروبي

٣٠٦٩٥ - **وَشَقُّ الْفَقْرِ** هو حناق الارض ، اطلبه .

٣٠٦٩٦ - **وَشَقُّ الْمَنَاقِعِ \* شَيْب**

Lynx chaus (S). Lynx des marais (F). Chaus (E).

نوع من الشق ، طولُه نحو ٦٥ سم. وذنبه ٢٢. ثوبه املح اللون الاغبر ، ابيض البطن ، اكلع العين ، اسمر المرافف . موطنه شاسع الاطراف يعم الحبيشة والتوبة ومصر ولبنان وسورية وال عراق وبلاد فارس حتى بحر قزوين .

٣٠٦٩٧ - **وَشَقُّ حَبَشِي \* Lynx caligatus (S). Lynx botté (F). Booted lynx (E).**

نوع من الشق ، طولُه نحو ٩٧ سم. وذنبه ٣٠. ثوبه اغبر اللون ابيض العنق اسمر الخد . ريشة الذكر عاقبة لامعة وبخبره زرقاء المواج . ريشة الانثى باهية وبخبرها وردية المواج . موطنه افريقية الشرقية وبلاد فارس والهند . يكثر في الحبيشة .

٣٠٦٩٨ - **وَشَقُّ قَهْدِي \* بُغْه ، لُتَجُلْ**

Lynx pardinus (S). Lynx pardé (F). Pardine lynx, Southern lynx, Spanish lynx (E).

نوع من الشق ، موطنه الشرق الاوسط واروية الجنوبية . وهو اصغر جنس من الشق الاوروي واشرس خلقاً ، ثوبه كسوب القهد لوناً وريشة . راجع نقه .

٣٠٦٩٩ - **وَشَقُّ كَنْدِي \* Lynx canadensis (S). Lynx du Canada (F). Canada lynx, Peeshoo (E).**

نوع من الشق الامريكي ، اصغر جنس من الاوروي واكبر من القهدي . طولُه نحو ١٠٥ سم. وذنبه ٥١. موطنه كندا وبعض امراج اريكة التاليفية . ثوبه املح اللون ، حنطي المواج ، اسمر الريشة . ذنبه اغبر اللون احر المواج اسود الطرف .

٣٠٧٠٠ - **وَشَكْل Suint (F). Yolk (E).**

هو نتوع او مصالة صوف الغنم . راجع نص .

٣٠٧٠١ - **وَشَكْلِي \* Ambulacraire (F). Ambulacrum (E).**

الجهاز الرثلي مجرمة اقنية متشابكة تسمح بمرور الغذاء عند الشوكيات .

٣٠٧٠٢ - **وَشَمَّ**

اول ظهور النبات على سطح التربة . ج وشوم وشام .

٣٠٧٠٣ - **وَشَمِيَّة \* Mascigosporium (S).**

جنس فطور مجهرية من الرطحيات يتميز بجهره الكندية الاسطوانية ، القصيرة ، المتنامية ، الشفافة التي تحمل في اطرافها كائنا فردية ، مدنية ، وريية الانقسام الوثيري . بويضاته مستطيلة عليية || انزاعه قليلة ، اعرضها ونيمة النجيل وريشة الترس .

٣٠٧٠٤ - **وَشَمِيَّةُ الْفَرْسِ \* Mascigosporium lupini (S).**

فطر مجهرى يركب اوراق الترس فيسبب ذبيطا واحمالا الباكس || مظهره الخارجي لطح خفيفة مستطيلة سمراء اللون ، زيتونية المواج ، تركب الاوراق فتؤذيها وتقتوها الى الذبول والاحمال || ينشط في المواتق الظليلة الرطبة .

٣٠٧٠٥ - **وَشَمِيَّةُ النَّجِيلِ \* Mascigosporium calvum (S).**

فطر مجهرى يصيب اكثر النجيليات البرية في اوراقها

ليعملها ويدونها || مظهره الخارجي لطح مستطيلة مبيشة طويلا يراوح من ١ الى ٨ سم. لونيا الى الجوزية العاقبة . تركب نصل النصف فقرهه وتؤويه || ينشط في المواتق الرطبة وريية نشاطه الموائل الجوية المواتية .

٣٠٧٠٦ - **وَشَن Eclage (F). Low-water mark (E).**

وشن ووشن الماء : قل . زين الشين هو زين البروس اي قلة المياه النابتة او الجارية .

٣٠٧٠٧ - **وَشَنَة Griotte (F). Morello cherry (E).**

اسم شامل يطلق على مختلف ثمار شروب الكرز الحادي التي تتميز بصفرها وحوضها .

٣٠٧٠٨ - **وَشَه**

طائر من الصقور وهو ضرب من الشامين او هرق منه . كل ما قيل فيه : « طائر شبه الشامين وليس به » .

٣٠٧٠٩ - **وَشَيْج ، هَلِكُونِيَا Heliconia (S). Héliconie (F).**

جنس نباتات عشبية مسرة من فصيلة الموزيات ، انواعه المعروفة ٩ ، اصلها البلاد الاستوائية والحارة . تزود للزينة وهي قريبة الشبه من الموز تملو من ١٠٥ الى ٤٠٠ سم. اوراقها كبيرة القد ، نصلها اعليها على الشكل مائل الصفحة الجامدة الزاهية الخضار . كيانها كبيرة القند تطلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. انزاعها متراكبة ، كثيرة البعد ، مختلفة الالوان البنية .

٣٠٧١٠ - **وَشَيْجَة Racine secondaire (F). Secondary root (E).**

من الجذور الثانوية التي تنشعب عن الرئيسة . ج وشائج .

٣٠٧١١ - **وَشَيْعَ Palissade, Hale (F). Palisade, Hedge (E).**

سياج من قصب او قضبان متشابكة وكل ما غرس او وضع حول الحديقة من الشجر والشوك والاسلاك منساً لإبادة الدخول .

٣٠٧١٢ - **وَشَيْعَ**

هو سقف البيت وهو ما يبس وسقط من ورق الشجر . ج وشائج .

٣٠٧١٣ - **وَشَيْعَة Fuseau (F). Spindle (E).**

شكل تزلذب هيكلي شائع الاستعمال في بعض انواع الانجار المشردة . والشكل الرشي يكون عادة اوسع قاعدة من المردي واقل انضاماً منه .

٣٠٧١٤ - **وَشَيْعَة Allantoide (F). Allantoid, Allantoic (E).**

ملحق جنيني يظهر في اول الحمل ويستمر نحو ثمن يوماً ثم يتلاشى .

٣٠٧١٥ - **وَصَامَة Pathologie (F). Pathology (E).**

علم يبحث في اسباب الامراض واعراضها .

٣٠٧١٦ - **وَصَامَة نَبَاتِيَّة Pathologie végétale (F). Vegetative pathology (E).**

علم يبحث في اسباب الاوصام النباتية وعوارضها .



وشق المناع



وشق حبشي



وشق كندي



وشق كندي

Tuteur de fait وصي خاص  
Tuteur légal وصي شرعي  
Tuteur ad hoc وصي نفعي  
Cotuteur وصي مع غيره

Tutelle (F), Tutelage (E). وصاية  
نظام قانوني لحماية القصر .

٣٠٧١٨ - وَصَع \* ، وَصَعَة  
Troglodytes parvulus (S), Troglodytes mignon (F), Wren (E).

عصفور أبيض من الجوارح . جسمه صغير القد يطول نحو ١٠ سم . منقاره دقيق حاد الطرف . جناحاه قصيران . ذنبه متوسط الطول . قريب من الرتبة السمراء ويلعبها جميع معترض أسود . يألف الحدائق والأدغال والبرسيم والسياحات . قوته اللدنان والناكبات والذباب والحمام . يدثر في الأدغال والجنانث الكثيفة . أثناء تخضن مرتان في السنة . حضنتها ٨ إلى ٦ بيضات وتستمر ١٢ يوماً .

٣٠٧١٩ - وَصَعِيَّات  
Troglodytidae (F), Troglodytidae (E).

فصيلة طير من الجوارح لاقفات النمل سنيات المناخير . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٦٠٠ موطنها يشمل معظم مناطق القارتين القديمة والجديدة || معظم طيورها صغيرة القد ، تحب المناخير القليلة الانعطاف . قصيرة الاربعة والأذنان المستديرة الأطراف . دقيقة الارباع الرفيعة || تألف الأدغال . طيراتها قصيرة الشوط كثير التصيد والتبيط . تسرح على الأرض خفية وتسلو بسرعة . قوتها النمل والحشرات الصغيرة والنويات || أشهر اجناسها املاطاً الوصع .

٣٠٧٢٠ - وَصَف ، تَعْرِيف  
Signalement (F), Description (E).

تحديد اشكال الحيوان وعلاماته الفارقة بعد ذكر اسمه او رقه وتحديد سلالته وعمره .

٣٠٧٢١ - وَصَف ، تَعَت  
Qualification (F), Qualification, Title (E).

هو في القانون المدني تحديد طبيعة العلاقة القانونية . وهو في القانون الجنائي تعيين وضع الجريمة في نطاق المقتات وموجبات القانون .

٣٠٧٢٢ - وَصَل  
Récépissé (F), Receipt (E).

محرر يدون فيه تسليم أوراق او اشياء للاطلاع او الحفظ .

٣٠٧٢٣ - وَصَم  
Maldie (F), Disease (E).

الوصم هو المرض . ج . وسم وراسم .

٣٠٧٢٤ - وَصَم سَكُو  
Mal secco

هو ستندارية الحمضيات ، اطلبها .

٣٠٧٢٥ - وَصَمِيَّات  
Périnosporées (F), Périnosporée (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الصنانيات . تتميز بمشيجها المرئي الخيطوي الدائلي الذي لا يخرج من دعاماته . تكاثرها ببني خارجي || اجناسها ستة اربعة منها تركيب النبات فتؤذي بهي التسنة والصنات والصيل واللفحة . واثنان لا يؤذيان .

٣٠٧٢٦ - وَصِي  
Tuteur (F), Guardian (E).

هو الذي صار قيمته لغيره على مصلحة القاصر وإدارة امواله وتثيله امام القضاء وهو قد يكون :  
وصي بالوصية

٣٠٧٢٧ - وَصِيَّة ، مَوْصِي بِهِ  
Legs, Testament (F), Legacy, Will (E).

هو كل موقوف في وصية مكتوبة .

٣٠٧٢٨ - وَصِيَّة عَهْدِيَّة ، وَصِيَّة إِسْتِثْنَائِيَّة  
Fidécum (F), Fidél-commissum (E).

هي الوصية التي يشترط فيها دفع المال الموقوف الى شخص ثان بعد مدة معينة . فالوصي له الاول يدعى المهدد او المكلف والوصي له الثاني يدعى المستحق المهدد .

٣٠٧٢٩ - وَصِيد  
Athermane, Athermique (F), Athermanous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل مادة لا تحترقها الحرارة المشعة .

٣٠٧٣٠ - وَصِيد  
Dru (F), Thick (E).

الزروع الوصيد هو الزروع المتقارب الاصول . والزراعة الوصيدة : المتقاربة النبات .

٣٠٧٣١ - وَصِيدَة  
حظيرة من الحجارة تتخذ المال بيتاً للحظيرة تكون من التفتحة .

٣٠٧٣٢ - وَصِيْع  
Cri des oiseaux (F), Cry of the birds (E).

صوت الصائير . راجع صقب .

٣٠٧٣٣ - وَصِيْف  
هو كريمة الير ، اطلبها .

٣٠٧٣٤ - وَصَام  
Radiation nocturne, Rayonnement nocturne (F), Nocturnal radiation, N. radiation (E).

ويسم من قال الرضاء الليلي ، هو اطلاق الحرارة التي كانت قد تجمعت في النهار .

٣٠٧٣٥ - وَصَام  
Rémanence (F), Remanence (E).

خاصة تتميز بها بعض المشاعر التي يستمر انفعالها برعة من الزين بعد زوال السبب الباعث .

٣٠٧٣٦ - وَضَع ، وَلاَدَة  
Mise bas, Part, Parturition (F), Parturition (E).

خروج الجنين من رحم الانثى في نهاية مدة الحمل .

٣٠٧٣٧ - وَضَع الْحُدُود  
Abornement, Bornage (F), Delimitation, Fixing limits (E).

وضع علامات بين ارضين للدلالة على الخط الذي يفصلها .

٣٠٧٣٨ - وَضَع الْيَدَ  
Malnmise, Occupation, Possession (F), Seizure, Possession (E).

الملك في المباح انما يثبت بالاستيلاء عليه . والآخر هو المستولي او الغاشل . راجع استيلاء .

٣٠٧٣٩ - وَضْعِيَّة  
Assiette (F), Posture, Seat (E).

هي حالة الانس التي تقوم عليها بعض الامور .  
كوضعية الحق

Tuteur testamentaire



وصعة

وضعية الرهن  
وضعية الضريبة  
وضعية العقار

٣٠٧٤٠ - وَصَمَّ غشية الجزار يقطع عليها اللحم .

٣٠٧٤١ - وَصِيحِيَّ *Oryx beatrix* (F).  
هو أرغ الجزيرة ، اطلبه .

٣٠٧٤٢ - وَطَّ *Cri de la chauve-souris* (F).  
*Cry of the flittermouse* (E).  
هو صوت مجنحات الايدي من وطواط وغفاس وشما الخ .

٣٠٧٤٣ - وَطَّار \* *Cereopsis* (S). *Céréopsis* (F).  
طائر وحيد الجنس والرتب من كفيات القدم وفصيلة  
صفصيات الحناتير || ملجته الحياتي جماعي . يكثر وجوده  
في جزر المحيط الهادي || جسمه متوسط القد . جسمه سم  
البطة الصغيرة . رأسه معتدل الجرم . يتميز برسابة الزند  
الذي ينفذ الصفحة العليا من المنقاد . عنقه معتدل  
القول . جناحه كبيران لا حافان . ذنبه قصير مقعوم  
الطرف || ثوبه الى الزبدة تعلوها ماجات بنفسجية وزرقاء  
يلته الى البياض الاخير .

٣٠٧٤٤ - وَطَّالَة حَرْبَاء \* *Stratiomyia chamaeleon* (S).  
*Stratiome caméléon, Mouche armée* (F).  
حشرة من فصيلة البطافات . تألف الموامع الربية . جسمها

متوسط القد ، بطول من ١٤ الى ١٦ سم . رأسها كبير  
الجرم ، قليل الشعر . عينها فارتقتان . زباناها مرفقيان .  
صدرها كثيف الخمل . صفيحتها صفراء اللون ، ثنائية  
المناقص الحادة . ثوبها الى الزرقة السراة يملوها في يعلها  
تبيح اصفر هندي الشكل || يرتقا دودية ، غبراء  
القول ، مبراء الرأس .

٣٠٧٤٥ - وَطَّافِيَّات \* *Stratiomyidae* (S).  
*Stratiomyidés* (F). *Stratiomyidae* (E).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين قصيرات القرون .  
اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، منتشرة في جميع اصقاع  
العالم || اجناسها مجنحة ، متوسطة القد او صغيرة . شبيهة  
بالذباب . رؤوسها شبه مستديرة . حيوها لاقية الاوتكار  
متناكها حثة لا تصلح لسم . قرونها الاستشارية متباعدة  
الاشكال ، تكثر فيها الاستقامة ، عدد فصلها يراوح  
من ٤ الى ٨ . صبورها ملحومة بصل قصير ملهب اللون  
او لفي . صفياتها شاذكة او سرعة . قوائمها حرياطة .  
بطونها خاسية او سداسية السكم الواضحة . رواشتها نسيطة ،  
شفافة ، مطيعة الاسترمال عند الراحة || اناثها اكبر من  
ذكورها . يرتقا دودية الشكل ، غبراء اللون ، فسيمة  
الرؤوس التي تنقبض في مقدم الجوشن . جميعها نائمة  
تميش على المراد النباتية والمضوية || اشهر اجناسها  
الوطافة والبرية والسمنة .

٣٠٧٤٦ - وَطَّامَة \* *Monotoma* (S).  
*Monotome* (F). *Monotoma* (E).

جنس حشرات من فصيلة البطافات ورتبة غدييات  
الاجنحة . انواعها المروفة نحو ٣٠ منتشرة في بعض  
اصقاع البلاد الباردة والمتدلة الحرارة || اجناسها صغيرة  
تطول من ٢ الى ٣ سم . رؤوسها مخروطية الشكل . حيوها

صغيرة ، ناضرة . تأثيرها وفكوكها نظامية . قرونها  
الاستشارية دويسية الاطراف . كواسلها مستطيلة الشكل ،  
مسنة الحثار . اغامدا وشمية ، لا تنلف كامل البطن .  
اثوابها وصية اللون ، يكثر فيها الاسمر والاسمر ||  
جميعها دامة تميش على المواد النباتية المنحلة والساخرة الى  
الانحلال .

٣٠٧٤٧ - وَطَّامِيَّات \* *Monotomidae* (S).  
*Monotomidés* (F). *Monotomidae* (E).

فصيلة حشرات من غدييات الاجنحة . اجناسها وانواعها  
المروفة قليلة العدد منتشرة في بعض اصقاع البلاد المعتدلة  
الحرارة || اجناسها صغيرة تطول من ٢ الى ٥ سم . رؤوسها  
صغيرة ، مخروطية الشكل . حيوها بارزة . تأثيرها وبلاسها  
نظامية . قرونها الاستشارية دويسية الاطراف ، تساعية  
الفصل . كواسلها مسنة الحثار . اغامدا شبه مجنحة  
الشكل ، لا تلحف كامل البطن . قوائمها نسيطة . ارساها  
رباعية المقل ، اثوابها ملونة || جميعها دامة . بعضها  
يميش في قرى التل اعصها النمل الاكثف || اشهر  
اجناسها الرطامة .

٣٠٧٤٨ - وَطَّارِيَّط *Mégachiroptères, Grandes chauves-souris* (F). *Me-*  
*gachiroptères* (E).

مرتبة حيوانات من مجنحات الايدي ، تشمل فصيلة  
الوطواطيات والعديد من الاجناس والانواع . تتميز بأذنانها  
اللازندية ، بأنوثها اللازخرقية وبأذنانها ، عند وجودها ،  
المركزة تحت الكشاء الجلدي والقاعدة النخذية .

٣٠٧٤٩ - وَطَّبَّ هو الصرع العظيم في البقر والذئب والماضر .

٣٠٧٥٠ - وَطَّيَاء النطية الصرع كدوك بقرة ولجاء او عز وطياء .

٣٠٧٥١ - وَطَّحَاتِيَّات \* *Mucédinées* (F). *Mucedinas* (E).

عارة فطور مجهرية من فصيلة الكنتيات . تتميز ببونها  
الشفاف او القليل لتلون || اجناسها عديدة ، فوارقا  
مركزة على تركيب شكل الكنتات . اعزها من الرسية  
الاقتصادية الزراعية حنة : الحنون ، الدندام ، السليمية ،  
الككن والكنتية .

٣٠٧٥٢ - وَطَّحِيَّات \* *Mucedinaceae* (S).  
*Mucedinacés* (F). *Mucedinaceae* (E).

فصيلة فطور مجهرية من مرتبة الحفانيات ورتبة الزوييات .  
تتميز ببونها الاناثي والترتيب والتضبيب فهو غشي  
التجميع او مبعثر وهو عادم اللون شفاف او مشع التضبيب  
الزاهي . كئناها متعددة الاشكال والالوان . اجناسها  
وانواعها كثيرة العدد جميعها خس همارات ، الزريكات  
والطليات والفتيتيات والماسويات والقيسيات والمبرويات .

٣٠٧٥٣ - وَطَّدَ *Tasser* (F). *To compress* (E).  
وطد الارض شربها بالبطلة لتصلب لاساس بناء  
او غيره .

٣٠٧٥٤ - وَطَّصْرِيَّية هي الواصريية ، اطلها .

٣٠٧٥٥ - وَطَّنَ راجع بك .



وطار



وطانة



### ٣٠٧٥٦ - وَطَاط

Chauve-souris (F).

Bat, Flittermouse (E).

اسم شامل عام يطلق على جميع حيوانات رتبة مجنحات الالادي .

### ٣٠٧٥٧ - وَطَاطَة

سمكة بحرية تسمى شفين العمق ، اطلها .

### ٣٠٧٥٨ - وَطَاطِيَّات

Pteropodidae (S).

Pteropodidae (F). Pteropodidae (E).

فصيلة من البطاريق . اجناسها ٨ وأنواعها ١١٠ جميعها ثامرة ، كبيرة ومتوسطة القد . تتميز بقوف أذنبا البوقي الشكل . انثاها تنضع جروا واحدا تحملها دائما وترضعه في انثاء طيراتها . اما اجناسها الثانية فهي : الحيت ، الحورن ، الرذاعة ، السرماب ، السططوم ، الشقاعة ، اللثانة والمساعة . (اطلها في مواضعها) .

### ٣٠٧٥٩ - وَطِيب \*

Isocardia (S).

Isocardia (F). Isocardia (E).

جنس حيوانات بحرية من فصيلة الطريبات ورتبة الرغويات صفيحيات الخياشيم والارجل . أنواعها المعروفة عديدة اطلها بمجر البلاد الحارة والمحتلة الحارة . اصداها شبه قلبية الشكل مستتلة اللحم او صغيرة ، مائسة الصفعة او خافتة التخليد النحيل يلصقها غشاء ليفي المادة دقيق . تعيش في رمال واسحال مصبات الانهر .

### ٣٠٧٦٠ - وَطِيبَة

Utricule (F). Utricule (E).

تجويف كالغرفة يوجد في جدار الطلع يستوعب المادة المنصبة .

### ٣٠٧٦١ - وَطِيبَة

Assise du mur (F).

وطيبة ج : مثالة : هي قواعد البنيان أي اساسه .

### ٣٠٧٦٢ - وَطِيبَة

حياء الاثنى من ذوات الحافور .

### ٣٠٧٦٣ - وَطِيب

Canon (F). Shin (E).

عضون قوائم الخيل وهو في الفرس بين الركبة والحوشب في القامتين الاماميتين ، وبين المرقوب والحوشب في القامتين الخلفيتين .

### ٣٠٧٦٤ - وَعَاء

Vaisseau (F). Duct (E).

هو الانبوب الكائن في نسج النباتات الوضائية ، وهو يقع على اشكال خنثلة اشبهها بالخزوي والشكي والمنقط .

### وعاء حلزوني

Vaisseau spirale (F).

Spirally duct (E).

### وعاء شبكي

Vaisseau réticulé (F).

Reticulated duct (E).

### وعاء منقط

Vaisseau ponctué (F).

Punctuated duct (E).

### ٣٠٧٦٥ - وَعَائِث \*

Melyris (S).

Mélyris (F). Melyris (E).

جنس حشرات من فصيلة الوعائيات ورتبة غديات الاجنحة انواعها المعروفة نحو ٣٠ اطلها بمط مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . اجناسها شبه اعليجية الشكل ، مستتلة الاسديداب ، طولها من ٨ الى ١٦ م . رؤوسها مستترضة ، قليلة التشوؤ . عيونها صغيرة ، بارزة .



رطب



وعائ

تأثيرها وملاسها نظامية . قرونها الاستشعارية قلادية . كواسلها مقببة الشكل . اغمارها لاسفة ، ثنائية الفلوع الناشرة القاطية . قوائمها نشيطة . اثنائها ملونة تكثر فيها الحرة والاصحة . جميعها واثمة وغفيرة تعيش على رقيق الازهار وما تقتنصه من صغبر الحشرات . يرقاتها مفترسة .

### ٣٠٧٦٦ - وَعَائِيَّات \*

Melyridae (S).

Mélyridae (F). Melyridae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد . اطلها بمط مناطق افريقية الشالية وحوض البحر الابيض المتوسط . اجناسها شبه اعليجية الشكل ، طولها من ٩ الى ١٨ م . رؤوسها مستترضة ، قليلة التشوؤ . عيونها صغيرة ، بارزة . تأثيرها وملاسها نظامية . قرونها الاستشعارية قلادية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها مقببة . اغمارها لاسفة ، ثنائية الفلوع القاطية ، قليلة الرخافة ، مستتلة الصلابة . قوائمها نشيطة . ارساها خاسية المعقل . اثنائها ملونة . جميعها واثمة ومفترسة ، تعيش على رقيق الازهار وما تقتنصه من صغبر الحشرات . يرقاتها مفترسة . اشهر اجناسها الوعائث .

### ٣٠٧٦٧ - وَعَاط

Rosier jaune (F).

هو الوردة الاصفر ، اطله .

### ٣٠٧٦٨ - وَعَائِيَّات البُذُور

Angiospermes (F).

Angiospermes (E).

وعائيات البذور او مستورات البذور او النباتات مظافة البذور هي احد قسمي باديات الزهر . وهذا القسم يشغل النباتات التي تكون بيضها في مبيض وزرعتها في ثمرة .

### ٣٠٧٦٩ - وَعَائِيَة

Vascularisation (F).

تغير فيزيولوجي ، راجع قسويته .

### ٣٠٧٧٠ - وَعَب

Terrain plat et vaste (F).

الموضع الواسع المستقر من الارض . ج : وعاب .

### ٣٠٧٧١ - وَعْث

Epiphytie (F). Epiphyty (E).

وعوث النبات : عللها وارسامها في منطقة معينة .

### ٣٠٧٧٢ - وَعْثَة

Coleosporium (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الوعائيات يشبه بالذات المتراكبة المتشابهة وبدعاماته الاسطوانية المستطيلة الدقيقة القاعدة . انواعها قليلة تنطفل على نباتات الفصيلة الصنوبرية فتركب الاهداب وتؤذيها . مظهرها الخارجي بطور مستدرة مبرزة متفرقة لونها الى الخلوة يحمسها اطار بنسجي ، تثبت على النصل نحو السنة ثم تتطور بعد ذلك الى سويصلات مفلطحة القاعدة العريضة ، مستدرة القمة ، طولها من ١ الى ٢ م . لونها الى البياض التي يرضع منها عند اكمال دورها الفطري وبعد انفجارها نقطة من الراتنج . اغزارها زهيدة لا تستوجب المكافسة .

### ٣٠٧٧٣ - وَعَائِيَّات \*

Coleosporiaceae (S).

Coléosporiacées (F). Coleosporiaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة العداميات ، تتميز بركباتها التي تحضن العداميات ، دعاماتها عمودية الانغلاق ، رباعية الانحية ، شمعية الانقسام ، غليظة الجراب البوقي . اجناسها قليلة ، اعرفها الوعثة والسبع .

## ٣٠٧٨٣ - وَعَش المَصْرِي الهَارِي\*

*Dactylopius adonidum* (S). Pou blanc des serres (F).  
حشرة صغيرة من القرمزيات. محارية الشكل، صفراء اللون، مركزية السرة، خبراء الترس الشامي. تركيب نباتات المصاري وتفتك بها.



وعش التين

## ٣٠٧٨٤ - وَعَش صَيْتِي

هو قمرزية فوردوزا، اطليا.

## ٣٠٧٨٥ - وَعَش مَحَارِي

هو قمرزية النفاخ، اطليا.

## ٣٠٧٨٦ - وَعَل ، وَعَل ، تَيْس الجَبَل

*Bouquetin* (F). *Steinbok* (E).  
جنس حيوان بري جبل. ينحدر من فصيلة التنيات. قريب الشبه من المعز التي تحدثت عنه. أنواعه عديدة، جميعها ودية الجثة، كبيرة القرون اللطيفة المنحنية القوية. الاثنى ثنائية الاختلاف تقصص جديداً واحداً في اواخر حزيران يتبع امه بعد الوضع بثلاث او اربع ساعات || اعرف انواعه واشهرها : الوبل والبدن والتايل والماعور والمزعز. ج ارمك ووصل.



وعش المصري البطل

## ٣٠٧٨٧ - وَعَل اُرُوْبِي \* ، وَعَل الالب

*Capra ibex* (S). *Bouquetin des Alpes* (F). *Steinbok of the Alps* (E).

نوع من الوعل. موطنه جبال الالب. جسمه ربع الجثة مسفوس الغالب يطول ١٥٠ سم. يطول نحو ١٠٠ وزن ٧٥ الى ١٠٠ كيلو. ثوبه سوي اللون يختلف مع العمر ومع فصول الصيف والشتاء. وهو يراوح بين الشبهة الصنانية والصمرة. غط ثوبه اكهب اللون. ابطاء وبلته اصغر من ظهره. قراءه ضليمان محتين كسيفين احدين. الاثنى اصفر قرناً من الذكر.



وعش المصري الهاري

## ٣٠٧٨٨ - وَعَل القَفَقَاس ، قُرْ

*Capra cylindricornis* (S). *Bouquetin du Caucase, B. à cornes cylindriques, Tur* (F).

نوع من الوعل قريب الشبه من الغنم. موطنه جبال القفقاس. طولك يراوح من ٦٠ الى ٦٥ سم. وارتفاعه كذلك. قرنه يطول نحو ٦٠ سم. وهو يشبه قرن الكبش شكلاً وانسلاطاً. ثوبه الى الكهبة، لحية قليلة الشعر سواد اللون. إجله يعد من ٦ الى ١٠ ازواج.

## ٣٠٧٨٩ - وَعَل حَبْتِي

*Capra wail* (S). *Bouquetin d'Abysinie* (F).  
نوع من الوعل. موطنه جبال بلاد الحبشة من ارتفاع ٢٠٠٠ الى ٤٠٠٠ م. وهو صغير الجثة احسن القرن مخدب الجبهة. إجله يعد من ٧ الى ١٥ زوجاً.

## ٣٠٧٩٠ - وَعَل سِيْبِيرِي

*Capra sibirica* (S). *Bouquetin de Sibirie* (F).  
نوع من الوعل. موطنه شاسع الاطراف. ينتد من حلايا الى شرقي سيبيريا. جسمه كبير القند قدره قدر الوعل الاروبي. الا اثنى انتد قويا وهو كحيت الدمية مستطيل القرن. إجله يعد من ١٢ الى ٢٠ زوجاً.



وعل اوردية

## ٣٠٧٩١ - وَعَل عَرَكِي

ويندو ايضاً وعل التوبة، هو البدن، اطليا.

## ٣٠٧٩٢ - وَعَل قَارِصِي

هو البزل، اطليا.

## ٣٠٧٧٤ - وَعَش Dryandra (S). Dryandre (F).

جنس جنبات ابيئة معمرة من فصيلة الغضيات. اوراقها لا نظامية الترتيب منها المتعاقبة والفضية والبشرة. ازهارها رويسية الجميع تحفظها قلائد من القناب الخروطي الشكل. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

## ٣٠٧٧٥ - وَعَش لَشَجِي

*Dryandra nivea* (S). *Dryandra blanc de neige* (F).  
نوع من الوص، جنيته تملو نحو ١٠٠ سم. اورتيا مادة. فروصها قصيرة عقداء. اوراقها مفصصة، نصلها يطول من ١٠ الى ٢٠ سم. مسفته السفل حلية البشرة فضية اللون. رؤوساتها الزهرية بيضية الشكل. ازهارها يفياء اللون. قناتها حلية البشرة حنطية اللون والمواج. تنوره يستمر من آذار الى ايار.

## ٣٠٧٧٦ - وَعَش لَكَخِر

*Dryandra formosa* (S). *Dryandra magnifique* (F).  
نوع من الوص، جنيته تملو نحو اربعة امتار، ساقها عقداء. فروصها اطروسية منتصبة مستطيلة. اوراقها غنية متراكبة، نصلها ضيق الصفحة يطول من ١٢ الى ٢٠ سم. ويمرض من ٨ الى ٨ سم. رؤوساتها الزهرية بيضية الشكل. ازهارها برقالية اللون، قناتها حر || تنوره يستمر من ايار الى تموز.

## ٣٠٧٧٧ - وَعَش كثير الزهر

*Dryandra floribunda* (S). *Dryandra multiflora* (F).  
نوع من الوص، جنيته تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها قراء. فروصها لينة العود الخمين. اوراقها متعاقبة، نصلها اهليجي الشكل، مسن الحافة، مالن البشرة على مسطحه. ازهارها صفراء اللون، قناتها حنطية. تنوره يستمر طوال فصل الصيف.

## ٣٠٧٧٨ - وَعَشَاء

الزملة البنية يصعب فيها المشي. ج وعاش واطعاس.

## ٣٠٧٧٩ - وَعَش اُرْجُونِي

هو قمرزية الحفصيات، اطليا.

## ٣٠٧٨٠ - وَعَش التَيْن \*

*Lepidosaphes minima*, L. *conchyiformis*, *Mytilaspis minima* (S). *Cochenille virgule du figuier* (F).  
حشرة صغيرة من القرمزيات، جسمها كروي الشكل تقوى يراوح من ٢ الى ٣ سم. ثوبها ابيض اللون، ترسا الشامي قليل المادة والانتشار. جيلها الخولي واحد. تنجح مكها تدريجيا فلول شهر نيسان فينفت عن يرقات تنهي انسلختها في اواخر الصيف، اقلها حوض البحر المتوسط. تركيب التين دون سواء تنؤذه اذا كثرت لانها تنهي الساق والاصغان.

## ٣٠٧٨١ - وَعَش الحُمْصِيَّات

هو قمرزية الحفصيات، اطليا.

## ٣٠٧٨٢ - وَعَش المَصْرِي المُسَطَّط \*

*Eucalymnatus tessellatus*, *Locanum tessellatum* (S). *Cochenille plate des serres* (F).

حشرة صغيرة من القرمزيات، جسمها بيضي الشكل مبطط يطول من ٣ الى ٤ سم. ويمرض نحو ٢. ثوبها الى البني الاصفر. اطرافها خبراء اللون مسنة، جاتهاها شامغان. تركيب مسطط نباتات المصاري اعصها التخليلات والسحليات.

Engraissement (F). **وَعْنَنٌ** و **وَعْنَنٌ** ٣٠٨٠٢

Fattening (E).

توصفت الغنم والأبقار : بلغت غاية السمن .

Latérite (F). **وَعْنَكَة** ٣٠٨٠٣

شكل من التراب الصلصالي الاحمر اللون .

Latéritique (F). **وَعْنِيَّة** ٣٠٨٠٤

صفة الوعنة وهي التراب الصلصالي الاحمر اللون .

Chacal du Sénégal (F). **وَعْوَع** ٣٠٨٠٥

رابع ابن آوى الافريقي .

٣٠٨٠٦ - **وَعَالٌ**

البقال وكل ياتع يغلي ثمن الاشياء .

Aubergine (F). **وَعْدٌ** ٣٠٨٠٧

هو الباذنجان ، اطليه .

Imperméable (F). **وَقَاصُ** ٣٠٨٠٨

Impermeable, Impervious (E).

الوقاص : المكان يحسك الماء . والترية الوقاص هي التي

تحفظ الماء ولا تسرب .

Eplucher (F). To pick (E). **وَقَلٌّ** و **وَقَلٌّ** ٣٠٨٠٩

وقل وقل الشيء قشره فهو وقائل .

Philodendron (S). **وَقِيلٌ** ٣٠٨١٠

Philodendron (F).

الواحدة وقيلة . جنس نباتات جذورية مدادة معمرة من

فصيلة التفلسيات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠٠ منها

بعض مناطق البلاد الاستوائية اغصنها امريكة الجنوبية ||

سوقها جلدورية مدادة . اوراقها متناحية ، منقطة ، كبيرة

القد ، شبه قلبية الشوزن ، جامدة النصل الغرض والمشرم .

ازهارها طلمة كما في النخل . ازهارها شديدة الصغر ،

عريفة ، مستعينة الاربع || تزود لتزين في المراكن

داخل المساكن .

Exalbuminé (F). **وَقِينٌ** ٣٠٨١١

نمت تعريفي يطلق على كل بذرة او ثفل عديم الراح

اي الابوين .

Crie de la pie-grièche (F). **وَقِيٌّ** ٣٠٨١٢

الوق هو صباح الصرد .

Chronomètre (F). **وَقَاتٌ** ٣٠٨١٣

Chronometer (E).

جهاز ضبط دقيق الصنع يستعمل لتحديد الوقت الذي

استوجبه العمل المطلوب .

Chronométrique (F). **وَقَاتَة** ٣٠٨١٤

Chronometry (E).

Combustible **وَقَادٌ** ٣٠٨١٥

ما توقد به النار ، اطلب وقود .

Certhiols (S). Certhiola (F). **وَقَالٌ** ٣٠٨١٦

جنس طير من الجواثم رقيقات المناظر وعضلة الخدريث ،

انواعه المعروفة نحو عشرة منتشرة في معظم المناطق الحارة

اغصنها امريكة الجنوبية || اجسامها متوسطة القد .

Commelina (S).

Commeline, Commelyne (F). Blue spiderwort (E).

Commeline (D).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الوعلانيات . انواعها

زهاء ٨٠ معظمها بري وبضها طيب وزيتي . سوقها

منقصة او مدادة . اوراقها لا قياسية الشكل تكثر فيها

الاستطالة . ازهارها لا نظامية التجميع ، سوية الالوان

تلب فيها الزهرة || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣٠٧٩٤ - **وَعَلَّانُ الْجَنَّةِ**

Commelina benghalensis (S). Commeline du Bengale (F).

نوع من الوعلان ، ساقه وفروعها مدادة تنصب عند اطرافها .

اوراقه بيضيه مقطوعة ، تصلها الى الخصار الزاهي ،

اغصانها موشحة بالاخر . ازهارها كثيرة العدد ، بنفسجية

اللون ، صغرة القد || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٧٩٥ - **وَعَلَّانُ سَبَاوِيٍّ**

Commelina caelestis (S). Commeline céleste (F).

نوع من الوعلان ، قاعدة ساقه درفعية الجثث المستطيل .

ساقه فروع زياء تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه لاطئة

اهليجية الشكل ، تصلها خلي الصفحة العليا ، املط

السطل . ازهارها الى الزرقاة الساباجوية ، قطرها يراوح من

١٥ الى ٢٥ م || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

٣٠٧٩٦ - **وَعَلَّانُ فَرِجِينِيَّةٍ**

Commelina virginica (S). Commeline de Virginie (F).

نوع من الوعلان ، ساقه منتصبه فروع تملو من ٥٠ الى

٩٠ سم . اوراقه سنانية الشكل ، تصلها جامد الصفحة

يطول من ٧ الى ١٣ سم . ازهارها الى الزرقاة المايقة الزاهية ،

قطرها يراوح من ٢٠ الى ٣٠ م || تنوره يستمر من

حزيران الى ايلول .

٣٠٧٩٧ - **وَعَلَّانُ مُنْتَصِبٍ**

Commelina erecta (S). Commeline dressée (F).

نوع من الوعلان ، ساقه منتصبه قليلة الفروع تملو من ٤٠

الى ٦٠ سم . اوراقه خميدة ضيقة النصل تطول من ٨ الى

١٥ سم . وتعرض من ١٠ الى ٢٥ سم . تمدها خلي البشرة

يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ازهارها الى الزرقاة الجميلة ،

قطرها يراوح من ١٥ الى ٢٠ م . || تنوره يستمر من

آب الى تشرين .

٣٠٧٩٨ - **وَعَلَّانِيَّاتٌ**

Commelinaceae (S).

Commelinacées (F). Commelinacées (E).

فصيلة نباتية من رسيديات الفلقة . اجناسها وانواعها عديدة

جميعها من نباتات المناطق الحارة . اشهر اجناسها الوعلان

والمكايية والزربينة والطينيسيا .

Bouquetin femelle (F).

Cow-bouquetin (E).

٣٠٧٩٩ - **وَعِلَة**

الوعيلة اثني الويل .

Gazelle femelle (F).

Cow-gazelle (E).

٣٠٨٠٠ - **وَعَمَة**

الوعمة اثني الغزال .

٣٠٨٠١ - **وَعْنٌ**

Fourmière délaissée (F).

الوعن قرية النمل المهجورة . ج وعنان .



وعلان



ويل



وقال

مناليدها مستطيلة، أذناها مستديرة الأطراف، أنوابعها  
جيلة الإلوان الزاوية يكثر فيها الأحمر والأزرق البنفسجي  
المزاج || قوتها الحشرات وبعض الثمار البائنة .

٣٠٨١٧ - وقائِد Tablettes en pierre (F).  
الوقائِد : الحجارة المفرطة في الحداق والممرات؛ وأحدها  
وقيد ووقيدة .

٣٠٨١٨ - وقائِع الدَعْوَى Points de fait (F).  
في البيان بأحدها المتقافين والحوادث التي نشأت عنها  
الدعوى .

٣٠٨١٩ - وقاية Prophylaxie (F), Prophylaxis (E).  
في جماع وسائل الحيلة والعناية الممكنة اتخاذها لئلا  
الأمراض . راجع انتفاء واستعزاز .

٣٠٨٢٠ - وقب ، حِجَاجُ الْعَيْنِ Orbite (F).  
Orbite, Socket (E).  
في نقرة العين شبه هرية الشكل رباعية السطح . وما  
الثلاث .

٣٠٨٢١ - وقبة Orbitale (F), Orbital (E).  
راجع مدارة .

٣٠٨٢٢ - وقبي Orbital (F), Orbital (E).  
راجع مداري .

٣٠٨٢٣ - وقبيات Arcifères (F), Arciferous (E).  
لغة من مرتبة النويات عديمات الذنب سليات اللسان .  
أنواعها الممرقة كثيرة المدد تجمعها خمس فصائل :  
الشرغيفات والمجبوبات والصفاجيات والكداميات  
والهكسريات || تتميز جميع صفاد هذه اللمة بدم مساواة  
سطح غليبي توسها الصدري في مركز ثلاثيها || أشهر  
صفاد هذه اللمة المعلوم والشرغوف .

٣٠٨٢٤ - وقرف Charge (F), Load (E).  
هو ثقل الحمل الذي يقع على أعمدة وسقوف وجدران  
المباني . وهو يقسم إلى ثقل ميت مستقر وثقل حي متحرك .  
ونظراً لكثرة الدوامل التي تدخل في حسابه فالوقرف قد يكون :

وقر الكسر Charge de rupture (F).  
Breaking load (E).

وقر متحرك Charge mobile (F).  
Travelling load (E).

وقر مستديم Charge permanente (F).  
Permanent load (E).

وقر لامركزي Charge excentrique (F).  
Essential load (E).

وقر منفرد Charge isolée (F).  
Concentrated load (E).

وقر موزع بالتساوي Charge uniformément répartie (F).  
Uniformly distributed load (E).

٣٠٨٢٥ - وقرفة Cicatrice (F), Scar (E).  
هي الأثر في الجسم من أي سبب كان . ج. وقرات .

٣٠٨٢٦ - وقس Gale (F), Scab, Scurf (E).  
اسم شامل يطلق على جميع أنواع الجرب التي تتركب الحيوان  
والنبات . ومن قاربه الجرب فهو مؤنس وهي مؤقوة .

٣٠٨٢٧ - وقسيات Gymnosaceae (S).

Gymnosacées (F).  
فصيلة فطور مجهرية تنتمي إلى مرتبة التنفسيات ورتبة  
الزقيات . تتميز بأزراق عريضة تلحفها غلفة الأسن التي  
الموجبة || أجناسها وأنواعها عديدة تجمعها ثلاث عمارات :  
الترغيفات والتنفسيات والمجبوبات .

٣٠٨٢٨ - وقث Wakf  
هو سبب العين ورسد ويعمل على الوقف وذريته أو من  
يوصيه .

٣٠٨٢٩ - وقث Suspension  
يحدد في حينه .

٣٠٨٣٠ - وقث الأثر Surannation (F).  
وقث أثر المقد المحوّل الغسل عند أجل ما إذا هو لم  
يحدد في حينه .

٣٠٨٣١ - وقث \* ، كميرويس Chamaerops (S).  
Chamérops (F).  
جنس أشجار ليغية برية ورتبية من فصيلة النخلات .  
منها بلاد الحارة . أنواعها عديدة بعضها أسوي المنبت  
وسمها الأثري والامريكي . سوقها جالسة تملو من مقر  
إلى عشرة أمتار . أوراقها مدلارية ، كبيرة القد ، جميلة  
الحضار ، مستطيلة الزناد || أشهر أنواعه التريينة  
ما يلي .

الوقث الخامس Chamaerops humilis (S).

الوقث الشائك Chamaerops hystrix (S).

الوقث الصلب Chamaerops martiana (S).

الوقث الفاخر Chamaerops excelsa (S).

الوقث الكونفوشي Chamaerops cochinchinensis (S).

الوقث المنفرد Chamaerops fortunei (S).

الوقث المنشاري Chamaerops serrulata (S).

٣٠٨٣٢ - وقث خاضع ، موزحة

Chamaerops humilis (S). Chamérops humble, Pal-  
mier éventail, P. nain (F). Dwarf palm, European fan-  
palm (E). Hanfpalme, Schirmpalme, Europäische  
Zwergpalme (D). Palma camerops, P. minore, P.  
femmina (I).

نوع من الوقث لا ينشئ البرد العادي يعيش على منظم  
شروط المتوسط . ساقه قصيرة . أوراقه مروحية جميلة  
الحضار التريي المزاج . يزود قروين ويستخرج من  
أوراقه ألياف قوية تصلح لصناعة الحبال . يتكاثر بالبذر .

٣٠٨٣٣ - وقث Dénicher (F).  
To take out of the nest (E).

وقث وأقن : أخذ الطير من محاضبه .

٣٠٨٣٤ - وقثة Nid (F), Nest (E).  
أقنة : محض الطائر دثن في الشجرة .

٣٠٨٣٥ - وقواق \* ، ققب Cuculus (S).  
Cucous (F), Cuckoo (E).

جنس طير من حمزة البوقليات وفصيلة القيقوبيات . أنواعه  
نحو ٧٥ مظهرها متوسط اللد قدره قدر الحماة . أنوابعها  
قريبة الشبه من ثوب الباشق مع إبداءه ورشبه وحسن  
تبيجه . تألف الإحراج . قوتها الحشرات . لا تحسن  
بفسها ولا ترق فراشها بل تصنع بيضا غلطة في أوكان



وقث



وقواق

بالاسود الابيض وبالبابيض . ودارجة ، من الحوافر الى الركب ، تبنية اللون . سوافره الى السواد الاحمر اللامع . ذنبه ذنب الزرافة ولجلل || الانثى اصفر قدماً من الذكر وانحل جسداً ، اما الذوب بنفسه .

### ٣٠٨٤٢ - وَكَاحَة حَرْجِيَّة \* ٥

*Drassus silvestris* (S). *Drassode sylvestre* (E).  
*Syla drassus* (E).

نوع من العناكب السابعة الفانصة ثنائية الروايات سداسية المشاقق تنتمي الى فصيلة الوكاحيات || جسمها متوسط القد يطلو عند العنكب نحو ١٣ م . وعند العنكب نحو ١٧ م . صدراسها زواوي الشكل ، اشجع اللون حطلي المروج . عينها زعنجان ، شيفاشها غليسان . فكاهها مستطيلان شيطان . جرامزها كبيرة ، كثيرة الحلب . بطنها بيضي الشكل ، حطلي اللون ، احمر المواج ، اسود التنقيب المبشر ، ينتهي بشلولة دقيقة فارقة || تاليف الحراج والبراري . صكبتها وطاق تسجبه تحت الحجارة والجفوع المستلقية . مسرهما جدوي يسمر من الغروب الى الفجر . قوتها الحشرات الصغيرة والاساريح . تسمى الى قصها ركفاً وتتميز بالمرارسة والقدح || بيابها الشتوي يسمر من ١٦ الى ١٨ اسبوعاً . تميش نحو ثلاث سنوات . والانثى تمتع المكان على دمة واحدة في غشاء من النواس متين الحيك تلفه وتحمله لاصفاً بمشاتها الى ان يم التنف . ثم تحضن الصغار على سطح بطنها نحو اربعة اسابيع || تعتبر من الدويبات الثانفة للاسودية .

### ٣٠٨٤٤ - وَكَاحِيَّات \* ٥

*Drassidae* (S). *Drassidae* (E).  
فصيلة عناكب من رتبة الزيلولات . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع اقطار العالم . جميعها مفترسة ، متوسطة القد أو صغيرة . تتميز بصدرها البيضي اللون ، المبطنة الجرم وبامتداعة اجزائها الشفوية || انواجها متباينة الالوان ، شعها ومطاقات قعيها تحت الحجارة والجفوع المستلقية ولها الانجبار والجلالة || اشهر انواعها الوكاحية .

### ٣٠٨٤٥ - وَكَار \* ٥

*Coureur* (F). *Runner* (E).  
هو الداء ، اعليه .

### ٣٠٨٤٦ - وَكَالَة \* ٥

*Coloré* (F). *Coloured* (E).  
وكب الثمر : لون وزهى وقد يكون ذلك عند الادراك .

### ٣٠٨٤٨ - وَكَب \* ٥

*Coloris* (F). *Colouring* (E).  
هو زهاء ماجة لون الثمر او أي لون كان .

### ٣٠٨٤٩ - وَكَنَة \* ٥

*Point (noir ou rouge)* (F).  
*Point (black or red)* (E).  
نقطة سوداء او حمراء . اوراق موكوة : ظهر فيها لقط .

### ٣٠٨٥٠ - وَكُج \* ٥

الوكج : هو المكان الصلب . يقال بلغ في سفره الوكج اي بلغ الصخر .

٣٠٨٥١ - وَكُر \* ٥

*Nid* (F). *Nest* (E).  
الوكر : عش الطائر وان لم يكن فيه .

بعض الطيور ولا تلي في العش الواحد أكثر من بيضة واحدة . ذكرها أكثر عدداً من انثاها . وهي من الطيور شبه القواطع تير في الليل . تحض الربيع والصيف في الاقاليم المعتدلة والحريف والشتاء في الاقاليم الدافئة || اشهر انواعها : البوق المارون والبوق المطرق والبوق المرقط والبوق الكبير الدارة والمقرض والفيث والفيثو والكوكو والكنكر والكنكر والكوكو والفريق والجم والجم والفوق والعلوى .

### ٣٠٨٣٦ - وَقَوَائِيَّات \* ٥

*Cuculines* (F).  
عارة طير من فصيلة القيقوبيات . اجناسها اريمة وانواعها المعروفة ١٤٠ موطنها اسراج العالم القديم . وهي باكريتها من الطيور الثانفة التي تلهم الحشرات . من مزاياها الخاصة انها لا تحضن بيضها ولا ترق فراشها وصوتها يشبه البوق .

### ٣٠٨٣٧ - وَقُود \* ٥

*Combustible*  
هي المواد التي تستخدم لتوليد الحرارة باستراحتها الى النار . تقسم الوقود من حيث حالتها الطبيعية الى ثلاثة اقسام تعرف بالصلبة كالقحم والسائلة كالفحم والغازية كغاز الاستسباح . وتقسم ايضاً من حيث مصدرها الى طبيعية كالنطف والقحم ومخررة كالكمبول .

### ٣٠٨٣٨ - وَكِيد \* ٥

*Brûlis* (F). *Denshered, Patch of burnt* (E).  
ما يوقد به النار من حطب وعود و الارض التي احترق نباتها .

### ٣٠٨٣٩ - وَكَيْفَة \* ٥

المقع الذي اعتاد الطائر اتيانه والوقوع عليه .

### ٣٠٨٤٠ - وَكَيْمَة \* ٥

*Lamelle* (F). *Lamella* (E).  
الوكيم والوكيم : راية صغيرة من الزجاج متناهية في البقة تستعمل لتغطية القناع المطلوب خصصاً تحت الجهر .

### ٣٠٨٤١ - وَكَب \* ٥

*Dichroisme* (F). *Dichroism* (E).  
الوكاب خاصة تتميز بها بعض الاجسام فتظهر لظاهر البها كاتها خضبة بلونين وذلك بالنسبة الى انكسار النور او انكساره .

### ٣٠٨٤٢ - وَكَب \* ٥ ، وَكِي \* ٥

*Okapia Johnstoni* (S). *Okapi de Johnston* (F).  
حيوان يون مشب يجتر اكتشفه الرحالة الانكليزي السير جوستون عام ١٩٠٥ في غابات الكونغو المناخلة لفضة النشالية من نيب « سيمليكي » . يبدو ، من الهيكل والشكل الخارجي ، كأنه يتحد من الزرافة ولهاها وحمار الزرد . يألف الغابات المستحصية . مناطق مرتبة ترتفع عن سطح البحر نحو ٤٠٠٠ م . ملجته الحيائي زويبي || جسمه يطلو نحو ٢٥٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٤٠ سم . ارتفاعه الى الحاروك ١٥٠ سم . معادلته السنية ٢٢ ك .

هي الحال عند الزرافة . رأسه معتدل الجرم . قصبة انفه مخدبة . غنطه وشي الشكل . حاروكه ارفع من الظهر . عنقه حلق الماهة . كئلته كفل حمار الزرد ودارجة متساوية كمدارجة || ثوبه الى الجفوة القرمزية المواج . محصره الى البياض الاصفر . غنطه الى السمرة القامحة . جبهته الى الحفرة البعوية . سيالته سوداء تمتد حتى الجحفة . اذناه اكبر من اذني الحمار وهما كاسيتان جلوبوتا اللون . عنقه ومتكبا الى الجفوة السوداء المواج . فضاء جملعتان



وَقَاب



وَكَاحَة حَرْجِيَّة

Curatelle (F). **ولاية - ٣٠٨٦٤**  
Guardianship, Trusteeship (E).  
هي إدارة شؤون وأموال المحجور عليه .

٣٠٨٦٥ - **وَلْت**  
الوَلْت هو القليل من المطر .

Herbes effluées (F). **وَلَع**  
الولع هو الشغف المستطيل .

Lapement (F). **وَلَع** ، **وَلْعَان** ، **وَلْعُوع**  
Lapping (E).  
شرب السباح بالسنتها .

Vivipare (F). Viviparous (E). **وَلَوْد**  
مدلول التكاثر النسل بالولادة ، بماكسها يبيض .

٣٠٨٦٩ - **وَلَوَل** ، **بُؤْسَةُ الْأَطْلَال**

Otus ascalaphus (S). Hibou ascalaphe (F).  
طائر من البوم ينتمي إلى عائلة البوميات ، موطنه إفريقية  
الشالية وبعض مناطق حوض البحر المتوسط . جسمه  
صغير لقد يطول نحو ٣٠ سم . ثوبه أعين من ثوب البومة  
وأكتف رقيقة . يألف الاطلال والاحراج ولا يقرب إلا ما كان  
الأكلة إلا عند ميسر الحاجة . ينس قوته في الليل . يصيد  
جميع أنواع القوارض والحشرات .

٣٠٨٧٠ - **وَلِسْتَاكِيَّة** هي رشع الماء ، اطلبه .

Pollen **وَلِغ** - ٣٠٨٧١  
هو الصلح ، اطلبه .

Pollinique (F). Pollinic (E). **وَلِغِي** - ٣٠٨٧٢  
اطلب طلي .

Braula coeca (S). **وَلِغَاةُ النَّحْلِ** - ٣٠٨٧٣  
حشرة راشنة مؤذية من فصيلة البوميات ورقة ذوات  
الجناتين || جسمها شديد الصغر يطول نحو ١ سم . تعيش  
كامل حياتها الخشيرة معلقة بالنحل || مكنتها شديد  
الصغر تمتصه الاثني قروياً في الخلاء فيفتن عن يرقاات  
متناحية الصغر واللقعة تعيش على المكبر الحزون والتخاروب .

Braulidae (S). **وَلِغَاةَات** - ٣٠٨٧٤  
Braulids (F). Braulidae (E).

فصيلة حشرات راشنة مؤذية من رتبة ذوات الجناتين ،  
لها ثومان يصممها جنس واحد || اجسامها صغيرة ، ممدبة ،  
شبه بيضية الشكل ، تطول من ١ إلى ١.٥ سم . رؤوسها  
صغيرة ، مبطلة . عيونها دقيقة فارقة . قربها الاستعمارية  
صغيرة ، صغيرة ، ثلاثية الفصل . كواسلها وبطنها  
متلاصقة . وهي عادمة الجناح والزان . قوائمها قوية ،  
مشعبة الأطراف || اشهرها وباشة النسل .

Asterocystis (S). **وَلِغَة** - ٣٠٨٧٥

جنس فطر مجهرية من فصيلة الصمغيات . تكاثرها  
لاشي . تتميز بجها البرني المستطير الشكل الماد الرابح .  
تتغلي على عدة نباتات زراعية فتركب جلودها وتؤذيها  
وقد تميها .

Asterocystis radialis **وَلِغَة الْجُدُر** - ٣٠٨٧٦

نوع من الومحة تركب جلود بعض النباتات اخصها  
الكتان والسلمج واللفت والخس والكرات والشوان والنف

Parade (F). Pairing (E). **وَلِغ** - ٣٠٨٥٢  
الولع هو مفاد الطيور الالية . واكم الذيك العجاجة :  
سدها . وكمت الحامة والبط : خضمت لسفاد الذكر .

Vice (F). Defect, Viciousness (E). **وَلِغَة**  
هو العيب الظاهر في الشيء . ج اوكاف .

٣٠٨٥٤ - **وَلِغَن**  
الوكن والوكنة : هي محض الطائر في حصر او جدار .

Menon (F). **وَلِغَن** - ٣٠٨٥٥  
الكيش او الشاة قلبيها النهم .

Mandataire (F). Mandatory (E). **وَلِغَل** - ٣٠٨٥٦  
هو من استندت اليه الوكالة .

Régisseur (F). **وَلِغَل** ، **وَلِغَلِي** - ٣٠٨٥٧  
Manager, Bailiff (E).

هو الذي يدير الخزينة ويقوم بشؤونها بدلاً من صاحبها .

Contramaître (F). **وَلِغَلِي** ، **وَلِغَلِي** - ٣٠٨٥٨  
Overseer, Foreman (E).

هو رئيس العمال في ورشة مينة .

٣٠٨٥٩ - **وَلِغَلِي التَّحْلِيَّة** ، **مَسْتَدِيك**  
Syndic de faillite (F). Syndic of bankruptcy (E).

هو الوكيل القانوني من كلمة الدائنين ويختاره القانون  
وكيلاً ايضاً من المفس ليدر امواله ويصلها .

Macropus (S). Wallable (F). **وَلَاب** - ٣٠٨٦٠

جنس حيوانات ليلية عاشية من فصيلة القنقرات .  
انواعها المعروفة نحو ١٢ موطنها استرالية وتجانية . تألف  
الاجام والنباتات والافعال . ملجئها الحيالي جماعي ||  
اجسامها معتدلة القد تطول من ١٦٠ الى ١٨٠ سم . بما  
فيه الذئب الذي يطول من ٦٠ الى ٧٠ سم . اثولها الى  
الطولة المتفاوتة السمة . اثانها رباعية الاعلاف ||  
اعرف انواعها واشهرها :

Wallable à cou rouge (F). **وَلَاب احمر العنق**

Wallable à queue noire (F). **وَلَاب اسود الذئب**

Wallable agile (F). **وَلَاب رشيق**

Mise bas (F). **وَلَادَة** - ٣٠٨٦١  
هي الوضع أي خروج الجنين من رحم الانثى في نهاية  
مدة الحمل .

Parthenogénèse (F). **وَلَادَة العَدَكُرَى** - ٣٠٨٦٢  
Parthenogenesis (E).

هي الولادة التي لم يستيقها كرم ؛ وقد تحصل في بعض  
الحشرات منها الارق .

٣٠٨٦٣ - **وَلَانَة**  
Avellana (S).

Avellana (F). Avellana (E).

جنس حيوانات بحرية من الرنويات مديات الادلجل  
وفصيلة الجينيديات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد  
منتشرة في بعض مجار البلاد المعتدلة الحرارة واخصها البحر  
الابيض المتوسط . تألف الشطوط الحصبية والرمليّة .  
اصداؤها بتدقيق الشكل والقد ، مستديرة الفموة الثلاثية  
الاسنان . مالة الصنفة المعتدلة الساكنة ، الجميلة  
الالوان الزاهية ، يكثر فيها المجوي .



للاستعمال إلا بعد مرورها بفترة مراحل تخميرية وتخميرية تستلزم الوقت الطويل الذي يراوح من ٨ إلى ٩ أشهر .

٣٠٨٨٩ - وَكِيلِين (F). Vanilline (E).

عطر الزبونية يستخرج من الثمار التي تحوي ما يقارب ٢٪ من وزنها .

٣٠٨٩٠ - وَكِيَمَة (F). Sclérote, Stroma (F).

مشيمة نباتية صلبة المادة تتكون من بعض الفطور فطحلها بتقريبها . ج. وُم .

٣٠٨٩١ - وَهَاجَة (F). Photomorphose (F).

الوهجة تأثير الضوء على النمو والانتشار عند الكائنات الحية .

٣٠٨٩٢ - وَهَانَة (F). Sénescence (F). Senescence (E).

هو الدور الذي يسبق الذبول في النجس الحية أن سيوانية أو نباتية .

٣٠٨٩٣ - وَهَجَنَة (F). Photologie (F).

الوهجنة علم يبحث في وهج الضوء وتأثيره ومعطياته .

٣٠٨٩٤ - وَهْد (F). Terrain bas, encaissé (F).

الوهد والويدة : الأرض المنخفضة أينا . كان مؤدبا . ج أود ووددان ورواد .

٣٠٨٩٥ - وَهْر (F).

الوهر : توضع وقع الشمس على الأرض حتى ترى له اضطراباً كالبحر .

٣٠٨٩٦ - وَهْص (F). Emasculat (F).

هو انتزاع الخصيتين لانساد عمل التناسل في ذكر الحيوان . الناية منه حث الحيوان على التزويج .

٣٠٨٩٧ - وَهْط (F). Bocage (F). Copse, Basket (E).

غابة صغيرة ظليلة وكل حرجية من عشر .

٣٠٨٩٨ - وَهْف (F). Feuillage (F). Foliage, Leafage (E).

جاء أوراق الشجرة .

٣٠٨٩٩ - وَهَق (F). Lasso (F).

هو حبل في طوله أنشطة يطرح في حقل الدابة للقبض عليها . يقال صاده بالوق . ج أرقاق .

٣٠٩٠٠ - وَهْلَبَرْجِيَّة (F). Wahlenbergia (F).

جنس نباتات شبيهة حولية أو معمرة من فصيلة الجرسيات . كسمها وأوراقها متباعدة الأشكال والأحجام . أزهارها مختلفة الألوان ، يكثر فيها الأزرق || أنواعها المعروفة عديدة ، أشهرها التالية .

٣٠٩٠١ - وَهْلَبَرْجِيَّة صَعْتَرِيَّة الْوَرَق (F). Wahlenbergia serpyllifolia (F).

مهددا البلقان . ساقها قصيرة تملو نحو ١٠ سم . أوراقها

والفصاة || مظهرها الخارجي يقع كستنية اللون مستطيلة الشكل تنشق الجذور عند انتشارها . وعند تفتح شرا تملط الأوراق وتسبب يباسها .

٣٠٨٧٧ - وَمَك (F). أريد والويدة : شدة حر الليل .

٣٠٨٧٨ - وَمَس (F). وس وأوس المنب : لأن وقرب النضج

٣٠٨٧٩ - وَمِيض (F). Fulguration (F). Fulguration (E).

لحمان كالبرق يظهر في الطبقات العليا من السحاب لا يمتد بعد .

٣٠٨٨٠ - وَنْشِيرِيَّات (F). Winters (S). Wintère (F).

جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة النوتريات . أنواعها المعروفة خمسة . جميعها جنات معمرة فراءه . أوراقها معنقة ، جامدة النصال السنائية الشكل ، الجسيلة الخضراء اللامس . أزهارها بجيلة ، كبيرة ، خاسية أبيضات اللون ، عديدة الأسيمة الصفراء اللون || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٨٨١ - وَنْشِيرِيَّات (F). Wintéracées (F). Wintéracées (E).

فصيلة نباتية من فوات الفلفتين مستقلة الفصائل . أجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد أعطائها جزر الزايج || جميع نباتاتها شجيرات وجنات فراءه . أوراقها معنقة ، متعاقبة ، نصالها سنائية جامدة . أزهارها عشكولي التجميع || طري الأرتكان . أزهارها كبيرة جميلة القالب ملونة || أشهر أجناسها الوشير .

٣٠٨٨٢ - وَنَس (F). هو المفاس للمترج ، أطلبه .

٣٠٨٨٣ - وَنَكْ ، وَنَكْ (F). Couver (F).

ونك العاطر : حضن الأبيض .

٣٠٨٨٤ - وَنَكَا (F). هي القضا ، أطلبه .

٣٠٨٨٥ - وَنَمَة ، وَكِيم (F). سلح الذباب .

٣٠٨٨٦ - وَنِيلِيَّة ، وَنِيلِيَّة (F). Vanille (F). Vanille (E).

ثمر الزبونية وهي على شكل سفة مستطيلة يستخرج منها معطرها المشهور الشائع الاستعمال .

٣٠٨٨٧ - وَنِيلِيَّة ، وَنِيلِيَّة (F). Vanilla (S).

جنس نباتات عديدة عارضة من فصيلة السحليات . أنواعها عديدة ، أعطائها المناطق الحارة ، مظهرها بري وبعضها زبني وصناري || أشهر أنواعها الزراعية الزبونية المنبسطة الورق .

٣٠٨٨٨ - وَنِيلِيَّة مَنَسَطَة الْوَرَق (F). Vanilla planifolia (S). Vanillier commun (F). Common vanilla-plant (E). Echter Vanilla (D). Vaniglia, Vanigliero (I).

أشهر أنواع الزبونية وأهمها زراعة . جنبها قصفة عارضة متقلبة . أوراقها معنقة متعاقبة منبسطة الصفحة قليلة النمل . سواقلها دقيقة مستطيلة تقابل الأوراق . أزهارها عشكولي التجميع محوري الارتكان . أزهارها كبيرة للقد عطرية العرف . ثمارها سفة الشكل مستطيلة لا تصلح



ونشير



زبونية منبسطة الورق



وهلبرجية

Faculraie (F). ٣٠٩٠٦ - وَهَيْجِيَّةٌ  
نمت منسوب الى وهيجة الشمس .

Carrière de terre glaise (F). ٣٠٩٠٧ - وَتَلَر

Quarry of clay (E).  
هو محفر الطين الذي تلاحظ به الحياض وغيرها منها  
لرشح الماء .

٣٠٩٠٨ - وَبِيَّةٌ  
الويه طائر يعرف بالطيطوى الحيسال ، اطلبه . وهي  
ايضاً نبات خزام الصباغين .

Age de la charrue (F). ٣٠٩٠٩ - وَبَيْح  
Plough-beam (E).  
هو سلب المحراث الجامع لساير اجزائه .

Vératrine (F). ٣٠٩١٠ - وَيرَاتُونِين ، وَصَرَبَكِين  
Veratrine, Veratria (E).

مادة نباتية شبه قلوية تستخرج من بلور الحرق  
الابيض . تستعمل طبياً ضد الحيات والانهابات .

Wigandia (S). ٣٠٩١١ - وَيْغَنْدِيَّةٌ  
Wigandie (F). Wigandia (E).

نبات معقود التبريف عل اسم الطيب ، ويغند . مجلة  
معمرة وسيدة الجنس والنوع من فصيلة النجميات . مهدها  
بعض مناطق يولييفية || مجلتها تملو نحو ثلاثة أمتار .  
ساقها قليلة الفروع متكاثة الغطاء الجماد الشائك ، اوراقها  
متعاقبة ، معنقة ، متعصبة النصال الكبيرة التي يبلغ طولها  
نحو ٩٠ سم . وعرصها نحو ٥٠ سم . صفحتها العليا الى  
الغضار البحري . صفحتها السفلى كثيفة الحمل ، فضية  
المواج || ازهارها حستمر قرق . ازهارها كبيرة ، عقرية  
الشكل ، وبنفسجية اللون ، خليسة التويج || تنويرها  
يستمر طوال شهر نيسان .

Raisin noir (F). Black grapes (E). ٣٠٩١٢ - وَئِنْ  
هو العنب الاسود اللون من اي ضرب كان .

كأوراق الصمغ تطول نحو ٢ سم . نصالها خلية فضية  
المواج . ازهارها بنفسجية التويجات ، حر الكؤوس ،  
قطرها يراوح من ٢ الى ٣ سم . || تنويرها يستمر طوال  
فصل الصيف .

٣٠٩٠٢ - وَهْلَنْبَرْجِيَّةٌ عَشَقِيَّةُ الْوَرَقِ  
Wahlenbergia hederacea (S).

Wahlenbergia à feuilles de lierre (F).  
منبتها يمتد من الشرق الادق الى اوروبا ، يكثر وجودها  
في المناقع وعل الصفات الرملية . ساقها نحيلة مستقيمة  
تطول نحو ٣٠ سم . اوراقها كأوراق المشقة شكلها وقد  
ازهارها فردية ، مستطيلة المماثلين ، زرقاء اللون ، قطرها  
من ٢ الى ٤ سم . || تنويرها يستمر من حزيران الى  
تشرين الاول .

٣٠٩٠٣ - وَهْلَنْبَرْجِيَّةٌ عَصَلِيَّةٌ  
Wahlenbergia graminifolia (S).

Wahlenbergia à feuilles de graminées (F).  
مهددا يمتد من البلقان الى حوض البحر الابيض المتوسط .  
ساقها تملو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقها صفية الشكل  
كأوراق النجيليات وتطول نحو ١٦ سم . ازهارها زرقاء  
اللون ، قطرها نحو ٣ سم . || تنويرها يستمر من حزيران  
الى آب .

٣٠٩٠٤ - وَهْلَنْبَرْجِيَّةٌ كُرَوَاتِيَّةٌ  
Wahlenbergia croatica (S).

Wahlenbergie de Croatie (F).  
مهددا كرواتية ودلاسيه . ساقها تملو نحو ١٠ سم .  
اوراقها سنانية ضيقة تطول من ٣ الى ٥ سم . ازهارها  
بنفسجية التويجات والكؤوس ، صغيرة القد ، قطرها نحو  
٢ سم . || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٩٠٥ - وَهَيْجِيَّةٌ  
Facule (F). Facula (E).  
الويجة بقمة اكثر تاجباً ولعناً من غيرها في القصر  
الشمسي . ج وهائج .



ويغندية





ي

### ٣٠٩١٨ - ياسم ، قعقو ، وثايفي ، نرّار أببيض

*Ligustrum* (S). Troène, Prûne, Bois noir (F). Privet, Priry (E). Gemeiner Liguster, Liguster, Gewöhnliche rainweide (D). Ardivela, Baciare, Ligustro, Lamitra, Rovistca, Olivella, Mimolo (I).

جنس نباتات برية وثرينية من فصيلة الزيتونيات . انواعه نحو ٢٠ معظمها بري وبعضها ترابي . نباتاتها مختلفة الاحجام منها الشجيرات والجنبايات والجنبايات . سوقها فراء فناء . اوراقها ممتعة متقابلة ابيدة صغيرة النصل اهليلجية الشكل . ازهارها مستحبة العرف صغيرة القد عكركية التجميع تاجية الارزكاز او هامة || تزود في الحدائق والبساتين لتسبيح وحل جوانب الممرات . وهي سهلة الانقياد قاعد جميع الاشكال المطلوبة وتصلح لحد الرياح حتى ارتفاع ثلاثة امار || اشهر انواعه الزيرينية ما يتبع .

### ٣٠٩١٩ - ياسم بيضي الورق

*Ligustrum ovalifolium* (S). Troène à feuilles ovales (F).

جنبة صغيرة القد فناء . اوراقها بيضية الشكل هائلة ، نصلها جميل الخضار الاصفر الموج . تكثر زراعتها في المراكن وفي الحدائق المرتبة المصممة الاشكال والالوان . تتكاثر بالتعجيل .

### ٣٠٩٢٠ - ياسم صيني

*Ligustrum sinensis* (S). Troène de Chine (F).

شجرة سريوة فناء تملو نحو ٤ امار . تصلح للزئين ولحد الرياح . اوراقها ابيدة ، نصلها سناني الزام الاخير ، جميل الخضار المايق || تتكاثر بالتعجيل وبالزود .

### ٣٠٩٢١ - ياسم صيني الورق

*Ligustrum angustifolium* (S). Troène à feuilles étroites (F).

جنبة متوسطة القد تملو نحو ٢٥٠ سم . ساها فناء . اوراقها

*Hortensia* (F).

### ٣٠٩١٣ - يابانيي

نبات ترابي يدعى ايرلسيا ، اطلبه .

*Baoris zelleri* (S).

### ٣٠٩١٤ - ياروؤ الاوز

حشرة من الحسيريات ، فراشها صغيرة القد تطول نحو ٣٠ م . فويها الى الي الزبي الموج . وراشها الامامية مبقجة بالابيض . وراشها الخلفية حطية اللون يرتقالية الموج || يكثر وجودها في الربيع والصيف . رقاتها تنقف حل صف الازر فتلتهم النصال وتؤدي النبات .

*Adopaea ectaeon* (S).

### ٣٠٩١٥ - ياروؤ المراكعي

حشرة من الحسيريات ، فراشها تطول نحو ٢٨ م . جسمها مردلي الشكل كسني الثوب . وراشها حطية اللون زيتية الموج زهو في الذكور وتبقى في الاناث || يكثر وجودها من حمز الى آب . رقاتها تركب الزود والمراكعي فتؤذي اذا كثر عددها .

*Adopaea lineola* (S).

### ٣٠٩١٦ - ياروؤ التيجليات

حشرة من الحسيريات فراشها صغيرة القد تطول نحو ٢٦ م . في الذكور والاناث . جسمها مردلي الشكل كسني الثوب . وراشها يرتقالية اللون حطية الحمار والتسلج . يكثر وجودها من حمز الى آب . رقاتها تركب صف التيجليات فتؤذي .

*Termite femella* (F).

### ٣٠٩١٧ - ياروؤش

*She termite* (E).

هي الارضة الانثى الكاملة الاعضاء التناحلية . وظيفتها منع المازن لاستمرار وجود الرمية .



ياروؤ الارز



ياروؤ المراكعي



ياروؤ التيجليات

التجميع . حثكولها يمد من ٥ الى ١٥ ذرة . زهرها صغيرة  
القد ، صفراء اللون ، خافتة العرف || تنورهما يستمر من  
أذار الى تشرين الاول .



ياسمين صيني

٣٠٩٢٩ - ياسمين إسباني ، ياسمين كبير الزهر  
*Jasminum grandiflorum* (S). *Jasmin d'Espagne*, J. à  
grandes fleurs (F).

نوع من الياسمين السبروتي . زراعته الصناعية شائعة  
لاستخراج دهن العطري . جنبته تملو نحو ٣ امتار أرواقه  
متقابلة ، وريقاته وريّة التجميع لا قياسية العدد . أزهاره  
الى الخضار اللامع . نصلها جامد الصفحة . أزهاره  
عشكولي التجميع ، عجوري الارتكاز . أزهاره كبيرة القد ،  
لونها ابيض الموشح بالوردي ، عريها فواح الرائحة  
الاخاذة || تنوره يستمر من حزيران الى تشرين .

٣٠٩٣٠ - ياسمين أصغر ، ياسمين البرّ

*Jasminum fruticosum* (S). *Jasmin à feuilles de cyprès*,  
J. frutescent (F).

نوع من الياسمين الميزلول . جنبته تملو نحو ٢٠٠ سم . أرواقها  
متعاقبة مركبة ، وريقاتها أزرائية الشكل صغيرة القد تملو  
نحو ٢ سم . نصلها جامد الصفحة || أزهارها صفراء اللون ،  
شفعية الترتيب ، ثنائية أو رباعية التجميع || تنوره  
يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٩٣١ - ياسمين آصوري

*Jasminum azoricum* (S). *Jasmin des Açores* (F).

نوع من الياسمين ، اقليمه البلاد المعتدلة المشجرة نحو  
الحارة . جنبته عارضة . فروعها متعاقبة اسطوانية المقطع .  
أوراقه مركبة ثلاثية . وريقاته شبه قلبية الشكل . نصلها  
جامد الصفحة الامامية . أزهاره عشكولي التجميع عجوري  
الارتكاز . أزهاره بيضاء اللون ، متوسطة القد ، فواحة  
العرف المشتبب || تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٣٠٩٣٢ - ياسمين صيني

*Jasminum beesianum* (S). *Jasmin de Bees*, J. de  
Chine (F).

نوع من الياسمين السبروتي وهو بجلة ممرّة صغيرة القد  
تملو من ٧٠ الى ١٠٠ سم . أرواقها بيضبة الشكل ،  
سنائية الزام الاخير ؛ نصلها يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم .  
وهو جامد الصفحة فشتي اللون . أزهارها عطرية العرف ،  
حراء اللون ، متوسطة القد ، ثلاثية التجميع أو فردية .  
تنورها يستمر ملوان شهر حزيران .

٣٠٩٣٣ - ياسمين عطري

*Jasminum odoratissimum*, J. suaveolens (S). *Jasmin*  
*suave*, J. jonquille (F).

نوع من الياسمين السبروتي . منته جزر كناري وبادريا  
جنبته تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . نصلها وانادها  
اسطوانية المقطع . أرواقها متعاقبة ، مركبة ، وريّة الترتيب ،  
ثلاثية أو خماسية التجميع ، وريقاتها ابيدة ، نصلها  
بيضي الشكل مقطوع القاعدة . أزهارها ثلاثية التجميع ،  
صفراء اللون ، فواحة العرف المشتبب || تنورها يستمر  
من نيسان الى تشرين الثاني .



ياسمين

٣٠٩٣٤ - ياسمين أحرّ

*Jasminum pubigerum* (S). *Jasmin à duvet* (F).

نوع من الياسمين السبروتي . يعيش في جميع الاقاليم المعتدلة .  
بجلته منتضبة تملو نحو ١٥٠ سم . افادها مضلفة الزوايا .  
أوراقها متعاقبة ، مركبة ، وريّة الترتيب ، خماسية أو سباعية  
أو تساعية الورقات . وريقاتها اهليلجية الشكل ؛ نصلها  
انزب الصفحة السفلى ، غلي العليا . أزهارها عشكولي

مرفوعة . نصلها شيق الصفحة ، اخضر اللون ، عجوري المالح .  
تتكاثر بالتعليل وبالبزور .

٣٠٩٢٧ - ياسم كَثِيفَ الْوَرَق

*Ligustrum compactum* (S). *Troène compact* (F).

جنبية زيبية صغيرة القد كثيفة الاوراق . أرواقها داكنة  
اهليلجية الشكل ، نصلها جبل الخضار المالح || تتكاثر  
بالتعليل وبالبزور .

٣٠٩٢٣ - ياسم معروف

*Ligustrum vulgare* (S). *Troène commun* (F).

جنبية سبروتية شائعة الاستعمال الزينبي . ساقها فروع فناء .  
أوراقها ابيدة اهليلجية الشكل مدببة الطرف جميلة الخضار  
القائم الجذري المالح || تتكاثر بالتعليل وبالبزور .

٣٠٩٢٤ - ياسم ياباني

*Ligustrum japonicum* (S). *Troène du Japon* (F).

جنبية سبروتية شائعة الاستعمال الزينبي ولصد الرياح .  
ساقها فروع فناء تملو نحو ثلاثة امتار . أرواقها ابيدة .  
نصلها اهليلبي الشكل ، لس الزام الاخير ، اخضر اللون .  
فشتي المالح || تتكاثر بالتعليل وبالبزور .

٣٠٩٢٥ - ياسمين

*Jasminum* (S). ياسمين \* ياسمين

*Jasmin* (F). *Jasmin* (E). *Jasmin* (D). *Gelsomino* (I).

جنس نباتات ممرية وزراعية من سبط الازيتونات  
وفصيلة الازيتونيات . انواعه زهاء ١٠٠ منظرها بري  
وبعضها زراعي زينبي وصناعي || سوقها فروع عارضة .  
افادها جالسة الالتئباب . أرواقها متعاقبة مركبة ، وريقاتها  
لا قياسية التجميع والشكل . أزهارها جميلة المنظر مخفلة  
الالوان يكثر فيها الالبيض ثم الاصفر والاحمر . بعضها  
فواح العرف العطري يستخرج منه دهن فاخر الصف  
مرفوف فيه || تتكاثر الباسمين بالتعليل والترقيد . يجود  
في جميع الارضية اغصانها الخفيفة المتوسطة الاندماج لانه  
يغنى الرطوبة المشتمكة || اشهر انواعه ما يتبع .

٣٠٩٢٧ - ياسمين أبيض ، ياسمين مخفّلي

ياسمين معروف

*Jasminum officinale* (S). *Jasmin commun*, J. blanc (F).

*Jasmin* of poetry, White flowered *Jasmin* (E).  
*Echter Jasmin*, *Weisser Jasmin* (D). *Gelsomino*  
*blanco* (I).

نوع من الياسمين السبروتي الميزلول . اقليمه البلاد المعتدلة  
الحارة المنقوعة نحو الحارة . جنبته متشعبة تملو نحو  
٩ امتار . فروعها متعاقبة مضلفة المقطع والزاويا . أرواقه  
متعاقبة ، وريقاته وريّة الترتيب لا قياسية التجميع والعدد  
منها الخماسية والسباعية والتساعية . لونها الى الخضار المالح .  
نصلها دلي الصفحة || أزهاره عشكولي التجميع عجوري  
الارتكاز . أزهاره متضومة العرف العطري المشتبب ، لونها  
ابيض بلق || تنوره يستمر من ايار الى ايلول .

٣٠٩٢٨ - ياسمين أرخب

*Jasminum pubigerum* (S). *Jasmin à duvet* (F).

نوع من الياسمين السبروتي . يعيش في جميع الاقاليم المعتدلة .  
بجلته منتضبة تملو نحو ١٥٠ سم . افادها مضلفة الزوايا .  
أوراقها متعاقبة ، مركبة ، وريّة الترتيب ، خماسية أو سباعية  
أو تساعية الورقات . وريقاتها اهليلجية الشكل ؛ نصلها  
انزب الصفحة السفلى ، غلي العليا . أزهارها عشكولي

٣٠٩٣٧ - ياسمين عرائلي  
هو صريمة الجدي الشائعة ، اطلبا .

٣٠٩٣٨ - ياسمين هندي  
هو الفتة ، اطلبا .

٣٠٩٣٩ - ياسمينيات

Jasminacées, Jasminées, Jasminiacées, Jasminidées, Jasminariées (F).  
سبط من فصيلة الزيتونيات ، اجناسه وانواعه عديدة  
اشهرها الياسمين . لياتاته جنات وجنيات فراء السوق ،  
ازهاره جميلة الشكل ثنائية السداة ، خاصة التركيب ،  
بعضها عطر فواح العرف المستحب .

٣٠٩٤٠ - ياسستقوس  
هو الجاستد ، اطلبا .

٣٠٩٤١ - ياسكيد

Aizoon (F).  
جنس نباتات برية وتربيتين من فصيلة الظهوريات مشهور  
باسم حندق ، اطلبا .

٣٠٩٤٢ - ياعزال دوزر  
هو ابرة الجوز ، اطلبا .

٣٠٩٤٣ - يالبع  
Adulte (F). Adulte (E).  
يالبع ، بالغ ، ملك ، شوب ، نموت تعريفية  
لمنى راشد يوصف به طور الاستقرار الحياتي القائم بين  
طوري الفتوة والشيخوخة .

٣٠٩٤٤ - يالغوخ  
Fontanelle (F).  
فرجة غشائية في الجمجمة .

٣٠٩٤٥ - يالغوخ  
Sinclut  
هو قرة الرأس يقابله التفن .

٣٠٩٤٦ - يالغولة  
Ephémère (F).  
شجرة تعرف بأبنة يوم ، اطلبا .

٣٠٩٤٧ - يالغوريات

Procephemera (E).  
Protéphémères (F).  
رتبة حشرات صغيرة لقد تحلجها الجسم من طبقة البويضات.  
فصلاتها واجناسها وانواعها عديدة ، جميعها من الحوام التي  
تقضي حياتها البرقية في الماء .

٣٠٩٤٨ - يالغوت  
Corindon (F). Corundum (E).  
حجر كريم شفاف ، صلب الجسم وزينة ، اجوده  
اصفاه . وهو مختلف الالوان فيه الاحمر والاصفر والاخضر  
والازرق .

٣٠٩٤٩ - يالغوت اخضر  
هو اللؤلؤ ، اطلبا .

٣٠٩٥٠ - يالغوت زعفراني  
Hyacinthe (F).  
حزب من سيليكات الزئبق ، وهو حجر كريم زعفراني  
اللون يوجد عادة في بعض طبع البراكين .

٣٠٩٥١ - يالغون

Polymnia edulis (S).  
Yacon (Poiré de terre) (F).  
نبات سولي من فصيلة المركبات قريب الشبه من الدالية .  
منته البلاد الحارة الامريكية . جلوده صوفلية . ساقه  
فراء . اوراقه متعابلة ممتدة سنائية النصل المزرواني الحافة .  
يستخرج من حسائه مادة نشوية مأكولة وصناعية يستعمل  
منها بعد تحميرها بعض الكحول الشائعة الاستعمال .



يانوف



يامور



يانوف



يانوف النجيليات

٣٠٩٥٢ - يامين  
Dextrorse (F). Dextorse (E).  
يامن م . يامنة . نمت تعريف يطلق على كل ساق نباتية  
متشعبة دورتها الاربعية من اليسار الى اليمين .

٣٠٩٥٣ - يامور

Capreolus capra, Cervus capreolus (S). Chevreuil (F). Roebuck, Roaddeer (E). Rehwild (D).  
حيوان لادن يجمر من فصيلة الابلديات . جسمه يطول نحو  
١١٥ سم . ويصلو ٧٤ سم . أما ذنبه فهو ٢٠ سم . ثوبه  
الى الحمرة الخفيفة المورج وهو اغبر البطن ، ابيض العنق .  
قرنه مثلث الشبب ينصله كالأليل . موطنه اجراج الشرق  
الاصط واروبه الغربية والوسطى . يعيش جماعات قليلة  
العدد . اجله مؤلف من ذكر وثلاث او اربع اناث .  
الانثى تحمل ٥ اشهر وتضع من يصفور الى ثلاثة .

٣٠٩٥٤ - يالسنون  
Anls (F).  
هو الالسنون ، اطلبا .

٣٠٩٥٥ - يالسنون بري  
هو الكمن الحبي ، اطلبا .

٣٠٩٥٦ - يالنع  
Mature, Mûr (F). Mature (E).  
نمت تعريتي توصف به جميع المحاصيل الزراعية التي اجازت  
دور الادراك ودخلت في دور الانبات .

٣٠٩٥٧ - يالغوف

جنس حشرات فراشية من فصيلة الحسريات . انواعه  
للزينة قليلة . اجسامها نحيلة القد تطول نحو ٢٨ مم .  
في الذكور والاناث . رواشن ذكورها حطيلة اللون يبيض  
التصنيع والزرقة . رواشن اناثها بنية اللون حر التبييض  
والتصنيع || يكثر وجودها من ايار الى حزيران . رفاقها  
تركب النجيليات دون ان تؤذيها شديدة الاذى .

٣٠٩٥٨ - يانوف النجيليات

Pamphila sidæ (S). Pamphile des graminées (F).  
Pamphila sidæ (E).  
حشرة من فصيلة الحسريات ورتبة حشرقيات الاجنحة .  
موطنها الشرق الاقصى وبعض الاصقاع الاربوية . فراشتها  
جارية قوتها رقيق الازداد . سرقها تميش على عصف  
النجيليات || جسمها متوسط القد . مدني الشكل يطول  
نحو ١٤ مم . بسطها نحو ٢٩ مم . رأسها كبير لاهرم ،  
بني اللون . عينها كبيرتان ناضجتان . زباناها صولجانيان .  
جوشنها وبطنها الى الخلفي الشديد السرة . زيب طوقها  
الرمي الى الشقصة || رواشن الذكر الى الخلفي يطوى  
تفقيج وزرقة صناعية . الزوج الاسامي اكثر زرقة  
من الخلفي الذي يتميز بنقطة كبيرة تطوقها نقطة صغيرة  
جميعها الى السرة القائمة . رواشن الانثى الى البني يطوى  
تفقيج احمر وتجدع اشعث اكلس وبعض نقط صغيرة  
غبراء اللون || لها جبل واحد في الحول . تظهر الفراشة في  
ايار . تسرح في النهار . تماثل بعد ظهورها بنحو سبعة  
اسبوع وتحت المكان مبيحاديا على الصفحات السفلى من  
نصال الارواق || السرقه عند بلوغها الكمال تطول نحو  
٢٢ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مستقيم الوسط ،  
بشعر اطبق ، ارمك اللون يطوى تمشج اسمر . رأسها  
وتنهدا ودواجبه سود || طور الاكمال الذي يستمر نحو  
خسة اشهر يتقضي داخل صلبة تحببها السرقه بين اوراق  
الاشجار الابيدة .



نباتة



يد



بروح مخزني



يتروحه

### ٣٠٩٦٦ - يَتْرُوح، لَفَّاح، مَنَدَرَجُور، مَنَدَرَاك لَفَّاحُ الْخِثَّانِ، لَفَّاحُ الْخِثَّانِ

Mandranga (S). Mandragora (F). Mandrake, Devil's apple (E). Alraun, Hundsapfel (D). Mandragora, Mano di gloria (I).

البروح عبر التاريخ : اصل الاسم العلمي من لغز واطلي ولفظ مندرافور . أما لفظة بروح فهي عبرانية ومعناها ناقص الروح وذلك لان شكل جلد هذا النبات يشبه جسم الانسان . وقد ورد ذكر البروح كسكن في بعض الاساطير الفرونية المائدة الى نحو ٢٠٠٠ سنة قبل الميلاد . وقد استعمل منبأ عند الاشوريين وصنعت منه مرام مخدرة الجذور والاوراق كخدر للاصابة في العمليات الجراحية وفي بعض جبر الكسور المفلتة . ويطلق جلدوه للمخدرة اذا تقمت في الخلل كانت مقوداً جنسياً حليماً . وكان ايضاً شائع الاستعمال في السرور وفي طقوس افروديت .

تقليد العلمية : جنس نباتات مقرية ، عشية ، طيبة ، ممررة ، برية وزراعية من فصيلة الباذنجانيات . انواعه خمسة جميعها من نباتات حوض البحر المتوسط . سويها جنود لينة خفية تلتصق فيها الانزواجية . شكلها شكل جسم الانسان . اوراقها قرصية الاوتكاز ، كبيرة القذ ، معقنة . نصلها رافض الصفصمة ، متمع الحافة . انزاعها متصلة القذ ، كثيرة العدد ، فردية التجميع تقوم على مائلين قرصية الانتشاب . الوانها مختلفة بين الالبيض والازرق والاحمر والبني . ثمارها باذنجانية مستديرة . جلدوها وثمارها واوراقها تحوي مادة مخدرة عنصرها كمنصر الاثروبين ان لم يكن اقل || اعرف انواعه واشهرها البروح اخفري .

### ٣٠٩٦٧ - يَتْرُوح مَخْزَنِي

Mandranga officinarum (S). Mandragora officinalis (F).

نوع من البروح وهو نبات مقري طيب بري وزراعي . هذه القدر الشرق الاوسط . ساقها جلدية ، خضراء الشكل ، قوية ، لونها الى اخضر الاسمر . اوراقها قرصية الانتشاب ، معقنة ، كاملة ، مستطيلة . نصلها مبرك الصفصمة متمع الاطراف . انزاعها فردية التجميع ، قصيرة المائلين المنتصب . بيضاء اللون ، خضراء المراج . ثماره مستديرة ، كبيرة القذ . راجع خواصه الطبية في المادة السابقة .

### ٣٠٩٦٨ - يَتْرُوح

Picrasma (S). Picrasma (F). Picrasma (E).

جنس اشجار حرجية طيبة وتزينة من فصيلة السوربيات . هذها الشرق الاقصى . ساقها مسطحة الصماء حراء اللون مبقية بالاصفر ، ترتفع نحو عشرة امتار . اوراقها مركبة . ورقها تطلو نحو ١٠ سم . وتعرض نحو ٤ سم . انزاعها عتي التجميع . انزاعها الذكرية رباعية الفص والثلث والاسدية . انزاعها الانثوية خماسية الخيام . اعصابها صلبة صفراء اللون . لحاء السق والاصقان مرة الطعم طيبة .

### ٣٠٩٦٩ - يَتْرُوحَة ، وَسَبِيَة

Eutrema wasabi (S). Wasabi (F).

نبات يلقى معمر من فصيلة الصليبيات . هذه اليابسان . ساقه خضراء مستطيلة . اوراقها قرصية الانتشاب ، خلية الاصلاح ، كبيرة النصال القليلة الشكل ، خراخه الزهري يملو نحو ١٠٠ سم . انزاعها عقودي منتصب . انزاعها

### ٣٠٩٦٩ - يَتْرُوحَة \* Potomagalus velox (S). Potomagale véloce (F).

حيوان وحيد الجنس والنوع من فصيلة البليات . اصطناعه بعض مناطق افريقية الشالية || جسمها كثيف البربر النام ، يطول نحو ٦٠ سم . جافيه الذنب الذي يطول نحو ٣٠ سم . راسها شبه مخروطي الشكل ، مستدير الخيط . اسنانها صغرة ، مربعة ، حادة الاطراف ، عددها ٤٠ . ساقها متوسطة الكثافة والصلابة . جنتها كيزتان لوزيتان ، اذناها مستديرتان صغيرتان . ذنبها شبه مردي الشكل جلل البربر . قوائمها قصيرة . ثوبها الى السمرة يطولها في الراس والظهر موج ارجواني . ابطاها ويطنها الى البياض التي || تتميز بجلد هيكلا المظني من الترقوة || تألف صفاف مجاري الماء . قوتها الاسماك والغذاء والافاعي والحشرات الكبيرة .

### ٣٠٩٦٩ - يَتْرُوحَات \* Potomagalidae (S). Potomagalidés (F). Potomagalidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة حاشرة وحيدة الجنس والنوع تشبه القفصاعة تعيش على صفاف مجاري الماء || نوعها الوحيد اليبية .

### ٣٠٩٦٩ - يَتْرُوحَات \* Dothidéaceae (F). Dothideaceae (E).

عارة فطور مجهرية من فصيلة المشويات ودبة لثويات . تتميز بأساسها المركبة المحقة القائمة على زينة لا جولية . انفلاقها يحصل في من ساقها المستديرة || اجناسها التي تم الانتصاب الزراعي قليلة وهي التبيكة والديوريون والدينخة .

### ٣٠٩٦٩ - يَتْرُوح \* Sesleria (S). Séslerie (F).

جنس نباتات عشية ممرجة من فصيلة النجيليات . انواعه قليلة العدد . سويها خماسية او سداسية الاضلاع ، دقيقة النصب ، ثنائية او ثلاثية السلايات . مصفها فريق النصل المستطيل . ساقها اسطوانية الشكل ، صغيرة القذ . ويوجد في الاراضي الجبلية الكلسية للسان . اشهر انواعها ما يتبع .

### ٣٠٩٦٩ - يَتْرُوح لُزُوق Sesleria coerules (S).

Seslerie bleue (F). نوع من اليبد البروتي المبلول . عشية سداسية الاضلاع تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . مصفها مستطيل النصل المخجن يعرض نحو ٤ م . ساقها قصيرة القذ اسطوانية الشكل تطول نحو ٣ م . قطرها ٧ م . سيقانها الى الزرق الجميلة . يوجد في الارربة الكلسية القليلة او المتوسطة الرطوبة .

### ٣٠٩٦٩ - يَتْرُوح لُزُوق Sesleria argentea, S. nitida (S). Séslerie brillante (F).

نوع من اليبد البروتي المبلول . عشية خماسية الاضلاع تملو من ٢٠ الى ٨٠ سم . مصفها مستطيل النصل المقرص يعرض نحو ٢ م . ساقها تطول نحو ٥ م . قطرها ١٢ م . سيقانها مستطيلة لونها الى الزرق المائلة يطولها موج فضي .

### ٣٠٩٦٥ - يَتْرُوحَة Feuille de vigne (F).

البرقة ورقة البكرة . ج يرق . وتدعى ايضاً الخليلب .

الارتكاز . ازهارها وردية اللون مشبعة بالاريجاني . بتلاتها مهدبة الخمار || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٩٨٠ - **يُخْشُومُ عَطِير** (S). *Adenandra fragrans*  
٣٠٩٨١ - **يُخْشُومُ عَطِير** (F). *Adenandra odorante*

نوع من اليشوم التريبي . ساقه تملو من ٨٠ الى ١٠٠ سم .  
اوراقه اهلبيجية مستطيلة . نصالها منبسطة مرعاه حيلة  
الخضار الزاهي . ازهارها عتيق التجميع ، طرفي الارتكاز .  
ازهارها مستطيلة المالحق ، وردية اللون ، مفرسة الفصل  
والبتلات ، عطرية العرف المستحب || تنويره يستمر طوال  
شهر ايار .

٣٠٩٨١ - **يُخْشُومُ لَرْدِيّ الزَهْرَة**

*Adenandra uniflora* (S).  
*Adenandra à fleurs solitaires* (F).

نوع من اليشوم التريبي . ساقه ترتفع نحو ٤٠ سم .  
اوراقه سنائية الشكل ، مهدبة ، شائكة . نصالها ملتفة  
الاطراف . ازهارها فردية التجميع ، طرفية الارتكاز ،  
بيضاء اللون من الداخل ، وردية من الخارج || تنويرها  
يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٩٨٢ - **يَحْجُوج** (F). *Halophile*  
نمت تمرني يطلق على النباتات التي تعيش وتتكاثر تلقائياً  
في الارربة المالحة .

٣٠٩٨٣ - **يَحْجُور** (F). *Outarde (mâle)*  
ذكر الحباري .

٣٠٩٨٤ - **يَحْشُور**  
قد يكون اليامور . قال الجاحظ في وصفه : و دابة  
وحشية نافرة لها قرنان طويلان كأنهما مشاران . وقرونه  
كفرون الأيل وهي صامتة لا تجويز فيها وهو أسرع من  
الأيل .

٣٠٩٨٥ - **يَحْشُور** (F). *Hémoglobine*  
٣٠٩٨٦ - **يَحْشُور** (F). *Hemoglobin*  
مادة آسمة يتألف منها خضاب دم الفقريات .

٣٠٩٨٦ - **يَحْشُوم**  
طائر من الفئق ، يلد الفقع المدس ، اطلبه .

٣٠٩٨٧ - **يَحْشُوم** (F). *Oena*  
هو الحنسة ، طائر من الحمايات ، اطلبه .

٣٠٩٨٨ - **يَحْشُوش** (S). *Erythrinus*  
٣٠٩٨٩ - **يَحْشُوش** (F). *Erythrin*

للواحدة عيشية . جنس اسمك ثيرية من مفتوحات انهر  
وفصيلة القرضانيات . انواعها المعروفة اربعة موطنها انهر  
وجبيلات امريكة الاستوائية || اجسامها مستطيلة ، شبه  
اسطوانية الشكل ، تطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . رؤوسها  
مستطيلة مقطوعة كبيرة الاشداق . زعانفها الظهرية كبيرة  
متباعدة بزيجيات محمية صغيرة . زعانفها الذيلية مستديرة  
الاطراف . انواجها تراوح من الخضار الالص الى الخضار  
الاسف . بطونها فضية || لحوبها مأكولة ، متوسطة  
الصف .

٣٠٩٨٩ - **يَحْشُور** (F). *Gazon*  
هو الحضر والخضرة . ج بخاضير .

صغيرة القد ، بيضاء اللون . ساقه واوراقه مأكولة || يتكاثر  
بالزور والفصال . يرغب في المواتع الرطبة اللطيلة وفي  
الارربة الصصلالية الرطبة الوفرة العناصر الغذائية .

٣٠٩٧٠ - **يَتُور** هو الفريين ، اطلبه .

٣٠٩٧١ - **يَتُور السُحُور**

هو فريين الفجر ، اطلبه .

٣٠٩٧٢ - **يَتُور المكسك**

هو الفريين الاربيكي ، اطلبه .

٣٠٩٧٣ - **يَتُور هندي**

هو فريين الاقدين ، اطلبه .

٣٠٩٧٤ - **يَتُوريات**

فصيلة نباتية تعرف بالفريونيات . اطلها .

٣٠٩٧٥ - **يَتَمَة** (F). *Michauxia*

جنس نباتات عشبية برية وزراعية محولة وممرة من  
فصيلة الجربسيات . انواعها المعروفة قليلة متبها الشرق  
الادق . سوقها متعصية . اوراقها متعاقبة متباعدة قليلة  
العدد . ازهارها ابطية الارتكاز ، كبيرة القد ملتفة البتلات .  
اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣٠٩٧٦ - **يَتَمَة لَوْرَانِيَّة** (F). *Michauxia levigata*

*Michauxie à tige lisse* (F).

نوع من اليشة المحولة . مهدبا بلاد ايران ، ساقها مرعاه  
فرداه تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها جامدة النصل  
الازرق . ازهارها بيضاء اللون ، فردية التجميع ، ابطية  
الارتكاز تملو الساق والفروع . تنويرها يستمر من تموز  
الى آب .

٣٠٩٧٧ - **يَتَمَة سُورِيَّة**

*Michauxia campanuloides* (S). *Michauxie fausse-*

*campanule* (F).

نوع من اليشة المحولة ، مهدبا الجبال السورية واللبنانية .  
ساقها فرداه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . بشرتها حلية  
الزغب الشائك . اوراقها جامدة النصل الازرق . ازهارها  
وردية او بنفسجية اللون ، فردية التجميع ، ابطية الارتكاز ،  
مبشرة على الساق والفروع . تنويرها يستمر من حزيران  
الى آب .

٣٠٩٧٨ - **يُخْشُوم**

*Adenandra* (S). *Adenandra* (F). *Adenandra* (E).

جنس جنبات برية وتريبية ممرسة من فصيلة السدابيات .  
موطنها بعض مناطق افريقية الجنوبية والشمالية . سوقها  
فرداه قصيرة تملو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها ابيدة  
متباينة الاشكال . ازهارها خماسية الفصل والبتلات ،  
عشائية الاسدية || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها  
الثلاثة التالية .

٣٠٩٧٩ - **يُخْشُوم صِيْرَانِي**

*Adenandra umbellata* (S). *Adenandra en ombelle* (F).

نوع من اليشوم التريبي . ساقه تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم .  
اوراقه سنائية الشكل صغيرة القد تطول من ٢ الى ٣ سم .  
وتعمر من ٤ الى ٦ م . نصالها مهدبة الاطراف ، حلية  
الصفحات السفلى . ازهارها صيراني التجميع ، طرفي



ببخشور



يُصَوِّر الحَوَر



يُصَوِّر المَصْفَاف



بَرَاة



رَبُود

الاجنحة . تألف الاماكن التي يكثر فيها الحلزون والبزاق والعريط . تتميز بأعين القشور وبالعصا في الظلام وبغبارق الشكل الخارجي بين الذكر والانثى ، ذكرها بجنية وانثاها ماري || جسمها متوسط القد ، يطول عند الذكر من ١١ الى ١٣ سم . ويطول عند الانثى من ١٤ الى ١٦ سم . ثوبها الى البني الاسمر ، ينحرف الى الجوزي عند الذكر ويبيت عند الانثى . رأسها صغير الحجم كالحمار ذبان . عينهاا صغيرتان . زباناها غطيان صغيران . ظهورها عند الذكر مستطيل القد وهو عند الانثى جعدة تركيز على التربة الاولى . ارساغها خماسية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتمشي حتى اواسط الصيف . تسرح في الليل . تساقط في اوائل حزيران تنجح الممكن ميعادها تحت الجلالة والحجارة || البرقة مبطلة الشكل ، سداسية الرواجب بمراء اللون ، تعيش في اول عهدا على المواد الضوية ثم ثم ما تقتصره من البزاق والحلزون .

### ٣٠٩١٧ - بَرَاة شَرْبِيَّة ، حُجَاب شَرْبِيَّة ، بَصْبُوس اللَّيْلِ الشَّرْبِيَّة

*Luciola orientalis* (S). *Luciola orientalis* (F).  
Orient Fire-fly, Orient Glow-worm (E).

حشرة مفترسة نافعة من فصيلة البراعيات ورتبة مفدمات الاجنحة . تألف الاماكن التي ترتادها البراة الدجوية وهي اكثر انتشاراً منها ولشد بصيصاً في الظلام وانثاها بجنية كالذكر || جسمها متوسط القد يطول عند الذكر نحو ١٤ سم . ويطول عند الانثى نحو ١٦ سم . ثوبها شاذي اللون ، جوزي الرأس والظهران ، حطلي الكويل بالجنات والجرازم . رأسها صغير الحجم ملفوف بالكويل . زباناها مستطيلان . عينهاا صغيرتان بارتان . ظهورها يلمع كامل البطن . بطنها مبطل . اسمر اللون . ارساغها خماسية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر آذار وتمشي حتى اواخر آب . تسرح في الليل . قوتها البزاق والحلزون والعريط . وهي كالبزاة العجيبة تحارس المقسم الاستقبالي فتتحقق ضيبتها برضاب ذماني للمادة ثم تمقبة بسائل لزبي يمل التسج ويذيبها لترشفها بفكيها الاجنبي || البرقة مبطلة الشكل ، سداسية الرواجب ، بمراء اللون ، مقلدة المراج وهي الحشرة الجملانة لا تخلو من الجهاز الضوئي || طول الاكمال الذي يستمر نحو ٦٥ يوماً ينقضي في التربة تحت الحجارة .

### ٣٠٩١٨ - بَرَاة عِيَات

*Lampyridae* (S).  
*Lampyridae* (F). *Lampyridae*, Fireflies, Glowworms, Lightning basties (E). *Leuchtkäfer* (D).

فصيلة حشرات مفترسة من ثدييات الاجنحة ، ليات البشرية ، صبرات القد ، مستطيلة الشكل ، تقضي في الظلام لان تربيته الطرية تجعل دغداً لفسورية بصيصها يشع في الظلمة . اجناسها المبرقة نحو ٥٠٠ أما انواعها فعدة مئات . معظمها من حشرات المناطق الحارة . تتميز بذكرها الجنية وانثاها للملاري . وهي تتميز من الحشرات النافعة لانها تقضي على بعض الثدييات الفارة بالزراعة .

### ٣٠٩١٩ - بَرَاة دُجُوبِيَّة ، حُجَاب دُجُوبِيَّة ، بَصْبُوس اللَّيْلِ

*Cyclamen* (F).  
*Rhizothorus* (S).  
*Rhizothorus* (F). *Rhizothorus* (E).

حشرة مفترسة نافعة من فصيلة البراعيات ورتبة مفدمات الاجنحة . تألف الاماكن التي يكثر فيها الحلزون والبزاق والعريط . تتميز بأعين القشور وبالعصا في الظلام وبغبارق الشكل الخارجي بين الذكر والانثى ، ذكرها بجنية وانثاها ماري || جسمها متوسط القد ، يطول عند الذكر من ١١ الى ١٣ سم . ويطول عند الانثى من ١٤ الى ١٦ سم . ثوبها الى البني الاسمر ، ينحرف الى الجوزي عند الذكر ويبيت عند الانثى . رأسها صغير الحجم كالحمار ذبان . عينهاا صغيرتان . زباناها غطيان صغيران . ظهورها عند الذكر مستطيل القد وهو عند الانثى جعدة تركيز على التربة الاولى . ارساغها خماسية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتمشي حتى اواسط الصيف . تسرح في الليل . تساقط في اوائل حزيران تنجح الممكن ميعادها تحت الجلالة والحجارة || البرقة مبطلة الشكل ، سداسية الرواجب بمراء اللون ، تعيش في اول عهدا على المواد الضوية ثم ثم ما تقتصره من البزاق والحلزون .

*Baudrier d'Orion* (F).  
٣٠٩١٥ - بَرَاة الجُزَرَاء  
يد الجوزاء ثلاثة كواكب وباسطة من كوكبة الجوزاء . راجع قنار الجوزاء .

### ٣٠٩١٦ - بَرَاة حَوَر

*Idiocerus tremulae* (S).  
حشرة من فصيلة الزيديات ، طولها يراوح من ٤ الى ٦ سم . جسمها مخروطي الشكل . رأسها مستعرض . زباناها غطية قصيرة . ثوبها حطلي اللون . رأسها واظراف جناحها الى الخضار الاطحل الباهت . مدها حطلي اللون اسمر الحار والظرف . تركب الحور من اذار الى تشرين .

### ٣٠٩١٧ - بَرَاة صَفْصَاف

*Idiocerus ustulatus* (S).  
حشرة من فصيلة الزيديات طولها يراوح من ٤ الى ٦ سم . جسمها مخروطي الشكل . رأسها مستعرض . زباناها غطية قصيرة . ثوبها الى الخضار الاسمر المراج . مدها اسمر تركب الصفصاف دون ان تؤذيه .

### ٣٠٩١٨ - بَرَاة أَلِيْف

*Idiocerus socialis* (S).  
*Idiocerus social* (F).

حشرة من فصيلة الزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها صغير القد يطول نحو ٥ سم . رأسها مستعرض ، قليل النتوء اصفر اللون . خطمها معتدل الطول . عينهاا كبيرتان . زباناها صغيران ، غحيلان . كويلها قليل الاحتداد اصفر . حشمتها بحرية صفراء . ظهورها كامل الخشبية ، لاحت ، حطلي اللون يملو مواج اسمر . وثنها غشائيات ، شفافة . بطنها اصفر اللون . صفحتيه . قوامها بكيفية الملب التاشك || تألف جميع المواقع التي يكثر فيها الاشباب والاشجار . قوتها التسج تنحصر من الاوراق .

### ٣٠٩١٩ - بَرَاة يَدِيَّة

*Idesia* (S). *Idésie* (F).  
شجرة برية ورتبة من فصيلة التنفسيات . مدها الصين واليابان . ساقها منتصبة تملر من ١٢ الى ١٧ م . انصافها فائرة نظامية الارتكاز . اوراقها عابئة ، متعاقبة و متعقة ، رديعة الشكل ، مستطيلة المنق . نصلها جامد الصفحة بحري اللون . ازهارها زوجية الثلث ، عادية القلمة ، صغيرة القد ، خضراء اللون . ازهارها عشكولي التجميع ، بحوري الارتكاز . عشاكلها متدلية . ثمارها حنية الشكل والقد برتقالية اللون || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

### ٣٠٩٢٥ - بَرَاة كَمَّة ، حُجَاب كَمَّة ، بَرَاة لَمُورِي

*Lampyrus* (S).  
*Lampyre*, *Ver luisant* (F). *Firefly* (E).

جنس حشرات مفيدة ، صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، مبطلة الجسم ، من فصيلة البراعيات . انواعها المبرقة نحو ١٠ جميعها من ليات البشرية يشع في الظلام . معظمها من حشرات المناطق الحارة . ذكرها تسرح في الليل لاعتداده الى انثاها للماري . اثنائهاا مختلفة الالوان يكثر فيها الرادي والبي .

### ٣٠٩٢٦ - بَرَاة دُجُوبِيَّة ، حُجَاب دُجُوبِيَّة ، بَصْبُوس اللَّيْلِ

*Lampyrus noctiluca* (S).  
*Lampyre nocturne*, *Ver-luisant* (F).  
*Fire-fly*, *Glow-worm* (E).

حشرة مفترسة نافعة من فصيلة البراعيات ورتبة مفدمات الاجنحة . تألف الاماكن التي يكثر فيها الحلزون والبزاق والعريط . تتميز بأعين القشور وبالعصا في الظلام وبغبارق الشكل الخارجي بين الذكر والانثى ، ذكرها بجنية وانثاها ماري || جسمها متوسط القد ، يطول عند الذكر من ١١ الى ١٣ سم . ويطول عند الانثى من ١٤ الى ١٦ سم . ثوبها الى البني الاسمر ، ينحرف الى الجوزي عند الذكر ويبيت عند الانثى . رأسها صغير الحجم كالحمار ذبان . عينهاا صغيرتان . زباناها غطيان صغيران . ظهورها عند الذكر مستطيل القد وهو عند الانثى جعدة تركيز على التربة الاولى . ارساغها خماسية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتمشي حتى اواسط الصيف . تسرح في الليل . تساقط في اوائل حزيران تنجح الممكن ميعادها تحت الجلالة والحجارة || البرقة مبطلة الشكل ، سداسية الرواجب بمراء اللون ، تعيش في اول عهدا على المواد الضوية ثم ثم ما تقتصره من البزاق والحلزون .

جوي الرقطة الصنائية التبدل . رقطة له لقياسة الحجم والشكل صدره وبطنه الى البياض الناصع || موطنه بين ايران والانفان واغند الى التبت . يالغ الجبال العالية من ارتفاع ٣٠٠٠ الى ٦٠٠٠ م .

٣١٠٠٧ - **يرغوم**  
Percoptère mâle (F).  
Ha percopterus (E).  
اليرغوم واليرشم واليرغوم هو الذكر من اليرشم .

٣١٠٠٨ - **يرد**  
Yard  
وسدة قياس الكازينية تساوي ٠.٠٩١٤٣٨٣ م . يقال اخذت من طول سيف الملك هنري الاول || كسور اليرد القدم واليوسه . انقدم او القوت يساوي ٣٠.٨ م . واليوسه او اللانش تساوي ٢٥.٤ م . فاليرد يساوي اذاً ثلاثة اقدام او ٣٦ بوصة .

٣١٠٠٩ - **يردوم**  
Monstera (S). Monstère (F). Ceriman (E). Kust-licher, Kolbenriesse (D). Monstera (I).  
جنس نباتات عشبية متسلقة من فصيلة الفصليات . انواعه المعروفة ١٢ ، مهدا البلاد الامريكية . منظرها محو وبمضها معمر . اوراقها مزخرفة التصنيف . ازهارها سرية . ازهارها صغيرة لائحة بيضاء الشق . ثمارها لوزية مأكولة القشور في بعض الانواع .

٣١٠١٠ - **يرز**  
Pinasse (F).  
هو الصنوبر البري ، اطله .

٣١٠١١ - **يرسون**  
Erycina (S).  
Erycène (F). Erycina (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة اليرسونيات . انواعه المعروفة كثيرة العدد ، جميعها من متحجرات الطبقات المسانية واليوسانية . اصداها يضيئة الشوزن او عرسة ، معتدلة التبطيط ، رقيقة ، مالة .

٣١٠١٢ - **يرسونيات**  
Erycinidae (S).  
Erycinidés (F). Erycinidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها عديدة ، منها الماهرة وهي من متحجرات الاراضي الثالثة ، ومنها الماهرة التي تتميز باصداها الصغيرة الرقيقة الشافة . جميعها ثنائية المصارع ، مستطيلة الارجل القابضة الانحناء || اعرف اجناسها واشهرها اليرسون واقتين واقتية والخطوة .

٣١٠١٣ - **يرع**  
Tragelaphus scriptus (S). Tragelaphe écrite, Guib (F). Bush buck, Hornessed antelope (E).  
نوع من الجهل صغير القند حسيبه جسم المامز . اصفاة البلاد الافريقية من جنوب الصحراء الكبيرة الى الحيفة . ثوبه امركيت يملو بخطوط ابيض وتبيح اسم لا نظامي الترتيب ولا قياسي الشكل . راجع نباح .

٣١٠١٤ - **يرغون**  
Eriogonum (S). Eriogone (F).  
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة البطاطيات . انواعه عديدة ، منظرها بري وبمضها تريبي . سوفها منتصبة عادة الفروع . اوراقها غمية التجميع لقياسة الارتكاز يكثر وجودها عند قاعدة الساق . ازهارها صغيرة القند شامية الانقسام ثنائية او رباعية التجميع متغلغلة قلافة جرسية الشكل او اسطوانية || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

يألف البراري والادغال . ملجئه الحيائي جماعي ، جماعته قليلة العدد . قوته الحشرات والنمل والبرود البرية || جسمه معتدل القند قريب الشبه بالجمال الا انه اطول عنقا وبنقاداً واصفر رأساً . جناحه مستدير الاطراف . ذنبه صغير القند ، مخروطي الشكل . ثوبه الى اليردة الزرقاء المزاج يملوها قوشم ابيض واسمر . زوره وسدره وبطنه الى التربة السوداء يملوها مزاج ودي || يذش اقصومه الى التربة بين النباتات المشايكة . الاثني تحسن وحدها من ١٤ الى ١٦ بيضة . الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع . الذكر يدين الغذاء والحماية .



يربوع

٣١٠٠١ - **يربوع** \* **أودع**  
Dipus (S). Gerboise (F). Jerboa, Jaculus (E).  
جنس حيوانات لينة قاضية جاسة من فصيلة اليربيجات . انواعه عديدة موطنها جميع الاساقع الصحراوية الحارة والمتندلة الحارة || شكله ككل فارة كبيرة . طوله نحو ١٧ سم . وذنبه ٢٠ . حياءه جاحظتان . اذناه كبيرتان منتصبتان وهو طويل الرجلين قصير اليدين جداً وله ذنب مستطيل يرفعه صعداً يحمل في طرفه خصلة صوف لونها يختلف من لون ثوبه || ثوبه الى الصهبة الصفراء . ظهره بلون الرمل ، بطنه ابيض || يالغ القفاني والناطق الجافة يتخذ بصره في نثر الارض . انشاء تحمل ثمانية اطباء وتضع اربع مرات في السنة في كل مرة من ٤ الى ٦ ادراس . قوته المواد النباتية على اختلاف انواعها ومصادرها والحشرات والحراد || اعرف انواعه واصمها ما يتبع .



يربيس

٣١٠١٢ - **يربوع تدعري**  
Dipus macrotarsus (S). Gerboise macrotarse (F).  
موطنه البلاد السورية . ثوبه بلون الرمل . طوله نحو ١٦ سم . وذنبه ١٩ || يكثر في البادية .



يردوم

٣١٠١٣ - **يربوع ذو ريش**  
Dipus sagitta (S). Gerboise flèche (F).  
موطنه العراق وتركيا واروبه . ثوبه بلون الرمل . ظهره عايق لليج . ذنبه اسود الخصلة ، ابيض النورة .



يرسون

٣١٠١٤ - **يربوع مصرى**  
Dipus aegyptius (S). Gerboise d'Egypte (F).  
موطنه فسيح الاجزاء بينت من الجزائر الى تونس وليبيا ومصر والنوبة وفلسطين وشالي الجزيرة العربية || ثوبه الى الصهبة الصفراء . ظهره بلون الرمل الرطب . بطنه ابيض . خصلة ذنبه بمراء . طرفها اخبر .

٣١٠١٥ - **يربوعيات**  
Dipodidae (S).  
Dipodidés (F). Dipodidae (E).  
فصيلة حيوانات لينة قاضية جامة من مرتبة قردنيات الشوزب ورتبة القوارض . اجناسها وانواعها عديدة تتميز باستطالة جراسها الخلفية وقصر الامامية . رؤوسها عظيمة . اذانها ملغية الشكل منتصبة . اعناقها قصيرة . اذنانها طويلة || موطنها العالم ، تألف القفاني والقيمان . قوتها الاغشاب والجذور والثار || اعرف اجناسها اليربوع والزبود والعولاة والهاقل .



يرع

٣١٠١٦ - **يربيس** \* **لمر ابيض**  
Felis uncia (S). Snow leopard, Irbis (E).  
حيوان مقرن من فصيلة السنوريات . يشبه النمر كوكباً ونظماً . يقال انه ضرب منه . طوله نحو ٣٣٣ سم . بما فيه الذنب الذي يطول نحو ١٠٠ سم . ثوبه ابيض الاساس

## ٣١٠٢٢ - يَرْغُونُ قَاصِمُ الْهَتَبِ \*

*Ericulus setosus* (S). *Ercule soyeux* (F).  
حيوان لبون حاشر من فصيلة المذليات. موطنه جزيرة مدغشقر. يألف الحشبات والنباتات التي تكثر فيها الأعشاب مرصحة دجوي. قوته الحشرات والديدان || جسمه صلب اللد ، قريب الشبه بالفتنة ، يظل نحو ٢٤ سم. حليه متثل الخشونة ، عديم المسال. ثوبه الى السمرة السوداء || الاثني ثلثون تقصع في كل ديس من ١٥ الى ١٢ جرأ || يئانه الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر .

Larvae (F). Larval (E).

٣١٠٢٤ - يَرْبَبُ

راجع ديموي .

*Pierre calcaire molle* (F).

٣١٠٢٥ - يَرْبَعُ

هو كل حجر كلسي عديم الصلابة أو سريع الانفلات .

*Asperge* (F).

٣١٠٢٦ - يَرْبَعُ

هو الحليون المعروف . ج رابع ، اطلبه .

*Sparmannia* (S).

٣١٠٢٧ - يَرْمُومُ

*Sparmannia* (F). *Sparmannia* (E).

جنس جنبات وشجيرات برية وزراعية تربيتين من فصيلة التريزوفيات . منبتها البلاد الافريقية . سوطها منتصبه تملو من متر الى ستة امتار . اورقها شتائية الاشكال . ازهارها صيواني التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها صفيرة اللد يضاء اللون || انواعه المعروفة قليلة البد ، اشهرها اتالية :

## ٣١٠٢٨ - يَرْمُومُ افريقي

*Sparmannia africana* (S). *Sparmannie d'Afrique* (F).  
نوع من البريوم . ساقه تملو نحو ستة امتار . اورقها قلبية الشكل تطلو من ١٢ الى ١٥ سم. وترمس من ٨ الى ١٥ سم. تصالها مسنة الخفاف ، مزينة البشرة على السفحتين العليا والسفلى . ازهارها صفيرة الحجم ، يضاء اللون || تنويرها يستمر طول شهر ايار .

## ٣١٠٢٩ - يَرْمُومُ كَبِيَّ الْوَقْ

*Sparmannia palmata* (S). *Sparmannie palmée* (F).  
نوع من البريوم . ساقه تملو من متر الى مترين . اورقها كفية الشكل ، خماسية الفلق المسننة الخنار . تصالها عديم الزغب ، بحري الخفسار . ازهارها يضاء اللون ، صفيرة الحجم || تنويرها يستمر من آذار الى تموز .

Henné (F).

٣١٠٣٠ - يَرْغَاءُ

هي الحناء ، اطلبه .

*Pedetes cafer* (S).

٣١٠٣١ - يَرْتَبُ \*

*Pédète cafre, Lièvre sauteur* (F).

حيوان لبون قاصم وسيد الجنس والنوع من فصيلة الدافيات . موطنه بعض الاستعاق الافريقية . طوله نحو ٤٥ سم. بؤقيه ٤٥ ، رأسه كراس الانب . عيناه كبيرتان جاسناتان . ذنبه جنل الصوت . جرامزه قصيرة ، خماسية الاصابع ، قوية الاظافر القصوة . جرامزه اخلفية مستطيلة ، رباعية الاصابع ، قوية الاظافر القصيرة المستعرة || ثوبه الى الصبغة السوداء . بطنه زشوفيف يفض . يعيش جماعات كثيرة البد || جحره ردة قسيمة تكتنفها اربعة اتفاق متصالية مستطيلة . قوته الاعشاب والجذور والحطب .

٣١٠١٥ - يَرْغُونُ أَصْفَرُ \*  
*Eriogonum flavum* (S). *Eriogone jaune* (F).

نوع من البرغون التريبي . ساقه زياه تملو نحو ٣٥ سم. اورقاه متعقة ملقبة الشكل تطلو من ٣ الى ٨ سم. تصالها خلى البشرة على صفحتيه . ازهاره هامة الارتكاز صيوانية التجميع ، حلية البشرة ، صفراء اللون || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

## ٣١٠١٦ - يَرْغُونُ غَسِيي \*

*Eriogonum umbellatum* (S). *Eriogone en ombelle* (F).

نوع من البرغون الجلبني المنبت . ساقه تملو من ١٥ الى ١٥ سم. اورقاه متعقة ملقبة الشكل . تصالها بحري الصفة العليا ، خلى السفلى . ازهاره هامة الارتكاز ، خمسية التجميع ، صفراء اللون || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

## ٣١٠١٧ - يَرْغُونُ عَدَقِي \*

*Eriogonum corymbosum* (S). *Eriogone en corymbe* (F).

نوع من البرغون التريبي . ساقه مزغبة تملو من ١٥ الى ٢٥ سم. اورقاه متعقة اهليلجية الشكل ، تصالها خلى البشرة ، متصع الاطراف . ازهاره هامة الارتكاز ، ملقبة التجميع ، ثوبا الى البياض الموشح بالوردي || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

## ٣١٠١٨ - يَرْغُونُ عُرْسَبِ \*

*Eriogonum compositum* (S). *Eriogone composite* (F).

نوع من البرغون التريبي . ساقه مرءاه تملو من ٣٥ الى ٤٥ سم. اورقاه بيضية الشكل ، قلبية القاعدة ، تصالها اغصن الصفة العليا خلى السفلى . ازهاره هامة الارتكاز ، خمسية الشكل ، مركبة الصفوف المتراكبة . ثوبا الى البياض الاغبر || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

*Pterostyrax*

٣١٠١٩ - يَرْفِيلُ \*

جنس نباتات برية وتريزينة من فصيلة الاصطركيات . انواعه المعروفة قليلة البد منها الاشجار والشجيرات . سوطها منتصبه فراء . اوراقها عابلة متعقة متصانة . تصالها اهليلجية جامدة الوثل ، مسنة الحواشي . صفحاتها السفلى كثيفة الخمل الاطلل . ازهارها مهورية الارتكاز ، معتدوية التجميع . ازهارها ديموي . ثمارها جرأ يرسية الشكل ، رباعية الابعدة .

*ictère, jaunisse* (F).

٣١٠٢٠ - يَرْكَانُ

*Icterus, jaunisse* (E).

حال مرضية تترى لسح الحيوان تنفسه ، سببها المادي تملد الصفراء من بلوغ المهي بسهولة تختلط بالدم .

*Chlorose* (F).

٣١٠٢١ - يَرْكَانُ ، يَرْكَانُ

*Chlorosis* (E).

ومنهم من قال اركان . حلة فيزيولوجية تصعب النبات فتسبب اصفرار الارراق وتنمنا عن القيام بعملها التنشيطي على الوجه الاكمل مما يؤدي الى تأخير النمو والتدليل الباكر . ويتقال للارواق والنباتات المصابة بالارقان ميوقة .

Larve (F).

٣١٠٢٢ - يَرْكَدُ ، يَرْكَانَةُ

هي الدعوص ، اطلبه .



يرغول قاصم القلب



يربب



الاستشعارية قصيرة، ثنائية الفصل، أخطائها قصيرة، ملاسها دقيقة، كواسلها وبطنها شبه أسطوانية الشكل، رواشتها معتدلة الحجم، شائعة، قوائمها نشيطة || تألف المواقع الجافة والمنازل الريفية، قوتها المراد المضوية المنحلة، يرقاتها عادمة البصر، نائلة ودائمة.

٣١٠٤١ - يثوريكيات <sup>٥</sup>  
Scenopinidae (S). Scénopinidés (F). Scenopinidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين، أجناسها وأولاهها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة، تألف المواقع الجافة وتضيق المساكن الريفية || أجناسها صغيرة تطول من ٢ الى ٨ م، رؤوسها كبيرة، عيونها متقاربة، مثائلة عند الشقين، قربها الاستشعارية قصيرة، ثنائية الفصل، أخطائها صغيرة، كواسلها وبطنها شبه أسطوانية الشكل، رواشتها شائعة، قوائمها قوية || يرقاتها كومة، دودية الشكل، بعضها وألح والبعض الآخر دامن || أشهر أجناسها اليركة.

٣١٠٤٢ - يثوروم <sup>٥</sup>  
Georyssus (S). Géorysse (F). Georyssus (E).

جنس حشرات من فصيلة اليرموقيات ورتبة غديات الاجنحة، أنواعها المعروفة نحو ٢٥ جميعها من حشرات المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة || أجناسها عادمة الراش الصغيرة القدة، بيضية الشكل، تطول من ٢ الى ٥ م، رؤوسها صغيرة، ملحوفة، عيونها بارزة، أخطائها مستطيلة، تأثيرها وملاسها نظامية، قربها الاستشعارية قصيرة، دبوسية الاطراف، كواسلها شبه مخروطية، مقطوعة المقدم، المهادا لاهفة قلعها خطوط من التغيرات الدقيقة، قوائمها نشيطة، أثوابا وحيدة اللون يكثر فيها الاسود وبشتافاته والجزوي والكسني || تألف صفات المناطق ويجاري الماء حيث تنغم في الرمال والاسمال الرطبة، قوتها المواد المضوية المنحلة وما تستطيع اقتناصه من حشرات وهوام.

٣١٠٤٣ - يثوروميئات <sup>٥</sup>  
Georyssidae (S). Géoryssidés (F). Georyssidae (E).

فصيلة حشرات متفرقة من غديات الاجنحة، أجناسها وأنوانها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || أجناسها عادمة الراش، صغيرة القدة، بيضية الشكل، تطول من ٢ الى ٥ م، رؤوسها صغيرة، ملحوفة، عيونها بارزة، تأثيرها وملاسها نظامية، قربها الاستشعارية قصيرة، كواسلها والفصل، دبوسية الاطراف، كواسلها شبه مخروطية الشكل، تلحف الرأس، المهادا لاهقة، قوائمها نشيطة، أثوابا سوية اللون || تألف الرياض وصفات المناطق ويجاري الماء، تعيش على المواد المضوية المنحلة وعلى ما تستطيع قنصه من دوبيات وهوام || أشهر أجناسها اليرموم.

٣١٠٤٤ - يسكر، يسكر <sup>٥</sup>  
Ben (F). هو البسان، اطلبه.

٣١٠٤٥ - يستعور

شجر تصنع منه المساويك ومساويكه اشد المساويك إنقاذ الثغر ونابته بالسارة وفيها شيء من مرارة مع لين.

٣١٠٤٦ - يستوروية <sup>٥</sup>  
Ostryer (F). هي النابية للشهورة بصلابة خشبها.

يسرح في الليل ويبعث في النهار، انثاء تحمل اربعة اطياء وتضع اربعة ادراس مرة واحدة في السنة.

٣١٠٣٢ - يثوريثلم، نديية <sup>٥</sup>  
Eriophyllum (S). Eriophylle (F).

جنس نباتات عشبية مصرمة من فصيلة المركبات، أنوامه عديدة، معظمها بري وبعضها زرعني، سوقها فروع مستطيلة الزغب الذي يشبه ندف القطن، أوراقها متعاقبة وريشة غبرية، أزهارها وريشة صفراء اللون، يزورها منجبة بقضية || أشهر أنواعه ما يتبع.

٣١٠٣٣ - يثوريثلم عدي، نديية عديية <sup>٥</sup>  
Eriophyllum confertiflorum (S). Eriophylle à corymbes (F).

نوع من البروتيفلم، عشبته تطلو من ٣٥ الى ٦٥ سم، أوراقه صغيرة القدة ثلاثية التفرغ أو خنائية، رويشاته الزهرية كثيفة التجميع، قصيرة الاذن، هرية اللق، أزهاره يستمر من ابرائل سريان الى اواسط تموز.

٣١٠٣٤ - يثوريثلم يثوروي، نديية يثوروية <sup>٥</sup>  
Eriophyllum coespitosum (S). Eriophylle gazonnant (F).

نوع من البروتيفلم، عشبته تطلو من ٣٥ الى ٥٥ سم، أوراقه السفل خمسية التفرغ، رويشاته الزهرية كبيرة القدة، متوسطة العدد، مستطيلة الاذن || أزهاره يستمر طوال شهر تموز.

٣١٠٣٥ - يثوري <sup>٥</sup>  
Yurumi (F). حيوان لبون اردو مشهور باسم تمشور أعرف، اطلبه.

٣١٠٣٦ - يثورون <sup>٥</sup>  
Sperme des animaux féroces (F). يثورون، صعد الحيوانات المفترسة.

٣١٠٣٧ - يثورون <sup>٥</sup>  
يدماغ الفيل.

٣١٠٣٨ - يثوريثيات <sup>٥</sup>  
Spermaphytes (F). ترميث يطلو على جميع النباتات التي تعلق بزور حقيقة من أي قسم كانت أن من المستورات أو العريانات أو التسميرات.

٣١٠٣٩ - يثوراع <sup>٥</sup>  
Bioplane (S). Bioplane (F).

جنس حشرات لاذقية من فصيلة البنيشيات ورتبة مفدمات الاجنحة، انواعها المعروفة خمسة مهدا الشرق الاذل يكثر ويوجد في بعض مناطق سورية الداخلية || أجناسها صغيرة تطول من ٨ الى ١٢ م، أثوابا وحيدة اللون منها الاسود والجزوي والاسفر والكسني والبني، رؤوسها صغيرة مستديرة، قربها الاستشعارية دبوسية الشكل، كواسلها معبودية، ناشرة الاطراف الامامية، المهادا غفدة، مقطوعة الاطراف لا تلحف كامل الجسم || تألف المرح وزرائب البقر والتمز والماعز، تعيش تحت القش على المواد المضوية والنائلة المنحلة.

٣١٠٤٠ - يثوريكة <sup>٥</sup>  
Scenopinus (S). Scénopine (F). Scenopinus (E).

جنس حشرات من فصيلة اليركيات ورتبة ذوات الجناحين، انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || أجناسها مستطيلة تطول من ٣ الى ٦ م، رؤوسها كبيرة، عيونها متقاربة عند الشقين، قربها



يثوراع



يثوروم

تركب النباتات المرعوبة والمنقعية || أشهر أنواعها البسف  
الفرأز ويسف فرموزا .

Chenille (F).

٣١٠٤٧ - يُسْتَرْع  
هو الاسروع ، اطلبه .



يسف البسف

٣١٠٤٢ - يُسْرُوع \*  
Tritonia (S). Tritonia (F). Tritonia (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديبات الاربل  
خلفيات الخياشم فصيلة البسويستية . انواعه المرعوبة  
كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على  
التبوت البحرية || اجناسها عراشلة اعليجية الشكل  
شبيهة بالبراق . رؤوسها قصيرة مقطوعة ، ثنائية القواس  
الجماحة . خياشيمها ظهريه الارتكاز ، ثنائية الصف ،  
منشعبة . افواجمها ثنائية الفكوك القرنية المسنة الاطراف .  
الواجم ملونة بكث في الاحمر والازرق والاصفر .

٣١٠٤٨ - يَسْفَ البسف \*  
Ortalis formosa (S). Ortalis élégante, Otile élégant (F).  
حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة اليسفيات .  
جسمها صغير القد يطلو من ٧ الى ١١ م . رأسها كبير ،  
شبه مخروطي الشكل ، حنطي اللون ، اقفر الموج .  
جبهتها برتقالية اللون . غطلمها مستدل الطول ، صناعي  
اللون . عينها مكورتان ، فاشتران و اربوايتسان ،  
مطوئتان بالفضي . زباناها قصيران . رؤسهاا كبيران  
صنابيان ، مقيبان بالاسمر الباقي . قوائمها الى الحنطي ،  
صدرها صناعي اللون ، فضي الغمل ، تقطبه بعض الخطوط  
السر . بطنها يرسمي الشكل ، صناعي الخضاب ، اصفر  
المواج ، تملو ستة اطواق سمر || تظهر الحشرة الجملانة  
من حزيران الى ايلول . مرتها المرامي والاعشاب المنقعية  
حيث تقترس مختلف انواع الارق والمروم || يرقاتها غاصلة  
تركب الارواق وتعيش عليها حتى الاكمال .



يسف ثنائي اللون

٣١٠٥٤ - يُسْوِيعِيَات \*  
Tritonidae (S). Tritonidae (F). Tritonidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مديبات الاربل  
خلفيات الخياشم . اجناسها وانواعها المرعوبة عديدة  
منتشرة في معظم بحار العالم . اكثرها عبي وبعضها يقترب  
من الشطوط . اسرابها متفانوة العدد || اجناسها مستعيلة  
عامة الصف . رؤوسها ثنائية او رباحية اللامس .  
خياشيمها متساوية ، مركزها فوق الرءاء على الظهر او  
على الجانبين || اعرف اجناسها واشهرها اليسوع والبراة  
وغلوكس .

٣١٠٤٩ - يَسْفَ ثَسْنَائِي اللون \*  
Ortalis bicolor (S). Ortalis bicolor (F).  
حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة اليسفيات .  
جسمها صغير القد يطلو من ٤ الى ٧ م . رأسها محبد  
الشكل ، صناعي اللون . غطلمها مستدل الطول . زباناها  
صغيران ، مقيبان . عينهاا كبيرتان ، ذهبيتان . صدرها  
الى الخضار اللامس . بطنها يرسمي الشكل ، ازرق اللون ،  
اسنح المواج . مرزا الى السمرة الحنطية الباقية . رؤسهاا  
كبيران ، ثنائان . قوائمها الى السمرة الكتشية || تظهر  
الحشرة الجملانة من اواسط نيسان الى اواسط تشرين الاول .  
مرسها يشمل كل مكان حتى الاماكن للمرعولة || قوتها  
المروم . يرقاتها نائلة .



يسف فرموزا

٣١٠٥٥ - يُسُون \*  
Pimpinella (S). Pimpinella (F). Pimpinella (E).  
جنس نباتات عشبية من فصيلة الخيميات . انواعه المرعوبة  
عديدة منها الحولية والحرولة والمعرة اشهرها الايسون ||  
سوقها متصبية فراءه . اوراقها مركبة . ازهارها صرولي  
التجميع ، ابطي الارتكاز او تاجية . ازهارها بيضاء  
اللون . غمارها يزور صغيرة || اشهر انواعها :

٣١٠٥٠ - يَسْفَ فرموزا \*  
Ortalis formosa (S). Ortalis élégante (F).  
ذبابية من اليسفيات صغيرة القد ، طولها يراوح من ٧  
الى ١١ م . رأسها وقوائمها الى الحنطي الاشتر . حريتها  
فضية . جبهتها برتقالية . تسرح من حزيران الى ايلول .  
مرتها المرامي الزطة والاعشاب المنقعية حيث تلتهم مختلف  
انواع المروم || يرقاتها غاصلة تركب الارواق وتعيش  
عليها .

P. anisum (S). يسون انيسي ، آيسون  
P. cretica (S). يسون اكرتي  
P. viridis (S). يسون اصفر  
P. puberula (S). يسون ذهبي  
P. anthriscoides (S). يسون سرلي  
P. eriocarpa (S). يسون صدفلي اللبر  
P. corymbosa (S). يسون ملدي



يسف هزار

٣١٠٥٦ - يَخْشِب \*  
Jaspe (F). Jasper (E).  
حجر الشب حجر صرولي التركيب مختلف الالوان  
منه حجر الحك الاسود اي صدق الصافه .

٣١٠٥١ - يَسْفَ هزار \*  
Seoptera vibrans (S). Ortalis vibrans (F).  
ذبابية من اليسفيات صغيرة القد ، طولها يراوح من ٥  
الى ٧ م . جسمها ازرق اللون . رأسها الى الشقرة الباقية .  
قوائمها سود . اسافلها حنطية تتنير باستمرار امتزاز  
جناحيها . تسرح من حزيران الى آب . مرتها الاشجار  
والمرامي حيث يكث الارق والمروم || يرقاتها حراكة  
مغاصلة عند الحاجة .

٣١٠٥٧ - يَخْشِبِيَّة \* كَوْتَب افرقيبة  
Agathaea amelloides, Aster capensis (S). Agathaea,  
Aster d'Afrique, A. du Cap, Marguerite bleue (F).  
Cape daisy, Cape aster (E). Afrikanischer Agath (D).  
Aster d'Africa (I).

٣١٠٥٢ - يَسْكِيَات \*  
Ortalisidae (S). Ortalisidae (F).  
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . انواعها المرعوبة  
نعا ٤٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم . حشراتا ذبابية  
الشكل . اناسها مسلحة بأشرة حادة تستعملها لفرس . افواجمها  
عديدة الالوان الزاعية المتراكبة || يرقاتها دلمة او غاصلة



يسع

بجلة زبدية معمرة من فصيلة المركبات . مهدا افرقيبة  
الجنوبية وقد همت زراعتها معظم حداثات العالم . ساقها  
فراءه تملو من ٧٠ الى ١٢٠ م . لوانها متعاقبة ،  
حاضفة - ملثة الاطراف . نصلها يفضي الشكل ، حلي  
الصفحة . ازهارها وروئية ، فردية التجميع ، مستعيلة الزناد ،  
زرقاء اللون . ازهارها يستمر طوال الصيف .

Chevreau (F).

Small goat, Young roe (E).

٣١٠٦٤ - يَغَر

هو الجدي والحلام والرفلة .

Diphax, Sympetrum (S). \* ٣١٠٦٥ - يَغْرُوس

جنس حشرات من فصيلة البسويات، أنواعه عديدة جميعها مفترسة تقتضي على الحوام . طول اجسامها يراوح من ٢٠ الى ٤٠ سم . وبسطة اجنحتها تراوح من ٤٢ الى ٦٠ سم . ألوانها المتغيرة الى الخطي الصنابي المارح . اجنحتها وردية الجسم ، صفراء القواعد يعلوها في أول زواياها الاشارة بخطوط متفرعة صنابية اللون . رقبتها عارية عادمة اللمع مستطيلة الاربعل تعيش في وصول المناطق وبجاري الماء .

Orthetrum (S). \* ٣١٠٦٦ - يَغْس

جنس حشرات مفترسة من فصيلة البسويات ، أنواعه عديدة، طول اجسامها يراوح من ٣٥ الى ٤٧ سم . وبسطة اجنحتها تراوح من ٥٥ الى ٧٥ سم . ألوانها الى الزرق . روبروسا خضر . انثاها اصغر ثوبها وجناحها . رقبتها زياه الجسم تعيش في الاسمال .

Libellula (S). \* ٣١٠٦٧ - يَغْسُوب

Libellule (F). Dragon fly (E). جنس حشرات من فصيلة البسويات، أنواعه عديدة، اجسامها مستطيلة ، طولها يراوح من ٢ الى ٤٦ سم . وبسطةها تراوح من ٥٥ الى ٧٦ سم . ألوانها خطية أو كستنية اللون . اجنحتها شفافة شرجية التزاويق . جميعها مفترسة، بعضها يحمل على النمل .

Libellulidae (S). \* ٣١٠٦٨ - يَغْسُوبِيَّات

Libellulidae (F). Libellulidae, Dragon flies (E). فصيلة حشرات من رتبة الرعاشات ، اجناسها وانواعها كثيرة العدد، جميعها مفترسة تألف المناطق وبجاري الماء . ذكورها اصفر قدام انثاها واخرى لونا سبها . انثاها تقتف بمكنها فرديا على سطح المناطق وعلى صفحة الماء . قنيتف عن دعابيص جاسة تعيش كامل حياتها البرقية في الماء او في الرسل . حشراتها الكاملة تتميز بعدم انطلاق اجنحتها في الاستراحة والرقاد || اشهر اجناسها البسوب والبيس واليعروس والكرولون .

Stachyurus (S). \* ٣١٠٦٩ - يَغْشِيل

Stachyure (F). Stachyurus (E). جنس جنباث معمرة برية وزراعية تربيته من فصيلة البسليات، سوقها تملو من تيرين الى اربعة امتار . اوراقها عابلة متعاقبة ، مسنة الحصار ، تظهر بعد الانزهار . ازهارها سبلي التجميع . ازهارها صغيرة يضاء اللون أو صفراء ، رباعية الفصل والبيلات والنياسم و ثمانية الاسدية . ثمارها "مبار" متينة صغيرة || اعرف ألوانها واشهرها التالية :

٣١٠٧٠ - يَغْشِيل بِكُورِي

Stachyurus praecox (S). Stachyurus précoce (F).

نوع من البسيل . جنبة تربيته تملو نحو ثلاثة امتار . ساقها منتصبة . افئداه قضيفة مرنة . اوراقها اهليلجية طويلة ، طولها ١٨ سم . وتفرس نحو ٩ سم . تصالها قشور مسنة الحصار ، جميلة الخضار الزاهي . ازهارها سبلة التجميع ، متدلية ، صفراء اللون || تنويرها يستمر من شباط الى نيسان .

Jade (F).

٣١٠٥٨ - يَسْم

حجر صواني التركيب شديد الصلابة .

Echites (S). Echites (F). \* ٣١٠٥٩ - يَسْمِيَّت

جنس نباتات برية طيبة من فصيلة الدفليات . انواعها للمرونة قليلة . جميعها امريكية المنبت . معظمها لولبي متسلق وبعضها جبني . سوقها سرسة ماسلة . اوراقها متعقة ، بيضيه ، متعاقبة . ازهارها كبيرة القند زاهية الالوان منها الابيض والاصفر والاحمر . ثمارها جرابية الشكل نجيله القند || يستخرج من سوقها بالخز حصاة لبنية يضاء اللون ، حريفة الطعم ، جسمية المادة لها استعمالها الطبي || اعرف انواعه واشهرها .

Echites biflora (F). يَسْمِيَّت ثنائي الزهر

Echites à feuilles verticillées (F). يَسْمِيَّت ضميّ الأوراق

Echites à corymbes (F). يَسْمِيَّت عذليّ الزهر

٣١٠٦٠ - يَسْمُورَةُ الْبَاذَنْجَان ، نَارِيَّة الْبَاذَنْجَان

Euzophora osseatella (S). Euzophore de l'au-bergine (F).

فراشة من الناريات ، صغيرة القند . بسطها نحو ١٧ سم . رؤسها الاماميان الى السمرة يتوصلها تبيج اسود داكن . رؤسها الخلفيان مفصضان . رقبتها مستدقة الجسم ، خضراء اللون ، كستنية الرأس . تركب نباتات الفصيلة الباذنجانية اخصها الباذنجان والبقيلة والبطاطا تنتعب السوق وتدخلها مع جمام التربة وتتابع نغرها واذاها صمدا ما استطاعت .

٣١٠٦١ - يَسَّار

Raire (F). Throat of the deers (E). صوت الأبل . واليثار شجرة في الصحراء تأكلها الأبل (السان).

٣١٠٦٢ - يَسْمِيَّتِيَّ

Psophia (S). Agami (F). جنس طير من طوارق الساق . انواعه المعروفة قليلة العدد تجمع بين التغلق واللقلق . اصغاطها ضفاف نهر الامازون . اجسامها ربة . اعناقها متوسطة الطول . روبروسا كبيرة . مناقبها غروبية ذرية سادة الملائق . اجنحتها قصيرة . انانيتها شديدة القصر . اسفاها حشفية مستطيلة . ارياشها ناعمة رهلة . روبروسا واعناقها وبطنها خليصة الريش والازن || اعرف انواعه واشهرها البسيمي اللجب .

٣١٠٦٣ - يَسْمِيَّتِيَّ لَبِيَّ

Psophia crepitans (S). Agami bruyant, Oiseau-trompette (F).

نوع من الباجيم صوته كطين البوق يردده أكثر من ٢٠٠ مرة في النهار . وهو طائر كبير القند طوله يراوح من ٩٠ الى ٦٥ سم . ثوبه شديد السمرة اللامعة . رأسه وصفته وظاهره وسدره وبطنه واخنيكه سود . جناحه الى الجوارق السمراء يعلوها موج ازرق وانخضر . صدقة حية غرلوية . زفده وصفاه حجر . مقاراه السس || اصغاته ضفاف نهر الامازون اخصها الصفاف الثالية . يعيش زمرأ واسرابا يراوح عدد افرادها من ٣٠ الى ٢٠٠ واكثر قوته البار والبلور والحشرات والديدان . يث في الخوص للفسوي الشكل يلفه بالحشايش الناعمة ويوطوه بجمار القش والطين . اثناء تقص من ١٢ بوصة تحضنها نحو ٣ اسابيع || يبين بطنه عناء واذا عاش مع البط والأوز والدجاج والحيش حافظ عليها كالخارص الايمن .



يَسْمِيَّت



يَسْمِيَّت لَبِيَّ



يَغْرُوس



يَغْس



يَغْسُوب

## ٣١٠٧١ - يَعْشِيل صَيْبِي

*Stachyurus chinensis* (S). *Stachyura de Chine* (F).  
نوع من اليصيل، جنبة تزيينية تملو نحو أربعة أمتار،  
ساقها متحركة الإفناد المنبسطة، أوراتها أحليجية، ذلفة  
إزاهم الأخير، تطلو نحو ٢٥ سم، تصالها حيلة الخصار  
المالين، مسنة الحار. أزهارها سنبل التجميع. أزهارها  
بيضاء اللون، صغيرة القد || تنويرها يستمر من أيار  
إلى تموز.

## ٣١٠٧٢ - يَعْشِيلِيَات

*Stachyuraceae* (S). *Stachyuracées* (F). *Stachyuraceae* (E).  
فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة مستقلة الفملات  
اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد مهنها بعض مناطق  
الشرق الاقصى والجزر. جميع انواعها شجيرات وجنبات  
معظمها بري وبعضها زراعي تزييني || أشهر اجناسها  
اليصيل.

## ٣١٠٧٣ - يَعْصُومُ التَّجِيلِيَّات

*Isosoma graminicola* (S). *Isosoma des graminées* (F).  
حشرة خاضعة من فصيلة السويليات وربة ششائيات  
الاجنسة المخصورة، موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة  
الحارة والمنسفرة نحو الحارة || جسمها صغير القد يطول  
نحو ٣ سم. رأسها مستعرض. جوشنها مستطيل. يطنها  
ضامر وقصير. زريقونها الأخيرة محزائية الشكل. مرزها  
مدبب وقصير || تتطفل على التجليات ونها القمح  
تفذيها.

## ٣١٠٧٤ - يَعْصِفِيد \* يَعْصِفِض

*Leontodon* (S). *Leontodon, Dent de lion* (F). *Hawke, Lion's tooth* (E). *Löwenzahn, Kuhlblume* (D). *Tarassaco, Dente di leone* (I).  
نبات عشبي بري معمر من فصيلة المركبات. أوراتها  
كبيرة مفرسة زهرها المائشة وتسن عليها. أزهار رؤسية،  
صغيرة القد، كثيفة التجميع، لونها إلى الصفار الكبريتي.  
صنارة لوزجة، مرة، العلم، طيبة.

## ٣١٠٧٥ - يَعْغُور

*Hera* (F). *Young deer* (E).  
صغير الايل لا يزال يتج أمه.

## ٣١٠٧٦ - يَعْغُورِب

هو الحجل الرومي، اعليه.

## ٣١٠٧٧ - يَعْغُورِيَّة

*Jacobaea* (S). *Jacobaea, Herba de St Jacques* (F). *Jacoby* (E). *Jacobablume* (I). *Glabocaea* (I).  
نوع من الشرونة من فصيلة المركبات، وهو نبات عشبي  
بري معمر يبدل في معظم المناطق المعتدلة من العالم القديم.  
ساقه تملو نحو ٧٠ سم. أوراتها حاضنة متناوبة، تصالها  
مفروض الصفحة المستطيلة. أزهار رؤسية صفراء اللون.  
يقال انه من النباتات النافعة. صنارته تمل الجرح.  
ونهم من قال انه يغيد القرصة.

## ٣١٠٧٨ - يَعْصَلِيَّة

*Pragmatisme* (F). *Pragmatism* (E).

البيعية مذهب فلسفي محوره معرفة الحقيقة من قدر  
نتائجها العملية.

## ٣١٠٧٩ - يَعْصُور

الجدى والصنبر من الفان. ج يماير.

## ٣١٠٨٠ - يَعْصِيْمَا

*Rhubarbe groseille* (F).  
هو الرابند الربامي، اعليه.

## ٣١٠٨١ - يَعْصُوس \*

*Callichromis* (S). *Callichrome* (F). *Callichromis* (E).

جنس حشرات من عذبات الاجنسة طوال القرون وفصيلة  
الزعنفيات. انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع  
اصقاع البلاد الحارة. جميعها نائلة ودامتة تعيش على  
المواد العضوية والنباتية المنحلة || تتميز باستطالة الاجسام  
والقرون الاستشعارية والقوائم الخلفية. اجسامها معتدلة  
التبطين تطلو من ٢٥ الى ٤٥ سم. كراسلها مكورة  
مخصورة. عيونها بارزة. اغذيتها بحزة لاحفة. ألوانها  
عديدة الالوان السوية، يكثر فيها الاخضر الاسمع  
والكسني الافتح المواج.

## ٣١٠٨٢ - يَغْرَكة

*Coleonema* (S). *Coléonème* (F). *Coleonema* (E).

جنس نباتات جنبة معمرة من فصيلة السذابيات. منها  
بعض مناطق افريقية الجنوبية والشرقية. سوطها ترتفع  
٣٠ الى ١٠٠ سم. أوراتها ابيدة متناوبة خيفة الصال  
المسنة الاطراف الجلادة. اغذائها حامية للفصل والنباتات،  
عشارية الاحدية، خنلفة الالوان والتجميع || انواعها  
المعروفة قليلة العدد، أشهرها التالية:

## ٣١٠٨٣ - يَغْرَكة بَيْشَاء

*Coleonema album* (S). *Coléonème blanc* (F).

نوع من البقرة التزيينية. ساقها تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم.  
أوراتها تطول نحو ١ سم. وتعرض نحو ١ سم. أزهارها  
بيضاء اللون، فردية التجميع، طرفية الارتكاز، مهدبة  
الترنج والقنايات، مقطوعة البتلات || تنويرها يستمر  
طوال فصل الربيع والصيف.

## ٣١٠٨٤ - يَغْرَكة قَاحِرَة

*Coleonema pulchrum* (S). *Coléonème superbe* (F).

نوع من البقرة التزيينية. ساقها فراء تملو نحو ١٠٠ سم.  
أوراتها سنائية النصل تطلو من ٢ الى ٥ سم. عصفها  
مدببة شاذكة. أزهارها ثلاثية أو رباعية التجميع، طرفية  
الارتكاز، حراء اللون، خاضعة العرف السطري || تنويرها  
يستمر طوال فصل الخريف.

## ٣١٠٨٥ - يَغْرُوب \*

*Hygrobia* (S). *Hygrobie* (F). *Hygrobia* (E).

جنس حشرات مائية مقترنة من فصيلة البغروبيات وربة  
عذبات الاجنسة. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في  
بعض مناطق العالمين القديم واليهدي || اجسامها صغيرة  
شبه يفسية الشكل، تطلو من ٨ الى ١٠ سم. رؤوسها  
قربها الاستشعارية غليظة. ناكشورها وكوكورها ولباسها  
معطوفة القد. كراسلها مستعرة، قليلة الطول. اغذائها  
عديدة، لاحفة. قوائمها شديدة النشط. ألوانها وسيدة  
اللون. تكثر فيها البصرة الحديثة المواج || تألف المنافع  
والاواخر والمياه الراكة. تعيش على النباتات المائية وفي  
الاسمال. قوتها كل ما تستطيع قمه من دوبيات.

## ٣١٠٨٦ - يَغْرُوبِيَّات \*

*Hygrobiidae* (S). *Hygrobiidés* (F). *Hygrobiidae* (E).

فصيلة حشرات مائية من عذبات الاجنسة. اجناسها



يصوم التجليات



يعفيد



يعغوبة



بعروس



بغروب

## ٣١٠٩٣ - يَكْن

اليكن: هو العجل اذا اربع. ج. يكن.

## ٣١٠٩٤ - يَكْنَة

هي البقرة الحامل لأول مرة. ج. يكنات.

## ٣١٠٩٥ - يَكْظَا ٥

Screpere

Scréphre, Réveilleur (F).

جنس طير من الجرامين وفصيلة الفراشيات. انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بعض مناطق استراليا. تألف الغابات وصفات الانهر. ملجئها الحيائي جماعي. افواجاها تمد من ٣٠ الى ٨٠ زوجاً. قوتها الثمار والبلور والخشرات والوديات || تتميز بكثرة تعبيها المزيج الذي تردده عند الصبح الباكر || اجسامها شبيهة باجسام الشققة او غراب الزرع. مناقيدها مخروطية جالسة. اجنحتها لافحة. اذناها شبه مخروطية. انواها الى السواد الاسمر وبعضها الى السواد الازرق المالح. اقفاها واجنحتها مبطنة ومطوية بالابيض || تدنق في الاخشاب الباسقة. اناثها تضع من ٦ الى ٧ بيضات تحضنها بمفردها بينا الذكور توكن لها الغذاء.

## ٣١٠٩٦ - يَكْصُوم ٥

Solva (S). Solva (F). Solva (E). جنس حشرات من فصيلة القيصويات ورتبة ذوات الجناحين انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٥ الى ٨ م. رؤوسها شبه مزوانية الشكل و مستقلة. حيوتها كبيرة، فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية قصيرة، ثلاثية الفصل. تأثيرها صغيرة. ملاسها ثنائية العقل. كراسلها ضيقة. بطونها مستطيلة، صغيرة المراتز الخلفية شديدة رواشتها تبتية الغضاب. افخاذ قوائمها الخلفية شديدة الضخامة || تألف الحراج والغابات. قوتها طلع الازهار وصحيفها. يرقاتها وأجعة تفرس ما تستطيع من دويبات.

## ٣١٠٩٧ - يَكْصُومِيَّات ٥

Solvidae (S). Solvidés (F). Solvidae (E). فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم. تألف الغابات والحراج || اجسامها متفاوتة القد، تطول من ٥ الى ١٢ م. رؤوسها مزوانية. حيوتها فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية ثلاثية الفصل. تأثيرها صغيرة. ملاسها ثنائية العقل. كراسلها شبه اسطوانية. بطونها مستطيلة. رواشتها شائعة عند معظم الاجناس. افخاذ قوائمها الخلفية مستضخمة || يرقاتها وأجعة. شبه دودية الشكل || اشهر اجناسها اليقصوم.

## ٣١٠٩٨ - يَكْطِين ٥

هو القرقع، اطليه.

## ٣١٠٩٩ - يَقْطِين اقْرَع \* ، قَاوُون المير

Cucumis melopepo (S). Pétisson, Mélépépon, Bonnet d'électeur (F). Squash (E). Melonen-Kürbiss (D). Melopopeo (I).

نوع من القرقع وهو نبات عشبي حولي زراعي شائع الاستعمال. ساقه مدادة لا قياسية الطول والارتفاع والتساقط ثماره متوسطة قلسوبة الشكل مستديرة اخضر اللون للقرص. لياها جامد المكسر، متوسط الحلاوة، جيد الصنت يطبخ ويربب || زراعته لا تستوجب عناية خاصة.

وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المالح القديم والجديد || اجسامها صغيرة، شبه يفسية الشكل، تطول من ٦ الى ١٥ م. رؤوسها مستقلة، مستقلة. حيوها ناشرة. قرونها الاستشعارية عيطية، مركبة من ١١ فصلة. كراسلها مستديرة، قليلة الطول. اغمادها لافحة. قوائمها شديدة التلطف || جميعها مفترسة وداسة تمشي في اسيال المياه الزاكرة || اشهر اجناسها اليغروب.

## ٣١٠٩٧ - يَقَاع ٥

هو القحمة، اطليا.

## ٣١٠٨٨ - يَفْرُود ٥

Aphrodes (S). Aphrode (F). جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة الورديات. انواعه عديدة، اصغرها العالم ومرتعا اشباب المراعي. اجسامها يفسية الشكل تطول من ٣ الى ٤ م. رؤوسها مثثة ازوايا. انواها ملونة يكثر فيها التلطيح المتفرس. اضرارها زديدة لا تستوجب المتكاملة.

## ٣١٠٨٩ - يَفْرُود الرِيَّاس ٥

Aphrodes histronicus (S). Aphrode comédien (F). حشرة من فصيلة الورديات ورتبة متجانسات الاجنحة. جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م. رأسها كبير الجرم، لونه الى اخضر الالاس تملو زفرقة يضاء. عظمها معتدل الطول. عيناها كبيرتان. زباناها قصيران. كرونها مستطيل الشكل، ابيض اللون، اخضر الخثار الذي يتناسخ الحبيبة. حبيبتها حمراء بنية مجمعة بالاسود. ظهراها كاسل الخنجية، لافح، ابيض اللون، بني التلطيح والتدبيح. وشتاها غشائيا شفافان. يغطيا اسم. قوائمها كثيفة الملبب الشالك || تألف الرِيَّاس والمروج. قوتها التسع.

## ٣١٠٩٠ - يَقْعَة ٥

Raphiolepis (S). Raphiolepide (F). Raphiolepis (E). جنس شجيرات برية وزراعية ثريبتية من فصيلة الورديات. مهدا يمتد من الشرق الاقصى الى اليابان. سوقها فروع، مبهرة الالفان، تملو من متر الى ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة، اهليجية الشكل او سنانية. نصلها جامدة، حيلة الخضار الدايق. ازهارها عطرة العرف، وعتودية التجميع او حشوكية، مختلفة الالوان. ثمارها حنينة سوداء اللون || انواعها المعروفة قليلة، اشهرها التالية.

## ٣١٠٩١ - يَقْعَة البَحْثَل ٥

Raphiolepis indica (S). Raphiolepide du Bengale (F). نوع من اليتمة اليربانية. ساقها تملو من مترين الى ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة، اهليجية، مستديرة القاعدة والطرف. نصلها جميل الخضار اللامع. ازهارها يضاء اللون بعلها متشعب ودي واجر. اسديها بنية اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران.

## ٣١٠٩٢ - يَقْعَة عَيْمِيَّة ٥

Raphiolepis umbellata (S). Raphiolepide à ombelles (F). نوع من اليتمة اليربانية. ساقها تملو من متر الى ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة، يفسية متمكة تطول نحو ٩ سم. وتعرض نحو ٥ سم. نصلها جلدية التسنج، مستديرة الاطراف تلبو كجسومة من الخيام. ازهارها يضاء اللون عطرة العرف، صغيرة القد، ظفورها من ١٥ الى ٢٠ م. || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران.



يفرود



يَقْط



يقطين اقرق

ايطي الارنكاز او طرقي. ازهارها قرنبزة اللون، قطرها نحو ٢٥ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف.

٣١١٠٨ - **يُكْرَمَةُ**  
lochroma (S). lochrome (F). lochrome (E).

جنس جنبات معمرة من فصيلة الباذنجانيات. مهدا ينض مناطق امريكية الجنوبية. سوقها تعلق من متر الى ثلاثة امتار. اوراقها كاملة، معتقة، متعاطية. ازهارها زرقاء اللون او حراء. || تزروع لآثريين في الحدائق وهي من النباتات السبروتية التي تجود في جميع الاطربة || انواعها المعروفة عديدة، اشهرها التالية.



يقطينة

٣١١٠٩ - **يُكْرَمَةُ اَنْبُوبِيَّة**

lochroma tubulosum (S). lochrome tubuleux (F).

نوع من البكرورة. منبتها كولومبيا. ساقها تعلق من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها اعليجية مستطيلة. نصالها خلية البشرة. ازهارها عتيق التجميع، محوري الارنكاز. ازهارها مستطيلة المالحق، متدلية، لونها الى الزرقوة الجلدية. توريحاتها انبوبية الشكل تعلق من ٣ الى ٤ سم. || تنويرها يستمر طوال شهر آب.

٣١١١٠ - **يُكْرَمَةُ سَنَانِيَّة**

lochroma lanceolatum (S). lochrome lancéolé (F).

نوع من البكرورة. منبتها بلاد الشيل. ساقها ترتفع من ١٢٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها سنانية الشكل تعلق من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ سم. نصالها كثيفة الخمل الاخضر اللون. ازهارها شبه صيواني الشكل، محوري الارنكاز. ازهارها بنفسجية اللون، توريحاتها تعلق نحو ٥ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف.

٣١١١١ - **يُكْرَمَةُ قِرمُزِيَّة**

lochroma coccineum (S). lochrome écarlate (F).

نوع من البكرورة. منبتها بعض مناطق امريكية الوسطى. ساقها مزينة العماء تعلق من متر الى مترين. اوراقها سنانية الشكل مستطيلة الطرف. نصالها خلية الصفحات السفلى. ازهارها شبه صيواني التجميع، محوري الارنكاز. ازهارها قرنبزة اللون متوسطة القد، قصبية المالحق. توريحاتها تعلق نحو ٥ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف.

٣١١١٢ - **يُكْرَمَةُ كَبِيرَةُ الزَهَر**

lochroma grandiflorum (S).

lochrome à grandes fleurs (F).

نوع من البكرورة. منبتها جبال البيرو. ساقها تعلق من مترين الى ثلاثة امتار. اوراقها اعليجية الشكل تعلق من ١٥ الى ١٧ سم. وتعرض من ٧ الى ٩ سم. نصالها عادية الخمل على الصفحات العليا، مزينة الصفحات السفلى. ازهارها كبيرة القد، لونها الى الزرقوة السايجمية. توريحاتها تعلق من ٥ الى ٦ سم. || تنويرها يستمر من الصيف الى الخريف.



بكرورة

٣١١١٣ - **يُكْمُورِي**

Camphorifère (F).

Camphoriferous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل ما يشع الكافور.

٣١١٠٠ - **يُقَطِيطِيَّة**

Citrouille, Courge (F).

Pumpkin, Gourd (E).

هي القرعة ثمرة القرع او اليقطين. اشكالها واحجامها عديدة شائعة. اوراقها متفارقة تراوح من كيلو واحد الى ٥٠ كيلو. لبها لذائي يطبخ ويربب، متوسط ما يحويه من مواد:

ماء	٩٥,٩٠ %
مواد ازوتية	٠,٢٨ %
مواد دهنية	٠,٢٥ %
مواد استخلاصية	٣,٨٧ %

٣١١٠١ - **يُقَطِيطِيَّات** هي القرعيات، فصيلة لبياتية.

٣١١٠٢ - **يُقَتِي**

اليق: جبار التخل. القلمة منه يققة.

٣١١٠٣ - **يُكَاسَة**

Sphaerolceae (S).

Sphérallée (F). Sphaerolceae (E).

جنس نباتات جنبية او عشبية من فصيلة الخايزيات. مهدا بعض اصناف امريكية الجنوبية، اقلها اقليم البرتقال. سوقها فروع تعلق من ٥٠ الى ٣٠٠ سم. شكلها شكل الخبازة. اوراقها مهدبة النصال، حراء اللون او بنفسجية || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.

٣١١٠٤ - **يُكَاسَة حَمْرَاء**

Sphaerolceae minata (S).

Sphérallée rouge (F).

نوع من اليكاسة. جنبية تزينية معمرة مهدا بلاد الابجيتين. ساقها فروع تعلق نحو ١٠٠ سم. اوراقها ثلاثية الفلق النشارية المختار. نصالها خلية البشرة، بحرية المخاض. ازهارها فردية حراء اللون زنجفيرة الموحج || تنويرها يستمر من تموز الى تشرين الثاني.

٣١١٠٥ - **يُكَاسَة صِيَوَانِيَّة**

Sphaerolceae umbellata (S).

Sphérallée en ombelle (F).

نوع من اليكاسة. جنبية تزينية معمرة مهدا المكسيك. ساقها ودية تعلق نحو ثلاثة امتار. اوراقها خماسية او سباعية الفلق البامدة التنتين. نصالها بحرية المخاض. ازهارها صيواني التجميع، محوري الارنكاز. ازهارها بنفسجية اللون، كبيرة القد، قطرها نحو ٦ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الخريف والشتاء.

٣١١٠٦ - **يُكَاسَة قَبَقِيَّةِ الْوَرَق**

Sphaerolceae acerifolia (S).

Sphérallée à feuilles d'érable (F).

نوع من اليكاسة. جنبية تزينية معمرة مهدا بعض مناطق كاليفورنيا. ساقها فروع تعلق نحو ١٠٠ سم. اوراقها ثلاثية او خماسية الفلق، قريبة الشبه بوق القيقب. ازهارها فردية ليكية اللون او بفساء، قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف والخريف.

٣١١٠٧ - **يُكَاسَة مُمُور**

Sphaerolceae Munroana (S). Sphérallée de Munro (F).

نوع من اليكاسة. شبة تزينية سبروتية مهدا بلاد كولومبيا. ساقها فروع تعلق من ٥٠ الى ٦٠ سم. اوراقها ثلاثية الفلق المستنة الاطراف. ازهارها عنقودي التجميع،

Ullucus tuberosus (S).

Ulluco, Ulluque (F).

نبات عشبي حولي وحيد الجنس والنوع من فصيلة السرمقيات. اصطناعه البلاد الأمريكية يكثر في الأند وبوليفيا والبيرو وفرانكو الجديدة. جذره صفوي. ساقه عشية جمار اللون. أوراقه متعاقبة متعقبة ، لصلها قلبى الشكل غليظ الصفحة. أزهاره صغيرة القند عقدية التصميم بحورية الارتكاز. عسلها تستعمل أشتال البطاطا فى اجاصية الشكل، جوزية الحجم، وردية الفشور، صفراء اللون. يتكاثر بالبزور وبالصلصال.

Columba intermedia (S).

Biset, Bizet, Petit ramier (F). Rock-dove, Stock-dove (E). Hohltaube (D).

نوع من الحمام البري الخفيف الطيران. يقال ان الحمام الناجن تحدد منه ومن الحيدوان، طوله نحو ٣٠ سم. فويه الى البرادى الحيطى. اجنته غطلة بالاصد، ولونها يبيض. وأسه شديد السمرة عابق الموج. صدره جزوى. مقاربه جالس دقيق. افنته احمر الانتشاب، حطلى الطرف. موطنه فسج الارياض يعم الشرق واروية وافريقية. يالفت المناطق البرية القليلة الانجار. يعيش أسراباً صغيرة يراوح عدد أفرادها من ٨ الى ٣٠. قوته الحبوب والبزور. يلدن عشه في تجاريف الاشجار وأوقاب الصنوبر. اناته تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في السنة. حضنتها ييشتان.

Phascolomys (S).

Phascolome, Wombat (F). Wombat (E).

جنس حيوانات لبونة جاسنة من فصيلة السبابيات اى الجرذان الجرابية. أنفها المعروفة ثلاثة موطنها أستراليا والجزر المجاورة. اجسامها ربة، قصيرة القوائم والذنب، تطول من ٦٥ الى ٧٥ سم. رؤوسها شبه مخروطية الشكل، قصيرة الاطعام المقطوعة. حيوتها صغيرة. اذانتها قصيرة متصبية. اوبارها ناعمة. أنثواها تراوح من الصغرة الى السمرة السوداء. اخافيرها قوية تمككها من حفر التربة. الاتى تحمل رضيعها في جراب رجب الحب مركزه في مؤخر البطن. تسرح في الليل وتبيت في النهار داخل انفاق تحفرها في التربة. قوتها الاعشاب البرية والجنود. اما الانواع الثلاثة فهي :

Phascolomys ursinus (S).

Wombat ourson (F).

Phascolomys latifrons (S).

Wombat à front large (F).

Phascolomys vulgaris (S).

Wombat commun (F).

Phascolomyidés (F).

فصيلة حيوانات لبونة جاسنة قضمى جرذان جرابية ، اعطيا .

Abeille mâle (F).

Drone (E).

اليسخور او الرعل الذكر من النسل. وهو كالح الشوار الشقي، عادم الشفام اللاسع، أطول قدماً من النحلة البالغة وأغلظ جسماً منها. يحكم الملكية، اى الانثى الكاملة الاعضاء التناسلية والمعروفة ايضاً بالاجمل، مرة واحدة في حياتها وذلك قبل ان تباشر متع المازن، ثم يموت على أثرها. ج يساخير ورسائل.

Ortalis (S).

Ortalide (F). Ortalis (E).

يكون هو الاسم البرازيلى ، جنس طير من رتبة الدجاجيات وفصيلة الترانسات. انواعه المعروفة نحو ٢٥ منتشرة في معظم مناطق امريكا الاستوائية. تألف الغابات والاحراج الظليلة القريبة من الماء. ملجأها الحياتى جامع. باعائها لامتسارية البدن الذي يراوح من عشرة أزواج الى مئة زوج وأكثر. قوتها التار والحبوب والبلور والخشرات المختلفة الفصائل والافراخ. اجسامها مستطيلة رفيقة. رؤوسها صغيرة. مناقيدها كبيرة، جالسة، مدبة الملاط. اعناقها مستطيلة. اجنتها مستديرة. اذياها كبيرة مزروانية الاطراف. أنثاها تختلف مع الانواع، ويكثر فيها الخضار الزيتي والشفهة والشفقة. انثاها أصغر قدماً من ذكورها وتحتل بنفس الاقواب. قدتن اعشاشها في الاجمار الرقيقة. انثاها تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في الحول. الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع. الذكور تزين الحامية بالغذاء. تعتبر من الطرائد المزيعة. لحومها فاخرة الصنف، مرغوب فيها. أشهر انواعها واعرفها:

Ortalis ruficeps (S).

Ortalis motmot (S).

Ortalis veluta (S).

Lantzia (S).

Lantzie (F). Lantzia (E).

جنس حيوانات متعينة من الرخويات منويات الارجل وفصيلة اللينيات. انواعه المعروفة قليلة البدن اعطائها بعض جزر المحيط الهادى. تعيش في المناطق قوتها المواد النباتية والاعشاب. اصداها صغيرة القند، محلولة، قصيرة القلب الاشد. رؤوسها ريفية مقطوعة. لواسها مبطلة سبانية الشكل، اربطها وحيدة مستعرضة.

Fallenia (S).

Fallénie (F). Fallénie (E).

جنس حشرات من فصيلة الفرصيمات ورتبة ذوات الجناحين انواعها المعروفة خمسة اصطناعها بعض المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة. اجسامها ضخمة، شبه ييفية الشكل، كثيفة الخمل، تطول من ٩ الى ١٦ م. رؤوسها مستعرضة، قليلة الفشور، حيوتها كبيرة، فارة عند الشقين. قروتها الاستشارية صغيرة، ثلاثية الفصل. ملابسها نحيلة. اعطائها صغيرة. كواسلها محدودة. بطونها مستعرضة، شبه مقنطرة المؤخر. ورائتها شبه شفافة، شفاها غضاب تبنى باحت. قوائمها متعددة الطول. جيمها واخمة تألف الغابات والمروج حيث تكثر الازهار. يرقاتها خاضلة ودائمة وبعضها نائل.

Unone odorant (F).

٣١١١٧ - يلائح هو الينون، اعطيه.

٣١١١٨ - يلكة

اليلقة: البهية البيضاء من عزز أو بقرة. ح يلق.

Bois d'Aloès (F).

٣١١١٩ - يلسجوج هو عود الد، اعطيه.



يكون



يلوكو



ييام



يياط

Source (F), Spring (E).

## ٣١١٣٣ - يَنْبُوت

هو الماء الذي ينبع من الأرض، والنباتات حبيطة الاشكال تختلف باختلاف مصادرها وأصولها. منها المنجربة والمنقطعة والمستمرة والوقتية والارثوآية، الخ.

Fontinal (F).

## ٣١١٣٤ - يَنْبُوتِي

نمت تعريفي يطلق على ما يعيش في الينابيع أو على ما تحويه مياهها من املاح ومواد معدنية.

## ٣١١٣٥ - يَنْبُوتِي

جنس طير من فصيلة الشقاييات، انواعه قليلة جميعا كبيرة الجثة تقدرها قدر الحليشة، رأسها قنبري الريش المستطيل، مناقرها صغير وضعيف، اجنتها هريضة مستديرة، ذنبها متوسط الطول، اسافلها قوية، اثنائها الى الزرقة الزرقاء، اجنتها الى الزرقة الداكنة تعلطط متعرج في الياض والاريد والاصود، ريش عنقا وبشرتها ابيض الانتشاب اسود الجسم، تألف السهل المنخفضة الكثيرة الادغال، القليلة الشجر، تموش ذكرًا وأنثى كالحمام، اسرارها متوسطة المدد يراوح عديدها من ١٢ الى ٢٥ زوجًا، قوتها الحبوب والحشرات من نصفيات الاجنحة وتستقيها، اناثها لا تحضن البيض بل تضعه في محضن من الرمل والورق تحضره على شكل كرة صغيرة قطرها يراوح من ٤٠٠ الى ٥٠٠ سم، وعولها من ١٠٠ الى ١٥٠ سم، تصرف بيضها في التلة على عمق ٣ او ٤ سم، صغرها متتابعة ابتداء من الاسفل، وهي تبقي في موضعها الحولي الذي يستمر نحو خمسة اشهر من ١٠ الى ١٢ بيضة بعدد بيضة واحدة كل ١٣ يومًا، أما البيضة فتختلف بعد وضعها ياسبوعين من فرخ تشيط كاسي الريش يدر امر نفسه بدون عناية.

## ٣١١٣٦ - يَنْبُوتِي

Onychiurus, Lipura (S).  
Onychiure, Lipure (F).  
جنس حشرات دامتة من فصيلة النخوريات، انواعه المروفة متوسطة المدد، منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة، اجسامها صغيرة، مستطيلة الشكل، مبدئة الحلق، تطول من ٢ الى ٣ م، اثنائها تراوح من الرمكة السمراء الى البياض الاغبر المواجه، رؤوسها مقلطة منتشرة الى الاسفل، عيونها طامسة، بطونها مقلطة خضية المزخر، قوتهاها قصيرة، ارسافها ثنائية الانظار الدرية الاستساوية، مبدولة في المواقع الرطبة وتحت الحجارة وفي الجلالة.

## ٣١١٣٧ - يَنْبُوتِيَات

Onychiuridae, Lipuridae (S).  
Onychiuridés, Lipuridés (F).  
فصيلة حشرات دامتة من رتبة الكهكليات، اجنتها وانواعها المروفة قليلة المدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة، اجسامها صغيرة، مبدئة الحلق، تطول من ٢ الى ٤ م، رؤوسها مقلطة، مائلة، عيونها طامسة، صدرها ثلاثية الخلفات الاستساوية، اصفرها الكحول، بطونها سداسية السكم، قوتهاها قصيرة، ارسافها ثنائية الانظار الدرية الاستساوية القله، أشهر اجنتها النخور.

## ٣١١٣٨ - يَنْبُوتِي

Triton (S).  
Triton (F), Trumpet-shell (E).  
جنس دويبات بحرية من الرخويات وفصيلة الينوسويات.

Hymenanthra (S).

## ٣١١٣٥ - يَنْبُوتِي

Hymenanthra (F), Hymenanthra (E).

جنية معمرة برية وزراعية تزيينية من فصيلة البنسجيات، شكلها قريب الشبه بالمرج، ساقها تملو نحو ١٠٠ سم، اثنائها مقلبة السكاء، اوراقها صغيرة متعالية جلدية الاتصال الخروطية الشكل تطول من ٣ الى ٤ م، ازهارها محورية الارتكاز، قصيرة المالحق، خاسية التركيب، يفضاه اللون، يملوها مواج اصفر، ثمارها جنية يصم الحمص، لونها الى البنسجي الموشح بالابيض، تنويرها ديبجي.

## ٣١١٣٦ - يَنْبُوتِي

Ormosis (S), Ormosie (F).  
جنس اشجار حرجية من فصيلة القرنيات القراضية، انواعها المروفة نحو ٢٠ منها بعض المناطق الحارة والاستوائية من القارة الاسيوية وامريكا الجنوبية، ساقها منتصبة، فروعها فروصه شبه افقية الانتشاب، اوراقها مركبة، دريشية، ازهارها عنقودي التجميع، ازهارها كبيرة، جيلة اللولان المتراكمة، مستحبة اللون الخافت.

## ٣١١٣٧ - يَنْبُوتِي

Anadrome (F).  
Anadromous (E).  
نمت تعريفي يطلق على الاسماك التي تترك البحر الى التبر في زمن التسرة.

## ٣١١٣٨ - يَنْبُوتِي

Anadromie (F).  
Anadromy (E).  
الينبوتية فريضة الاسماك التي تهجر انياه البحرية الى البرية المبدية في زمن التسرة.

## ٣١١٣٩ - يَنْبُوتِي

Pélagique (F).  
Pelagic (E).  
نمت تعريفي يوصف به كل ما له علاقة مباشرة بالبحر كقولك العظم البحرية والنبوت البحرية.

## ٣١١٤٠ - يَنْبُوتِي

Pélagisme (F), Deep-sea life (E).  
الينبوتية حياة الكائنات المضاهية في غضم الم.

## ٣١١٤١ - يَنْبُوتِي، أَنْبُوتِي

Anagris (S).  
Anagry (F).  
جنس نباتات برية جنية ونجمية من فصيلة القرنيات القراضية، انواعها قليلة منها شواطي البحر المتوسط والبلاد العربية ويبرز كناريه، الواحدة بنبتة، أشهر انواعها الينبوت اللين.

## ٣١١٤٢ - يَنْبُوتِي لَين \*، أَنْبُوتِي عَليبي

شجيرة الخشخشة، جرد  
Anagris foetida (S), Anagris foetida, Bole puant, Pudas (F), Bean-clover, Stinking wood (E), Stinkbaum, Stinkholz (D), Anagride foetida, Fascolaria, Laburno foetida (I).

نوع من الينبوت وهو جنية برية طيبة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم، اوراقها مركبة عابلة، وديقاتها ثلاثية التجميع، فصلها سناني الصفحة، خلل البشرة، يطول نحو ٨ سم ويعرض نحو ٢، ازهارها عنقودي الترتيب، ازهارها كبيرة القند صفراء اللون، سفاتها عنقودية تطول من ١٢ الى ١٥ سم، وتعرض نحو ٢ سم، رؤوسها نصفية اللون جسمية المادة، القليل من نقيج ازهارها واوراقها ينشط الاصلاح والياه، والكثير منه مقبي.



ينبوت لَين



ينبوت



اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداها ببقية الشكل ، حلزونية ، ذرابة الاطراف ، جميلة الاذن المرقشة والمجعدة || اشهر اجناسها اليسوع وأفروعة .

### ٣١١٤٦ - يَنْطُوبَة شَهْبَاء \*

*Achroia grisella* (S).

*Petite teigne des ruches* (F).

وتدعى أيضاً منطوبة شهباء || فراشة من فصيلة الذناريات ودية حرشفات الاجنحة . طولها يراوح من ١٨ الى ٢٠ سم . ووشاشا الاماميان وجوشنها الى الصهباء الشهباء الخالية من التنشيش والتجسيم . ووشاشا الخلفيان وربطها الى الثغرة الخنطية المواجه || الاثنى اكبر قدماً من الذكر || البرقة حاجية اللون ، سمراء الرأس ، تعيش في غلايا النحل من ايار الى تشرين وتقلد ما يفعلها صمل النحل من اذى واضرار || وهي من الحشرات الناحية المؤذية لانها تدخل المنازل لتفرض الغرام والجوارد والقرمحاسية والقلائد ...

٣١١٤٧ - يَنْشَع ، يَنْشَع (F). *Maturité* (F).

هو بلوغ الثمرة كاملاً الجسدي وقد يتم هذا الدور من حياتها بعد الادراك وقبل النضج .

### ٣١١٤٨ - يَنْشَع

ضرب من المقيق ، حرته جوية المواجه يملوها توشيع اصفر .

٣١١٤٩ - يَنْشَع *Telopea* (S). *Télopée* (F).

جنبة برية ودينية معمرة من فصيلة القضييات ، ساقها قرعاء تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها معتقة ، نصلها اهلبيجي الشكل ، غروجلي الزام الاخير ، يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ويمرض من ٣ الى ٦ سم . ازهارها عقودية التجسيم ، طرفي الارتكاز . ازهارها اجروانية اللون ، كبيرة اللقد ، ثنائية الترتيب || تنورها يستمر من نيسان الى حزيران .

٣١١٥٠ - يَنْشَك هو السنت الصفي ، اطبله .

٣١١٥١ - يَنْشَمَة *Podanthum* (S). *Podanthe* (F).

جنس نباتات عشبية عولة او معمرة من فصيلة الجريسيات . انواعها المعروفة عديدة ، معظمها من نباتات حوض البحر المتوسط . ساقها خشبية يكثر فيها التضييع . جلودها حزازية الشكل او لفتية . اوراقها مستطيلة النصل لا قياسية . ازهارها عقودية التجسيم او سلبية ، قاجية الارتكاز و جريسية الشكل ، زرقاء اللون || اشرف انواعها واشهرها ما يتبع .

### ٣١١٥٢ - يَنْشَمَة بَيْشَاء

*Podanthum canescens* (S). *Podanthe blanchâtre* (F).

نوع من البينة المسمرة ، ساقها دقيقة خلية البشرة تملو من ٦٥ الى ١٠٠ سم . اوراقها لاطئة ، بيضبة الشكل ، سنائية الزام الاخير . نصلها غلي البشرة حل صفحته السفلي . ازهارها عقودية التجسيم ، بيضاء اللون . تنورها يستمر من حزيران الى آب .

### ٣١١٥٣ - يَنْشَمَة جَبَارَة

*Podanthum giganteum* (S). *Podanthe géant* (F).

نوع من البينة المحولة . مهدا جزر اليونان . ساقها مسطحة قليلة الفروع تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . جلودها وتدي الشكل . اوراقها معتقة سنائية النصل جامدة الصفعة المسنة الحتار . ازهارها سبلي التجسيم ، هامي الارتكاز .

انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداها ببقية حلزونية وتطول من ٨ الى ٥٠ سم . الوانها جميلة مرقوشة ومجعدة || اشرف انواعها واشهرها اليسوع اليسوعي .

٣١١٣٩ - يَنْشُوع *Tritonia* (S). *Tritonie* (F).

جنس نباتات درفصية عشبية من فصيلة السوسنيات . انواعها عديدة برية وزراعية ودينية . ساقها شراعية تنشيش بالانزهار اللاتياهي التجسيم . اوراقها صفة سيفة الشكل او عريضة . ازهارها صغيرة اللقد او متوسطة ، الوانها عديدة تختلف باختلاف النوع || زراعتها لا تتطلب عناية خاصة وهو يربط في الارية للمسوية التركيب ، المعتدلة الانساج ، البنية بالمواد الاوزوية || اشهر انواعها ما يتبع .

٣١١٤٠ - يَنْشُوع زَعْفَرَانِي \* *Tritonia crocata* (S).

*Tritonie safranée* (F).

نوع من اليسوع التريبي . ضرابه الزراعية عديدة . شراخه الزهري يملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . عصفه سبي الشكل مستطيل النصل يمرض من ١٢ الى ١٥ سم . ازهاره سبلي الترتيب . ازهاره رباعية التجسيم ، ثنائية التصنيف المتقابل لونها الى الصفار الزعفراني || تنوره يستمر طوال شهر حزيران .

٣١١٤١ - يَنْشُوع عَصَصِي الزَهَر

*Tritonia scillaris* (S). *Tritonia à fleurs de scille* (F).

نوع من اليسوع التريبي . شراخه الزهري يملو نحو ٣٠ سم . صفة عيالي النصل محجن الطرف . ازهاره سبلي التجسيم . ازهاره صغيرة اللقد ، ودية اللون متراكبة البلات للملتفة الاطراف || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٣١١٤٢ - يَنْشُوع مَدَهَب *Tritonia aurea* (S).

*Tritonie dorée* (F).

نوع من اليسوع التريبي السبروني الشائع الزراعة . شراخه الزهري يملو نحو ٦٠ سم . عصفه سبي الشكل يمرض من ١٨ الى ٢٠ سم . ازهاره سبلي التجسيم . ازهاره كبيرة اللقد لطرما نحو ٦ سم . لونها الى البرتقالي الزاهي . تنوره يستمر من اواسط الصيف الى اواسط الخريف .

٣١١٤٣ - يَنْشُوع مَقُوس *Tritonia securigera* (S). *Tritonie arquée* (F).

نوع من اليسوع التريبي . شراخه الزهري يملو نحو ٤٠ سم . عصفه سبي الشكل يمرض نحو ١٦ سم . ازهاره سبلي التجسيم ، مقوس الشكل . ازهاره متوسطة اللقد تطول نحو ٣ سم . وطرها ٤ سم . لونها الى البياض الماجي . تنوره يستمر طوال شهر ايار .

٣١١٤٤ - يَنْشُوع يَنْشُوعِي \* *Tricon tritonis* (S).

اشهر انواع اليسوع . يبلغ طوله نحو ٥٠ سم . يكثر وجوده في المحيط الهندي .

٣١١٤٥ - يَنْشُوعِيَات \* *Tritonidae* (S).

*Tritonidae* (F). *Tritonidae* (E).

فصيلة دويات بحرية من الرخويات مديات الارجل امانيات الخياشيم . اجنتها وانواعها المعروفة عديدة .



يسوع زعفراني



يسوع يسوعي



ينطوية شهباء

انزاعها ضام متناهية لونها الى الزرقاء المائلة يعلوها موالج  
بنسجي . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .  
٣١١٥٤ - **بَيْتَة تَحْلِيلَة النَّاج**

*Podanthum trichocalycinum* (S). *Podanthe à calice velu* (F).

نوع من البينة للممرة، مهدا الزوان . ساقها فراء تملو  
من ٥٠ سم . جذعها لقي الشكل والمادة اوراقها  
ضفية ، نصلها لا تقاسي الشنين المتناهد . انزاعها متقودية  
الشكل ، ثلاثية الترتيب ، طرفية الارتكاز ، زرقاء اللون ،  
خلية الناج ، قصبة الاذن . تنورها يستمر من حزيران  
الى تموز .

٣١١٥٥ - **بَيْتَة عَرِيْفَة**

*Podanthum virgatum* (S). *Podanthe à tige nue* (F).

نوع من البينة المحولة الطرية في جبال لبنان . ساقها  
عريانة ، غليظة ، مضطمة الزوايا ، فراء ، تملو من ٣٥  
الى ٤٠ سم . قرعها قصيرة منتصبه . اوراقها ضفية التجميع  
مركزها في أسفل الساق وفي سنانة النصل ، جامدة الصفحة ،  
متبادعة الشنين . انزاعها بنفسجية اللون ، قصيرة الاذن ،  
فردية او ثلاثية التجميع . تنورها يستمر من ايار الى  
حزيران .

٣١١٥٦ - **بَيْتَة مَشْطَلَة**

*Podanthum pinnatum* (S). *Podanthe penné* (F).

نوع من البينة للممرة . مهدا الشرق الاذن . ساقها منتصبه  
فراء . جذعها حزاني الشكل ، مأكول المادة . اوراقها  
مشطية النصل ، ثلاثية او خاسية التضاميس الاقياضي  
التفرغض . عناقيدها الزهرية رمله التجميع . انزاعها الى  
الزرقاء الزاهية . تنورها يستمر من حزيران الى آب .

٣١١٥٧ - **بَيْتُونِيَّة ، اِنْسُوِيَّة ، دُمُوزُ**

*Inosite, Dambosé*

مادة سكرية توجد في فصلات الجسم وفي اللويا الخضر  
وفي مسار النبت وورق الجوز والبنج .

٣١١٥٨ - **بَيْتُونُ \* بَيْلَانَج**

*Canang des Molluques, Unon odorant* (F). *Ylang-ylang tree* (E). *Canangaebaum* (D). *Cananga* (I).

جنية برية وزراعية من فصيلة القشديات . ساقها منتصبه  
فراء تملو نحو ٣ امتار . اوراقها متعاقبة اهليلجية النصل .  
انزاعها جملة الشكل ، متوسطة القند ، ثابرة اللون ،  
فواحة العرف المستحب . يستخرج منها بالتقطير ادمان  
عطرية فاخرة الصنف شائعة الاستعمال . لها ساقها وفروعها  
لبني التركيب بين التيلة الناعمة الدفينة يستعمل في صناعة  
بعض الاوتار الموسيقية .

٣١١٥٩ - **بَيْتَة**

*Antholyza* (S). *Antholyse* (F).  
جنس نباتات دوصية ضفينة من فصيلة السولليات . انواعها  
عديدة ، برية وزراعية . ساقها شراعية تنجي بالانزاع  
الاقياضي الترتيب . اوراقها شرفانية الشكل . انزاعها  
قريبة الشبه من انزاع الدلبوث (٣) زراعها لا تنقلب  
عنانية خاصة لكنها تقفل الاربعة الدالية الوازنة العنصر  
الازرق (٢) امرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣١١٦٠ - **بَيْتَة اَثْرِيْبَة**

*Antholyza aethiopica* (S). *Antholyse éthiopienne* (F).

نوع من البينة التريينية . شراخها الزهري يملو من ١٠  
الى ١٢٠ سم . شرافتها مستطيلة تفرس من ٢ الى ٣ سم .

٣١١٦١ - **بَيْتَة الكَفَر**

*Antholyza caffra* (S). *Antholyse cafre* (F).

نوع من البينة التريينية . شراخها الزهري يملو من ٥٠  
الى ٦٠ سم . شرافتها مستطيلة النصل المستطيل . انزاعها  
سنبلي التجميع . انزاعها ثنائية الارتكاز تمتد من ١٢  
الى ٢٠ زوجا . لونها الى الحمرة الارضوانية (٢) تنورها  
يستمر طوال شهر حزيران .

٣١١٦٢ - **بَيْتَة عُنْكَوْلَة**

*Antholyza paniculata* (S). *Antholyse en panicule* (F).

نوع من البينة التريينية . شراخها الزهري يملو نحو  
٩٠ سم . شرافتها تطلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . وتفرس من  
٦ الى ٨ سم . نصلها لا نظامي الانقسام والتجميع . انزاعها  
عشكولي التجميع . انزاعها كبيرة القند فردية الارتكاز .  
لونها متراكب الصفرة والحمرة البنفسجية (٢) تنورها  
يستمر من حزيران الى تموز .

٣١١٦٣ - **بَيْتَة كُونُو**

*Antholyza cunonia* (S). *Antholyse de Cuno* (F).

نوع من البينة التريينية . شراخها الزهري يملو من ٤٠  
الى ٦٠ سم . شرافتها مستطيلة النصل المستطيل . انزاعها  
سنبلي الترتيب . انزاعها فردية التجميع ، متعاقبة الارتكاز ،  
لا يفوق عندها ٦ ولا يتقص من ٤ . الوانها متراكبة ،  
انبيبا كبريتية الصفار ، يتلاتها الى الحمرة الزاهية .  
تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣١١٦٤ - **بَيْقُ**

*Monsonia* (S). *Monsonie* (F).

*Monsonia* (E). *Monsonie* (D). *Monsonia* (I).

جنس نباتات عشبية مصرية من فصيلة الفروقيات . انواعه  
عديدة ، مهدا بعض الكوار افرقية الجنوبية اصعبا منتفخة  
رأس الرجاء الصالح . ساقها مفصلي مستطيلة . اوراقها  
متعاقبة سافنة . انزاعها جملة الشكل ، متخلقة الالوان ،  
ذكية المرف الخافت (٢) معظمها نبات بري وبعضها  
زينة يزرع في المزارك والحداث . يتكاثر بالبسرود  
وبالتعليل .

٣١١٦٥ - **بَيْهَر \***

*Anomalurus* (S). *Anomalure* (F).

جنس حيوانات قاضية من فصيلة البيريات . انواعه المعروفة  
تسعة موطنها البلاد الافريقية الحارة (٢) اجسامها متوسطة  
الحجم ، طولها يراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم . واذناتها من  
١٢ الى ١٦ سم . رؤوسها صغيرة القند . اذنانها يغبية  
الشكل . اذنانها جملة الصف . جوارها قصيرة ، انزاعها  
سادة مستطيلة . واولها الجانبية مستعرضة . الزوايا سوية  
اللون يراوح بين الصفرة والحمرة (٢) تألف الغابات ،  
تنتقل الانجبار وتطير من واحدة الى اخرى . طيراتها دائم  
الانحراف نحو الارض ، شوطها لا يفوق ٣٠٠ م . (٢) قوتها  
جميع المواد النباتية (٢) اعرف انواعها واشهرها :

٣١١٦٦ - **بَيْهَر بِل \***

*Anomalurus pelei* (S). *Anomalure de Pele* (F).

نوع من البير ، موطنه افرقية الشمالية . ثوبه الى السمرة  
تتبع مع اقاربها من ثوب الظهر .



ينثر



بير

٣١١٧٩ - يوكا **يوكا**  
Yucca (S). Yucca, Yuque (F).  
Yucca, Bear grass (E). Palmenlilie (D). Iucca (I).  
جنس نباتات ممرمة من فصيلة الزيتقيات ، انواعها عديدة  
سوقها خشبية تملو مع المر وتولي السنين ، اوراقها  
جلدية ضمية التجميع ، ازهارها عنقودي يرتكز على شاربخ  
منتصبة مستطيلة ، ازهارها كبيرة القد متدلية الازهار  
لا متباينة الالوان تلب فيها الغبة || اشهر انواعه  
الزيتية المحكن غربها في اقاليم المتوسط ما يتبع .

٣١١٨٠ - يوكا **يوكا**  
Yucca aloifolia (S).  
Yucca à feuilles d'aloès (F).  
نوع من اليوكا، منتهب البلاد الامريكية ، ساقها خيشلة  
مستندة منتصبة تملو نحو ٥ امتار . اوراقها الوية الشكل  
تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم . وتعرض من ٤ الى ٤ ، فصلها  
جلدي الصفحة ، باحت الخضر البادي ، بحري المقصه ،  
ينتهي بشوكه جزوية اللون سادة الطرف . ازهارها بيضاء  
اللون تطول من ٤ الى ٥ سم . ازهارها عنقودي الشكل ،  
كثيف التجميع ، يملو من ٣٠ الى ٩٠ سم . ثمارها حقة ،  
لحمية السقذ ، لا مأكولة ، تنورها يستمر من اوائل آب  
الى اواخر ايلول .

٣١١٨١ - يوكا **يوكا**  
Yucca glauca (S).  
Yucca glauque (F).  
نوع من اليوكا، منتهب امريكية الجنوبية ، ساقها منتصبة  
قصيرة . اوراقها جلدية النصل ، بحرية اللون ، جزوية  
الخنار ، تمتد من ٢٥ الى ٣٠ طولاً من ٦٠ الى ٩٠ سم .  
وعرضها من ٦ الى ١٢ سم . ازهارها الى البيضاء الاخضر  
المواج . ازهارها عنقودي ، كثيف التجميع ، يملو من ٦٠  
الى ١٠٠ سم . ثمارها حقة جافة ، تنورها يستمر من  
ايار الى حزيران .

٣١١٨٢ - يوكا **يوكا**  
Yucca elephantipes, Y. guatemalensis (S). Yucca  
pied d'éléphant, Y. du Guatemala (F).  
نوع من اليوكا، منتهب الفرونتالا . ساقها منتصبة رافعة  
القاعدة النطيلة ، تملو من ٥ الى ٦ امتار . اوراقها  
جلدية الصفحة ، حقة الخضر ، بيضاء خنار المسنن .  
فصلها يطول من ٩٠ الى ١٠٠ سم . ويعرض من ٥ الى  
٨ سم . ازهارها تطول من ٦ الى ٨ سم . لونها الى البيضاء  
الساقي . ازهارها عنقودي ، هربي الشكل ، يطول من ٧٠  
الى ١٠٠ سم . ثمارها حقة لحمية السقذ لا مأكولة .  
تنورها يستمر من آب الى اواخر ايلول .

٣١١٨٣ - يوكا **يوكا**  
Yucca baccata (S).  
Yucca à baies (F).  
نوع من اليوكا، منتهب امريكية الشالية . ساقها منتصبة  
تملو نحو ٣ امتار . اوراقها جلدية النصل ثخينة الصفحة  
تطول من ٥٥ الى ١٠٠ سم . وتعرض نحو ٤ سم . ازهارها  
جربية الشكل تطول من ٥ الى ٨ سم . لونها الى البيضاء  
الساقي . ازهارها متبدل المتقدي يملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم  
ثمارها بلحية الشكل ، قرمزية اللون ، تطول من ٨ الى ١٢ سم  
وهي مأكولة مستحبة الطعم ، تنورها يستمر من نيسان  
الى حزيران .

٣١١٨٤ - يوكا **يوكا**  
Yucca filamenteux (F).  
راجع ابرة آدم .

٣١١٧٧ - يَهْر زَاهِر **يَهْر زَاهِر**  
Anomalurus fulgens (S).  
Anomalure écaquant (F).  
نوع من الير ، موطنه افريقية الوسطى ابتداء من الصحراء  
الكبرى . ثوبه يرتقالي اللون ، محسره وجيته بيض .

٣١١٧٨ - يَهْر فَرْوَز **يَهْر فَرْوَز**  
Anomalurus fraseri (S).  
Anomalure de Fraser (F).  
نوع من الير ، موطنه الفايون ، ثوبه الى الريدة السمره .  
صدره ويطنه الى الصهبة الصنابية .

٣١١٧٩ - يَهْرِيَّات **يَهْرِيَّات**  
Anomaluridae (S).  
Anomaluridés (F).  
فصيلة حيوانات لبونة قاصمة . انواعها تسعة تنتمي الى  
جنس واحد || موطنها البلاد الافريقية تتميز بزائدها  
المجلدية الجانبية الشكل القائمة على كامل غوصها من  
ساعد الجرموز الامامي الى مفصل ربيع الجرموز الخلفي .  
٣١١٨٠ - يُوْد **يُوْد**  
Iode (F). Iodine (E).  
جسم بسيط من اشياء المعادن شائع الانتشار في مياه  
البحر وفي بعض النباتات البحرية اعصها الفرع .  
صفائحها بلورية سريعة الغلب . لونه الى الجزوة الكستنية  
البشجية الملوّج . اثره على الجلد اصفر الخضاب . رمزه  
(X). وزنه ١٢٦,٩٢ . ثقله النوعي ٤,٩٨  
يصهر في ١١٣°س ويغلي في ١٧٥°س . يذوب  
في الماء بمعدل ١ الى ٧٠٠٠ ويذوب في الاثير والكحول .  
يستعمل في تطهير الجروح .

٣١١٧١ - يُوْدَات **يُوْدَات**  
Iodate (F).  
هو ملح حفص البرديك .  
٣١١٧٢ - يُوُوس **يُوُوس**  
Virus (F).  
هو الفيروس ، اطليه  
٣١١٧٣ - يُوُورِيَا **يُوُورِيَا**  
هي القريض ، اطليه .

٣١١٧٤ - يُوُورِيَا **يُوُورِيَا**  
Roi des rouges (F).  
سكة بحرية تسمى خليج احمر ، اطليه .  
٣١١٧٥ - يُوُوسَفْ افَنْدِي **يُوُوسَفْ**  
هو اليوسن الافندي ، اطليه .

٣١١٧٦ - يُوُوسِي **يُوُوسِي**  
Hieracidae (S). Iéracide (F).  
جنس طير من هارة الصقور . انواعه المعروفة اربعة .  
واحد افريقي وثلاثة امريكية واسترالية . جميعها من القترطم .  
اجسامها دبة . ثوبها نمره الريش ، غبراء البطن . سواقطها  
مستطيلة . مناسرها حادة البرة الهدية . ارساغها دقيقة  
غالبها قوية . تعيش سباحات كبيرة سرها نحو المئة .  
قوتها صغير الحيوان والمفاد والاناعي . تدن اوكارها في  
اعالي الاشجار الشاخة . سفنتها من ٣ الى ٤ رفقات  
ترضها الاناث دون الذكور .

٣١١٧٧ - يُوُوسَا **يُوُوسَا**  
Yoga (F). Yoga (E).  
البرفا تحط تهلبيسي هندي يرتكز على قواعد صوفية زهدية  
وتعارين عقلية وجسدية .

٣١١٧٨ - يُوُوسِيَّة **يُوُوسِيَّة**  
Yogisme (F). Yogism (E).  
الروبية مجموعة المصلحات التقنية الصوفية الزهدية والتبارين  
العقلية والجسدية التي يمارسها اليوفي .



يُوُوسِي

## ٣١١٩ - يوكا

Dlaire (F), Dally (E).

تست ترميلي يطلق على كل ما لا يدم أكثر من يوم واحد.

## ٣١١٩١ - يوكا

Ephéméroptères (F), Ephemeroptera (E).

طبقة حشرات صغيرة القند تحية تعيش في المنافع وعلى غصن اللد. اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها عدة فصائل تنتمي الى رتبتي: الزنبقيات والياقوتيات. جميعها من الحشرات التي لا تطول حياتها الفراهية اكثر من بضعة ايام في حين ان مدة حياتها البقية تبلغ الثلاث سنوات. اجسامها دقيقة مسطلة. قوتها الاستشعارية قصيرة. اجناسها الانامية كبيرة القند والخلفية صغيرة. مؤنرها ينتهي بخصيتين في الذكور وبثلاثة خيوط في الاناث. اثارها الى الياض الاغبر تشوبه غضرة او صفرة كبيرة.

## ٣١١٩٢ - يوكا

lonidium, Hybanthus (S).

lonide, lonidie, Hybanthe (F).

جنس نباتات برية معمرة من فصيلة البينفسجيات انواعها المعروفة عشرة، مهدا البلاد الاستوائية والحارة اخصها ايركية الجنوبية || بعضها اشباح نفاذة والبيض الآخر جنات فرعاء. مسطها ينبت في دال الشواطي البعيدة عن مرضي الموج || جميعها طيبة جلورها مهدية.

## ٣١١٩٣ - يوكا

Cystoderma (S).

Cystoderma (F).

جنس فطور عشائية من فصيلة التاروقيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منها بعض سفوح جبال المناطق المعتدلة الحرارة || تعيش على الدبال وعلى المواد النباتية المتحللة. جميع انواعها صغيرة القند، كاعمة الصنف، لاماكلة || تتميز باخشيتها التي تلصق الساق كالارن من القاعدة حتى اوائل الزمان الثالث || الوانها متباينة منها الاشبع والامفر والاصفر والامليل.

## ٣١١٩٤ - يوكا

Wouwou

هو الجبون الربادي، اطلبه.

## ٣١١٩٥ - يوكا

الجركاد، أبو رليح، جركاديه، صقر

Falco lithofalco, F. Gsalon (S), Faucon-émérillon, Emerillon, Rochier (F), Merlin (E).

طائر من الكونج وتصيلة الصقريات. كنية أبو رليح ويدهي الجلم لفته جناحيه وسرعة انقضائه وهو سر المزاج، قوي الشكية، بطاشي شجاع. جسمه صغير القند، جميل القالب، قصير الذنب، ثوبه أغبس أغم. صدره ويقله الى الياض الاغبر التفتي للمواج تملوه وشة قياسية الترتيب سرراء. رأسه مستعرض الشكل، عيضاء كالباقوت يكتنفها اطار اصفر || وهو من القواطع يحوب البلاد في طلب القوت والصيد والمشي || قوته الطير والقواضم والبطاء والجراد. يذنب وكه في ارباب الصخور وفي قن الاشجار الباسقة، اناثه تبيض وتغصن من ه الى ٦ فوات، ترخيها يستمر نحو اربعة اسابيع.

## ٣١١٩٥ - يوكا متجيدة \*

Yucca gloriosa (S).

Yucca magnifica (F).

نوع من اليوكا السبرية الملبولة على شطوط المتوسط، ساقها منتصبة تملو نحو ٣ امتار. اوراقها جلدية النصل كثيرة العدد تطول من ٥ الى ١٥٠ سم. وتعرض من ٥ الى ٨ سم. لونها الى الخضار الباهت. حناجرها قليل العرض، جوي اللون، ازهارها متوسطة القند، يضاء اللون تملوها رشة حمراء. ازهارها ليد التصبج يطول من ١٢٠ الى ٢٥٠ سم. ثمارها حقية جافة. تنويرها يستمر من تموز الى اواخر ايلول، ضرورها واصرامها عديدة اشهرها القلدة والمقررة واللحضة، جميعها جميلة للقالب تعيش في المراكن.

## ٣١١٩٦ - يوكا متجيدة \*

Yucca arborescens (S).

Yucca arborescens (F).

نوع من اليوكا، منها اريزونه وكليفورنيه. ساقها غليظة منتصبة تملو من ٦ الى ٩ امتار. قطرها يراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها جلدية النصل، بحرية اللون، شائكة المعصنة تطول من ١٥ الى ٣٠ سم. وتعرض من ٦ الى ١٥ سم. ازهارها الى الياض الاخضر المواج. ثمارها حقية الشكل، جافة السويق، حمراء اللون، تطول من ٥ الى ٨ سم. تنويرها يستمر طوال الصيف.

## ٣١١٩٧ - يوكا متجيدة \*

Yucca radiosa (S).

Yucca ryanonant (F).

نوع من اليوكا، منها بلاد اريزونه. ساقها منتصبة تملو من ٥ الى ٧ امتار. اوراقها جلدية النصل، رادية اللون، تعد من ١٠٠ الى ٢٥٠ طولها يراوح من ٤٥ الى ٦٠ سم. عرضها من ٣ الى ١٠ سم. ازهارها جرية الشكل غيراه اللون، طولها نحو ٥ سم. يجمعها شراخ يراوح طوله من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ثمارها حقية جافة. تنويرها يستمر طوال الصيف.

## ٣١١٩٨ - يوكا متجيدة \*

Yucca rostrata (S).

Yucca à bec (F).

نوع من اليوكا، منها المكسيك. ساقها منتصبة تملو نحو ٦ امتار. اوراقها جلدية النصل، بحرية اللون، صفراء المواج، مسلة الحنجر، شائكة المعصنة، تطول من ٥٥ الى ١٠٠ سم. وتعرض من ١٥ الى ٢٥ سم. ازهارها غيراه اللون خضر المواج. ثمارها حقية الشكل، جافة السويق، تنويرها يستمر غشي الماداة احسن الطرف.

## ٣١١٩٩ - يوكا

Jour (F), Day (E).

اليوم هو مدى اربع وشرين ساعة تحسب من نصف الليل الى نصفه. وقد يحسب اليوم من شروق الشمس الى غروبها فهو النهار ولا يجوز تغليف المهام او اعلان اكثر المعقد الا خلاله. وفي اعتبار الايام يمكن تحديدها كما يتبع:

Jour de planche (F).

يوم الشحن والتفريغ

Jour utile (F).

يوم صحيح

Jour férié (F).

يوم عطلة

Jour ouvrable (F).

يوم عمل

Jour franc (F).

يوم كامل

Jour fixe (F).

يوم معين



يوكا متجيدة



يوكا



يوكا




# مُلِحَقُ الْمَجَلَّاتِ الثَّلَاثَةِ

## أ - ي



# ملحق



عنصر معني نادر. يوجد في بعض الأثرية الخاصة. رمزه  
(Er) وزنه الذئبي ١٦٧,٢٠ املاحه ورنبة اللون.

Synergides

٣١٢٠٣- آزران  
اطلب عومران.

Homozygotie (F).

٣١٢٠٤- إسالة<sup>٥</sup>

Homozygoty (E).

الإسالة هي تماثل العوامل الوراثية عند الحيوان والنبات.  
راجع جنس.

Strophisme (F). Strophism (E).<sup>٥</sup> ٣١٢٠٥- إستغكاس

طسم خاص بعض النبات يقود نصال الأوراق إلى  
الالتواء الكامل.

Méiotique (F).

٣١٢٠٦- إنقيداري

راجع ميوزي.

Catabolisme (F).

٣١٢٠٧- إنهدام، إنقاض

Catabolism (E).

الإنهدام تفاعل كيميائي يسمح بتحويل المواد الباقية في  
الأصبة الحية إلى طاقة جهد. وهو بذلك يشكل، في  
معاوضات الأيض، الطور المعاكس للإنتاج.

Catabolique (F).

٣١٢٠٨- إنهدامي، إنقاضي

Catabolic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بمنشع الإنهدام أو  
الانقضاء.

Anabolisme (F).

٣١١٩٦- إنباء، تشيد

Anabolism (E).

هو تحويل المواد المغذية إلى نسج حية. وهو ما يشكل  
الطور الرئيسي من معاوضات الأيض.

Anabolique (F).

٣١١٩٧- إنبائي، تشيدي

Anabolic (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو مختص بالإنباء أو التشيد.

Plasmogamie (F). Plasmogamy (E).<sup>٥</sup> ٣١١٩٨- إبالغة

الابالغة حالة تأهب انصابي يكون نوى الونات  
شديد التقارب.

Plasmatique (F).

٣١١٩٩- ألي، بلاسمي

Plasmatic (E).

كل ما هو مشتق من الابالغة أو ناجم عنها.

Macroptère (F).

٣١٢٠٠- أدلي

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة طويلة الجناح أو  
الروشن أو الغمد. م. دفواء.

Argonite (F). Aragonite (E).<sup>٥</sup> ٣١٢٠١- أرغونيت

الارغونيت في علم المعادن صخر متبلور من كربونات  
الكالسيوم. تبلوره معني قائم. ثقله النوعي ٢,٩٥ وهو  
ضرب من الكالسيت الثنائي الشكل المتبلور. يستعمل في  
الزخرفة المعمارية والتزيينية.

Erbium (F). Erbium (E).

٣١٢٠٢- إريثوم<sup>٥</sup>



Protistologie (F). Protistology (E). **بُرَيْثِيَّة** ٣١٢١٦ -  
البريكية علم يبحث في اول وابسط الكائنات الحيّة .

Exondation (F). Emergence (E). **بُرَاغَة** ٣١٢١٧ -  
البرازغة حصولها هي البروز فوق سطح الماء . وهي ظهور  
الحضيض او التربة بعد تقلص مياه الغمر .

Exondé (F) **بُرُوع** ٣١٢١٨ -  
نعت تعريفي يطلق على ما برز فوق سطح الماء . يقال  
أراض برُوعة وصخور برُوعة .

Surrection (F). **بُسُوق** ٣١٢١٩ -  
هو الشخصوس ، اطلبه .

Psiolipus (S). **بُسيَلَف** ٣١٢٢٠ -  
Psiolile (F). Psiolipus (E).

جنس طحالب صرخوبية صغيرة القد تتميز بحواشيها  
الحويّة الشكل || أنواعه المعروفة قليلة العدد منبتها بعض  
الاصفاق الباردة اعخصها الشمالية .

Ceratothylacaceae (S). **بُشَيَّات** ٣١٢٢١ -  
Cératothylacées, Cératothylacées (F).  
Ceratothylacées (E).

فصيلة نباتات عشبية مائية من ثنائيات الفلقة . اجناسها  
وانواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها عشبية ، مائية ،  
مسترة ، عائمة الجذور ، ضميّة الاوراق الحافلية .  
ازهارها وحيدة المسكن || اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة  
تعيش في المنافع والاهوار والمغايض والضايق المائية  
الماء || اعرفت أنواعها ولشجرها بشت القرد المعروف ايضاً  
بحامول الماء ونضوش الحوت .

**بُحَالَة** ٣١٢٢٢ -  
البهالة من الحشرات والوبيات هي الأثني التي تقضي  
على بعلاها فور الانتهاء من البال او الكوم كاسرعوفة  
والخرب والرتبلاء ...

Plasmatique (F). **بِلَاسْمِي** ٣١٢٢٣ -  
راجع أثلي

Béridé (F). **بِلْدُوس** ٣١٢٢٤ -  
حيوان لون من الجربانيات الشاجرات يدعى بئروس ،  
اطلبه .

Hypopharynx (F). **بِلْصَة** ٣١٢٢٥ -  
Hypopharynx (E).

الجزء الداخلي من فم الكثير من الحشرات . وهي امتداد  
للبلعوم . وعلى هذه البلعمة ، الناشزة عند غددات  
الاجنحة وستقيمتها ، يوجد الكثير من العقد العصبية ممّا  
يدلّ على انها مركز احساس خاص لا يزال مجهول الغاية  
حتى الآن .

Mésozoïque (F). **بِلْوسِيِي** ٣١٢٠٩ -  
Mesozoic, secondary stratum (E).  
نعت تعريفي يطلق على ارضين الاباح الثاني المعروف  
ايضاً بالابوسط .

Blastoceros (S). **بِلْوَالِيِي** ٣١٢١٠ -  
Blastocère (F).  
حيوان لون مجترّ من فصيلة الابلات . موطنه فاني امريكة  
الجنوبية . يعيش جماعات قليلة العدد . اجله مؤلف من  
ذكر مانع وثلاث او اربع اناث . مع ارشادها || جسمه  
يطول نحو ١٢٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٥ سم .  
ارتفاعه ٧٥ سم . ثوبه الى الشقحة المراء السفاه الموج  
- عنه مطوّنة بالابيض . قرنه مصمت ، ثلاثي الشعب  
ينصله كل عام || الاثني جسماء ، ضرعها ثنائي  
الاختلاف ، تحمل نحو ٥ اشهر وتضع من بغور الى  
بغورين .

Petaurus, Belideus (S). **بِلْوس** ، **بِلْوس** ٣١٢١١ -  
Pétaure, Béliidé (F).  
جنس حيوانات لونة من الجربانيات الشاجرات وفصيلة  
الفنجربات . انواعه المعروفة ثلاثة موطنها استراليه  
والجزر المجاورة . جميعها بجوية المسرح . تألف  
الغابات والحراج ، تبيت في النهار اما في تجاوب  
الأشجار النخرة او على قننها || اجسامها صغيرة .  
كبيرة . اذنانها مستطيلة منقطة الاطراف || قوائمها  
الامامية أقصر من الخلفية - اصابعها خماسية حادة  
الاطراف . اصرافها ناعمة ، لينة . اغشيها الاطيلة جلدية  
تمتد من الايدي الى الارجل . اناثها مجهزة بجربا عند  
اسفل البطن تقيم فيه الرضيع حتى النظام || اما انواعها  
الثلاثة فهي :

P. australis (S). - **بِلْوس أسترالي**  
P. acureus (S). - **بِلْوس رينجاسي**  
P. brevipes (S). - **بِلْوس قصير الرأس**

Bathydrique (F). Bathydic (E). **بِلْدِي** ٣١٢١٢ -  
نعت تعريفي يطلق على كل كائن يعيش في غور الماء ||  
تقول العلم البديدة والنبت البديدة .

Inné (F). Innée (E). **بِلْجِيِي** ٣١٢١٣ -  
نعت تعريفي يطلق على ما هو اثل في المنطوق . وهو  
بذلك يرادف علقى (Congenital) يقال صفة بجديّة وعامة  
بجديّة .

Bathybius (F). Bathybius (E). **بِلْجِيِي** ٣١٢١٤ -  
اسم يطلق على كتل هلامية توجد في قاع البحر . يقول  
فيها العالم دهوكسلي وبعض علماء الطبيعة انها الحالة  
الاولى من المادّة الحيّة .

Protiste (F). Protiste (E). **بِلْوي** ٣١٢١٥ -  
كائن حي وحيد الخلية . مجمل وسومه المشققة حتى الآن  
تجعله متارجكاً بين النبات والحيوان . ومن العلماء من قال  
انه اقرب الى النبات منه الى الحيوان .

٣١٢٣٨ - **نَسَاوِيَّة** <sup>○</sup>  
Isostasie (F). Isostasy (E)  
نظرية حصيلية تركز على تادل القوى المحركة النابذة والمماسية.

٣١٢٣٩ - **بُوغَنَة** <sup>○</sup>  
Sporogonie (F). Sporogony (E).  
البوغنة ، في علم الزولوجية ، طريقة تلقيح خاصة ببعض التوالى .

٣١٢٣٩ - **نَكَيْس**  
Enkystement (F).  
Encystation, Encystment (E)  
النكيس ، في علوم التاريخ الطبيعى والبيولوجية والطب ، هو الالتحاق الكلى بشئ متين يدعى كيساً .

٣١٢٣٧ - **بُوغِيَّة** <sup>○</sup>  
Sporophyte (F). Sporophyte (E).  
طور من اطوار التكوين النشوي عند النباتات اللاشعبيّة من ذوات البوغ وهي بذلك تماكس البغامة عند النباتات الشّعبية .

٣١٢٤٠ - **نَائِي الأَوَّلِي** <sup>○</sup> ، **مِيْزُونُون**  
Mésosome (F). Mesozoon (A)  
كائن مركزة بين الاوولي والتوالى ، يتربك من حبيرة مركزية تغلفها حبيرات مسطحة مزرزة . أمّا الرضيلة فلا وجود لها .

٣١٢٣٨ - **بُيَاغَة** <sup>○</sup>  
Sporose (F). Sporose (E).  
البغاة في علم النبات هي ابراز البوغ ونشره عند السراخس ولهاها .

٣١٢٤١ - **جَدِيم** <sup>○</sup>  
Lorique (F). Loricata (E).  
نمت تعريفي يطلق ، في علم النبات ، على كل حبة او بزة غلافها الخارجى جامدة و يطلق في علم الزولوجية على كل جسم تغلفه صفائح عظمية .

٣١٢٣٩ - **كَيَّانٍ مَشْرِي** <sup>○</sup>  
Hétérothallisme (F).  
Heterothallism (E).  
التباين المشري ، في علم النبات ، حالة تكون فيها الغامات الذكرية والانثوية متماثلة من غيامات مختلفة الشّعبية أيضاً .

٣١٢٤٢ - **جَزْر**  
Troncature (F).  
حالة الشيء المقطوع جزء منه .

٣١٢٣٠ - **كُوك** <sup>○</sup> ، **مُكُود** <sup>○</sup>  
Autochtonie (F).  
Autochtony (E).  
صفة الشيء الموجود طبيعياً وأساساً في مكان جنائى معين .

٣١٢٤٣ - **جَزُونُوق** <sup>○</sup>  
Lithocranus. Walleri (S).  
Lithocrane, Généruc, Gazelle-Girafe (F).  
جزونوق هو الاسم الصومالي . حيوان لبون من الغنم ، وحيد الجنس والنوع . موطنه يمتد من الصومال الى شرقي الكونغو . ملجئه الحياتي جماعي . اجله يمد من ١٢ الى ١٥ يراشه ذكر مانع او ذكران وما تبقى فائت وطلّى . لونه الاعشاب خضراء وباهية ، ولوراق بعض الاشجار احصها المستطاحات | شوته شبه الظرافة جسمه بطول نحو ١٦٥ سم . ارتفاعه ١٠٠ سم . قرنا الذكر منقفا الطرف المنصب . عينا كبرتان ، متوجتان بهجة بضاء . اذناه صغيرتان جالستان . عنقه شديدة الطول . حاروكه ارفع من كنهه كما في الظرافة . ذنبه قصير وديق ، ينتهي بخصلة من الشعر . الاثى حماء ، لثائية الاخلاف ، فردية الطلى | ثوبه الى المفرة السوداء . رأسه وظهره شديدة السمرة . الاثى الى السمرة السوداء باستثناء البطن الابيض الاخير .

٣١٢٣١ - **تَجْرِيم**  
Accouage, Accouage (F).  
Lighterage (E).  
التجريم هو نقل البضاعة من رصيف الميناء الى السفينة او من السفينة الى رصيف الميناء . لذلك فالتجريم يعني الشحن ويعني التفريغ أيضاً .

٣١٢٣٢ - **تَرِيْبَة** <sup>○</sup>  
Terrigène (F). Terrigenous (E).  
نمت تعريفي يطلق على الرسوب المتراكمة في قعر البحار والمعادلة الى انتحات وانجحات الاتربة القارية .

٣١٢٣٣ - **نَسَاوِي مَشْرِي** <sup>○</sup>  
Homothallisme (F).  
Homothallism (E).  
النساوي المشري ، في علم النبات ، حالة تكون فيها الغامات الذكرية والانثوية ناتجة عن غبامة واحدة .

٣١٢٣٤ - **تَسْخِيْد**  
Placentation (F).  
هي السخدة ، اطلبها .

٣١٢٣٥ - **تَفْيِيْد**  
Anaboliame (F).  
اطلب ابتناء

٣١٢٣٦ - **تَفْيِيْدِي**  
Anabolique (F).  
راجع ابتنائي .

٣١٢٣٧ - **نَسَاوِيَّة** <sup>○</sup>  
Isostatique (F). Isostatic (E).  
نمت تعريفي يطلق ، حصيلياً ، على كل ما له صلة بالتعادلية الارضية | وهو ميكانيكياً الاتزان المتبادل في الخطوط والسطوح .



جزونوق

٣١٢٤٤ - **جَزْرُوق**  
Adéphage  
نمت وصفي يطلق على كل مفرس يتميز بالشراعة ان حيوان او حشرة .

٣١٢٤٥ - **جَزْرَانِي**  
Caroténolide (F).  
Carotenoid (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالكاروتين المعروف أيضاً بالجزرين . الشقاات الجزرانية شفاحات صفراء وبرتقالية وحمراء اللون يكثر وجودها في النبات والحيوان . وهي غير قابلة الانحلال في الماء انما تذلل في بعض الشحوم .

Abomasum (F). Abomasum (E). حَافِصَة ٣١٢٥٣ -  
الحافضة الجيب الرابع من معدة المجترات .

Cénozoïque (F). حَويْث ٣١٢٥٤ -  
اطلب سنويزي

Monécle (F). حِصَاوَة ٣١٢٥٥ -  
الحصاة حالة فيزيولوجية عند المشرّبات تُسمّ بقرنية الخلّة .

Pédologue (F). Pedologist (E). حِصَالَم ٣١٢٥٦ -  
هو صاحب الاختصاص في الحصلة اي في علم الاربة الزراعية من حيث تكوينها وطرق استثمارها .

Ovula (S). Ovule (F). حَيْدَاء ٣١٢٥٧ -  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معدّبات الارجل وفصيلة الدوعيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة | اصداؤها متوسطة القد ، شبه بيضية الشكل ، كطرة ، مقفّرة الظهر ، صلبة الصفحة الخارجية ، بياض اللون | أشهر انواعها حيداء الزابج Ovula ovum (S). طولها نحو ١٠ سم . لونها الى البياض المجاني الاسفع المواج .

Charophytes (F). Charophytes (E). حَيَاق ٣١٢٥٨ -  
فئة من النبات معظم انواعها يعيش في المياه العذبة الراكدة وبعضها في الماء الاجاج | خضائها الى الخضار القاتم ويطلع منها عند اللبس صلبة كبريه | وهذه الفئة من النبات تشكّل صلة الوصل بين المشرّبات والطحليّات .

Céramiste (F). Céramiste (E). حَزَاف ٣١٢٥٩ -  
الحزّاف من تماطي صناعة الخزف من نخار ومطلي وصفي .

Céramique (F). Céramique (E). حَزَاف ٣١٢٦٠ -  
فنّ صناعة الآنية الخزّافية وشيئا .

Ginglymostoma ٣١٢٦١ - غُفَافَة سَوِيَة اللَّوْن \*  
concolor (S). Ginglymostome concolor (F).  
Ginglymostome concolor (E).

سمكة بحرية من السفنقات الاشلاقي . اعطانها تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي | جسمها وشي الشكل بطول نحو ٢٠٠ سم . تميّز بزغفتها الظهرية المتأخرة الاركانز والمتقابلة مع البطنية والشرجية . ثوبها سوي اللون الاصفر .

Cryptogènes (F). عَطِيَّاتِ الْجَيْن ٣١٢٦٢ -  
Cryptogenous (E).

نعت تعريفي يطلق على الفئات الحية ، من حيوان ونبات ، التي تصنف بالتناسل اللامنطور .

Caryogamie (F). Caryogamy (E). خِلَاط ٣١٢٦٣ -  
الحلاط هو اعانة نشاط الاخصاب اللاشفي عند

Dermoptera (S). جِلْبَنَاتِ الْعَوَام \*  
Dermoptères (F). Dermoptera (E).

مرتبة من الحشرّيات . تسموها في الزمن الماضي الى المهورّبات ثم الى مِجَنّات الادي . ووجدوا اخيرا انها اقرب الى الحشرّيات | وهذه المرتبة تضم فصيلة واحدة تدعى كوبنّيات وجسّ واحد يدعى كوبن .

Gymnura (S). Gymnure (F). جِمْنُور \*  
جنس حيوانات لينة من فصيلة النفنقات ورتبة الحشرّيات . انواعها المعروفة ثلاثة موطنها جزر الزابج | اجسامها شبه اسطوانية الشكل تطول نحو ٦٥ سم . بها فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٣٠ سم . رؤوسها مخروطية الشكل . عيونها صغيرة . اذانها مستديرة . اعناقها قصيرة . قوائمها معقلة الطول . اصابعها مجعّرة باظافر حادة . اثوابها الى الدبسة الصنّائية المواج . وبرها ليد ناعم يتخلّله حلب جامد شائك . اذانها جرداء عارية | انثاءا اميز فقا من ذكورها واهتت ثوبا منها ، قوتها الحشرات والديدان والزحافات الصغيرة .

Parétienne (F). جُولِي ٣١٢٤٨ -  
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ينتمي الى فئة الجوليّيات .

Parétiales (F). جُولِيَّات \*  
فئة نباتات من ثنائيات الفلقة مشيمتها تأوى الى جدار المدقة كما هي الحال عند البنفسجيات والالانيات وغيرها .

Gymnorhinus (S). جِمْنُورِين \*  
Gymnorhine (F). Gymnorhine (S).  
جنس طير من الجوانم سيات المتأقرب فصيلة الغرابيات .  
أنواعها المعروفة ثلاثة اعطانها استرالية وجزر الزابج | اجسامها متوسطة القد تطول من ٤٠ الى ٤٥ سم . مناقيرها مخروطية الشكل . اجنتها لاحة ، زلقة . اثوابها مزخرفة | أشهر انواعها الجمنورين الزّمار G. fluteur (F). طولها نحو ٤٥ سم . ثوبه اسود اللون يطوح يتيج ابيض في الفخذ والجنّاح | يالّف حياة الاسر ويقلّد جميع الانغام والاصوات .

Ginkgoales (E). مَمَائِل \*  
جِنْكُوات ، مَمَائِل \*  
تسم من عربانات البزور يعود ظهورها الى الحقبة البغونية من الاباج الاول | كانت ، في الماضي البعيد ، تعدّ الكثير من الأنواع الا انها اضمحلت مع مرور الزمن ولم يبق منها في عصرنا الحاضر سوى النوع المعروف بشجرة المعبد او الجينكو وهي شجرة مقدّسة عند البوئين .

Actualisme (F). Actualism (E). حَافِرِيَة \*  
الحافرية نظرية حصيلية تفسّر الناشع والتطوّرات الارضية الغائرة بالمنايع الحاضرة مع اعتبار هذه التطورات مستمرة العمل البطيء | والحافرية بمفهومها الحصيلي تماكس النظرية الجليلية .



جمنور



جمنورين



خفّاءة سوية اللون

Danaide, Danaïs (F).

جنس حشرات فراشة من رتبة حرشفيات الاجنحة وفصيلة الدنيسيات. انواعها المعروفة نحو ٣٠ اعطانها المناطق الحارة من العالم القهم باستثناء اربعة انواع، ثلاثة منها تعيش في امريكا الوسطى ونوع واحد اعطانها تشمل حوض البحر الابيض المتوسط وتمتد حتى اورنوبه الوسطى، يدعى تنسبة بحريزيب D. Chrysippus (S) جسمها كبير القد، ووشانها الى الصغار الاشعل تطوره يخاف بيض وسود اطوار اسود منبج بالابيض | اساربعها باهتة الخضار تعيش على اوراق الصقلابات.

Ptéridospermées (F).

٣١٧٧٣ - دوسرييات  
فئة من السراخس المتقرفة التي كانت شارها بزور دقيقة مجنحة بدلا من بوعه.

Diatomite (F). Diatomite (E).

٣١٧٧٤ - ديتاوميت  
صخور صوانية نباتية الاصل تكونت من تراكم وتكسب روبات الشذيرات العائنة الى المشطورات.

Dinantien (F).

٣١٧٧٥ - دينانتيني  
ساف من الحقبة الكربونية يدعى ايضا كلمي، اطله.

Melanocetus (S).

٣١٧٧٦ - دَخاطة  
Melanocetus (F). Melanocetus (E).

جنس اسماك بحرية لجمية من شائكات الزعانف وفصيلة الكواحيات. المعروف منها حتى الآن نوعان مشتريان في لبحج المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط | اجسامها قصيرة، شبه صلبة الشكل، تطول نحو ٤٠ سم. تتميز برووسها المستضخمة وبشدها الكبيرة الفائرة وبكثرة اسنانها الحادة وبانهاها المنشرة المستقيمة. سنها عرياط عادم السهف. عيونها علوية الاركانز تحتل ثمة الرأس. ويعطوها في مقدم خطمها ملمس مستطيل، غضروفية العانة ينتهي بشرة صغيرة تستعمله الدخاطة لاجتذاب الاسماك.

Acutangulés (F). Acutangular (E).

٣١٧٧٧ - دَرِب  
نمت تعريفي يطلق في علم النبات على كل عضو او شكل ضيق الزوايا.

Germigène (F). Germigen (E).

٣١٧٧٨ - رالميم  
رالميم او راشمة نمت تعريفي يطلق جسموريا، اي في علم الفيزيولوجية، على غديدة في الجهاز الشقي تحضن علية الجبلة حتى الاغصاب وذلك عند المهنزات والمقنيات والمنقنيات.

Manubrium (F). Manubrium (E).

٣١٧٧٩ - رُدين  
الاسم القرشي والاكليزي من اللاتيني بمعنى ردن وكيم. والردين، في علم النبات، خلية من المشن التي ترتب منه اثيرة الخبيئات من الخبيئات الخضر | وهو في علم الحيوان، شبه انبوب ادرم التركيب مركزه في وسط مظلة المدوس يحمل في طرفة قم الحيوان.

وحيدات الخلية وذلك باتحاد نوى الوانف المقاربة.

Dermatogène (F). Dermatogen (E).

٣١٧٨٤ - دُرمجة  
الدرمجة هي نسج الطبقة الخارجية من غلاف التثيط في النبات.

Desmidiées (F).

٣١٧٩٥ - دوسيدييات  
عصارة نباتات مائية من فصيلة المدغسات النائية الى الخبيئات الخضر. اجناسها المعروفة قليلة الحد جميعها من وحيدات الخلية تعيش في المياه العذبة | اشهر اجناسها المدسم.

Périlème (F). Perilèem (E).

٣١٧٩٦ - دُشيلة  
الطينة. هي نسج الطبقة الوسطى من غلاف التثيط. مركزها بين الدرمجة واللمسة.

Acrogamie (F). Acrogamy (E).

٣١٧٩٧ - دُعاطة  
الدعاطة، في علم النبات، تطور بطراً على الانبوب الظلي فيدخل البيضة من السم.

Alléomorphisme (F).

٣١٧٩٨ - دُعاشة  
Alléomorphism (E).

الدعاشة، في علم النبات، طور من اطوار التنسل البدائي يتميز بالتقابل الشكلي والتخالف الوراثي.

Pérolème (F). Perolème (E).

٣١٧٩٩ - دُلكسة  
اللمسة هي نسج الطبقة الداخلية من غلاف التثيط في النبات.

Bombylidae (S).

٣١٨٠٠ - دُنبانيات  
Bombylidae, Bombyliidae (F).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين قصيرات القرون. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٢٥٠ منتشرة في جميع اقطار العالم احصها المناطق الحارة | اجسامها مبطلة صغيرة القد او متوسطة. رؤوسها صغيرة وبرة، مستطيلة الاعظام الماشقة. كواسلها وبطونها مزورة. قرونها الاستشعارية قصيرة ودقيقة. اجنحتها ضيقة مستطيلة | يرقانها طليقة تعيش في خشاوات واصقان ومحاجر غشائيات الاجنحة | اشهر اجناسها: الدنانة، العتروس، اللمسة.

Danaidae (S). Danaidés (F).

٣١٨٢١ - دنكسييات  
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة صولجانيات القرون. اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد اعطانها المناطق الحارة في جميع اقطار العالم | اجسامها رشيقة، متوسطة القد او كبيرة. ووشانها مزورة، جميلة الالوان، مستيرة الاطراف. قرونها الاستشعارية صولجانية الشكل | اساربعها خاضعة تعيش على اوراق النبات | اشهر اجناسها الدنيسية.

Danaïs (S).

٣١٨٢٢ - دُنكيسية



دخاطة

ولو كان جزئياً ، الحاصل في البلاد السكتانية منذ تَلَقَّصَ  
المسك أو هبوطه .

Ontogénétique, Ontogénique (F). **رَوْدَكِي** ٣١٢٨٩  
Ontogenetic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالروضة أي بشوهِه  
الكانات .

Glyptognosie (F). **رَوَقْشَة** ٣١٢٩٠  
Glyptognosy (E).

الروقة هي معرفة وتمييز الحجارة المنقوشة القديمة العهد .

Cinérîtes (F). **رَوَمَد** ٣١٢٩١  
الرومد رمد بركاني منقُذ .

Sorculus (S). Soricule (F). **رُؤَيْبَة** ٣١٢٩٢  
Sorculus (E).

جنس حيوانات لينة من فصيلة الزبائيات ورنة  
الحشرات . أنواعها المعروفة خمسة أعطانها المناطق  
الجبلية الآسيوية إحصاء الهند والصين || جميعها صغيرة  
القد ، مستطيلة الذنب . قوتها الحشرات والديدان .

Abortif (F). Abortive (E). **رُوحِين** ٣١٢٩٣  
نعت تعريفي يطلق في علم المواليد والنبات على الأعضاء  
والثمار التي تسقط قبل اكتمال نموها .

Pyrhocoris **رُوحَاَلَة** ٣١٢٩٤

جنس حشرات ناهمة من نصفيات الأجنحة وفصيلة  
الزحاليات . أنواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم  
قطار العالم || أجسامها اهليلجية ، مبططة ، تطول من ٧  
الى ١٢ مم . رؤوسها معتدلة الجسم . عيونها صغيرة ناشزة .  
قرونها الاستشعارية رباعية الفصائل المستطيلة . بطونها سوداء  
اللون أو حمراء . أجنحتها ملونة بكث في التبقع  
والتجذيع || تألف بمعظمها الحياة الجماعية . شراندها تعد  
بعض الحشرات . قوتها اوراق النبات وما تستطيع اقتراسه  
من حشرات وهوام :

Pyrhocoridae (S). **رُوحَاَلِيَّات** ٣١٢٩٥  
Pyrhocorides (F).

فصيلة حشرات من رتبة نصفيات الأجنحة المختلفة ||  
أجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم  
قطار البلاد المعتدلة الحرارة .

أجسامها اهليلجية أو بيضية الشوزن ، معتدلة التنبط ،  
تطول من ٧ الى ١٥ مم . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة .  
قرونها الاستشعارية رباعية الفصائل . أجنحتها مستطيلة  
ثلاثية العلل || أجنحتها متقاربة الطول ، معظمها نصفية  
وبعضها يلحف أكثر من زامن || قوائمها شديدة معتدلة  
القد || معظم أنواعها ناهم قوته النبات وما تستطيع اقتراسه  
من حشرات || أشهر أجناسها الزحالة .

Diécie (F) **رُوكَاوَة** ٣١٢٩٦

الركاوة حالة فيزيولوجية عند المشربات تسم بازواجية  
الخطية .

Métastable (F). Metastable (E). **رُوسيس** ٣١٢٨٠  
نعت تعريفي يطلق فيزيائياً وكيمائياً على كل نظام أو  
تركيب ثباته الظاهري يشكو من ندّة الوجود .

Lycopodiales (F). **رُوصِيَّات** ٣١٢٨١

فئة من النبات عاشرت بانواعها العديدة المختلفة الأشكال  
جميع الأزمنة الحصلية منذ الحقبة الميوسينية || أنواعها  
المقرضة شملت الكثير من الأشجار التي كان ارتفاعها  
يرواح من ٢٠ الى ٢٥ م . والتي كانت تشكل معظم  
غابات مناطق الحقبة الكربونية || وما طبقات الفحم  
الحجري سوى بقايا هذه الأشجار المنصودة || أما الأنواع  
المعاصرة فجميعها عشبية تجمعها فصيلة الصنديات .

Batholite, Batholithe (F). **رُوصِيْمَة** ٣١٢٨٢  
اسم يطلق في علم الحصلية على كل كتلة من الطخ أو  
الصخور الثائرة لا تسمى الشكل إنما مستعرضة القاعدة .

Périgyne (F). Périgynous (E). **رُغِيل** ٣١٢٨٣  
نعت تعريفي يطلق على تويج الزهرة واسبتها عندما تكون  
متجمعة في الكأس حيث تشكل طوقاً يحوق بالمبيض .

Périgynique (F). Périgynic (E). **رُغِيلِي** ٣١٢٨٤  
نعت تعريفي يطلق على شكل من اشكال امتزاج الاسدية في  
كمّ الزهرة أو حول المبيض .

Enicurus (S). Enicure (F). **رُيْلَة** ٣١٢٨٥  
Enicurus (E).

جنس طير من الجوائم سنّيات المناظير وفصيلة  
الذغريات . أنواعها المعروفة عشرة أعطانها تمتدّ من الهند  
الى المازية || أجسامها معتدلة القد ، تطول من ٢٥ الى ٢٨  
سم . بما فيه الذنب الفارق المستطيل الرقائ || أنفها  
سوداء اللون ، مبلّقة بالابيض || تألف ضفاف مجاري  
الماء . قوتها الحشرات والديدان || تعدّ اغراضها في  
المواقع الوعرة المنيمة المشارة على مجاري الماء . اناتها  
بيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بتناوبة الذكور نحو  
١٤ يوماً .

Glyptographe (F). **رُقَاَش** ٣١٢٨٦  
Glyptographer (E).

الرقاش من تعاطى الرقاشة أي علم الحجارة المنقوشة  
القديمة العهد .

Glyptographie (F). **رُقَاَشَة** ٣١٢٨٧  
Glyptography (E).

الرقاشة هي علم الحجارة المنقوشة أو المحفورة القديمة  
العهد .

Epirogénique (F). **رُكَاجِي** ٣١٢٨٨  
Epirogenic (E).

نعت تعريفي يطلق على الحركة العمودية التي تصيب بعض  
أجزاء الكتل القارّة . مثلاً على ذلك الارتفاع المستمر .



ريلة



رينة

Estsiens (F).

٣١٣٠١ - سَحْجُوَّة

اسم يطلق على رباح خاصة تهب فوق البحر الأبيض المتوسط وضفاف حوضه. مصدرها تناوب من الشمال ومن الجنوب، يحركها التبريد الشديد فوق الماء ودرجة حرارة الصحاري، من الصحراء الكبرى إلى الجزيرة.

Placentation (E) ٣١٣٠٢ - سَحْجَدَة

السجدة في النبات هي كيفية اندراج السند داخل المبيض. وقد تكون على ثلاثة أشكال: محورية أو جولية أو مركزية.

Aboral (F). Aboral (E). ٣١٣٠٣ - سَحْرِي

نعت تعريفي يطلق في علم الزولوجية على ما هو كان في الناحية المقابلة للثم عند الحيوانات الدنيا.

Géothermie (F). Geothermy (E). ٣١٣٠٤ - سَحْرَة

السحرة هي حرارة الأرض.

Géothermique (F). ٣١٣٠٥ - سَحْرِي

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بحرارة الأرض.

Sphenophyllum (S). ٣١٣٠٦ - سَبِيلِي

جنس نباتات متحجرة من فئة السبيليات. جميع أنواعها جذموية، عشبية، مورقة. منبتها المنافع والغدران.

Sphénophyllées (F). ٣١٣٠٧ - سَبِيلِيَّات

فئة نباتات متحجرة ظهرت في الحقبة السيلونية وانقرضت في البرمية من الأماج الأول إلى آخره. إن الأمسوخيات سوية البوغ تتحجر منها ذلك لأن نطع الشبه بينها لا تفرق عن ٨٥٪.

Pinnule (F). Pinnule (E). ٣١٣٠٨ - سَلْة

السلفة ورقة لا تباينة الشكل، غالباً مستطيلة.

Sapropel, Sapropèle (F). ٣١٣٠٩ - سَبِيل

السبيل حمأة تترسب تعود إلى بقايا حيوانات مجهرية رست في قعر البحار ففسختها البكتيريا.

Sapropelique (F), Sapropelico (E). ٣١٣١٠ - سَبِيلِي

نعت تعريفي يطلق على المادة العضوية المائعة إلى الطم والنبت التي فسختها المياه الباتمة.

Cimbex (S). Cimbex (F). ٣١٣١١ - سَبِيلَك

جنس حشرات ماصة من غشائيات الأجنحة وصفلة السبيليات. أنواعها المعروفة نحو ٢٠ إعطائها بعض مناطق البلاد المصلة الحرارة. تألف النباتات والحراج الطفيلة إلى أجسامها كبيرة، شديدة النشط. إعطائها ماصة، لزوجها الاستشعارية صفة الأطراف. أنوابها

Melipona (S). Mélipone (F).

٣١٢٩٧ - زُمَّة

جنس حشرات ماصة من غشائيات الأجنحة وصفلة الزمميات. أنواعها المعروفة نحو ٩٠ إعطائها المناطق الاستوائية والحرارة إلى أجسامها معتدلة القد أو صغيرة، محبة البون، خفيفة القشار، عادية الشذام. ملجنها الحياتي جماعي كالنحل. لؤلها يتكون من ثلاث فئات: الأنثى ثم الذكر ثم فئة العاملات العامة الشوار الشقي. أنثىها تطول، حسب الأنواع، من ١٢ إلى ٢٧ سم. ذكورها تطول من ١٠ إلى ١٤ سم. أما عاملاتها فتطول من ١١ إلى ١٥ سم كوزارتها أو محاجرهما محرسه، شبه هرمية الشكل، لوعادها سطوحها. نخارها صفوف أفقية الارتكاز تستعملها الأنثى لمشح السرة. أما رجلي الأجزاء التي تنجيه العاملات فتعاريه اجرة بيضية الشكل مركزها في الزام الأول أي الأسفل من الكوزارة. عملها يختلف مع اختلاف الأنواع والمراعي. أما الإنتاج الحولي فيراوح من ٢ إلى ٦ كيلو. أعرف أنواعها وأشهرها الثلاثة التالية:

Melipona scutellaris (S).

زُمَّة النزاليل أكبر أنواع الزممع وأعمها انتشاراً. عملها جيد الصنف، ضربي العرف، مستحب الطعم. إنتاجها الحولي نحو ٦ كيلو.

Melipona fluvipes (S).

زُمَّة النراغوي متوسطة القد والانتشار. عملها جيد الصنف، عطري العرف، مستحب الطعم. إنتاجها الحولي نحو ٥ كيلو.

Melipona enxui (S).

زُمَّة أنكسوي متوسطة القد. تربى في كوزارات خاصة تعلق على الأشجار. عملها طيب، مقو، ناعش، مستحب الطعم. إنتاجها الحولي نحو ٣ كيلو.

Méliponidae (S). ٣١٢٩٨ - زُمَمِيَّات

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الأجنحة. اجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد. إعطائها بعض المناطق الاستوائية والحرارة من المالمين القديم والجديد إلى أجسامها شبيهة بأجسام النحل لكنها اصغر قدراً ولا غشام لها. جميعها ماصة. معظمها يقيم كوزارته في جذوع الأشجار النخرة إلى ملجنها الحياتي جماعي كالنحل. لؤلها يتألف من أنثى كاملة الشوار الشقي وظفقتها مشح السرة. ومن بعض الذكور وظفقتها كدم الأنثى الماكلة. ومن عاملات عادية الشوار الشقي تشبه الكوزارات وتربي فيها النخارب وتجنح الرجوح والطلع أشهر اجناسها الزممة والصواعة.

Spermatie (F). ٣١٢٩٩ - زَرْبَف

الزربف اسم يطلقه علماء النبات على البوغ الخارجي، الحظي الشكل، عند بعض الطيور والخفيات.

Sigillariées (F). ٣١٣١٠ - سَبِيلَارِيَّات

مجموعة نباتات متحجرة قريبة الشبه بالهشوميات. تميزت بسوقها الفصصة الكبيرة وأوراقها المركبة المنتظمة التنسيق الطولي.

الزمنية عن رباطه الخمي في بعض الالبيات احصاها المشطورات.

Stèle (F). Stèle (E).

٣١٣٢٠ - شَطَاب <sup>○</sup> الشطاب ، في علم النبات ، هو الجزء الداخلي من الجذر او الساق الذي يشمل الالوية الخشبية واقية النجب .

٣١٣٢١ - شَمَاح <sup>○</sup> Acrogène (F). Acrogenous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل فطر نوعة سافه وارسوسته رأسية الشماخ .

٣١٣٢٢ - شِيَاكَة <sup>○</sup> Héterozygotie (F). Heterozygosity (E).

الشباة هي عدم تماثل العوامل الوراثية عند الحيوان والنبات | ومنهم من قال اختلائية الأزواج . راجع اشيب .

٣١٣٢٣ - صَاوُج <sup>○</sup> Treverlin (F).

حجر من الفليس الجصي يصلح لبناء .

٣١٣٢٤ - صَتَّام <sup>○</sup> Pétrographie (F). Petrograph (E).

الصتَّام من تماطي الصنائة اي علم الصخور .

٣١٣٢٥ - صُنْقُر <sup>○</sup> Halistur (S). Halistur (F). Halistur (E)

جنس طير من الكولير وفصيلة الصقريات . انواعه المعروفة ثلاثة اعطائها الهند وآسية الشرقية واسترالية | اجسامها شبيهة باجسام العقبان إلا انها اصغر قدًا ، اطوالها نزاح من ٥٠ الى ٦٠ سم . اذناها ثنائية اللون . رؤوسها واعناقها وصدرها بعض . اردبتها وسواطها اطراف بطونها وافخاذها واذناها الى الشقة السراء ، مواجها يختلف مع اختلاف الانواع | تألف الشطوط البحرية والمواني . تغطس في الماء كالنورس . قوتها الاسماك وكل ما تيسر لها من مواد عضوية .

٣١٣٢٦ - صَوَاعَة <sup>○</sup> Trigone (S). Trigone (F).

جنس حشرات عسالة من عشائيات الاجنحة وفصيلة الزمغيمات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها المناطق الاستوائية | اجسامها شبيهة باجسام النحل لكنها اصغر قدًا ولا شدام لها انما تعض وعضتها مؤذية | ملجئها الحياتي جعاعي كسائر انواع الزمغيمات . تشيد كزارتها على الاشجار وعلى الصخور . تنبها بالظن وتغلفها بمختلف المواد النباتية . مداخلها فردية انبوية الشكل ، تسمع بمرور صواعة واحدة . نخاريها افنية الارتكاز . اجرة الصل بيضيه الشكل ، صغيرة القد ، تحتل الزمام الاول والثاني من الكوارة | صعلها دون الوسط . اتانجها الحولي نحو ٠ كيلو .

٣١٣٢٧ - صَوْغِي <sup>○</sup> Phylétique (F). Phyletic (E).

نعت تعريفي يطلق على التسلسل الكينوني في الحيوان والنبات .

ملونة ، يكثر فيها الاصفر | يرقاتها خاضلة لثلثم اوراق معظم الاشجار الحرجية باستثناء الصنوبريات . وريقاتها هذه تنفذ ، عند الفذاع عن النفس ، سائل اخضر اللون كاي . طور الاكمال يقضي ضمن فليجة سمره اللون تحبكيها على الافناد او على الالواق المروة .

٣١٣٢٨ - سَبْكِيَّات <sup>○</sup> Cimicidae (S). Cimicidés (F)

فصيلة حشرات من رتبة عشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة الحد منتشرة في معظم افطار البلاد المعتدلة الحرارة . يكثر وجودها في الغابات والحراج الجبلية | اجسامها متوسطة القد او كبيرة ، مغاطمها ماصة . قرونها الاستشارية معتدلة الطول ، صفة الاطراف | يرقاتها خاضلة ، مؤذية عند كثرتها | اشهر اجناسها السنبك .

٣١٣٢٩ - سُنْقُس ، سَحُور <sup>○</sup> Suncus (S). Pachyure (F).

جنس حيوانات لبونة جاسة من فصيلة الزبابيات ورتبة الحشرات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطائها بعض مناطق العالم القديم احصاها الهند واثريقية وجزيرة مدغسكر | اجسامها صغيرة القد تطول من ٧ الى ١٢ سم . رؤوسها مخروطية الشكل . عيونها خريزية . اذناها صغيرة . جرائزها معتدلة الطول . اصابعها مجهزة باظافر حادة . اذناها طويلة . اذناها متباينة الالوان السوية تكثر فيها القصة والمصرة اللقائمة | اتانها اميز قدًا من ذكورها وانهمث ثوبًا منها | قوتها الحشرات والديدان .

٣١٣٣٠ - سَوُوزِي <sup>○</sup> Cénozoïque (F). Cénozoic (E).

نعت تعريفي يطلق ، حصليًا ، على برهة من الزمن تشمل الاحقاب التي توالى منذ الحقبة التوالية الى المعاصرة .

٣١٣٣١ - سَوِيَّ اللُّون <sup>○</sup> Concolore (F). Self-coloured (E).

نعت وصفي يطلق على ما كان ثوبه متساوي اللون الواحد .

٣١٣٣٢ - سَوِيلُ اللُّوْغ <sup>○</sup> Isosporé (F). Isoporous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات من مستورات الزهر الوعائية بوجه متجانس الشق والشكل .

٣١٣٣٣ - سَلَوُخ <sup>○</sup> Atypique (F). Atypic (E).

نعت تعريفي يطلق ، في علم النبات ، على كل تسلسل علوي يند عن القش الثاني .

٣١٣٣٤ - سُخُوص <sup>○</sup> Surrection (F). Upheaval (E).

الشخوص ، حصليًا ، هو الارتفاع الذي يطرأ على مكان معين من سطح الأرض .

٣١٣٣٥ - سُذِيرَة <sup>○</sup> Frustule (F). Frustule (E).

جسم صواني التركيب . شديد الصغر ، فصلته الموامل



صنقر

٣١٣٢٨ - صَبْوَة Blague (F). Tobacco-pouch (E).  
الصَبْوَة كيس من جلد يستعمل لحفظ التبن، التبغ  
المغروم، صغير القد يوضع في الجيب.

٣١٣٢٩ - صَبْرَة Enicognathus (S).  
Enicognathe (F). Enicognathus (E).

جنس طير من المصّلات وفصيلة البغاوات، اناوعه  
المعروفة قليلة العدد اعطائها البلاد الحارّة اخصها الهند  
وامريكة الجنوبيّة || ملجئها الحياتي جماعي، قوتها الثمار  
البريّة وبعض الحشرات || اجسامها معتدلة القد. تتميز  
بمناقيرها المستطيلة الافلاك العليا المخروّجة الشكل ||  
اشهرها فجرة الشيلي لونها الى الخضار الاسفج الموج.  
قمة رأسها واطراف قوائمها الى الزرق العابقة. محصرها  
وذنها الى الحرة القرمزية.

٣١٣٣٠ - صُرَاسِيَّة Delphinula (S). Delphinula (F).  
جنس حيوانات بحريّة من الرخويات مغيّات الارجل  
وفصيلة الصُرَاسِيَّات. اناوعها المعاصرة المعروفة قليلة  
العدد منتشرة في بعض بحار المناطق الحارة من العالم  
نقديم || اصداؤها شبه مخروطيّة الشكل، لؤلؤيّة  
الصفحات الناعمة، كثيرة التضاريس والتتواتر الشائكة  
من الخارج || اشهر اناوعها الصُرَاسِيَّة المِعْرَضَة  
(S). D. laciniosa التي يكثر وجوها في بحار الصين.

٣١٣٣١ - صُرَاسِيَّات Delphinulidae (S).  
Delphinulidés  
فصيلة حيوانات بحريّة من الرخويات مغيّات الارجل  
اماميّات الخياشيم الجعبيّة. اجناسها واناوعها المعاصرة  
المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارّة ||  
اصداؤها شبه مخروطيّة الشكل، كثيرة التضاريس  
والاطنات والتتواتر الشائكة. نواها مستديرة. اجسامها  
صغيرة، رحبة الارادية، معتدلة الارجل || اشهر اجناسها  
الصُرَاسِيَّة.

٣١٣٣٢ - صَاطِي Stationnel (F).  
نمت تعريفي يطلق، في علمي الحيوان والنبات، على كل  
هجين سقتر الصفات.

٣١٣٣٣ - صَاطِي Paratique (F). Paralic (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل ما هو خاص بالشطوط  
البحريّة.

٣١٣٣٤ - صَافَسَاة Glyptogénésis (F).  
Glyptogenesis (E).  
طور من اطوار المناشع الحصيليّة حيث العوامل الطبيعيّة  
الناقضة، اخصها الماء والرياح، قوّضت معالم القشامة  
الاولى.

٣١٣٣٥ - صَافَسَاة Aconuridae (S).  
Aconuridés (F). Aconuridae (E).  
فصيلة اسماك بحريّة من شاكيات الزعانف، اجناسها  
واناوعها المعروفة قليلة العدد جميعها صغيرة القد، وراعيّة

الاولان المزخرفة الجميلة || مسرحها بحار المناطق  
الحارّة. يكثر وجوها قرب وحاف وحشاف المرجان  
والرّجّان.

٣١٣٣٦ - طَهَب Panglum (S).  
Panglie (F). Panglun (E).  
جنس اشجار حرجيّة من فصيلة الطيهبات، منبتها البلاد  
الحارّة، يكثر وجوها في جاوا || سورها فروع. اورثاها  
مقلّعة، متباعدة. ازهارها ثنائيّة السكن. ثمارها صنيّة  
لويبة || اشهر اناوعها الطهبة المأكولة (S). P. edule  
منهاجاوا. جميع اجزائها من خشب ولحاء وتشور  
واوراق وثمار جعاليّة المائدة وافر الحامض السانديريكي  
|| ثمارها مأكولة بحدّ ثمنها ٨ ساعة في الماء. ويستخرج  
من بزورها بعد تقمها ايضا مادة زيتيّة سهلة شائعة  
الاستعمال || اما اشجارها فشميدة الصلاة فاخرة الصنف.

٣١٣٣٧ - طَهَبِيَّات Pangliaceae (S).  
Pangliacées (F). Pangliaceae (E).  
فصيلة نباتيّة من ثنائيات الفلقة. اجناسها واناوعها المعروفة  
قليلة العدد منها البلاد الحارّة والاسوائية من العالم القديم  
|| اعرف اجناسها واشهرها الطهبة والمصّرة.

٣١٣٣٨ - عَدْرِيَّات Andrena (S). Andrène (F).  
جنس حشرات حويّبة من فصيلة العدريّات. اناوعه  
المعروفة عديدة معظمها من علم المناطق الشاميّة. ملجئها  
الحياتي فريدي. اوكرها محاجر تحفرها في التربة ||  
اجسامها صغيرة شبيهة باجسام النحل. لواطها ثنائيّة منها  
السويّة اللون ومنها المنخّصة والمجّعة || قوتها رحيق  
الازهار وطعمها تختزن بعضه في نخراب ورتبة المائدة  
تقيمها في محاجرها كذالك لدها قبل ان تتحوّل الى  
حشرات جملانة سارحة || اشهر اناوعها واعماها انتشارا  
Andrena cineraria العدريّة الرماديّة  
Andrena fulva والعدريّة الصفراء

٣١٣٣٩ - عَدْرِيَّات Andrenidae (S).  
Andrenidés (F).  
فصيلة حشرات من الحويّبات ورتبة غشائيّات الاجنحة.  
اجناسها واناوعها المعروفة عديدة اعطائها المناطق  
الشاميّة وبعض الاقاليم المعتدلة المنخفضة نحو الباردة ||  
اجسامها صغيرة شبيهة بالنحل. لواطها ملوّنة تكثر فيها  
السمرة المختلفة الماجدة وبعضها اصفر او مخضّب  
بالاصفر الخضر || ملجئها الحياتي فريدي. الذكر يمش  
حتى زمن الدحاب فيكدم الاش ويلتاشي. الانثى تمتع  
مكثها في نثاريب خشاهما التي تقيمها في محجر تحفرها في  
التربة || اعرف اجناسها واشهرها العدريّين والسكود.

٣١٣٤٠ - عَدِيمَاتِ الخَلَايَا Pluricellulaire (F).  
Pluricellular (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل كائن حي مركّب من تكتل  
الخلايا.

٣١٣٤١ - عَدِيمَاتِ المِرْعَةِ Lipotyphla (S).  
Lipotyphles (F). Lipotypha (E).  
مرتبة من الحشريّات تتميز بخلوّ اسماها من المِرْعَة وشبه



فجرة



طَرَفِيَّةٌ ، ثمارها عَنَبِيَّةٌ لَوِيَّةٌ ۥ أشهر أنواعها العصرة السامة *H. venenata* (S) ثمارها سامة دافعة .

٣١٣٤٨ - عِنَاكَة °  
Gonochorisme (F).  
Gonochorism (E).

العناكة هي الانفصال الشقي . وهي بولوجيا عكس العنثية .

٣١٣٤٩ - عَيْك °  
Gonochorique (F). Gonochoric (E)  
تفت تعريفي يطلق ، بولوجيا ، على كل كائن وحيد الشق  
ان في الحيوان ام في النبات .

٣١٣٥٠ - عَوْس °  
Eos (S). Eos (F). Eos (E).  
جنس طير من المستققات وفصيلة الببغاوات . أنواعه  
المعروفة نحو ١٠ موطنها يمتد من الهند الصينية الى جزر  
الزباب . ملجنها الحياتي جماعي . افواجها تراوح من ٢٠  
الى ١٠٠ زوج ۥ اجسامها معتدلة القد . اناثها تراوح من  
العصرة الارجوانية الى الوردية ۥ اعرب انواعها  
واسهرها :

المَوْسُ الْيَاوُوي  
Eos rubra (S)  
المَوْسُ الكُوَشْنِيَنِي  
Eos Cochinchinensis (S).

٣١٣٥١ - عَوَمَان ، آوَرَان °  
Synergides (F).  
المعمران او الآرران اسم يطلق على خليتين تُوَاجِجُ نَصَّ  
المثك أو ينتهي بهما جراب الطلع .

٣١٣٥٢ - عُشَارِيَات °  
Pelliphytates, Profilicales (F).  
فئة من النبات تنتمي الى مستورات الزهر الوعائية .  
مركزها التسلسلي يأتي بعد المشركات وبين الخيئات  
والطحليات ۥ وهي من النباتات البسيطة التركيب العادة  
الجذور الحقيقية .

٣١٣٥٣ - عُثْلِيَّات °  
Galeidae (S).  
Galéides (F). Galeidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من السفكيات . اجناسها المعاصرة  
المعروفة ثلاثة ، جميعها من الاشلاق الوشعية الشكل ۥ  
تتميز بنمساها المغلوة بأغشية سادة متحركة . أشهر  
اجناسها واعما انتشارا الفطروس .

٣١٣٥٤ - عُثْلِيَتُون °  
Glyptodon (F).  
Glyptodon (E).

جنس حيوانات اصفورية من اللبونات البرد . احافيرها  
تعود الى الابعاج الرباعي . جميعها من المدرعات الامريكية  
المهد ۥ اجسامها ضخمة ، كبيرة ، مغطاة بذبال عظيمة  
سُسْمَةُ الزوايا ، اطوالها بما فيه الرأس والذنب نحو ثلاثة  
أمتار ۥ يقال انها كانت تعيش حياة التانو او المنزح .

٣١٣٥٥ - عُثْلِيل °  
Dentalium (S). Dentale (F)

جنس حيوانات بحرية من الرغويات الزورقيات وفصيلة  
الضليليات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار  
العالم ۥ اصدانها بوقية الشكل كل مردنية . منها الجالسة  
والمعلقة والمحسنة . صفحاتها الخارجة مخددة السطوح .

انعدام مرتقها الحوضي . وهي تضم سبع فصائل  
الزبايات والوطوبنيات واليبايات والفتنديات والمذليات  
والمكسبات والصربيات .

٣١٣٤٢ - عُشْرِب °  
Chrysochloris (S).  
Chrysochlore (F).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة الصربيات . انواعه  
المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع افريقية الشرقية  
والجنوبية ۥ شكله قريب الشبه بالخط . جسمه يطول من  
١٢ الى ١٦ سم . رأسه مخروطي الشكل ، ذلق الخطم .  
عيناه صغيرتان مغلوفتان بخشاة من الجلد متحركة . اذناه  
صغيرتان ، ماسحتان ، لاقوية التركيب . عنقه شديدة  
القصر ، ذنبه جعدة . جرامزه قصيرة ، مسحة باظانير  
ضليعة ، جاسة . الامامية منها رباعية الاصابع . الخلفية  
خصسيتها . ثوبه قسطنطي اللون كثيف الوبر الناعم  
القصر . الاثنى ابرز قدا من الذكر ۥ قوته الحشرات  
والبدان والزحافات الصغيرة ۥ أشهر انواعه :

العُشْرِبَةُ الْمُذْبِيَّة °  
Chrysochloris aurea (S).  
Chrysochlore doré, Taupe-dorée (S).  
موطنه افريقية الجنوبية . ثوبه قسطنطي اللون ، ذهبي  
المواج .

٣١٣٤٣ - عُشْرِيَّات °  
Chrysochloridae (S).  
Chrysochloridés (F) Chrysochloridés (E).

فصيلة حيوانات لبونة حاشرة من عديمات المعرفة ورتبة  
الحشریات . انواعها المعروفة عديدة جميعها جنس واحد  
الصرب ۥ اجسامها مكدرمة . اسطوانية الشكل ، صغيرة  
القد . رؤوسها مستغلطة ، مخروطية ، ذلقة الاخطام .  
عيونها صغيرة مغلوة بخشاة جلدي متحرك . اذناها  
صغيرة ، ماسحة . جرامزه الارامية مسحة باظانير  
نشيطة ، جاسة . اناثها قسطنطي اللون ، جميلة الماجات  
المترابكة ۥ كثيفة الوبر الناعم القصير . اناثها اكبر قدا من  
ذكورها .

٣١٣٤٤ - عُصِم °  
Holométabole (F).  
Holometabolous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة نامة التطور الاكمامي .  
م عسمة .

٣١٣٤٥ - عُثِيد °  
Tractus (F). Tractus (E).

اسم يطلق على الخيوط والحزم اللينة الموجودة في وثن  
النسج النباتية والحيوانية .

٣١٣٤٦ - عُصْبُون °  
Nevrax (F). Nevra (E).

اسم يطلق على الجهاز العصبي المركزي الذي يشمل  
الدماغ والنخاع الشوكي .

٣١٣٤٧ - عُصْوَة °  
Hydnocarpus (S). Hydnocarpe (F)

جنس اشجار حرجية من فصيلة الطهيبات . انواعها  
المعروفة ستة . منهاها البلاد الحارة والاستوائية ۥ اشجارها  
كبيرة دائمة . اوراقها متعاقبة . ازهارها محورية الاركان ،



عُشْرِب



عُوس



غليبتودون

Gal. tigrinus (S).

**قُرُصُوبٌ تَاجِي**  
يكثر وجوده في المحيط الهندي. طوله نحو ١٥٠ سم.  
ثوبه بين الصبغة والشفقة بالمرسة الماعية. بطنه  
الى الشبهة الماعية.

Phyllite, Phyllithe (F).

Phyllite (E).

ورقة مشجرة أو حجر نقشه الأوراق بوسوما.

Astrophysique (F).

Astrophysical (E).

**الفيزياء الكوكبية**  
الغزياء الكوكبية علم يبحث في طبيعة الكواكب وفي  
المنامح والإساليب التقنية الخاصة بها.



ظُرُوس

Bathyal (F). Bathyal (E).

**٣١٣٦٥ - بَاطِي**  
نعت تعريفي يطلق في علم الحفلة (الجيولوجية) على  
المنطقة البحرية التي يراوح عمقها من ١٠٠٠ إلى ١٠٠٠ م  
[من ميزات هذه المنطقة: عدم اضطراب المياه وتلفظها.  
استقرار الحرارة وتساويها. عدم نفاذ التور. قلة وجود  
النبت في الطبقة العليا وانحائها في الطبقتين الوسطى  
والسفلى. عظمها مصورة بالرخويات رأسيات الأرجل  
والقشريات والأسماك المقترسة والبسالة التي تعيش على  
المواد العضوية المائعة الى البث الراسية] أما الأثرية  
الكثائية أو الشسئية المنتشرة على سطح الأرض فهي  
بعضها تعود الى الغبار أو الصلصال القاعي الذي كان  
راسياً على هذه الأعماق في الإباح الأول.

Xérophilie (F). Xerophily (E).

**٣١٣٦٦ - قَافَة**  
القافة منشع طبيعي يتوقد النبات القن، الذي يرغب في  
المنخات الجافة، الى تكاثف الأدمة وأغوار الخلايا  
السمة في داخلها.

Dryopithecus (S).

Dryopithecus (E).

**٣١٣٦٧ - قُرْدُ العُص**  
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى قرد العُص. جنس قرد  
مقرضة تعود إحصائياً الى الزمن الميوسيني من الحقبة  
النوجينية [هيكلا العظمي شبيه بهيكل القورلي وشبه  
البامة من حيث القد] وقد ثبت الآن أن لا صلة بينه وبين  
السلالات البشرية.

Crossopeus, Neomys (S).

Crossope (F).

**٣١٣٦٨ - قُرُصُوب**  
حيوان ليون وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزبانيات  
ورثة الحشرات. أعطاه نعت من الصين الى أروية.  
بالت ضفاد الأناهر، هجوم وينطس في الماء فينتص  
الحشرات المائية وإسارها والإرابها والأسماك  
وبلاعتها [جسمه صغير القد، شبه بالزبانية. طوله ما  
فيه الذنب نحو ٢٠ سم. رأسه مخروطي الشكل، نلق  
العظم، عناءه صغيرتان، مستديرتان، عتقه قصيرة.  
تواليه كبة الإطراف، عاتمة الأصابع، حناها حلب لب  
جامد. ذنبه الذي يبلغ طوله نحو ٨ سم. شبه بمجاني  
الشكل، يطوقه حنا من الهلب القصير الجامد. ثوبه الى

اجسامها اسطوانية. أربيتها قليلة الرحابة. أرجلها  
قصيرة، ثلاثة ألق في تعيش متغمة في الرمال والأسمال.

Dentalidae (S). Dentalidae (F).

**٣١٣٦٩ - عُثْلِيَّات**  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات الزورقيات.  
اجناسها وأنواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع العالم.  
أكبرها قدأ أبعدها غوراً [أصنافها كسئية المانة، متبانة  
الاشكال والحجوم، منها المردنية والبونية والانوبية  
والكبيرة والصغيرة، جميعها مفتوحة الطرفين. صفائحها  
الخارجية مضمدة السطوح أو ماسية، الداخلة صقيلة  
أشهر اجناسها القليل.

Gamétophyte (F).

Gametophyte (E).

**٣١٣٧٠ - عُثَامَة**  
العثامة، في علم النبات، طور من أطوار الانصاب  
الشري؛ يبتدى مع التحويل الكروماتيني وينتهي عند  
الانصاب.

Anisotrope (F).

Anisotrope (E).

**٣١٣٧١ - عُثَرٌ مُسَاوِي الأَجَاه**  
نعت تعريفي يطلق، فيزيائياً، على كل مائة صفاتها  
الحكمية أو الميكانيكية لانسوية الأجاه.

Chlamyde (F).

**٣١٣٧٢ - قَحِيث**  
اسم يطلق على كل زهرة ثنائية الكم. ويطلق أيضاً على  
كل عضو يشبه غلات خارجي.

Tuniciers, Urochordates (F).

Urochordata (E).

**٣١٣٧٣ - قُصْبِيَّات**  
صفت حيوانات بحرية ركنية أو طوحيّة ملحونة يشبه  
القلقة [فصلها وأنواعها المعاصرة متوسطة العدد.  
اجسامها صغيرة القد، مستطيلة الشكل. تتميز بجهازها  
العصبي الظهري الأركاز وهو مؤلف من مكاش شوكي  
يمتد لشداد الجسم. أما التنفس فتؤمّه فروع خيشومية  
مركزها في جانبي البلعوم.

Interstellair (F).

Interstellar (E).

**٣١٣٧٤ - قَافَا عُثْاسِي**  
اسم يطلق على الفضاء القائم بين النجوم والمجرات.

Galeocerdo (S).

Galeocerdo (F). Galeocerdo (E).

**٣١٣٧٥ - قُرُوس**  
جنس اسماك بحرية من السنفيات ونسيلة الطجيات.  
أنواعها المعاصرة المعروفة ثلاثة أمّا المقرضة المتحجرة في  
الأراضي الطباشيرية والثالثة فأربعة [اجسامها وشبه  
الشكل تطول من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. تتميز بأشنانها  
الحززة والتساوية العدد في الفكين] أشهر أنواعها  
المعاصرة ظُرُوس الشمال والظُرُوس البوري

Gal. Arcticus (S).

**قُرُوس الشمال**  
يكثر وجوده في بحار الشمال. ثوبه الى الزرق الخضراء.  
طوله من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم.

**٣١٣٧٣ - قَمَاصِيَّات** <sup>٥</sup>  
Bittacidae (S). Bittacidae (F).  
نصيلة حشرات قانصة من رتبة شارقيات الاجنحة  
عصبيّات الجناح. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة  
منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء المناطق الشاميّة |  
اجسامها تضيق متباينة الطول. قوائمها مستطيلة.  
اجنحتها ضيّقة، مستديرة الاطراف | قوتها كل ما  
استطاعة قصه من ذباب وهوام وحشرات. يرقاتها  
بأكثرتها دائمة نائلة ومنها الواجبة والقِرْصَامَة | اشهر  
اجناسها القَمَاصَة.

**٣١٣٧٤ - قُوسِيَّة** <sup>٥</sup>  
Xenophora (S). Xenophora (F).  
جنس حيوانات بحريّة من الرخويّات مميّات الأرجل  
اماميّات الخياشيم ونصيلة القمعيّات. انواعها المعروفة  
قليلة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارّة | اصداؤها  
شبه مظليّة الشكل، كلسيّة المادّة، متراكبة الاطراف  
المتباينة الاشكال والالوان | اعرف انواعها واطهرها :

X. lithophora (S). القمعيّة المصنّعة  
X. corrugata (S). - القمعيّة المصدّعة

**٣١٣٧٥ - قُمَيْيَّات** <sup>٥</sup>  
Xenophoridae (S). Xenophoridae (F).  
نصيلة حيوانات بحريّة من الرخويّات مميّات الأرجل  
اماميّات الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة  
العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارّة | اصداؤها  
صغيرة القد، مظليّة الشكل او صويانيّة. صفحاتها  
الساخلة عاصمة المادّة اللؤلؤيّة اما الخارجيّة فندبجة  
بالزخارف والاطراف المتباينة الاشكال والالوان | اشهر  
اجناسها واعرفها القمعيّة.

**٣١٣٧٦ - قُرَاسِمَة** <sup>٥</sup>  
Nomada (S). Nomade (F).  
جنس حشرات حمويّة من عشائيات الاجنحة وفصيلة  
القُرَاسِمَيات. انواعها المعروفة نحو ١٢٠ منتشرة في جميع  
اقطار العالم | اجسامها رشيقة مهيّاء متوسّطة القد او  
صغيرة. اناؤها متباينة تغلب فيها الشقعة فالصبة  
والتنجيع بالاصفر او الزنجفري | الحشرات الجبلانة  
تمشي على رحيق الازهار واطعمها. يرقاتها طفليّة تمشي في  
محاجر الدريّيات والنوّاريّات وغيرها.

**٣١٣٧٧ - قُرَاسِمَيات** <sup>٥</sup>  
Nomadidae (S). Nomadidae (F).  
نصيلة حشرات حمويّة من رتبة عشائيات الاجنحة.  
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع  
العالم | نظامها الحياتي فردي. اناؤها تضع المكن قرب  
مداخل محاجر غيرها من عشائيات الاجنحة احصاها  
الدريّيات والهلمكوسيّات والنوّاريّات، فتصرع البرقات  
فور نفقا الى داخل المحاجر حيث تمشي كامل حياتها  
البرقيّة على ما تبنيه العوائل | اشهر اجناسها القُرَاسِمَة.

**٣١٣٧٨ - قَيْسِيّ** <sup>٥</sup>  
Phénotypique (F). Phenotypic (E).

ويدعى النمط الظاهري. نعت تعريفي يطلق على كل ما له  
صلة بالنمط. التنازل للقيسي لا وراثي.

الشبهة السمراء تشبه سموتها في الظهر وتغير في الصدر  
والطن | الاشيّ اميز قنّا من الذكر وتحتلّى باللوب نفسه.

**٣١٣٦٩ - قِرْصَامَة** <sup>٥</sup>  
Crocodura (S). Crocodile (F). Crocodile (E).  
جنس حيوانات لبونة من فصيلة الزبانيّات ورتبة  
الحشريّات. انواعها المعروفة نحو ٦٠ اعطانها البلاد  
الحارّة والعمدلة الحارة من العالم القديم. جميع انواعها  
جاسّة قوتها الحشرات والبهائم | اجسامها تطول من ١٢  
الى ٢٦ سم. رؤوسها مخروطيّة، ذلّة الاعظام. عيونها  
صغيرة، مستديرة، اذانها ماسحة. جرامها معتدلة القد،  
خصاسية الاصابع، مستطيلة الاظفار الحادّة. اناؤها  
تزاوج من السمرة الضنيّة المواج الى السمرة المابقة |  
اذاها اميز قنّا من ذكرها، يعتقد ان حملها يوم نحو  
٢٠ يوما تضع في تمامه من ٣ الى ١٠ ايراص وذلك  
حسب الانواع.

**٣١٣٧٠ - قِرْط** <sup>٥</sup>  
Embletonia (S). Emblétonie (F).  
جنس حيوانات بحريّة من الرخويّات مميّات الأرجل،  
خلقيّات الخياشيم، جلبانيّات التنفس. انواعها المعروفة  
قليلة العدد منتشرة في بحار النصف الشمالي من الكرة  
الأرضيّة | اجسامها صغيرة، عريضة، عاصمة  
الاصداص، مستطيلة الشكل، عديدة اللوامس القمويّة  
الاهليجيّة، المبطّلة | معظم انواعها يعيش على  
الصخور البعيدة للغور.



قِرْصَامَة

**٣١٣٧١ - قُورِسيَّات** <sup>٥</sup>  
Xyridaceae (S). Xyridacées (F).  
نصيلة نباتيّة من وحيدة الفلّة. اجناسها وانواعها المعروفة  
متوسّطة العدد. مهدها بعض الاصقاع الاسيويّة  
والامريكيّة. جميعها من ثوب المناطق والمواقع الرطبة |  
نباتاتها جنمويّة ممتّرة. اولواتها قرصيّة الانتساب عصبية  
الشكل او منصليّة. تنويرها شعراخي: سننلي التجميع،  
هامي الارتكاز. ازهارها خنثويّة، كبيرة القد، ملوّنة.  
اكمامها مضغفة الراسات. ثمارها جرداء ثلاثيّة الفلق.  
يزورها آحيّة، تشوبه المادّة.

**٣١٣٧٢ - قَمَاصَة** <sup>٥</sup>  
Bittacus (S). Bittaque (F).  
جنس حشرات قانصة عصبية الجناح من فصيلة  
القَمَاصِيَّات. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم  
اقطار العالم | اجسامها تضيق مستطيلة القوائم والاجنحة.  
يكثر وجودها في المواقع الرطبة وقرب مجاري الماء |  
جميعها معتدلة قوتها الذباب والهوام. يرقاتها دائمة نائلة  
تمشي في الجلالة وتحت المدر.

**القَمَاصَة القمعيّة** <sup>٥</sup>  
B. tipuloides (S). اعطانها شرقي حوض البحر الابيض المتوسط  
**القَمَاصَة الافريقيّة**  
B. capensis (S). اعطانها معظم مناطق افريقيّة الجنوبيّة.  
**القَمَاصَة البرازيليّة**  
B. Blancheti (S). اعطانها البرازيل وخاصة حوض الامازون.

Colloïde (F). Colloid (E).

٣١٣٨٦ - كُولِيد

اسم يطلق في علم الكيمياء على كل جسم لا يذوب في الماء كالصمغ شبه المتبلورات.

Prothella (F).

Prothallium, Prothallus (E).

٣١٣٨٧ - كُثَمَّة

تنوء صغير ، صفحي الشكل غالباً ، يطلو بويضة مستورات الزهر الوعائية ، تنوء عليه الاثيرة والسمن.

Condylura (S). Condylure (F). ٣١٣٨٨ - كَنْدُل

حوان لون جاش وحيد الجنس والنوع من فصيلة الطوبيتات ورتبة الحشرات ، موطنه امريكا الشمالية | جسمه صغير القد ، اسطوانتي الشكل ، يطلو نحو ٢٤ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١١ سم. رأسه مخروطي الشكل ينتهي بقنطرة صلبة بطولها اكمل من انحاء طليستان. ثننه بمطر الهلب الحصر. جرابه خرافية الاصابع المجزأة باظفار قوية ، مستطيلة. ثوبه ابيض اللون ، اشجع الموج | الاثي اميز قدا من الذكر واهت ثوبا منه. تحمل مرة واحدة في العام وتضع من يرصين الى خمسة ايراص | قوت الحشرات والبدان. يعيش في ثقب يخلده على عمق يراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم.

Terre non cultivée (F).

٣١٣٨٩ - كَنْكُث

الكثكث كل تربة غير مزروعة مستحالة كانت او غير مستحالة.

Exothermique (F).

Exothermic (E).

٣١٣٩٠ - لَاحِش

نعت تعريفي يطلق على كل تفاعل كيميائي ينشأ الحرارة الناتجة عن تفاعله او تركبه.

Bressolis (S). Bressolis (F).

٣١٣٩١ - لُجَائِيَّة

جنس حشرات فراشية صولجانيات القرون من فصيلة اللُجَائِيَّات ورتبة حشرات الاجنحة | انواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها البلاد الحارة. اجسامها كبيرة القد. روافدها مائلة جميلة التخضب. قوتها الانتشارية صولجانية الشكل | اسرارها خافتة. ملجئها الحياتي جماعي. مجموعاتها تترك بعض المئات. تعيش في جراب واحد غشائي المائدة. تخرج في الليل وتعود لي جرابها في النهار. تلثم اوراق الكثير من النبات ومنها اللوز فتؤذيها اشد الاذى.

Bressolidae (S).

Bressolidae (F).

٣١٣٩٢ - لُجَائِيَّات

فصيلة حشرات من رتبة حشرات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها البلاد الحارة | الافريقية والامريكية | جميع انواعها كبيرة القد ، جميلة الالوان والتهيج والزخرفة | اسرارها خافتة قوتها اوراق النبات. جميعها شرذمية الملجئ الحياتي تعيش مع بعضها البعض في اجرة كبيرة خائفة المائدة تبيت فيها من

Bathymétrique (F).

Bathymetric (E).

٣١٣٩٤ - قِيَاسِي

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالقياصة.

Castnidae (S).

Castnidae (F). Castnidae (E).

٣١٣٩٥ - كَسْتِنِيَّات

فصيلة حشرات فراشية من حشرات الاجنحة مختلفات القرون. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع المناطق الاستوائية اعطتها امريكية | جميع انواعها متوسطة القد او كبيرة. تتميز بجمال روافدها الخفيفة القشار الساطعة الالوان. وتتميز ايضا باسترسال روافدها عند الراحة ، على شكل جملون | اشهر اجناسها الكسنيانة.

Castnia (S). Castnia (F).

٣١٣٩٦ - كَسْتِنِيَّة

جنس حشرات من حشرات الاجنحة وفصيلة الكسنيئات انواعها المعروفة عديدة اعطائها معظم الاقاليم الاستوائية | اجسامها كبيرة القد تطول من ٣٥ الى ٤٥ مم. ويصلحها تراوح بين ١٠٠ الى ١١٥ مم. روافدها خفيفة القشار جميلة الالوان الساطعة الموج يكثر فيها الاسمر الحنطي يطوله تجنيد وتفتح يراوح ، حسب الانواع ، من الاصفر الكبريتي الى الاحمر القرميدي | اسرارها مؤذية تخلف سوق الموز والانناس والصابار وغيرها من النباتات اللينة.

Atta (S). Atta, Atte (F).

Atta (E).

٣١٣٩٧ - كُطْبِيَّة

جنس حشرات من غشائيات الاجنحة وفصيلة النمليات. انواعها المعروفة قليلة العدد. معظمها امريكية المهد. ملجئها الحياتي جماعي كسائر انواع النمل | اجسامها معتدلة الحجم لكنها تتميز بكبر وبخلاطة رؤوسها ، فكوكها حادة فاضمة ، حماتها ذرية تهريق مائة مخثرة.

Calamariidae (F).

٣١٣٩٨ - كَلَمَارِيَّات

فئة نباتات متشجرة يعود ظهورها الى الحقبة الكربونية. نباتاتها قريبة الشبه بالكنائيات. سوقها لينة ، معشوشة ، مجوفة ، تطول من ٤ الى ١٠ امتار اوراقها خافتة الانتساب ، عصفية الشكل ، مستطيلة. اعرف نباتاتها الكليمات والبصريات.

Culm, Dinantien (F).

Culm, Dinan (E).

٣١٣٩٩ - كَلِمِي

كلمي من «كولم» اسم موقع في المانية. ونباتاني من «دينان» اسم موقع في بلجيكة | ساق او طبقة من الحقبة الكربونية تتميز بشبهها الكثير المائدة النباتية.

Calamite (F). Calamite (E).

٣١٣٩٥ - كَلِمِيَّة

جنس نباتات متشجرة يكثر وجودها في الحقبة الكربونية من الاباح الاول | تعتبر من الاسوسيات الجارة المتقرضة. شكلها قريب الشبه باليوس. ارتفاعها يراوح من ٧ الى ٨ امتار.



كندل

Laurentien (E). Lawrentian (E). ٣١٣٩٧ - لَوْرَنْتِيَّة ٥  
نمت تمريني يطلق على الطليقة السفلى من الحقبة السحيقة  
العائدة الى الاباح ما قبل الكمبري .

Lithosidae (S). ٣١٣٩٨ - لِيثُوْسِيَّات ٥  
Lithosidés (F).  
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيّات الاجنحة . اجناسها  
وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها المناطق الجبلية  
والاقاليم الباردة من العالم القديم | اجسامها كثيفة الخمل ،  
شبه لسطوانية الشكل ، تطول من ٢٢ الى ١٨ مم . سطنها  
تراوح من ٤٢ الى ٥٢ مم . رؤوسها مزوانية الشكل .  
عيونها صغيرة . ملاسها ومراسفها دقيقة . قرونها  
الاستشعارية خيطية . رواشنها الامامية ضيقة . اثوابها  
عامة الزعرقة ، الوانها تختلف مع اختلاف الانواع  
| اشهر اجناسها الليتوزية .

Lithosia (S). ٣١٣٩٩ - لِيثُوْسِيَّة ٥  
Lithosia (F). Lithosia (E)  
جنس حشرات فراشية من فصيلة الليتوزيات . انواعها  
المعروفة نحو ٣٠ اعطائها جبال البالد المعتدلة الحرارة  
من العالم القديم | اجسامها متكاثفة الخمل الناعم تطول  
من ١٥ الى ١٨ مم . سطنها تراوح من ٤٥ الى ٥٢ مم .  
رؤوسها معتدلة الجسم ، صغيرة العيون ، دقيقة الملاص  
والمراسف . ازيتها خيطية الشكل . رواشنها الامامية  
ضيقة . مقطوعة الاطراف . رواشنها الخلفية رحبة  
الانفراج ، مستديرة الاطراف | اساريها تعيش على  
الحزاز .

Endothermique (F). ٣١٤٠٠ - مَاحِيْش ٥  
Endothermic (E).  
نمت تمريني يطلق على كل تفاعل كيميائي يمتص الحرارة  
الناجمة عن تفاعله | معظم المتفجرات من العناصر  
الماحشة .

Hétérothallique (F). ٣١٤٠١ - مَكْبَانِ الْمَشْرِ ٥  
Heterothallic (E).  
نمت تمريني يطلق في علم النبات على كل جهاز عضوي  
يجاري منشع التباين المشري .

Homothallique (F). ٣١٤٠٢ - مَسَاوِي الْمَشْرِ ٥  
Homothallic (E).  
نمت تمريني يطلق في علم النبات على كل جهاز عضوي  
يجاري منشع التساوي المشري .

Triquètre (F). ٣١٤٠٣ - مَكْلُوْث ٥  
نمت تمريني يطلق في علم النبات على كل سطح مستدير  
تلوه ثلاث زوايا ناشرة تتخللها ثلاث زوايا غائرة .

Vitellogène (F). Vitellogen (E). ٣١٤٠٤ - مَحَاخ ٥  
مَحَاخ او مَحَاخَة نمت تمريني يطلق في علم الفيزيولوجية  
على غنية تنشأ منها الخلايا المحية المزودة بالمواد  
الغذائية عند المنطقات والمنطقات .

الصباح الى الغروب لانها تسرح في الليل سعيًا وراء الزاد  
| اشهر اجناسها للجابية .

Cuterebra (S). Cutérébre (F). ٣١٣٩٣ - لَحَاظَة ٥  
جنس حشرات من رتبة ذوات الجناحين وفصيلة  
الحاظيات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في بعض  
اقطار العالم اخصها امريكة الجنوبية والشرق الاقصى |  
اجسامها مكرسة ، شبه اسطوانية الشكل . رؤوسها وعيونها  
ناشزة . ازيتها نحيلة وتضيرة . اعطائها فصحة اثوابها  
ملونة ، مجذعة الكوسل والبطون | اناها تمتع المكن على  
جلود معظم الحيوانات الوحشية والداجنة فينقت عن  
يرقات دقيقة تنقب جلد المائل حيث تعيش كامل طورها  
البرقي . طور الاكمال ينقضي في التربة وينتهي بظهور  
الحشرة الجلجلة .

Cuterebridae (S). ٣١٣٩٤ - لَحَاظِيَّات ٥  
Cutérébridés (F). Cuterebridae (E).  
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين قصيرات  
القرن . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٦٠ تألف الحراج  
والغابات والمراعي . معظمها امريكي المهد وبعضها  
اسوي | اجسامها صغيرة مكرسة . رؤوسها معتدلة  
الضخامة ، ناشزة . عيونها كبيرة . قرونها الاستشعارية  
قصيرة ونحيلة . اعطائها صغيرة القد ، فصحة . اثوابها  
مجزعة | اناها تمتع المكن على جلود الحيوانات البرية  
والالهة فينقت عن يرقات صغيرة ، دقيقة تنتم في جلد  
المائل فتسبب له قروح وسامل وتبقى حتى يحين زمن  
الاكمال فتخرج عوائلها الى التربة حيث تتحول الى  
حشرة جلجلة | اشهر اجناسها الحَاظَة .

Gracilaria, Caloptilia (S). ٣١٣٩٥ - لَدَاسَة ٥  
Gracilire (F).  
جنس حشرات فراشية من حرشفيّات الاجنحة وفصيلة  
الداسيات . انواعها المعروفة نحو ٤٠ اعطائها معظم  
اقاليم البلاد المعتدلة الحرارة | اجسامها صغيرة نحيلة  
تطول من ٤ الى ٦ مم . سطنها يتراوح من ١٠ الى ١٤  
مم . قرونها الاستشعارية خيطية مستطيلة . مراسفها  
وملاسها نشطة . رواشنها جميلة التخضيب الزاهي ،  
مستعرضة التهذيب المتحاري | اساريها تعيش على اوراق  
الاشجار العائلة اخصها اللبك والحوور واليزفون  
والنولا .

Gracilaridae (S). ٣١٣٩٦ - لَدَاسِيَّات ٥  
Gracilaridés (F).  
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيّات الاجنحة . اجناسها  
وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها معظم مناطق  
البلاد المعتدلة الحرارة | اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة  
الزباني الخيطية الشكل ، مهدبة الرواشن الجميلة  
التخضيب . تتميز برؤوسها المزوانية الشكل ومراسفها  
النشطة وبملاسها اللكية اللونية | اساريها تعيش على  
اوراق الاشجار النفضية اخصها الحرجية والتزيينية |  
اشهر اجناسها اللداسة .

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الفرغيات. انواعها المعروفة عديدة اعطانها بحار البلاد الحارة اوصافها مستعرة، مطولة، تطول من ١٥ الى ٢٥ سم. رؤوسها صغيرة. عيونها مستديرة، جاحظة. اخطامها ناشزة الفك الاسفل. اثنائها فضية اللون يطولها تحشيب ممترض اسود. زعانفها الظهرية والشرجية شائكة. وزعانفها الذيلية فارقة ا لسومها ماأكولة.

Ginkgoles (F).

٣١٤١٣ - مَمْبَل

اطلب جينكوات.

Bathomètre, Bathymètre (F).

Bathometer, Bathymeter (E).

٣١٤١٤ - مَقْيَاق

المقياس جهاز يرتكز على الثقل النوعي يستعمل في سبر اغوار البحار.

Syngamie (F). Syngamy (E).

٣١٤١٥ - مَكَاكِمَة

المكاملة في علم النبات هي اتحاد الاشراج في التناسل اللقي.

Autochtonie (F).

٣١٤١٦ - مَكود

راجع تيك.

Solenodon (S). Solénodon (F).

٣١٤١٧ - مَكيس

Solenodon (E).

جنس حيوان لبون من فصيلة المكسيات. له نوعان يعيشان في جزر الايتل. والمكيس هو اسمه في تلك البلاد ا جسمه يطول نحو ٦٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٥ سم. شكله شكل الجرد الا انه اسفني الرأس الذي ينتهي بخرطوم قصير. وهو كيف الهلب الجلد، عري الذنب ا ملجنه الحياقي فريدي. يسرح في الليل، قوته الحشرات والديدان والزحافات الصغيرة وبعض الثمار البرية والجذور ا اما نوعا فهما مكيس الايتل S. Cubanus (S) ومكيس كوبا S. Paradoxus (S). مكيس الايتل كان كثير الوجود في جزيرة مايني الى حين اندخلوا على الجزيرة بعض الثنوس للفضاء على الاتاعي نقضت على الاتاعي والمكيس.

Enkysé (F). Encysé (E).

٣١٤١٨ - مَكَيْس

المكيس، في علوم البيولوجية والطب والنبات، هو ما كان موجودا ضمن كيس.

Solenodontidae (S).

٣١٤١٩ - مَكَيْسِيَّات

Solenodontiidae (F). Solenodontiidae (E).

فصيلة حيوانات من الثدييات عيشات المرغة ورتبة الحشرات. المعاصر منها الآن جنس واحد يدعى مكيس يشتمل على نوعين مهدهما جزر الايتل الكبرى والصغرى.

Menotyphla (S).

٣١٤٢٠ - مَمْرُغِيَّات

Ménotyphles (F). Menotyphla (E).

مرتبة من الحشرات تتميز حيواناتها بوجود المرغة

Endothermicité (F).

٣١٤٢٥ - مَمَاكِمَة

Endothermicity (E).

المحاشية، كيميائيا، هي امتصاص الحرارة الناتجة عن تفاعل بعض الاجسام أو العناصر.

Panspermie (F). Panspermy (E).

٣١٤٢٦ - مَمَاكِمَة

الفادة، ببولوجيا، نظرية افتراضية تمتح عن اصل الحياة ومصدرها. ملخصها ان الحياة على الارض تعود الى جراثيم كونية انتقلت في الفضاء من بعض الكواكب ا الثلاثة العلمية الحديثة تني هذه النظرية ذلك لأن لشعة ما وراء البنفسجي التي تهين على الفضاء الخارجي لا تسمح بالحياة لأي جرثومة كانت.

Marattiaceae (S). Marattiacées, Maratiées (F). Marattiaceae (E).

٣١٤٢٧ - مَمْرِيَّات

فئة نباتات من مستورات الزهر الوعائية تنتمي الى الشرنديات. انواعها المعروفة عديدة، معظمها من متحجرات الازمنة الغائرة. اما المعاصر منها فنحو ٥٠ جميعها من ثبوت المناطق الحارة ا سوقها قصيرة، بونصية الشكل، منتصبه. اوراقها ضمية الارتكاز، تاجية الانتساب، كبيرة القد، تطول من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. نصالها مستعرة يغلب فيها التفرخ الريشي ثم الكتي.

Cipolin (F). Cipolin (E).

٣١٤٢٨ - مَمْرِير

ججر من الجنس المتطور تختزفه عروق من الطلق (ميك) مشتركة المركز. يستعمل استعمال الرخام وهو اصلب منه.

Tactisme (F). Tactism (E).

٣١٤٢٩ - مَمْسَاك

تفاعل أو ارتكاس الخلقة الحية من جراء تأثيرات مختلفة المصادر، ككهوائية، حرارية، كهربية، الخ ... تأثيرات قد تكون جاذبة أو دافعة فتدعى لجاذبية أو سلبية.

Thelloide (F). Thalloid (E).

٣١٤٣٠ - مَمْشَرِي

هو في النبات ما كان تركيبه وشكله كالشعر.

Crossoptérygiens (F). مَصْلَبَات الزَعَايِف

٣١٤٣١

Crossopterygii (E).

فئة من الاسماك اللامعات يعود ظهورها الى الحقبة الباليوتية. اجسامها مستطيلة الشكل تتميز بزعانفها الوضعية والبطنية الشاذة عن الفتوس المألوفة وذلك بانتشائها عند مؤخر الصدر والبطن، وبارتكازها على مادة حريشقة ناصلة. زعانفها الذيلية معددة ومصلبة ا فصائلها واجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، معظمها من متحجرات الحقبة الباليوتية وما يلها. النوع الوحيد المعاصر والمعروف حتى الآن يدعى «لانيمره» وهو من عظم ارتخيل الكومور في المحيط الهندي. يعيش بين منطقتان الصخور وفي تجاويها على اعماق براوح غورها بين ٣٠٠ و ١٢٠٠ م.

Glyphisodon (S).

٣١٤٣٢ - مَمَاكِمَة

Glyphisodon (F). Glyphisodon (E).



مَمَاكِمَة



مَكيس

- Méiotique (F). **مَيُوزِي** ○ ، **إِنْتِيدَايِي**  
Meiotic (E)  
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالموزة أو الانقسام.
- Propodite ○ **نَاجِدٌ** ٣١٤٢٨  
اسم يطلق على الفصلة قبل الأخيرة من قوائم القشرينات عشاريات الأرجل.
- Allométrique (F). Allometrie (E). **نَاسِجٌ** ○ ٣١٤٢٩  
نعت تعريفي يطلق في علم البيولوجية على كل عضو يتميز بنوعه لا تنسجم مع نوعة سائر الاعضاء الأخرى.
- Coccolithe (F). **نَبِيثٌ** ○ ٣١٤٣٠  
النبيت جسم مجهرى من كربونات الكالسيوم مشبع بالمواد الموضوية يرسب في قاع البحر.
- Hétérosporé (F). **تَبِيلُ الْبُوغِ** ○ ٣١٤٣١  
Heterosporous (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل نبات من مستورات الزهر الواعائية كمخخه متباينة البوغ المختلف الشق.
- Gametangie (F). Gametangy (E). **نَازَكَةٌ** ○ ٣١٤٣٢  
النادة طريقة إخصاب شائعة عند الفطور وبعض العنثيات. قوامها النحام النازك الذكورية بالانثوية واتماجها قنلاحتها وإخصابها.
- Gamétange (F). Gametange (E). **نَازِكَةٌ** ○ ٣١٤٣٣  
النزدة في علم النبات هي الخلية الأم أي أم الغامات عند النباتات الدنيا ومنها الفطور وبعض العنثيات.
- Histogène (F). Histogenous (E). **نَسَاجٌ** ○ ٣١٤٣٤  
اسم يطلق على العناصر والمواد الحيوانية التي تتكون منها الأنسجة الحية.
- Histogénèse, **نَسَاجَةٌ** ○ ، **هِيستُوجِينَةٌ**  
Histogénie (F). Histogenesis, Histogeny (E).  
قسم من النعارة ، علم الاجنة ، يبحث في تكوين النسيج الحية وفي تطورها.
- Histogénique (F). Histogenic (E). **نَسَاجِيٌّ** ○ ٣١٤٣٦  
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالنساجة.
- Allométrie (F). Allometry (E). **نُسُوجٌ** ○ ٣١٤٣٧  
خاصة جسمية تتمتع بها عضو من الاعضاء فيسرع نشاط نومه أو بانقاصها بالنسبة الى سائر اعضاء الجسم . وهو ما يميز عنه النسوج الإيجابي أو السلبي.
- Chète (F). **نُسْجَةٌ** ○ ٣١٤٣٨  
زائدة دقيقة إبرية الشكل تطلو زجان الحشرة في فصلته الأخيرة . يقال ان وظيفتها تماثل وظيفة الهلب الذي يعلو الفصل عند بعض الحشرات.
- والمرتقن الماني أو المحوشي . وهي تضم فصيلة الحداديات وفصيلة الطواحيات .
- ٣١٤٣١ - **مُنْدُولَةٌ** Monedula (S). Monédula (F).  
جنس حشرات ناقصة من الحواريات وفصيلة الوراشيات . أنواعها المعروفة نحو ٣٠ مظهرها أمريكية المهد | أجسامها متوسطلة القد أو كبيرة ، قرينة الشبه بالزنابير . أتبائها ملونة تكثر فيها الصفرة المجذعة بالأسود أو الأسمر | تقبم أصفانها في محاجر تحفرها في التربة الرملية على أعماق تراوح من ٥ الى ٧ سم | قوتها ما تستطيع اقتناصه من حشرات إخصها الذباب والهوم والناثع عن العناكب والنمل .
- ٣١٤٣٢ - **مِيُوزُونٌ** ○ Mésosozaire (F).  
راجع ناتي الاوالي .
- ٣١٤٣٣ - **مِيكْرُوجَنْيَّةٌ** ○ Microénergétique (F). Microenergetic (E).  
علم من علوم الفيزياء يبحث في بُدَّة (كوانتا) الطاقة أو الجهد .
- ٣١٤٣٤ - **مِيكْرُوفِيْزِيَاءٌ** ○ Microphysique (F). Microphysics (E).  
قسم من علوم الفيزياء يبحث في الذرة .
- ٣١٤٣٥ - **مِيْمَارٌ** ○ Mymar (S). Mymar (F). Mymar (E).  
جنس حشرات مطفلة من غشائيات الاجنحة وفصيلة الميماريات . أنواعها المعروفة قليلة لا تتجاوز السبعة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة | أجسامها شديدة الصغر تطول نحو ٠,٦ مم . تتميز بأجنحتها المتباينة الشكل والحجم ، الأمامية منها مجنادة مهذبة الأطراف ، الخلفية ضيقة ، معلاية الشكل ، عادمة الوزن . زباني ذكورها محيطية ، زباني انثائها صولجانية | جميع أنواعها مطفلة تعيش على مكن الحشرات المختلفة الفصائل .
- ٣١٤٣٦ - **مِيْمَارِيَّاتٌ** ○ Myrmidae (S). Myrmadés (F). Myrmidae (E).  
فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المخسورة . أجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد أعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة | أجسامها شديدة الصغر تطول من ٠,٥ الى ٠,٨ مم . رؤوسها مستعرضة ، مقطوعة الاقضية . قرونها الاستشعارية مستطيلة ، عديدة الفصل ، من ٨ الى ١٣ . زين الاناث صولجانية الأطراف . أعناقها دقيقة . صورها شبه بيضية ، خصوصها انبوبية ، مستطيلة عند معظم الأنواع . بطونها شبه مردنية . أجنحتها الامامية مجنادة الشكل ، مهذبة الأطراف ، مستطيلة الاهداب . أجنحتها الخلفية معلاية ، ضيقة . قوائمها مستطيلة | جميعها مطفلة تعيش على مكن الحشرات من مختلف الفصائل والترتب . ومنها التي تفوص في طلب مكن الحشرات المائية | يرقاتها مرقالة وعادمة الرؤوس والمنافذ القوية ، تتغذى بالتناوب | أشهر أجناسها وأعرقها الميمار .

جنس حشرات من الحويّات وفضيلة الهلكتوسيات.  
انواعها المعروفة نحو ١٢٠ متشرة في معظم مناطق البلاد  
المعتدلة الحرارة حتى في جبالها | اجسامها مستطيلة  
الشكل، متوسطة القد أو صغيرة، ذكورها اميز قداً من  
اناثها. اناثها قليلة التباين بين الانواع، تكثر فيها الشهية  
والشفقة والتزهر البطنى بالأصفر أو الأطلح أو الاسمر |  
جميعها تصفن في محاجر تحتفروا في التربة. قوتها رحيق  
الازهار وطلها | أشهر انواعها الهلكتوس السداسي الزناتير  
H. sexnotus. تويه الى السمرة السوداء اللوام، زناتيره  
البطنية طحلاء اللون، ثلاثية الأزواج.

### ٣١٤٤٨ - هَلِكُوسِيَّاتٌ (F) Helictidae (S)

فضيلة حشرات من الحويّات ورتبة عشائيات الاجنحة.  
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة متشرة في جميع اصقاع  
البلاد المعتدلة الحرارة | اجسامها متوسطة القد أو صغيرة.  
ذكورها اغلظ من اناثها واطول منها. قوتها رحيق الازهار  
وطلمها | تقيم اصنافها في محاجر تحتفروا في التربة | أشهر  
اجناسها الهلكتوس.

### ٣١٤٤٩ - هَلِكُونِيَّاتٌ (F) Heliconiidae (S)

فضيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. اجناسها  
وانواعها المعروفة نحو ١٦٠ جميعها من علم امريكة  
الجنوبية | اجسامها نقيقة مستطيلة أو معتدلة الطول.  
رواشنها كبيرة، مستعيرة الاطراف، جميلة الالوان الزاهية  
والزخرفة المنسقة | معظم انواعها يفرز عند الدفاع عن النفس  
مادة سائلة صفراء اللون كريهة الرائحة | اساريها تعيش  
على اوراق النبات | أشهر اجناسها الهلكتونوس.

### ٣١٤٥٠ - هَلِكُونِيُوسٌ (F) Heliconius (S)

جنس حشرات من حرشفيات الاجنحة وفضيلة  
الهلكتونيات. انواعها المعروفة نحو ٩٠ اعطتها امريكة  
الجنوبية | اجسامها نقيقة تطول من ٢٢ الى ٢٨ مم.  
بسطها تراوح من ٣٤ الى ٤٢ مم. رؤوسها شبه مكررة.  
عيونها بارزة، قرونها الاستشعارية ثلاثية الفصل. مخاطمها معتدلة  
رواشنها كبيرة، مستعيرة الاطراف، جميلة التضبيب  
والزخرفة | جميع انواع هذا الجنس تفرز، للدفاع عن  
النفس، مادة سائلة صفراء اللون، كريهة الرائحة تبعث  
عنها الطير والحشرات المفترسة | أشهر انواعها واعضا  
انتشاراً هلكونوس البرازيلي H. eucreate. تويه اصفر  
اللون صناعي اللوام مجذع ومزخرف بالاحمر.

### ٣١٤٥١ - هَلَوَايْتٌ (E) Helioyate (F)

شيليكيات الالومنيوم الطبيعي المنشوء.  
٣١٤٥٢ - هَوْرِي (F) Lacustra (S)

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان أو نبات يعيش في  
الاهوار والبحيرات والغدران | ويطلق حصلياً على تكوين  
خاص أو تربة خاصة فتقول تكوين هوري وتربة هورية |  
ويطلق اركيولوجياً على الساسكر والقرى التي كانت تشاد  
فوق الماء على ركائز وواتاد مفروزة في القاع.

### ٣١٤٣٩ - نُشْ (F) Bipartition (E)

النش في علم النبات هو الانقسام الى شطرين متساويين.

### ٣١٤٤٠ - نُشُوءٌ ذَاتِي (F) Abiogenèse (E)

النشوء الذاتي نظرية بيولوجية قديمة كانت تسلم بنشوء  
الحياة من مواد طبيعية خام.

### ٣١٤٤١ - نَلَقَّةٌ (F) Pénépleine (F)

نقعة ج تقات اسم يطلق على الجبال القديمة العهد التي  
قضت عليها العوامل الارضية المسحقة فاصبحت  
منبسطة كالسهول | أشهر هذه القاف وارحها انصاعاً  
سهول فنلندة في شمالي اوروبا ونجد البحيرات الكبرى في  
كندا.

### ٣١٤٤٢ - نُكَلَةٌ (F) Nucleus (E)

اسم يطلق، في علم التشريح، على نواة الحبيرة الحيوانية  
أو الخلية النباتية.

### ٣١٤٤٣ - نَبِيْقٌ (F) Inlandsis (E)

اسم يطلق على كتلة الجليد التي تلحف الاراضي القطبية |  
النبيق الذي يلحف بعض اجزاء الغرولند يقدر بنحو مليون  
كيلومتر مربع | النبايق التي تلحف اراضي القطب  
الجنوبي تقدر بملايين الكيلومترات المربعة | أما سماكة  
هذه النبايق فتتراوح من متر واحد الى ٣٠٠٠ متر وأكثر.

### ٣١٤٤٤ - هَبْرُوسٌ (F) Velia (S)

جنس حشرات قانصة من نصفيات الاجنحة وفضيلة  
الهبروسيات. انواعها المعروفة نحو ١٥ متشرة في جميع  
انظار العالم | اجسامها صغيرة تطول من ٧ الى ٩ مم.  
رؤوسها مخروطية الشكل، قليلة البروز، عيونها صغيرة  
ناشزة. قرونها الاستشعارية ثلاثية الفصل. مخاطمها معتدلة  
الطول ثلاثية العقل. اجنحتها متباينة الاشكال والحجوم.  
فواصلها الخلفية مستفصحة الافخاذ. الوابها ملونة | يكثر  
وجودها في النائق والاهوار وعلى ضفاف مجاري الماء.  
جميعها قانصة تسرع على سطح الماء. قوتها الهوام وكل ما  
استطاعت اليه سبلا من حشرات.

### ٣١٤٤٥ - هَبْرُوسِيَّاتٌ (F) Veliidae (S)

فضيلة حشرات من رتبة نصفيات الاجنحة المختلفة.  
اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة الحد متشرة في جميع  
اصقاع العالم | تألف النائق ومجاري الماء وضفاف  
الانهر. تسرع على سطح الماء برشاقة الشابرات. قوتها  
الهوام والحشرات الصغيرة | أشهر اجناسها الهبروسة.

### ٣١٤٤٦ - هَرْسِيْنِيٌّ (F) Hercynien (E)

نعت تعريفي أو اسم يطلق على اقدم التضخينات التي  
حصلت في القشرة الارضية وما نجم عنها من سلاسل  
حليّة.

### ٣١٤٤٧ - هَلِكُوسٌ (F) Helictus (S)



Enzaïque (F). Enzaic (E). <sup>٣١٤٦٠ - يُحْفُورِي</sup>  
نعت تمريني يطلق على كل موقع أو ارض تكثر فيها  
الاحافير الحيوانية أو النباتية.

Ammomanes (S). <sup>٣١٤٦١ - يُرْمَل</sup>  
Ammomane (F).

جنس طير من الجوامث مخروطيات المنائر ونصيلة  
الْقَبْرِيَّات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها الصحارى  
والبلاد الحارة. تألف الواحات والمواقع المبعثرة الاشجار  
وبعضها يرغب في البراري القاحلة || اجسامها شبيهة باجسام  
الْقَبْرِ ، تطول من ١٤ الى ١٨ سم. مناقيرها مخروطية نرية.  
اجنحتها معتدلة الطول ذقنة. اذناها فارقة. اتواها الى  
الصهبة المنمشة والمرفوشة بالاطحل والاسمر || ملجئها  
الحياتي جماعي. جميعها من الضواري التي تجوب البلاد  
في طلب الرزق. قوتها الحشرات وبعض الزور والثمار ||  
افواجها متوسّطة العدد إلا في زمن القطاع حيث يتألف  
السرب من عدة مئات || اناها تدن في التربة بين الاعشاب  
المتراكبة. حضنتها تراوح من ٣ الى ٥ بيضات. ترخيمها  
يستمرّ نحو ١٤ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر || اعرف  
انواعه واشهرها البرملة الابنية

Am. cincture (S). Am. élégante (F).  
اعطائها تمتد من الصحراء الكبرى الى جبال الاطلس ،  
تجوبها كل عام.

Cassia (S). Casque (F). <sup>٣١٤٦٢ - يَلِكَة</sup>  
جنس حيوانات بحرية من الرعويات معنّيات الارجل  
مشطيات الخياشيم وفصيلة الخونويات. انواعها المعروفة  
عديدة ، معظمها من متحجّرات الاراضي الثالثة ،  
المعاصرة منها الآن نحو ٥٠ متشرة في بعض بحار البلاد  
الحارة والمعتدلة الحرارة. تتميز بشعانة اصدانها الخونوية  
الشكل المتراكبة الاطناف والزخارف والالوان.

Lillies (F). <sup>٣١٤٦٣ - سُسِيَّات</sup>  
النباتات مجسومة نباتية من وحدات الفلقة تضم خمس  
فصائل وهي الزنبقيات والزمراريات والوعلاقيات  
والقصورسيات والزغفليات.

Corynmethe Yohimba, <sup>٣١٤٦٤ - يُوْهَمِبَة</sup>  
Pausinystalia Yohimba (S).  
Yohimbé (F). Yohimbe (E).

شجرة حرجية طيبة ، كبيرة الحجم ، دائمة ، من فصيلة  
الفوفيات. منتها بعض مناطق البلاد الاستوائية اخصها  
الكامرون والجاون والكونغو || ساقها منتصب ، رفيعة ، عتية  
الاغصان. اوراقها معنقة ، متعابلة ، اهليلجية النصال.  
ازهارها عكولي التجميع ، طرفي الارتكاز. ثمارها جراء  
شبه بيضية الشكل تملغ الصبد من البزور الصغيرة ||  
يستخرج من لحاء ساقها واغصانها مادة اليوهيمين المشهورة  
بخواصها الشافية.

Lépidodendrées (F). <sup>٣١٤٥٣ - هَيْسُومِيَّات</sup>  
مجموعة نباتات متحجرة قريبة الشبه بالخشريات.  
اجناسها المحققة متوسّطة العدد جميعها من نوات الحقبة  
البفونية والكربونية المعادة الى الاباج الاول || تميّزت هذه  
النباتات بسخامة سوقها المستطيلة ان كان قطرها يراوح  
من ٨٠ الى ١٢٠ سم. وارتفاعها من ١٠ الى ١٥ مترا.

Achlemydée (F). <sup>٣١٤٥٤ - وَالِيَّة</sup>  
اسم يطلق على كل زهرة عادمة التويج والكأس. جهازها  
وزيم وعطيل.

Monodelphes (F). <sup>٣١٤٥٥ - وَحِيدَات الرِّحْم</sup>  
Monodelphia (E).  
اسم يطلق على جميع الثدييات التي تضع اولادها كاملة  
الخلفة بخلاف نوات الرحمين او الجرابيات التي تنتقل  
اولادها من الرحم الباطني الى الجيب الخارجى المعروف  
ايضا بالجراب حيث تقيم فيه حتى اكتمال فالغمام.

Bembecidae (S). <sup>٣١٤٥٦ - وَرَّاشِيَّات</sup>  
Bembécidées (F).

فصيلة حشرات من الحويكات ورتبة غشائيات الاجنحة  
المختصرة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة متشرة في  
جميع اصقاع العالم خاصة في البلاد الحارة والمعتدلة  
الحرارة || اجسامها متباينة الحجم ، منها الصغيرة  
والوسطى والكبيرة ، جميعها قريبة الشبه بالثعل  
والزناهير. اناها ملونة بكثر فيها الاصفر المجزّع بالاسود  
|| جميعها تصنّف في التربة. محاجرها رداء فسيحة تغور  
نحو ١٠ سم. مداخلها انفاق انبوبية الشكل منحرفة نحو  
السطح. اصغافها متراكبة المتخاربت المسنسة المسطوح ||  
قوتها الذباب والهوم والصغير من نوات الجناحين  
تقتنصها فتخترقها وتنقلها الى اصغافها زائدا لها وليرقاتها ||  
اعرف اجناسها واشهرها الورشة والمنثولة.

Achlemyde (F). <sup>٣١٤٥٧ - وَلِيَّت</sup>  
نعت تمريني يطلق على كل نبات خشبي من نوات الالياف  
المحسوبة بخلاف واحد بدلا من غلاتين.

Ytterbium (F). Ytterbium (E). <sup>٣١٤٥٨ - يَتْرِيُوم</sup>  
عنصر معدني بسيط. رمزه (yb) وزنه الاتومي ١٧٣,٠٤  
رقمه الاتومي ٧٠ يستخلص من الاتربة الاربية. اول من  
اكتشفه مارياتاك عام ١٨٧٨.

Yttrium (F). Yttrium (E). <sup>٣١٤٥٩ - يَتْرِيُوم</sup>  
عنصر معدني بسيط. رمزه (y) وزنه الاتومي ٨٨,٩٢  
رقمه الاتومي ٣٩ اول من اكتشفه غولان عام ١٧٩٤.



يرمل







*L'Encyclopédie des Sciences de la Nature  
se compose de quatre volumes, dont le dernier  
comprend les lexiques des termes  
allemands,  
anglais,  
français,  
grecs,  
italiens et  
latins.*



Edouard Ghaleb  
Ingénieur agronome

---

# **ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES DE LA NATURE**

## **ENCYCLOPEDIA OF NATURAL SCIENCES**

---

Agriculture, Botanique, Zoologie, Ornithologie,  
Ichtyologie, Entomologie, Parasitologie, Bactériologie,  
Microbiologie, Affections animales et végétales.

Termes techniques:

(Physique, Chimie, Mathématiques, Géologie, Astronomie, Droit)

### **Volume III**

2ème ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE





---

**ENCYCLOPEDIE DES  
SCIENCES DE LA NATURE**

**ENCYCLOPEDIA  
OF NATURAL SCIENCES**







**Dar el-Machreq sari**  
Boîte Postale 946 Beyrouth, Liban

Distribution :



**Librairie Orientale** - Boîte Postale 1986  
Beyrouth, Liban



ARTICLES ET INDEX  
en arabe, anglais, français  
allemand, italien, latin et grec

Edouard Ghaleb **ENCYCLOPEDIE DES  
SCIENCES DE LA NATURE**

Agriculture • Botanique • Zoologie • Géologie

**ENCYCLOPEDIA  
OF NATURAL SCIENCES**

2420 pages • 31464 articles  
6962 illustrations • 24 planches en couleurs

Agriculture • Botany • Zoology • Geology



**DAR EL-MACHREQ**  
BEYROUTH